


80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

喬木類

三十八

地
棲漢三才圖會



和漢二才圖會卷第八十三目錄

香向木類

黃蘖

三
卷之二

小蘋

卷之三

卷之三

波牟乃木

木

厚朴

卷之三

杜仲

同會印政

意
意
あいき萩

梧桐

5

卷之三

木油桐

1

海桐

• 100

和漢三才圖會卷第八十三

攝陽城醫法橋寺島良安 尚順編

香向木類

本草必讀之圖



黃蘖

和名岐波太
今專日黃柏

本綱黃蘖樹高數丈葉似吳茱萸亦如紫椿經冬不凋其皮外白裏深黃色緊厚二三分鮮黃者爲上根結塊如松下茯苓名之檀植百歲以上者根長三四尺別在芝旁以小根綴之又名檀樹氣味苦寒入足少陰腎經爲足太陽膀胱引經藥生用則降實火熟用則不傷胃酒制則治上鹽制則治下蜜制則治中也惡乾漆伏硫黃其

多羅葉

榕

印鑄二才圖會

卷之二

卷八十三

1

用有六瀉膀胱龍火利小便結除下焦濕腫
三也治痢疾先見血四也治臍中痛五也補腎不足壯骨髓六也乃癰瘍必用之藥治口瘡如神黃蘖無知母猶水母之無蝦也蓋黃柏能制膀胱命門陰中之火知母能清肺金滋腎水之化源故皆以爲滋陰降火要藥然必少壯氣盛能食者宜用之若中氣不足而邪火熾甚者久服則有寒中之變

檀桓苦寒治心腹百病安魂魄不饑渴久服通神

△按黃柏藥用外可以染黃色日向加賀之產最良和州吉野與州會津之產次之



いのきの木 子蘖

山石榴
金櫻子杜鵑花並名山石榴同名異物也

小蘖

本綱小蘖生山石間小樹也枝葉與石榴無別但花異子赤如枸杞子兩頭尖其皮外白裏黃如蘖皮而薄小也氣味苦大治口瘡殺諸蟲去心腹熱氣△按小蘖葉似柳而狹長其子大如豆生青熟淡紫色中有三子黑色似山椒子苦辛名志古乃倍伊用洗眼良樹皮可以染黃偽充黃柏不可不辨其材爲板旋箱

黃櫞

俗云波時乃木
和名波途之



本綱黃櫞生山谷葉圓木黃可染黃色木苦寒治黃疸目黃水煮服之洗赤眼及湯火漆瘡△按黃櫞以染黃色天子御袍稱黃櫞染是也染帛上用磁木畧深則爲黑茶色其葉小淺青色莖微赤三四月

開小白花結細子至秋紅葉

そんのき 正字未詳

波牟乃木

△按波牟乃木生山中高者二三丈葉似栗而輒花亦似栗花而褐色實似杉實其木肌心白色見日則變赤今染家用梅木煎汁中投此木屑經宿以染赤色

かくかく 烈朴

赤朴

もものき 厚皮

重皮



厚朴

樹名櫟
子名逐折

和名保乃加之波乃木
今云保乃木

本綱厚朴生山谷中梓州龍州者爲上其木高三丈徑一二尺膚白肉紫春生葉如榆葉四季不凋皮鱗皺而厚紫色多潤者良五六月開細紅花結細實如冬青子生青熟赤有核

皮

辛

其用有三平胃也去腹脹也孕婦忌之

也

雖除腹脹若虛弱人宜斟酌用之誤服脫人元氣乃

結者散之之神藥能瀉胃中之實平胃散用之佐以蒼

木瀉胃中之濕平胃土之太過以致於中和而已非謂

溫補脾胃也蓋與枳實大黃同用則能泄實滿與陳皮

蒼木同用則能除濕滿與解利藥同用則治傷寒頭痛

與瀉痢藥同用則專治腸胃

不以薑製則辣人喉舌乾薑爲之使惡瀉薦忌豆食之動氣

△按厚朴葉大者近尺似榆葉而無刻齒淺綠色冬凋春

生嫩葉夏開花狀似牡丹花而淺紫色大一尺許隨結實似冬青子而熟則殼自裂裏赤中子黑老木皮有鱗皺剥入藥用膚白理密微帶黃作刀劍鞘或筆等塗蓋其葉四季不凋者花紅細者並不當



思仙

木綿 棉
昔有杜仲者服此得道因名之思仙皆由此義

杜仲

本綱杜仲生深山中樹高數丈葉似辛夷及柘葉其皮折之銀絲相連如綿故名木綿初生嫩葉可食其花實苦澀其子名逐折與厚朴同名皮甘溫肝經氣分藥潤肝燥補肝虛益肝主筋腎主骨腎充則骨強肝充則筋健屈伸利用皆屬干筋杜仲能入肝而補腎治腰膝痛以酒行之則爲妙客易矣

木綿 棉
昔有杜仲者服此得道因名之思仙皆由此義

△按杜仲本朝古有之今亦有稱杜仲者皮相似而無絲入藥來於中華者佳



椿

梔

ちやんちゆん 虎目樹

大眼樹
今云知也并知半唐音之訛也

樗
今云知也并知半唐音之訛也

樗
今云知也并知半唐音之訛也

本綱椿樗榜乃一木三種也皆亦類漆樹其葉脫處有痕如虎之眼目又如樗蒲子故名之其木易長而多壽考故有椿榜之稱莊子言太椿以八千歲爲春秋是矣

椿
皮細肌堅實而赤嫩葉香甘可茹

樗
皮粗肌虛而白其葉臭惡其木最爲無用莊子所謂吾有大木人謂之樗其木擁腫不中繩墨小枝曲拳不中規矩者也樗之有花者無莢有莢者無花其莢夏月常生樗木未見椿之有莢者然樗莢俗不辨之而

樗莢爾

樗 即樗之生山中者亦虛大然爪之如腐朽故以爲不

才之木不似椿木賢實可入棟梁

椿根皮 色赤而性滻

樗根皮 色白而性朴

其主治之

功雖同而滻利之效則異

正如伏苓芍藥亦白頗殊也

凡血分受病不足者宜用

椿根皮氣分受病有鬱者宜

用樗根皮凡女子血崩產後血不止月信來多或亦帶

下及小兒瘡瘍宜用椿根皮

鳳眼草 即椿樹上所生莢也

蓋謂椿不莢生也

燒灰淋水

洗頭經一年眼如童子

加椿根皮灰尤佳

正月七日二月八日三月四日四月五日

五月二日

六月四日七八月三日九月二日

十月三十日十一月十二日

九日十二月十四日可洗之

△ 檀椿葉似漆而初生二三年者未分枝梗至秋莖葉皆落盡如立一棒其莖脫處有窪痕春梢生葉嫩隨長而莖葉亦隨分經四五十年者生枝梗最易長葉香採嫩葉

噉之相傳黃藤禪師始將來之呼曰香椿

倭名抄椿

和名豆爲海石櫟之訓

樗名爲五倍子樹

之訓者並非也凡香椿及漆葉橫理透背鮮明頗似檀葉而小兩兩繁對生

香椿折枝有香氣故臘汁食人

生漆齋

李 本字

和名宇留之

暴物色潤美

漆

ツイ 木蠟 漆子也

本綱漆木高二三丈其身如柳其葉如椿皮白花似槐其子似牛李子木心黃也春分前移栽則易成有利六七月以竹筒釘入木中取滴汁則成漆其汁可以暴物金州者爲佳以物亂之試之微扇光如鏡懸絲急似鈎撓成琥珀色打着有浮漚凡漆物難乾得陰濕雖寒月亦易乾一種有黃漆 出於廣浙中樹似小楨而大六月取汁其

漆物黃澤如金凡入藥當用黑乾漆半夏爲之使
乾漆辛溫殺蟲行血破日久癰結之疾血損妙熟不爾

治喉痺欲絕不可針藥者以筒吸之

漆得蟹而成水蟹見漆而不乾蓋物性相制也

凡人畏漆者嚼蜀椒塗口鼻則可免

生漆瘡者杉木

湯紫蘿湯漆姑草湯蟹湯浴之皆良

△按漆樹陸與出羽下野處處關東之產稱世之女漆爲最上日向米良之產次之真黑塗及小細工家可用之和州吉野漆者朱及黝朱必可用中國西國北國皆有之而越前之產最下凡入藥可用唐乾漆髹物唐漆不佳也凡木器磁器破者以漆接繼之則不可離如欲復離之者薺麥稈灰汁中投漬其器則可離

一種波世漆正字未詳

樹葉似漆而瘦小莖赤生山中其木

漆不堪用子亦爲蠟不佳



梓

音

實名豫章

楠樟亦名豫
章與欽同名
和名阿豆佐

太明一統志云朝鮮亦有黃漆樹似棕六月取汁漆物如金本朝黃漆未曾有但以藤黃和漆金則爲黃而已

漆子本草唯謂治下血本朝人採未熟者搗爲木蠟作蠟燭再晒煉爲髮油如膏藥而其木蠟出於諸國備前爲上會津次之凡搔漆樹不結果子故收子者不取漆有三種木理白者爲梓赤者爲楸梓之美文者爲楠小角其角細長如箸其長近尺冬後葉落而角猶在樹其實名豫章其花葉飼豬能肥大

者爲櫻。

△按梓桐之屬其花深黃色古者彫此木爲書版故有繡梓綴梓之名倭版多用櫻木

むささ

櫻

和名比佐木



本綿楸即梓之木赤者也有行列莖幹直聳可愛至上垂條如線謂之楸線其木濕時脆燥則堅良材也宜作棋枰其葉大而早脫故謂之楸唐時立秋日京師賣楸葉婦女兒童剪花戴之取秋意也擣楸葉傳瘡腫煮湯洗脹血冬取乾葉用之

農政全書云楸山谷中多有之甚高大其木可作琴瑟葉類梧桐葉而薄小葉稍作三角尖叉開白花味甘

ツウ
楸 秋

刺楸
くわひざき

櫻 同

本綿刺楸即楸之屬葉大而早脫者謂之楸葉小而早秀故謂之櫻二木共散散音鵠皮粗也

△按櫻字今俗以爲惠乃木者無櫻

櫻

音 益

萬年樹
和名河皮木



說文云：楨，梓之屬。二月花白，子似杏葉，亦似杏而尖，白色皮正赤，其理多曲，少直，材可爲弓弩幹。

伊勢物語：木有楨，名也。其子曰楨，其葉曰楨葉。



桐 同 音

白桐 黃桐
泡桐 白花桐
岐利乃木

トシ

本綱岡桐喜生朝陽之地，因子而生者，一年可起三四尺。由根而出者，可五七尺。其葉圓大而尖長，有角光滑，而毛最易生長。先花後葉，三月開花，如牽牛花，而白色花心微紅，結實大如巨棗，長寸餘，內有兩房，房內有肉，上有薄片，即其子也。輕虛如榆莢，葵實之狀。老則殼裂隨風飄揚，其木輕虛皮色粗白，故名之。白桐不生蟲蛀，作琴瑟及器物。

屋柱甚良。
△按桐木作筆及箱櫃，輕而不蛀，以爲上品。性不黏堅，故不堪爲屋柱而已。最易長有幼女家，可栽之。當嫁之頃，則宜作櫃板。云云。凡桐子種者，宜剪蘗早茂長。

かうとうり 紫花桐

岡桐



本綱岡桐文理細而體性堅，亦生朝陽之地，不如白桐易長。其葉三角而圓大，如白桐，色青多毛而不光，且硬微赤，亦先花後葉，花色紫其實亦同。白桐而微尖狀如詞子，而粘，房中肉黃色與白桐皮色皆一，但花葉小異。體性堅慢，不同爾。又有冬月復花者。

桐葉 茎葉 茎葉若寒 治癰疽發背，大如盤，臭腐不可近者，桐葉醋

希漢三才圖會

薰貼上退熱止痛漸漸生肉收口極驗秘方

外而有桐之皮蒸之多益之勿令身之氣

ごとうざり

槐 音親

五同桐

以字音呼



梧桐

一名青如狼裡

ウ、トン

本細梧桐似桐而皮青不散其木無節直生理細而性緊葉亦似桐而稍小先滑有尖其花細莖墜下如釀其莢長三寸許五片合成老則裂開如箕謂之橐橐鄂其子綴於橐鄂上多者五六少者二三子大如胡椒其皮皺但晚春生葉早秋即凋其木易生鳥卵子隨生其生山石間者用爲樂器更鳴響也古稱鳳凰非梧桐不接豈亦食其實乎遁甲書曰梧桐可知日月正閏生十二葉一邊有六葉從下數一葉爲一月至上十二月有閏十三葉其小者爲閏

青桐

即梧桐之無實者又似青桐葉有棱者名鵝桐

△按梧桐其子大如胡椒正圓故諸書謂丸藥大可如梧桐子者是也

或書云推古帝時參河國山有神代桐木長四十九丈太二十二尋枝過半枯中有虛洞本有洞口龍住時發雲霧依日桐生山峯

わざとざり

瞿子桐

油桐

荳油桐

だま



本細油桐枝幹花葉並類圓桐而小樹長亦遲花亦微紅但其實大而圓每實中有二子或四子大如大風子其肉白色味甘食之吐逆得酒入多種藥收子貨之爲油入漆

家及船舶用爲時所湏其油似荳油有僞者惟以箇圈蘸起如鼓面者爲真。

桐子油甘微辛寒

傳惡瘡塗鼠咬處又能辟鼠治酒釀

赤鼻桐油入黃丹雄黃傳之

△按油桐江州濃州多種之揩油大津油家販之其功同荳油煉成代漆用名桐油漆可以塗五色常漆不能塗白色也又加松脂塗船槽不木漏名知也半塗造桐油漆法

桐油一合密陀僧二錢滑石五分白礬三分

以文火煉之豎起燈心不仆爲度其青色綠青黃藤黃

赤朱或白白粉黑油煙

加所好者塗之水中有盛竹筒則不涸乾



海桐

今云島桐



刺桐

本綱海桐生南海山谷中葉大如手作三花尖皮若梓皮黃白色而堅韌可作繩入水不爛其木有巨刺如櫟樹纹理細緊而性喜折裂三月開花赤色照映三五房周則三五復發其實如楓子

△按海桐工匠以旋箱偽白桐然木理縱文微似槐木理劣於白桐矣畫譜云海桐花細白如丁香而嗅味甚惡遠觀可也據此則花色白蓋有赤白二種乎



賴桐

賴音稱

赤色再深也
今云唐桐

本綱賴桐生江南身青葉圓大而長高三四尺便有花成叢而繁紅色如火無實爲夏秋榮觀

△按賴桐近年來於薩州屋致島植庭園悉之葉大五六寸許而微皺其花深紅色有臭樹之花樣性甚畏寒故冬則藏根株包藁至春移栽干地或植於盆賞花

葉苦甘治小兒胎毒草瘡入五香湯用又煎葉汁染皂色



菜盛葉

俗云左以毛利波正字未詳

△按木葉似桐而小高一二丈五月出花穗似麴六月結實有毛似麴而攢生秋黃熟山人用葉盛食物代器皿故名菜盛葉其木不堪材用鳥銜其子遺尿易生

葉苦甘

治

小兒胎毒

草瘡

入五香湯用又煎葉汁染皂色

五菜菜



棟

音

實名金錢子

俗云雲見州

あゆち

苦棟

本綱棟高丈餘其長甚速三五年即可作椽葉密如槐而長三四月開花紅紫色芬香滿庭有雌雄雄者無子根亦有毒服之使人吐不能止時有至死者雌者有子根白微毒其子正如圓棗又如小鈴生青熟黃色歲時記言蛇龍畏棟故端午以葉包粽投江中祭屈原今俗五月五日取葉佩之云辟惡也川棟子苦寒有小毒故熟厥心腹痛及疝氣爲要藥苦棟根皮苦微寒宜用雌者治蛇蟲利大腸治小兒諸瘡燒灰傳之

△按棟其子入藥中華四川之產佳故名川棟子如川芎
川烏頭之類亦然其材微赤色有梗比於桐堅先於櫟
軟可以旋箱此樹易生易長故多栽塘堤

新古今本草曰川棟子根皮味苦性寒能除風濕止癲癇

產地山東形狀如豆莢而細長子葉紫赤色葉味苦

黃棟樹



農政全書云黃棟樹生山野中葉似初生椿樹葉而極小
又似棟葉色微帶黃開花紫赤色結子如豌豆大生青熟
亦紫赤色葉味苦



槐

音回

槐音懷

和名惠爾須

槐黃中懷其
美故三公位
之僚三公者
左大臣右太
臣內大臣也

本綱槐虛星之精老槐生火生丹其神異如此槐之詩歸
也古者聽訟於槐下使情歸實也其生也季春五日而鬼
目十日而鼠耳二旬而葉成初生嫩芽可代茶其木堅重
有青黃白黑色四五月開黃花六七月結實其花未開時
狀如米粒其實作莢連珠中有黑子以子連多者爲好葉
細而青綠者但謂之槐葉大而黑者名櫟槐晝合夜
開者名守官槐有數種而功用不言有別

實苦寒

肝經氣分藥也治證與桃仁同十月上巳日採

槐子去皮納新瓶中封口二七日初服一枚再服二枚
日加一枚至十月又從一枚起而復始明月使髮不落

延年益氣力

有

槐花 苦平以染黃色甚鮮又陽明厥陰血分藥治五痔一

切血症

涼大腸者開時采收陳久

枝葉 苦平洗痔及陰囊下溼

入藥炒用

汁釀酒療大風瘡癰甚妙

△ 檉槐柿枝能生易長有雌雄而雄者開花無子並其材堅實樸文美可以作器盒古今醫鏡云人家庭院門逕宜栽之脩剪圓齊不數年長盛如蓋夏中綠陰可愛滿院清芬也



檀

檀 善木也

字從亶亶者善也

和名萬由三

本細檀有黃白二種葉皆如櫟堪爲飲皮青澤肌細而膩

體重而堅狀與梓榆莢遂相似也至夏有不生者忽然葉開當有大水農人候之以占水旱貌爲水檀也檀木堪作
杵 檳 鍤 及 斧 柯

一種高五六尺四月開花正紫其根如葛

△ 檉檀結實如棟子而小成簇生青熟淡赤裂內有紅子三四粒其葉至秋紅

けつめい

擊迷 翮先

孩兒拳頭

莢速

キツネイ



本綱莢速生山林中其葉似木槿及榆梔小樹其子如豌
豆兩兩相對而色赤味甘皮堪爲索蓋此檀榆之類也
枝葉甘苦下氣消穀煮汁和米作粥飼小兒甚美

本草三才圖會

喬木

卷十三

十三

農政全書云孩兒拳頭莢^名其木作小樹葉似木槿而薄
又似杏葉頗大薄澀枝葉間開黃花結子似瓊疏兩兩切
並四四相對共爲一攢生則青熟則赤色味甘苦



秦皮

檉皮
石檀
盆桂
苦櫟

ツインヒイ
和名止祢利古乃木
一云太無乃木

本綱秦皮其木大都似檀枝幹皆青綠色葉細如匙頭虛
大而不光無花實皮有白點而不粗錯取皮漬水便碧色
書紙看之皆青色者真也根似槐根
秦皮^{寒濶}厥陰肝少陽膽經藥也故治目病驚癇取其
平木也治下痢崩帶取其收濶也治目之要藥也



合歡

尸利灑樹

佛經

ホツハシ
和名祢布里朵
又云加宇加乃木
青裳
萌葛
夜合
鳥賴樹

木綱合歡木似梧桐枝甚柔弱葉似皂莢及槐極細而繁
密互相交結每一風來輒自相解了不相牽綴五月花發
其花上半白下半肉紅散垂如絲爲花之異其緣葉至夜
則合也嫩時燒熟水淘亦可食此樹生山谷人家植於庭
除間使人不忿蓋云合歡蠲忿萱草忘憂

木皮^{甘平安}五臟和心志令人歡樂無憂消癰腫續筋骨
治折傷疼補陰之功甚捷長肌肉與白蠟同入膏用
有神効^{一兩}治撲損折骨法合歡皮^{去粗皮炒}芥菜子炒
每服二錢溫酒臥時服以滓傳之接骨甚妙

卷之三

卷八

卷之四


△ 按合歡木處處山谷有之。和州多武峯最多。其葉夜合，如眠。下界稱祿布乃木。又有睡草，秋開花葉狀與木同。晚眠。



早英

雞栖子 懸力
俗云左以加之
皂角子之訛也

本細皂莢樹其葉如槐葉瘦長而尖枝間多刺夏開細黃花結實有三種一一種小如猪牙一一種長而肥厚多脂而粘一一種長而瘦薄枯燥不粘以多脂者爲佳其樹多刺難上采時以箒箒其樹一夜自落亦一異也有不結實者樹鑿一孔入生鐵三五斤泥封之即結莢人以鐵砧槌皂莢即自損鐵碾碾之久則成孔鐵鍋爨之多爆斤落豈皂莢與



肥皂莢



本細肥皂莢生高山中其樹高大葉如檜及皂莢葉五六月開白花結莢長三四寸狀如雲實之莢肥厚多肉內有黑子數顆大如指頭不正圓其色如漆而甚堅中有白仁如栗煨熟可食十月采莢氣味辛溫治風濕下痢便血癰癬腫毒相感志言肥皂莢水外金魚牌與

痘瘡見文則不訛亦物性然

附

植

夢婆

無患子

肥珠子

菩提子

鬼見愁

油珠子



本細菩提子生高山中樹高大枝葉皆如椿葉對生或曰
櫟柳葉五六月開白花結實大如彈丸狀如銀杏及苦棟子
生青熟黃也老則文皺黃時肥如油廩之形其蒂下有二
小子相粘彌之實中一核堅黑正圓如珠釋子取爲念珠
殼中有仁如榛子仁味辛可炒食相傳以此木爲器用以
厭鬼遂俗名爲鬼見愁備有神巫日搖能符勦百鬼
子皮即枝外肉也治喉痺研細喉中立開滯者去面
△梅無患子俗云有小毒今俗云無久者之此木爲椿樟殺之
及漆葉凡一桺十二三葉對生開小白花其子殼黃皺
帶下二小子及中黑核之形色皆如上所說其黑核須
有微白毛俗呼名豆布其小者爲念珠大者童女用代
錢或鑿一孔植小羽以小板鼓上之則韻頑以爲遊戲
稱之羽子正月弄之也取鬼見愁之義乎其子皮煎汁
洗衣能去垢又漬水以管咬則泡脹起以爲戲俗云奢盒
無冬呂之即木欒子畧也誤爲無患子之名乎

今云菩提樹之葉

三才圖會

樂華

并名無久禮途之俗云無久呂之

所圖

木欒子

附
菩提樹

モツロワシツウ



本綱此樹生山中園圃間或有之葉似木槿而薄細其花黃似槐而稍長大子殼似酸漿其中有實如熟豌豆圓黑堅硬謂之木欒子堪爲數珠其花五六月可收以洗黃甚鮮明未見入藥

華苦寒治目痛腫含黃連作煎療目赤爛

△按木欒子無患子之類異種別有菩提樹者葉似棕又似桑葉而厚面深翠背淺青二四月將花時別出莖生新葉以蔽其莖黃青色微似波蔭草葉抽於其半腹莖稍開花四五朵黃色而小甚香芬花散結實中子如豌豆成簇一房二十粒許淡黑色用爲數珠蓋葉與子之樣大奇

翻譯名義集云菩提樹即畢鉢羅樹也昔佛在世高數百尺屢經殘伐猶高四五丈佛坐其下成等正覺因謂之菩提樹焉莖幹黃白枝葉青翠冬夏不凋光鮮無變每至涅槃之日葉皆凋落湏之復故

此菩提樹者異品而非今菩提樹乎形狀大異



沒石子

黑石子
麻茶澤

モニツツウ

本綱沒石子生波斯及大食國呼稱摩茶澤樹樹高六七丈圍八九尺葉似桃而長三月開花白色心微紅子圓如彈丸初青熟乃黃白蟲蝕成孔其樹一年生拔屢子大如指長三寸上有段中仁如栗黃可取次年則生無食子聞掌

互生也。異產如此。太明一統志云出三佛齊國。沒石子樹
如樟。開花結實如中國茅栗。子苦溫治赤白痢。益血和氣安神。烏鬚髮充令色藥。洗鬚
不造墨。家亦用之。鐵使勿犯銅。並被火驚。



かりろく 詞子

詞黎勒

マリイレツ

本綱詞子生西域。今嶺南皆有。而廣州最盛。樹似木櫟。而
花白。子形似庵子。核橢圓青黃色。皮肉相着。七八月實熟時。
收之以六路者爲佳。六路者即六稜也。或、多、或、少、者、是、雜、路、勒、也。皆圓
而露文。八、路、至、十、三、路、者、號、日、未、熟、時、風、飄、隨、著、謂、之、櫟精勒味濃不堪用也。

隨風子

嶺南風俗有佳客至則用新摘詞子五枚甘草一寸破之。

水煎若新茶賞之。今亦貴。此湯然煎之不必盡。如昔時之
法也。

詞子溫酸止腸澼久泄赤白痢。消痰下氣化食。實大腸。
但同烏梅五倍子用。則收斂同橘皮厚朴用。則下氣。同
人參用。則能補肺。治咳嗽。但效寒未久者不可驟用之爾。

けやき

柏

櫟柳

鬼柳

櫟

音

今云介夜木

倭名抄訓久奴

キニイ

本綱櫟樹最大者高五六丈。合二三人抱其葉。謂柳非櫟。
謂櫟非槐。其實如榆錢之狀。其材紅紫作箱案之類甚佳。
嫩皮取以緣櫈柵及簾幕。土人采其葉爲甜茶。
木皮大治時行頭痛。療水氣。斷刺安胎。止姪婦腹痛。
△按櫟生深山中。形狀如上。說其大者十五六丈。其材帶

紅紫色，龐理堅實，而凡堂城之柱梁用之，經歲不蛀。或作盜漆髹爲飲食器，最上品。作案几及階梯之板，皆佳也。但不宜水濕耳。出於四國西國處處，日向之產爲良。陶弘景曰：皮似槐而葉如櫟，櫟者即久奴木矣。源順擬此，以櫟爲久奴木訛也。櫟有三種：真櫟、石櫟、槐櫟也。其材有少異。

石櫟

木理龐於真櫟甚，堅硬匠人勞于鋸錐。

槐

豆木乃木

木理龐似硬，不硬，不良材。唐韻曰：堪作弓。

俗目槐櫟

蓋櫟弓槐弓

古者多用弓乎？

本

角弓弓之木，今方名櫟弓。

波太豆

波太豆毛利

△按其材似櫟，今多用澤胡桃或波太豆爲板，僞櫟。

矣，秋多之木，今方名櫟弓。

櫟

音

櫟

和名云

櫟

和名云

櫟

和名云



△按櫟木山林多有之。封壠植之，高者五六丈可合抱。其葉似櫟而圓大，微光澤，嫩葉可茹。四月著小花，黃色，狀如雀屎。附生葉面不開，而凋落故視之者鮮枝梢結子，大如豆，生青熟褐，色味甘小兒食之有早晚二種。椋鳥鴨喜食之。

子甘平

治咽喉腫痛及骨髓

其材皮青白色，無龐皮，身白，木理密而硬，然不堪爲柱。伐可爲砧礎，最宜薪。相傳云：其火氣益人身。又生於櫟木，故名奈女。湧々岐木，名依乃詳，芝柄類。

ヤマモミ

小楊

楊柳

布名之太里柳
今唯云夜祭



柳

釋氏呼曰
尼俱律陀木

本綱楊樹枝硬楊起柳樹枝弱而垂流蓋一類二種而今猶併稱楊柳此樹縱橫倒順插之皆生春初生柔荑而開黃蕊花至春晚葉長成其葉狹長而青綠枝條長軟其花中結細黑子蕊落而絮出如白絨因風而飛其子着衣物能生蟲入池沼即化爲浮萍古者春秋取榆柳之火其嫩芽可作飲湯

柳絮苦寒吐血咯血服之佳金瘡出血封之即止又可以捍體代羊毛爲茵褥柔軟性涼宜與小兒臥尤佳古

人以絮爲花謂花如雪者皆誤矣

柳枝去風消腫止痛作浴湯膏藥牙齒藥又其嫩枝剝

爲疖杖滌齒最妙凡諸卒腫急痛以酒煮楊柳白皮暖熨之即止本草綱目△柳極易生易長陶朱公所謂種柳十株可足柴炭者是也凡煉膏藥用柳木或作俎板及蒸籠亦皆以無毒也

三才圖會

所圖



檉柳

觀音柳人柳

チリウ

雨師

今云絲垂柳
又云糸柳

本綱檉柳時珍曰生水旁小幹弱枝挿之易生赤皮細葉如絲婀娜可愛得雨則垂如絲雨師當一年三次作花花穗長三四寸木紅色如蓼花色

△按檉柳即絲垂柳也木似柳而枝倍勒垂葉纖於柳而

不如柏檉之葉細刺者也其花作穗長三四寸似栗花而淡白色也其木皮似楊柳而淺青色肌濃不可謂皮赤又謂花似蓼花而水紅色者並不然也蓋單名檉者則無呂乃木也規類下香名檉柳者則絲柳也然本草綱目所說二物紛紜記于左

爾雅翼云天將雨檉先知之起氣以應又負霜雪不凋乃木之聖者也故字從聖

陸機詩疏云生水旁皮赤如絳枝葉如松

沈炯賦云檉似柏而香

以上皆是無呂乃木也絲垂柳冬凋春生葉其木皮不赤色葉亦不似松及柏檉之輩也而柳山林人家皆多有之不足論者也然泥檉字漫爲集解矣李氏之博識尚有不二省之失況於管見乎

△按川柳岸岸捕之
非落不天木而保土其
花附枝如蠟蝶小青綠
色綻白繁散生葉如楊
柳葉長而不圓也



かはやし
水楊

青楊 蒲楊 蒲柳
柳柳 蓼柳 蓼苻
蓼名加波夜奈木

本細水楊葉圓潤而尖枝條短硬勁軌可爲箭筈有二種
一種皮正青一種皮正白可爲矢其花與柳同
白皮及根 苦平治金瘡漏乳癰腫痘瘡生搘貼瘡其熱
苦平治金瘡漏乳癰腫痘瘡生搘貼瘡其熱
苦平治金瘡漏乳癰腫痘瘡生搘貼瘡其熱

丸子
獨搖

俗云丸葉乃
夜奈波

白楊

本細白楊木身似楊微白故名白楊非如粉之白也木高

大葉圓似梨而肥大有尖面青而光背甚白色有鋸齒木肌繩白性堅直用爲梁柱終不撓曲其根不時碎札入土即生根故易繁風纏至葉如大雨聲但風微時其葉孤絕處則往往獨搖以其蒂長葉重大勢使然也

△按白楊爲开杖名丸葉楊枝性敏於柳然治开齒痛之功以柳爲勝京師太佛得長壽院棟梁木即出於紀州熊野楊其長六十六間凡四十蓋此白楊乎

高飛 唐棣 獨搖

扶移



本綱扶移生江南山谷與白楊是同類二種樹大十數圍圓葉弱蒂微風則大搖故名之花反而後合

木皮苦毒燒作灰置酒中令味正經時不敗

△按桑槐萍蓬草及風藤等草木相兼湯浴之能

五木湯 桑 槐 桃 楠 榆是也

△按杞柳每夏採氣條三四尺者剥去皮作箇白色光澤

本綱杞柳生水旁葉粗而自木理微赤可爲車轂今人取其細條火逼令柔屈作箱篋孟子所謂杞柳爲杯棬者是也

△按杞柳每夏採氣條三四尺者剥去皮作箇白色光澤名柳行李壓干物不損旅行必用之器也多出於藝州嫩木時剥皮故大木希也其皮縛金瘡甚佳

杞柳



キイリウ

ふやなき 正字未詳



贊柳


△按贊柳生山谷叢生高五六尺葉似白楊葉而花穗與柳無異其木枝皆有縱脹起剥皮如堆文亦似人脫贊故呼曰贊柳木理濃美可以作牙杖

ひやうをすき 正字未詳



美容柳

△按俗云美容柳小木勦枝其葉似柳六月開黃花如簾葉棟棠花而甚美不結子蓋此非柳種類最非喬木而



以葉畧似得柳名耳

リヤン
涼 松楊 檉

和名無久

本綱棕生江南林落間大樹葉似櫟兩葉相當子細圓如牛李生青熟黑其木堅重煮汁色赤其材如松其身如楊故名松楊其陰可蔭涼故名棕其材中車輞△按棕樹似櫟而微白色其材堅重用爲榨酒木及櫈杖其葉似櫟葉而薄團有鋸齒枯亦堅以葉面可摩挲象牙鹿角及木器勝於木賊其子黑色而圓如龍眼肉去皮者也小兒喜食之本草謂似柳葉者非也相傳曰原空上人出生日幡降下於此樹因名誕生木彼宗派之輩貴重其念珠其木有作州久米郡

加條木 閩中記曰其葉可用摩犀角象牙於此與猿同類者乎



榆

音

零榆

和名夜仁禮
有數種

刺榆

白榆

棚榆

本綱有數十種今人不能盡別也莢榆白榆皆大榆也有赤白二種白者名粉其木甚高大未生葉時枝條間先生榆莢形狀似錢而小色白成串俗呼之榆錢後方生葉似山茱萸葉而長尖削潤澤嫩葉燥浸淘過可食刺榆有鍼刺如柘其葉如榆諸榆性皆扇地故其下五穀不植今人采其白皮濕搗如糊用粘瓦石極有力或以石爲碓嘴用此膠之

榆白皮

滑汗

治大小便不通除邪氣消腫入手足太陽

和醋塗之蟲當出

△榆木葉皺有刻齒而小不潤多蟲三四月開花細小淡赤生莢莢長不過五六分中有細子其材堅重同干櫟木

蕪荑仁

莢蕪

無姑



本綱蕪荑榆之類出河東河西及高麗山中狀如榆葉圓而厚莢亦如榆莢氣臭如狗性殺蟲置物中亦辟牲但患其臭有大小兩種小者即榆莢也人多以外物相和不可不擇去之

蕪荑仁辛溫治瘧癥冷痢得訶子豆蔻良去三蟲化食治五痔蟲


牙痛者以蕪荑仁及縫中甚妙

孔

△按蕪荑本朝古有而今無之今亦出於攝丹二州山中然以不分明令停止之

蘇木

和名須房



蘭方木

ノウハニ

本綱南海島有蘇方國其地產此木故名今人呼爲蘇木爾崑崙交趾暹羅多有特暹羅國賤如薪其樹類槐葉如榆葉而無澀抽條長丈許花黃子青熟黑其木煎汁染絳色忌鐵器則色黯其木蠹之名曰紫納木蘇方未敷之外以蘇蘭破血治產後血脹及月經不調排膿止痛消癰腫撲瘡瘀血乃三陰經血分藥少用則破血凡使去上粗皮并節得中心文模如嘴角者倍常

△金瘡接指凡指斷及刀斧傷者蘇方未敷之外以蘇蘭包縛完固數日如故多將來之煎汁涂帛及紙絳色次干紅花
△按蘇方暹羅咬嚼吧交趾東京六申柬埔寨等之南方倭有蘇方木樹皮濃白色葉似荊芥葉而薄有光徂葉莖長三月有花淡紫攢生大可麥粒結莢狀似紫藤子而小中有細子春種子生然未見大木故不知其汁染物否今所圖據本草必讀之繪此與倭蘇方不遠但本草細目所言花實異而已疑倭曰蘭方者即紫荊也

灌木類

烏木

ウモツ
鳥文木



木細烏木出雲南南蠻樹高七八尺葉似櫻櫞其木體重

堅
紙
色正黑如木牛角可爲筋及器物有間道者嫩木也
南人多以繫木染色偽之
繫木計編

按烏木出於雲南廣東其性堅實黑色類干角俗謂之
黑檀以爲白檀紫檀等之類非也

檀規丁

黑 檀

林詳于山果類

△梅黑檀即山中樺木心也黑色光澤密理堅硬爲器
甚美以亞鐵力木烏木但嫩木則色不光黑

鐵力木
見于後



樺

音

加木
和名加波
又云加仁波

樺

音

加木
和名加波
又云加仁波

本綱樺生遼東及西北諸地其木似山桃色黃有小斑點
紅色其皮厚而輕虛軟柔皮匠家用織韁裏及爲刀乾之
類或裹鞍弓轂或以皮燒烟熏紙或以皮卷蠅可作燭點
木皮
苦平治黃疽煎服時行熱毒瘡及乳癰良

五雜組云持官炬者以鐵籠盛樺皮燒之易燃而無烟也

△樺木本草未詳何木皮不言其花葉實也而刀乾之乾乃
乃韌軟鞍弓轂之乾乃鎔歟本朝稱樺者山中單花櫻
皮也皮色及所使用如上說

詳于山
之下

華 櫺 木

俗作花梨誤

矣

本綱華櫺木出於安南及南海其木性堅紫紅色似紫檀

而色赤，又有花紋者謂花櫚木可作床几及器皿諸物。

△按華櫚木來於南蠻其木理似櫟而帶紫光色作板及器美也今以楨櫬呼花梨且疑思華櫚木誤之甚者也。

モモロ

機櫚

棕裕

和名椎魯



機櫚

本綱櫚櫚樹最難長初生葉時如白及葉高二三尺則木端數葉如扇高一二丈則葉亦大而如車輪華樹杪上聳四散岐裂其莖三稜四時不凋其幹正直無枝近葉處有皮裹之每長一層卽爲一節幹身赤黑皆節絡宜爲鍾杵其皮有絲毛錯縱如織又如馬駿鬚故字從麥其毛剝取縷解可織衣帽禡椅之屬每歲必兩三剝之否則樹死或

不長也三月於木端莖中出數黃苞苞中有細子成列乃花之孕也狀如魚腹孕子謂之櫻魚櫻鮑漸長出苞則成花穗黃白色結實纍纍大如豆生黃熟黑甚堅實其皮絲可作繩入水千歲不爛其筍及子花有小毒敗人喉不可輕食

皮苦澆治腸風下血赤白痢止吐衄及崩中帶下

燒存性佐以他藥與亂髮灰同用更良年久敗棕

一種 小而無絲惟葉可作帚

一本 多生於深林中多有之

又其子可作扇

△櫚櫚櫚今處處有之薩摩最多剥皮毛爲帚爲繩其葉亦細割如線而爲帚民間多植之有利

一種 唐棕櫚者其葉剪又不深不如倭棕櫚婆娑

一種 棕櫚竹似竹而中實葉似棕櫚而短觀下竹

所謂蒲葵笠同圓扇白色似芭而闊美也本朝未有之

ウミツガ
鷗白



本綱鷗白生南方平澤樹高數仞葉如小杏葉但微薄而綠色差淡其葉用可潔皂五月開細花黃白色八九月子熟初青後黑分爲三瓣烏喜食之又其子可壓油然燈明其木老則根下黑爛成臼其油塗一切腫毒瘡疥根白皮苦微溫能通大小便治腫滿氣虛人不可用



バ豆

老陽子

巴菽 剣子

ハア、方ウ

本綱巴豆本出巴蜀四川也而形如菽豆故名之今嘉州眉州戎州皆有之木高一二丈葉如櫻桃而厚大初生青色後漸黃赤至十二月葉漸稠二月復漸生四月舊葉落盡新葉齋生卽花發成穗微黃色五六月結實作房生青至八月熟而黃漸自落一房有二瓣一瓣乙子或三子子仍有殼用之去殼似大風子殼而脆薄子及仁皆似海松子其繁小者是雌有棱及兩頭尖者是雄雄者峻利雌者稍緩也

戎州之巴豆殼上有縱文隱起如線一道至兩三道呼爲金線巴豆最爲上等他處亦稀有

巴豆 辛溫 生則緩熟則猛若急治爲水穀道路之劑去皮心膜油可生用若緩治爲消堅磨積之劑炒去烟令紫黑色可熟用又云雖可以通腸之藥可以止瀉世所不知也能行能止能降之藥也反牽牛子連巴豆毒者用冷水黃能解之

海紅豆

ハナイホラノウ



本綱海紅豆生南方人家園圃中近時蜀中亦種之樹高二三丈葉似梨葉而圓或云如冬青而圓春開花白色結莢枝間其子累累而綴珠若大紅豆而扁皮紅肉白有小毒蜀人用爲果飴

△按飴音角置食也若謂果子而常食之外間貯食者

相思子

俗云唐小豆

スヤンツ



本綱相思子傳云昔有人歿於邊其妻思之哭於樹下而卒因以名此與韓憑樹不同也海紅豆之類也海紅豆扁生嶺南其樹高丈餘白色其葉似槐花似皂莢其莢似扁豆其子大如小豆半截紅色半截黑色人以嵌首飾氣味苦平有毒食之吐逆治猫鬼野道其症眼見猫鬼及耳有所聞用相思子蓖麻子巴豆各一硃砂末蠟各四錢合丸凡如麻服之即以灰圍患人面前着一斗灰火吐藥入火中沸卽畫十字于火上其猫鬼者死也

豬腰子

リョウモク



本綱猪腰子木生柳州在廣西蔓生結莢內子大若猪之內

腎狀酷似之長三四寸色紫而肉堅故名之彼人以充土貢饋送中土
猪腰子 甘微辛 治一切瘡毒及毒箭傷研細酒服之塗之並良



石瓜

本綱石瓜出四川峨眉山中甘樹修幹樹端挺葉肥滑如冬青狀似桑其花淺黃色結實如綴長而不圓壳裂則子見其形似瓜其堅如石煮液黃色



鐵樹

鐵刀木

俗云太刀也左卒

桃榔木亦名
鐵樹與此不

同

木本畫譜云鐵樹產廣中色儼類鐵其枝丫穿結甚有畫意又聞有鐵樹花葉密而花紅想亦一種也

△梅鐵刀木今出於廣西木紫黑密理爲堅甚美貴重之



美豆木

或用椹字亦俗也

正字未詳

△按美豆木高者二三丈葉似梅櫛木葉而微厚冬凋花似藤花而黃色

下種出於土佐山中。高一二丈葉似粉團花葉而小。正月開黃花。攢簇下垂。結子赤色。呼名土佐美豆木。

かくめの木 正字未詳

扇骨木 加奈女



△按扇骨木高二三丈葉似海石榴葉而狹小有細鋸齒而滑。四月開小白花。結細子作簇八九月赤熟其木堅硬堪爲扇骨故名。

かくめの木 正字未詳

奈岐乃木



△按奈岐木高二三丈老則皮自脫爲紅膚復次如此葉似竹葉而厚有縱理淺綠色表裏滑美甚。莖兩兩對生
こぐれ木 正字未詳

古賀乃木



△按古賀木高一二丈葉似珊瑚樹葉而背色淡開小花淺棕色結子畧作簇大如櫻桃子正赤其木甚堅硬作
破之螺旋之栓

娑羅雙樹



翻譯名義集云婆羅此云堅固冬夏不凋故名堅固其樹
類櫟而皮青白葉甚光潤四樹特高其林森聳出於餘林
也故華嚴經音義翻爲高遠佛入涅槃已四方雙樹皆悉
垂覆如來其樹慘然皆悉變白

△桉婆羅本名也雙樹其林也俗通曰婆羅雙樹片山
有之其花白單瓣狀似山茶花而易凋爾陽雜組云婆
羅樹花如蓮者與此異和別長谷寺有二十株



根多羅

ハルカラ

貝多

字彙云根多出交趾及西域葉可書也
翻譯名義集云多羅舊名貞多此岸形如方梭櫛直
而且高極高長八九十尺華如黃木子或云高七仞

是則樹高四十九丈

西域記云南印度建那補羅國北不遠有多羅樹林三十
餘里其葉長廣其色光潤諸國書寫莫不采用

多羅葉



△梅多羅葉木青白色高者二三丈葉似海石榴而長大
四五月開小白花六月結子大如小豆而青色冬熟則
赤黑色作簇戲採其葉以小火燼暫按於葉上則其痕
爲環其文信於火之大是亦根多羅之類乎今多人家
庭園栽之

榕 音容



字彙云榕初如葛藟綠木後乃成樹五雜組云榕木閨廣有之其木最易長折枝倒埋之外便可合抱柯葉扶疎參雲表大者蔽廬百畝老根蟠挾如石者木理邪而不堅易於朽腐十圍以上其中多空此莊子所謂以不才終天年者也

按此木不載葉花實之形故不知有於本朝不也蓋莊子所言不才木則樗櫟也見于前

