



九

倭漢三才圖會

九十四之末

濕草類

4加3
175
130
72



4 3

叢書
圖書

同會
印政

和漢三才圖會卷第九十四之末目錄

濕草類

款冬花

剪紅羅

金盞草

車前子

蛇含草

鱧腸

豆和

眼皮

金錢花

狗舌草

鼠尾草

連翹

瞿麥

王不留行

葶藶

馬鞭草

狗尾草

倭連翹

和漢三才圖會

叢書
圖書

葫藿

蓼

葎草

三白草

篇蓄

穀精草

蜈蚣草

紫花地下

藍

水蓼

毛蓼

虎杖

蓋草

海金沙

碎米薺

鬼針草

青黛

馬蓼

火炭母草

菹

蒺藜子

水楊梅

半邊蓮

見腫消

草綿

樊噲草

翠蝴蝶

路鳥草

草列珠

泡盛草

九葉草

贊波丁子

秋海棠

岡萍蓬

蝴蝶草

絲線草

草蓮花

山萵苣

澤桔梗

吉野靜草

兔兒傘

紫羅襪花

鶴子草

善界草

淡雪草

櫻草

丁子草

二人靜草

本草綱目卷之九十四之末 〇目錄一

千日紅

緜摺草

牡鷓草

玉毬花

熊谷草

夏雪草

碇草

潮風草

粉條兒菜

亂菊

螢草

雉子竄

董董菜

梅鉢草

華鬢草

有馬草

藁荷草

水引草

虎尾草

猩猩袴

風樓草

鹽竈草

曼陀羅花

逢坂草

日向堪

白絲草

望江南

雨點兒菜

千屈菜

剪刀股

野茴香

火燄菜

藤袴

野鶴草

風花菜

星宿菜

草零陵香

蠟子花菜

香菜

遏藍菜

礮邊草

鰾蓬

白屈菜

毛連菜

委陵菜

婆婆指甲

牻牛兒

胡枝花

結縷草

董

茅切草

矢筈草

角觥草

菅

和漢三才圖會卷第九十一之本

攝陽

城醫法橋寺島良安

尚順編

濕草類



欵冬花

虎鬚

俗云布木乃之字止女

欵凍 類凍

氏冬 鑽凍

菟奚 豪吾

本細百草中惟此不顧水雪最先春也葉似葶藶十二月開黃花青紫萼去土一二寸初出如菊花萼通直而肥實無子根紫色須微見花者為藥或云似葵而大叢生又有紅花者葉如荷而斗直大者容一升小者容數合俗呼為蜂斗葉又名水共春時人採以代蔬其腹裏有絲

氣味辛溫 純陽入手大陰經治欬逆古方用為溫肺治

嗽之最杏仁為之使得紫苑良惡皂莢去

△按雀鳥錫食經云落和名也此則欬冬即山落今云至冬亦葉

不凋落本草二物不分別然所圖落也入藥欬冬可

落初生葉似草薺而無叉尖大者似半莖葉而團莖長

一二尺有溝青白色根本帶紫有微白色皮肉間有絲

剥皮者食春時常用之其花臘月出於土如藜荷掌大

如梅指淺青色採之切片塗豆醬炙食味極苦然本草

為辛者非也嗜酒人賞之或謂治痞積至春稍長外皮

綻舒為葉抽莖四五寸稍開花白帶黃無莖無子與州

津輕之產肥大莖周四五寸葉徑三四尺以代傘防暴

雨南方人聞之不信但未聞有紅花者耳

根苦平倭方海人草欬冬草根甘草三味浸水湯煎以

用初生兒云能去胎毒本草不載



豆和

欬冬

和名夜末布岐

對落謂山落等

今以揀棠花同

名俗曰豆和

△按豆和即欬冬而落之一種莖葉形狀相似而花大異

落青白有溝葉薄軟淺青不凋秋冬枯死

欬冬灰紫無溝葉厚硬深青先澤冬亦不凋

落出於根下一二寸如藜荷掌開舒淡白無藥

秋抽莖作聚二三尺如菊花萼開單正黃有藥

採莖葉燂淘去苦汁為蔬其葉解魚毒中河豚魚毒者

生噉之屢有效又飼馬良不劣於薊葛之葉也九列人

今亦每為蔬菜食之

太加良古 在山中葉似落而花似豆和三月開花連根

莖葉用入洗藥中洗折傷及麻痺但葉本莖有穢

口菓二十圖會 卷之九

藤瞿麥



瞿麥

石竹 蓮麥 天菊 大蘭 南夫世二草 巨句麥

和名大奈天之古 一云止古奈豆

本綱瞿麥葉似地膚葉而尖小又似初生小竹葉而細窄其莖纖細有節高尺餘稍開花田野生者花大如錢紅紫色人家栽者花稍小而嫵媚有細白粉紅紫赤斑爛數色俗呼為洛陽花並二月至五月開七月結實作穗如燕麥內有小黑子其嫩苗煉熟水淘過可食

一種 葉微大花邊有叉極一種 葉莖相似而有毛花晚而甚赤畫譜云石竹二種單瓣者名石竹千瓣者名洛陽花二種俱有雅趣亦須每年起根分種則茂穗苦寒 利小便明目 使即空心令人氣噎小便不禁也

八正散用瞿麥今人為至要藥若心經雖有熱而小腸虛者服之則心熱未退而小腸別作病矣

△按瞿麥即石竹也今以為二種共葩周圍有刻齒而有切又似剪紅紗者為瞿麥無切又者為石竹並出於豫州者良丹波紀伊次之

倭瞿麥 莖葉細弱花有紅紫白赤斑爛單葉千葉數種南京瞿麥 株太莖細而葉大於倭其花單瓣紅

藤瞿麥 莖大高尺餘葉厚形似匙首而深青色抱節兩兩對生其花數朶小形似桔梗而白帶紫萼長淺青倭石竹 莖葉細柔其花有數品從春至秋皆變於子種而異品者為珍賞

阿蘭陀石竹 株莖大葉硬強花亦大有數品也開伊流

剪紅



本草

剪秋羅



剪秋羅

剪紅羅

剪紅羅

俗云仙翁花
今云世年

ツモシキニロウ

本綱剪春羅二月生苗高尺餘柔莖綠葉其葉對生抱莖
 入夏開花深紅色花大如錢凡六出周迴如剪成可愛結
 實大如豆內有細子人家多種之為玩治火帶瘡調塗之
 剪紅紗花 莖高三尺葉似旋覆夏開花狀如石竹花而
 稍大四圍如剪鮮紅可愛結穗亦如石竹穗中有細子
 剪秋羅花 畫譜云剪秋羅花有五種春夏秋冬羅以時
 名也春夏二羅色黃紅不佳獨秋冬者紅深色美亦在
 春時分種喜肥則茂
 △按剪紅羅總名而有數種皆夏月開花稍遲者至秋耳
 冬乃枯死宿根春生苗故未見春冬開花者畫譜之說

不是也相傳嵯峨仙翁寺始出之仍名仙翁花今此畧
 五鳳集云吾邦有一種奇花每歲以六七月着紅謂之仙
 翁花世傳自嵯峨仙翁寺所出也太唐詩文之中論花甚
 夥未聞有此名

蓋此仙翁花乃剪紅羅花也疑僧奮然取得種於中國
 者矣仙翁寺舊地在太覺寺西今為村名今愛宕山一
 有小堂號當時所賞翫者記于左

剪紅羅世今云葉形似梅葉而無鋸齒裏有微白毛對生
 六七月開花正紅色大如錢有刻齒周迴如剪成今時

又有白花者
 剪秋羅俗云松莖葉與常剪羅相似而五六月開花深

紅色其周迴如剪成之處不峻今時有數色紅白及裏
 朱曙紅櫻色等變於子種

剪紅紗俗云小葉細長而五六月開花淡紅色形如石
 竹花其刻齒亦深而美今又有白花者

俗稱



眼皮花

△按眼皮草與剪羅一類異種也春生苗柔莖青綠葉厚於剪羅而不圓末尖六七月開花似剪羅花而刻齒淺其色肉赤也俗說達磨太師九年面壁時欲不眠自剪上下眶棄之地生此草其花肉赤色以為似眶因名眼皮矣一種有逢坂草者見于後



王不留行

ワシフツリウヒ

和名加左久佐

金盞銀臺
禁宮花

本綱王不留行多生交地中苗高者一二尺三四月開小花如鐸鈴狀紅白色結實如燈籠草子殼有五稜殼內包一實大如豆實內細子大如菘子生白熟黑正圓如細珠可愛其功能金瘡止血出竹下刺性走而不住雖有王命不能留其行故名

氣味甘苦 能走血分下乳汁利小便治癰疽惡瘡又竹木鍼刺在肉中不出疼痛者為末熟水傳即出
△按王不留行花似藤瞿花而蓋此治惡瘡故和名為瘡草



金盞草

キンツツスウ

俗云幾年世金花

杏葉草
長春花

本綱金盞花苗高四五寸葉似初生蒿草葉厚而狹抱莖

而生莖柔脆莖頭開花大如指頭金黃色狀如蓋子四時不絕夏月結實在莖內宛如尺蠖蟲數枚蟠屈之狀其葉味酸煨熟水浸過油鹽拌食有治腸痔下血之功

△按蓋贊杯也其花形也近時出白花者為珍俗以為金錢花誤也



金錢花

夜落金錢
子午花
和名抄俗云
古無軟
今云午時花

畫譜云出自外國梁時外國進花朶如錢亭可愛

倭名抄云梁簡文帝有金錢花賦

△按金錢花葉狹長有鋸齒五六月開花深紅色形圓如錢其色狀甚可愛日午盛夜子落俗呼日午時花蓋花馬金錢花者甚誤也



葶藶

丁歷 葶藶
狗齋 太室
大適
和名波未太加奈
一云阿之奈豆奈

本綱葶藶叔世利初春生苗葉高六七寸似薺根白色枝莖俱青三月開花微黃結角子扁小如黍粒微長黃色月令云四月靡草死注曰靡草薺葶藶之屬是也蓋有甜苦二種其甜者不藥入用

子苦寒 降氣以導腫氣其氣味俱厚不減大黃以洩陽分肺中之閉亦能洩大便其苦者下泄之性急既泄肺而易傷胃病人稍涉虛者宜遠之

△按葶藶俗云狗齋以奴奈出於攝州者良播州者次之然是非真葶藶子多用齋子偽之



車前

子五ツエ

和名於保波古

當道車輪菜

芥苳鼠墓衣

馬寫牛遺

牛舌地衣

本綱車前草好生道邊及牛馬跡中故名之春初生苗葉布地如匙面累年者長及尺餘中抽數莖作長穗如鼠尾花甚細密青色微赤結實如葶藶赤黑色子甘寒利小便而不走氣與茯苓收難產又治目赤痛大抵頂佐他藥如六味地黃丸之用澤瀉可也非單用久服之物

△按車前子大葉出於蕪州者良攝州丹州次之今人取其葉傳一切腫物初發者然未知的據但千金方云金葉可傳其子能治內障明目今治疳眼灸八目鰻車前子少糝和令吃之者有據



狗舌草

くせり草

本綱狗舌草生渠塹濕地似車前葉而無文理抽莖開花黃白色四五月採莖暴乾氣味小苦寒有治蟲疥瘙瘡殺小蟲為末和塗之即瘥



馬鞭草

ニアペンツアウ

和名久末豆々良

龍牙草

鳳頸草

本綱馬鞭草春月生苗方莖葉似益母對生夏秋開細紫

花作穗如車前穗又類鞭鞘故名馬鞭其子如蓬蒿子而細根白小

苗葉寒苦微破血行血活血治金瘡通月經治水腫鼓脹

大腹水腫馬鞭草鼠尾草各一斤水一斗煮取五升去

加至四五男子陰腫大如升核痛人所不能治者搗塗

按馬鞭草處處有之攝州之產良陰囊腫痛者用馬鞭草鼠尾草煎汁洗之佳



蛇含草

威蛇蛇銜
紫背龍牙
小龍牙

俗云岐良牟草

本綱生土石上或下濕地其葉似龍牙而小背紫色一莖五葉或七葉當用細葉有黃花者但有二種細葉者名蛇銜大葉者名龍銜

氣味寒苦微傳蛇虺蜂毒及丹毒瘡腫即愈人家種之亦

令無蛇只用葉晒乾勿犯火根莖不用其根名女青

異苑云有田父見一蛇被傷一蛇銜一草著瘡上經日

傷蛇乃去田父因取其草治蛇瘡皆驗名曰蛇銜草

勿誤用有蘗尖葉者號竟命草味酸誤服令人吐血不止

速服知時

女青

一名雀瓢

本綱女青即蛇銜根也

氣味辛平人卒暴死者搗女青屑一錢安咽立活也又

辟穰瘟疫正月廿五日搗末女青盛

一種有藤生者生平澤葉似蘿摩兩相對子似瓢形大如

棗許故名雀瓢根似白微莖葉並臭也然則女青有草

生藤生二種矣

△按岐良牟草生山中移種濕地葉花異峴軒



鼠尾草

みそくさ
勤音山陵翹
鳥草 水青
和名美留月波木
俗云水掛草
チネイヤツソウ

本綱鼠尾草下濕地有之葉如蒿莖端夏生四五穗若車
前又似鼠尾花有赤白紫三種莖葉俱可以凍皂四月採
葉七月採花陰乾
花葉苦微
古方療痢多用之
久痢時止時作搗末飲

服一錢 治連年下血鼠尾草地榆二十兩水二斗煮一
升頓服二十者不過再服亦
可為 反花瘡生于惡肉如飯粒破之血出隨生及
朱服鼠尾草根切同猪脂搗傳
△按鼠尾草多出自攝河州干蘭盆聖靈祭用鼠尾草供
水因稱水掛草無別意但穗花長
以灌木有便耳俗傳鼠尾草莖葉浸
醴投陰地不日蛞蝓化生亦一異也海帶浸雨水則化
蛭之類矣



狗尾草

まのこぐさ
莠音光明草
阿羅漢草
和名惠沼乃
古久佐
俗云波久佐
ケウノイツネウ

本綱狗尾草原野垣墻多生苗葉似粟而小其穗亦似粟
黃白色而無實又穗形象狗尾故名又秀而不實故字從
秀為莠凡赤眼拳毛倒睫者翻轉目驗以一二莖蘸水長
去惡血甚良
△按狗尾草原野多有之小兒用之鉤蛙戲者



體腸

りい
蓮子草 墨煙草
金陵草 旱蓮草
黑頭草 糊孫頭
猪牙草 墨菜
和名字未太多之

本綱體腸草葉似柳而光澤莖似馬齒莧高一二尺開花
 細而白其實若小蓮房體鳥魚也其腸亦鳥此草柔莖斷之有墨汁出故名體腸
 一種苗梗枯瘦頗似蓮花而黃紫色實亦作房而圓是乃
 小連翹折其苗則皆有汁出須臾而濕

體腸草 甘酸 治血痢灸瘡血出不止傳之立已塗眉髮
 生速而繁烏髭髮傳一切瘡止血排膿擊臂截癰此草
 按體腸草男左女右置寸口上以古文錢壓定帛繫田野濕地多有之折苗莖則出黑汁
 葉似柳而小花是蓮草生而小正白不攢



連翹

本綱連翹其子折之片如翹故片有大小二種子亦有二種

連音早蓮子
 異翹三廉
 蘭華 根名
 連軛 又竹根
 和名以多知久生
 一云以大知波

大翹生下濕地或山岡上青葉狹長如榆葉水蘊葦莖赤
 色高三四尺獨莖稍間開花黃色秋結實似蓮內作房
 瓣根黃如蒿根

小翹生岡原之上花葉實皆似大翹而細南方生者葉狹
 而小莖短纒高一二尺花亦黃實房黃黑內含黑子如
 粟粒亦名旱蓮

出於蜀中者子似椿實之未開者殼小堅而外完無附萼
 剖之則中解氣甚芳馥其實纒乾振之皆落不着莖也
 出於江南者子如茵苳殼柔外有附萼抱之而無解脈亦
 無香氣乾之雖久着莖不脫此甚相異蜀中者為勝

連翹若平氣味俱薄其用有三瀉心經客熱一也去上
 焦諸熱二也為瘡家聖藥三也入手足少陽手陽十二
 經瘡藥中不可無此乃結者散之義
 △按連翹本朝古有之今無也而今有稱連翹者與以上
 之形狀稍異記于左

倭連翹

わのきんぎょ



一按倭連翹枝莖柔垂似蔓而非蔓高者丈余周迴不過七八寸似草而非草也三月開花純黃形似桔梗花形而小繁茂遠望之如葉其花罷生葉似梅葉而微長小兩兩對生六七月葉間結實形似綿桃而小生青熟黃黑色中子生白熟褐色本草謂小連翹出於南方者是



蒴藿

花曰陸英

シヨウ チヨウ

和名抄云朔獨二音此間音會久止久今通云曾久豆

葦草 芟音 接骨草

本綱蒴藿春抽苗莖有節節間生枝每枝五葉葉大似木芥其花白其子初青如綠豆顆每象如蠶豆向大又平生有一二百子十月方熟紅其花曰陸英芥及接骨木三物亦同一類故芥名木英蒴藿名陸英花葉並相似

蒴藿 酸温或陸英 寒 惡痒作浴湯妙

治骨間諸痺四肢拘攣疼酸肌皮

△按蒴藿原野多有之人用浴湯云治折傷小瘡



藍

藍音 木藍 右有五品所 圖藍也 和名阿井

本綱蓼藍人家蔬圃作畦種至三四月生苗高三二尺許葉似大蓼花紅白色實亦若蓼子而黑色五六月采實但

其葉可染碧不堪作澱

菘藍葉如白菘 馬藍葉如苦蕒亦名大葉冬藍此二藍

此子並如蓼藍 吳藍莖長如蒿而花白 木藍莖長如

夫明高者三四尺分枝布葉葉如槐葉七月開淡紅花結

角長寸許纍纍如小豆角其子亦如馬蹄夫明子而微小

迥與諸藍不同而作澱則一也皆性味不遠其藍子則專

用蓼藍

藍實 苦寒 解諸毒殺蟲咬小兒鬼利五臟調六腑通關

節益心力 明目 療毒腫

葉汁 苦甘 殺百藥毒及蜂蜘蛛斑蝥砒霜石等毒藍汁

一盞入雄黃麝香以點毒蟲咬處仍服其汁神妙如無

汁以青縹布試以一蜘蛛投入件汁中隨化為水

應聲蟲病疾出腹中有物作聲隨人語言名應聲蟲

病用板藍汁一盞分五服效 卒自縊死者灌之以藍汁

唇邊生瘡連年不瘥者以生藍汁洗之

△按藍京洛外之產為上攝州東成郡之產最勝阿波淡

路之產次之莖葉大者稱高麗藍中者稱京蓼小者稱

廣島藍三月下種四月植苗喜旱而好水有蠶能蝕其

葉頻灌煙草莖汁防之凡植七十日許未作穗時稍且

乘露枝採四五日曝乾去根莖用葉累薦漬池水一日

滴水攤之下布筵二層上亦益筵二層宿蒸之至六七

日再三攪之經二十日取出醱熱氣能採以鹿麩篩去莖

節再乾收取俗名採藍阿井美

又未經篩者曰擣丸如餅俗名玉藍阿井太未

京洛之藍苳葉不着根莖故不採亦用之染色淺青美

凡欲收藍實者苳時殘莖四五寸許則嫩芽再生出穗

藍澱

和名阿 井之流

本綱掘地作坑以藍浸水一宿入石灰攪至千下澄去水

則青黑色亦可乾收用淡青碧又收藍澱浮沫謂靛花氣味辛苦解諸毒傳熱瘡止血殺蟲治噎膈與石炭作

解毒殺蟲之功似勝於藍



唐永徽中有一僧病噎不下食數年臨終命其徒曰吾死後可開吾冢喉視有何物若我如此及死其徒依命開視胸中得一物形似魚而有兩頭遍體悉似肉鱗安鉢中跳躍不已戲投諸味雖不見食皆化為水又投諸毒物亦皆銷化一僧方作藍澱因以少澱投之即怖懼奔走須臾化成水世傳澱水能治噎疾蓋本干此

靛花青蛤粉

青代黑

黛眉色也滅去眉毛以此代之故名之

淡靛花



本綱青代黑以藍為之攪劉藍澱之浮沫掠出陰乾謂之靛

花即青黛也

氣味鹹寒

解諸藥毒治小兒驚癇及府熱瀉肝散鬱火

消食積吐血下血咯血傳金瘡惡腫陰瘡

△按青黛和漢共有之漢者呼青黛深青倭者呼藍澱淺青用為畫具最入藥用亦佳



蓼

料音

青藜

和名多天

リヤウ

本綱蓼其類甚多有青蓼香蓼水蓼馬蓼紫蓼赤蓼木蓼之七種紫赤二蓼葉小狹而厚青香二蓼葉亦相侶而俱薄馬水二蓼葉俱闊大上有黑點木蓼一名蔓生葉侶極葉凡蓼花皆紅白子皆大如胡麻赤黑而尖扁惟木蓼花

黃白子皮青滑諸蓼並冬死惟香蓼宿根重生木蓼出於
苗葉溫一食之過多有毒發心痛和生魚食令人脫氣陰
核痛未死二月食蓼傷人胃婦人月事來時食蓼蒜變
為淋古人種蓼為蔬禮記云烹雞豚魚鼈皆實蓼于其
腹中而和羹臠亦頂切蓼也後世飲食不用惟造酒麴
者用其汁耳

此蓼在三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月

△按青蓼喜濕地二三月生苗四五月繁茂至秋作穗開
細花紅白色播州津由每出穗蓼羊中有穗亦一異也
夏月摘其葉與鮓同食以為必用之物食魚臠用蓼酢
又採穗鹽漬與醢同食亦可也蓋有和生魚食之令人
乾蓼莖煮汁味甘僧侶用代鱉肺蓋造酒麴者用其汁
者未有之古今食品之用不用異同如此也鼈惡蓼
捕鼈入蓼於鼈口則出洵苦矣



水蓼 虞蓼 澤蓼

本綱水蓼生下濕水澤中葉似馬蓼大干家蓼而長五六
寸莖赤色水接食之勝干蓼子
莖葉辛 蛇傷傳之如蛇毒入腹心悶者絞汁服之
後世約其葉



馬蓼 大蓼 黑記草 九物大者以馬名

本綱馬蓼生下濕地高四五尺莖斑葉大每葉中間有黑

和漢三才圖會 卷九十四之末 (七十四)
跡如墨點記有兩三種其最大者即水荳蔻也



荳蔻

いぬこ
鴻韻 龍古
遊龍 石龍
天蓼 大蓼

ホランツアウ

和名伊泥多天

本綱荳蔻草生水旁如馬蓼而長大其莖粗如柵指有毛其葉大如商陸葉其花淺紅色成穗秋深子成扁如酸棗仁而小其色赤黑而肉白不甚辛詩大雅云隰有游龍者即是也

△按荳蔻犬蓼之大者也凡物大者曰馬馬蘭馬藍相似之類是也而可殺其物者以犬為和名犬山椒犬碗犬蓼亦有數種水蓼馬蓼共為犬蓼六月六日製神麵用蓼汁者以水蓼為良犬蓼之莖燒為炭為懷爐之炭佳勝於茄莖之炭能保火

けいご

毛蓼

俗云介太天



ミソ リヤウ

本綱毛蓼生山麓似馬蓼葉上有毛冬根不死蓋此與澤濕之蓼不同

莖葉辛温治癰疽瘰癧并碎納瘡中引膿血生肌

△按俗有用毛蓼為疝氣藥煎服者恐有毒之草多服則有害蓋水荳蔻花治心氣疝痛及痞積與此相誤傳來乎

くはたんがま

火炭母草

ホウタンモラツアウ



本綱火炭母草生原野中莖赤而柔似細蓼葉端尖近梗形方夏有白花秋實如椒青黑色味甘可食葉味酸
△按蓼類為炭能保爐也蓋此草蓼類而特有火母功乎



三白草

和名架之呂又佐
俗云半夏草

本綱三白草生田澤畔八月生苗高二三尺莖如蓼葉如商陸及青葙四月其顛三葉向上二次變作白色餘葉仍青不變俗云一葉白食小麥二葉白食梅杏三葉白食黍子五月開花成穗如蓼花狀而色白微香結細實根長白虛軟有節鬚狀如菖蒲根
氣味甘辛寒治小毒腫脚氣利大小便消痰除積聚
△按本草蕪茶注云三白草葉上有三黑點非白也仍

名抄亦用其說共非也半夏生時分變白故俗曰半夏草



虎杖

和名伊太止里
苦杖 大蟲杖
斑杖 酸杖

本綱虎杖生田野三月生苗莖如竹筍狀上有赤斑點初生便分枝子亦似荻葉葉圓似杏葉七月開花花狀似菊色似桃花九月結實又有無花者根皮黑色破開即黃似柳根
虎杖根溫甘微通月水魁治五淋最奇如石止渴解熱毒暑月以根和甘草同煎為飲色如琥珀可愛甚甘美瓶置井中令冷徹如水時人呼為冷飲子啜之且尊於茗極解暑毒其汁染米作糜饌益美

和名三白草會
虎杖
卷之九十四

△按虎杖根出於金剛山者良小兒折其莖剥去皮噉之味酸故名酸杖大抵高者不過三四尺然松前之虎杖高丈餘而如木甚大者亦有蜀本草言木高丈餘而宗奭疑以為非蓋隨土產有不同豈惟虎杖耶
日本紀云反正帝生淡路宮時於是有井汲之洗太子時多遲花落有干井中因為御名號多遲比瑞齒別天皇多遲花者今虎杖花也

治奔怪病 人忽遍身皮底混混如波浪聲痒不可忍抓之血出不能解謂之氣奔以虎杖人參青鹽細辛各一兩作一服水煎細飲盡便愈

蛇蘭草

本細蛇蘭草生平地其葉似虎杖而小節赤高一二尺種之辟蛇凡蛇虺毒蟲等螫取根葉搗傳咬處當下黃水

△按蛇蘭草生池隄虎杖之一類二種也



馬唐 馬飯
羊麻 羊粟
軒干 蔓干
俗云美曾無良

本細藕生廢稻田中節節有根着土如結縷草而葉長堪飼馬馬食之如膳如飯羊亦食故名之其氣猶臭故曰藕藕者朽臭也

按藕俗云溝渚處處生麥田及溝葉細小而長



扁竹粉節草
扁辨道生草
扁蔓
和名宇之久佐

本綱篇竹春中布地生道旁苗似瞿麥葉細綠如竹及落
 帶葉而不尖莖赤如釵股而弱引蔓促節三月節間開細
 紅花如蓼藍花結細子根如蒿根爐火家燒灰煉霜用
 根苦平 治熱淋瀝痛利小便霍亂黃疸療女子陰蝕及
 痔又小兒吐咬心痛面青沫出臨死者以水一石煎至
 一斗去滓煎如空心服一升虫即下也仍常煮汁食
 錫隔宿勿食
 △按篇蓄處處原野路邊多有之



黄草 鴉脚草
 葦竹 葦蓐
 葦草 熟葦草
 王芻

本綱葦草生山谷葉似竹而細薄莖亦圓小煮以染黃色
 極鮮好詩云終朝採葦不盈一掬又云箬竹猗猗是此葦
 草也

氣味 平 苦 治久欬上氣喘逆又洗一切惡瘡效

△按倭名抄云葦草一名加木奈本朝出二
 處以為一物者非也多出於越前以為染家必用之物
 薑汁加明紫染黃則令色不脫也或
 下染藍上用薑汁再染則成藤葱色



茨 旁通
 屈人 止行
 蒺藜子 休羽 升推

和名波萬比之

本綱蒺藜生道上及墻上布地蔓生細葉如初生皂莢葉
 整齋可愛開小黃花其子有三角四刺實有仁其刺狀如
 菱而小人行多着木履今軍家乃鑄鐵作之以布敵路名
 鐵蒺藜也蓋蒺藜有二種杜蒺藜
 白蒺藜一名沙苑蒺藜 綠葉細蔓綿布沙上七月開花黃紫色

和名波萬比之

如豌豆花而小九月結實作莢長寸許內子大如脂麻狀如羊腎而帶綠色

蒺藜子温若治惡血積聚癥及婦人帶下催生久服長肌

肉明目温若輕身妙黃色去刺用

神仙方云蒺藜子為末每服二錢新汲水日三服勿令

間斷服之一年冬不寒夏不熱二年老者復少髮百復

黑齒落重生輕身延年辟穀長生又治三十年失明眼

△按蒺藜生濱邊故稱濱藜出於豫州者良紀州者次之



穀精草

戴星草
流星草
文星草
俗云波世佐

本綱穀精草收穀後荒田中生之一科叢生莖葉俱青似

嫩穀秧抽細莖高四五寸莖頭有小白花點點如亂星可

饒馬令肥九月採花陰乾可結水銀

一種莖梗長有節根微赤者有之

花辛温性浮能上行治眼病加而用之甚良明目退翳之

功似在菊花之上穀精草防風等分為末米飲

△按穀精草出於參州今焙穀脹開而白如雪亦如花者

名音祿俗此花似之故名波世草



海金沙

竹園荈
俗云頂奈久佐
夕云多不岐久佐

本綱海金沙生山林下莖細如線引于竹木上高尺許其葉細如園荈葉而其薄背而皆青上多皺文皺處有細沙子

狀如蒲黃粉黃赤色不開花細根堅強其沙及草皆入藥
七月收其全科於日中暴之小乾以紙襯裏以杖敲之有
細沙落紙上且暴且擊以盡為度
氣味甘寒 小腸膀胱血分藥也熱在此二經熱淋急痛
者為末煎生甘草湯調服二錢或加右妙

△按海金沙和漢並用之出於江州者良又用江浦草子
偽之試之燃不粘者真也如燃土而粘者偽也

地椒



水楊梅

シヤヤシ

本綱水楊梅生水邊田野叢生苗葉似菊莖端開黃花實
如楊梅狀類椒而不赤氣味無毒治疥瘡腫毒
△按毒草部所載石龍芮與此形狀相似疑是一物二種

矣其石龍芮葉似和入參葉而有光澤詳毒草條下


有一種俗云柳草生田野其莖圓其葉似菊而長似柳

而有齒莖端開小白花結子似楊梅而青此所謂水楊
梅乎然花有黃白之差

ヒョウゲ

蜈蚣草

ウ、コンツルウ



本綱蜈蚣草生村落墜野間左蔓延右右蔓延左其葉密
而對生如蜈蚣形其穗亦長俗呼過路蜈蚣

其延上樹者呼飛夫蜈蚣也根苗皆可用
氣味苦寒 解諸毒治大便不通癰腫搗塗或末服排膿

蜈蚣傷者入鹽少許搗塗○托裏散一切癰疽及腸癰
已破而膿血不散發熱疼痛能食者並宜排膿未破或
蜈蚣赤芍藥當歸甘草等分為末每服二錢温酒下



まんげまね

俗云蓮華花

碎米薺

救荒本草云碎米薺三月米薺可作齏

△按雖不謂其形狀而所圖似今云蓮華花也蓋碎米薺之名義未解也蓮華花春生苗其葉似皂莢及槐之嫩葉兩兩對生枝莖布地如蔓節上抽莖頂開花自三月至四月末盛其花淡紫色本間有白處形似蓮華故名結莢三稜黑色長五六分中有細子自撒易生其多處如敷錦於地人以爲野遊之一興

有白花者和列多有之能治湯火傷揉葉傳汁一種有似碎米薺莖葉而四月開正黃花者其花生莖末形如半邊蓮五月結莢長一寸許似野豌豆

まんげまね

急解毒

半邊蓮

ハアベンレン



本綱半邊蓮生陰濕處莖葉小葉也就地細梗引蔓節節而生細葉秋開小花淡紅紫色止有半邊如蓮花狀故名氣味辛平治蛇傷搗汁飲以滓圍塗之
△按半邊蓮和列河列堤邊有之一莖叢生如蔓葉似碎米薺而秋開淡紫花如刀豆花樣而小似半蓮

まんげまね

獨行虎


紫花地下

羊角子
箭頭草
米布袋



ムハア、イヒヤ

本綱紫花地丁處處有之其葉似柳而微細夏開紫花結
 角平地生者起莖溝壑邊生者起蔓
 又云卿村籬落生者夏秋開小白花如鈴兒倒垂葉微似
 木香花之葉此與紫花者相戾恐別一種也
 氣味寒若辛 治癰疽發背無名諸腫貼之如神連根用之 以白
 麩和成鹽醋浸一夜貼之 瘡得此一尼 瘰癧下瘡此草根
 去粗皮同白蒺藜為末油和塗神効
 △按紫花地丁未考後名凡抽莖植着花狀頗似釘者得
 地丁之名蒲公英為黃花地丁則紫花地丁者今云蓮
 華花而本綱之註亦能當矣然畫圖之形狀不似蓮華
 花故不決救荒本草碎采薺之圖宛然似蓮華花故重
 出之



鬼針草
クイセンソウ

本綱鬼針草生池畔方莖葉有稜子作釵脚着人衣如針
 故名氣味苦平
 治蜘蛛蛇咬碎汁服併傳 又蠍蠚傷塗之

狼把草 一名即耶草

本綱狼把草生山澤高三四尺葉作鴈齒如鬼針草葉
 有稜如釵脚狀
氣味苦平 與鼠尾草功用近故本草見鼠尾草下今附于此

本草綱目卷之二十一 草部 狼把草



筠列

見腫消

クニシスヤク

本綱見腫消生筠列春生苗葉莖紫色高一二尺葉似桑而光面青紫赤色

氣味酸澀有消癰腫及狗咬搗葉貼之

△按見腫消名義其功可知而倭如此草未見識者但此圖三才圖會所圖也而有二品葉形大異



草綿

蠶綿曰真綿故稱之木綿別有木綿即瑛花也

古終

俗云木綿

本綱有草木二種似木者名古良出干灌木類似草者名古終此種出南番宋末始入江南今則徧及江北與中州矣不蠶而綿不麻而布利被天下其益大哉四月下種莖弱如蔓高者四五尺葉有二尖如楓葉入秋開花黃色如葵花而小亦有紅紫色者結實大如桃中有白綿綿中有子大如梧子亦有紫綿者八月采採謂之綿花並出中核紡為細纒以為帛甚軟白子油微辛熱治惡瘡疥癬燃燈攝目

史炤釋文云木綿江南多有之以春二三月下種既生須一月三莖至秋生黃花結實及熟時其皮四裂其中綻出如綿土人以鐵鋌碾去其核取如綿者以竹為小弓長尺四五寸許牽弦以彈綿令其勻細卷為筒就車紡之自然抽繭如線綿狀織以為布

漂着三河國以布覆背有積鼻不著袴左肩著紺布形似
袈裟年可廿身長五丈五寸耳長三寸餘言語不通不知
何國人太唐人等見之僉曰崑崙人後頗習中國語自謂
天竺人常彈一弦琴歌舞哀楚閱其資物有如實者謂之
綿種依其願令住川原寺即賣隨身物立屋焉後遷住近
江國國分寺十九年四月庚辰以彼綿種賜紀伊淡路
阿波讚岐伊豫土佐及太宰府等諸國植之其法先簡陽
地沃壤墾之作穴深一寸衆穴相去四尺乃洗種漬之令
經一宿明且植之一穴四樹以土掩之以手按之每且灌
水常令潤澤待生芸之

△按相傳皆首蠶綿之外以穀皮爲衣服謂之本綿訓由
中古草綿始也本朝桓武朝先於中華凡可二百年矣
今聞唐綿灰白色不知倭綿潔白者也下種先漬水一
宿可糝灰否則生出而蟻子害其苗蓋有早晚早者八
十八夜以後於麥苗之際撒之晚者四月苺麥攬株傍

撒之既生待梅雨晴可拔去繁生者稍長後摘去梅葉
至立秋前三日則止其花向日性惡北風喜西風最惡
雨濕從來南方之種也俗呼曰日照草是也如值濕雨
則桃不開口而凋謂之保呂綿爲濕熱所蒸則不意葉
凋落此乃綿之病名防天灌灰避之
大抵枝葉花似黃蜀葵而花淺黃色其實如桃呼曰綿
桃四裂中吹出白綿以攪車緣去中子其子小者精綿
多稱殖生綿爲上而品類甚多有白花者有本赤末白
花或曰午前黃色午後赤紫色者名曰半變
多田綿 出於攝州花黃而綿甚白細強最良然不
殖生故今多不種用
蝦手綿 其葉深刻如蝦手樹葉故名之白花而桃
大其綿潔白然桃數少
神樂綿 其花有白有黃杈亦攢生儼似神巫所持
鈴故名種之有大利

續三行國書
卷之四
三十四

佐利綿

出於河州其枝葉帶赤色其花本淡紅末黃色或名赤叔者亦此類也綿之能殖生凡神樂佐利之二品為最上三十餘年以來行于世蓋佐利者棄去之訓也相傳有人變於子種始得此種有聲乞之而不與怨棄去其妻故名但恨不肥圃不能茂

煙草綿

其葉青色而枝極際生小葉形如煙草芽故名之桃小而不佳

凡攝津及備後之產為最上播磨丹波備中並佳河州紀州次之泉州為下其他亦出處不攷舉但北國不種凡至白者無如攝州者縞細者無如河州者大顆者無如丹波者

綿子

一桃中子六七或八九有之小者綿佳

其用甚多也磨末榨燈油謂白油光大明也榨糟為田糞良其磨殼燒灰以代薪其灰以琢銅鐵器鑄坩能脫其灰汁以洗晒布帛汚穢去為純白造糕屋作賤果子

以綿子灰汁少許和麩糕令果子脹大然有小毒綿子油濁不堪用攝列平野人加用石灰少許則澄始考澄法今盛用



秋海棠

ツマハアイダン

爛腸草

三才圖會云秋海棠近日見人取梗去皮蘸糖霜吃頗清香其花艷麗可愛

汗躍鯉草本花詩譜云秋海棠嬌冶柔軟其同美人捲粧此品喜陰一見日色則瘁九月收枝上黑子撒於盆內地
上明春發老根過冬發花更茂
△按秋海棠莖葉畧似款冬而小軟有艷梗帶赤色抽莖開花似蕙蘭玉簪花之輩而淡紅可愛其子生枝葉間形色似零餘子而大如豌豆種之易生



兔兒傘

俗云散管笠

救荒本草云兔兒傘生荒野中苗高二三尺許每科初生一莖莖端生葉一層有七八葉每葉分作四叉排出如傘蓋狀故以爲名後於葉間攬生莖又上開淡紅白花根似牛膝而疎短採嫩葉焯熟換水浸瀆去苦味油鹽調食
 △按兔兒傘五月開黃花似菊而如散笠狀



樊噲草

俗稱未詳

△按樊噲草高一二尺一莖一葉有七切又似兔兒傘葉而小莖端開小白花畧似慈姑花或名之散管笠兔兒傘名樊噲會草者亦有



岡萍蓬草

鐵輪花 共俗稱

△按高一尺許葉圓小徑一二寸畧似萍蓬草葉三四月抽莖開黃花似單葉梅花樣



紫羅襪花

草本花詩譜云紫羅襪花其草本色紫翠如鹿葱花秋深

分本栽種四月發花可愛



翠蝴蝶

竹節菜
翠蛾眉
簞竹花
倭青草

鴨跖草之一類乎見本草卷一

農政全書云翠蝴蝶南北皆有山野中亦有之葉似竹葉微寬短莖淡紅色就地叢生攢節似初生嫩莖節稍葉間開翠碧花狀類蝴蝶其葉味甜採嫩苗葉燻熟油鹽調食

王蝴蝶



蝴蝶草

草本花詩譜云蝴蝶草花儼若蝶狀色黃上有赤色細點

調葉秋時分種

續醫說云雲南臨安之南產靈草狀似蝴蝶名之玉蝴蝶凡仕宦閩廣者以此草綴於衣領中可以預知蠱毒領中颼颼作聲其家具簪斷不可食矣無毒則寂然無聲以是為驗此草雖土人亦罕得之劉紹卿官遊此地得藏于家△按王蝴蝶翠蝴蝶共是一物乎唯花色黃與翠之異耳本朝未聞有之其花美而知毒之有無也誠有益草也



鶴子草

不記莖葉之形狀

本綱有蝶之鶴子草蔓草也當夏開花形如飛鶴翅羽皆距皆全是媚草採曝以代面壓蔓上春生雙蟲食葉收入粉奩以葉飼之老則蛻而為蝶赤黃色女子收而佩之名

媚蝶

△按鶴子草此云鷺草之類者乎然鷺草不蔓鶴子草蔓也當入蔓草部而以花異形列蝴蝶及鷺草類

連鷺



鷺草

さきくさ

鷺草

連鷺草

豆禮佐岐
共俗稱也本
名未詳

△按鷺草與州處處有之春生苗葉如麥嫩苗高尺許六月抽莖開花正白色如雪形似鷺鳥故名
連鷺草豆禮佐岐與鷺草一類異種性惡濕喜陰處赤土原非濕草高五七寸葉畧大似万年青嫩葉而後青色夏開花白色帶微青其形似鷺鳥十有余羣飛故名

いしりのき

絲線草

緒手卷

共此俗稱
本名未詳



△按絲線草高二三尺葉似胡蘿蔔葉二三月開花白色帶黃形似籬故名之
一種有八重絲線草其花不單無周圍角籬也

せいしん

善界草

俗稱
本名未詳



△按善界草高六七寸葉似胡蘿蔔葉三月開花黑赤色形似寶鐸花罷後似白熊毛



草列珠

樹有列珠木

俗稱

△按草列珠高二尺許叢生葉似桃葉六月多開小黃花



草蓮花

俗稱

△按有草蓮花者高二尺莖韌垂葉如牡丹葉而狹小長又似淡雪草葉六七月抽莖開白花似蓮花而最小單葉其枝條垂而花向下甚艷美可愛
△農政全書有蓮子草者與此葉形不同疑贈腸草矣曰蓮子

草以其花之莖葉狀似小蓮蓬樣故名生下濕地苗高一尺餘莖紫赤色對生莖又葉似小桃紅葉而長稍間開細辨白花而淡黃心其葉味苦見贈腸草



淡雪草

俗稱

△按淡雪草高七八寸葉似草蓮花五月抽莖開花白色細小似唐松草之輩



泡盛草

俗稱

△按泡盛草，高一二尺，一莖數朶，葉似草蓮花，而畧圓，夏開白花，細小似花苞之穗。



山萵苣

俗云九輪草

救荒本草云：山萵苣生山野間，苗葉撮地生，葉似萵苣葉而小，葉脚花又頗少，葉頭微尖，邊有細鋸齒，葉間攢莖開淡黃花，苗葉味微苦。

△按山萵苣，此云九輪草，子似萵苣葉而扁，邊有細鋸齒，而葉脚窄，葉心莖淡紫，三四月抽莖開小花，似櫻草花而畧大，生於莖圍，八極各一樣，如車輪，至穉如此七層，或九層，宛然似浮屠九輪，故名，有紅白紫三種，結子茶褐色，其葉心莖中有紫色，強系丸形狀，乃九輪草也。

山萵苣花色黃也，九輪草花未有黃色者，以為異。



櫻草

△按櫻草生山谷中，即九輪草之一類異種也，葉形相似，微小，邊無齒，刻不甚，光澤，而葉心白，九輪草三四月抽莖，頂生花，似九輪草花，而單淡紫色，或白色，又如櫻花，最豔美，故名櫻草，結蒴兒，青色，內結子，初青，後茶褐色，人家移種之。



九葉草

くさふさう 俗稱本銘

△按九葉草高尺許一莖無枝象而葉似車百合葉而莖圍相列生九枚秋開黃花似旋覆花

さへふさう 俗稱本銘



澤桔梗

△按澤桔梗高近二尺葉似山丹草葉而短三四月葉間開花形似桔梗而小紫色頗似水葵花而淺水中亦生多生濕地水草部

ちりり(さう) 俗稱本銘



丁子草

△按丁子草高尺許葉似澤桔梗而細長又似山丹葉而細三月葉間著花層層其形如丁子而紫色結莢大平綠豆而一拊二莢向上如角

さんぢり(さう) 俗稱本銘



替波丁子

△按替波丁子高二三尺葉似山漆葉而小其花黃色似菊而小有單葉有千葉自六月至九月逐日開

和漢三才圖會

蕪草

家元古之末

和漢三才圖會 卷之二十一 花部 第三十一



吉野靜

俗稱木詔
靜者源義經
之寵妾有於
吉野山歌舞
之事好事者
比其美以名
之

△按吉野靜高尺許葉似澤桔梗而大三四月開花白色而紫彩點及赤黃色小點甚乃艷



二人靜

俗稱木詔
謠歌云靜女
之幽靈為二
人同遊舞此
花二朵相双
豔美以名之

△按二人靜高尺許葉似櫻桃葉而厚二月葉間開白花形如蓼穗而二小朵成杈



千日紅

せんぢらぎ

△按千日紅高二三尺莖似秋海棠而淡紫色葉似雞頭草而大面有毛茸八九月生花深紫色千葉圓而形似楊梅形其盛久可百日矣有樹名百日紅者以勝之稱千日紅不實唯收花二月採碎之蒔種生或挿枝亦活凡如菊花無實者近年知蒔花



粉條兒菜

黄菅草
紅菅草
共俗稱

和漢三才圖會 卷之二十一 花部 第三十一

農政全書云粉條兒菜生田野中其葉初生就地叢生長則四散分垂葉似萱草葉而瘦細微短葉間攢葶間開淡黃花葉甜煤熟油鹽調食


△按黃菅草高二三丈葉似萱草而細硬又比菅則少稠六月開花黃色單葉似姬萱草花所謂粉條兒菜是也紅菅草葉與黃菅草同抽莖開花濃紅色似萱草花



藁荷草

俗稱林銘

△按藁荷草高二丈葉似藁荷四月抽莖開花如穗而細白花



緜摺草

俗稱本名
古者與州信
夫郡出緜名
緜摺其文如
亂髮而美以
比之名乎

△按緜摺草高五六寸葉如初生稻苗而細軟三月開花如穗而色淺赤

俗稱未詳

亂菊



△按亂菊高七八寸葉似櫻而厚狹小其枝極繁七八月葉間抽細莖著花淺紫色如穗一種有白花者

和漢三才圖會 卷九十四 草部 三十四



水引草

俗稱本名
紙然彩色代
絲繩括物名
水引此草穗
莖稍似故名
水引

△按水引草高一二尺葉似楊樞而不皺秋出長穗著小花紅色其莖圓纖如紙然鬚及水引故名

俗稱本名

杜鵑草



△按杜鵑草高尺餘葉似百合葉六七月抽莖葉間開小黃花或白或白入紫苔子或濃紫入白苔子一種白色有淺紫點名之山杜鵑

俗稱本名

螢草



△按螢草高尺許葉似櫻葉而小四五月開小白花有紫理而花多著

俗稱本名

虎尾草



農政全書有
虎尾草莖葉
形狀似之然
不言開花

又山草有同名各別也

一按虎尾草高二尺許葉長三四寸末窄尖深綠色厚皺有鋸齒六月莖端著花極細白如穗末窄似獸尾故名一種有淺紫色者瑯瑯色

和漢三才圖會 卷之四十五 三十一



玉毬花

俗云松虫草

△按玉毬花高七八寸葉畧似蕪菁葉而小四五月抽莖
開花淺紫色細小



雉子竄

此草葉細密雉子非隱可免獵佃故名

△按雉子竄高二尺餘葉似柝葉而細密三月葉間著
小白花極細難見隨結子青圓秋熟則赤大如南天之
子



猩猩袴

俗稱未詳

△按猩猩袴高六七寸葉似蕙而短五六月開花淺紅色
似櫻草花而稍小



熊谷草

俗稱未詳

△按熊谷草高五六寸葉似款冬而小三月抽莖開花內
有細蒼子花形似母衣源氏武臣有熊谷直實者一谷
合職有職功其圖負母衣形勢
讚之此草形似母衣故以
熊谷名之迂遠之甚者也

和漢三才圖會 卷之四十五 三十一

農政全書所圖如左而花似矢頭與本文不合疑畫工之訛乎



董董菜

やぐらさき

箭頭草

俗云矢筈草

又別有矢筈草

見于後

農政全書云生田野中苗初掘地生葉似鐵箭頭樣而葉蒂甚長其後葉間攢莖開紫花結三瓣蒴兒中有子如芥子大茶褐色味甘今人用根葉搗傳諸種毒良

△按矢筈草高尺許葉厚青色類蕎麥葉又似矢羽形開小白花帶微紫結子如芥子大



風樓草

ふうろうさき

俗稱未詳

△按風樓草高六七寸葉似毛茛葉而有毛三四月葉間出莖開花單葉紫色形似梅花



夏雪草

なつゆきさき 俗稱未詳

△按夏雪草高二寸許葉似草烏頭葉而小春開小白花單葉似梅花其根似生薑而小



梅鉢草

うめぼちさき 俗稱未詳

今以梅花為衣服之文呼日梅鉢故名

△按梅鉢草高四五寸葉畧圓厚小而青色帶赤三月開

白花單葉似梅花蓋風樓草夏雪草梅鉢草一輪草之花皆似梅三月開單白花似梅



鹽竈草

俗稱本名

按鹽竈草高六七寸葉似小菊葉無切又秋開花淺赤色而小



碇草

俗稱本名

按碇草高五六寸細莖葉似猴溺木葉三月開小白花

形如舟碇又有紫花者



華鬢草

俗稱

按華鬢草高尺餘葉似石龍芮而小三月莖端開花淡紅色作房其花楸畧長似鈎華鬢狀故名



曼陀羅花

俗稱本名

按此云曼陀羅花高六七寸葉似華鬢草葉三月抽莖開花黃色帶微赤而小蓋法華經曰雨曼陀羅華者即

毒草類有同名不同

朝鮮朝類也

詳見于毒草類

卷九十四之末(三十七)



潮風草

俗稱木詔

△按潮風草高二三尺葉似紫苑而短小三四月開花黃色作房又有赤者



有馬草

攝列有馬名有之故名

△按有馬草高尺許葉似初生椴櫚葉而小二三月抽莖開黃花形畧似蘭花而不香



逢坂草

俗稱木詔

△按逢坂草高七八寸葉似眼皮草葉五六月開花形似眼皮草花形而有白紅淺紅之數品但莖莖長草見于前莖節帶黑故又名節黑遠州新坂多有之



日向堪

俗稱木詔

△按日向堪高三四尺葉似牛蒡葉而小六七月著花似楊梅形而圓大硬



藤袴

ふらびくまの 俗稱 本名

△按藤袴高二三尺葉似如取花葉而無切又六七月開細白花似繡線花此與磯邊草一類二種乎
蘭和名曰藤袴和歌亦然而以此草呼同名何謂乎

磯邊草

いそべくさ 俗稱 本名



△按磯邊草高尺有余葉似藤袴葉四五月開花細白如繡線菊花而數聚美又淡紅色者有之



白絲草

俗稱 本名

△按白糸草高五六寸葉似猩猩袴葉而細三月白花似穗又如筆頭



野鶴草

のぼろさ 俗稱 本名

△按野鶴草生原野中莖勁如蔓非蔓一極三葉大如槐葉三月開花於葉叔小黃色後結子小毬五顆攢生



鹽蓬

クハク

鹽蓬

農政全書云：鹽蓬生水傍下濕地，莖有線楞，葉似蓬而肥壯。比蓬葉亦稀疎，莖葉間結青子，極細小。其葉微鹹。

花名茶花兒

望江南

俗云 鮑虹豆



農政全書云：望江南人家園圃中多種，苗高二尺許，莖微淡赤，色葉似槐葉而肥大，微尖，開五瓣金黃花，結角長三寸許，葉味微苦。

ウハク

風花菜



全云：風花菜生田野中，苗高二尺餘，葉似芥菜葉而瘦長，又多稍間開黃花，如芥菜花。辛微。採嫩苗葉，燂熟水浸去苦味，油鹽調食。

ウハク

白屈菜



農政全書云：白屈菜生田野中，苗高一二尺，初作莖生，莖

葉皆青白色莖有毛刺稍頭分叉上開四瓣黃花葉頗似山芥菜葉而花又極大又似漏蘆葉而色淡



雨點兒菜

全云雨點兒菜生田野中就地叢生其莖脚紫稍青葉如細柳葉而窄小抽莖而生又似石竹葉而頗硬稍間開小尖五瓣白花結角比蘿蔔角又大其葉味甘



星宿菜

俗云三國草

全云星宿菜生田野中作小科葉似石竹葉而細小稍上開五瓣小尖白花苗葉味甜
△按三國草高尺許葉似石竹葉三月開花細小白似唐松草花
花罷有細子所謂星宿菜即是乎



毛連菜

常十八

全云毛連菜生田野中苗初揚地生後攢莖又高二尺許葉似刺薊葉而長大稍尖其葉邊襖曲皺上有溢毛稍間開銀褐花
採葉燻熟油鹽調食
△按毛連菜處處有之葉緣微曲所謂襖音優俗云倍里



千屈菜

せんくつさい

全云千屈菜生田野中苗高二尺許莖四楞葉似山梗菜葉而不尖又似柳葉菜葉亦短小葉頭頗齋葉皆相對生稍間開紅紫花葉甜採嫩苗葉煤熟水浸油鹽調食

くさくさいのうらぶらぎ 芫香



草零陵香

真零陵香見于芳草下

全云草零陵香菜人家園圃中多種之葉似苜蓿葉而長大微尖莖葉間開小淡粉紫花作小短穗其子如粟粒苗

葉味苦今人遇零陵香缺多以此物代用治病

いっさうさい 翻白菜

委陵菜



農政全書云委陵菜生田野中苗初搗地生後分莖又莖節稠密上有白毛葉彷彿類栢葉而極闊大邊如鋸齒形面青背白莖葉稍間開五瓣黃花

せんくつさい



剪刀股

農政全書云剪刀股生田野中處處有之掘地作科苗葉似嫩苦苣菜而細小色頗似藍亦有白汁莖又稍間開淡黃花葉味甘採苗葉燂熟去苦味油鹽調食



蝎子花菜

乾蚕花
野菠菜

全云蝎子花菜生田野中苗初掘地生葉似初生菠菜葉而瘦細葉間攢生莖又高一尺餘莖有線楞稍間開小白花其葉苦採嫩葉燂熟油鹽調食



婆婆指甲菜

農政全書云婆婆指甲菜生田野中場地攤科生莖細弱葉像女人指甲又似初生棗葉微薄細莖稍間結小花蒴苗葉味甘採嫩苗葉燂熟油鹽調食



野茴香

真茴香見干
葷草下

農政全書云野茴香生田野中苗初掘地生葉似掃娘蒿葉微細小後干葉間攢莖分生莖又稍頭開黃花結細角

有黑子葉味苦



香菜

かまの

真苗香且干

農政全書云人家園圃種之苗高一尺許莖方窠面四稜莖色紫稔葉似薄荷葉微小邊有細鋸齒亦有細毛稍頭開花作穗花淡藕褐色味辛香



牛兒

けんのちうこ

鬪牛兒

全云牛兒生田野中就地拖秧而生莖蔓細弱其莖紅


紫色葉似蕨葉而瘦細而稀疎開五瓣小紫花結青膏菜兒上有一嘴其尖銳如細錐子狀小兒取以為鬪戲其葉微苦



火燄菜

かろん

農政全書云火燄菜人家園圃多種苗葉俱似菠菜但葉稍微紅形如火焰結子亦如菠菜子苗葉味甜性寒冷



過藍菜

あらん

全云過藍菜生田野下濕地苗初掘地生葉似初生菠菜葉而小其頭頗團葉間攢葶分又上結莢兒似榆錢狀而小其葉味辛香微酸性微温



胡枝花


和名波木

隨軍茶 救荒
天竺二花 花史
鹿鳴草 以下出
芽子花 和名抄
芳宜草
萩 音 蕭 音

救荒本草云胡枝花生平澤中有二種葉形有大小而大葉者類黑豆葉小葉者莖類著草葉似苜蓿葉而長大花色有紫白結子如粟粒大氣味與槐相類救飢採子微春即成米先用冷水淘淨復以滾水湯三五次去水下鍋或作粥或作炊飯皆可食採嫩葉蒸曬為茶煮飲亦可
花史云天竺花自五月開至七月花頭細小其色純紫而枝葉如嫩柳其幹之長與人等

△按胡枝花叢生枝長垂蔽地狀似絲垂櫻而一極三葉其葉似棗葉又似南天燭秧而不光柔軟秋著小花淡紫色新撰萬葉集菅直相詩云曉露鹿鳴花始發者是也俗專用萩字與州宮城野方二里許荻生茂

有山萩有白花者有白紫開分者北國山中有大木可為柱者四國山中有南天燭大木俱叢內人不信
山萩又名荻葉大團有大木雄萩葉大亞山萩花淺紫雌萩城野葉花小共結實褐色大可豌豆扁中有細子



結縷草

かゝらひまゝ 横目草
かゝらひまゝ 鼓筆草
かゝらひまゝ 傳醋
俗云高麗菜

救荒本草云師古漢書注曰結縷蔓生著地之處皆生細根如絨相結故名之今俗呼鼓筆草兩幼童對銜之手鼓中央則聲如筆也

△按萊之波一名類草田廢生草曰萊今俗用芝字芝瑞草也凡荒野堤岸雜草自生牛鹿常齧之故夏野萊不過數寸頗如青檀然

結縷草此一種萊似絲匹秧而無枝極其根細似蔓而相延結秋抽細莖出穗似雀麥細冬枯春生栽假山稍長時均萌之則最美也又其老莖以鼓筆也如上說



董

音勤

和名須美禮俗云相模草

苦董 苦葵

本綱蕒恭曰董菜野生非人所種葉似蕒菜花紫色劉錫曰說文云董根如薺葉如細柳子如米蒸為食之甘滑也而云苦董古人語倒猶甘草謂大苦也

△按董字未詳本作董橫土乃黏者今人謂從董从土會黏土字義又謂為頭苗為董草音謹又木董同種蓋為頭苗權共有黏汁也然蕒恭所言者即須美禮也田野

草也葉似蕒菜及旋花葉而小其裡有畧缺三四月抽蕒稍開小紫花其莖曲垂作鉤小兒戲採二莖鉤與鉤對引則以莖切落方為負因各角方草結子內有細子其子綻脫殼三開李時珍以董為早芥各又似柳葉

小者亦有堀河百 若乃の 堀河百

凡小兒取為鬪戲者堀河百 堀河百

正字未詳

弟切草



△按弟切草初生似地膚子，而兩兩對生，有枝極而莖葉極之，有汁，源更變紫色。六七月開小黃花，單五瓣，有細葉結莢，有三稜，中有細子，黑色。味甘，莖葉傳金瘡，折傷及一切無名腫物，有神效。

相傳花山院朝有鷹，飼名暗賴精，其業也。入神有鷹被傷，按草傳之，則愈。人乞問草名，秘之不言。然有家弟密露洩之，暗賴大怒，又傷之。自此知鷹之良藥，名弟切草。一種莖弱，不起如蔓，而葉花子不異，葉畧小，其味殊強。

ヤムコウ

天竺草



△按天竺草出野堤，小草也。小葉似槐及奴，而長抱莖，生高二尺許，枝條希，而如蒼秋之葦，秋葉交結，小花穗微似帚草穗。其葉及晚景則如葦，如睡朝乃如故也。

董董菜 出干前 真天竺草矣。此草名天竺之譯，未審。

力草 本名未詳

角觥草



本呼莖名角觥草，花與花相別，為勝負其趣也。

△按角觥草原野湿地有之葉布地叢生似忍麥微扁以石莧而色淺秋起莖嶺作穗青白色可有細子而不見其莖扁強健長六七寸小兒取莖縮穗結如繩而用二箇一插其脅兩人持莖相引而切方為輸以戲因俗名相撲取草自茂盛為農圃之妨引根強難拔因名力草一種相似而莖葉穗俱瘦者俗以為角觥草之雌



菅

音

不載本綱蓋是前
三稜之屬而根異
如香附與蚊帳鈎
昔之異三稜草亦

△按字彙曰菅葉似茅而滑澤莖有白粉柔韌可為索今云須介葉有劍脊而硬不韌莖本白別抽一莖如蒹而
出穗似車前穗而短為枝六月前葉乾光白色縫莖美也如列金澤攝列深江勢列齋官多作出菅莖根燹能治積聚

