



本草方抄録

圖書印
600
191



門曾
號 600
卷 191

於學士本專方林

全



夫入京當陽五行運氣空而保命其法...
有志抄疾患無殊...
榮謝不調則疾...
人且如左右手...
加之有疾而無...
自有氣味...
治諸虛...
夫入京當陽五行運氣空而保命其法...
有志抄疾患無殊...
榮謝不調則疾...
人且如左右手...
加之有疾而無...
自有氣味...

月

月



許學士 一本全

類證普濟本事方

後

卷之一

儀真許學士述

治諸虛進食生血

氣弁論

氣弁論

夫人稟陰陽五行運氣榮衛而保全其身化一身中或

有毫抄疾患無非因臟腑虛冷臟腑虛冷則榮衛不調

榮衛不調則疾生矣又况虛冷之極又能生其虛陽或

手足腰腎則眼目口齒三焦六腑值病之亟則各能死

人且如左右手三陰三陽十二經脉皆須用有胃氣或

加之有疾而無胃氣者不問病之輕重不救何謂須用


有胃氣緣胃受穀氣穀氣生則能生氣血氣血壯則榮

龍澤文庫

衛不寒榮衛不寒則病自去矣如五臟六腑表裏之間
皆出自穀氣而相傳授生氣血而灌蔭五臟或氣血不
足則五臟六腑陰無所目况加之於憂思慮喜怒不常
起居勞役飲水不節房事過多衝雪冒霜伏暑解熱損
失耗散則病生焉具如春季夏季秋季冬季一千八日
之間脾土於此時王極每遇此際腎水受尅故當補腎
所以心肺肝脾腎各有表旺各有相生相尅如心尅肺
肺尅肝肝尅脾脾尅腎腎尅心遇旺則尅之愈甚凡受
尅處故宜補然春補脾夏補肺秋補肝冬補心古之賢
人平居無病亦常用方藥法度調護脾胃使進飲食而

全穀氣凡百皆得其宜如今之庸醫用意皆錯姑舉一
二而為證然且如腎經衰敗則以天雄附子之類而言
補腎且腎本屬北方壬癸水喜濕惡燥反用天雄附子
至燥藥豈能補乎腎耶况腎經虛則乃五臟六腑衰極
而漸至腎則諸病生焉凡下部腎經虛者不必補之至
妙之法有二一則但補脾護胃使進飲食而全穀氣令
之生氣血所謂者可何每日夜半子時乃北方正候當此
之時腎水旺極則攝血化精精氣全則實腎經不虛病
自去矣男子則攝血化精女子則通月事若穀氣不全
則氣血不生氣血不生則當夜半子時腎水雖旺則血

不能償其腎所攝無精可化丹田不固腎自虛矣以此
 觀之凡腎經并五臟虛敗醫者不識源流枉用其法初
 不能損於病乎今則具列先補脾胃後調氣血二方并
 法悉皆備集予不欲私為己有用傳好事云耳
 戊巳圓治丈夫婦人稟賦怯弱飲食無味氣血衰敗肌
 肉不生項背拘緊腰脚無力胸膈膨脹多睡少寤終日
 昏朦夜多異夢及積年脾蟲時下惡心噫酸吐水小兒
 吐乳大人翻胃並皆治之此藥能護脾開胃進飲食長
 肌肉生氣血化精益髓全胃氣丹田不竭腎經不虛是
 此藥功也



大茴香 三兩 揀淨 其艸 一兩 浮椒 五兩 乃胡椒也 揀淨 人參 一兩
 白朮 二兩 朱砂 兩 白茯苓 三兩 香附子 半兩 炒
 右為細末生姜汁打麩糊為圓如梧桐子大每服二
 十圓空心白湯送下日服
 又方 平陸買面日黃黑熟三十後入熟下取效
 石菖蒲 二兩 白茯苓 三兩 白朮 二兩
 茴香 一兩 青皮 一兩 枳殼 一兩
 右為末每服二大錢棗湯調空心服
 又方 枳殼 二兩 炒 木香 一兩 丁香 半兩 青皮 一兩

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

許^{莊子士}類證普濟本事方卷之六

治諸癰癤等患

儀真許^父學士述

化毒方治一切癰疽瘡癤未成者速散已成者速潰敗
膿自出無假手擠惡肉自去不犯針刀服藥後疼痛頭
減此其常用者效也此方得自於都下異人時有苦背
瘍者七十餘頭諸藥試遍不獲痊效衆醫環立如堵出
是方示之相目而笑曰是豈癰背所用藥耶固謂之曰
古人用方自有意儀觀其所用藥性平和縱未能已疾
必不能壞病服之何害迺治此方藥與之以熟酒一升

許下藥五六錢少頃頓減七分數服後瘡大潰膿血流
逆若有物自內挖出服之半月瘡口遂合若未常有所
苦者又有苦腹疾者其痛異常醫者莫曉時意謂此藥
大能止痛試與餌之當日下濃二三碗許痛亦遂止思
察之乃腸癰也又一老人忽胸間發腫根脚甚大毒氣
止收如一瓢然斜捕頂右不能轉動遂以此藥與服明
日腫毒既散餘一小瘤如粟米大又明日怡然如故無
事又一人發腦疑此藥不能救遂殞於庸醫手次年其
子復苦此疾與父無異病狀一同因懲父之失縱飲酒
服此藥而至不覺大醉竟日衮臥地上及至酒醒病已

去矣又一婦人發乳癰腫疼痛日夜叫聲不絕哀苦之
音皆不忍聞自謂無復生理又有一婦人股間發腫大
如杯碗服此藥皆脫然如失物是藥濟苦者不可記數
姑據一二以示大略 大抵癰疽之作無非氣血凝滯
風毒壅結或飲酒食熱物過多房室虛甚榮衛不調所
致治之不早則外壞肌肉內攻臟腑去生遠矣詳味此
方其所用藥皆發散風毒調理氣血排膿止痛生肌長
肉等藥五毒不試而坐收瘍醫十全之功其可悉述乎

人參 用新羅者團結重尖滋潤
防風 擇新者淨
當歸 取川中來者澤大令如馬尾狀滋潤
洗淨去芦薄切焙乾
洗薄切焙乾
洗薄切焙乾
洗薄切焙乾

黃耆川綿者為良狀如等幹者長一二尺不開者洗淨寸截
 酥再入
 芎藭川中者為上今多止是
 厚朴宜用梓來者厚而紫指文油焙乾
 桔梗以有心味苦者為真無心味苦者齊芫也切勿誤用洗淨去頭薄切焙乾
 桂宜用卷薄者古法帶皮桂每兩好者不見火
 其艸生
 白芷

右十味選藥貴精者皆取淨曬乾極燥方秤人參當歸黃耆各二兩其他七味各一兩除桂外一處為末入桂今勻每服三錢漸加至五六錢熱酒調日數服以多為妙服至瘡口合更服為佳所以補前損杜後

患也不飲酒濃煎木香湯下然不若酒力之勝也或飲酒不多能勉強間用酒調下并木香湯解酒切效當不減於酒也

又方治一切惡核癰瘰癧疽等病及惡腫

- 青木香
- 沉香
- 乳香
- 麝香
- 升麻
- 獨活
- 連翹
- 桑寄生

木通夜干一兩 大黃五兩
 右咬咀乃為散也 每服四錢水二盞煎至一盞已上去滓取八分清汁空心熱服半日已上未利再服以快為度或下惡物未生肉已前時服不妨以析

毒熱之氣或有人使竹瀝芒硝恐用藥之人不能斟量是故不載知者當自相度用之

又方治癰疽發背丹癰赤腫惡肉時行熱毒變作赤雜及眼赤痛生障翳病方

黃芩

白薇

麻黃去節

漏蘆真者

白薇

枳殼麸炒去穰

升麻

白芍藥

川當歸

川牛膝

甘草已上各二兩

大黃五兩

右為麤末每服四錢水一盞半煎至七分空心熱服或利一二行如未利再服可加芒硝三錢未成者散去已成者立潰癰痛藥中無如此三方妙絕余每用

兼當作嫌余

濟人不少凡有患癰癤發背等疾服此二三藥復安之後宜常服四物湯交和黃耆建中湯空心煎服藥未來恐疾再作其根難又兼費財不秘者欲天下人安故也治發背內潰及諸惡毒衝心嘔吐疼痛不可忍三兩服可救一命應于瘡毒癰疽等疾每日一服無不除愈內托毒氣使出及外不至內攻乳香散

菜豆粉

四兩

乳香

兩水中坐乳碎一本全

右二物再同碾極細每服一錢新汲水調下水不宜多要藥停在胸膈也甚妙

治諸水腫氣疾

陰區細作外腎

治十腫水病并根源証狀方法

- 一蒸水起區先從左右肋腫根在肝藥是大戟
- 二赤水先區從舌根起根在心葶藶子
- 三黃水從腹腫起根在脾耳遂微區
- 四白水從脚起根在肺藁本桑白皮區
- 五黑水從陰外腎腫起根在腎連翹
- 六玄水從面腫起根在外腎芫花醋區
- 七風水從四肢腫起根在骨澤瀉
- 八石水高區從腎腫起根在膀胱桑根白皮苦稟本區
- 九蒿水高區從滿腹腫起根在小腸巴豆去皮區

區下恐有脫字

十氣水盛區或成或衰根在腹赤小豆

右十般腫病各有根源種種不同看十腫病根除一味悟區用將九味等分逐味用製者依法修治焙為細末煉蜜為圓用赤茯苓湯吞下三九區不拘時候其圓如梧桐子大每日服三服忌鹽一百二十日綠鹽能化水故也然區然忌魚鮮蝦區麪食一切毒物及生冷等物及不得行房事此病去生甚遠取死將近或得良醫醫者得余此方慎勿輕賤雖千金難換但余欲天下人安故也用此方獲瘥之後更用後來補藥

補藥方

肉桂 去麄皮

青皮 去白

乾薑 洗湯

我朮 醋煮

川芎

肉豆蔻

雞心檳榔

桔梗 各等分依法製治

右等分醫元事治為末每服三錢百沸湯點服空心食前

日午食前晚食前各一服 前頃頂醫元二方治水腫病余

見鄉人有患水疾半年後得名醫獲瘥余遂百計未甚效醫元

此醫人多酬黃白之物遂得此二方余試用之百發

百中獲濟者無數世間所有水病方藥無此二方之出醫元一本全

右者余初出本事方前集尚有此後集二帙初深秘

之今見前集已盛行于世此後集今亦略傳一二仁

者使天下皆得躋盡天年毋罹四罹枉斃云

此書吳山翁翁翁時所抄錄也太厚為巨秘藏也

天保七年秋八月中辭

瀧澤解藏

