



纂喜廬叢書

14
677
4



373

新設本學堂於上海英租界

自設在英租界英大馬路

伏谷 虎 楓 松 柏 杉 柏 檉 柳 楊 柳

松 柏 檉 柳 楊 柳 檉 柳 楊 柳

檉 柳 楊 柳 檉 柳 楊 柳 檉 柳

檉 柳 楊 柳 檉 柳 楊 柳 檉 柳

檉 柳 楊 柳 檉 柳 楊 柳 檉 柳



677

新修本草木部上品卷第十二

十二

一

新井文庫

司空上柱國英國公臣勳等奉勅修

伏苓 虎魄 松脂 栢實 菌桂

牡桂 桂 杜仲 楓香 乾漆

蔓荊 牡荊 女貞 桑上寄生

蕤核 五茄 沉香 藜木 辛夷

木蘭 榆皮 酸枣 槐實 柝實

枸杞 藟合 橘柚

右木部上品合廿七種

廿種神農本草經六種
名醫別錄一種新附

伏苓味甘平無毒主胃腸逆氣憂志驚

耶恐悸心下結痛寒熱煩滿欬逆口焦

舌乾利小便心消渴好唾大腹淋瀝莖中

淡水腫淋結閉胸府調藏氣伐腎耶

長陰益氣力保神守中久服安魂魄養

神不飢延年一名伏菟其有根者名伏神

味甘平主辟不祥療風眩風虛五勞七傷

口乾心驚悸多志怒善忘開心益智安魂

魄養精神生太山谷大松下二月八月採陰

乾 馬同為之使紫莖名無馬同或是馬莖聲相近故
也得甘草防風夕莖紫石麥門冬共療五藏惡白

敏畏牡蒙地榆雄黃秦膠龜甲今出鬱州彼土人乃
故斫松作之散多小虛赤不佳自然成者大如三日

斗器外皮黑細結內豎白如鳥軟龜鱗者良又復
時焙則不水作丸散者皆乾黃之而三沸乃切曝乾

白色者補赤色者利俗用甚多仙徑服食最為至要其通神而致露和魂而煉魄明竅而益肌厚腸而用心調營理胃上品仙藥也善能斷穀不飢為藥元朽駐吾寧極地得昔人所埋一塊計伏神是其次伏苓後結一塊也仙方唯云伏苓而伏神為療既同用之亦應無讓謹案李氏本草云為刀為伏苓使无名問者問字草書似刀字寫人不識記為問耳陶不悟云是馬莖謬矣今大山亦有伏苓白實而塊塊小不復採用今第一出華山形極廣大雍州而山亦有不如華山者

虎魄味甘平無毒主安五藏定魂魄斂精

魁耶鬼消痰五通五淋生永昌

舊說云是私脂論入地千

年所化今燒之布作松氣俗有虎魄中有一絳粉色如生博物志又云燒碎葉所作也亦實此或為碎為松脂所黏目墮地淪沒耳有黃假鷄子及青真杭作者並非真唯以粉芥為驗俗中多帶之辟惡刮屑服療瘡至驗仙徑云用曲農舟所須以赤者為勝今並從外國來而伏苓處永无有不知虎魄靈液有伏苓以否謹案整味甘平无毒古來相傳云松脂千年為伏苓又千年為虎魄又千年為整然二物燒之皆有松氣為用与虎魄同補心安神破血充善狀似玄玉而粒如西戎來而伏苓處見无此物今西州而三百余里礦中得者大則方尺里圍而輕燒作腥臭高昌人名為木整謂玄玉為石整洪州土石間得者燒作松氣破五生肌与虎魄同見凡折破不堪為器量此二種及虎魄或非松脂所為也有此異并今略論之

松脂味苦甘温无毒主癰疽惡瘡頭瘍
白禿疼癢風氣安藏陰翳胃中伏熱火
咽乾消渴及風痺死肌練之令白其赤
者主惡風痺久服輕身不老延年一名
松膏一名松肪生大山之谷六月採松實
味苦無毒温主風痺寒氣虛羸少氣
補不足九月採陰乾松葉味苦温主風

濕痺瘡氣生毛髮安藏守中不飢延年

松節温主白節久風之虛脚痺疼痛根

白皮主辟穀不飢楊煉松脂並在服食方以棗灰

造白滑則可用其有自流土者乃勝於鑿樹及糞膏也其實不可多得唯葉心是浙聲所且分細切如粟以水及麴飲服之亦有陰乾搗為屑丸服者人患惡病脈此无不差此葉苦脚弱人釀松節酒急皆愈松栢皆有脂潤又陵冬不歇理為佳物但人多輕忽近易之耳 謹案松花名松花名松葉似蒲黃心公酒服輕身瘡病云勝皮葉及脂其子味甚甘性直云味苦也松取枝燒其上下兼汁名滿音主牛馬瘡疥為佳

樹皮係衣必艾納合和諸香燒之其烟團聚青白可愛也

栢實味甘平無毒主驚悸安五藏益氣除風濕痺恍惚虛損吸之歷節腰中重痛益五心汁久服令人潤澤美色耳目聰明不飢不老輕身延年生太山山谷栢葉尤良栢葉苦微溫無毒主吐五疳五崩中赤白輕身益氣令人耐風寒不濕痺心

飢四時各依方面採乾陰栢白皮主火灼

爛瘡長毛髮

杜鰾桂蔬子為之使惡菊華羊蹄諸石及麴栢葉實之為服食

可重煉餅別有法栢葉之有當以太山為佳至忌取冢墓上也雜四時俱有而秋夏為好其脂五入用此云惡麴人有以釀酒无妨恐酒米相和異單用也謹案栢枝節莖葉以釀酒生風痺歷節同燒取諸瘡腐疥及癩瘡尤良今子人唯出陝州宜州為勝大山无復採者也

茵桂味辛溫無毒主百疾養精神和顏色黃諸菜先炒通使久服輕身不老面

生光華媚好常如童子生交趾山谷桂

枝間無骨正同如竹生桂林山谷立秋棕

交趾馬交州桂林屬廣州而蜀郡賦云箇桂臨
崖今俗中不見正同如竹者唯懶枝破卷成圓於
依桂用忌非真箇桂也仙徑乃有用箇桂云三重者
良則判非今桂矣必當別是一物應更研訪謹案
箇者竹名古方用箇桂者是故云三重者良其箇桂
亦有二三重卷者葉中三道又肌理緊薄如竹大枝
小枝皮俱是箇桂然大枝皮不能重
卷味極淡薄不入藥用今出款州之

桂桂味辛溫無毒主上氣欬逆結氣

協風

十二

六

喉痺吐吸心痛協痛溫筋通脈心煩

出汗利關節補中益氣久服通神輕

身不老生南海山谷南海郡即是廣州今
俗用桂桂狀似桂而扁

廣味薄皮色黃脂肉甚少氣如木蘭味多類桂不
知當是別樹為和是桂生有老宿者耳且所未究
謹案本雅云枝木桂古方且用木桂或云牡桂即今
木桂及單名桂者也此桂花子無箇桂同唯葉倍
良大小枝皮俱名牡桂然大枝皮肌理廉虛如木蘭
肉少味薄不及小枝皮也小枝皮肉多半卷中必
敲起味辛美一名肉桂枝一名
桂心出融州柞州交州

桂味甘辛大熱有毒主溫中利肝肺氣
 心腹寒熱冷疾霍亂轉筋頭痛腰痛
 出汗心煩心噉欬嗽鼻膈能隨胎墜骨
 節通血脉理疎不足宣導百藥无所
 畏久服神仙不老生桂揚二月七八月十
 月採皮陰乾得人參麥門冬甘草大黃三味調
 中益氣得燕胡紫石乾地黃療
 吐逆案本徑唯有茵桂壯桂而无此桂用體大同
 小異今俗用便有三種以半卷多脂者單名桂入

十三 七

葉最多所用悉与說相應仙仙徑乃並有三種桂常
 服食以葱涕合和雲母並化水者正是此種耳今出
 廣州者惠為好湘州始興桂陽縣即是小桂也亦有而
 不如廣州者史州桂州形疑小多脂肉互好徑云桂
 葉如栢葉澤黑皮黃心赤曆武帝時湘州送桂樹以
 植芳林苑中今東山有山桂皮氣粗相類而葉亦異
 之能凌冬忍或是桂桂詩人多呼丹桂正謂皮赤耳
 此方今重此每食輒須蓋礼所云薑桂以為芬芳也
 謹案茵桂葉似栢葉中有微文三道表裏无毛而
 光澤壯桂葉長尺許陶云小桂或言其葉小者陶
 承注云葉似栢葉殊不相類不知此言從何所出今案
 桂二種唯皮稍不同若茵桂老皮堅板无肉全不
 堪用其小枝皮薄卷乃二三重者或名茵桂或名茵
 桂其桂嫩枝皮名為肉桂也名桂枝其老者名

桂桂名木桂得人壽長本是
茵桂出單桂陶者深誤也

桂仲味辛甘平温无毒主骨脊痛補

中益精氣堅筋骨强志陰下瘡濕小

便餘瀝脚中酸疼痛不欲踐地久服輕

身能老一名思仙一名思仲一名木綿生

上虞山谷又上黨及漢中二月五月六月

九月採皮陰乾

畏肥膩皮去參上虞在豫州
虞綿之虞非會稽上虞縣也

今用也建平宜都朴者狀厚者狀如厚朴折之多
白絲為佳用之薄削去上甲皮橫理切令絲斷也

楓香脂一名白膠香味辛平无毒主

身上風癢浮腫齒痛樹皮味辛平有

少毒主水腫下水氣煮汁用之所在大

山皆有

樹高大葉三角五月研樹
為吹十一月採脂新附也

乾漆味辛温无毒有毒主絕傷補中

續筋骨填髓安五藏五後六急風寒

濕痺欬嘔消痰五瘡滿腰痛女子疝瘕

利小腸去蛇虫生漆去長虫久服輕身能

老生漢中川谷夏至後採乾之羊夏為之使長鷄子

今又忌油脂今梁州漆取勝益州為有唐州漆性
急易燥其諸處漆桶上蓋裏自然有乾者狀如蜂
房孔之障者為佳生漆毒烈人以鷄子白和服之去虫
如有劫齒腸胃者畏漆人乃致死外氣無能使室
瘡腫自別有療法仙方用
蟹清之為水煉服長生

蔓菁實味苦辛微寒平温无毒主

筋骨間寒熱濕痺拘攣手明日豎齒

利九竅去白虫長主風強痛腫鳴目淚

出益氣久服輕身能老令人蔓澤脂微

長鬚髮小荆實亦等生益州惡為頭石膏小荆即

應是杜荊子大於蔓荆子而反呼為小荊恐或以
樹形為言後不知蔓荊樹若高大耳 謹案此荊子
今人呼為杜荊子者是也其蔓荊子大故呼杜荊子為
荊實也等言其功用与蔓荊同也蔓荊苗蔓生故
名蔓荊生水濱葉似杏葉而細莖長餘花紅白色今
醫目陶誤注萊州劉州遂將蔓荊子為杜荊

牡荊實味苦溫无毒主除骨間熱通利
胃氣心欬下氣生河間南陽宛胸山谷咸
平壽都鄉高隄岸上北荊生田野八

月九月採實陰乾

得木栢實青箱共磨腹用防
風者之使忠石膏河間宛胸

平壽並在此南陽在西論
荊即應是今作杖
楛之荊而後非見其小
珠細心如小麻子色青
黃荊子實小大此也荊
子乃出此方如烏豆大
心負黑仙術多用牡荊
今人都无識之者李當
之藥錄乃注搜疏下云
疏一名陽腫一名荊荊
一名空疏皮白中空時
有蒂子似楊杞子赤色
味甘苦冬月熟俗乃无
識者為

此實是真非人離城陽腫也案如此說搜疏主磨與
牡荊都不同其形類亦異恐乖實理而仙方用牡
荊云能通神鬼非唯其實乃枝葉並好又有云
荊樹必枝、相對此是荊荊有不對者即是北荊
既為文則不應有子如此蓋莫詳虛實復更博
訪乃詳之耳謹案此即作楛杖荊是也實細黃
黑色莖勁作樹不為莠生故稱之為荊非无實之謂
也案漢書郊祀志以牡荊莖為幡竿此明則莠不
堪為竿今所在皆有此荊非本經所載者今生出
乃是莠荊以為附後陶為誤矣別錄言荊葉味苦
平无毒主久利霍亂轉筋而淋下部瘡濕醫薄脚
主脚氣腫滿根味甘苦平无毒水煎服主心風頭
風支體諸風解肌殺汗有青赤二種赤者為佳出類
聚方今鑿相兼以莠荊為牡荊以荊荊為莠荊

誤也

女貞實味苦甘平無毒主補中安藏養精

神陰百瘧久脈肥健輕身不老生武陵川

谷立夏採葉茂盛後冬不取皮肉白與秦皮為表裏其樹似冬生而可愛諸家時有仙

徑亦脈食之俗方不後用市人無識之者萍葉女貞葉似桐骨及青樹等其實九月熟黑似牛李子

任云白秦皮為表裏誤矣然秦樹葉細冬枯如貞葉大冬茂殊非類也

桑上寄生味苦甘平無毒主腰痛小兒

十二

十一

背強癢腫安胎充肌膚堅髮齒長鬚

肩主金創去痺女子崩中內傷不足產

後餘瘧下乳汁其實明目輕身通神一

名寄屑一名寓木一名宛童一名葛生

知農川谷桑樹上三月三日採莖葉陰乾

桑上者名桑上寄生耳詩人云抱干松上方家亦有用楊上桐上者則各隨其樹名之取類猶是一但根津所因實為異法生樹枝間寄根在枝節之內葉負青赤厚澤易折旁自生枝節冬夏生四月

華白五月實赤大如小豆今處之皆有似出款城者勝
俗人呼皆為續斷用之葉今徑續斷別中品葉所
主療不同豈容是一物布人使混亂無復能甄藏之者
服食方云是柔楊與此說又為不同耳 謹案寄生
檉舉柳水楊桐等樹上子黃大如小栗子唯錦州有
柔上者子汁甚黏極大如小豆葉無陰陽如細柳
葉厚肌甚廣短江而人相服用為續斷珠不相用且寄
生實九月始熟而黃今稱五月實赤大如小豆此是陶
未見
之也

菱極味甘溫微寒無毒主心腹邪結氣明
目痛赤傷淚出療目腫背爛齋鼻破

十二 十三

心下結淡痞氣久服輕身益氣不飢生涎

谷川谷及巴西七月採實 今從此方來云出款城
同形如烏豆大負而扁

有文理狀如胡桃今人皆合誤用為分兩此乃應破取
人解之壘方唯此瘡眼細徑以合字中九也 謹案採

字如此
作也

五茄味辛苦溫微寒無毒主心腹疝氣

腹痛益氣療疝小兒立能行痘瘡陰蝕

男子陰萎囊下濕小便飲瀝女人陰痒及

腰脊痛兩脚疼痺風弱五緩虛羸補中

益精堅筋骨強志意久服輕身耐老一名

狝漆一名材節五葉者良生漢中及宛胸

五月七月採莖十月採根陰乾連志者之使畏
死脫皮去茶今

近道靈靈有東之問採多四葉者亦好莖根莖釀酒
至益人道家用此作灰之以煑石與地榆並有秘法

茄字或作
家字者也

沉香薰陸香鷄舌香藿香磨糖香

楓香並微溫患瘰癧風水毒腫去惡氣薰

陸磨糖去伏尸鷄舌藿香瘰癧亂心

痛杻香瘰癧風隱軀痒毒此六種香皆合香
家要用不正滾入

藥唯瘰癧惡極毒腫通方頗有用靈磨糖出晉書
則上真淳澤者難得多以其皮及枯虫矢難之唯

輕者為佳其餘无甚臭為而有精麻耳外國用皮
津香明目白檀消凡腫其青木香別在上品 謹

紫沉香青桂鷄骨馬蹄絨香等同一樹葉似橘
葉花白子似檳榔大如棗椹紫色而味辛樹皮

青色木似檉柳薰陸香似白膠出天竺單二國
鷄舌香樹葉及皮並似栗花如梅花子似末極此唯

樹也。又香用雄樹者，花不實，採花釀之，以成香。出崑崙
崑崙及交安以南，葉糖樹似橘，葉枝葉為香，似糖而黑。
出交廣以南，又有丁香根，味辛溫，主心毒，諸腫，此別一
種樹，葉似橘，高越丈，陵冬不敗，唯根堪療，凡嬰毒
腫不入心腹之
用非鷄舌也。

藤木味苦寒，無毒，主五藏腸胃中結氣。
熱黃疸，腸痔，心洩，利女子漏下，赤白陰
陽蝕瘡，驚氣，在皮間，肌膚熱赤起，目
黃赤，痛口瘡，久服通神。一名檀桓，根名。

十二 古

檀桓主心腹百病，安魂魄，不飢渴，久服輕身。

近年通神，生隄中山谷及永陵者，輕薄色深。

為勝出東山者，厚重而色淺，其根於道家入木芝品。
今人不知取服之，又有一種小樹狀如石榴，其皮黃
而苦，俗呼為子藤，赤主口瘡，又一種小樹，至多刺，皮色
黃赤，主口瘡。謹葉子藤一名山石榴，子似女貞，皮白
不黃，名小藤，所在皆有。今云皮黃，恐認芙蓉。
今俗用子藤皆多刺小樹，名刺藤，非小藤也。

辛夷味辛溫，無毒，主五藏身體寒風，
頭腦痛，面黧，溫中解肌，利九竅，通鼻。

寒涕出面腫引齒痛眩冒身洋、如在

車船之上者生鬚髮去白虫久服下氣輕

身明目增年能老可作膏藥用之去

中心及外毛、射人肺令人欬一名辛矧

一名喉桃一名房木生漢中川谷九月採

實曝乾芎藭為之使惡五石脂畏昌蒲黃連石膏

香即雜騷所呼辛葳者也 謹案此是樹花未用時

恐誤其樹大連抱高數仞葉大於柿葉所在皆有實髮
不任藥也方云去毛用其心然難得而為人面以用花
開者易得而且香

木蘭味苦寒無毒主身有大瘻在皮膚

中去面贅赤皴皴酒惡風癩疾陰下瘡

濕明目療中風傷寒及癰疽水腫去臭

氣一名林蘭一名拉蘭皮似桂而香生零

陵山谷生太山十二月採皮陰乾零陵諸處皆有狀如栲栳

皮甚薄而味辛香今益州有皮厚狀如厚朴而氣味為勝故蜀都賦云木蘭被桂也今東人皆以山桂及檀之木相類道家之用合香之好也 謹案木蘭葉似茵桂葉其葉氣味辛香不及桂

榆皮味甘平無毒主大小便不通利水道除邪氣腸胃邪契氣消腫性滑利久服輕身不飢其實尤良療小兒頭瘡疔華主小兒疳小便不利傷契一名零榆生潁川山谷二月採皮取白曝乾八月採實並勿令

中濕之則傷人

此即今榆樹耳前取皮刮陰上亦可臨時用之性至滑利起生

葉人以作糜養輩令人腦眩慈公所謂榆令人眼斷穀乃屑其皮并檀皮服之即可謂不飢者也 謹案榆三月實熟尋即落矣今稱八月採實恐本經誤矣也

酸棗味酸平無毒主心腹寒熱邪結氣四支酸疼濕痺煩心不得眠昏上下痛五轉久洩汗渴補中益肝氣堅筋大骨助陰氣令人肥健久服安藏輕身延

年生河東川澤八月採實陰廿日成

已今出東山間云即是山棗樹子似武昌棗而味極酸
東人乃敢之以醒睡以此療不得眠正及矣謹重此即

棗實也樹大如大棗實无常形但大棗中味酸者
是本位唯用實療不得眠不言用人今方用其人補
中益氣自補中益肝已下為酸棗人之功能又比下品白
并徐中復云用其實今登棘實為酸棘太誤矣也

槐實味苦酸寒無毒主五内邪氣
心泣唾補絕傷五痔火瘡婦人乳癰子
截急痛以七月七日取之搗取汁銅器

十二 十七

盛之日剪令可作九火如鼠矢内竅中三

者愈又墮胎久服明目益氣頭不日逆

羊枝主洗瘡及陰囊下濕癢皮主爛

瘡根主喉痺寒勢生河南平澤可作

神燭 景天為之使槐子以多連者為好十月上
巳日採之新兒盛合泥百日皮爛為水搽

如大豆服之今令人臨滿發不白而長生慶之有此云
七月取其子未堅故搗攪取汁謹案別錄云八月

斷槐大枝使生蠟藥煮汁釀酒療大風痿痺甚効
槐耳味苦辛平无毒主五痔心痛女人陰中痔痛

槐樹菌也當取堅如菜
耳者枝蛇射心醫毒也

杵實味甘寒無毒主陰痿水腫一名穀

實所在有之八月九月採實日乾葉味

甘無毒主小兒身熱食不生肌可作浴湯

又主惡瘡生肉樹皮主逐水利小便莖主

隱軀癢單黃洗浴其皮白汁癰此即
今穀

樹子也仙方採搗取汁和丹用亦乾服使人通神
見鬼南人呼穀紙亦為楮紙作楮音武陵人作敵

皮衣又具
堅好耳也

枸杞味苦寒根大寒
子微寒無毒主五內邪氣熱

中消渴周痺風濕下胷腸氣客熱頭

痛補內傷大勞嘔吸堅筋骨強陰利

大小腸久服堅筋骨輕身能老耐寒

暑一名杞根一名地骨一名苟忌一名地輔

一名羊乳一名却暑一名仙人杖一名西王

母杖生常山平澤又諸丘陵阪岸上冬採

根春夏採葉秋採實陰乾今石頭煇火樓下家多其葉可

作羹味小苦俗讀云去家千里勿食羅摩狗把此言且補益精氣強盛陰道也羅摩一名苦九葉厚大似藤生極有白汁人家多種之可生酸而於蒸糞食也枸杞根實為服食家用其說乃甚美仙人之杖遠自有白平也

蘇合味甘溫無毒巨辟惡斂鬼精物

溫瘧豈毒痼瘕去三虫除邪不夢

竹瀝味甘通神明久服輕身長年生

中書川谷俗傳云是師子矢外國說不今今皆從西域來真者難別亦不復

大藥唯供合好香身 謹案此香從西域及崑崙朱空赤色重如石燒之灰白者好云是師子屎

者以是胡人誰言陶不誤之於以為疑

橘柚味辛溫無毒之胃中癥瘕氣

利水穀下氣止嘔欬除膀胱留熱下停

水五淋利小便主脾不能消穀氣充


胃中吐逆霍亂心淺去寸白久服去夏
下氣通神輕身長年一名橋皮生南

山川谷生江南十月採

以東橋為好西江亦

用之不如甘皮小冷瘧氣乃言欲勝東橋此人亦
蓋人也今以雅用皮既其葉類所以和宜相佐抽
子皮乃可食而不傷入葉用此亦應下氣謹案
相皮厚味甘不如橋有酸者名却甘今俗人或
謂燈為柚非也案呂氏春秋云葉之美者有雲夢
之柚鄭氏曰柚似燈而大於橋孔
安國云小曰柚大曰柚皆謂甘也

新修本草木部之上品卷第十二



[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '新修本草木部' and '卷第十二']

新編本草木部中卷第十三



新井文庫

司空上柱用英國公臣勳等

勅依

龍眼

厚朴

猪苓

竹葉

竹筴

枳實

山茱萸

吳茱萸

秦皮

枚子

檳榔

合歡

秦椒

衛矛

紫葳

蕪夷

食茱萸

樟子木

每始木

朽傷木

茗苦楮

桑根白皮

松蘿

白棘

棘刺

安息香 龍腦 菴摩勒 毗梨勒

右木類中品廿八種

十七種神農本草經二種
各醫別錄九種新附

龍眼味甘平去毒十 除五藏邪氣安志

厭食除虫去毒久服強魂魄聰察輕身

不通神明一名益智其大者似檳榔生

南海山若

廣別別有龍眼似荔枝而小非益智恐彼人別名
今者為益智日 食之並利人 謹案益知 不連麴

子頭未開者味甘辛殊不似 傾其苗葉花根与 豈受 无別 唯
子小耳龍眼一名益智而益智非龍眼也其龍眼樹似荔枝葉若

林檎花白色子如檳榔有
鱗甲大如鵝卵味甘酸

厚朴味苦温無毒主中風傷寒頭痛寒熱

驚氣血痺死肌去三 五温中益氣消痰下

氣療霍亂及腹痛脹滿胃中冷逆胸中

嘔逆不止洩利淋瀝除留去留痰心煩滿厚

腸胃一名厚皮一名赤朴其樹名榛其子在

逐楊療鼠痿明目益氣生皮壯完胸三月

九月十月採皮陰乾

乾薑為之使惡澤寫寒水石消
石今出達平宜都極厚肉紫色者

為好殼薄而白者不用之失
上甲錯皮俗方多用道家不須之

猪苓味甘苦平無毒主療瘧解毒辟瘟
不注祥利水道久服輕身能老一名猪猪

矢生衡山之谷及濟陰宛朐二月八月採

乾今湘州衡山无有此道不通皆從寧州來舊云是槐樹苓其
皮至黑作塊似猪矢故以名之肉白而實者佳用之削去黑皮乃

稱之比年
殊難得耳

竹葉芥竹葉味辛平大寒無毒主欬逆上氣
溢勸惡瘍斂小虫除煩熱風痊喉痺欬逆
根作湯益氣心渴補虛氣消毒汁主風癩
痺實通神明輕身益氣生益別淡竹葉味
辛平大寒主胸中淡熱欬逆上氣其應大寒
療暴中風痺胸中大熱心煩洵其皮茹蠶室
療嘔窶溫氣寒癸吐血崩中溢勸苦竹葉

及瘰癧口瘡明眼痛通利九竅

竹筴味甘無毒之消渴利水道益氣可

久食干筴燒服療五痔五

竹類甚多此前一條云是筴竹吹用淡苦耳又

一種薄殼者名甘竹葉取勝又有實中竹筴竹又有筴竹並以筴為佳於葉无用凡竹瘰唯用淡竹耳竹實出藍田江東乃有花而牙實故鳳鳥不至而須來吸有實之狀如小麦也

枳實味苦酸寒無毒主大風在皮膚中

如麻豆苦瘰除寒熱之結心利長肌定利

五藏益氣輕身除胸脇淡痺逐停水破

結實消脹滿心下急痞痛逆氣脇風痛安

胃氣心瘡洩明目生河內川澤九月十月採陰

乾今處有採破令乾用之除中採薇後合香亦如橘皮以陳者為良枳樹枝莖及皮療水脹暴風骨節疼急枳實俗方及用道家不須也謹案枳實日干乃得陰便濕爛用當去核及中穰乃佳今云用枳故乃尔若稱枳實須合核穰用者殊不然也誤矣

山茱萸味酸子微溫無毒主心下邪氣寒

熱溫中逐寒溫濕痺去三虫腸胃風邪寒
熱疝瘕頭腦風氣去來鼻塞目黃耳聾
面皯溫中下氣出汗強陰益精安藏通九
竅心小便利久服輕身明目強力長年一名
蜀棗一名鷄足一名思益一名魁實生漠中岩
及^{脚脚}脚宛胸東海^兼棗賒九月十月採實陰乾
藜實為之使惡枯梗防風防己今出近道諸山中大樹子初發未乾赤
毛如胡蘂子亦可取既乾後皮甚薄當合核為用也

十三

五

吳茱萸味辛溫大熱有小毒主溫中
下氣心痛欬逆寒熱除濕而痺逐風
邪開溼理去痰冷腹內絞痛諸冷實
不消中惡心腹痛逆氣利五藏根斂
三虫根白皮熬燒虫療喉痺欬逆心淺
注食不消女子經產餘血療白癬一名藪
生上谷川谷及宛胸九月九日採陰乾

藜實為之使惡丹紫消石白惡畏紫石英此即今食茱萸禮
記亦名藜而俗中呼為藜子當是不識藜字之似藜仍以相
傳其根南行東行者為勝道家去三尺方亦用之謹案今雅
耀水云檉檉醜檉陸氏本草疏云檉檉屬亦有檉名陶誤也

秦皮味苦微寒大寒無毒主風寒濕痺

洗之寒氣除熨目中青翳白膜男子少

精婦人帶下小兒癩身熨可作洗目湯

久服頭不白輕身皮膚光澤肥大有子

一名岑皮一名石檀生膚江川谷生宛胸

二月八月採皮陰乾

大戟為之使惡茱萸俗云是焚窺皮而水漬以和墨書青色不脫徹青

且亦殊薄恐不必命俗方 以瘡目道術家亦自用處謹案此樹似檀葉細皮有白點而不麻錯取皮水漬便碧色書紙者背青色者是俗見味苦名為苦樹亦用皮療眼有効似藜似檀故名石檀也

枝子味苦寒大寒無毒主五內邪氣胃中

熱氣面赤酒皸鼻白瀨赤癩瘡瘍目熱

赤痛胸中心大小腸大熱心中煩悶胃中熱

氣一名木丹一名越桃生南陽川谷九月採實曝

乾 鮮玉支毒處有亦兩三種小異以七道者為良徑霜乃取之今皆入漆用於藥甚希玉支亦躑躅也

檳榔味辛温無毒主消穀逐水除痰辟飲三虫

去伏尸療寸白生南海 此有三四種出交州形小而味甘廣別以南者形大而味涩核亦大尤大

者名楮檳榔作藥皆用之又小者南人名蒟子俗人呼為檳榔孫亦可食 謹案檳榔未者極大停數日便爛今人此來者皆先

灰汁煮變仍火董使干始堪停久其中人主腹脹生痔未服利水穀傳瘡生肌肉心痛憎為灰主口吻白瘡生交州愛州及崑崙

合歡味甘平無毒主安五藏和心志令人歡樂

無憂久服輕身明目得所欲生益州川谷 嵇公養生論亦

云合歡蠲忿萱草忘憂詩人又有萱草皆云即是今麻苳不入藥用至於合歡舉俗無識之者當以其非療病之功稍見輕略遂致永謝猶如長生之法入罕敦尚亦為遺棄也洛陽華林苑中猶云合歡如丁林唯不來江九耳 謹案此樹生葉似皂莢槐等極細五月花發紅白色所在山瀟中有之今東西京茅宅山池間亦有種者名曰合歡或曰合昏 秋實作英子極薄細

秦桤味辛温生温熟寒有毒主風邪氣

温中除寒痺堅齒長髮明目療喉痺吐逆

疝瘕去老血產後除疾腹痛出汗利五藏

久服輕身好色能老增年通神生太山川谷

及秦嶺上或榔榔八月九月採實

惡枯樓房夢
畏雌黃今從

西來形似枲而大色黃黑味亦頗有枲氣或呼為大枲又云即
今椽樹子而椽子是枲枲忍讓 謹案秦枲樹葉及子都似蜀

枲但味短實細藍田而

秦嶺聞大有

衛茅味苦寒無毒主女子崩中下血腹滿

汗出除邪熱鬼毒注盜中惡腹痛去白虫

消皮膚風毒腫令陰中鮮一名鬼箭生霍山

山谷八月採陰乾

山野處有其莖三羽狀如箭羽俗皆呼
為鬼箭而為用甚希用之削取皮及羽也

紫葳味酸微寒無毒主婦人乳餘疾崩中

癥瘕血閉寒熱羸瘦養胎莖葉味苦无

毒主痿躄益氣一名陵苔一名芙蓉生西

海川谷生山陽

李云是瞿麥根今方用至少博物志云郝晦
行葦草於太行山此得紫葳葦必當奇異今

瞿麥葦乃可愛而處之有不應乃在太行山且又標其莖葦恐
亦非瞿麥根詩云有莖之葦郭云陵霄藤亦忍非也 謹案此

葳此即陵霄也花及莖葦俱用案尔雅釋草云莖一名陵苔黃葦葉
白葦尖郭云一名陵時又名陵霄本草云一名陵苔一名芙蓉即用花

不用根也山中亦有白花者案瞿麥花紅无黃白者紫葳瞿麥皆本
經所載若用瞿麥根為紫葳紫葳何得復用莖葦體性既与瞿麥

可異生處亦不相開郭
云度霄此為真說

蕪蕪味平無毒主五内邪氣散皮膚骨節

中淫淫行毒去三虫化食逐寸白散腹中温

温喘出一名無姑一名蕪塘生川谷三月採實陰乾

今唯出高麗狀如榆荚氣臭如狐彼人皆以作醬食之性殺虫以
置物中亦辟蛀但患其臭耳謹案尔雅蕪蕪一名斂蓋今云蕪塘
字之誤也今出
近所同別者最好

食菜莫味辛苦大熱無毒功用與吳菜莫同少

為劣耳療水氣用之乃佳

皮薄用口者是雖名為
食而不堪散新附

椋子木味甘鹹平無毒主折傷破五養五安胎心

痛生肉

菜似柿兩菜相當子細如牛李子生青變黑其木堅重
煮汁赤色尔雅云椋即椋者是也八月九月採木日乾新附

每始王木味苦平無毒主折跌筋骨主肌破血

心痛酒水煮濃汁飲之生肉列山谷

藤生鏡樹木上
菜似蘿摩菜

二月八月
採新附

折傷木味甘鹹平無毒主傷折骨筋疼痛

散血產後血悶心痛涓水黃濃汁飲之生資劑

山谷

藤生饒樹上葉似茵草葉而光厚八月九月採莖日乾新附

茗苦楮茗味甘苦微寒無毒主痿瘡利小

便去淡熱渴令人少睡秋採之苦楮主下氣

消宿食作飲加茱萸葱薑茅

素小雅釋木云楮苦楮春秋採之搽音石

舜出山南金州梁州

漢中山谷新附

栝根白皮味甘寒無毒主傷中五勞六極羸

十三

十

瘦崩中脈絕補虛益氣去脈中水氣心強

面熱渴水腫腹滿臚脹利水道去寸白可以

縫割採無時出土上者斂人

續斷桂心麻子為使

菜主除寒熱出汗汁解吳公毒

栝耳味甘有毒黑者主女子漏下

赤白汁血癥瘕積聚腹痛陰陽寒

熱无子月水不調其黃熱陳白者

心久洩益氣不飢金色者療痺痺
飲積聚腹痛金創一名菜菌一名木蕨
五木耳名槲益氣不飢輕身強志生
槌為六月多雨時採木耳即曝乾東行
菜根
乃易得而江邊多出土不可輕信菜耳浙穀方之木槲又呼為
菜上寄生此云五木耳而不顯四者是何木菜老菜樹生燦耳
有黃赤白者又多雨時亦生軟濕者人採以作菹皆无復菜用
謹案斫耳人常食槐耳用療痔榆柳菜耳此為五耳軟者
並堪取菜味甘寒无毒单食主消渴菜味苦甘寒有少毒
水煎取濃汁除脚氣水腫利大小腸灰味辛寒有小毒蒸

淋取汁為煎与冬 等回滅誌燕黑子蝕
惡肉煮小豆大下汁脹傳金創心五生肌也

松蘿味苦甘平無毒主瞋怒邪氣心虛汗
出風頭女子陰寒腫痛療淡婁温瘧可為
吐湯利水道一名女蘿生熊耳山川谷松樹
上五月採陰乾東山甚多生雜樹上而以松上者為真
毛詩云葛藟 蘿菴干松上葛是寄生今
以菜上者為真不用
松者此牙有異同耳
白棘味辛寒無毒主心痛癰腫潰膿心痛

决刺结療大夫虛損陰痿精自出補腎氣

益精髓一名棘鍼一名棘刺生雍州川谷李云此是棗樹

針今人用天門冬代之非真也謹案白棘莖白如粉
里子棗與赤棘同棘林中時復有之亦為難得

棘刺花味苦無毒平主金創內漏明目

冬至後百日採之實主明心脈痿疔

焚刺小便生道旁四月採一名旃蓂一名

胸一名刺原又有棗針療腰痛喉痛心

此一條又相違越恐李所言多是然後无導其花復一折
別一物不關棗刺也今俗人不皆用門冬苗乃是好作飲益入正自不可

儒棘刺耳謹案棘有白赤二種亦猶諸棗色類非一位條用
不足恠以江南元棘李云用棗針天門冬苗一名賴棘南人取

陶亦不許今用棘刺當取白者為勝花即棘花定无別物然刺有
種有鈎有直補益用直者療腫宜取鈎者又云棗針宜在棗

人味於棗棘所
以同在棘條

安息香味辛苦平無毒之心腹惡氣鬼

西戎似松脂黃黑名為規新者亦柔韌新

龍腦香及膏香味辛苦微寒一云温平無毒

至心腹邪氣風濕積聚耳聾明目去目赤

翳出婆律圓形似白松脂作松木氣明淨者

善久經風日或如雀屎者不佳云合穀米相

思子貯之則不耗膏之可部

樹似松言婆律
芝樹根下青曰龍脂

芝樹根中乾脂子似荳蔻皮有甲措香代龍腦味辛尤下惡氣
消食散脹香口又云出婆律國葉以國為名也亦言即松脂也江南有
松木經歲造或方云无脂猶甘
蕉蘭花而无實耳新附

菴摩勒味甘寒無毒之風虛煥氣一名

十三

十三

餘甘生嶺南交廣愛等州

樹葉細似合歡化黃
似李奈青黃也核實

六七稜中入亦
入藥新附

毗梨勒味苦寒無毒切用與菴摩勒同出云

域及嶺南交愛等州戎人謂之三菓


樹似椰子
亦以桃核

熟勃而負短元楊
用之亦同法新附

新修本草木部中品卷第十三

新修本草木部下卷之二十四
 同字上柱國英國名醫勳等奉
 黃環 石南草 巴豆 蜀椒 莽草
 郁李 覆李 桑李 枳殼 楠材
 羅實 蔓材 釣樟 雷丸 沒硫
 藥材及白粉樹皮水為藥藥劑
 藥材及白粉樹皮水為藥藥劑

新修本草木部下卷之二十四
 同字上柱國英國名醫勳等奉
 黃環 石南草 巴豆 蜀椒 莽草
 郁李 覆李 桑李 枳殼 楠材
 羅實 蔓材 釣樟 雷丸 沒硫
 藥材及白粉樹皮水為藥藥劑
 藥材及白粉樹皮水為藥藥劑



新修本草木部下品卷第十四



新井文庫

司空上柱國英國公臣勳等奉

勅修

黃環

石南草

巴豆

蜀椒

莽草

郁李

鼠李

藥華

枳材

楠材

匪實

蔓樹

釣樟

雷丸

波疏

舉樹皮

白楊樹皮

水楊葉

藥荊

小蘗

莫遂

釣藤

藥實

皂莢

練實

柳華 桐華 梓良 蘇方木 接骨木

木天翠 烏梁 赤收 訶梨勒

楓柳 賣子木 文空 紫真檀 椿木

橡實 無食子 揚蘆木 榭若

右木類下品各卅五種 一十七種神農本草經七種
各醫別錄廿一種新附

毒理味苦平有毒之 畫毒鬼泣鬼魅耶丸

在藏中除款送寒熱一名陸泉一名大就生

蜀郡山谷三月採根陰乾 戴尾為之使惡伏苓必防
已亦作車輪理解蜀郡賦

所云主 另黃隈者或云是大戟花定非也俗用甚希市人甚有識者
兼此勿襄陽已西人謂之就葛作藤生根亦類所云似防已作車
輪理解者近之人取葛根誤得食之吐利不止下土漿解乃若此真
黃隈也餘處亦稱唯襄陽大有本經用根今之大戟花非也真下
角生似皂莢花實與葛同時矣 今爾 連種之大者莖徑六七寸所有
之謂其子名穉後子今太常科劔而耒者乃鷄屎葛根非也

石南草味辛平苦有毒主 養腎氣內傷

筋骨皮毛療脚弱五藏耶氣除熱

女子不可服令思男實殺盡毒破積聚逐風

痺一名鬼月生華陰山谷二月四月採菜八月採

實陰乾五茄為之使今盧江及東閩皆有菜狀如枇杷菜方用亦希謹案此早菜似茵草陵冬不敗以菜細者為良開

甲者其豆療風耶丸散人安其江山已而者長大如枇杷菜無氣味殊不任用今醫家不復用實也

巴豆味辛溫生溫熟寒有大毒至傷心溫瘧寒

熱破赤瘰癧結堅積聚留飲淡滯大腹水

良烏練五藏六府開通閉塞利水穀道

去惡肉除鬼蠱毒注邪物殺虫臭女子月

兩爛胎產剝膿血不利丈夫陰致敗苗毒

可練解之益五臟令人色好變化与鬼神

通一名巴林生巴那以谷八月採實乾之用

去心皮芫花為之使惡蕞草畏大黃連梨蘆出巴那似大豆最

特利人新者佳用皆之去心皮乃接又熬令黃黑別搗如

膏乃合和丸散可道方亦有錢解法服之乃言神仙吞一枚便欲死而覺食之三年重丹介物性乃有相耐知此可

高丈餘葉似櫻桃葉頭微尖十二月菜漸歇至四月落盡月菜漸止七月花八月結實九月成十月採其子三枚共帶各有殼

最出眉

州喜州

蜀椒味辛温大热有毒主肺氣欬逆温中逐
骨解皮膚死肌寒濕痺痛下氣除
五藏六府寒冷傷寒温瘧大風汗
不出心腹痞軟宿食山腸澼下利洩
精字乳餘痞散風邪痲結水腫黃
疸鬼注盜毒欬出臭毒久服之頭
不由輕身增年開腠理通血脉堅齒

髮調鬪耐寒暑可作膏藥多食
令人食氣口閉者欬人一名巴椒一名

盧葭生武都川谷及巴郡八月採實乾

查人為之使畏素吾出蜀郡北郡西以志人家種皮肉厚
應衣白乳味濃江陽喬厚及建平間品有而細赤辛而不貴
勢不如巴郡巴椒有毒不可服而山為一名恐不介又有秦椒黑色在上
品中凡用椒皆火微熬之令汗出謂為汗椒合有力勢椒自冷利素
則六美不得相雜耳謹案椒目味苦寒无毒
主水腫脹滿小便今椒出金州西域最善

莽草味辛苦温有毒主風頭癰腫乳癰

瘋癩除結氣疥癬虫疽疥致虫臭療

喉痺不通乳難頭風瘡可用沐勿近目

一名弭一名春草生上谷山谷及宛胸五

月採菜陰乾

上谷遠在幽州今東間諸山處皆有菜青新烈者良入用鳩以和米肉水中與吞即死

浮出人取食之无妨莽

字亦有作苟者呼為同青

郁核味酸平无毒主大腹水腫面目

交浮腫利小便水道根主齒斷腫鶴

慈堅慈去白出一名爵李一名車下

李一名採生高山川谷及丘陵上五月

六月採根

山野處有其子孰赤色亦可散之

鼠李子主寒熱瘰癧癢皮味苦微

寒无毒主除身皮熱毒一名牛李

一名鼠梓一名柙生田野採无時

此徐又附

見今亦在副品限也謹此藥一名趙李一名皂李一名馬槎樹皮主諸瘡寒熱毒痺子主牛馬六畜瘡中虫或生槎

薄之或和脂陰皆効子味苦採取日乾九蒸酒漬服三合日
二能下血及碎肉除痰瘕積冷氣大良皮子俱有小毒

藥華味苦寒無毒主目痛洩出傷骨

消日腫生漢中川谷五月採天明為之使
程宗此樹系架

莖而薄細花黃似槐少長大殼似酸漿其中有實如熟豉豆負
黑堅硬堪為數珠者是也五六月花可收而人取合黃連作藥膏
市爛大劫花以凍黃色甚鮮好也

枚材微溫療漆削作柿煮以洗漆亦不可差又
有鼠查生去地高丈餘許煮以洗

漆多老文日漆較葉細之生石邊亦療漆其鷄子及蠶並是
舊方謹案枚木水煎汁浸痔差脚氣腫滿服之療心腹脹痛去惡

氣其鼠查漆姑有
別功別出下品

楠材微溫主霍亂吐下不心削作柿煮服之
窮无他菜用此

榧實味甘主五痔去三虫盡毒鬼注

生永昌今出東陽諸郡食其子乃言療寸白不復有
餘用不藥方疑此与前虫品彼子療說同

謹案此物是虫部中彼子也余雅之彼枚也其樹大連
柁高數仞葉似枚其樹如栢作松理肥細軟堪器用者

蔓柁味苦溫無毒主風寒濕痺瘰癧疥

瘰癧痛除四支厥氣膝痛一名家柁一名鼠

栲一名狗栲生雲中山川谷及人家間株

莖根煮醱

山野處有俗呼為樛似檉藿
小不啻耳一名樛斂可以蒸病出汗

釣樟根皮主金創口

出桂陽邵陵諸處亦呼作
烏樟方家乃不用而俗人多

或此創根皮屑以療金創新舊易合甚驗又有一草似樟可氣辛臭
各地菽人呼為劉盡草五月五日採乾作屑亦至療金瘡言劉盡昔
採用之耳謹業釣樟生柳州山谷樹高丈餘葉似柝葉而
夫長皆有赤毛若枇杷葉八月九月採根皮白乾之

雷丸味苦鹹寒微寒有小毒主斂三虫

逐毒氣胃中熱利丈夫不利女子作膏

摩小兒百病逐邪氣惡風汗出除皮汁

勢結積聚蠱毒白出寸白自出不止久服

令陰萎一名雷矢一名雷實赤者斂人生

石城山谷生漢中土中八月採根曝乾

為之使惡葛根今出達平且都間累々相連如丸本經云利丈夫別
錄云久服陰萎於事相及謹案雷丸是竹之苓也凡有田勞餘零
出无相連者今
市房州全州

沒疏味辛苦寒微寒无毒主身皮

膚中熱除邪氣心遺溺通利水道除

胃中熱下氣可作浴湯一名長骨生

掘耳川谷及田野故丘墟地四月採盧

為之使李公波疏一名楊樞一名杜荆一名空疏皮白中空時

有莖子似芍杷子冬月熟色赤味甘苦未代凡乃識者此實

真也非入蘿棧之楊樞也李當之此說於論杜荆乃不為大

乎而隘引波疏恐斯誤矣又云波疏與空疏亦不同掘耳類應

作德耳山名而都无掘耳之号也謹案波疏似空疏樹高

丈許皮白其子八月九月熟色赤似芍杷子味苦必兩相並空

疏不同空疏一名

樞子為英不似波疏

欒樹皮大寒主時行頭痛熱結在腸胃山中

處有皮似檀槐葉如檉櫛人亦多藏用之削取表皮

去上甲黃收之夏日作飲去漿謹案此樹所在皆有多生

溪澗水側葉似樺而狹長樹大者連枕高數仞皮極厚

強不似檀俗人取煮汁以療水及新下利取爛葉按承火燭瘡

有劫也

白楊樹皮味苦无毒主久風脚氣腫四支緩

弱不隨毒氣遊易在皮層中淡澹等酒漬

服之取葉圓大帶小无風自動者新附

水楊葉嫩枝味甘平無毒主久利赤白痔水

絞取汁服一升日二大効此陶注部者是新附

藥荊味辛苦溫有小毒主大風頭面手足諸

風癩狂瘧濕痺寒冷疼痛俗方大用之而

本草不載然無別名但有藥花切用又別非

此花也其莖葉都似石而乾亦反表冬不凋葉上有細黑點者真也今雍州所用者是而洛州乃用石荊當之非也新附

小藥味苦大寒無毒主口瘡甘蜜殺諸虫去

心腹中熱氣一名山石留其樹枝葉與石留無別但花異子細黑負如牛字子耳生山石間

新在皆有襄陽峴山東者為良陶於藥本附見二種其一見是陶云皮黃其樹乃皮白今大常所貯乃葉多刺者名曰刺藤非小藥

新附

美蓮味甘苦平無毒主三虫下氣消穀似菜

木槿及似榆作小樹其子如椹疏而為並四相對而色赤味甘煮樹枝汗和作粥甘美以餉小兒殺蛇不入方用後撰草木疏各繫

此一各翠先單云檀榆類也所在山谷南之新附

釣藤微寒主小兒寒熱十二驚癇如連平然作予藤字

唯療小兒不入餘方謹案山藥州
系細長莖間有刺形若釣鈞者

藥實根味辛溫元毒主聃氣諸痺疥

酸續傷絕補骨髓一名連木生蜀郡山谷

採无時

謹案此藥子也當今咸用胡名那錠出通州渝州本
徑用根恐誤載根字子味辛平无毒主破血心利

消腫除盛注地毒樹生葉似杏花
紅白色子肉味酸甘用其極入也

皂莢味辛鹹溫有小毒主風痺死肌聃氣

風頭濇出下永利九竅殺鬼精物療腹脹

滿消穀被欬嗽囊結婦人脫不落明目益精

可為沐藥不入湯生雍州川谷及魯鄆縣如

嗜可者良九月十月採莢乾

栢實苦之使惡
麥門冬畏宜青

人參昔參今處之有長尺二者良俗人見其皆有虫乳而未
嘗見虫取皆言不可迨令人惡病殊不念其虫伏也草采上青
虫莢微破魚便虫去所以難見耳但取生者若目知之也謹案此
物有三種猪可皂莢最下其形曲瘦薄惡全无落晒洗於亦不
去其尺二寸者麻長虛无潤也若長六七寸
圓厚莖從直者皮薄多肉味濃大也

練實味苦寒有小毒主溫疾傷寒大熱煩

狂殺三虫疥瘍利小便水道根後寒療沈

虫刺大腹生荆山之谷

處有俗人五月五日皆取花葉佩帶之去辟惡其根以苦酒摩陰

疥甚良煮汁作糜食之去蛇虫也謹案此物有兩種有雄有雌雄者根赤无子有毒服之多使人吐不能止時有至死惟者根白有子毒微用當取雌者

柳華味苦寒无毒主風水黃疸面熱無疥

疥惡瘡全割一名柳紫葉主馬疥疥瘡取

煎黃以洗馬疥立愈療心腹肉血心痛實

主潰癰逐膿五子汁療渴生疥郟川澤

柳子今水楊也

花熟隨風飛狀如兔零陳元正方以為譬若尚用其未舒時子亦隨花飛正應水漬取汁耳柳花亦宜枯炙瘡皮茶湯洗瘡僅葉柳与水楊全不相似火楊葉負白而赤枝條短軟柳葉長青綠枝條長軟此論用柳不載水楊亦有療能本草不錄樹枝及空中垂屑枝皮味苦寒无毒主痰熱淋可為生湯黃洗風腫癢酒煮含主齒痛空中虫屑可為浴湯主風腫癢隱軟大劫以人間柳樹是陶云水楊非也本草載花差灸瘡

桐葉味苦寒无毒主惡蝕瘡著陰皮主五

痔殺虫貴純氣華傳猪瘡肥丸三倍生桐

栢山谷

相樹有四種青桐莖皮青葉似梧桐而无子栢桐色白葉似青而有子、肥亦可食白桐与齒桐无異佳有花子耳花三月舒黃紫色礼云桐始花者也齒桐无子是作琴瑟者今此云花便應是白、桐、亦堪作琴瑟一名梓桐人家多植之、僅案古本草桐花飼猪服大之倍小云傳廢恐誤矣豈有故破傷猪傳花者

梓白皮味苦寒无毒主熱去三虫目中患華

葉檮傳猪瘡肥大易養三倍生河内山谷

梓樹之皮梓亦有三種當用作梓索不腐者方葉不漫用葉療中耳謹案此二樹花葉取飼猪並能肥大且易養今見李云本草及博物志但云飼猪使肥今云傳猪瘡並誤詭矣別錄云皮生吐建

胃反去三虫小兒嬰癢身頭嬰煩能瘡湯浴之并封薄散傳頌葉主爛瘡也

蘘方木味甘鹹平无毒主破血產後血脹悶欬

死者水煮若酒煮五兩取濃汁服之効

此用漆色者出方

海味論宋文州愛州有樹似菴羅葉若榆葉而无髓抽條長丈許其黃子生青熟黑新附

梓骨木味甘苦平无毒主折傷續筋骨除風瘡癬

益可為浴湯

葉如蔭英花亦相似但似樹高二丈木輕虛无砒菴檮便主人家亦種之一名木荆藿所在皆有之新附

枳俱味甘平无毒主頭風少腹物急陸機云一名

木蜜其木皮温无毒主五痔和五藏以木為屋

中酒則味薄此亦奇物其樹徑尺木名白石棗如棗柘其子作房似珊瑚椽在其端人皆食之新附

木天蓼味辛温有小毒主瘕結積聚風勞瘵

冷生山谷中作藤莠菜如柘花白子如棗許无定形中穰似茄子味辛取之以當薑蓼其苗藤切以酒侵服或以醱酒去風冷

瘕僻大効所在皆有从步安州申州新附

烏臼木根皮味苦微温有毒非暴水瘕結積

聚生山南平澤樹高數仞葉似梨杏花黃白子黑色新附

赤仇草味苦寒无毒主水利風頭身瘡生平

陸所在有之實味酸冷无毒汁服主利洗頭及

身羸瘡瘻一名羊林一名鼠查小樹生高五六尺子似掌仇大如小林檜赤色出

山南申州安州隨州新附

訶梨勒味苦温无毒主冷氣心腹脹滿下宿物

生交愛州似木椀花白子形似交子青黃色皮內相著水磨或散水服之新附

風柳皮味辛大熱有毒主風鶴為痛出石州

葦似槐莖赤根黃子六月熟錄
色少細則取其葦皮用之新附

賣子木味甘微溫鹹平無毒主折傷面肉結補

骨髓心痛安胎生山谷中
其生似柿也每
市字州新附

大空味辛苦平有少毒主三虫致蟻生山谷

中以根皮末油和塗致蟻死
根皮赤葉似楮以
圓厚作之樹抽條

高六七尺出襄州山谷所在亦
有秦隴人名為獨空新附

紫真檀木味鹹微寒主惡毒風毒
俗人誤以陰風
毒諸腫亦劫

不及青木香又主金創以血亦癰淋用之
謹案此物出昆崙崑崙國惟不佳中華人尚通有

十四 十四

椿木葉味苦有毒主洗瘡疥風疽水煮葉汁用

之皮主甘蟻標不根葉尤良
二樹形相似標木味
椿木實也新附

胡枹味辛大溫無毒主下氣溫中去淡除蔽

府中風冷生西戎形如鼠李子調食用之味甚

辛美而芳香不及蜀枹
附新

椽實味苦微溫無毒主下利厚腸胃肥健人其

散為散及黃汁服亦主利并堪漆用一名枏汁
枏櫟皆有以櫟為勝所在山谷中皆有新附
無管子味苦溫无毒主赤白利腸滑生肌肉去

西戎

云生沙磧間柑似檉
者新附

楊廬木味苦有毒主疽瘰惡瘡水煎茶汁
洗瘡立差生籬担間一名空梳所在皆有新附
槲若味甘苦平无毒主痔心五之利心渴取脉

十四

十五

灸用之皮味苦水煎濃汁除盡及上瘻俗効

新附

新終本草木部下品卷第十四

本草綱目

Faint vertical text columns, likely bleed-through from the reverse side of the page.

