



本草綱目

十七
下上

服部文庫
117
400
14



117
400
14

本草綱目草部目錄第十七卷上

草之六 毒草類四十七種

大黃 本經 商陸 本經 狼毒 本經

防葵 本經 狼牙 本經 蘭茹 本經

大戟 本經 澤漆 本經 甘遂 本經

續隨子 開寶 葇若 本經 雲實 本經

蓖麻 唐本 常山蜀漆 本經 土紅山附

藜蘆 本經 馬腸根附 參果 木藜蘆 拾遺

附子 本經 天雄 本經 側子 別錄

本草綱目卷之六十七

漏籃子 綱目 烏頭 本經 白附子 別錄

虎掌夫南星 本經 田跋 本經

菟藟 開寶 菩薩草附 半夏 本經 蚤休 本經

鬼臼 本經 射干 本經 鳶尾 本經

玉簪 綱目 鳳仙 綱目 坐拏草 圖經 坤不蒼附

曼陀羅花 綱目 羊躑躅 本經 山躑躅 羊不吃草附

芫花 本經 蕘花 本經 醉魚草 綱目

莽草 本經 茵蕒 本經 石龍芮 本經 胡椒

毛茛 拾遺 每薑附 牛扁 本經 風建草附 葶麻 圖經

格注草 唐本 海芋 綱目 透山根附 鉤吻 本經

左右附方舊一百三十四新四百九十五

綱目草部第十七卷上



毒草類四十七種

大黃 本經下品

釋名黃良 經本將軍之當火參 黃虞如 黃其色也將軍

之號當取其駿快也 果曰推陳致新如 黃其色也將軍

集解 采別錄曰大黃生河西山谷及隴西二月八月

生黃赤其葉四四相當莖高三尺許二月花黃五

月實黑八月采根根有黃汁切片陰乾弘景曰今

采益州北地部波山及西山者雖非河西隴西好者

猶作紫地錦色味甚苦瀟色至濃黑西川陰乾者

勝此部日乾亦有火乾者皮小焦不如而耐蛀

久此藥至勁利粗者便不中服恭曰葉子黃並倍

[Faded bleed-through text from the reverse side of the page]

羊蹄但莖高六七尺而脆味酸堪生啖葉粗長而厚根紅者亦宿羊蹄大者乃如盤長二尺其莖濕潤而易蛀壞火乾乃佳作時燒石使熱橫寸截著石上燂之一日微燥以繩穿眼乾今出宕州涼州西羌蜀地者皆佳幽并以此者漸細氣力不及蜀中者陶言蜀地不及隴西誤矣藏器曰凡用當分別之若取和及深沈能攻病者可用蜀中倍生舌片緊硬者若取瀉洩快推陣去熱者當取河西錦文者頌曰今蜀川河東陝西州郡皆有之以蜀川錦文者佳其次秦隴來者謂之土番大黃正月內生青葉似苧麻大者如扇根如芋大者如盤長一二尺其細根如牛蒡小者亦如芋四月開黃花亦有青紅似蕎麥花者莖青紫色形如竹二八月采根去黑皮切作橫片火乾蜀大黃乃作緊片如牛舌形謂之牛舌大黃二者功用相等江淮出者曰土大黃二月開花結細實時珍曰宋初益州方物圖言蜀大山中多有之赤莖大葉根巨若盤藥市以大黃為號紫地錦文也今人以莊浪出者

為最莊浪節古涇原隴西地與別錄相合

正誤

頌曰蜀州出一種羊蹄大黃治疥癢甚効初生苗葉累年長大即葉似商陸而狹尖四月

內抽條出穗五七莖相合花葉同色結實如蕎麥而輕小五月熟即黃色呼為金蕎麥三月采苗五月采實陰乾九月采根破之亦有錦文亦呼為土大黃時珍曰蘇說即老羊蹄根也因其似大黃故謂之羊蹄大黃實非一類又一種酸模乃山大黃也狀似羊蹄而生山上所謂土大黃或指此非羊蹄也俱見本條

根修治

雷曰凡使細切以文如水旋煎緊重者到未至亥如此凡七次晒乾却洒淡蜜水再蒸一伏

時其大黃必知烏膏樣乃晒乾用藏器曰凡用有蒸有生有熟不得一槩用之承曰大黃采時皆以火石燂乾貨貴更無生者用之亦不須更多炮炙

蒸

氣味苦寒無毒

別錄曰大寒言曰... 毒扁鵲苦無毒李富之大寒元素

曰味苦氣寒氣味俱厚沉而降陰也... 燥熟者寒因熱用酒浸入太陽經酒流入陽明經... 餘經不用酒呆曰大黃苦峻下走用之于下必生... 用若邪氣在上非酒不至必用酒浸引至至高之... 分驅熱而下如物在高巔必射以取之也若用生... 者則遺至高之邪熱是以愈後或目赤或喉痺或... 頭腫或膈上熱疾生也時珍曰凡病在氣分及胃... 寒血虛并妊娠產後並勿輕用其性苦寒能傷元... 氣耗陰血故也之才曰黃芩為之

閉寒熱破癥瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致

新通利水穀調中化食安和五臟平胃下氣除

痰實腸間結熱心腹脹滿女子寒血閉脹小腹痛

諸老血留結別錄通女子經候利水腫利大小腸貼

熱腫毒小兒寒熱時疾煩熱蝕膿甄權通宣一切氣

調血脈利關節泄壅滯水氣溫瘴熱瘡大明瀉諸實

熱不通除下焦濕熱消宿食瀉心下痞滿元素下痢

赤白裏急腹痛小便淋瀝實熱燥結潮熱譫語黃

疸諸火瘡時珍

發明

之才曰得芍藥黃芩牡蠣細辛茯苓療驚志... 怒心下悸氣得消石紫石英菴仁療女子血

閉宗與曰張仲景治心氣不足吐血衄血瀉心湯... 用大黃黃芩黃連或曰心氣既不足而不用補心

湯更用瀉心何也答曰若心氣獨不足則當不吐
 其熱以苦補其心蓋一舉而兩得之有是證者用
 之無不効惟在量其虛實而已震亨曰大黃苦寒
 善泄仲景用之瀉心湯者正因少陰經不足本經
 之陽元甚無輔以致陰血妄行飛越故用大黃瀉
 去亢甚之火使之平和則血歸經而自安夫心之
 陰氣不足非一日矣肺與肝俱各受火而病作故
 黃芩救肺黃連救肝肺者陰之主肝者心之母血
 之合也肝肺之火既退則陰血復其舊矣寇氏不
 明說而云邪熱客之何以明仲景之意而開悟後
 人也時珍曰大黃乃足太陰手足陽明手足厥陰
 五經血分之藥凡病在五經血分者宜用之若在
 氣分用之是謂誅伐無過矣瀉心湯治心氣不足
 吐血衄血者乃真心之氣不足而手厥陰心包絡
 足厥陰肝足太陰脾足陽明胃之邪火有餘也雖
 曰瀉心實瀉四經血中之伏火也又仲景治心下
 痞滿按之軟者用大黃黃連瀉心湯主之此亦瀉

脾胃之濕熱非瀉心也病發于陰而反下之則作
 痞滿乃寒傷營血邪氣乘虛結于上焦胃之上脘
 在于心故曰瀉心實瀉脾也素問云太陰所至為
 痞滿又云濁氣在上則生腹脹是矣病發於陽而
 反下之則成結胸乃熱邪陷入血分亦在上脘分
 野仲景大陷胸湯丸皆用大黃小瀉脾胃血分之
 邪而降其濁氣也若結胸在氣分則只用小陷胸
 湯痞滿在氣分則用半夏瀉心湯矣成無已註釋
 傷寒論亦不知分別此義成無已曰熱淫所勝以
 苦泄之大黃之苦以蕩滌痲熱下燥結而泄胃強
 頌曰本草稱大黃推陳致新其効最神故古方下
 積滯多用之張仲景治傷寒用處尤多古人用毒
 藥攻病必隨人之虛實寒熱而處置非一切輕用
 也梁武帝因發熱欲服大黃姚僧坦曰大黃乃是
 快藥至尊年高不可輕用帝弗從幾至委頓梁元
 帝常有腹疾諸醫咸謂宜用平藥可漸宣通僧
 坦曰脉洪而實此有宿妨非用大黃無瘥理帝從
 之遂愈以此言之今醫用一毒藥而攻衆病其偶

中便謂此方神奇其差誤則不言用藥之失可不戒哉

附方 舊十四新吐血衄血 治心氣不足吐血衄血者為心湯主之 大黃二兩黃連黃芩各一兩水三升煮一吐血刺痛 黃一兩為散每服一錢以生地黃汁一合水傷寒痞滿

半盞煎三五沸無時服 簡要濟眾方 傷寒痞滿病發於陰而反下之心下滿而不痛按之濡此為痞也 大黃黃連瀉心湯主之 大黃二兩黃連一兩以麻沸湯二升漬之 須臾絞汁 熱病譫狂 川大黃分作二次溫服 仲景傷寒論 熱病譫狂 五兩剉炒微赤為散用臘雪水五升煎如傷寒發黃 上方同

膏每服半匙 冷水下 聖惠方 傷寒發黃 上方同氣壯者 大黃一兩水二升漬一宿 半旦煎汁一腰升入芒硝一兩緩服 須臾當利下 傷寒類要 腰脚風氣 作痛 大黃一兩切如碁子和少酥炒乾勿令焦 搗篩每用二錢空心以水三大合入

薑三片煎十餘沸取湯調服 當下冷 一切壅滯 驗膿惡物即痛止 崔元亮海上方 一切壅滯 驗方治風熱積壅化痰涎治痞悶消食化氣導血用大黃四兩牽牛子半炒生四兩為末煉蜜丸如梧子大每服十九丸白湯下並不損人如要微利加一

二十丸 〇衛生寶鑑用皂莢熬膏和丸名墜痰丸 又名全真丸 金宣宗服 痰為百病 滾痰丸治痰為之有驗 賜名保安丸 前產後不可服用 大黃酒浸蒸熟切晒八兩生黃

芩八兩沉香半兩青礞石二兩以焰硝二兩同入砂罐固濟煨紅研末二兩右各取末以水和丸梧子大常服一二丸小病五六丸緩病七八丸急病一百二十丸溫水吞下即卧勿動候藥逐上焦痰滯次日先下糟粕次下痰涎未下再服王

隱君歲合四十餘斤愈 男女諸病 無極丸治婦人疾數萬也 養生主論 痛下崩漏不止腸風下血五淋產後積血癥瘕腹痛男子五勞七傷小兒骨蒸潮熱等證其效甚速

宜六癸日合之用錦紋大黃一斤分作四分一分
 用童尿一盞食鹽二錢浸一日切晒一分用醇酒
 一盞浸一日切晒再以此巴豆仁三十五粒同炒豆
 黃去豆不用一分用當歸四兩入淡醋一盞同浸一日去
 切晒一分用當歸四兩入淡醋一盞同浸一日去
 歸切晒為末煉蜜丸梧子大每服五十九空溫
 酒下取下惡物為驗未下再服此心腹諸疾三物
 武當高士孫碧雲方也醫林集要心腹諸疾三物
 丸治心腹諸疾卒暴百病用大黃巴豆乾薑各一
 兩搗篩蜜和搗一千杵丸小豆大每服三九凡中
 客卒忤心腹脹滿痛如錐刀氣急口噤停尸卒死
 者以暖水或酒服之或灌之未知更服三九腹中
 鳴轉當吐下便愈若口已噤者折齒灌之入喉即
 瘥此乃仲景方司空裴秀改為散用不及丸也
 圖經**腹中痞塊**大黃十兩為散醋三升蜜兩匙和
 本草**下利為度腹脇積塊**風化石灰末半斤瓦器炒
 外臺秘要**極熱稍冷入大黃末一兩**

炒熟入桂心末半兩畧炒下米醋攪成膏攤布貼
 之○又方大黃二兩朴硝一兩為末以大蒜同搗
 膏和貼之或加阿魏一**久患積聚**二便不利上搶
 兩尤妙丹溪心法**又患積聚**二便不利上搶
 大黃白芍各二兩為末水丸梧子大每**脾癖疳積**
 湯下四十九日三以知為度千金方**脾癖疳積**
 不拘大人小兒錦紋大黃三兩為末醋一盞沙鍋
 內文武火熬成膏傾瓦上日晒夜露三日再研用
 舶上硫黃一兩形如琥珀者官粉一兩同研勻十
 歲以下小兒半錢大人一錢半米飲下忌一切生
 冷魚肉只食白粥半月如服不愈半月之**小兒**
 後再服若口不食勿服**聖濟總錄**
無辜閃癖癩癧或頭乾黃聳或乍痢乍瘥諸狀多
 者大黃煎主之**大黃丸**兩錦紋新實者若微
 朽即不中用削去皮搗篩為散以好米醋三升和
 置瓦盆中於大鐺內浮湯上炭火慢煮候至成膏
 可丸乃貯器中三歲見一服七九梧子大日再服
 以下出青赤膿為度若不下一服或下少稍稍加丸若

下多又瀉疾之病重者七八劑方盡根大人亦可
用之此藥惟下宿膿不令兒利也須禁食毒物乳
母亦禁之一加木香小兒諸熱一兩為末煉蜜丸

麻子大每服五丸至十丸錢氏小兒方骨蒸積熱黃瘦

加黃連名三黃丸錢氏小兒方

大黃四分以童子小便錢氏小兒方

空腹分為二服如人行五里再服廣利方赤

白濁淋好大黃為末每服六分以雞子一個破頂

簡便相火秘結大黃末一兩牽牛頭末半兩每服

煩密湯服劉諸痢初起大黃煨熟當歸各二三

河間保命集取利或加檳榔熱痢裏急煎服取利忽喘

悶絕不能語言涎流吐逆牙齒動搖氣出轉大絕

水二盞煎一盞熱服食已即吐胸中有火也大黃

可安危氏得效方婦人血癖作痛大黃一兩酒

取利仲景金匱玉函方產後血塊大黃末一兩頭醋半升熬膏丸

千金翼久當下乾血氣痛錦紋大黃酒浸晒乾四兩為末

千金方乃調經仙藥也或加香附董氏集驗方婦人嫁

痛小戶腫痛也大黃一兩酒一男子偏墜作痛大

醋塗之乾則濕熱眩暈不可當者酒炒大黃為末

易梅師方小兒腦熱常欲閉目大黃一分水三合浸

也丹小兒腦熱常欲閉目大黃一分水三合浸

溪纂要上乾即再上暴赤目痛四物湯加大黃酒煎

姚和衆至寶方傳信適用方

火牙痛 口含水水一口以紙撚蘸大黃末 風熱牙

痛 紫金散治風熱積壅一切牙痛去口氣大有奇效好大黃瓶內燒存性為末早晚揩牙漱去都

下一家專貨此藥兩宮常以數千 風蟲牙痛 齦常

漸至崩落口臭極效大黃米泔浸軟生地黄各旋切一片合定貼上一夜即愈未愈再貼忌說話恐

引入風 口瘡糜爛 大黃枯礬等分為末 鼻中生

瘡 生大黃杏仁搗勻豬脂和塗○又方生大黃黃連各一錢麝香少許為末生油調搽 聖惠方

仙茅毒發 舌脹出口方 傷損瘀血 三因方雞鳴散

石壓傷及一切傷損凝積痛不可忍並以此藥推陳致新大黃酒蒸一兩杏仁去皮三七粒細研

和濟方治跌壓瘀血在內脹積大黃當歸等分炒

研每服四錢溫酒 打撲傷痕 瘀血滾注或作潮熱

服取下惡物愈 杖瘡腫痛 大黃末薑汁調塗

一夜黑者紫二夜紫者 杖瘡腫痛 大黃末醋調塗

白也 瀕湖集簡方 湯火傷灼 莊浪大

摘玄 醫方 金瘡煩痛 大黃末水調塗 湯火傷灼 黃生研

千金 凍瘡破爛 大黃末水調塗 湯火傷灼 黃生研

方 密調塗之不惟止痛又且戒癢此乃 灸瘡飛蝶 因

金山寺神人所傳方 洪邁夷聖志 灸瘡飛蝶 艾

灸訖火痂便退瘡內鮮肉片飛如蝶形而去痛不可忍是火毒也大黃朴硝各半兩為末水服取利

即愈 張 蠅螻咬瘡 大黃末塗 火丹赤腫 遍身者

果醫說 蠅螻咬瘡 大黃末塗 火丹赤腫 遍身者

水頻刷之 腫毒初起 大黃五倍子黃蘗等分為末

急救方 腫毒初起 大黃五倍子黃蘗等分為末

方便 癰腫焮熱 作痛大黃末醋調塗之 臛即易不遇

乳癰腫毒

全黃散用川大黃粉草各一兩為末好酒熬成膏投之以絹攤貼瘡上每時

先以溫酒服一大匙明日大風癩瘡大黃煨一角

取下惡物婦人經驗方為末每服方寸七空心溫酒下取出惡毒物如魚腦狀未下再服即取下如亂髮之蟲取盡乃服

造散十便良方

葉氣味酸寒無毒主治置薦下辟虱蟲

相感

商陸

本經下品

釋名逐莠

音逐

當陸

開寶

章柳

圖經

白昌

開寶

馬尾

廣雅

夜

呼本經時珍曰此物能逐蕩水氣故曰逐莠訛為商陸又訛為當陸比音訛為章柳或云枝枝相

值葉葉相當故曰當陸或云多當陸路而生也

集解

別錄曰商陸生成陽川谷如人形者有神恭

甚有毒保昇曰所在有之葉大如牛舌而厚脆赤

花者根赤白花者根白二月八月采根日乾頌曰

俗名章柳根多生於人家園圃中春生苗高三四

尺青葉如牛舌而長莖青赤至柔脆夏秋開紅紫

花作朶根如蘿蔔而長八九月采之爾雅謂之逐

莠廣雅謂之馬尾易經謂之覓陸數曰一種赤昌

苗葉絕相類不可服之有傷筋骨消腎之毒惟花

白年多者仙人采之作脯可下酒也時珍曰商陸

昔人亦種之為蔬取白根及紫色者擘破作畦栽

之亦可種子根苗莖並可洗蒸食或用灰汁煮過

亦良服丹砂乳石人食之尤利其赤與黃色者有

毒不可食按周憲王救荒本草云章柳幹粗似雞冠花幹微有線楞色微紫赤極易生植

根修治

取花白者根銀刀削去皮薄切以東流水浸兩宿漉出架無蒸以黑豆葉一重

商陸一重如此蒸之從午至亥取出
去豆葉暴乾剉用無豆葉以豆代之

氣味辛平有毒

別錄曰酸權曰甘有大毒忌犬肉

有毒症伏礪砂砒石雌黃拔錫恭曰赤者但可貼
腫服之傷人痢血不已殺人令人見鬼神張仲景
曰商陸以水服殺人杲曰商陸有毒陽中之
陰其味酸辛其形類人其用療水其效如神

主治水腫疝瘕痺癢除癰腫殺鬼精物經療胸中邪氣

水腫痿痺腹滿洪直疏五臟散水氣別錄瀉十種水

病喉痺不通薄切醋炒塗喉外良權通大小腸瀉

蠱毒墮胎協腫毒傳惡瘡明

發明弘景曰方家不甚用惟療水腫切生根雜鯉
魚煮作湯服道家乃散用之及煎釀服皆能

去尸蟲見鬼神其實子亦入神藥花名蕩花尤良
頌曰古方術家多用之亦可單服五月五日采根
竹筴盛掛屋東北角陰乾百日搗篩并華水調服
云神仙所秘法也時珍曰商陸苦寒沉也降也陰
也其性下行專於行水與大戟葶遂蓋異性而同
功胃氣虛弱者不可用方家治腫滿小便不利者
以赤根搗爛入射香三分貼於臍心以帛束之得
小便利即腫消又治濕水以指畫肉上隨散不成
文者用白商陸香附子炒乾出火毒以酒浸一夜
日乾為末每服二錢米飲下或以大蒜同商陸煮
汁服亦可其莖葉作蔬食亦治腫疾嘉謨曰古讚
云其味酸辛其形類人療水貼腫其效如神斯言
盡之

附方

舊九濕氣脚軟樟柳根切小豆大煮熱更

新六水氣腫滿外臺祕要用白商陸根去

瘡為度最效斗門方

皮切如豆大一盞以水

去

去

一升煮一升更以粒米一夫盞同煮成粥每日空

心服之取微利不得雜食○千金髓用白商陸六

兩取汁半合和酒半升看人與服當利下水取

○梅師方用白商陸一兩羊肉六兩水一斗煮取

六升去滓和葱腹中暴癥有物如石痛刺啼呼不

效作臍食之腹中暴癥治百日死多取商陸根

搗汁或蒸之以布藉腹上安藥勿覆

冷即易晝夜勿息孫真人千金方

下堅硬生商陸根汁一升杏仁一兩浸去皮搗如

泥以商陸汁絞杏泥火煎如錫每服棗許空腹熱

酒服以利下惡物產後腹大散用樟柳根三兩大

為度聖惠方

戟一兩半其遂炒一兩為末每服二三錢熱湯調

下大便宜利為度此乃主水聖藥也黎古保命集

五尸注痛腹痛脹急不得喘息上攻心胸旁攻兩

更互熨之取小兒痘毒小兒將痘發熱失表忽作

効肘后方

由毒氣與胃氣相搏欲出不得出也以商陸根和

葱白搗傳臍上斑止痘出方免無虞

耳卒執腫日再易聖濟錄

熨之冷即易立

愈三四壯良○一切毒腫再易之

外臺秘要

石癰如石堅硬不作膿者生商陸根搗擦之燥即

方瘡傷水毒章陸根搗炙布暴熨之

蕪花主治人心昏塞多忘喜卧取花陰乾百日搗

末日暮水服方寸匕乃卧思念所欲事即於眠中

狼毒 本經下品

釋名 時珍曰觀其名知其毒矣

集解 別錄曰狼毒生秦亭山谷及奉高二月八月采根陰乾陳而沉水者良弘景曰宕昌亦出

之乃言止有數畝地生蝮蛇食其根故為難得亦用太山者今用出漢中及建平云與防葵同根但置水中沉者是狼毒浮者是防葵俗用亦稀為療腹內要藥耳恭曰今出秦州成州秦亭原在二州之界秦隴地寒元無蝮蛇此物與防葵都不同類生處又別太山漢中亦不聞有陶說謬矣志曰狼毒葉似商陸及大黃莖葉上有毛根皮黃肉白以實重者為良輕者為力劣秦亭在隴西奉高是太山下縣陶云沉者是狼毒浮者是防葵此不足為信假使防葵秋冬采者堅實得水皆沉狼毒春夏采者輕虛得水皆浮且二物全別不可比類此與麻黃橋皮半夏實吳茱萸黃為六陳也保昇曰根

似玄參性浮虛者為劣也頌曰今陝西州郡及遼石州亦有之狀如馬志所說時珍曰狼毒出秦晉地今人往往以草藜為之誤矣見藺茹下也

根氣味 辛平有大毒大明曰苦辛有毒之才曰大豆為之使宜醋炒惡麥句薑

主治 欬逆上氣破積聚飲食寒熱水氣

惡瘡鼠瘻疽蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸 除胸下

積僻 治痰飲癥瘕亦殺鼠 合野葛納耳中治

聾 抱朴子

附方 舊四新六 **心腹連痛** 作脹用狼毒二兩附子半兩搗篩蜜丸梧子大一日服一

丸二日二丸三日三丸止又從一丸起至三丸止以瘥為度 **九腫心痛** 蟲

二蛙三風四悸五食六飲七冷八熱九氣也又治連年積冷流注心胸及落馬墮車瘀血中惡等證

九痛丸用狼毒炙香吳茱萸黃湯泡巴豆去心炒取霜乾薑炮人參各一兩附子泡去皮三兩為末煉

蜜丸梧子大每空服溫腹中冷痛水穀陰結心下酒下一丸和劑局方

按之鳴轉逆害飲食用狼毒三兩附子一兩旋覆花三兩搗末蜜丸梧子大每服三丸食前白湯下

日三服。陰疝欲死九縮入腹急痛欲死狼毒四肘後方兩防風二兩附子三兩燒以

蜜丸梧子大每服三九日兩脅氣結方同腹中一夜三度白湯下肘後方

切蟲病川狼毒杵末每服一錢用錫一皂子大沙糖少許以水化開卧時空腹服之次早即

下蟲也。乾濕蟲疥狼毒不拘多少搗爛以猪油集効方馬油調搽患處方睡勿以被

蒙頭恐藥氣傷面此維揚潘積年疥癩狼毒一兩氏所傳方隔氏經驗方

一半炒研輕粉三合水銀三錢以茶末少許於瓦器內以津液擦化為末同以清油浸藥高一寸三

日待藥沉油清遇夜不見燈火蘸油塗瘡上積年仍以口鼻於藥盞上吸氣取効末類方

乾癬生加搔之黃水出每逢陰雨即惡疾風瘡秦芄等分為末每服方寸匕聖惠方

溫酒下日一二服千金方

防葵

釋名房苑梨蓋經利茹吳音又名爵離方蓋農根香味似防風故名防葵

集解別錄曰防葵生臨淄川谷及嵩高太山二月生根根大如桔梗根中紅白六月花白七月

八月實白三月采根恭目此物亦稀有襄陽望楚

根香味似防風故名防葵

二月生根根大如桔梗根中紅白六月花白七月八月實白三月采根恭目此物亦稀有襄陽望楚

根香味似防風故名防葵

二月生根根大如桔梗根中紅白六月花白七月八月實白三月采根恭目此物亦稀有襄陽望楚

根香味似防風故名防葵

二月生根根大如桔梗根中紅白六月花白七月八月實白三月采根恭目此物亦稀有襄陽望楚

山東及興州西方有之興州者乃勝南者為隣蜀地也頌曰今惟出襄陽地他郡不聞也其葉似莢每莖三葉一本上葉莖中發一幹其端開花如葱花景天輩而色白六月開花即結實根似防風香味亦如之依時采者乃沉水今乃用枯朽狼毒當之極為謬矣時珍曰唐時臨西成州貢之蘇頌所說詳明可據

正誤

弘景曰防葵今用建平者本與狼毒同根猶如三建其形亦相似但置水中不沉爾而狼

毒陳久者亦不能沉矣數曰凡使防葵勿誤用狼毒緣真相似而驗之有異効又不能功須審之恐誤人疾其防葵在葵州沙土中生采得二十日便生處亦別藏器曰二物一是上品善惡不同形質又別陶氏以浮沉為別後人因而用之將以防葵破堅積為下品之物與狼毒同功今古因循遂無甄別殊為謬誤

根修治

數曰凡使須揀去艸末用甘草湯浸一宿漉出暴乾用黃精自然汁一二升拌了土

器中炒至汁盡用

氣味辛寒無毒

別錄曰其苦普曰神農辛寒桐君扁鵲無毒岐伯雷公黃帝辛苦無

毒權曰有小毒

主治疝瘕腸洩膀胱熱結溺不下欬逆濕

瘖癩癩驚邪狂走久服堅骨髓益氣輕身本經療五

臟虛氣小腹支膈臚脹口乾除腎邪強志中火者

不可服令人恍惚見鬼別錄久服主邪氣驚狂蘇恭主

疫癘氣塊膀胱宿水血氣瘤大如盤者悉能消散

治鬼瘡百邪鬼魅精怪通氣甄權

發明

時珍曰防葵乃神農上品藥黃帝岐伯桐君
雷公扁鵲吳普皆言其無毒獨別錄言中火
者服之令人恍惚見鬼陳延之小品方云防葵多
服令人迷惑恍惚如狂按難經云重陽者狂脫陽
者不見鬼是豈上品養性所宜乎是豈寒而無毒者
乎不然則本經及蘇恭所列者是防葵功用而別
錄所列者乃似防葵之狼毒功用非防葵也狼毒
之亂防葵其來亦遠矣不可不辨古方治蛇瘖驚
瘖大方中多用防葵皆是狼毒也

附方

舊一腫滿洪大防葵研末温酒服一乃圭至
新二傷寒動氣傷寒汗下後臍左
○肘癩狂邪疾上方同
防葵一兩木香黃芩柴胡各半兩每服半兩
水一盞半煎八分温服雲岐子保命集

狼牙
本經下品

釋名牙子

本經狼齒別錄狼子別錄犬牙普抱牙普支蘭
李當之弘景曰其牙似獸之齒牙故有諸名

集解

別錄曰狼牙生淮南川谷及宛句八月采根
暴乾中濕腐爛生衣者殺人普曰葉青根黃
赤六七月華八月實黑正月八月采根保昇曰所
在有之苗似蛇莓而厚大深綠色根黑若獸之牙
三月八月采根曰乾頌曰今江東汴東州郡多有
之時珍曰范子計然云出建康及三輔色白者善

根氣味苦寒有毒

別錄曰酸普曰神農黃帝苦有
毒桐君辛岐伯雷公扁鵲苦無

毒之才曰蕪荑為之使惡地榆棗肌

主治邪氣熱氣疥癬惡瘡瘡痔

去白蟲

本經治浮風瘙癢煎汁洗惡瘡殺腹臟一

切蟲止赤白痢煎服

本草綱目卷之二十一 藥部下品 狼牙

附方 新舊六 **金瘡出血** 狼牙草葉蒸搗 小便溺血

金粟狼牙草焙乾入蚌殼炒槐花百藥煎等分爲末每服三錢米泔空心調服亦治酒病 衛生易

方寸白諸蟲 狼牙五兩搗末蜜丸麻子大隔宿不食明且以漿水下合服盡即瘥

外臺 蟲瘡瘙癢 六月以前采狼牙葉以後用根生咬咀以木葉裹之燒火炮熟於瘡

上熨之冷即止 **小兒陰瘡** 狼牙草濃煮汁 **婦人陰**

癢 狼牙二兩蛇牀子三兩 婦人陰蝕瘡爛者狼牙煎水熱洗 外臺祕要

兩水四升煮取半升以筋纏綿浸湯 歷洗日四五遍 張仲景金匱玉函 **聾耳出汗** 狼

之 研末綿裹日塞 **毒蛇傷螫** 獨莖狼子根或葉搗爛 臘豬脂和塗立瘥 崔

氏射工中人 有瘡狼牙冬取根夏取葉搗汁 飲四五合并傳之 千金方

蘭茹 本經 下品

釋名離婁 別錄 **掘掘** 音結 **白者名草蘭茹** 時珍曰蘭茹本經

紫其根牽引之貌掘掘當作拮据 詩云千手拮据手口共作之狀也

集解 別錄曰蘭茹生代郡川谷五月采根陰乾黑頭者良普曰草高四五尺葉圓黃四四相當

四月華五月實黑根黃有汁亦黃色三月采葉四月五月采根弘景曰今第一出高麗色黃初斷時

汁出凝黑如漆故云漆頭次出近道名草蘭茹色白皆燒鐵爍頭今黑以當漆非真也 頌曰今河陽

淄齊州亦有之二月生苗葉似大戟而花黃色根如蘿蔔皮赤黃肉白初斷時汁出凝黑如漆三月

開淺紅花亦淡黃色不着子陶隱居謂出高麗者此近之又有一種草蘭茹色白古方兩用之故姚

僧坦治癰疽生惡肉有白蘭茹散傳之看肉盡便停止但傳諸膏藥若不生肉又傳黃芪散惡肉仍

不盡者可以漆頭赤皮蔞茹為散半錢和白酒蔞茹散三錢和傅之觀此則赤白皆可用也時珍曰蔞茹子計然云蔞茹出武都黃色者善草蔞茹出建康白色今亦處處有之生山原中春初生蔞高二三尺根長大如蘿蔔蔓菁壯或有岐出者皮黃赤肉白色破之有黃漿汁莖葉如大戟而葉長微露不甚尖折之有白汁抱莖有短葉相對團而出尖葉中出莖莖中分二三小枝二三月開細紫花結實如豆大一顆三粒相合生青熟黑中有白仁如續隨子之狀今人往往皆呼其根為狼毒誤矣狼毒葉似商陸大黃革根無漿汁

根氣味辛寒有小毒別錄曰酸普曰神農辛岐伯酸鹹有毒李當之大寒之才

日耳草為之醫門冬主治蝕惡肉敗瘡死肌殺疥蟲排膿

血除大風熱氣善忘不寐本經去熱痺破癥瘕除

息肉別錄

發明宗奭曰治馬疥尤善服食方用至少時珍曰素問治婦人血枯痛用烏鰂骨蔞茹二物丸

服方見烏鰂魚下王冰言蔞茹取其散惡血又齊書云郡王子隆年二十身體過充徐嗣伯合蔞茹丸服之自消則蔞茹亦可服食但要斟酌爾孟詵必効方治甲疽生干脚趾邊腫爛用蔞茹三兩黃芪二兩苦酒浸一宿以豬脂五合合煎取膏三合日三塗之即消又聖惠方治頭風旋駭鷓鴣頭丸中亦用之

附方舊二緩疽腫痛蔞茹一兩為散溫水傷寒咽

痛毒攻作腫其蔞茹瓜甲大納口嚼汁中焦熱痞

善忘不禁蔞茹二分耳草炙二兩消石為末每服一錢雞鳴時溫酒下以知為度聖惠方

瘡瘙癢 調傳之 多能鄙事

大戟 本經 下品

釋名 下馬仙 綱目 時珍曰 其根辛苦 戟人

仙言 利人甚速也 郭璞注 爾雅云 蕎 卽大戟也

集解 別錄曰 大戟生常山 十二月采根 陰乾 保昇

苦參皮 黃肉 黃白 五月采 苗二月八月采 根用 頌

曰 近道多有之 春生紅芽 漸長 叢高一尺 以來葉

似初生楊柳小團 三月四月開黃紫花 團圓似杏

花 又似蕪荑根 似細苦參 秋冬采 根陰乾 淮甸出

者 莖圓高三四尺 葉黃 葉至心亦如百合 苗江南

生者 葉似芍藥 時珍曰 大戟生平澤 甚多 直莖高

二三尺 中空 折之有白漿 葉長狹如柳葉 而不團

其稍葉密 積而上 杭州紫大戟為上 江南土大戟

次之 北方綿大戟 色白 其根皮柔 韌如綿 甚

峻利 能傷人 弱者服之 或至吐血 不可不知

根修治 數日 凡使勿用 附生者 誤服 令人洩氣 不

到與海芋葉 拌蒸 從巳至申 去芋葉 曬乾 用時珍

曰 凡采得 以漿水 煮軟 去骨 曬乾 用海芋葉 麻而

有毒 恐不 可用也

氣味 苦寒 有小毒 別錄曰 其大寒 權曰 苦辛 有大

肺損真氣 時珍曰 得棗 卽不損脾 之才 曰 反甘草

用 菖蒲 解之 恭曰 畏 昌蒲 蘆葦 芫 鼠屎 大明曰 赤小

豆 為之 使 惡薯 預 主治 蠱毒 十二水 腹滿 急痛 積聚 中風

皮膚 疼痛 吐逆 本經 頸腋 癰腫 頭痛 發汗 利大小便

別錄 瀉毒 藥泄 天行 黃病 溫瘧 破癥 結明 下惡 血癰

本草綱目 卷之二十三

塊腹內雷鳴通月水墮胎孕權治隱癰風及風毒

脚腫並煮水日日熱淋取愈蘇頌

發明成無已曰大戟甘遂之苦以泄水者腎所主也好古曰大戟與甘遂同為泄水之藥濕勝

者苦燥除之也時珍曰痰涎之為物隨氣升降無處不到入于心則迷竅而成癰痼妄言妄見入于肺則塞竅而成痰唾稠粘喘急皆冷入于肝則留伏蓄聚而成脅痛乾嘔寒熱往來入于經絡則麻痺疼痛入于筋骨則頸項胸背腰脇手足牽引隱痛陳無擇三因方並以控涎丹主之殊有奇効此乃治痰之本痰之本水也濕也得氣與火則凝滯而為痰為飲為涎為涕為癖大戟能泄臟腑之水濕其遂能行經隧之水濕白芥子能散皮裏膜外之痰氣惟善用者能收奇功也又錢仲陽謂腎為真水有補無瀉而復云痘瘡變黑歸腎一證用百祥膏下之以瀉腎非瀉腎也瀉其腑則臟自不實

至重者不過再服便瘥禁毒食一年永不復作此方出張尚客李絳兵部手集水氣腫

脹大戟一兩廣木香半兩為末五更酒服一錢半取大戟一兩廣木香半兩為末五更酒服一錢半

水腫腹大如鼓或遍身浮腫用空燒存性研末每錢匕

水腫腹大如鼓或遍身浮腫用浸過用大戟根苗蓋之瓦盆合定煮熟取棗無時食之棗盡決愈○又大戟散用大戟白牽牛木香

等分為末每服一錢以猪腰子一對批開搽末在內濕紙煨熟空心食之左則塌右則塌右

紫古活法機要**牙齒搖痛**大戟咬於痛處**中風發熱**大戟

四兩白酢漿一斗煮熟洗之寒乃止**千金方**

澤漆本經下品

釋名澤莖本經貓兒眼睛草綱目綠葉綠花草綱目五鳳

草

弘景曰是大戟苗生時摘葉有白汁故名澤漆亦醫人。餘見下

集解

別錄曰澤漆大戟苗也生太山川澤三月三日七月七日采莖葉陰乾大明曰此即大戟

花也川澤中有莖梗小花黃色葉似嫩菜五月采之頌曰今冀州郛州明州及近道皆有之時珍曰別錄陶氏皆言澤漆是大戟苗日華子又言是大戟花其苗可食然大戟苗洩人不可為菜今攷土宿本草及寶藏論諸書並云澤漆是貓兒眼睛草一名綠葉綠花草一名五鳳草江湖原澤平陸多有之春生苗一科分枝成叢柔莖如馬齒莧綠葉如苜蓿葉葉圓而黃綠頗似貓睛故名貓兒眼莖頭凡五葉中分中抽小莖五枝每枝開細花青綠色復有小葉承之齊整如一故又名五鳳草綠葉綠花草稻莖有白汁粘人其根白色有硬骨或以此為大戟苗者誤也五月采汁煮雄黃伏鍾乳結草砂據此則澤漆是貓兒眼睛草非大戟苗也今方家用治水蠱腳氣有効尤與神農本文相合自

愚按百祥惟用大戟一味大戟能行水故曰瀉其腑則臟自不實腑者膀胱也竊謂百祥非獨瀉腑正實則瀉其子也腎邪實而瀉其肝也大戟味苦瀉浸水色青綠肝膽之藥也故百祥膏又治噉而吐青綠水夫青綠者少陽風木之色也仲景亦云心下痞滿引脅下痛乾嘔短氣者十棗湯主之其中亦有大戟夫乾嘔脇痛非肝膽之病乎則百祥之瀉肝膽也明矣肝乃東方宜瀉不宜補况瀉青瀉黃皆瀉其子同一瀉也何獨腎只瀉腑乎索古老人治變黑歸腎證用宣風散代百祥膏亦是瀉子之意蓋毒勝火熾則水益涸風挾火勢則土受虧故津血內竭不能化膿而成青黑乾隔之證瀉其風火之毒所以救腎扶脾也或云脾虛腎旺故瀉腎扶脾者非也腎之真水不可瀉其真水之邪毒爾

附方

百祥膏治百祥症者宜下之

不黑者慎勿下紅芽大藥不以參麥陰乾藥水
 極軟去骨日乾復納原汁盡焙為末水丸粟米大
 每服一二十九丸研赤脂麻湯下○梁古活法機要
 棗變百祥丸治瘰癧變黑大便閉結用大戟一兩
 棗三枚水一盃同煮暴乾去大戟以治瘰癧
 棗肉焙丸服從少至多以利為度控涎丹
 在胸膈上下變為諸病或頸項背腰脅手足膝
 髀隱痛不可忍筋骨牽引鈞痛走易及皮膚麻痺
 似乎癱瘓不可誤作風氣風毒及瘡疽施治又治
 頭痛不可舉或睡中流涎或欬唾喘息或痰迷心
 竅並宜此藥數服痰涎自失諸疾尋愈紫大戟白
 甘遂白芥子微炒各一兩為末薑汁打麩糊丸梧
 子大每服七丸或二十九丸以津液嚥水腫喘急
 下若取利則服五六十九丸三因方
 瀋及水蠱大戟炒二兩乾薑炮半兩為散每
 服三錢薑湯下大小便利為度聖濟總錄
 腫滿水二升煮取七合頓服利下水二三升勿怪
 便

漢人集別錄誤以為大戟苗
 故諸家襲之爾用者宜審

莖葉氣味苦微寒無毒

別錄曰辛大明日冷有小
 毒之才曰小豆為之使惡

著黃主治皮膚熱大腹水

氣四肢面目浮腫丈夫陰

氣不足本經利大小腸明

自輕身別錄主蠱毒蘇止瘡

疾消痰退熱大明

發明時珍曰澤漆利水

功類大戟故人見其莖有
 戟然大戟根苗皆有毒洩

人而澤漆根硬不可用
 作菜食而利丈夫陰氣

盛亦無毒可
 沉者澤漆湯主之澤漆三

附方舊二肺欬上氣脈

以東流水五斗煮取一斗

五升去滓入半夏半升
 草黃芩人參桂心各三

兩煎取五升每服五合日

三服 張仲景 心下伏 瘕大如盃不得食者澤漆

金匱要畧方 搗篩蜜丸梧子大每服 二十腫水氣 澤漆十斤夏

丸日三服 葛洪肘後 於銀鍋內慢火熬如稀錫 入水一斗研汁約二斗 酒調下一匙以愈為度

入瓶內收每日空心溫 聖惠 水氣蠱病 生鮮貓 眼睛草晒乾為末棗肉丸

方 服覺腹中暖小便利 脚氣赤腫 行步脚痛貓兒眼

為度 乾神秘輻 等分每服一兩水五碗 煎三 牙齒疼痛 貓兒眼晴

爛湯泡取汁含漱吐 疰 衛生易簡方 男婦瘰癧 貓兒眼晴草一二

五日午時鍋內熬至一 瓶收每以椒葱槐枝煎 湯洗瘡淨乃搽此膏數次

甘遂

本經 下品

釋名甘藁 別錄 陵藁 吳普 陵澤 別錄 甘澤 吳普 重澤 別錄 苦澤

吳普 白澤 吳普 主田 別錄 鬼醜 吳普 時珍曰諸

集解 別錄曰甘遂生中山川谷二月采根陰乾(普

山江東比來用京口者大不相似赤皮者勝白皮

者都下亦有名草甘遂殊惡蓋贗偽者也(恭曰甘

遂苗似澤漆其根皮赤肉白作連珠實重者良草

甘遂乃是蚤休療體全別苗亦不同俗名重臺葉

似鬼白苧麻根皮白色大明曰西京者上沐滄吳

者次之形似和皮甘草節(頌曰今陝西江東亦有

之苗似澤漆莖短小而葉有汁 根皮赤肉白作連珠大如指頭

根修治 數日凡采得去莖於槐砧上細剉用生草

本草綱目卷之十一

甘遂

甘遂

甘遂

本草綱目卷之十七
黑汁乃漉出用東流水淘六七次令水清為度漉
出于土器中熬脆用之時珍曰今人多以麩煨熟
用以去其毒

氣味苦寒有毒

別錄曰其大寒普曰神農桐君苦
有毒岐伯雷公其有毒元素曰純

陽也之才曰瓜蒂為
之使惡遠志反甘草

主治大腹疝瘕腹滿面目浮

腫留飲宿食破癥堅積聚利水穀道

本經下五水散

膀胱多熱皮中痞熱氣腫滿別錄能瀉十二種水疾

去痰水甄權瀉腎經及隧道水濕脚氣陰囊腫墜痰

迷癩癩噎膈痞塞時珍

發明

宗奭曰此藥專于行水攻決為用元素曰味
苦氣寒苦性泄寒勝熱自達水氣所結之處

乃泄水之聖藥水結胸中非此不能除故仲景大
陷胃湯用之但有不可輕用時珍曰腎主水疑
則為痰飲溢則為腫脹其遂能泄腎經濕氣治痰
之本也不可過服但中病則止可也張仲景治心
下留飲與甘草同用取其相反而立功也劉河間
保命集云凡水腫服藥未全消者以甘遂末塗腹
透臍令滿內服甘草水其腫便去又王璆百一選
方云脚氣上攻結成腫核及一切腫毒用甘遂末
水調傅腫處即濃煎甘草汁服其腫即散二物相
反而感應如此清流韓誅病脚疾用此一服病去
七八再服而愈也

附方舊三新**水腫腹滿**

甘遂炒二錢二分黑牽牛
一兩半為末水煎時時呷

之普**膜外水氣**

餅燒熟食之取利
聖濟總錄

身面洪腫

其遂二錢生研為末以豬腎一枚分
為七齋入末在內濕紙包煨令熟食之

日一服至四五服當覺腹鳴腎水流注腰膝掣急四肢腫痛

小便利是其効也即上方加木香四錢每用二錢煨熟溫酒正水脹

急大小不利欲死甘草五錢半生半炒胭脂坏子

水煮令浮淡食之大小便利後用平胃小兒疳水

散加熟附子每以二錢煎服普濟方

珠子甘遂炒青橘皮等分末三歲用一錢以麥

芽湯下以利為度忌酸鹹三五日名水寶散

總微水蠱喘脹一字水半盞煎三五沸服不過十

服論聖水腫喘急大小便不通十棗丸用甘遂大

濟錄梧子大每服四十九丸侵晨熱湯下利去妊娠腫滿

黃水為度否則次午再服三因方

氣急少腹滿大小便不利已服豬苓散不瘥者用

太山赤皮甘遂二兩搗篩白蜜和丸梧子大每服

五十九丸得微下仍服豬苓散不下再心下留飲滿

服之豬苓散見豬苓下小品方

脈伏其人欲自利反快甘遂半夏湯用甘遂大者

三枚半夏十二個以水一升煮半升去滓入芍藥

五枚甘草一節水二升煮半升去滓以蜜半脚氣

井同煎八合頓服取利張仲景金匱玉函

腫痛腎臟風氣攻注下部瘡痒甘遂半兩木鼈子

四錢摻在內濕紙包煨熟空心食之米飲下服後

便俾兩足大便行後吃白粥二三日為妙本事後

方二便不通其遂末以生麩糊調傳臍中及丹田

大山赤皮其遂末一兩煉蜜和勻小便轉脾甘遂

分作四服日一服取利聖惠方

錢豬苓湯調下立疝氣偏腫甘遂苗香等分為末

通筆峯雜典方疝氣偏腫酒服二錢儒門事

親婦人血結渴婦人少腹滿如敦狀小便微難而不

此為水與血俱結在血室大黃二

六

兩甘遂阿膠各一兩水一升半煮
半升頓服其血當下張仲景方
膈氣哽噎

五錢南木香一錢為末壯者一錢
弱者五分水酒調下怪病奇方
痞證發熱

為末大人三錢小兒一錢冷蜜水
時服忌油膩

魚肉普濟方消渴引飲蒸餅丸
綠豆大每薄荷湯下二

九忌甘草癩痢心風及婦人心
丹治風痰迷心癩痢

二錢為末以猪心取三管血和藥
入猪心內縛定

紙裹煨熟取末入辰砂末一錢
分作四丸每服一

丸將心煎湯調下大便下惡
馬脾風病小兒風熱

不安謂之馬脾風甘遂麩包煮
一錢半辰砂水飛

二錢半輕粉一角為末每服一
字漿水少許滴油

一小點抄藥在上沉下去漿
麻木疼痛萬靈膏用

餅貼之內飲甘草湯一兩搗作
耳卒聾閉寸綿裹

耳卒自然通也冰類方

續隨子宋開

釋名千金子開千兩金華菩薩豆
日拒冬寶聯步

頌曰葉中出葉數數相續而生
故名冬月始長故名拒冬

集解頌曰續隨子生蜀郡處處
亦有之苗如大戟

一莖莖端生葉葉中多有北土
少苗如大戟初生

抽幹而生實青有殼人家園亭
中多種以為飾秋

種冬長春秀秋實時珍曰
莖中亦有白汁可結水銀

修治時珍曰凡用去殼取色白
者以紙包壓去油取霜用

將當作豬

莖

瘡之字上
當有惡之
字

氣味辛温有毒主治婦人血結月閉瘀血癥瘕疝

癰除蠱毒鬼疰心腹痛冷氣脹滿利大小腸下惡

滯物開寶積聚痰飲不下食嘔逆及腹內諸疾研碎

酒服不過三顆當下惡物蜀本宜一切宿滯治肺氣

水氣日服十粒瀉多以酸漿水或薄醋粥喫即止

又塗疥癬瘡大明

發明頌曰續隨下水最速然有毒損人不可過多
時珍曰續隨與大戟澤漆甘遂蓬蘽葉相似注
療亦相似其功皆長于利水
惟在用之得法亦皆要藥也

附方舊二小便不通者不過再服用續隨子去皮
新四

一兩銀丹半兩同少蜜搗作團瓶盛埋陰處臘月

至春末取出研蜜丸梧子六每服二三十九丸木通

湯下化破尤妙病急水氣腫脹聯步一兩去殼研

亦可旋合聖濟錄水氣腫脹壓去油重研分作

七服每治一人用一服丈夫生餅子酒下婦人荆

芥湯五更服之當下利至曉自止後以厚朴湯補

之頻喫益善忌鹽醋一百日乃不陽水腫脹續隨

復作聯步即續隨子也斗門方去油二兩大黃一兩為末酒水丸綠豆大涎積

塊續隨子三十枚膩粉二錢青黛炒一錢研勻糯

熟去皮核同嚼冷茶送下半夜後蛇咬腫悶欲死

取下積聚惡物為効聖濟錄蛇咬腫悶用重

臺六分續隨子仁七粒搗篩為散酒服方寸匕黑

兼唾和少許塗咬處立効崔元亮海上方

子疣贅續隨子熟時塗之

本草綱目草部卷之十七上

葉及莖中白汁主治剥人面皮去黥黥開寶傳白癩

癩湯明大搗葉傳蠟螯立止時珍

葇苳音浪蕩
本經下品

釋名天仙子圖經橫唐本行唐時珍曰葇苳一作蘭

狼放宕
故名

集解別錄曰葇苳子生海濱川谷及雍州五月采

子弘景曰今處處有之子形頗似五味核而

極小保昇曰所在皆有之葉似菘藍莖葉皆有細

毛花白色子殼作罌狀結實扁細若粟米大青黃

色六月七月采子日乾頌曰處處有之苗莖高三

三尺葉似地黃王不留行紅藍等而濶如三指四

月開花紫色莖莢有白毛五月結實有殼作罌子

狀如小石榴房中子至細青白色如粟米粒

凡使勿用蒼葇子其形相似只是微赤服之無効

時人多以雜之時珍曰張仲景金匱要畧言菜中

有水葇苳葉圓而光有毒誤食令人狂

亂狀如中風或吐血以甘草汁解之

子修治敷曰修事葇苳子十兩以頭醋一鎰煮乾

黑即是真者
晒乾搗篩用

氣味苦寒無毒別錄曰其權曰苦辛微熱有大毒

服之熱發以綠豆汁甘草并麻犀角並解之
敷曰有大毒誤服之衝人心大煩悶眼生暈火頌曰本

經言性寒後人多云大熱而史記淳于意傳云淄

川王美人懷子不乳飲以浪藥一搽以酒飲旋乳

浪菜當作
葇苳

肉痺拘急久服輕身使人健行走及奔馬強志益

力通神見鬼多食令人狂走本經癩癩狂風癩顛倒

拘攣別錄安心定志聰明耳目除邪逐風變白主瘰

癧取子洗晒隔日空腹水下一指捻亦可小便浸

令泣盡暴乾如上服勿令子破破則令人發狂藏

炒焦研末治下部脫肛止冷痢主蛙牙痛咬之蟲

出甄權燒熏蟲牙及洗陰汗大明

發明弘景曰入療顛狂方用然不可過劑久服自

無燥通神健行足為大益而仙經不見用權

曰以石灰清煮一伏時掬出去芽暴乾以附子乾

薑陳橘皮桂心厚朴為丸服去一切冷氣積年氣

刺甚溫暖也不可生服傷人見鬼拾鍼狂亂時珍

曰而芽方生其為物可知矣其若雲實防葵赤商

陸皆能令人狂惑見鬼者昔人未有發其義者蓋

此類皆有毒能使痰迷心竅蔽其神明以亂其視

聽故耳唐安祿山誘奚契丹飲以苜蓿酒醉而坑

之又嘉靖四十二年二月陝西遊僧武如香挾妖

術至昌黎縣民張柱家見其妻美設飯間呼其全

家同坐將紅散入飯內食之少頃舉家昏迷任其

奸污復將魔法吹入柱耳中柱發狂惑見舉家皆

是妖鬼盡行殺死凡一十六人並無血迹官司執

柱囚之十餘日柱吐痰二碗許聞其故乃知所殺

者皆其父母兄嫂妻子姊妹也柱與如香皆論死

世宗肅皇帝命榜示天下觀此妖藥亦是苜蓿之流

附方

舊二新卒發顛狂苜蓿三升為末以酒一升

如小豆三升日三服當見面急頭中如有蟲行額

及手足有赤豆處如此並是瘡候也未知再服取

盡神良 陳風痺厥痛 天仙子三錢炒大草烏頭

延之小品方 未糊丸梧子大以螺青為衣每服十九丸男

子菖蒲酒下女子芫花湯下 聖濟錄 久嗽不

止 有濃血莨菪子五錢淘去浮者煮令芽出炒研

食三枚○又方莨菪子三撮吞之日五六 年久呬

度光祿李承服之神驗 孟詵必効方 嗽至三十年者莨菪子木香熏黃等分為末以羊

脂塗青紙上撒末於上卷作筒燒烟熏吸之

崔行功 水腫蠱脹 方見獸部 積冷疰癖 不思飲食

纂要方 若子三分水淘去浮者大棗四十九個水三升煮

乾只取棗去皮核每空心食一個米飲下覺熱即

止 濟錄 聖水瀉日久 填滿札定燒存性每粟米飲服

一錢 聖惠方 冷痺痢下 莨菪子為末臘豬脂和丸綿裹

不過三度瘥○ 赤白下痢 瀉痛腸滑後重黃

孟詵必効方 為末每服一錢米 久痢不止 變種種痢兼脫肛莨

飲下 普濟方 淘去浮者煮令芽出晒乾炒黃黑色青州棗一升

去皮核醱醋二升同煮搗膏丸梧子大每服二十

丸食前米飲 聖惠方 腸風下血 莨菪煎用莨菪實一升暴

下 鍋中更以無灰酒二升搜之土火煎如稠錫即換

投酒度用酒可及五升即止慢火煎令可丸大如

梧子每旦酒飲通下三丸增至五七丸止若丸時

砂當作研

本草綱目卷之九 卷之三十三 卷之九十九

冷更作盡三合乃正有延壽可去甚効○備牙齒

急方用莨菪子數納乳中以噤封之亦効

宣落風痛莨菪子末綿裹咬風毒咽腫及瘰癧咽

腫水服莨菪子末而乳癰堅硬新莨菪子半匙

不得嚼破○石癰堅硬和傳瘡頭根即拔出

外臺祕要外臺祕要惡瘡似癩十年不愈者莨菪子打撲折傷羊脂

若子末傳之千金方惡犬咬傷莨菪子七枚吞之

根氣味苦辛有毒主治邪瘡疥癬殺蟲時珍

附方新瘡疾不止莨菪根燒灰水服一合惡癬有

蟲莨菪根搗爛蜜和趾間肉刺莨菪根搗汁塗之

云脚生肉刺視繫莨菪根謂繫于視帶上也日二上外臺祕

要惡刺傷人莨菪根水煮汁浸之冷箭頭不出萬

神應丹端午前一日不語尋見莨菪科根本枝葉

花實全好者道云先生你却在這裏道罷用柴灰

自東南起圍了以木楔子掘取根下周迴土次日

日未出時依前不語用鑽頭取出洗淨勿令雞犬

婦人見于淨室中以石日搗如泥丸彈于大黃丹

為衣以紙袋封懸高處陰乾遇有箭頭不出者先

以象牙末貼瘡口後用緋帛袋盛此藥放臍中

綿兜肚繫了當便出也張子和儒門事親方

雲實本經上品

釋名員實別錄雲英別錄大豆吳普馬豆圖經羊石子圖經苗

名草雲母唐本臭草圖經粘刺綱目時珍曰負亦音雲

羊石當作羊矢
其子肖之故也

集解

別錄曰雲實生河間川谷十月采暴乾晉曰
莖高四五尺大葉中空葉如麻兩兩相值
月花八月九月實十月采弘景曰處處有之子細
如葶藶子而小黑其實亦類葶藶若燒之致鬼未見
其法術恭曰雲實大如黍及大麻子等黃黑似豆
故名天豆叢生澤旁高五六尺葉如細槐亦如苜
蓿枝間微刺俗謂苗為草雲母陶云似葶藶者非
也保昇曰所在平澤有之葉似細槐花黃白色其
莢如豆其實青黃色大若麻子五月六月采實頌
曰葉如槐而狹長枝上有刺苗名臭草又名羊石
子草實名馬豆三月四月采苗十月采實過時即
枯落也時珍曰此草山原甚多俗名枯刺赤莖中
空有刺高者如蔓其葉如槐三月開黃花纍然滿
枝莢長三寸許狀如肥皂莢內有子五六粒正如
鵲豆兩頭微尖有黃黑斑紋厚
殺白仁咬之極堅重有腥氣

實修治

教曰凡采得粗搗相對擇淨
顆橡實蒸一日揀出暴乾

氣味辛溫無毒

別錄曰苦普曰神農辛
小溫黃帝鹹雷公苦

主治泄痢

腸辟殺蟲蠱毒去邪惡結氣止痛除寒熱本經消渴

別錄治瘡多用蘇頌

主下蠱膿血時珍

附方 新蠱下不止

雲實女萎各一兩桂半兩川烏頭二兩為末蜜丸梧子大每服

五丸水下日三服肘后方

花主治見鬼精多食令人狂走久服輕身通神明

本經殺精物下水燒之致鬼別錄

發明

時珍曰雲實花既能令人見鬼發狂
豈有久服輕身之理此古書之訛也

根主治骨哽及咽喉痛研汁嚥之

蓖麻 蓖音卑 唐本草

釋名 頌曰葉似大麻子形宛如牛蟬故名時珍曰

集解 恭曰此人間所種者葉似大麻葉而甚大結

似葎草而大厚莖赤有節如葎高丈餘子大如

花隨便結實殼上有刺狀類巴豆青黃斑褐夏采

莖葉秋采實冬采根日乾用時珍曰其莖有赤有

白中空其葉大如瓠葉葉凡五尖夏秋間極裏

抽出花穗纒纒纒黃色每枝結實數十顆上有刺攢

族如蠅毛而軟凡三四子合成一顆枯時劈開狀

如巴豆殼內有子大如豆殼有斑點狀如牛蟬再

去斑殼中有仁嬌白如續隨子仁有油可

作印色及油紙子無刺者良子有刺者毒

子修治 教曰凡使勿用黑天赤利子緣在地蔓上

斑凡使以鹽湯煮半日去皮取子研用時珍曰取

蓖麻油法用蓖麻仁五升搗爛以水一斗煮之有

沫撇起待沫盡乃止去水以沫

煎至點燈不炸滴水不散為度

氣味甘辛平有小毒時珍曰凡服蓖麻者一生不

能伏丹 主治水瘰以水研二十枚服之吐惡沫加

砂粉霜 至三十枚三日一服瘥則止又主風虛寒熱身體

瘡痒浮腫尸疰惡氣榨取油塗之唐研傳瘡瘻疥

癩塗手足心催生明大治瘰癧取子炒熟去皮每時

本草綱目卷之十七

三

遂口眼喎斜失音口噤頭風耳聾舌脹喉痺胸喘
脚氣毒腫丹瘤湯火傷鍼刺入肉女人胎衣不下
子腸挺出開通竅經絡能止諸痛消腫追膿拔

毒時珍

發明

震亨曰蓖麻屬陰其性善收能追濃取毒亦

外科要藥能出有形之滯物故取胎產胞衣
刺骨膠血者用之時珍曰蓖麻仁其辛有毒熱氣
味頗近巴豆亦能利人故下水氣其性善走能開
通諸竅經絡故能治偏風失音口噤口目喎斜頭
風七竅諸病不止于出有形之物而已蓋鵝鵝油
能引藥氣入內蓖麻油能拔病氣出外故諸膏多
用之一人病偏風手足不舉時珍用此油同羊脂
麝香鯨鯉甲等藥煎作摩膏日摩數次一月餘漸
復無服搜風化痰養血之劑三月而愈一人病手

臂一塊腫痛亦用蓖麻搗膏貼之一夜而愈一人
病氣鬱偏頭痛用此同乳香食塩搗協太陽穴一
夜痛止一婦產後子腸不收搗仁貼其丹田一夜
而上此藥亦用屢奏奇動但內服不可輕率爾或
言搗膏以助點于驚馬六畜舌根下即不
能食或點小內即下血死其毒可知矣

附方

舊九新半身不遂失音不語取蓖麻子油一
升酒一斗銅鍋盛油著酒

中一日煮之令熟細口目喎斜貼右石貼左即正
細服之
外臺秘要
○婦人患方用蓖麻子仁七七粒研作餅右嚼安
在左手心左嚼安在右手心即以銅盂盛熱水生
藥上卷即換五六次即正也
○一方用蓖麻子
仁七七粒巴豆十九粒麝香五分作餅如上用風
氣頭痛不可忍者乳香麝香仁等分搗餅隨左右
蓖麻油紙剪花貼太陽亦效
○又方蓖麻仁羊兩
棗肉丁五枚搗登紙止瘡筒入鼻中下清涕即

正八種頭風

芫麻子剛子各四十九粒去殼養

掛風處陰乾用時先將好末茶調成膏子塗蓋內

後將皮火燒前藥烟起以蓋覆之待烟盡以百沸

葱湯煎蓋內茶藥服之後以綿方鼻塞不通

粒大棗去皮一枚搗勻綿裹塞之一天柱骨倒小

日一易三十日聞香臭也聖濟錄

疴疾及諸病後天柱骨倒乃體虛所致宜生筋散

貼之木鼈子六箇去殼芫麻子六十粒去殼研勻

先包頭擦項上令熱以津五種風癩

調藥貼之鄭氏小兒方

仁二兩黃連一兩石膏水一盞文武火煮之乾即

添水三日兩夜取出黃連只用芫麻風乾勿令見

日以竹刀每個切作四段每服二十段食後荆芥

湯下日二服終身忌食豆記之必腹脹死

寶鑑舌止出血

仁四十粒去殼研油金絲上作捲燒烟熏之未退

再熏以愈為度有人舌腫出口外一村人用此法

而愈驗良方急喉痺塞

烟熏吸即通或只取油咽中瘡腫

一錢同研新汲水服之連進二三服効○三因方

用芫麻仁荆芥穩等分為末蜜丸綿包嚼嚥之

金水氣脹滿服盡日中當下青黃水也或云壯人

止可服五粒脚氣作痛蘇合香丸貼足心痛即止

也外臺秘要小便不通

芫麻子去殼炒熟揀去者食之須多服

喘咳嗽見効終身不可食炒豆

生下胞

崔元亮海上集驗方取芫麻子七粒去殼

研膏塗脚心若胎及衣下便速洗去不爾

則子腸出即以此膏塗頂則腸自入也○臍后方
云產難取蓖麻子十四枚每手各把七枚須臾立
下子宮脫下入仍以蓖麻子仁十四枚研膏塗頂
也
心即入盤腸生產同上方
催生下胎胎不拘生胎死
巴豆一個麝香一分研貼臍中并足心○一切毒
又下生胎一月一粒溫酒吞下集簡方

腫痛不可忍蓖麻子仁搗
時后方
癘風鼻塌手指攣曲節
漸至斷落用蓖麻子一兩去皮黃連一兩到豆大
以小瓶子入水一升同浸春夏二日秋冬五日後
取蓖麻子一枚劈破面東以浸藥水吞之漸加至
四五枚微利不妨瓶中小水盡更添兩月後喫大蒜
猪肉試之如不發是効也若發動小兒丹瘤
再服直候不發乃止
杜壬方

去皮研入麩一匙水調
之甚効
瘰癧結核
皮每睡時服
二三枚取効一生不可
喫炒豆
阮氏經驗方
瘰癧惡瘡
及軟癬用白膠
化去滓以蓖麻子六十四個去殼研膏溶膠投之
覺勻入油半匙頭至點水中試軟硬添減膠油得
所以緋帛量瘡大小攤貼一膏
肺風面瘡
起白屑
可治三五癬也
儒門事親

赤瘡用蓖麻子仁四十九粒白果膠棗各三粒瓦
松三錢肥皂一個搗為丸洗面用之良
吳旻扶
壽
方
面上雀斑
用羊髓和勻夜夜傳之
摘玄方
髮黃不黑
蓖麻子仁香油煎焦去滓
耳卒聾閉
蓖
子一百個去殼與大棗十五枚搗爛入乳小兒乳
汁和丸作錠每以綿裹一枚塞之覺耳中熱為度
一日一易二十湯火灼傷
蓖麻子仁蛤粉等分研
日瘡
千金方
水調塗之○鍼刺入肉
觀傷處傳之類看若見刺

古今錄驗
本堂編
卷之十三
三十一

出即拔去恐藥緊擊出好肉或加**竹木骨哽**子仁

白梅肉同研尤好衛生易簡方

一兩凝水石二兩研勻每以一捻置舌根噙嚥自然不見○又方蓖麻油紅麩等分研細沙糖丸皂

子大綿裹含**雞魚骨哽**蓖麻子仁研爛入百藥煎

嘔痰出大良研丸彈子大井花水化下

半丸即下**惡犬咬傷**蓖麻子五十粒去殼以井花研膏

袖珍先以鹽水洗吹痛處乃貼此膏

葉氣味有毒主治脚氣風腫不仁蒸搗裹之日二

三易即消又油塗炙熱熨額上止鼻衄大驗蘇恭治

痰喘欬嗽時珍

附方新**齶喘痰嗽**儒門事親方用九尖蓖麻葉三錢入飛過白礬二錢以猪肉四

兩薄批摻藥在內荷葉裹之文武火煨熟細嚼以白湯送下名九仙散○普濟方治欬喘涎喘不問

年深日近用經霜蓖麻葉經霜桑葉御米殼蜜炒各一兩為末蜜丸彈子大每服一九白湯化下日

一服名無憂丸

附錄博落迴拾遺藏器曰有大毒主惡瘡櫻根瘤

和百丈青雞桑灰等分為末傅之蠱毒精魅溪毒瘡癩有法生江南山谷莖葉如蓖麻莖中空吹之作聲

如博落迴折之有黃汁藥人立死不可輕用入口

常山本經**蜀漆**同上

釋名恒山吳普**互草**本經**鷄屎草**日華**鴨屎草**日華時珍

也恒山乃北岳名在今定州常山乃郡名亦今真定豈此藥始產于此得名歟蜀漆乃常山苗功用

相同今併為一

集解

別錄曰常山生益州川谷及漢中二月八月
采根陰乾又曰蜀漆生江林山川谷及蜀漢
中常山苗也五月采葉陰乾弘景曰常山出宜都
建平細實黃者呼為雞骨常山川之最勝蜀漆是
常山苗而所出又異者江林山即益州江陽山名
故是同處爾彼人采得綵結作丸得時燥者佳恭
曰常山生山谷間莖圓有節高者不過三四尺葉
似茗而狹長兩兩相當二月生白花青萼五月結
實青圓三子為房其草暴燥色青白堪用若陰乾
便黑爛鬱壞矣保昇曰今出金州房州梁州中江
縣樹高三四尺根似荆根黃色而破五六月米葉
名蜀漆也李含光曰蜀漆是常山莖八月九月采
之頌曰今汴西淮浙湖南州郡亦有之並如上說
而海州出者葉似楸葉八月有花紅白色子碧色
似山棟子而小今天台山出一種草名上常山苗
葉極其人用為藥味甘味如蜜又名蜜香草性涼益

人非此常山也

修治

敷曰采時連根苗收如用莖葉臨時去根以
甘草細剉同水拌濕蒸之臨時去甘草取蜀
漆細剉又拌甘草水勻再蒸日乾用其常山凡用
以酒浸一宿瀉出日乾熬搗用時珍曰近時有酒
浸蒸熟或瓦炒熟者亦不甚吐人又有醋制者吐人

常山氣味苦寒有毒

別錄曰辛微寒普曰神農岐
伯苦桐君辛有毒李當之大
寒權曰苦有小毒柄曰得甘草吐瘡之才
日畏王札大明曰忌葱菜及菘菜伏砒石

主治傷寒熱熱發溫瘧鬼毒胸中痰結吐逆
本經療鬼蠱

往來水脹洒洒惡寒鼠瘻
別治諸瘡吐痰涎治項

下瘤瘻
甄權

蜀漆氣味辛平有毒

別錄曰微溫權曰苦有小毒
元素曰辛純陽炳曰桔梗為

之使之才曰枯樓
為之使惡貫眾

主治瘧及欬逆寒熱腹中癥堅

痞積聚邪氣蠱毒鬼疰

本經療胸中邪結氣吐去之

錄別治鬼瘡多時溫瘡寒熱下肥氣甄權破血洗去腥

與苦酸同用導膽邪

元素

發明

敷曰蜀漆春夏用莖葉秋冬用根老人久病
切忌服之頌曰常山蜀漆為治瘧之最要

可多進令人吐逆震亨曰常山性暴悍善驅逐能
傷真氣病人稍近虛怯不可用也外臺乃用三兩
作一服殊昧雷公老人久病切忌之戒時珍曰常
山蜀漆有劫痰截瘧之功須在發散表邪及提出

陽分之後用之得宜神効立見用失其法真氣必
傷夫瘧有大經瘧五臟瘧痰濕食積瘧疫鬼邪諸

瘧須分陰陽虛實不可一藥論也常山蜀漆生用

則上行必吐酒蒸炒熟用則氣稍緩少用亦不致

吐也得其草則吐得大黃則利得烏梅鯪鯢甲則

入肝得小麥竹葉則入心得秫米麻黃則入肺得

龍骨附子則入腎得草果檳榔則入脾蓋無痰不

作瘧二物之功亦在驅逐痰水而已楊士瀛直指

方云常山治瘧人皆薄之瘧家多蓄痰涎黃水或

停瀦心下或結滯脅間乃生寒熱法當吐痰逐水

常山豈容不用水在上焦則常山能吐之水在脇

下則常山能破其滯而下其水但須行血藥品佐

助之必收十全之功其有純熱發瘧或蘊熱內實

之證投以常山大便秘滴而下似泄不泄者須用

北大黃為佐泄利數行然後獲愈也又待制李壽

云嶺南瘴氣寒熱所感邪氣多在營衛皮肉之間

附方

舊三新截瘧諸湯外臺秘要用常山三兩漿
水三升浸一宿煎取一升

欲去皮膚毛孔中瘴氣根本非常山不可但
性吐人惟以七寶散冷服之即不吐且驗也

欲發前頓服取吐○肘后方用常山一兩末

百粒水六升煮三升分三服先夜未發臨發時服

盡○養生主論王隱者驅瘧湯云子用此四十年

奇効不能盡述切勿加減萬一無吐者常山酒煮

晒乾知母貝母草果各一錢半水一鍾

半煎半熟五更熱服渣以酒浸發前服

肘后方用常山一兩酒一升漬二三日分作三服

平旦一服少頃再服臨發又服或加其酒煮服之

○宋俠經心錄醇醪湯治間日瘧支太醫云乃桂

廣州方也甚驗恒山一錢二分大黃二錢半炙甘草

一錢二分水一盞半煎減半醇發日五更溫服

再以水一盞煎減半日醪未發時溫服○虞搏醫

學正傳治久瘧不止常山一錢半檳榔一錢丁香

五分烏梅一個酒一盞浸一宿五更飲之一服便

止求不再

截瘧諸丸 千金方恒山丸治數年不瘧

發如神 恒山三兩研末雞子白和丸梧子大瓦器煮熟

更二服天明一服發前一服或吐或否即止○肘

後丹砂恒山搗末三兩真丹一兩研白蜜和杵

百下丸梧子大先發時三九少頃再服三九臨時

服三九酒下無不斷者○曾世榮活幼心書黃丹

丸治大小久瘧恒山二兩黃丹半兩烏梅連核瓦

焙一兩為末糯米粉攪丸梧子大每服三五丸

涼酒下隔一服平旦一服午後方食○葛洪

肘後方用恒山三兩知母一兩甘草半兩搗末蜜

丸梧子大先發時服十丸次服七丸後服五六丸

以瘧為度○和劑局方瞻仰丸治一切瘧常山四

兩炒存性草果二兩炒存性為末薄糊丸梧子大

每卧時冷酒服五十丸五更再服忌鷄羊熱物○

又勝金丸治一切瘧胃膈停痰發不愈者常山八

兩酒浸蒸焙檳榔二兩生研末糊丸梧子大如上

法服○集簡方二聖丸治諸瘧不拘遠近大小難

骨恒山雞心檳榔各一兩生研錢甲煨焦一兩

辛為末糯米粉糊丸菜豆大黃丹厥陰肝瘧寒多熱

為衣每服三五丸如上法服

如死狀或少腹滿小便如膿不問久近不吐不泄
如神恒山一兩醋浸一夜瓦器煮乾每用二錢水

一盞煎半盞五更冷
太陰肺瘧 痰聚胸中病至令
服趙真人濟急方 痰聚胸中病至令

熱間善驚如有所見恒山三錢甘草半錢秋米三
十五粒水二鍾煎一鍾發日早分三次服 千金

方少陰腎瘧 凄凄然寒手足寒腰脊痛大便難目
眇眇然恒山二錢半鼓半兩烏梅一

錢竹葉一錢半葱白三根水一升
半煎一升發前分三服 千金方 **扎瘧獨寒** 不熱

漆散用蜀漆雲母煨三日夜龍骨各二錢為末每
服半錢臨發日且一服發前一服酢漿水調下温

瘧又加蜀漆一錢 ○ **牡瘧獨熱** 不冷者蜀漆一錢
張仲景金匱要畧 半甘草一錢麻黃

二錢牡蠣粉二錢水二鍾先煎麻黃蜀漆去沫入
藥再煎至一鍾未發前温服得吐則止 王肅外

臺秘 **温瘧熱多** 恒山一錢小麥三錢淡竹葉二
錢水煎五更服甚良 藥性論 三

十年瘧 肘后方治二十年瘧及積年瘧瘧
黃連各一兩酒三升漬一宿以瓦釜煮取

一升半發日早服五合發時再服熱當吐冷當利
無不瘥者 ○ 張文仲備急方用恒山一兩半龍骨

五錢附子炮二錢半大黃一兩為末雞子黃和丸
梧子大未發時五九將發時五九白湯下支太醫

云此方神驗 **瘧瘧寒熱** 劉長春經驗方常山一寸
無不斷者 草果 一枚熱酒一盞浸一

夜五更望東服之蓋卧酒醒即愈 ○ 談楚翁試驗
方用常山檳榔甘草各二錢黑豆一百粒水煎服

之乃彭司寇所傳 ○ 葛稚川肘后方用常山黃連
香豉各一兩附子炮七錢搗末蜜丸梧子大空腹

飲服四九欲發時 **妊娠瘧疾** 酒蒸常山石膏煨各
三九至午後乃食 一錢烏梅炒五分其

草四分水一盞酒一盞浸一夜 **百日兒瘧** 水鑑仙
平日温服 姚僧坦集驗方 人歌曰

瘧是邪風寒熱埃直須術治免成空常山刻作人
形狀釘在孩兒生氣官如金生人金生在巳即釘

本草綱目卷之七十一 瘧疾 三十一

已上木生人釘寒上夫生人
釘寅上水土生人釘申土
漆炒二錢左顧生人釘申土
煎服當吐痰而愈名千金方
甘草各一兩水五升煮取一升去滓入蜜
二合溫服七合取吐不吐更服
千金方

附錄杜莖山
圖經頌曰葉味苦寒主溫瘴寒熱
絞汁服吐出血延甚效生宜用
高四五尺葉
俗苦蕒菜秋有實如枸杞子大而白土

紅山
頌曰葉甘微寒無毒主骨節疼痛勞熱瘴瘧
而小無毛秋生白花如粟粒不實福州生者作細
藤伴芙蓉葉其葉上青下白根如葛頭土人取根
米泔浸一宿以清水再浸一宿炒黃為末每服一
錢水一盞生薑一片同煎服亦治勞瘴甚效時珍
曰杜莖山即土恒山土紅山
又杜莖山之類故並附之

釋名山葱
別錄葱苒同葱蒨
首菴葱蒨
首菴蘆
首菴葱葱
網目鹿葱時珍曰黑色曰黎其蘆有黑皮暴之故名
蔥葱南人謂之鹿葱

集解
別錄曰藜蘆生太山山谷三月采根陰乾
下極侶葱而多毛用之止剔取根微炙之保昇曰
所在山谷皆有葉侶鬱金秦艽藜蘆等根若龍膽
莖下多毛夏生冬凋八月采根頌曰今陝西山南
東西州郡皆有之遼州均州解州者尤佳三月生
苗葉侶初出攪心又侶車前莖侶葱白青紫色高
五六寸上有黑皮暴莖侶櫻皮有花肉紅色根侶
馬勝根長四五寸許黃白色二月三月采根陰乾
此有二種一種水藜蘆莖葉大同只是生在水

藜蘆
本經下品

釋名山葱
別錄葱苒同葱蒨
首菴葱蒨
首菴蘆
首菴葱葱

網目鹿葱時珍曰黑色曰黎其蘆有黑皮暴之故名
蔥葱南人謂之鹿葱

集解
別錄曰藜蘆生太山山谷三月采根陰乾
下極侶葱而多毛用之止剔取根微炙之保昇曰
所在山谷皆有葉侶鬱金秦艽藜蘆等根若龍膽
莖下多毛夏生冬凋八月采根頌曰今陝西山南
東西州郡皆有之遼州均州解州者尤佳三月生
苗葉侶初出攪心又侶車前莖侶葱白青紫色高
五六寸上有黑皮暴莖侶櫻皮有花肉紅色根侶
馬勝根長四五寸許黃白色二月三月采根陰乾
此有二種一種水藜蘆莖葉大同只是生在水

本草綱目卷之二十七
四十四

本經卷之二十一
溪澗石上根鬚百餘莖不中藥用今用者名葱白
藜蘆根鬚甚少只是三二寸莖生高山者為佳均
州土俗亦呼為鹿葱范子
計然云出河東黃白者善

根修治
雷曰凡采得去頭用糯米泔
汁煮之從已至未晒乾用

氣味辛寒有毒
別錄曰苦微寒普曰神農雷公辛
有毒岐伯鹹有毒李當之大寒大

毒扁鵲苦有毒之才曰黃連為之使反細辛芍藥
人參沙參紫參丹參苦參惡大黃時珍曰畏葱白
服之吐不止
飲葱湯即止

主治 蠱毒欬逆洩痢腸辟頭瘍疥癢惡瘡殺諸蟲

毒去死肌
經本 療噦逆喉痺不通鼻中息肉馬刀爛

瘡不入湯用
錄別 主上氣去積年膿血泄痢 吐上

膈風涎暗風癩病小兒齕鼻痰疾
未治馬疥癩

宗 奠

發明
頌曰藜蘆服錢七一字則惡吐人又用通頂
令人噦而別本云治噦逆甚效未詳時珍曰

噦逆用吐藥亦反胃用吐法去痰積之義吐藥不
一常山吐瘧痰瓜丁吐熱痰烏附尖吐濕痰萊菔

子吐氣痰藜蘆則吐風痰者也按張子和儒門事
親云一婦病風癩自六七年得驚風後每一二年

一作至五七年五七作三十七歲至四十歲則日作
或甚至一日十餘作遂昏痴健忘求死而已值歲

大饑采百草食于野中見草若葱狀采歸蒸熟飽
食至五更忽覺心中不安吐涎如膠連日不止約

一二手汗出如洗甚昏困三日後遂輕健病去食
進百脉皆和以所食葱訪人乃蔥葱苗也即本草

藜蘆是矣圖經言能吐風病此亦偶得吐法耳我
朝 和王妃劉氏年七十病中風不省人事牙

本草綱目卷之二十一
關紫閉群醫束手先考太醫吏日月池翁診視藥
不能入自午至子不獲已打去一齒濃煎藜蘆湯
灌之少頃噫氣一声遂吐痰而甦調
理而安藥弗瞑眩厥疾弗瘳誠然

附方

舊六新

諸風痰飲

黎蘆十分鬱金一分為末
每以一字溫漿水一盞和

服探吐○

中風不省

牙關緊急者黎蘆一兩去苗
頭濃煎防風湯浴過焙乾切

炒微褐色為末每服半錢小兒減半溫水調

灌以吐風涎為効未吐再服

簡要濟衆
中風

不語

喉中如曳鋸口中涎沫取黎蘆一分天南星
一箇去浮皮于臍上剉一坑納入陳醋二椀

斗四面火逼黃色研為末生麵丸小

諸風頭痛

黎蘆一莖日乾研末入麝香少許吹鼻○又

久瘡

痰瘡積瘡

痰多

不食欲吐不吐黎蘆末半錢

保命集

灸各一兩巴豆二十五枚熬黃研末蜜丸小豆大
每空心服一丸未發時一丸臨發時又服一丸勿
用飲食

結聚

如駭駭不去者巴豆半兩去皮心炒擣如泥
黎蘆炙研一兩蜜和擣丸麻子大每吞一二

丸○

身面黑痣

黎蘆灰五兩水一大碗淋汁銅器
重湯煮成黑膏以針微刺破點之

不過三次

鼻中息肉

黎蘆三分雄黃一分為末蜜
和點之每日三上自消勿點

兩畔○

牙齒虫痛

黎蘆末內入孔中勿
吞汁神効千金翼

黎蘆末猪脂調

頭生蟣虱

黎蘆末搽
直指

塗之

反花惡瘡

惡肉反出如
米黎蘆末猪

日夜避風効

疥癬虫瘡

黎蘆末生
油塗

脂和傳日三五

羊疽瘡痒

黎蘆

上

聖濟錄

聖濟錄

二分附子八分爲未傳之誤吞水蛭黎蘆炒爲末水服一錢必
吐出自出也陶隱居方
生堂方德

附錄山慈石別錄有名未用曰苦平無毒主女子

有衣一名烏蓼一名**參果根**又曰苦有毒主鼠瘻生百餘根根

連一名烏蓼一名**馬腸根**宋圖經頌曰苦辛寒有

鼠莖一名鹿蒲
生秦州葉似桑二月
采葉五月六月采根

木黎蘆拾遺

釋名黃黎蘆綱目鹿驪

集解藏器曰陶弘景注漏蘆云一名鹿驪山南人

乃樹生如茱萸樹高二尺有毒時珍曰鹿驪人

呼爲黃黎蘆小樹也葉如櫻桃葉狹而長多皺文

四月開細黃花五月
結小長子如小豆大
氣味苦辛温有毒主治疥癬殺蟲藏器

附子本經下品

釋名其母名烏頭時珍曰初種爲烏頭象烏之

如子附母也烏頭如芋魁附子如芋子蓋一物也

別有草烏頭白附子故俗呼此爲黑附子則烏頭

以別之諸家不分烏頭有川草
兩種皆混雜註解今悉正之

集解別錄曰附子生犍爲山谷及廣漢冬月采爲

根附子八月采八角者良烏頭四月采春時莖初

生有腦頭如烏鳥之頭故謂之烏頭有兩歧其蒂

與青心

狀如牛角者名烏喙取汁煎為射藥天雄似附子
細而長乃至三四寸側子即附子邊角之大者並
是同根而本經附子出犍為天雄出少室烏頭出
朗陵分生三處當各有所宜也今則無別矣恭曰
天雄附子烏頭並以蜀道綿州龍州者佳俱以八
月采造餘處雖有造得者力弱都不相似江南來
者全不堪用大明曰天雄大而長少角刺而實附
子大而短有角平穩而實烏喙似天雄烏頭次于
附子側子小於烏頭連聚生者名為虎掌並是天
雄一裔子母之類氣力乃有殊等即宿根與嫩者
爾數曰烏頭少有莖苗身長而烏黑少有旁尖烏
喙皮上蒼色有尖頭大者孕八九箇周圍底陷黑
如烏鐵天雄身全矮無尖周匝四面有附子孕十
一箇皮蒼色側子只是附子旁有小顆如棗核者
木鼈子是喙附烏雄側中毗患者不入藥用保昇
曰正者為烏頭兩岐者為烏喙細長三四寸者為
天雄根旁如芋散生者為附子旁連生者為側子
五物同出而異名苗高二尺許葉似石龍芮及艾
宗輿曰五者皆一物但依大小長短以象而名之
爾頌曰五者今並出蜀土都是一種所產其種出
于龍州冬至前先將陸田耕五七遍以豬糞糞之
然後布種逐月耘耔至次年八月後方成其苗高
三四尺莖作四稜葉如艾其花紫碧色作穗其實
細小如桑椹狀黑色本只種附子一物至成熟後
乃有四物以長二三寸者為天雄割削附子旁尖
角為側子附子之絕小者亦名側子元種者為烏
頭其餘大小者皆為附子以八角者為上綿州彰
明縣多種之惟赤水一鄉者最佳然收采時月與
本草不同謹按本草冬采為附子春采為烏頭博
物志言附子烏頭天雄一物也春秋冬夏采之各
異而廣志云奚毒附子也一歲為側子二年為烏
喙三年為附子四年為烏頭五年為天雄今一年
種之便有此五物豈今人種蒔之法用力倍至故
爾繁盛乎時珍曰烏頭有兩種出彰明者即附子
之母今人謂之川烏頭是也春未生子故曰春采
為烏頭冬則生子已成故曰冬采為附子其天雄

烏喙側子皆是生子多者因象命名若生子少及
 獨頭者即無此數物也其產江左山南等處者乃
 本經所列烏頭今人謂之草烏頭者是也故曰其
 汁煎為射兩陶弘景不知烏頭有二以附子之烏
 頭註射兩之烏頭遂致諸家疑或而雷敷之說尤
 不近理宋人楊天惠著附子記甚悉今撮其要讀
 之可不辯而明矣其說云綿州乃故廣漢地領縣
 八惟彰明出附子彰明領鄉二十惟赤水廬水昌
 明會昌四鄉產附子而赤水為多每歲以上田熟
 耕作壟取種於龍安龍州齊歸木門青埏小坪諸
 處十一月播種春月生苗其莖類野艾而澤其葉
 類地麻而厚其花紫瓣黃莖長苞而圓七月采者
 謂之早水拳縮而小蓋未長成也九月采者乃佳
 其品凡七本同而未異其初種之化者為烏頭附
 烏頭而旁生者為附子又左右附而偶生者為鬲
 子附而長者為天雄附而尖者為天錐附而上出
 者為側子附而散生者為漏藍子皆脈絡連貫如
 子附母而附子以貴故專附名也凡種一而子六
 七以上則皆小種一而子二三則稍大種一而子
 特生則特大附子之形以蹲坐正節角少者為上
 有節多鼠乳者次之形不正而傷缺風皺者為下
 本草言附子八角者為良其角為側子之說甚謬
 矣附子之色以花白者為上鐵色者次之青綠者
 為下天雄烏頭天錐皆以豐實盈握者為勝漏藍
 側子則園人以乞役夫不足數也謹按此記所載
 漏藍即雷敷所謂木鼈子大明所謂虎掌者也其
 鬲子即烏喙也天錐即天雄之類
 醫方亦無此各功用當相同爾

修治

保昇曰附子烏頭天雄側子烏喙采得以後生
 使乾又法以米粥及糟麴等淹之並不及前法頌
 曰五物收時一處造釀其法先於六月內造大小
 麴麴未采前半月用大麥煮成粥以麴造醋候熟
 去糟其醋不用太酸酸則以木解之將附子去根
 鬚於新甕內淹七日日攪一遍撈出以疎篩攤之
 令生白衣乃向慢風日中晒之百十日以透乾為

度若猛日則皺而皮不附肉時珍曰按附子記云此物最多不能常熟或種美而苗不茂或苗秀而根不充或已釀而腐或已曝而燥若存神物陰為之者故園人常禱於神曰為藥取其廉法用醋醃安密室中淹覆蒲月乃發出眼乾方出藥時其大有如拳者已定輒不盈握故及一兩者極難得土人云但得半兩以上者皆良蜀人餌者少惟秦陝閩浙人宜之然秦人纔市其下者閩浙纔得其中者其上品則皆貴人得之矣○弘景曰凡用附子烏頭天雄皆熟灰微炮令析勿過焦惟薑附湯生用之俗方每用附子須甘草人參生薑相配者正制其毒故也教曰凡使烏頭宜文武火中炮令皺拆擊破用若用附子須底平有九角如鐵色一箇重一兩者即氣全勿用雜木火只以柳木灰火中炮令皺拆以刀刮去上孕子并去底尖擊破於屋下干地上掘一土坑安之一宿取出焙乾用若製者生去皮尖底薄切以東流水并黑豆浸五日夜漉出日中曝用震亨曰凡烏頭天雄須用童子小便浸透煮過以殺其毒并助下行之力入鹽少許尤好或以小便浸二七日自揀去壞者以竹刀每箇切作四片并水淘淨逐日換水再浸七日晒乾用時珍曰附子生用則發散熟用則峻補生用者須如陰制之法去皮臍入藥熟用者以水浸過炮令發拆去皮臍乘熟切片再炒令內外俱黃去火毒入藥又法每一箇用甘草二錢鹽水薑汁童尿各半盞同煮熟出火毒一夜用之則毒去也

氣味辛溫有大毒別錄曰其大熱普曰神農辛岐有大毒元素曰太辛大熱氣厚味薄可升可降陽中之陰浮中沉無所不至為諸經引用之藥好古曰入手少陰三焦命門之劑其性走而不守非若乾薑止而不行趙嗣真曰熟附配麻黃發中有補仲景麻黃附子細辛湯麻黃附子甘草湯是也生附配乾薑補中有發仲景乾薑附子湯通脈四逆湯是也戴原禮曰附子無乾薑不熟得甘草則性緩得桂則補命門李燾曰附子得生薑則能發散

子小便浸透煮過以殺其毒并助下行之力入鹽少許尤好或以小便浸二七日自揀去壞者以竹刀每箇切作四片并水淘淨逐日換水再浸七日晒乾用時珍曰附子生用則發散熟用則峻補生用者須如陰制之法去皮臍入藥熟用者以水浸過炮令發拆去皮臍乘熟切片再炒令內外俱黃去火毒入藥又法每一箇用甘草二錢鹽水薑汁童尿各半盞同煮熟出火毒一夜用之則毒去也

以熱攻熱又導虛熱下行以除冷病之才曰地膽
為之使惡蜈蚣畏防風黑豆其草人參黃耆時珍
曰畏綠豆烏韭童溲犀角忌
鼓汁得蜀椒食益下達命門主治風寒欬逆邪氣

寒濕踈躄拘攣膝痛不能行步破癥堅積聚血痕

金瘡本經腰脊風寒脚氣冷冷弱心腹冷痛霍亂轉

筋下痢赤白温中強陰堅肌骨又墮胎為百藥長

別錄温暖脾胃除脾濕腎寒補下焦之陽虛元素除臟

腑沉寒三陽厥逆濕淫腹痛胃寒虻動治經閉補

虛散壅李杲督脉為病脊強而厥好古治二陰傷寒陰

毒寒疝中寒中風痰厥氣厥柔痊癩癩小兒慢驚

風濕麻痺腫滿脚氣頭風腎厥頭痛暴瀉脫陽又

痢脾泄寒瘧瘴氣久病嘔噦反胃噎膈癰疽不飲

久漏冷瘡合葱涕塞耳治聾時珍

烏頭即附子母主治諸風風痺血痺半身不遂除寒冷

温養臟腑去心下堅痞感寒腹痛元素除寒濕行經

散風邪破諸積冷毒李杲補命門不足肝風虛好古助

陽退陰功同附子而稍緩時珍

發明宗奭曰補虛寒須用附子風家即多用天雄

之時珍曰按王氏究原方云附子性重滯温脾逐
寒川烏頭性輕踈温脾去風若是寒疾即用附子

風疾卽用川烏頭一云凡人中風不可先用風藥
 及烏附若先用氣藥後用烏附乃宜也又凡用烏
 附藥並宜冷服者熱因寒用也蓋陰寒在下虛陽
 上浮治之以寒則陰氣益甚而病增治之以熱則
 拒格而不納熱藥冷飲下嗝之後冷體既消熱性
 便發而病氣隨愈不違其情而致大益此反治之
 妙也昔張仲景治寒疝內結用蜜煎烏頭近效方
 治喉痺用蜜炙附子含之嚥汁朱丹溪治疝氣用
 烏頭卮子並熱因寒用也李東垣治馮翰林姪陰
 盛格陽傷寒面赤目赤煩渴引飲脈來七八至但
 按之則散用薑附湯加人參投半斤服之得汗而
 愈此則神聖之妙也吳綬曰附子乃陰證要藥凡
 傷寒傳變三陰及中寒夾陰雖身大熱而脈沉者
 必用之或厥冷腹痛脈沉細甚則唇青囊縮者急
 須用之有退陰回陽之力起死回生之功近世陰
 證傷寒往往疑似不敢用附子直待陰極陽竭而
 用之已遲矣且夾陰傷寒內外皆陰陽氣頓衰必
 須急用人參建脈以益其原佐以附子溫經散寒
 捨此不用將何以救之劉完素曰俗方治麻痺多
 用烏附其氣暴能衝開道路故氣愈麻及藥氣盡
 而正氣行則麻病愈矣張元素曰附子以白朮爲
 佐乃除寒濕之聖藥濕藥宜少加之引經又益火
 之原以消陰翳則便溺有節烏附是也虞搏曰附
 子稟雄壯之質有斬關奪將之氣能引補氣藥行
 十二經以逆復散失之元陽引補血藥入血分以
 滋養不足之真陰引發散藥開腠理以驅逐在表
 之風寒引溫煖藥達下焦以祛除在裏之冷濕震
 亨曰氣虛熱甚者宜少用附子以行參耆肥人多
 濕亦宜少加烏附行經仲景八味丸用爲少陰嚮
 導後世因以附子爲補藥誤矣附子走而不守取
 其健悍走下之性以行地黃之滯可致遠爾烏頭
 天雄皆氣壯形偉可爲下部藥之佐無人表其害
 人之禍相習用爲治風之藥及補藥殺人多矣王
 履曰仲景八味丸兼陰火不足者設錢仲陽六味
 地黃丸爲陰虛者設附子乃補陽之藥非爲行滯
 也好古曰烏附非身涼而四肢厥者不可借用服

附子以補火必妨涸水○時珍曰烏附毒藥甚危病不用而補藥中少加引導其功甚捷有人纔服錢七即發燥不堪而昔人補劑用為常藥豈古今運氣不同耶荆府都昌王體瘦而冷無他病日以附子煎湯飲兼嚼硫黃如此數歲斲州衛張百戶平生服鹿茸附子藥至八十餘康健倍常宋張杲醫說載趙知府耽酒色每日煎乾薑熟附湯吞硫黃金液丹百粒乃能健啖否則倦弱不支壽至九十他人服一粒即為害若此數人皆其臟腑稟賦之偏服之有益無害不可以常理槩論也又續碎錄言滑臺風土極寒民啖附子如啖芋栗此則地氣使然爾

附方 舊二十六 新八十七 **少陰傷寒** 初得二三日脉微細但欲取三升分作三服取微汗張仲景傷寒論 **少陰發熱** 少陰病始得反汗

甘草湯微發其汗麻黃去節二兩甘草炙二兩附子炮去皮一枚細辛二兩水一斗先煮麻黃去沫納二味煮取三升分作三服取微汗張仲景傷寒論 **少陰發熱** 少陰病始得反汗

身反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脉不出者通脉四逆湯用大附子一箇去皮生破入片甘草炙二兩乾薑三兩水三升煮一升分温再服其脉即出者愈面赤加葱九莖腹痛加芍藥二兩嘔加生薑二兩咽痛加桔梗

少陰下利 少陰病下利清穀裏急後重身反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脉不出者通脉四逆湯用大附子一箇去皮生破入片甘草炙二兩乾薑三兩水三升煮一升分温再服其脉即出者愈面赤加葱九莖腹痛加芍藥二兩嘔加生薑二兩咽痛加桔梗

傷寒惡寒 傷寒已發汗不解反惡寒者虛也芍藥甘草附子湯補之芍藥三兩甘草炙三兩附子炮去皮一枚水五升煮取一升

傷寒發躁 傷寒下後又發其汗而安靜不嘔不渴無表證脉沉微身無大熱者乾薑附子湯温之乾薑一兩生附子一枚去皮破作八片水三升煮取一升頓服

陰盛格陽 傷寒陰盛格陽其人必躁熱而不飲

水脉沉手足厥逆者是此證也霹靂散用大附子一枚燒存性為末蜜水調服通散寒氣然後熱氣上行而汗出乃熱病吐下及下利身冷脉微發躁愈孫兆口訣

度臍分作八片入鹽一錢水一升陰毒傷寒孫兆

變半升温服立効經驗良方云房後受寒少腹痛頭疼腰重手足厥逆脉息

沉細或作呃逆並宜退陰散用川烏頭乾薑等分切炒放冷為散每服一錢水一盞鹽一撮煎取半

盞温服得汗解○本事方王女散治陰毒心腹痛

厥逆惡候川烏頭去皮臍冷水浸七日切晒紙裹

夜之遇有患者取為末一錢入鹽八分水一盞煎

八分服壓下陰毒如猪血相似再進一服○濟生

切散治陰毒傷寒面青四肢厥逆腹痛身冷一

切冷氣大附子二枚炮裂去皮臍為末每服三錢

○傳信方治陰毒傷寒煩躁迷悶急者用半兩

子一箇生破作四片生薑一大塊作三片糯米

一撮以水一升與六合温服煖臥或汗出或不

出候心定則以水所散之類解之不得與冷水如

渴更煎滓服中風痰厥昏不知人口眼喎斜并體

屢用多効生飲用生川烏頭生附子並去皮臍各半兩生南

星一兩生木香二錢五分每服五錢生薑十片水

二盞煎一盞温服中風氣厥痰壅昏不知人六脉沉

服和濟局方去皮生木香半兩每服四錢薑九片

水二盞煎七分温服之濟生方中風偏癱活

湯用生附子一箇去皮臍羌活烏藥各一兩每服

四錢生薑三片水一盞煎七分服王氏簡易方

半身不遂

遂令癖症用附子一兩以無灰酒一升浸一七日隔日飲一合延年秘錄

風病癱緩

手足解曳口眼喎斜語音蹇澀步履不正宜神驗烏龍丹主之川烏頭去皮臍

五靈脂各五兩為末入龍腦麝香五分滴水為丸如彈子大每服一丸先以生薑汁研化暖酒調服

本草綱目卷之二十一 風病癱緩 正宜神驗烏龍丹主之川烏頭去皮臍

一日二服至五七丸便覺手穩後**風寒濕痺**...

或手足不遂生川烏頭末每以香白米煮粥一盞...

入末四錢慢熬得所下薑汁一匙蜜三大匙空腹...

也脾主四肢風淫客肝則侵脾而四肢病也此湯...

極有力子每投人良**體虛有風**外受寒濕身如在...

驗許學士本事方**南星各二錢生薑十片水一盞半慢火煎服子口**

曾病此醫傳張子發授此方二服愈**本事方**口

眼喎斜生烏頭青礬各等分爲末每用一字嚙入...

中秘**口卒噤瘖**卒忤停尸並用附子末**產後中風**

寶方身如角弓反張口噤不語川烏頭五兩剉塊黑大...

取酒微溫服一小盞取汗若口不開拘攣灌之未...

効加烏雞糞一合炒納酒中服以差爲度

諸風血風烏荊丸治諸風緩言語蹇澀偏身麻...

風臟毒下血不止者服之尤効有痛風攣指顛頷...

不收者服六七服即瘥也川烏頭炮去皮臍一兩...

荆芥穗二兩爲末醋麵糊丸梧子大**婦人血風**虛...

溫酒或熟水每服二十九和劑方

月候不勻或手脚心煩熱或頭面浮腫頑麻用川...

烏頭一斤清油四兩鹽四兩鑊內同熬令裂如桑...

椹色爲度去皮臍五靈脂四兩爲末搗勻蒸餅丸...

如梧子大空心溫酒鹽湯下二十九亦治丈夫風...

疾**諸風癩疾**生川烏頭去皮二錢半五靈脂...

師方**小兒慢驚**搖搦涎壅厥逆川烏頭生去皮...

薑湯化**小兒項軟**乃肝腎虛風邪襲...

服水一盞薑七片煎**小兒顛陷**綿烏...

服湯氏嬰孩寶鑑**小兒顛陷**綿烏...

天南星各二錢爲末薑汁調攤貼

天柱骨內服瀉青丸全幼心鑑

子並生去皮臍二錢雄黃八分為末葱根搗和作餅貼陷處全幼心鑑

九治手足麻痺或癱瘓疼痛損閃胸痛不可忍生川烏不去皮五靈脂各四兩

威靈仙五兩洗焙為末酒糊丸梧子大每服七九至十九丸鹽湯下忌茶此藥常服其効如神普濟

方 風痺肢痛 營衛不行川烏頭炮去皮以大豆同焙為末臘醋熬稠丸綠豆大每腰脚冷痺 疼痛有

溫酒下七九日一服 聖惠方 大風諸痺 痰涎脹帛上貼之頭更痛止聖惠方

子半兩者二枚炮折酒漬之秋三日每服一合以瘥為度 聖惠方 脚氣腿

腫 久不瘥者黑附子一箇生去皮臍為散生薑汁調如膏塗之藥乾再塗腫消為度簡要濟衆

十脂疼痛 麻木不仁生附子去皮臍木香各等分生薑五片水煎溫服王氏簡易方

搜風順氣 烏附丸用川烏頭二十箇香附子半斤薑汁淹一宿炒焙為末酒糊丸梧子大

每溫酒下十九丸 體肥壯有 澹寮方 頭風頭痛 外臺秘要

風疾者宜常服之 頭一升炒令黃末之以絹袋盛浸三斗酒中逐日

溫服○孫兆口訣用附子炮石膏煨等分為末入腦麝少許每服半錢茶酒任下○修真秘皆用附

子一枚生去皮臍綠豆一合同入銚子內煮豈熟為度去附子食綠豆立瘥每風毒頭痛 聖惠方治

膏可煮五次後為末服之 頭目痛不可忍大附子一枚泡去皮為末以生薑

一兩大黑豆一合炒熟同酒一盞煎七分調附末一錢溫服○夏方治二三十年頭風不愈者用大

川烏頭生去皮四兩天南星炮一兩為末每服二錢細茶三錢薄荷七葉蓋梅一箇水一盞煎七分

臨卧溫服○朱氏集驗方治頭痛連睛者生烏頭一錢白芷四錢為末茶服一字風寒頭痛 十便良

仍以末嚙鼻有人用之得効 風寒頭痛 方治風

仍以末嚙鼻有人用之得効

仍以末嚙鼻有人用之得効

寒客于頭中清涕項筋急硬胸中寒痰嘔吐清水

用大附子或大川烏頭二枚去皮蒸過川芎麴生

薑各一兩焙研以茶湯調服一錢或剉片每用五

錢木煎服隔三四日一服或加防風一兩〇三因

方必効散治風寒流注偏正頭痛年久不愈最有

神効用大附子一箇生切四片以薑汁一盞浸炙

再浸再炙汁盡乃止高良薑等分爲末

每服一錢臘茶清調下忌熱物少時

沐頭中風多汗惡風當先風一日則痛甚用大附

子一箇炮食鹽等分爲末以方寸七摩顛上令藥

力行或以油調稀亦可

一日三上

調塗太陽

穴

厥頭痛

如破厥氣上衝痰塞胸膈炮附子三分釜

肉冷

腎厥頭痛

指南方用大附子一箇炮熟去皮

經驗良方荜根九治元陽虛頭痛如破眼睛如錐

刺大川烏頭去皮微炮全蠍以糯米炒過去米等

分爲末荜根汁丸綠豆大每

薄荷茶下十五丸一日一服

氣虛頭痛

僧繼洪澹寮方蠍附

丸云氣虛頭痛惟此方最合造化之妙附子助陽

扶虛鍾乳補陽鎮墜全蠍取其鑽透葱涎取其通

氣湯使用椒以達下鹽以引用使虛氣下歸對證

用之無不作效大附子一枚剉心入全蠍去毒三

枚在內以餘附末同鍾乳粉二錢半白麩少許水

和作劑包附煨熟去皮研末葱涎和丸梧子大每

椒鹽温下

腎氣上攻

頭項不能轉移椒附丸用大

以椒二十粒用白麩填滿椒口水一盞半薑七片

歸經也

鼻淵腦泄

生附子末葱涎和如

本事方

泥會涌泉穴

番濟耳鳴不止

無晝夜者烏頭燒作灰葛蒲等分為末耳卒聾閉

綿裹塞之日再用取効楊氏產乳耳聾閉

附子醋浸削尖挿之或更於聾耳膿血生附子為末葱涕和

上灸二七壯本草拾遺聾耳膿血生附子為末葱涕和

灌耳中喉痺腫塞附子去皮炮令拆以蜜塗上灸

即膿出未成者即久患口瘡貼足心男左女右日

消出本草拾遺普濟方用附子一兩燒灰枯礬

再換之風蟲牙痛一分為末搗之又方川烏頭

川附子生研麩糊丸小豆大每綿包一丸

咬之剛繁方用炮附子末納孔中乃止眼暴赤

腫砂大着背中以定為度張文仲備急方

切冷氣去風痰定遍身疼痛益元氣強力固精益

子盛以童子小便浸七日逐日添令溢出揀去壞

之日日換水日足取焙為末酒煮麩糊丸綠豆大

每服十九空心溫湯下少粥飯壓之經驗方

升降諸氣暖則宜流熱附子一大箇分作二服水

方中寒昏困薑附湯治體虛中寒昏不知人及臍

附子一兩去皮臍乾薑炮一兩每服三

錢水二鍾煎一鍾溫服和劑局方心腹冷痛

冷熱氣不和山厄子川烏頭等分生研為末酒糊

丸梧子大每服十五丸生薑湯下小腸氣痛加炒

苗香葱酒下二寸心痛疝氣厄子降濕熱烏頭破

丸王氏博濟方心痛疝氣厄子降濕熱烏頭破

下丹

寒厥心痛及小腸膀胱痛不可止者神砂

溪蓂要一粒丹用熟附子去皮鬱金

紅各一兩為末醋麩糊丸如酸棗大朱砂為衣

每服一丸男子酒下女人醋湯下宣明方寒

疝腹痛

遠臍手足厥冷白汗出脉弦而緊用大烏頭煎主之

寒疝身痛

腹痛手足逆冷不仁或身痛不能眠用烏頭桂枝湯主之

寒疝引脇

脇心腹皆痛諸藥不効者大烏頭五枚去角四破以白蜜

滑泄

腹痛腸鳴自汗厥逆熟附子去皮臍玄胡索炒各一兩生木香半兩每服四錢水二盞薑

小腸諸疝

倉卒散治寒疝腹痛小腸氣膀胱氣脾腎諸痛

虛寒腰痛

鹿茸去毛酥炙微黃附子炮去皮臍各二兩薑花三分為末棗肉和丸梧

元臟傷冷

附子炮去此方本治腰而効乃如此

胃冷有痰

附子半夏各

疝腹痛

頭煎主之

寒疝身痛

腹痛手足逆冷

寒疝引脇

脇心腹皆痛

滑泄

腹痛腸鳴自汗

小腸諸疝

倉卒散治寒疝

虛寒腰痛

鹿茸去毛酥炙

元臟傷冷

附子炮去

胃冷有痰

附子半夏各

疝腹痛

頭煎主之

寒疝身痛

腹痛手足逆冷

寒疝引脇

脇心腹皆痛

滑泄

腹痛腸鳴自汗

小腸諸疝

倉卒散治寒疝

虛寒腰痛

鹿茸去毛酥炙

元臟傷冷

附子炮去

二錢薑十片水二盞煎七分空心溫服又冷反胃

一方並炮熟加木香五分奇効良方

經驗方用大附子一箇生薑一斤剉細同煮研如

麩糊每米飲化服一錢○衛生家寶方用薑汁打

糊和附子末為丸大黃為末每溫水服十丸○斗

門方用長大附子一箇坐于磚上四面着火漸逼

以生薑自然汁淬之依前再逼再淬約薑汁盡半

碗乃止研末每服一錢粟米飲下不過三服瘥或

以猪腰子切片炙熟食○方便集用大附子一

箇切下頭子剉一錢安丁香四十九箇在內仍合

定線紫入砂鉢內以薑汁浸過文火熬乾為末

每挑少許置掌心舐喫日十數次忌毒物生冷

寒瘡疾濟生方云五臟氣虛陰陽相勝發為瘡

附子一枚炮七次鹽湯浸七次去皮臍分作二服

水一碗生薑七片菓七枚煎七分露一宿發日空

心溫服未久再進一服王璠百一選方云寒痰宜

附子風痰宜烏頭一服用烏頭則寒多者火炮七次

熱多者湯泡七次去皮焙乾如上法用烏頭性

炮多則熱散也○又果附湯用熟附子去皮草田

仁各二錢半水一盞薑七片棗一枚煎七分發日

早溫服○肘後方臨發時以醋和附子塗于背上

寒熱瘡疾

附子一枚重五錢者麩煨人參丹砂各

未發前連進三服中病則吐或身體麻

木未中病來日再服 龐安常傷寒論 瘡瘡寒熱

冷瘡寒熱往來頭痛身疼嘔痰或汗多引飲或自

利煩躁宜薑附湯主之大附子一枚四破每以

片水一盞生薑十片煎七分溫服李待制云此方

極妙章傑云嶺南以啞瘡為危急不過一二日而

死醫謂極熱感寒也用生附子一味治之多愈得

非以熱攻熱而發散寒邪乎真起死回生之藥也

嶺南 衛生方 小便虛閉 兩尺脈沉微用利小便藥不効

臍鹽水浸良久澤瀉一兩每服四錢水腫疾喘滿

不利若再用利藥性寒而小便愈不通矣醫者到此多束手蓋中焦下焦氣不升降為寒痞隔故水

疑而不通惟服沉附湯則小便自通喘滿自愈用生附子一箇去皮臍切片生薑十片入沉香一錢

磨水同煎食前冷飲附子雖三五枚亦無害小兒每服三錢水煎

脾虛濕腫 破大附子五枚去皮四服 朱氏集驗方

附子于中慢火煮熟去豆焙研末以薏苡仁粉打糊丸梧子大每服十九丸蘿蔔湯下 朱氏集驗方

陰水腫滿 烏頭一升桑白皮五升水五升煮一升去滓銅器盛之重湯煎至可丸丸小豆

大每服三五丸取小便利為佳忌油膩酒麪魚肉○又方人附子童便浸三日夜逐日換尿以布擦

去皮搗如泥酒糊和丸小豆大每服三十丸煎流氣飲送下 普濟方

大腸冷秘 附子一錢蜜水空心服之 聖濟總錄

老人虛泄 不禁 子一兩赤石脂一兩為末醋糊丸梧

子大未飲下五十九丸 楊氏家藏方 **冷氣洞泄** 川

烏頭一兩木香半兩為末醋糊丸梧子大每陳皮湯下二十九丸 本事方 **臟寒脾泄** 及

人中氣不足久泄不止肉豆蔻二兩煨熟大附子去皮臍一兩五錢為末粥丸梧子大每服八十九

蓮肉煎湯下○十便良方治脾胃虛冷大腸滑泄米穀不化乏力用大附子十兩連皮同大棗二升

於石器內以水煮一日常令水過兩指取出每箇切作三井再同煮半日削去皮切焙為末別以棗

肉和丸梧子大每空 **小兒吐泄** 注下小便少白龍心米飲服三四十九丸 丸用熟附子五錢

白石脂煨龍骨煨各二錢半為末醋麪糊丸 **霍亂** 黍米大每米飲量兒大小服 全幼心鑑

吐泄 不止附子重七錢者炮去皮臍為末每服四錢水二盞鹽半錢煎一盞溫服立止 孫兆

秘寶水泄久痢 川烏頭二枚一坐用一以黑豆半方 合同煮熟研丸綠豆大每服五丸

六五

黃連湯下 久痢赤白 獨聖丸用川烏頭一箇灰火

研末酒化臘丸如大麻子大每服三九赤痢黃連

甘草黑豆煎湯放冷吞下白痢甘草黑豆煎湯冷

吞如瀉及肚痛以水吞下並空 久痢休息 熟附子

心腹之忌熱物 經驗良方 未雞子白二枚搗和丸梧子大傾入沸湯下痢效

逆 脉沉陰寒者退陰散主之陳自明云一人病下

血虛寒 日久腸冷者熟附子去皮枯白礬一兩為

去皮生薑三錢半水煎服或 陽虛吐血 生地黃一

加黑豆一百粒 並聖惠方 酒少許以熟附子一兩半去皮臍切片入汁內石

器煮成膏取附片焙乾入山藥二兩研末以膏和

搗丸梧子大每空心米飲下二十九丸昔葛察判妻

苦此疾百藥皆試得此而愈屢發屢效 余居士

選奇 溲數白濁 熟附子為末每服一錢薑一錢

火背熱 虛火上行背內熱如火灸者附 經水不調

血臟冷痛此方平易捷徑熟附子去皮 斷產下胎

當歸等分每服三錢水煎服 普濟方 足心胎下去之 小品方 折腕損傷 附子四枚生

切以猪脂一斤三年苦醋同漬三宿取 癰疽腫毒

脂煎三上三下日摩傅之 深師方 癰疽久漏 瘡

川烏頭炒黃蘗炒各一兩為末唾調 癰疽久漏 瘡

塗之留頭乾則以米泔潤之 同上 癰疽久漏 瘡

冷膿水不絕內無惡肉大附子以水浸透切作大

徹內即瘥 癰疽肉突 烏頭五枚濃醋三升漬三日

驗 千金方 醋和附子末塗之 夕生疥癬 川烏頭

水煎洗甚 手足凍裂 附子去皮為末以水麩調足

釘怪疾 兩足心凸腫上生黑豆瘡硬如釘脛骨生

腎冷熱相吞用炮川烏頭末傅之

烏頭附子尖主治為末茶服半錢吐風痰癩癧

發明 時珍曰烏附用尖亦取其銳氣直達病所爾

厥逆用附子尖一箇硫黃棗大一箇蠟稍七箇為

末薑汁麩糊丸黃米大每服十九丸米飲下亦治久

瀉庭羸凡用烏附不可執為性熱審其手足冷者

輕則用湯甚則用丸重者用膏候手足暖陽氣回

即為佳也按此方乃和劑局方碧霞丹變法也非

真慢脾風不可輒用故初虞世有金虎碧霞之戒

主治 舊一風厥癩癧 凡中風痰厥癩癧驚風痰涎

宜碧霞丹主之烏頭尖附子尖蠟稍各七十箇石

綠研九度飛過十兩為末麩糊丸芡子大每用一

丸薄荷汁半盞化下更服溫酒半合須臾吐出痰

涎為妙小兒驚癇加白僵蠶等分 和劑局方

臍風撮口 生川烏尖三箇全足蜈蚣半條酒浸炙

薄荷湯灌一 木舌腫脹 川烏尖巴豆研細醋 牙痛

難忍 附子尖天雄尖全蠍各七箇 奔豚疝氣 作痛

囊腫痛去鈴丸用生川烏尖七箇巴豆七枚去皮

油為末糕糊丸梧子大朱砂麝香為衣每服二丸

空心冷酒或冷盞湯下三兩 割甲成瘡 連年不愈

日一服不可多 澹寮方 川烏頭尖

三百八十二

黃蘗等分為末洗了貼之
以愈為度 古今錄驗
老幼口瘡 烏頭尖一箇
研末薑汁和塗足心男左
女右不過二三次即愈
天南星一箇

本草綱目草部第十七卷下

草之六

天雄 本經下品

釋名 白幕 本經時珍曰天雄乃種附子而生出或
變出其形長而不生子故曰天雄其長

而尖者謂之
天雄象形也

集解 別錄曰天雄生少室山谷二月采根陰乾弘
景曰今採用八月中旬天雄似附子細而長

乃至三四寸許此與烏頭附子三種本出建平故
謂之二建今宜都佷山者最好謂為西建錢塘間
者謂為東建氣力小弱不相似故曰西本猶勝東
白也其用灰殺之時有水強者不佳恭曰天雄附
子烏頭並以蜀道綿州龍州出者佳餘處雖有力
弱不相似陶以三物俱出建平故名之者非也烏

頭苗名莖音新爾雅云葦莖草是也今訛莖為建遂以建平譯之矣本草曰天雄諸說悉備但始種而不生附子側子經年獲長大者是也蜀人種之尤忌生此以為不利如養蠶而成白蠶之意時珍曰天雄有二種一種是蜀人種附子而生出長者或種附子而盡變成長者即如種芋形狀不一之類一種是他處草烏頭之類自生成者故別錄註烏蒙云長三寸已上者為天雄是也入藥須用蜀產曾經釀制者或云須重一兩半有象眼者乃佳餘見附子下

修治敷曰宜炮皴去皮尖底用或陰制如附子法亦得大明曰凡丸散炮去皮用飲藥即和皮生使其佳時珍曰熟用一法每十兩以酒浸七日曬土坑用炭半秤煨赤去火以醋二升沃之候乾乘熟入天雄在內小盆合一夜取出去臍用之

氣味辛溫有大毒別錄曰甘大溫權曰大熱宜乾忌鼓汁

主治大風寒濕痺歷節痛拘攣緩急破積聚邪氣

金瘡強筋骨輕身健行本經**療頭面風去來疼痛心**

腹結聚關節重不能行步除骨間痛長陰氣強志

令人武勇力作不倦別錄禹錫曰按淮南子云天一枚納雄雞腸中搗食之令人勇**治風痰冷痺軟脚毒風能止氣**

喘促急殺禽蟲毒甄權**治一切風一切氣助陽道暖**

水臟補腰膝益精明目通九竅利皮膚調血脉四

肢不遂下胷水破痲痺癱結排膿止痛續骨消

癩血背脊偃倭霍亂轉筋發汗止陰汗炮食治喉

痺大

發明

宗奭曰補虛寒須用附子風家多用天雄亦取其散也元素曰非天雄不能補上焦之陽虛震亨曰天雄烏頭氣壯形偉可為下部之佐時珍曰烏附天雄皆是補下焦命門陽虛之藥補下所以益上也若是上焦陽虛即屬心肺之分當用參芪不當用天雄也且烏附天雄之尖皆是向下生者其氣下行其臍乃向上生苗之處寇宗奭言其不肯就下張元素言其補上焦陽虛皆是誤認尖為上爾惟朱震亨以為下部之佐者得之而未發出此義雷敷炮炙論序云咳逆數數酒服熟雄謂以天雄炮研酒服一錢也

附方

新三建湯

治元陽素虛寒邪外攻手足厥冷大小便滑數小便白渾六脉沉微

除固冷扶元氣及傷寒陰毒用烏頭附子天雄煎炮裂去皮臍等分改咀每服四錢水二盞薑十五片煎八分溫服時後方
男子失精 天雄三兩炮白朮八兩桂枝六兩龍骨三兩為散每酒服半錢 張仲景金匱要畧
大風惡癩 二月四月采天雄烏頭清細粒黑豆摩去皮不落者一夜取出曬乾又浸如此七次初吞三枚漸加至六七枚禁房室諸魚雞蒜犯之即死

側子

別錄下品

釋名 附子

時珍曰生于附子之側故名許慎說文作附子

集解

弘景曰此附子邊角之大者削取之昔時不用比來醫家以藥臍氣多驗秦曰側子附子

皆是烏頭下旁出者以承者為側子夫者為附子今以附子角為側子理亦不然若當陽以下江左

山南嵩高齊魯間附子時復有角如大豆許夔州以上劍南所出者附子之角但如黍粟豈可充用比來都下皆用細附子有効未嘗取角也保昇自今附子邊果有角如大者該及損擲以來者形狀自是一類且不小乃烏頭旁出附子附子旁出側子甚明時珍曰側子乃附子旁粘連小者爾故吳普陶弘景謂指為附子角之太者其又小於側子者即漏蓋子疾液場氏附子記言側子漏蓋園人皆不重之以乞役夫

修治 同附子

氣味 辛大熱有大毒 晉曰神農時伯有大毒 **主治**

癰腫風痺歷節腰脚疼冷寒熱鼠瘻又墮胎 別錄

脚氣冷風濕痺大風筋骨變急 冷酒調服治遍

身風癱神妙 散

發明 機曰烏頭乃原生之腦得母之氣守而不移居乎中者也側子散生旁側體無定在其氣

輕揚宜其發散四肢充達皮毛為治風之藥天雄長而尖其氣親上宜其補上焦之陽虛木鼈子則

餘氣所結其形惟殘宜其不入湯服令人喪目也時珍曰唐元希聲侍郎治癰瘰風有側子湯見外

臺秘要藥多不錄

漏蓋子 綱目

釋名 木鼈子 炮炙 虎掌 日華時珍曰此乃附子之

名南星之最小者名虎掌此物類之故亦同名大明會典載四川成都府歲貢天雄二十對附子五

十對烏頭五十對漏蓋二十斤不知何用

本草綱目卷之二十一
氣味苦辛有毒服之令人喪目 主治惡痢冷瀉瘡惡瘡

癘風時珍

發明時珍曰按楊士瀛直指方云凡漏瘡年久者復其元陽當用漏蓋子葷加減用之如不當

用而輕用之又恐熱氣乘虛變移結核而為害尤甚也又按類編云一人兩足生瘡臭潰難近夜宿

五夫人祠下夢神授方用漏蓋子一枚生研為末入膩粉少許并水調墜依法治之果愈蓋此物不堪服餌止宜入瘡科也

附方 新一切惡痢

雜下及休息痢百歲丸用漏蓋子一箇大者阿膠木香黃連罌粟殼各半兩俱炒焦存性入乳香少許為末糊丸梧子大每一歲一丸米飲下 羅天益衛生寶鑑

烏頭本經下品 校正併人拾遺

釋名烏喙本經即 草而頭綱目 土附子華 奚毒本經 耿

子吳普 毒公吳普又 金龜綱目 苗茗苣音良 芟音及 董音近 獨

白草拾遺 鴛鴦菊綱目 汁煎名射罔 之頭普曰烏頭形如鳥喙即烏頭異名也此有三岐者然兩岐者少若烏頭兩岐名烏喙則天雄附子之兩岐者復何以名之時珍曰比即烏頭之野生于他處者俗為之草

烏頭亦曰竹節烏頭出江北者曰淮烏頭日華子所謂土附子者是也烏喙即偶生兩岐者今俗呼為兩頭尖因形而名其實乃一物也附子天雄之偶生兩岐者亦謂之烏喙功亦同于天雄非此烏頭也蘇恭不知此義故反疑之草烏頭取汁晒為毒藥射禽獸故有射罔之稱後魏書言遼東塞外

秋收烏頭為毒藥射禽獸陳藏器所引續漢五行志言西國生獨白草煎為藥敷箭射人即死者皆

志言西國生獨白草煎為藥敷箭射人即死者皆

志言西國生獨白草煎為藥敷箭射人即死者皆

志言西國生獨白草煎為藥敷箭射人即死者皆

志言西國生獨白草煎為藥敷箭射人即死者皆

志言西國生獨白草煎為藥敷箭射人即死者皆

志言西國生獨白草煎為藥敷箭射人即死者皆

志言西國生獨白草煎為藥敷箭射人即死者皆

志言西國生獨白草煎為藥敷箭射人即死者皆

志言西國生獨白草煎為藥敷箭射人即死者皆

志言西國生獨白草煎為藥敷箭射人即死者皆

本草綱目卷之二十七
此烏頭非川烏頭也菊譜云鴛鴦菊即烏喙苗也

集解

別錄曰烏頭烏喙生朗陵山谷正月二月采葉厚莖方中空葉四四相當與蒿相似弘景曰今采用四月亦以八月采搗葶莖汁日更為射罔獵人以傅箭射禽獸十步即倒中人亦死宜速解之朗陵屬汝南郡大明曰土附子生去皮搗濾汁澄清旋添晒乾取膏名為射罔以作毒箭時珍曰處處有之根苗花實並與川烏頭相同但此係野生又無釀造之法其根外黑內白皺而枯燥為異爾然毒則甚焉段成式酉陽雜俎言雀芋狀如雀頭置乾地反濕濕地反乾飛鳥觸之墮走獸遇之僵似亦草烏之類而毒更甚也又言建寧郡烏勾山有牧靡草鳥鵠誤食烏喙中毒必急食比草以解之牧靡不知何藥也

修治

時珍曰草烏頭或生用或炮用或以烏大豆同煮熟去其毒用

烏頭氣味辛温有大毒

別錄曰其大熱大毒晉曰神農雷公桐君黃帝并有毒

毒權口苦辛大熱有大毒大明曰味蒼辛熱有毒之才曰莽草遠志為之使反半夏枯樓貝母白欬白芨惡藜蘆時珍曰伏丹砂砒石忌
豉汁畏飴糖黑豆冷水能解其毒
主治中風惡

風洗洗出汗除寒濕痺欬逆上氣破積聚寒熱其

汁煎之名射罔殺禽獸本經消胃上痰冷食不下心

腹冷痰臍間痛不可俛仰目中痛不可久視又墮

胎別錄主惡風憎寒冷痰包心腸腹痛疔瘡癰氣塊

齒痛益陽事強志甄權治頭風喉痺癰腫疔毒時珍

烏喙一名兩頭尖氣味辛微温有大毒普曰神農雷公桐君

黃帝有毒權曰苦辛
大熱○畏惡同烏頭
主治風濕丈夫腎濕陰寒癢

寒熱歷節掣引腰痛不能行步癰腫膿結又墮胎

別錄男子腎氣衰弱陰汗癩癰歲月不消
甄權王大風

頑痺時珍

射罔氣味苦有大毒之才曰温大明曰人中射罔毒以甘草藍汁小豆葉浮萍

冷木薺芫皆可一味禦之主治尸疰癥堅及頭中風痺別錄癩瘡

瘡根結核癩癰毒腫及蛇咬先取塗肉四畔漸漸

近瘡習習逐病至骨瘡有熱膿及黃水塗之若無

膿水有生血及新傷破即不可塗立殺人藏器

發明時珍曰草烏頭射罔乃至毒之藥非若川烏

自非風頑急疾不可輕投甄權藥性論言其益陽

事治男子腎氣衰弱者未可遽然也此類止能搜

風勝濕開頑痰治頑瘡以毒攻毒而已豈有川烏

頭附子補右腎命門之功哉吾斷郝知府自負知

醫因病風癰服草烏頭木籠子藥過多甫入腹而

麻痺遂至不救可不慎乎機曰烏喙形如鳥嘴其

氣鋒銳宜其通經絡利關節尋蹊達徑而直抵病

所更為射罔能殺禽獸非氣之鋒銳捷利能如是

乎楊清叟曰凡風寒濕痺骨內冷痛及損傷入骨

年久發痛或一切陰疽腫毒並宜草烏頭南星等

分少加肉桂為末薑汁熱酒調塗未破者能內消

久潰者能去黑爛性味辛烈能破惡魂逐寒

熱遇冷即消
遇熱即潰
附方舊四新陰毒傷寒生草烏頭為末以葱頭藥
四十八藥納穀道中名提益散

王海藏陰 二便不通 即上方名 中風癱瘓 掉言

證畧例 寒瀋左經丸用草烏頭炮去皮四兩川烏頭炮去

皮二兩乳香沒藥各一兩為末生烏豆一升以蠶

蛻三七箇去頭翅同煮豆熟去蠶取豆焙乾為末

和勻以醋麩糶丸梧子大每服三十丸溫酒下

簡易 癱瘓頑風 骨節疼痛下元虛冷諸風痔漏下

方 尖各三錢硫黃麝香丁香各一錢木鼈子五箇為

末以熟斷艾揉軟合成一團用鈔紙包裹燒熏病

處名雷丸 孫 諸風不遂 宋氏集驗方用生草烏

天仁集効方 生地龍搗和入少醋糊丸梧子大每服四五丸白

湯下甚妙勿多服恐麻人名鄂渚小金丹〇經驗

濟世方用草烏頭四兩去皮大豆半升鹽一兩同

以少瓶煮三伏時去豆將烏頭入木臼搗三百杵

以心鹽湯下十九名至寶丹一切頑風 神應丹

烏頭生天麻各洗等分搗爛絞汁傾盆中砌一小

坑其下燒火將盆放坑上每日用竹片攪一次夜

則露之曬至成膏作成小錠子每一錠分作三一

服用葱薑自然汁和好酒熱服 乾坤秘韞 一

切風證 不問頭風痛風黃鴉脚風痺生淮烏頭

葱一斤薑一斤播如泥和作餅子以草鋪盤內加

褚葉於上安餅於葉上又鋪草葉蓋之待出汗黃

梧子大初服三十丸日二服服後身痺汗出即愈

避風 乾 破傷風病 壽域方用草烏頭為末每以

坤祕韞 門事親方用草烏尖白芷并生研末每服半錢冷

酒一盞入葱白一根同煎服少頃以葱白熟粥投

之汗出 年久麻痺 或歷節走氣疼痛不仁不拘男

為末以袋一箇盛豆腐半袋入烏末在內再將豆

腐填滿壓乾入鍋中煮一夜其藥即堅如石取出

本草綱目草部 卷之二十七下 八

晒乾為末每服五分冷風濕氣以生薑湯
下麻木不仁以葱白湯下之活人心統風濕痺

木黑神丸草烏頭連皮生研五靈脂等分為末六
月六日滴水丸彈子大四十歲以下分六服病

甚一丸作二服薄荷湯送風濕走痛黑弩箭丸用
下覺微麻為度本事方

脂各一兩乳香沒藥當歸三錢為末醋糊丸梧子
大每服十丸至二十九臨卧温酒下忌油膩濕麩

孕婦勿服瑞竹堂方腰脚冷痛烏頭三箇去皮臍研末醋
調貼須臾痛止十便良

方膝風作痛草烏細辛防風等分為末搽靴襪中
及安護膝內能除風濕健步扶壽

方遠行脚腫草烏細辛防風等分為末搽鞋底內
如草鞋以水微濕搽之用之可行十

里甚妙脚氣掣痛或勝間有核生草烏頭大黃木
經法草烏一味為末以薑汁煎茶調貼之○

酒糟同搗貼之永類方濕滯足腫早輕晚重
用草烏頭

一兩以生薑一兩同研交感一宿蒼朮一兩以葱
白一兩同研交感一宿各焙乾為末酒糊丸梧子

大每服五十九酒下除風去濕治痺胃虛弱久積
艾元英如宜方冷氣飲食減少用

草烏頭一斤蒼朮二斤以去白陳皮半斤生甘草
四兩黑豆三升水一石同煮乾只揀烏木晒焙為

末酒糊丸梧子大焙乾收之每空心温酒下二編
三十九丸覺麻即漸減之名烏木丸集簡方

正頭風草烏頭四兩川芎藭四兩蒼朮半斤生薑
四兩連鬚生葱一把搗爛同入瓷瓶封固

埋土中春五夏三秋五冬七日取出晒乾揀去葱
薑為末醋麩糊和丸梧子大每服九丸臨卧温酒

下立効戴久患頭風草烏頭尖生用一分赤小
古渝經驗方豆三十五粒麝香一字為

末每服半錢薄荷湯冷服風痰頭痛體虛傷風停
更隨左右啗鼻指南方

頭痛或偏或正草烏頭炮去皮尖半兩川烏頭生
去皮尖一兩藿香乳香三皂子大為末每服二錢

薄荷薑湯下食後
女人頭痛 血風證草烏頭危子
等分爲末自然葱汁

隨左右調塗太陽及額上
腦洩臭穢 草烏去皮半
兩蒼木一兩

勿過眼避風 濟生方
川芎二兩並生研末麩糊丸綠豆大每
服十丸茶下忌一切熱物 聖濟總錄
耳鳴耳癢

如流水及風聲不治成聾用生烏頭掘得乘濕削
如棗核大塞之日易二次不三日愈 千金方

喉痺口噤 不開欲死草烏頭皂莢等分爲末入麝
香少許擦牙并嚙鼻內牙關自開也○

濟生方用草烏尖石膽等分爲末每用一錢醋煮
皂莢汁調稀掃入腫上流涎數次其毒即破也

虛壅口瘡 滿口連舌者草烏一箇南星一箇生薑
或以草烏頭吳茱萸等分爲
末蜜調塗口是心 本事方
疳蝕口鼻 穿透者草
入麝香等分 風蟲牙痛 草烏炒黑一兩細辛一錢
爲末貼之

草烏食鹽同炒黑
摻之 海上方
寒氣心疝 三十年者射罔食菜
黃所秘之方 范汪東陽方 寒瘡積瘡 巴豆一
皮射罔去皮如巴豆大大棗去皮一枚搗成丸梧
子大清旦先發時各服一丸白湯下 肘後方

脾寒厥瘡 先寒後熱名寒瘡但寒不熱面色黑者
者並宜服此賈耘老用之二十年累試有效不蛀
草烏頭削去皮沸湯泡二七度以蓋蓋良久切焙
研稀糊丸梧子大每服三十丸薑十片棗三枚葱
三根煎湯清早服以棗壓之如人行十里許再一
服絕勿飲湯便不發 腹中癥結 害妨飲食羸瘦射
也 蘇東坡良方 腹中癥結 胃二兩椒三百粒

搗末雞子白和丸麻子大每服一
丸漸至三九以愈爲度 肘後方
水泄寒痢 大草
兩以一半生研一半燒灰醋糊和丸綠豆大每
服七丸并華水下忌生冷魚肉 十便良方

本
草
綱
目
卷
之
下

本
草
綱
目
卷
之
下

本
草
綱
目
卷
之
下

本
草
綱
目
卷
之
下

本
草
綱
目
卷
之
下

本
草
綱
目
卷
之
下

本
草
綱
目
卷
之
下

本
草
綱
目
卷
之
下

本
草
綱
目
卷
之
下

本
草
綱
目
卷
之
下

本
草
綱
目
卷
之
下

痢注下

三神丸治清濁不分泄瀉注下或赤或白

尖以一箇火炮一箇醋煮一箇燒灰為末醋糊丸

綠豆大每服二十九丸水瀉流水下赤痢甘草湯下

白痢薑湯下忌魚腥結陰下血腹痛草烏頭蛤粉

生冷和劑局方煎入分去滓露一夜五更冷服聖濟錄老人遺

屎不知出者草烏頭一兩童便浸七日去皮同鹽

普濟內痔不出草烏為末津調點肛門內痔即反出

疥毒初起羅麩一兩為末無根水調搽留口以紙

蓋之乾則以水潤之唐珣經驗方疥毒惡腫生烏頭切片醋熬成

又方兩頭尖一兩巴豆四箇疔瘡發背草烏頭去

搗貼疔自拔出普濟方葱白連鬚和搗丸豌豆大以雄黃為衣每服一丸

先將葱一根細嚼以熱酒送下或有惡心嘔三四

口用冷水一口止之即臥以被厚蓋汗出為度亦治頭風乾坤秘韞惡毒諸瘡及

背疔瘡便毒等證二鳥膏用草烏頭川烏頭于瓦

上以井華水磨汁塗之如有口即塗四邊乾再上

亦可單用草烏磨醋塗之承類方大風癬瘡遍身黑色肌體麻木

斤刮洗去皮極淨攤乾以清油四兩益四兩同入

銚內炒令深黃色傾出剝油只留益并藥再炒令

黑烟出為度取一枚擘破心內如米一點白者始

好白多再炒乘熱杵羅為末醋麩糊丸梧子大每

服三十丸空心溫酒下草烏性毒難制五七遍身

日間以黑豆煮粥食解其毒繼洪澹寮方生瘡陰囊兩脚尤甚者草烏一兩益一兩化水浸

切搗醋糊丸綠豆大每服三一切諸瘡未破者草

半丸空心鹽湯下澹寮方烏頭為末

入輕粉少許臘猪油和搽普濟方

瘰癧初作未破作寒熱草烏頭半兩木鼈子二箇以

米醋磨細入搗爛葱頭蚯蚓糞少許調勻醫林正宗馬汗入

瘡腫痛急療之遲則毒深以生烏頭末傅靈苑方蛇蝎螫

人射罔傅之類易血射罔傅之中沙虱毒射罔傅之千金

白附子別錄下品

釋名見後發

集解別錄曰白附子生蜀郡三月采弘景曰此物

西蜀郡不復有生砂嶺下濕地獨莖似鼠尾草細

葉周匝生於穗間根形似天雄珣曰徐表南州異

物記云生東海新羅國及遼東苗與附子相似根正如草烏頭之小者長寸許乾者皺文有節

氣味辛甘大温有毒昇曰甘辛温大明曰無

日純陽引主治心痛血痺面上百病行藥勢別錄中

風失音一切冷風氣面疔癩疵大明諸風冷氣足弱

無力疥癬風瘡陰下濕癢頭面痕入面脂用李補

肝風虛好風痰震亨

發明時珍曰白附子乃陽明經藥因與附子相似

孔休傷頰有癩王莽賜王屑白附子香與之消癩

附方新十中風口喎半身不遂牽正散用白附子

末每服二錢熱酒調白薑蠶全蝎並等分生研為

下楊氏家藏方小兒暑風暑毒入心痰塞心

本草綱目卷之二十一

危急之證非此丸生料瞋眩之劑不能伐之三生

先和白附子天南星半夏並去皮等分生研猪膽

汁和丸黍米大量兒大小以薄荷湯下風痰眩運

令兒側卧嘔出痰水即甦全幼心鑑

頭痛氣鬱胃膈不利白附子炮去皮臍半斤石膏

煨紅半斤硃砂二兩二錢半龍腦一錢為末粟米

飯丸小豆大每服三十丸食偏正頭風

後茶酒任下御藥院方

角去皮等分為末食後茶清

服仰卧少頃普濟本事方

等分生研為末生薑自然汁浸蒸餅丸綠

豆大每服四十丸食後薑湯下濟生方

斑白附子硫磺等分為末薑汁調

稀茄蒂蘸擦日數次簡便方

未卧時漿水洗面以白蜜和塗紙

上貼之久久日落衛生易簡方

羌活一兩為末猪羊腎各一箇每箇入末半

錢濕紙包煨熟五更食溫酒下聖濟錄

喉痺

腫痛白附子末枯牛等分研末塗

箇為末津調填臍上以艾灸三

壯或五壯即愈楊起簡便方

小兒吐逆不定虛風喘急

虎掌本經天南星宋開寶

釋名虎膏綱目**鬼葫葫**日華云其根四時有圓牙

南星即本草虎掌也小者名由跋古方多用虎掌

不言天南星南星近出唐人中風痰毒方中用之

乃後人採用別立此名舊時珍曰虎掌因葉形似

之非根也南星因根圓白形如老人星狀故名南

星

星

皇卽虎掌也蘇頌說甚屬白宋開寶不當重出南星修今併入

集解

別錄曰虎掌生漢寧山谷及宛旬二月八月

四邊有子如虎掌今用多破作三四片方藥不甚

了扶莖根大者如拳小者如雞卵都似扁柿四畔

有圓牙看如虎掌由跋是新根大如半夏二三倍

四畔無子牙陶說似半夏乃由跋也保昇曰莖頭

有八九葉花生莖間藏器曰天南星生安東山谷

葉如荷獨莖用根頌曰虎掌今河北州郡有之初

生根如豆大漸長大似半夏而扁年久者根圓及

寸大者如雞卵周匝生圓牙三四枚或五六枚三

四月生苗高尺餘獨莖上有葉如瓜五六出分布

尖而圓一葉生七八莖時出一莖作穗直上如鼠

尾中生一葉如匙裹莖作房旁開一口上下尖中

有花微青褐色結實如麻子大熟即白色自落布

地一子生一窠九月苗殘取根今冀州人菜圃中

種之呼為天南星又曰天南星處處平澤有之二

月生苗似荷梗其莖高一尺以來葉如蒟蒻兩枝

相抱五月開花似蛇頭黃色七月結子作穗似石

榴子紅色二月八月采根似芋而圓扁與蒟蒻相

類人多誤采了不可辨但蒟蒻莖斑花紫南星根

小柔膩肌細炮之易裂為可辨爾南星即本經虎

掌也大者四邊皆有牙子采時削去之江州一種

草葉大如掌面青背紫四畔有牙如虎掌生三四

葉為一本冬青不結花實治心疼寒熱積氣亦與

虎掌同名故附見之時珍曰大者為虎掌南星小

者為由跋乃一種也今俗又言大

者為鬼曰小者為南星殊為謬誤

修治

頌曰九月采虎掌根去皮臍入器中湯浸五

裂用時珍曰凡天南星須用一兩以上者佳治風

痰有生用者須以溫湯洗淨仍以白礬湯或入皂

角汁浸三日夜日日換水暴乾用若熟用者須於

黃土地掘一小坑深五六寸以炭火燒赤以好酒

本

卷之六

十九

沃之安南星於內瓦盆覆定灰泥固濟一夜取出
用急用即以濕紙包於煨灰火中炮裂也一法治
風熱痰以酒浸一宿桑柴火蒸之常酒酒入甑內
令氣猛一伏時取出竹刀切開味不麻舌為熟未
一熟再蒸至不麻乃止脾虛多痰則以生薑渣和黃
泥包南星煨熟去泥焙用造南星麴法以薑汁蒸
湯和南星末作小餅子安藍內楮葉包蓋待上黃
衣乃取晒收之造膽星法以南星生研末臘月取
黃牯牛膽汁和劑納入膽中
繫懸風處乾之年久者彌佳

氣味苦温有大毒

別錄曰微寒普曰虎掌神農雷公苦有毒岐伯桐君辛有毒大明曰辛烈平果曰苦辛有毒陰中之陽可升可降乃肺經之本藥震亨曰欲其下行以黃蘗引之之才曰蜀漆為之使惡莽草大明曰畏附子乾薑生薑時珍曰得防風則不麻得牛膽則不燥得火炮則不毒生能伏雄黃丹砂煅硝

主治心痛寒熱結氣積聚伏梁傷筋痿拘緩利水道
除陰下濕風眩
別錄主疝瘕腸痛傷寒時疾強陰
天南星主中風麻痺除痰下

氣利胃膈攻堅積消癰腫散血墮胎

開寶金瘡折傷

疥血擣傅之

藏器蛇蟲咬疥癬惡瘡
去上焦痰及

眩運

元素主破傷風口噤身強
李杲補肝風虛治痰功

同半夏

好治驚癇口眼喎斜喉痺口舌瘡糜結核

鮮顛

時珍

發明

時珍曰虎掌天南星乃手足太陰脾肺之藥味辛而麻故能治風散血氣温而燥故能勝濕除涎性緊而毒故能攻積拔腫而治口喎舌瘡楊士瀛直指方云諸風口噤宜用南星更以人參

石菖蒲 佐之

附方 舊十新 **中風口噤** 目瞤無門下藥者開關散 用天南星為末入白龍腦

等分五月五日午時合之每用中指點末指齒三

二十遍搯大牙左右其口自開又名破棺散 經

驗 **諸風口噤** 天南星炮剉大人三錢小兒三字生 薑五片蘇葉一錢水煎減半入雄猪

膽汁少許温服 **小兒口噤** 牙關不開天南星一枚 仁齋直指方 煨熟紙裹斜包剪一小

孔透氣于口中牙關自開也 ○ 一 **小兒驚風** 散用 方用生南星同薑汁擦之自開

天南星一兩重一箇換酒浸七伏時取出安新瓦 上週迴炭火炙裂合濕地出火毒為末入硃砂一

分每服半錢荆芥湯調下每日 **吐瀉慢驚** 天王散 空心一服午時一服 經驗方

生瀉或誤服冷藥膠虛生風痰慢驚天南星一箇 入好酒半盞安南星在內仍架炭三條在上候發

裂取剉再炒熟為末用五錢天麻煨熟研末一錢 麝香一字和勻三歲小兒用半錢以生薑防

風煎湯調下亦治久嗽惡心 錢乙小兒方 **風癩** 痰迷 墜痰丸用天南星九蒸九晒為末薑汁麴糊

丸梧子大每服二十丸人參湯下石菖蒲麥 門冬湯亦可 **小兒癩瘡** 癩後瘡不能言以天南星

衛生寶鑑 **治癩利痰** 天南星煨香一兩硃砂一 調服二字 ○ 錢為末猪心血丸梧子大

全切心鑑 **口眼喎斜** 天南星生研末自然薑 每防風湯化下 **破** 汁調之左貼右貼左

存方 **角弓反張** 南星半夏等分為末薑汁竹瀝 破 仁 准下一錢仍灸印堂 摘玄方

傷中風 胡氏奪命散又名王真散治打撲金刃傷 及破傷風傷濕發病強直如癩狀者天南

星防風等分為末水調敷瘡出水為妙仍以温酒 調服一錢已死心尚温者熱童便調灌二錢鬪敵

內傷墜壓者酒和童便連灌三服即甦亦可更服 **破傷風瘡** 生南星末水調

有勁 普濟方 **婦人頭風** 攻目作痛天南星一箇

以醋一盞沃之蓋定勿令透氣候冷研末 **風痰頭**

痛 不可忍天南星一兩荆芥葉一兩為末薑汁糊

用天南星茴香等分生研末鹽醋煮麵 **風痰頭運**

目眩吐逆煩懣飲食不下王壺丸用生南星生半

夏各一兩天麻半兩白麵三兩為末水丸梧子大

每服三十丸以水先煎沸入藥煮五七沸 **腦風流**

流出放溫以薑湯吞之 惠民和劑局方 **腦風流**

邪風入腦鼻內結硬遂流髓涕大自南星切片

沸湯炮二次焙乾每用二錢棗七箇甘草五分

同煎服三四服其硬物自出腦氣流轉髓涕自收

以大蒜葶藶末作餅隔紗貼額前與耳熨之或以

香附葶藶末頻吹 **小兒風痰** 熱毒壅滯涼心壓驚

鼻中 直指方 **小兒風痰** 抱龍丸用牛膽南星

一兩入金錢薄荷十片丹砂一錢半龍腦麝香各

一字研末煉蜜丸芡子大每服一丸竹葉湯化下

全幼 **壯人風痰** 及中風中氣初起星香飲用南

心鑑 十四片煎六分溫 **痰迷心竅** 壽星丸治心膽被驚

服 王碩易簡方 **痰迷心竅** 神不守舍或痰迷心

竅恍惚健妄妄言妄見天南星一斤先掘土坑一

尺以炭火三十斤燒赤入酒五升滲乾乃安南星

在內盆覆定以灰塞之勿令走氣次日取出為末

琥珀一兩硃砂二兩為末生薑汁打麵糊丸梧子

大每服二十九至五十九丸煎人參石 **風痰注痛** 方

葛蒲湯下一日三服 和劑局方 **風痰注痛** 見

羊躑 **痰濕臂痛** 右邊者南星制蒼朮等分生 **風痰**

躑下 薑三片水煎服之 補玄方 **風痰**

欬嗽 大天南星一枚炮裂研末每服一錢水一盞

薑三片煎五分溫服每日早晚各一服

本草綱目卷之二十一

千金氣痰欬嗽 王粉丸南星翅半夏麴陳橘皮各

子大每服四十丸薑湯下寒痰去 清氣化痰丸治

橘皮加官桂 東垣蘭室秘藏 中脘氣滯痰涎煩悶頭目不清生南星去皮半夏

各五兩薑湯泡七次為末自然薑汁和作餅鋪竹

篩內以楮葉包覆待生黃成麴晒乾每用二兩入

香附末一兩糊丸梧子大每服四十丸食後薑湯

下 王璆 溫中散滯 消導飲食天南星炮高良薑

薑汁糊丸梧子大每薑酒積酒毒服此即解天南

湯下五十九丸和劑方 泥固濟一斤土坑燒赤沃酒一斗入坑放南星盆覆

南星一斤土坑燒赤沃酒一斗入坑放南星盆覆

泥固濟一斤土坑燒赤沃酒一斗入坑放南星盆覆

硃砂末一兩薑汁麵糊丸梧子大每服五十九薑

湯下蔡丞相呂丞相嘗用有驗 楊氏家藏丸

吐泄不止 四肢厥逆虛風不省人事服此則陽回

三枚水二鍾煎八分溫服未省再服 腸風瀉血

又方醋調南星末貼足心 普濟方 諸藥不効天南星石灰炒焦黃色為末酒

糊丸梧子大每酒下二十九 普濟方 吐血不

止 天南星一兩剉如豆大以爐灰汁浸一宿洗焙

研末每服一錢以自然銅磨酒調下 勝金方 初生貼額

頭熱鼻塞者天南星炮為末水調小兒 鮮顛

顛開不合鼻塞不通天南星炮去皮為末淡 醋調緋帛上貼額門灸手頻熨之立効 錢

乙小兒 鮮顛脫臼 不能收上 用南星末薑汁調 直訣 兒口瘡 白屑如鴛口不須藥以生元南星去皮 集効 走馬疳蝕 透骨穿腮生南星一箇當心剉空 方 以盞子合定出火毒去麴為末入麴 風蟲牙痛 香少許拂瘡數日甚効 經驗方

未塞孔以霜梅會
喉風喉痺
天南星一箇刺心入

任去涎
摘玄方
喉風喉痺
白僵蠶七枚紙包入

熟研末薑汁調服一錢
甚者灌
痰瘤結核
南星膏

之吐涎愈名如聖散
博濟方
痰瘤結核
治人皮

肌頭面上生瘤及結核
大者如拳小者如粟或軟
或硬不疼不癢宜用此藥
不可輒用針灸生天南

星大者一枚研爛滴好醋
五七點如無生者以乾
者為末醋調先用針刺
令氣透乃貼之覺癢則頻

貼取效
嚴
身面疣子
醋調南星末塗

子禮濟生方
之
簡易方

由跋
本經

釋名
天南星之小者其氣未足不堪服食故醫方罕用

集解
恭曰由跋是虎堂新根大于半夏一二倍四

生林下苗高一尺似菖
蕝根如雞卵保昇曰春抽

惟重八九錢至一兩餘者氣足乃佳正如附子之

側子不如附子之義也

正誤
弘景曰由跋本出始興今人亦種之狀如烏

氣味辛苦温有毒
主治毒腫結熱
本經

蒟蒻
宋開寶

釋名蒟蒻頭
開寶 鬼芋
圖 鬼頭

本草綱目卷之...

集鮮

志曰莠頭出吳蜀葉似由跋半夏根大如碗

生陰地雨滴葉下生子又有與杖苗相似至

秋有花直出生赤子根如莠頭毒猛不堪食虎杖

亦名斑杖與此不同頌曰江南吳中出白莠莠亦

日鬼芋生平澤極多人采以為天南星了不可辨

市中所收往往是此但南星肌細膩而莠莠莖莖

花紫南星莖無斑花黃為異爾時珍曰莠莠出蜀

中施州亦有之呼為鬼頭閩中人亦種之宜樹陰

下掘坑積糞春時生苗至五月移之長一二尺與

南星苗相似但多斑點宿根亦自生苗其滴露之

說蓋不然經二年者根大如碗及芋魁其外理白

味亦麻人秋後采根瀝淨擦或搗或片段以釀灰

汁煮十餘沸以水淘洗換水更煮五六遍即成凍

子切片以苦酒五味淹食不以灰汁則不成也切

作細絲沸湯灼過五味調食狀如水母絲馬志言

其苗似半夏楊慎丹鉛錄言莠醬即此者皆誤也

王禎農書云救荒之法山有粉葛莠莠橡栗之類

則此物亦有益于民者也其斑杖即天南星之類

有斑者

根氣味辛寒有毒

李廷飛曰性冷甚不益人冷氣人少食之生則戟人喉出血

主治癰腫風毒摩傳腫上搗碎以灰汁煮成餅五

味調食主消喝

開寶

發明

機曰按三元延壽書云有人患瘵百物不忌見隣家修莠莠求食之美遂多食而瘵愈又

有病腮癰者數人多食之亦皆愈

附錄菩薩草

宋圖經頌曰生江浙州郡凌冬不凋

根用味苦無毒主中諸毒食毒酒研服之又諸蟲

傷搗汁飲并傳之婦人妊娠效嗽搗篩蜜丸服効

半夏

本經下品

釋名守田本經水王本經地文別錄和姑本經時珍曰禮記月令五月半

夏生蓋當夏之半也故名守田會意水王因形

集解別錄曰半夏生槐里川谷五月八月采根暴乾普曰生微丘或生野中二月始生葉三三

相偶白花圓上弘景曰槐里屬扶風今第一出青州吳中亦有以肉白者為佳不厭陳久恭曰所在

皆有生平澤中者名羊眼半夏圓白為勝然江南者大乃徑寸南人特重之頃來互用功狀殊異其

苗似是由跋誤以為半夏也頌曰在處有之以齊州者為佳二月生苗一莖莖端三葉淺綠色頗似

竹葉而生江南者似芍藥葉根下相重上大小皮黃肉白五月八月采根以灰裹二日湯洗暴乾

蜀圖經云五月采則虛小八月采乃實大其平澤生者甚小名羊眼半夏由跋絕類半夏而苗不同

數曰白傍幾子真似半夏只是較着微酸不入藥用

修治弘景曰凡用以湯洗十許過令滑盡不爾有毒載人咽喉方中有半夏必須用生薑者以

制其毒故也數曰修事半夏四兩用白芥子末二兩醞醋二兩攪濁將半夏投中洗三遍用之若洗

涎不盡令人氣逆肝氣怒滿時珍曰全治半夏惟洗去皮垢以湯泡浸七日逐日換湯眼乾切片薑

汁拌焙入藥或研為末以薑汁入湯浸澄三日瀝去涎水晒乾用謂之半夏粉或研末以薑汁和作

餅子日乾用謂之半夏餅或研末以薑汁白礬湯和作餅楮葉包置藍中待生黃衣日乾用謂之半

夏麴白飛霞醫通云疹分之病半夏為主造而為麴尤佳治濕痰以薑汁白礬湯和之治風痰以薑

汁及皂莢煮汁和之治火痰以薑汁竹瀝或荆瀝和之治寒痰以薑汁礬湯入白芥子末和之此皆

造麴妙法也

根氣味辛平有毒別錄曰生微寒熟溫生令人吐熟令人下湯洗盡滑用元素曰

味辛、苦、性溫、氣味俱薄、洗而降陰、中陽也。好古曰：辛厚、苦輕、陽中陰也。入手陽明、太陰、少陰、三經之
未曰：射干為之使、惡皂莢、畏雄黃、生薑、乾薑、秦皮、
龜甲、反烏頭。**權曰**：柴胡為之使、忌羊血、海藻、飴糖。
元素曰：熱痰佐以黃芩、風痰佐以南星、寒痰佐以
乾薑、痰痞佐以陳皮、白木多用則瀉脾胃、諸血證
及口渴者、禁用為其燥津液。**主治**：傷寒、寒熱、心下

堅、胃脹、欬逆、頭眩、咽喉腫痛、腸鳴、下氣、止汗。本經消

心腹、胃膈、痰熱、滿結、欬上、氣心、下急、痛、堅痞、時

氣、嘔逆、消癰、腫療、痿黃、悅澤、面目墮胎。別錄消痰下

肺氣、開胃、建脾、止嘔吐、去胃中痰、滿生者、摩癰腫

瘰癧、瘦氣。甄權治吐食、反胃、霍亂、轉筋、腸腹冷、痰瘡

大治寒痰及形寒、飲冷傷肺而欬、消胃中痞、膈上

痰、除胃寒、和胃氣、燥脾濕、治痰厥、頭痛、消腫、散結

元治眉稜骨痛。震亨補肝風虛。好古除腹脹、目不得瞑

白濁、夢遺、帶下。時珍

發明 權曰：半夏使也、虛而有痰、氣宜加用之。頌曰：

潤也。半夏之辛以散逆氣、結氣、除煩、嘔、發音、聲、行
水氣而潤腎燥。好古曰：經云：腎主五液、化為五濕、
自入為唾、入肝為泣、入心為汗、入脾為痰、入肺為
涕、有痰曰嗽、無痰曰欬、痰者因欬而動、脾之濕也、
半夏能泄痰之標、不能泄痰之本、泄本者泄腎也、
欬、无有形痰、有形無形、則潤有形、則燥、所以為流濕、
潤燥也。俗以半夏為肺藥、非也。止嘔吐、為足陽明、
除痰、為是太陰、柴胡為之使、故今柴胡湯中用之。

雖為止嘔亦助柴胡黃芩主往來寒熱是又為足
少陽陽明也宗稟曰今人惟知半夏去痰不言益
脾蓋能分水故也脾惡濕濕則濡困困則不能治
水經云水勝則瀉一男子夜數如廁或教以生薑
一兩半夏大棗各三十枚水一升菟瓶中慢火燒
為熟水時呷之便已也趙繼宗曰丹溪言二陳湯
治一身之痰世醫執之凡有痰者皆用夫二陳內
有半夏其性燥烈若風痰寒痰濕痰食痰則相宜
至于勞痰失血諸痰用之反能燥血液而加病不
可不知機曰俗以半夏性燥有毒多以貝母代之
貝母乃太陰肺經之藥半夏乃太陰肺經陽明胃
經之藥何可代也夫欬嗽吐痰虛勞吐血或痰中
見血諸鬱咽痛喉痺肺癰肺痿癰疽婦人乳難此
皆貝母為向導半夏乃禁用之藥若涎者脾之液
美味膏粱炙博皆能生脾胃濕熱故涎化為痰又
則痰火上攻令人昏憤口噤偏癱僵仆蹇澀不語
生死旦夕自非半夏南星曷可治乎若以貝母代
之則翹首待斃矣時珍曰脾無留濕不生痰故脾

為生痰之源肺為貯痰之器半夏能主痰飲及腹
脹者為其體滑而味辛性溫也涎滑能潤辛溫能
散亦能潤故行濕而通大便利竅而泄小便所謂
辛走氣能化液辛以潤之是矣黎古張氏云半夏
南星治其痰而欬嗽自愈丹溪朱氏云二陳湯能
使大便潤而小便長聊攝成氏云半夏辛而散行
水氣而潤腎燥又和劑局方用半硫丸治老人虛
秘皆取其滑潤也世俗皆以南星半夏為性燥誤
矣濕去則土燥痰涎不生非二物之性燥也古方
治咽痛喉痺吐血下血多用二物非禁劑也二物
亦能散血故破傷打撲皆主之惟陰虛勞損則非
濕熱之邪而用利竅行濕之藥是乃重竭其津液
醫之罪也豈藥之咎哉甲乙經用治夜不眠是果
性燥者乎岐伯云衛氣行于陽陽氣滿不得入于
陰陰氣虛故目不得瞑治法飲以半夏湯一劑陰
陽既通其卧立至方用流水千里者八升揚之萬
遍取清五升煮之炊以葦薪犬沸入秫米一升半
夏五合煮一升半飲汁一盃日三以知為度病新

發者覆盃則出汗出則已久者三飲而已

附方 舊十五新 法制半夏 清痰化飲壯脾順氣用

再洗如此七轉以濃米泔浸一日夜每一兩用白礬一兩半溫水化浸五日焙乾以鉛白霜一錢溫水化又浸七日以漿水慢火內煮沸焙乾收

夏法 消風熱清痰涎降氣利咽大半夏湯浸焙制

先鋪燈草一重約一指厚排半夏于上再以燈草蓋一指厚以炒豆焙之候乾取出每嚼一兩粒溫水送下

化痰鎮心 祛風利膈辰砂半夏丸用半御藥院方 夏一斤湯泡七次為末篩過以水浸三日生絹濾去滓澄清去水晒乾一兩入辰砂一錢薑汁打糊丸梧子大每薑湯下七十九丸

消痰開胃 去胸膈壅滯斗

門方用半夏洗炮焙乾為末自然薑汁和作餅濕紙裹煨香以熱水二盞同餅二錢入鹽伍分煎一盞服之大壓痰毒及酒食傷極驗

中焦痰涎 利咽清頭目進水焙乾重研每服二錢 飲食半夏泡七次四兩枯礬一兩為末薑汁打糊或者棗肉和丸梧子大每薑湯下十五丸寒痰加丁香五錢熱痰加寒水石煨四兩名

老人風痰 大肺熱不識人及王液丸 和劑局方 肺熱痰實不利半夏炮七次焙硝石半兩為末入白麵搗勻

膈壅風痰 普濟 日乾為末漿水搜作餅日乾再研為末每五兩入生龍腦一錢以漿水濃脚和丸雞頭子大紗袋盛避風處陰乾每服一丸好茶或薄荷湯嚼下

搜風化痰 定志安神利頭目辰砂化痰丸用院方 半夏麴三兩天南星炮一兩辰砂

枯礬各半兩為末薑汁打糊丸梧子大每服三十丸食後薑湯送下

風省風湯用半夏夏湯泡八兩甘草炙二兩防風四兩每服半兩薑二十片水二盞煎服

風痰頭暈嘔逆目眩面色青黃脈弦者水煮金花丸用生半夏生天南星寒水石煨各一

兩天麻半兩雄黃二錢小麥麵三兩為末水和成餅水煮浮起漉出搗丸梧子大每服五十丸薑湯下極効亦治風痰咳嗽二便不通

風痰頭痛紫古活法機要方

風痰濕痰青壺丸半夏一斤天南星半兩各湯炮晒乾為末薑汁和作餅焙乾入神麴半兩白木末四兩枳實末二兩薑汁麵糊丸梧子大每服五十丸薑湯下

風痰喘逆凡兀欲吐眩一兩雄黃三錢為末薑汁浸蒸餅丸梧子大每服三十丸薑湯下已吐者加檳榔

痰喘急千縉湯用半夏湯洗七箇甘草炙皂莢炒各一

劑局 上焦熱痰效嗽制過半夏一兩片黃芩末二錢薑汁打糊丸綠豆大每服七十丸淡薑湯食後服此

周憲 肺熱痰嗽制半夏括樓末薑汁打糊丸梧子大每服二三十丸

熱痰欬嗽白湯下或以括樓瓢煮熟丸一濟生方

煩熱面赤口燥心痛脉洪數者小黃丸用半夏天南星各一兩黃芩一兩半為末薑汁浸蒸餅丸梧子大每服五七十九丸食後

小兒痰熱效嗽驚悸半薑湯下

濕痰欬為末牛膽汁和入膽內懸風處待乾蒸餅丸綠豆大每薑湯下三五丸

嗽面黃體重嗜臥驚兼食不消脉緩者白朮丸用半夏南星各一兩白朮一兩半為末薄糊丸梧子大每服五七十九丸

氣痰欬嗽面自氣促洒漸惡薑湯下

活法機要 小者王粉丸用半夏南星各一兩官桂半兩為末糊丸梧子大每服五十丸薑湯下

結胃痛 正在心下按之則痛脉浮滑者小陷胃湯
主之半夏半升黃連一兩栝樓實大者一

箇水六升先煮栝樓徒三升去滓內二
味煮取二升分三服 仲景傷寒論 **濕痰心痛**

喘急者半夏油炒為末粥糊丸綠豆
大每服二十九薑湯下 丹溪心法 **急傷寒病** 夏

四錢生薑七片酒一盞煎 **結痰不出** 語音不清年
服 胡洽居士百病方 結痰不出 久者亦宜至

粉丸半夏半兩桂心一字草烏頭半字為末薑汁
浸蒸餅丸茨子大每服一丸夜卧含嚥 活法機

要停痰冷飲 嘔逆橘皮半夏湯用半夏水煮熟陳
二盞煎一盞溫 橘皮各一兩每服四錢生薑七片水

服 和劑局方 **停痰留飲** 胃膈滿悶氣短惡心飲
半夏湯用半夏泡五兩茯苓三兩每服四錢薑

七片水一鍾半煎七分甚捷徑 和劑局方 **交**
作嘔 嘔家本渴不渴者心下有支飲也或似喘

不喘似嘔不嘔似喘不喘似嘔心下憤憤並宜
小半夏湯用半夏炮七次一升生薑半升水

七升煮一升五合分服 張仲景金匱要畧 **噦逆**
欲死 半夏生薑湯主 痘瘡噦氣上方同 **嘔噦眩悸** 穀

得下半夏加茯苓湯半夏一升生薑半斤茯苓三
兩切以水七升煎一升半分溫服之 金匱要畧

目不得眠 見發 心下悸忪 半夏麻黃丸 半夏麻黃
每服二十九日 傷寒乾嘔 半夏熟洗研末生薑湯

三 金匱要畧 嘔逆厥逆 內有寒痰半夏一升洗滑焙研小麥麵
日三服稍增至十五枚旋覆花旋覆花再作嘔

忌羊肉餒糖此乃許仁則方也 外臺秘要 **嘔**
吐反胃 大半夏湯半夏三升人參三兩白蜜一升

升半溫服一升日再服亦 **胃寒噦逆** 停痰留飲薑
右膈間支飲 全匱要畧

本堂編目

半夏湯泡炒黃二兩藿香葉一兩丁皮半薑小兒
每服四錢水一盞薑七片煎服

吐瀉 脾胃虛寒齊州半夏泡七次陳粟米各一錢
半薑十片水棧半煎入分溫服

小兒痰吐 或風壅所致或咳嗽發熱飲食即嘔半
夏泡七次半兩丁香一錢以半夏末水

和包丁香用麵重包煨熟去麵為末生薑自然汁
和丸麻子大每服二三十九丸陳皮湯下

議 妊娠嘔吐 半夏二兩人參乾薑各一兩為末薑
汁麵糊丸梧子大每飲服十九丸

服 仲景 霍亂腹脹 半夏桂等分為末水
金匱要畧 服方寸七 肘後方 小兒腹

脹 半夏末少許酒和丸粟米大每服二九薑湯下
不瘥加之或以火炮研末薑汁調貼臍亦佳

子母 黃疸喘滿 小便自利不可除熱半夏生薑各
秘錄 半斤水七升煮一升五合分再服

有人氣結而死心下暖以此 伏暑引飲 脾胃不利
少許入口遂活 張仲景方 消暑丸用

半夏醋煮一 斤 麵糊丸梧子大每服五十九丸熱湯下 和劑局方

老人虛秘 及痰癖冷氣半硫丸半夏炮炒生
子太每空 心溫酒下 黃等分為末自然薑汁煮糊丸如梧

五世准 和劑局方 失血喘急 吐血下血崩中帶
痛癢用半夏搥扁以薑汁和麵包煨黃研末米

糊丸梧子大每服三十丸白湯下 直指方 白
濁夢遺 半夏一兩洗十次切破以本猪苓二兩同

山藥糊丸梧子大每服三十丸伏苓湯送下腎氣
閉而一身精氣無所管揖妄行而遺者宜用此方

蓋半夏有利性猪苓導水使腎氣通也 八般頭風
與下元虛憊者不同 諸學士本事方

三次見効半夏末入百草霜少許作紙燃燒烟就
鼻內啗之口中含水有涎吐去再含 衛生寶鑑

少陰咽痛 生瘡不能言語聲不出者苦酒湯主之
半夏七枚打碎雞子一枚頭開一敷去

黃納苦酒令小蒲入半夏在內以錄子坐于炭火

上煎三沸去滓置盃中時時嚥之極驗未瘥更作

傷寒論喉痺腫塞生半夏末啗鼻內骨哽在咽夏

白芷等分為末永服方寸匕外臺秘要重舌木舌脹大塞口

當驅出忌羊肉外臺秘要含漱之○夏方半夏二寸枝木煮過再炮乾時小

乘熱以酒一升浸之密封良久熱漱冷吐之小

兒顛陷乃冷也水調半面上黑氣半夏焙研米醋

不計遍數從早至晚如此三日皂癩風眉落生半

屎燒焦等分為末自然盤腸生產產時子腸先出

薑汁日調塗聖濟錄盤腸生產產後不收者名

中則上也婦人良方產後運絕和九大豆太

網鼻中即愈此扁小兒驚風生半夏一錢皂角半

名噴驚散直指卒死不寤半夏末吹鼻中即活南岳

五絕急病一曰自溢二曰墻壓三曰溺木四曰魘

入鼻中心溫者一日癰疽發背及乳瘡半夏末雞

可活也子母秘錄後吹奶腫痛半夏一箇煨研酒服立愈一方以末

打撲瘀疔水調半夏末塗之一宿遠行足趺上方同

簡金刃不出入骨脈中者半夏白飲等分為末酒

李釜大飛蟲入耳生半夏末麻油調塗蝎蟻螫人

半夏末木調塗之立蝎蟻五孔相通者半夏末水

止錢相公方蝎蟻五孔調塗之日二聖

惠咽喉骨哽半夏白芷等分為末水服方寸

方外臺秘要

莖涎主治煉取塗髮眉墮落者即生

蚤休 本經 下品

釋名 蚤休 別錄 蚤休 紫河車 重臺 重樓 金線

唐本 三層草 綱目 七葉一枝花 蒙草 甘遂 唐本 白甘遂 珍

曰蟲蛇之毒得此治之即休故有蚤休整休諸名
重臺三層因其葉狀也金線重樓因其花狀也其
遂因其根狀也紫
河車因其功用也

集解 別錄曰蚤休生山陽川谷及宛句蔡曰今謂
重樓金線者是也一名重臺南人名為甘遂

一莖六七葉似王孫鬼曰菟麻葦葉有二三層根
如肥大莖蒲細肌脆白保昇曰葉似鬼曰牡蒙年
父者二三重根如紫參皮黃肉白五月采根日乾
大明曰根如尺二蜈蚣大如肥紫莖蒲續曰即紫

河車也今河中河陽華鳳文州及江淮間亦有之
葉似王孫鬼曰等作二三層六月開黃紫花藥赤
黃色上有金絲垂下秋結紅子根似肥薑皮赤肉
白四月五月采之宗奭曰蚤休無旁枝止一莖挺
生高尺餘顛有四五葉葉有岐似苦楸中心又起
莖亦如是生葉惟根入藥用時珍曰重樓金線處
處有之生于深山陰濕之地一莖獨上莖當葉心
葉綠色似芍藥凡二三層每一層七葉莖頭夏月
開花一花七瓣有金絲藥長三四寸王屋山產者
至五七層根如鬼曰蒼木狀外紫中白有粘糯二
種外丹家采制三黃砂永入藥洗切焙用俗語云
七葉一枝花深山是我家癰疽如遇者一似手拈
也

根氣味苦微寒有毒 大明曰冷無毒伏雄 主治驚

癰搥頭弄舌熱氣在腹中 本經 癰疾癰瘡除蝕下三

蠱去蛇毒錄別空食一升利水唐本治胎風手足搐能

吐泄瘰癧明大去瘡疾寒熱時珍

發明恭曰摩醋傳癰腫蛇毒甚有效時珍曰紫河

腫者宜之而道家有服食法不知果有益否也

附方新服食法紫河車根以竹刀刮去皮切作段

漉出疑入新布袋中懸風處待乾每服三九五

更初面東念咒井水下連進二服即能休糧若

飲食先以黑豆煎湯飲之次以藥丸煮稀粥漸漸

食之呪曰天明氣清金雞鳴吾今服藥欲長生吾

今不饑復不渴賴得神仙草有靈

錢冷水下○慢驚發搐帶有陽證者白耳遂末即

衛生易簡方○慢驚發搐帶有陽證者白耳遂末即

同于慢火上炒焦黃研勻每服一字錢乙小兒方中鼠莽毒金

煎麝香薄荷湯調下錢乙小兒方中鼠莽毒金

重樓根磨水服即愈集簡方○咽喉殺賊腫痛用重臺赤色者川

消半兩半夏泡一分為末聖惠方

丸艾子大含之校正併入圖經

鬼臼本經釋名九臼本經天臼別錄鬼藥綱目鮮毒別錄爵犀本經馬目

毒公本經害母草圖經羞天花綱目木律草綱目瑞田草綱目

獨脚蓮本草獨荷草土宿山荷葉綱目旱荷綱目八角盤

綱目唐婆鏡弘景曰鬼臼根如射于白而味甘九臼

其葉如鏡如盞如荷而新苗生則舊苗死故有鏡

本草綱目卷之二十七

盤荷蓮害母苗名蘇東坡詩集云瑤田草俗號唐
婆鏡卽本草鬼白也歲生一曰如黃精根而堅瘦
可以辟穀宋祁劍南方物贊云蓋天花蜀地處處
有之依莖綴花蔽葉自隱俗名羞天子改爲羞寒
花卽本草鬼白也贊云肯寒而茂莖修葉廣附莖
作花葉蔽其上以其自蔽若有羞狀○則有羞天
草與此不同
卽海芋也

集解

別錄曰鬼白生九具山谷及窞旬二月八月
射干木葦又似鉤吻有兩種出錢塘近道者味甘
上有叢毛最勝出會稽吳興者大而味苦無叢毛

力劣今馬目毒公狀如黃精根其白處似馬眼兩
柔潤今方家多用鬼白而少用毒公不知此那復
乖越如此茶曰鬼白生深山巖石之陰葉如莖
重樓輩生一莖莖端一葉亦有兩岐者年長二莖
莖枯則爲一白假令生來二十年則有二十白豈
惟九白耶根尚皮髮並似射干今俗用多是射干

而江南別送一物非真者今荊州當陽縣硤州遠
安縣襄州荊山縣山中並貢之亦極難得頌曰今
江寧府滁舒商齊杭襄峽州荆門軍亦有之並如
蘇恭所說花生莖間赤色三月開後結實又一說
鬼白生深山陰地葉六出或五出如鴈掌莖端一
葉如繖且時東向及暮則西傾蓋隨日出沒也花
紅紫如荔枝正在葉下常爲葉所蔽未常見日一
年生一莖既枯則爲一白及八九年則八九日失
然一年一白生而一白腐蓋陳新相易也故俗名
害母草如芋魁烏頭葦亦然新苗生則舊苗死前
年之舊腐矣而本草注謂全似射干今射干體狀
雖相似然曰形淺薄與鬼白大異鬼白如八九箇
南星側比相疊而色理正如射干用者當使人求
苗采之市中不復有也時珍曰鬼白根如天南星
相疊之狀故市人道謂小者爲南星大者爲鬼白
殊爲謬誤按黃山谷集云唐婆鏡葉底開花俗名
羞天花卽鬼白也歲生一白滿十二歲則可爲藥
今方家乃以鬼燈檠爲鬼白誤矣又鄭樵通志云

鬼白葉如小荷形如鳥掌年長一莖莖枯則根為一白亦名八角盤以其葉似之也據此二說則似是今人所謂獨脚蓮者也又名山荷葉獨荷草早荷葉八角鏡南方處處深山陰密處有之北方惟龍門山至屋山有之一莖獨上莖生葉心而中空一莖七葉圓如初生小荷葉面青背紫揉其葉作瓜李香開花在葉下亦有無花者其根全似蒼木紫河車丹爐家采根制三黃砂末或云其葉八角者更靈或云其根與紫河車一樣但以白色者為河車赤色者為鬼白恐亦不然而庚辛王冊謂蚤休陽草旱荷陰草亦有分別陶弘景以馬日毒公與鬼白為二物殊不知正是一物而有二種也又唐獨孤滔丹房鏡源云木律車有二種根皆似南星赤莖直上莖端生葉一種葉凡七瓣一種葉作數層葉似蓖麻面青背紫而有細毛葉下附莖開一花狀如鈴鐸倒垂青白色黃藥中空結黃子風吹不動無風自搖可制砂末按此即鬼白之二種也其說形狀甚明

根氣味辛温有毒

別錄曰微温弘景曰甘温有毒權曰苦之才曰畏垣衣

主治殺蟲毒鬼疰精物辟惡氣不祥逐邪解百毒

本經殺大毒療欬嗽喉結風邪煩惑失魄妄見去目

中膚翳不入湯

別錄

主尸疰殭蹠勞疾傳尸瘦疾

下死胎治邪瘧癰疽蛇毒射工毒

時珍

發明

頌曰古方治五尸鬼疰百毒惡氣多用之又曰今福州人三月采田草根葉焙乾搗末

蜜丸服

附方

新子死腹中 腫破不生此方累驗救人歲萬數也鬼曰不拘多少黃色者去

毛為細末不用篩羅只蒸之如粉為度每服一錢無灰酒一盞同煎入分通口服立生如神名一字

神散 婦射工中人 寒熱瘧瘡鬼曰葉一把善

于金 黑黃急病 黑黃面黑黃身如土色不妨食

脉耳會至泉章門心俞用生鬼曰搗汁一

射干 本經

釋名烏扇 烏扇 烏吹 烏蒲 鳳翼 鬼扇

土宿 扁竹 網 仙人掌 土宿 紫金牛 土宿 野萱花 網 草薑 別

黃遠 吳普弘景曰射干方書多音夜頌曰射干之

爾而陶氏以夜音為疑蓋古字音多通呼若漢官

僕射主射事而亦音夜非有別義也時珍曰其葉

叢生橫鋪一面如鳥翅及扇之狀故有烏扇烏扇

鳳翼鬼扇仙人掌諸名俗呼扁竹謂其葉扁生而

根如竹也根葉又如蠻薑故曰草薑○嬰音所甲切扇也

集解 別錄曰射干生南陽山谷田野三月三日采

之人言其葉是為尾而復有為頭此若相似爾恐

非烏扇也又別有射干相似而花白莖長似射人

之執竿者故阮公詩云射干臨層城此不入藥用

恭曰為尾葉都似射干而花紫碧色不抽高莖根

似高良薑而肉白名為頭保昇曰射干高二三尺

花黃實黑根多鬚皮黃黑肉黃赤所在皆有二月

八月采根去皮日乾藏器曰射干為尾二物相似

人多不分射干即人間所種為花草名鳳翼者葉

如鳥翅秋生紅花赤點為尾亦人間所種苗低下

於射干狀如為尾夏生紫碧花者是也大明曰射

干根潤形似高良薑大小赤黃色淡硬五六七八

月采頌曰今在處有之人家種之春生苗高一二

尺葉大類蠻薑而狹長橫張疎如翅狀故名烏

扇葉中抽莖似萱草莖而強硬六月開花黃紅色

射干 藥上之有細文秋結實作房中子黑色一說射干多
生山崖之間其莖雖細小亦類木故荀子云西方
有木名曰射干莖長四寸生於高山之上是也陶
弘景所說花白者自是射干之類(震亨曰)根為射
干葉為烏翼紫花者是紅花者非(機曰)按諸注則
射干非一種有花白者花黃者(時珍曰)射干即今
溪獨取紫花者必會試有驗也(時珍曰)射干即今
扁竹也今人所種多是紫花者呼為紫蝴蝶其花
三四月開六出大如萱花結房大如胡椒頗似泡
桐子一房四隔一隔十餘子子大如胡椒而色紫
極硬咬之不破七月始枯陶弘景謂射干為尾是
一種蘇恭陳藏器謂紫碧花者是為尾紅花者是
射干韓保昇謂黃花者是射干蘇頌謂花紅黃者
是射干白花者亦其類朱震亨謂紫花者是射干
紅花者非名執一說何以憑(依謹按)張揖廣雅云
為尾射干也易通卦驗云冬至射干生土宿真君
本草云射干即扁竹葉扁生如側手掌形莖亦如
之青綠色一一種紫花一一種黃花一一種碧花多生江

南湖廣川浙平陸間八月取汁煮雄黃伏雌黃制
丹砂能拒火據此則為尾射干本是一類但花色
不同正如牡丹芍藥菊花之類其色各異皆是同
屬也大抵入藥功不相遠藏器曰射干之名有三
佛經射干貂攬此是惡獸似青黃狗食人能緣木
阮公云射干臨瀛城者是樹殊有高大者本草射
干是草即今人所種者也

根修治 數日凡采根先以米泔水浸一宿漉出
然後以篋竹葉煮之從午至亥日乾用

氣味苦平有毒 別錄曰微溫久服令人虛保昇曰
微寒權曰有小毒元素曰苦陽中

主治 欬逆上氣喉痺咽痛不得消息

散結氣腹中邪逆食飲大熱 經本療老血在心脾間

欬唾言語氣臭散胃中熱氣 別錄苦酒摩塗毒腫

治疰氣消痰血通女人月閉甄權消痰破癥結胃腸

滿腹脹氣喘痰癆開胃下食鎮肝明目大治肺氣

喉痺為佳宗奭去胃中癰瘡元利積痰疝毒消結核

震亨時珍降實火利大腸治瘡母

發明震亨曰射干屬金有木與火行太陰厥陰之積痰使結核自消甚捷又治便毒此足厥陰

濕氣因疲勞而發取射干三寸與生薑同煎食前服利三兩行甚效時珍曰射干能降火故古方治

喉痺咽痛為要藥孫真人于金方治喉痺有烏雞膏張仲景金匱玉函方治欬而上氣喉中作水雞

聲有射干麻黃湯又治瘡母龜甲煎丸亦用烏雞燒過皆取其降厥陽相火也火降則血散腫消而

痰結自解瘰癧自除矣

附方舊二咽喉腫痛射干花根山豆根陰乾為傷

寒咽閉腫痛用生射干猪脂各四兩合煎令焦去滓每噉棗許取瘡龐安常傷寒論

痺不通漿水不入外臺秘要用射干一片含燕汁良○醫方大成用扁竹新根搗汁燕之大

腑動即解或醋研汁噉引涎出亦妙○便民方用紫蝴蝶根一錢黃芩生甘草結梗各五分為末水

調頓服立愈二便不通諸藥不効紫花扁竹根生名奪命散水邊者佳研汁一盞服即

通○水蠱腹大動搖水聲皮膚黑用鬼扇根搗陰

疝腫刺發時腫痛如刺用生射干搗汁乳癰初腫

扁竹根如僵蠶者同萱草根為末蜜調傅之神効永類方中射干毒生瘡者

麻各二兩水三升煎二升温服以滓傅瘡上姚僧坦集驗方

本草綱目卷之七十五

本經
下品

釋名烏園 本經 **根名烏頭** 時珍曰並以形命

集解 別錄曰烏鴛生九疑山谷五月采弘景曰方家言是射干苗而主療亦異當別是一種方

用烏頭當是其根療體相似而本草不題恭曰此草所在有之人家亦種葉似射干而濶短不抽長

莖花紫碧色根似高良薑皮黃肉白嚼之戟人咽喉與射干全別射干花紅抽莖長根黃有白保昇

曰草名烏尾根名烏頭亦謂之烏根葉似射干布地生黑根似高良薑而節大數節相連九月十月

采根日乾時珍曰此即射干之苗非別一種也肥地者莖長根粗瘠地者莖短根瘦其花自有數色

諸家皆是強分陳延之小品方言東海烏頭即山跋者亦說也東海出之故耳

氣味苦平有毒 恭曰有小毒 **主治** 蠱毒邪氣鬼疰諸毒

破癥瘕積聚去水下三蟲 本經 **殺鬼魅療頭眩** 別錄

附方 舊一 **飛尸遊蠱** 着喉中氣欲絕者烏尾根削去皮納喉中摩病處令血出

為佳 陳藏 **鬼魅邪氣** 四物烏頭散東海烏頭黃

謂本草拾遺 **鬼魅邪氣** 牙即金牙莖若子防葵為

未酒服方寸七欲令病人見鬼增防葵一分欲令

知鬼又增一分立驗不可多服 陳延之 小品方

王簪 綱

釋名白鶴仙 時珍曰並以花象命名

集解 時珍曰王簪處處人家栽為花草二月生苗成叢高尺許柔莖如白菘其葉大如掌團而

有尖葉上紋如車前葉青白色頗嬌莖六七月抽莖莖上有細葉中出花朵十數枚長二三寸本小

未大未開時正如白至搔頭簪形又如羊肚蘑菇之狀開時微綻四出中吐黃藥頗香不結子其根

無常

可也

已別正以成也

以心為體之於一

至心則自是

至心一子神功

細至一上

已

Handwritten cursive text, likely a signature or name.

Handwritten cursive text, possibly a name or title.

Handwritten cursive text, possibly a name or title.

Handwritten cursive text, possibly a name or title.

Handwritten cursive text, possibly a name or title.

Handwritten cursive text, possibly a name or title.

船部 映

阿 映

連生如鬼曰射于生薑上有鬚毛舊莖死則根有
一曰新根生則舊根腐亦有紫花者葉微被皆鬼
自射于
之屬

根氣味甘辛寒有毒主治搗汁服鮮一切毒下骨

硬塗癰腫時珍

附方新乳癰初起內消花即王簪花取根插婦人

斷產白鶴仙根白鳳仙子各一錢半紫葳二錢半

以酒半盞服之不可着牙解斑蝥毒王簪根搗水

齒能損牙齒也摘玄方王簪花根山裏紅果根同搗自

趙真人下魚骨王簪花根山裏紅果根同搗自

濟急方然汁以竹筒灌入咽中其骨自

下不可着牙齒王簪根乾者一錢白

雁仙乾坤生喜心刮骨取牙王簪根乾者一錢白

少許點疼處即自落也余居士選奇方

葉氣味同主治蛇虺螫傷搗汁和酒服以渣傳之

中心留孔洩氣時珍

鳳仙綱

釋名急性子救旱珍珠綱金鳳花綱小桃紅救夾

竹桃救海蔘音染指甲草救菊婢時珍曰其花頭

然如鳳狀故以名之女人采其花及葉包染指甲

其實狀如小桃老則迸裂故有指甲急性小桃諸

名宋光宗李后諱鳳官中呼為好女兒

花張宛丘呼為菊婢韋居呼為羽客

集解時珍曰鳳仙人家多種之極易生二月下子
五月可再種苗高二三尺莖有紅白二色其

大如指中空而脆葉長如尖似桃柳葉而有露齒
極間開花或黃或白或紅或紫或碧或雜色亦自
變易狀如飛禽自夏初至秋盡開謝相續結實纍
然大如櫻桃其形微長色如毛桃生青熟黃犯之
即自裂皮卷如拳苞中有子似蘿蔔子而小褐色
人采其肥莖灼配以充蒿笋嫩華酒浸一宿亦可
食但此草不生蟲蠹蜂蝶亦不近恐亦不能無毒也

子氣味甘苦温有小毒主治產難積塊噎膈下骨

哽透骨通竅時珍

發明時珍曰鳳仙子其性急速故能透骨軟堅抱
人烹魚肉硬者投數粒即易軟爛是其驗也

緣其透骨最能損齒與玉簪根同凡
眼者不可着齒也多用作人眼

附方新**產難催生**鳳仙子三錢研末水服勿近牙
外以蓖麻子隨年數搗塗足心

○集**噎食不下**鳳仙花子酒浸三宿晒乾為末酒
丸綠豆大每服八粒温酒下不可

多用即急性子
也**咽中骨哽**欲死者白鳳仙子研水
一大呷以竹筒灌入咽

其物即軟不可輕牙或
為末吹之**牙齒欲取**金鳳花子研末
入硃少許點疼

牙根取之**小兒痞積**急性子水菘花子大黃各一
兩俱生研末每味取五錢外

用皮硝一兩拌勻將白鷓鴣一箇或白鴨亦可去
毛屎剖腹勿犯水以布拭淨將末裝入內用線紮

定沙鍋內入水三碗重重紙封以小火煮乾將鷓
鴨翻調焙黃色冷定早晨食之日西時疾軟三日

大便下血病去矣忌冷物
百日**孫天仁集効方**

花氣味甘滑温無毒主治蛇傷搗酒服即解又治

腰脇引痛不可忍者研餅晒乾為末空心每酒服

三錢活血消積

時珍

附方 新 風濕臥牀

不起用金鳳花柏子仁朴補水瓜蒌湯洗浴每日二三次內服

獨活寄生湯
吳曼扶壽精方

根葉氣味苦甘辛有小毒主治雞魚骨哽誤吞銅

鐵杖撲腫痛散血通經軟堅透骨

時珍

附方 新 咽喉物硬

金鳳花根嚼爛噙嚙骨自下雞骨尤効即以溫水漱口免損齒

也亦治誤吞銅鐵

打杖腫痛鳳仙花葉搗如泥塗腫破處乾則又上

夜血散即愈冬月收取乾者研末

馬患諸病白鳳仙花

水和塗之 葉廷器通變要法

坐拏草 宋圖經

集解

頌曰生江西及滁州六月開紫花結實采其苗入藥甚易得後因人用有効今顯貴重時珍

珍曰按一統志云出吉安永豐縣

氣味辛熱有毒主治風痺壯筋骨兼治打撲傷損

蘇頌

發明

頌曰神醫普救方治風藥中已有用者時珍曰危氏得効方麻藥煮酒方中用之聖濟錄

治膈上虛熱咽喉噎塞小便赤瀉神困多睡有坐拏丸用坐拏草大黃赤芍藥木香升麻麥門冬黃芪木通酸棗仁薏苡仁枳殼等分為末

附錄押不蘆

時珍曰按周密癸辛雜志云漠北回回地方有草名押不蘆土人以少許

磨酒飲即通身麻痺而死加以刀斧亦不知至三日則以少藥接之即愈御藥院中亦儲之貪富汚吏罪甚者則賜服百日丹皆用此也昔華佗能割腸胃豈不有此等藥耶

曼陀羅花

綱目

釋名風茄兒

綱目

山茄子

時珍曰

法華經言佛蓋曼陀羅花又道家

北斗有陀羅星使者手執此花故後人因以名花曼陀羅梵言雜色也茄為因葉形爾姚伯聲花品呼為惡客

集解

時珍曰曼陀羅生地土人家亦栽之春生夏長獨莖直上高四五尺生不旁引綠莖碧葉

葉如茄葉八月開白花凡六瓣狀如牽牛花而大攢花中折駢葉外包而朝開夜合結實圓而有丁拐中有小子八月采花九月采實

花子氣味辛温有毒主治諸風及寒濕脚氣煎湯

洗之又主驚癇及脫肛并入麻藥

時珍

發明

時珍曰相傳此花笑釀酒飲令人笑舞采釀酒飲令人舞予常試之飲須半酣更令一人或笑或舞引之乃驗也八月采此花七月采火

麻子花陰乾等分為末熱酒調服三錢少頃昏昏如醉割捨灸火宜先服此則不覺苦也

附方

新

面上生瘡

曼陀羅花晒乾研末少許貼之

衛生易簡方

小兒慢

驚曼陀羅花七朵重一字天麻二錢半全蝎炒十枚天南星炮丹砂乳香各二錢半為末每服半錢薄荷湯調下

大腸脫肛

曼陀羅子連殼一對橡御藥院方

五沸入朴硝少許洗之

儒門事親

羊躑躅 本經下品

釋名黃躑躅 綱目 **黃杜鵑** 蒙筌 **羊不食草** 拾遺 **關羊花** 綱目

驚羊花 綱目 **老虎花** 綱目 **王枝** 別錄弘景曰羊食其葉躑躅而死故名關當作

惱惱亂也

集解 別錄曰羊躑躅生太行山川谷及淮南山三

似鹿葱不可近眼恭曰花亦不似鹿葱正似旋花

色黃者也保昇曰小樹高二尺葉似桃葉花黃似

瓜花三月四月采花日乾頌曰所在有之春生苗

似鹿葱葉似紅花莖高二四尺夏開花似凌霄花

山石榴葉正黃色羊食之則死今嶺南蜀道山谷

遍生皆深紅色如錦繡然或云此種不入藥時珍

曰韓保昇所說似桃葉者最的其花五出葉鱗皆

黃氣味皆惡絲頰所謂深紅色者即山石榴名紅

躑躅者無毒與此別類張揖廣雅謂躑躅一名决

光者誤矣决光央明也按唐李紳文集言駱谷多

山枇杷毒能殺人其花明艷與杜鵑花相似樵

者識之其說似羊躑躅未知是否要亦其類耳

花氣味辛温有大毒 權曰惡諸石及麴不入湯使

伏丹砂礪砂雌黃畏卮子

主治賊風在皮膚中淫淫痛温瘡惡毒諸痺 本經邪

氣鬼疰蠱毒 別錄

本草綱目卷之二十一

二十一

云五百九

發明 頌曰古之大方多用躑躅如胡洽治時行赤

散及治五嗽四滿丸之類并治風諸酒方皆

雜用之又治百病風濕等魯王酒中亦用躑躅花

今醫方將脚湯中多用之南方治蠱毒下血有躑

躑花散云甚勝時珍曰此物有大毒曾有人以其

根入酒飲遂至于斃也和劑局方治中風癱瘓伏

虎丹中亦用之不多服耳

附方 新 風痰注痛

餅既上蒸四五遍以稀葛囊盛

之臨時取焙為末蒸餅丸梧子大每服三丸温酒

下腰脚骨痛空心服手

臂痛食後服大良續傳

信痛風走注

黃躑躅根一把糯米一盞黑豆半盞

便能動也

風濕痺痛

手足身體收攝不遂肢節

醫學集成 一合酒二合調服五分

聖惠方 風蟲牙痛

草烏頭二錢半為末化臘丸豆大

綿包一丸咬之追涎海上仙方

附錄 山躑躅

時珍曰處處山谷有之高者四五尺

而花繁一枝數萼二月始開花如羊躑躅而蒂如

石榴花有紅者紫者五出者千葉者小兒食其花

味酸無毒一名紅躑躅一名山石榴一名映山

紅一名杜鵑花其黃色者即有毒羊躑躅也

不喫草

拾遺(藏器曰)生蜀川山谷葉細長任諸草

風血補益攻諸病煮之亦浸酒服(時珍曰)

此草似羊躑躅而云無毒蓋別有此也

芫花

本經 校正 自木部 移入此

釋名 杜芫 赤芫 去水 毒魚 頭痛花 兒

草 敗華 根名黃大戟 蜀桑 別錄(時珍曰)芫

詳去水言其功毒魚言其性大戟言其似也俗人

因其氣惡呼為頭痛花山海經云首山其草多芫

也 集解 別錄曰芫花生淮源川谷三月三日采花陰

黑華有紫赤白者三月實落盡葉乃生三月采花

五月采葉八月九月採根陰乾(保昇曰)近道處處

本草綱目卷之二十三

有之苗高二三尺葉似白前及柳葉根皮黃似桑根正月二月花發紫色葉未生時收采日乾葉生花落即不堪用也頌曰在處有之宿根舊枝莖紫長一二尺根入土深三五寸白色似榆根春生苗葉小而尖似楊柳枝葉二月開紫花頗似紫荊而作穗又似藤花而細今絳州出者花黃謂之黃芫花時珍曰顧野王玉篇云杭木出豫章莖莖及卵不壞洪邁容齋隨筆云今饒州處處有之莖幹不純是木小人爭鬪者取葉按擦皮膚輒作赤腫如被傷以誣人至和溫擦卵則又染其外若赭色也

修治

弘景曰用當微熬不可近眼時珍曰芫花留數年陳久者良用時以好醋煮十數沸去醋以水浸一宿曬乾用則毒減也或以醋炒者次之

氣味

加錄曰苦微溫晉曰神農黃帝禹公苦有毒扁鵲岐伯苦李當

之有大毒多服令人洩之才曰央明為之使反甘草主治欬逆上氣喉鳴喘

咽腫短氣蟲毒鬼瘡疔痕癰腫殺蟲魚本經消胃中

痰水喜唾水腫五水在五臟皮膚及腰痛下寒毒

肉毒根療疥瘡可用毒魚別錄治心腹脹滿去水氣

寒痰涕唾如膠通利血脉治惡瘡風痺濕一切毒

風四肢攣急不能行步甄權療欬嗽瘡瘡大明治水飲

痰癖脇下痛時珍

發明

時珍曰張仲景治傷寒太陽證表不解心下湯主之若表已解有時頭痛出汗惡寒心下有水氣乾嘔痛引兩脇或喘或欬者十棗湯主之蓋小

青龍治未發散表邪使水氣自毛竅而出乃內經所謂開鬼門法也十棗湯驅逐裏邪使水氣自大

小便而洩乃內經所謂潔淨府去陳莖法也夫飲有五皆由內啜水漿外受濕氣鬱蓄而為留飲流于肺則為支飲令人喘欬寒熱吐沫背寒流于胸則為懸飲令人欬唾痛引缺盆兩脇流于心下則為伏飲令人胸滿嘔吐寒熱眩運流于腸胃則為痰飲令人腹鳴吐水胸脇支滿或作泄瀉忽肥忽瘦流于經絡則為溢飲令人沉重注痛或作水氣附腫芫花大戟其逐之性逐水洩濕能直達水飲窠囊隱僻之處但可徐徐用之取効甚捷不可過劑洩人真元也陳言三因方以十棗湯藥為末用棗肉和丸以治水氣喘急浮腫之證蓋善變通者也楊士瀛直指方云破癖須用芫花行水後便養腎可也好古曰水者肺腎脾三經所主有五臟六腑十二經之部分上而頭中而四肢下而腰脚外而皮毛中而肌肉內而筋骨脉有尺寸之殊浮沉之別不可輕瀉當知病在何經何臟方可用之若誤投之則害深矣芫花與甘草相反而胡洽居士方治痰癖飲癖以甘遂大戟芫花大黃甘草同用蓋欲其大吐以泄濕因相反而相激也

正誤 慎微曰三國志云魏初平中有青牛先生常服芫花年百餘歲常如五六十人時珍曰芫花乃下品毒物豈堪久服此方外迂怪之言不足信也

附方 舊五新卒得欬嗽 芫花一升水三升煮汁一升食五枚必時後卒嗽有痰芫花一兩炒木一升煮四沸去滓白糖入半斤每服棗許

勿食酸鹹物○喘嗽失音 暴傷寒冷喘嗽失音取張文仲備急方 芫花連根一虎口切暴乾冷病人以薦自裹春令灰飛揚入其七孔中當

錄乾嘔脇痛 傷寒有時頭痛心下痞滿痛引兩脇驗乾嘔短氣汗出不惡寒者表解裏未

和也十棗湯主之荒花熬其途大戟各等分為散
以大棗十枚水一升半煮取八合去滓納藥強人
服一錢羸人半錢平旦服之當下利病水腫支飲
除如不除明旦更服仲景傷寒論

及癖飲用十棗湯加大黃甘草五物各一兩大棗
十枚同煮如法服一方加芒硝一兩胡治百病
方天行煩亂中煩亂欲死用荒花一斤水三升煮
取一升半漬故布薄胃上不過再三薄

熟則除當溫四肢護厥逆也千金方
在腹脇堅痛者荒花炒二兩硃砂五錢為水蠱脹
末蜜丸梧子大每服十九棗湯下直指

滿荒花枳殼等分以醋煮荒花至爛乃下枳殼煮
爛搗丸梧子大每服三十丸白湯下普濟方
酒疸尿黃發黃心懊痛足脛滿荒花椒目等
分燒末水服半錢日二服肘後背腿

痛一點痛不可忍者荒花根末米醋調傅之如
痛不住以帛束之婦人產後有此尤宜袖珍
諸般氣痛荒花醋煮半兩玄胡索炒一兩半為末
每服一錢男子元臟痛葱酒下瘡疾烏

梅湯下婦人血氣痛當歸酒下諸氣痛
香附湯下小腸氣痛茴香湯下仁存
一經候不通荒花根三兩剉炒黃為末每服一
錢桃仁煎湯調下當利惡物而愈聖方催生

云胎荒花根剝皮以綿裹點麝香套入
陰穴三寸即下攝生妙用方產後惡物
不下荒花當歸等分炒為心痛有蟲荒花一兩醋
未調一錢服保命集炒雄黃一錢

為未每服一字溫醋牙痛難忍諸藥不効荒花末
湯下乾坤生意牙痛難忍諸藥不効荒花末
溫水漱之白禿頭瘡荒花末猪脂和癰腫初起荒
未和膠塗癰癤已潰荒花根皮搗作搽挿入則不
之千金

痔瘡乳核荒根一握洗淨入木臼搗爛入少水絞
汁於石器中慢火煎成膏將絲線於膏

內度過以線繫痔當微痛候痔乾落以紙撚蘸膏

納竅內去根當永除根也一方只搗汁浸線一夜

用不得使水經驗瘰癧初起氣壯人用光根播水一盞服

傳瀕湖便毒初起光根播水服以渣傳之得下

集簡方贅瘤焦法甘草膏筆瘰癧之四圍上三次

調別以筆粧其中勿近甘草次日縮小又以甘草

膏粧小暈三次如前仍上此藥自然焦縮危氏

得効一切菌毒因蛇蟲毒氣熏蒸所致用荒花生

方氏得効方研新汲水服一錢以利為度危

堯花音饒○本經下品

釋名時珍曰堯者饒也其花繁饒也

集解別錄曰堯花生咸陽川谷及河南中牟六月

堯花而極細白色恭曰苗似胡荽莖無刺花細黃

色四月五月收與荒花全不相似也保昇曰所在

有之以雍州者為好生岡原上苗高二尺許宗奭

曰今京洛間甚多時珍曰按蘇頌圖經言絳州所

上堯花黃色謂之黃堯花其圖小株花成簇生恐

即此堯花也生時色黃乾則如白故陶氏言細白

也或言無堯花以桃花代之取其利耳

氣味苦寒有毒別錄曰辛主治傷寒温瘧下十二

水破積聚大堅癥瘕蕩滌滌腸中留癖飲食寒熱邪

氣利水道本療痰飲欬嗽別治欬逆上氣喉中腫

滿疰氣蠱毒疰癖氣塊甄

發明 宗奭曰張仲景傷寒論以莨菪花治利者取其行水也水去則利止其意如此今用之當斟酌不可過使與不及也須有是證乃用之好古曰仲景小青龍湯云若微利去麻黃加莨菪花如雞子大熬令赤色用之蓋利水也時珍曰莨菪花蓋亦芫花之類氣味主治大畧相近

醉魚草 綱目

釋名 開魚花 綱目 **魚尾草** 綱目 **櫬木** 綱目

集解 時珍曰醉魚草南方處處有之多在壑岸邊作小株生高者三四尺根狀如枸杞莖似黃荆有微稜外有薄黃皮校易繁衍葉似水楊對節而生經冬不凋七八月開花成穗紅紫色儼如芫花一樣結細子漁人采花及葉以毒魚盡圍圍而死呼為醉魚兒草池沼邊不可種之此花色狀氣味並如芫花毒魚亦同但花開不同時為異爾按中山經云熊耳山有草焉其狀如蘇而赤華名曰

莖薺可以毒魚其此草之類與

花葉氣味 辛苦温有小毒 **主治** 痰飲成齕遇寒便發取花研末和米粉作糲炙熟食之即効又治誤食石斑魚子中毒吐不止及諸魚骨鯁者搗汁和冷水少許嚥之吐即止骨即化也又瘡成癖者以花填鯽魚腹中濕紙裹煨熟空心食之仍以花和海粉搗貼便消 時珍

莽草 本草 **校正** 自木部移入此

釋名 **茵草** 音 **芒草** 山海經 **鼠莽** 弘景曰莽本作茵字俗訛呼爾時珍曰此

本草綱目卷之二十一

物有毒食之令人迷罔故
名山人以毒鼠謂之鼠莽

正誤 別錄曰一名菹一名春草禹錫曰按爾雅云菹春草孫炎注云藥草也俗呼為菹草郭璞

注云一名芒草所見異也時珍曰菹音尾白薇也薇菹字音相近爾別錄白薇下云一名春草而此

又以為菹草蓋因孫炎之誤也今正之

集解 別錄曰莽草生上谷山谷及宛句五月采葉陰乾弘景曰今東間處處皆有葉青辛烈者

良又用搗以和陳粟米粉納水中魚吞即死浮出人取食之無妨頌曰今南中州郡及蜀川皆有之

木若石南而葉稀無花實五月七月采葉陰乾一說藤生繞木石間既謂之草乃藤生者是也宗奭

曰莽草諸家皆謂之草而本草居木部今世所用皆木葉如石南葉枝梗乾則縹綠之其臭如椒教

曰凡用葉勿用尖及孿生者時珍曰范子計然云莽草出三輔青色者善

葉修治 數日凡使取葉細剉以生甘草水蒸一二件同盛入生稀絹袋中甑中蒸一日去二件

用 煞乾

氣味辛温有毒 晉曰神農辛雷公桐君苦有毒時珍曰莽草制雌雄黃雄黃而有毒誤

食害人惟紫河車磨水服及黑豆煮汁服可解豆汁澆其根即爛性相制也 **主治風頭**

癰腫乳癰疔瘻除結氣疥瘙殺蟲魚 本經 療喉痺不通乳難頭風癢可用沐勿令人眼 **治風疽疔氣**

腫墜凝血治瘰癧除濕風不入湯服主頭瘡白禿

殺蟲與白斂赤小豆為末雞子白調如糊煖毒腫

乾更易上 **治皮膚麻痺煎濃湯淋風蟲牙痛**

本草綱目卷之十七 莽草 五尊墨

發明

頌曰古方治風毒痺厥諸酒皆用茵草今書家取葉煎湯熱含少頃吐之治牙齒風蟲及喉痺甚効宗爽曰濃煎湯淋滌皮膚麻痺周禮夔氏掌除毒物以茵草熏之則死時珍曰古方治小兒傷寒有莽草湯又瑣碎錄云思村王氏之子生七日而兩腎縮入二醫云此受寒氣而然也以疏黃茱萸大蒜研塗其腹以茵草蛇床子燒烟熏其下部而愈也

附方

舊四新五 賊風腫痺 風入五臟恍惚宜莽草膏主各二兩切以水和醋一升漬一宿猪脂一斤煎三上三下絞去滓向火以手摩病上三百度應手即瘥若耳鼻疾可以綿裹塞之 小兒風癩 聖惠方 疥癬雜瘡並宜摩之 時後 猪脂一斤煎七沸去滓摩痛處勿近目及陰日凡三四次 外臺秘要 頭風久痛 莽草煎湯沐之勿 風蟲牙痛 聖惠方

肘後方用莽草煎湯熱漱冷吐 一加山椒皮 一加獨活 一加郁李仁 一加荒花 一加川

椒細辛各等分煎湯熱漱冷吐 聖惠用莽草半

兩皂角三挺去皮子漢椒七粒為末棗肉丸芥子

大每以一九塞 瘰癧結核 茵草一兩為末鷄子白

孔中吐涎取効 取効止 癰瘡未潰 方同上得 乳腫不消 莽草小

聖惠方 為末苦酒和傳 狗咬昏悶 浸水調莽草末 豆等分

茵芋

本經 下品

釋名莞草

別錄 卑共 別錄 時珍曰 茵芋本作因頂 未詳其義莞草與蒲莞名同

集解

別錄曰茵蕒生太山川谷三月三日采葉陰 似莽草而細軟連細莖采之方用甚稀惟合瘰癧 酒大明曰出自海壚形似石楠樹生葉厚五六七

本草綱目卷之九 茵芋 聖惠方

本草綱目卷之十一
月采頌曰今雍州終州華州杭州亦有之春生苗高三四尺莖赤葉似石櫛而短厚又似石南葉四月開細白花五月結實二月四月七月采莖葉日乾

莖葉氣味苦温有毒別錄曰微温有毒權曰苦辛有小毒主治五臟邪

氣心腹寒熱羸瘦如瘡狀發作有時諸關節風濕

痺痛本經療火風濕走四肢脚弱別錄治男子女人軟

脚毒風拘急變痛甄權一切冷風筋骨怯弱羸顛入

藥灸用大

發明時珍曰手金外臺諸古方治風癩有茵積丸治風痺有茵積酒治婦人產後中風有茵積膏風濕諸方多用之茵積石南莽草皆古

人治風妙品而近世罕知亦醫家疎缺也

四方舊一茵積酒治賦風手足枯痺拘攣用茵積附子天雄烏頭秦艽女萎防風

防已石南葉躑躅花細辛桂心各一兩十二味切以絹袋盛清酒一斗漬之冬七夏三春秋五日藥

成每服一合日二服以微痺為度方茵芋丸治風

出胡治居士百病方圖經本草滯成脚氣發則痛者茵芋葉炒薏苡仁各半兩郁

李仁一兩牽牛子三兩生研末半兩右為末煉蜜丸如梧子大每服二十九五更薑棗

湯下取利未利再服取快本事方產後中風茵

五兩木防已半斤苦酒九升漬一宿猪脂四斤晉金方

石龍芮本經校正併入菜部水莖

釋名地模本經天豆別錄石能別錄魯果能別錄水莖吳普

苦董爾雅董葵郭璞胡椒菜救荒彭根別錄弘景曰

又音苦董爾雅董葵郭璞胡椒菜救荒彭根別錄弘景曰

苦董爾雅董葵郭璞胡椒菜救荒彭根別錄弘景曰

苦董爾雅董葵郭璞胡椒菜救荒彭根別錄弘景曰

葉芮芮短小故名蘇頌曰實如桑葉數各地根禹錫曰爾雅云齧苦董也郭璞云即苦董也本草言味甘而此云苦者古人語倒猶其草謂之大苦也時珍曰芮芮細尾其根之子細芮故名地根以下皆子名也水董以下皆苗名也苗作蔬食味辛而滑醫有微葵之名唐本草菜部水董係重出今依三普本草合併為一

集解

別錄曰石龍芮生太山川澤石邊五月五日采子二月八月采皮陰乾弘景曰今出近道

子形粗似蛇牀子而扁非真好者人言是菹菜子也東山石上所生者其葉芮芮短小其子狀如葶蘆黃色而味小辛此乃是真也蘇曰今用者俗名水董苗似附子實如桑根生下濕地五月熟葉子皆味辛山南者粒大如葵子關中河北者細如葶蘆氣力劣於山南者陶以細者為真末為通論又曰葶菜野生非人所種葉似葶花紫色藏器曰爾雅云葶菜草注云烏頭苗也葶菜葶天雄亦云石

龍芮葉似葶草故名水董據此則葶草是烏頭苗水董定是石龍芮更非別草也頌曰今惟出兖州一叢數莖莖青紫色每莖三葉其葉短小多刻缺子如葶蘆而色黃蘇恭所說乃水董非石龍芮也兖州所上者正與本草及陶氏說合為得其真宗藥曰石龍芮有兩種水中生者葉光而子圓陸地生者葉毛而子銳入藥須水生者陸生者又謂之天灸而補不足莖冷失精時珍曰蘇恭言水董即石龍芮蘇頌非之非矣按漢吳普本草石龍芮一名水董其說甚明唐本草菜部所出水董言其苗也本經石龍芮言其子也寇宗奭所言陸生者乃是毛葶有大毒不可食水董即俗稱胡椒菜者處處有之多生近水下濕地高者尺許其根如葶二月生苗叢生圓莖分枝一枝三葉葉青而光滑有三尖多細缺江淮人三四月采苗淪過晒蒸黑色為蔬四五月開細黃花結小實大如豆狀如初生桑椹青綠色槎散則子甚細如葶蘆子即石龍芮也宜半老時采之范子然云石龍芮出三輔色

善黃者

子根皮氣味苦平無毒晉曰神農苦平岐伯酸偏

日大戟為之使主治風寒濕痺心腹邪氣利關節

止煩滿久服輕身明目不老本平腎胃氣補陰氣

不足失精莖冷令人皮膚光澤有子別逐諸風除

心熱燥大

發明時珍曰石龍芮乃平補之藥古方多用之其

水董氣味甘寒無毒時珍曰微主治搗汁洗馬毒

瘡并服之又塗蛇蝎毒及癰腫唐久食除心下煩

熱主寒熱鼠瘦癰癰生瘡結核聚氣下瘀血止霍

亂又生搗汁半升服能殺鬼毒即吐出孟

發明說曰董葉止霍亂與香

附方舊二結核氣董菜日乾為末油煎成膏摩之

蛇咬傷瘡生董杵汁塗血疝初起胡椒菜葉按

毛茛音良校正併入毛

釋名毛建草拾遺水茛綱毛董音天灸行自灸綱猴

蒜時珍曰茛乃草烏頭之苗此草形狀及毒皆似

說也俗名毛董似水董而有毛也山人截瘡采葉

本草綱目卷之七

集解

藏器曰陶注鈎吻云或是毛茛藜去毛茛
一方云菜中有水其葉圓而光生水旁有毒蟹多
食之人誤食之狂亂如中風狀或吐血以甘草汁
解之又曰毛茛藜生江東地田野澤畔葉如芥而
大上有毛花黃色子如莢麥時珍曰毛茛藜即
今毛茛也下濕處極多春生苗高者尺餘一枝三
葉葉有三尖及細缺與石龍芮莖葉一様但有細
毛為別四五月開小黃花五出甚光艷結實狀如
欲綻青桑椹如有尖峭與石龍芮子不同人以為
鷺不食草者大誤也方士取汁煮砂伏硫沈存中
筆談所謂石龍芮有兩種水生者葉光而末圓陸
生者葉毛而未銳此
即葉毛者宜辨之

附錄海薑陰命

藏器曰陶注鈎吻云海薑生海中
赤色狀如石龍芮有大毒又曰陰
命生海中赤色着木懸其
子有大毒今無的識者

葉及子氣味辛温有毒主治惡瘡癰腫疼痛未潰

搗葉傳之不得入瘡令肉爛又患瘡人以一握微

碎縛於臂上男左女右勿令近肉即便成瘡和薑

搗塗腹破冷氣藏器

牛扁本經
下品

釋名扁特

唐本扁毒

集解

別錄曰牛扁生桂陽川谷弘景曰今人不復
識此恭曰此藥似莖草石龍芮葷根如秦莖
而細生平澤下地田野人名為牛扁瘰牛莖甚多
太常名扁特或名扁毒保昇曰今出寧州葉似石
龍芮附子等二月八月采根日乾頌曰今潞州一
種便特六月有花八月結實采其根苗搗末油講

殺蟻虱主療大都相似疑即扁特也但聲近而字訛耳

氣味苦微寒無毒**主治**身皮膚瘡熱氣可作浴湯殺

牛虱小蟲又療牛病本經

附錄虱建草拾遺藏器曰苦無毒主蟻虱按汁沐頭虱盡死人有誤吞虱成病者搗汁

服一小合亦主諸蟲瘡生山足濕地發葉似山丹微赤高一二尺又有水竹葉生水中葉如竹葉而

短小可生食亦去蟻虱

蕁麻蕁音尋宋圖經

釋名毛蕁時珍曰蕁字本作蕁杜子美有除蕁草詩是也

集解頌曰蕁麻生江寧府山野中時珍曰川黔諸處甚多葉邊有刺高二三尺葉似花桑或青

或紫背紫者入藥上有毛芒可畏觸人如蜂螫蝥蠱以人溺濯之即解有花無實冒冬不凋按按水

中能毒魚

氣味辛苦寒有大毒吐利人不止**主治**蛇毒搗塗

之蘇頌風癩初起以此點之一夜皆失時珍

格注草唐本草

集解泰曰出齊魯山澤間葉似蕨根紫色若紫草根一株有二十許二月八月采根五月六月

采苗日乾用

氣味辛苦温有大毒**主治**蠱痊諸毒疼痛等唐本

海芋綱目

本草綱目卷之二十七 五十一

釋名 觀音蓮 網 羞天草 玉 天荷 日 隔河仙 見

集解 時珍曰 海芋生蜀中今亦處處有之春生苗高四五尺大葉如芋葉而有幹夏秋間抽莖

開花如一瓣蓮花碧色花中有葉長作穗如觀音像在圓光之狀故俗呼為觀音蓮方士號為隔河

仙云可變金其根似芋魁大者如升盤長六七寸蓋野芋之類也庚辛玉冊云羞天草陰草也生江

廣深谷澗邊其葉極大可以禦雨葉背紫色花如蓮花根葉皆有大毒可煨粉霜珠砂小者名野芋

宋祁海芋贊云木幹芋葉擁腫盤戾農經弗載可以治癰

氣味 辛有大毒 主治 瘡瘡毒腫風癩伏疔砂 時

附錄 透山根 時珍曰 按嶠嶼神書云透山根生蜀中山山谷草類藤蕪蕪可以點鐵成金昔

有人采藥誤斫此草刀忽黃軟成金也又庚辛玉冊云透山根出武都取汁點鐵立成黃金有大毒

大誤食之化為紫水又有金其草亦生蜀中狀如馬齒莧而色紅模鐵成金亦有大毒入口殺人頂吏為紫水也又何遠春渚紀聞云劉均父吏部罷官歸成都都有水銀一篋過峽篋漏急取渡旁叢草塞之久而開視盡成黃金矣宋初有軍士在澤州澤中割馬草歸鎌皆成金以草燃金亦成黃金又臨安僧法堅言有客過於潛山中見一蛇腹脹醫一草以腹磨之而消念此草必能消脹取置篋中夜宿旅館聞隣房有人病腹脹呻吟以釜煎藥一盃與服頃之不復聞聲念已安矣至旦視之其人血肉俱化為水獨骸骨在牀爾視其釜則通体成金矣觀何氏所載即是透山根乃金莫草之類如此毒草不可不知故備載之耳

鉤吻 本經 下品

釋名 野葛 本 毒根 吳 胡蔓草 經 斷腸草 綱 黃藤 綱

火把花

弘景曰言其入口則鉤人喉吻也或言吻當作挽字牽挽人腸而絕之也時珍曰此草雖名野葛非葛根之野者也或作冶葛王充論衡云冶地名也在東南其說甚通廣人謂之胡蔓草亦曰斷腸草入人畜腹內即粘腸上半日則黑爛又名爛腸草真火謂之火把花因其花紅而性熱如火也岳州謂之黃藤

集解

別錄曰鉤吻生傳高山谷及會稽東野折之青烟出者名固活二月八月采晉曰秦鉤吻一名除辛生南越山及寒石山或益州葉如葛赤莖大如箭而方根黃色正月采之恭曰野葛生桂州以南村墟間巷間皆有彼人通名鉤吻亦謂苗為鉤吻根名野葛蔓生其葉如柿其根新采者皮白骨黃宿根似地骨嫩根如漢防已皮節斷者良正與白花藤相類不深別者頗亦惑之新者折之無塵氣經年以後則有塵起從骨之細孔中出今折枸杞根亦然本草言折之青烟起者名固活為

良亦不達之言也人誤食其葉者致死而羊食其苗大肥物有相伏如此博物志云鉤吻蔓生葉似是葵是也時珍曰嵇含南方草木狀云野葛蔓生葉如羅勒光而厚一名胡蔓草人以雜生蔬中毒人半日輒死段成式酉陽雜俎云胡蔓草生邕州容州之間叢生花扁如卮子而稍大不成朵色黃白其葉稍黑又按嶺南衛生方云胡蔓草葉如茶其花黃而小一葉入口百竅潰血人無復生也時珍又訪之南人云鉤吻即胡蔓草今人謂之斷腸草是也蔓生葉圓而光春夏嫩苗毒甚秋冬枯老稍緩五六月開花似檉柳花數十朵作穗生嶺南者花黃生滇南者花紅呼為火把花此數說皆與吳普蘇恭說相合陶弘景

正誤

弘景曰五符經亦言鉤吻是野葛最毒而言似是非兩物野葛是根狀如牡丹所生處亦有毒飛鳥不得集今人用合膏服之無嫌鉤吻別是一物葉似黃精而莖紫青心抽花黃色初生極類

黃精故人采多惑之遂致死生之反或云鉤吻是
毛茛參錯不同未詳云何數日凡使黃精勿用鉤
吻真似黃精只是葉有毛鉤子二個黃精葉似竹
葉又曰凡使鉤吻勿用地精莖苗相同鉤吻治人
身上惡毒瘡其地精殺人也恭曰鉤吻蔓生葉如
柿陶言飛鳥不集者妄也黃精直生葉似柳及龍
膽草殊非比類毛茛乃有毛石龍芮與鉤吻何干
頌曰江南人說黃精莖苗稍類鉤吻但鉤吻葉頭
極大而根細與蘇茶所說不同恐南北之產異也
禹錫曰陶說鉤吻似黃精者當是蘇說似柿葉者
別是一物也又言苗名鉤吻根名野葛者亦非通
論時珍曰神農本草鉤吻一名野葛一句已明草
木狀又名胡蔓草顯是藤生具普蘇茶所說正合
本文陶氏以藤生為野葛又指小草為鉤吻復疑
是毛茛乃祖雷敷之說諸家遂無定見不辨其蔓
生小草相去遠也然陶雷所說亦是一種有毒小
草但不得指為鉤吻爾昔天姥對黃帝言黃精益
壽鉤吻殺人乃是以此二草善惡比對而言陶氏不

審疑是相似遂有此
說也餘見黃精下

氣味辛温大有毒

普曰神農辛雷公有毒殺人時
珍曰其性大熱本草毒藥止云

有大毒此獨變文曰大有毒可見其毒
之異常也之才曰半夏為之使惡黃芩

主治金瘡

乳疔中惡風欬逆上氣水腫殺鬼疰蠱毒

本經破癥

積除脚膝痺痛四肢拘攣惡瘡疥蟲殺鳥獸搗汁

入膏中不入湯飲

別錄主喉痺咽塞聲音變

吳普

發明

藏器曰鉤吻食葉飲冷水即死冷水發其毒
也彼土毒死人懸尸樹上汁滴地上生菌子

收之名菌葉烈於野葛也薤菜搗汁解野葛毒取
汁滴野葛苗即萎死南人先食薤菜後食野葛二
物相伏自然無苦魏武帝嗽野葛至尺先食此菜
也時珍曰按李石續博物志云胡蔓草出二廣廣

人負債急每食此草而死以誣人以急水吞即死
急慢水吞死稍緩或取毒蛇殺之覆以此草澆水
生菌為毒藥害人葛洪肘後方云凡中野葛毒口
不可開者取大竹筒洞節以頭拄其兩脇及臍中
灌冷水入筒中數易水須臾口開乃可下藥解之
惟多飲甘草汁人尿汁白鴨或白鶩斷頭瀝血入
口中或羊血灌之嶺南衛生方云即時取雞卵抱
未成雛者研爛和麻油灌之吐出毒物乃生稍遲
也即死

本草綱目卷之七
毒
...

