



大和本草綱目
六

服部文庫
117
403
6



117
403
6

大倭本 艸卷之六

艸之二

藥類

人參

參字本ハ薄ク或省テ作ハ漫ク有ル如ク人形手足者故入

參ト云朝鮮ノ産ヲ爲ス上品ト中夏ニ用之中夏ニハ又

上黨ノ人參ヲ爲ス良宗奭曰上黨者其價與銀等中

夏ニハ以與銀等ヲ爲ス甚貴ト今本邦自朝鮮來者價貴

重奚ハ翅ハ十倍ニ于銀故往往有偽作者以沙參薺ハ茈

桔梗等其餘藥品而亂真者多矣須擇之精詳大

率用於堅實而不偽作者而可也○唐人參ハ長

崎ニ來ル者朝鮮ニ次ケリ○ヒケ人參ハ人參ノヒケチ

本草綱目卷之六

リ是亦自異邦來ル非本邦ノ産堅實ナル故大人
參ノ性淡キニハニサル○節人參ト云モノアリ葉并
ニ似タリ根ニ節アリヒゲ多シ山中陰隲ノ地ニ生ス
其鬚ヲヒゲ人參ト云節人參ハ其大丸根ナリ藥肆
ニ其根及鬚ヲウル味苦ノ氣ヲ泄ス人參ノ氣味ニ
似ズ不可用草醫是ヲ以人參ニ代ヘ用ユ甚非也又
近年世上ニセリ人參トテ并ニ似タル草ヲウフ味モ
并ニ似タリカゴノ如クナル其根味甘シ未詳其
性本邦ノ醫人參ノ價貴キ故代ヘ用ル物多シト
トキ人參ツル人參此ニ種ハ砂參ナリ人參ニ代ヘ

用テ雖無大補然レトモ害ナシ又萎糲ハ治一切不
足之症用代人參不寒不燥大有殊功本草綱目
及李中梓カ本草通玄ニモイヘリ人參ノ代藥ニ此三
種ノ外ハ用ヘカラスタ益ナキノニニアラス又害之
也或漏蘆ト防葵ヲ人參ニ代ヘ用ヒ又薺芫桔梗
ヲ以人參ニ代ヘ用ル人アリ或右ノ藥ニ甘草ヲ煮染
テ偽リ賣ル是皆性各別ナリ不可用延喜式日本
諸州ノ土産ニ人參アリ是亦砂參ヲ以人參トセシ
ナルヘシ

○王海藏肺熱不宜用人參ノ説アリ王節齊亦因

而和之謂參芪能助肺火陰虛火動之病大忌服
人參若曾服過多者亦難治李時珍及李中梓並
引仲景東垣丹溪之說而辨二王之非出于綱目
正誤及李中梓本草通玄○弘景曰人參納新器
中密封可經年不壞頗二風日ヲ見レハ蛙シクモヤスレ細辛
二相ニシエ置ヘシ李言聞曰忌鐵器然レ凡諸醫往々
不忌鐵○人參ヲ煎レ或水ニ浸レ汁ヲ取テノニ或人
參膏ニ煎レ其滓ヲ售ル事アリ不可不察倭漢如此ナリ
○人參生根昔朝鮮ヨリ來江戶アリ今ハ無之
沙參 中華ヨリ來ル沙參二種アリ一種ハ桔梗ニ似タ

リ是ヲ用ユヘシ又人參ニ換用ユヘシ一種ハ綠ヲツカ子
タル如ク細長シ味ハヨケレトモイフカレ何物ナルヲレ
ラス日本ニテナキ人參ト云物沙參ナリ葉ハ杏
葉ニ似テ莖ハ桔梗ノ如シ根ハ桔梗ノ如ナル心ナシ輕
淡ナリ春苗ヲ生ス秋多ク小花ヲヒラク淡碧ウスアラ色ナリ其
形ツリカ子ニ似タリ根ハ人參ニ似テ味甘シ又ツリカ子
人參ト云筑紫ノ野人シレテハト云本艸ニ所載ニヨク
合ヘリ小兒ハ生ニテ食ス凡日本ニテ世醫人參ニ代用ル
モノ多シ且此沙參ヲヨレトスヘシ本艸ニ王好古カ曰張
潔古老人言以沙參代人參取其味耳也然人參

八補五藏之陽沙參補五藏之陰安得無異トイヘリ
然レバ古六毛沙參ヲ以人參ニ代ヘ用ユ好古又曰肺受
火邪則宜以沙參代之又人參ヲ用ユレハ氣ヲフサ
ク症アリ或肺熱アリト上氣スル症ニハ人參ヲ勿用沙
參ヲ用ユヘシ證類本草ニ徐州人參トアルハ沙參ナリ
シカラバ人參ニ代用ルニハ是ヲヨレトスヘシ但其體質輕
虚氣味淡薄不_ニ多用不可見效比_ニ他藥其功力甚
弱又一種ツク人參ト云物アリ本州沙參ノ集解
陳藏器カ説ニイヘル羊乳根是也人取根當薺芫ト
イヘリ其外陳藏器カ説皆ツル人參ニ合ヘリ別錄曰

羊乳温無毒主頭腫痛益氣長肌肉今案ニ羊乳ハ
ツルアリツルノ長サ一三三尺莖紫ニシテニ葉アリ其
處人手ヲフレサレトモ自香ハレ靈草ナリ莖ヲ折レハ乳
汁ノ如ナル白汁イツ根ノ形蘿蔔ノ如シ皴アリ又ニ
ルキアリ味甘シ花ハ鈴ヲ俯セタルニ似テトキ人參
ノ花ヨリ大ナリコレモ沙參ノ類ナリ別種也其肥大ナ
ルヲ二月以前八月以後ニトリテワリテ陰干ニスレハ
潤澤アリ香氣アリテ味甘ク用之補益ス其枝葉
ノ形狀香氣凡草ニ非ス是亦沙參トノ用ユヘシ本草
序例下藥名異同門ニモ羊乳ヲ以沙參トス輕淡

也可多用

桔梗 春宿根ヨリ生苗山野ニ多シ秋碧花ヲ開ク
又白花アリ八重アリ藥ニハ單ノ碧花アル根ヲ冬
月及正二月ニ採ル爲良小根ハ性薄シ大ヲ可用
花鏡曰以雞糞壅則茂ル○實ヲ一ケバ早ク生長
ス一年開花根亦大ナリ花ヲ賞スルニ苗ヒキ時カレバ
叢生ノ花多ク莖不高シテヨシ

薺花 與桔梗葉相似而比桔梗則大似杏葉且與
沙參相似根長味甘今人沙參ヲアヤミリテ薺花
トス或薺花ヲ以沙參トス紛ヤスレ分別スベシ本草

沙參薺花ノ集解可參考異名杏葉沙參ト云杏葉ヨ
ク似タルヲ是トスベシ

甘草 莖毛葉毛荊ノコトシ根ハカツラノ如シ根則其艸
也大ナルヲ良トス小ナルハ性薄シ昔ハ日本ニアルヲ
シラス近世甲斐國ヨリ多ク出ツ唐ヨリ來ル甘草ト
クスベシニ少モ不異性ヨシト云奥州ニモアリ鼠好テ
食シテ根タヘヤスシテヲウヘテ二年ノ後シフトル
其根如竹根繁茂ス或云深山所々有之黃芪葉
ニ似テコハレ○千金方云甘草解百藥毒蘇頌云常
帶甘草備急若含甘草而食物不吐者非毒物也

○醫書ニ甘草ヲ用ル事與他藥等分ナリ中華ノ人稟性厚ク強シ故肥甘ヲ好ミ多食シテ無害能峻補ヲ受ク飲饌ノ書ニ所載烹調ノ饌具ヲ見テ可知胃氣弱ク順リヤスル也本邦ノ人ハ薄弱ナリ不能受峻補甘草ヲ多服スレハ寒氣中滿藥力停滯入故倭醫之用甘草他藥ノ十分一或五分一ヲ用ユ甄權曰諸藥中甘草爲君治乳石之毒解草木毒調和衆藥有功故有國老之號本草序例曰凡用純寒純熱之藥及寒熱相雜並宜用甘草以調和之惟中滿者禁用甘爾入門曰甘草太抵脾胃

氣有餘如心下滿及腫脹嘔吐痢疾初作皆不可用下焦藥亦少用恐緩不能達凡藥宜少用多用則泥膈而不思食抑恐緩藥力而少効

白朮蒼朮 時珍云古方一朮通用後人有蒼白之分寇宗奭曰蒼朮氣味辛烈白朮微辛苦而不烈○白朮強脾胃進飲食補虛止汗止瀉李中梓曰補脾胃之藥更無出其右者食停滯者有痞積者皆用又曰蒼朮發汗而去風寒濕下氣而消痰食水開鬱有神功○蒼朮ヲキサンテ燒ケハ邪氣ト惡臭ヲ去リ疫氣ヲ除ク常ニタクベシ爲鹿朮糊和

レ引ノテ大塚香トシ陰乾シ貯ヘシ

黄耆 綱目ニ又作黄芪○本草承日日出綿上者爲良故謂綿黃耆非謂其柔韌如綿也○其製法考本草用蜜炙アリ塩水ニ浸メ乾ス灸ルアリ李中梓曰古人制黃耆多用蜜炙思易以酒炙既助其達表又行其泥滯也若補腎及崩帶淋濁藥中須鹽水炒之○今案心腹ニ泥滯シ氣ヲ塞クニ酒ニ浸シ焙リ或塩水ニ浸シ焙ルヘシ蜜炙泥滯ス

當歸 山州長池邊ニ多クツクル江州膽次山ノ自然生ハ根形小ナレト乾シテ香氣甚ク油多ク如シ自然生ト圃ニウフルト形味不同自然生ハ形小シ圃ニウフ

レバ大也凡藥ハ中華ノ産ヲ爲佳然長池ノ當歸大和ノ地黄ハ唐ニシサレリト云伊吹山ノ外ニモ高山處々ニアリ圃ニ栽ルニ風フキ通ゼサル所ニウフレハ花開クトシナリ當年生スル地ヲカヘ他所ニウツシ三年ニ至リトレバ根大也其年ニトレハ小ナリ植處ノメグリニ他草生セハ拔去ヘシ生ナル時煮テ食スニ味ヨシ生ナルヲ其テカゲ干シタルハ年ヲテモ潤アリ味甘ク虫ハミヤスタク久シク保カタキ故藥店ニアルハ皆蒸煮テホシタル物也故性ヨハシ長池ヨリ來ル生ナルヲ乾シテ熱湯ニ浸メ又乾ヘシ如此スレ

ハ虫クハス性ヨシ味最ヨシヨク乾タルヲロセハキ蠶ニ
入テ固ク封シ時々ホセハ虫ハニス身尾トモニ其ニシラ
ケハ虫ハミヤスレ身ト尾ト別ニ悉ク引サクヘシ大ナル
ハニ三割ルヘシ刻ミ置テ日久クハカヒ生シ氣味又
ケテアリ、

地黄 生熟トモニ肥大ナルヲ可用熟ハ生地黃ヲ五象
ニテ蒸スヘシ藥肆ヨリ來ヲ必不可用好酒ニ砂仁ヲ末
ヲ入拌テ地黄ヲ不刻ノ浸シ柳甑ニカケ陶釜ニテ度々
蒸スヘシ鐵鍋ニテ不可蒸今日蒸シ冷ヘテ後明日又
右ノ砂仁酒ニヒタシ蒸ヘシ一日ノ内ニテモヨク冷テ後蒸

ベシ蒸後竹刀ニテ刻ミ焙ル○生地黃ハ刻テ酒ニヒタシ
日ニ乾シテ炒ル或生薑汁ニ浸シテ炒ル夏アリ○和地
黃ノ上品ハ大和ヨリ出ツ唐ヨリ來ルニマサレリ大和ニ
地黄村アリ多ク産スコレヲウフル下濕ノ地ヲイ
ハ上ニアクタアルヲイム又新糞ヲ忌ム間遠クウ
ヘテ其間ニ久シキ糞水ヲソクヘシ甚繁昌ス生
ナルヲツキシボリ汁シヘトリ土ナベニテ煮テ膏ト
スルハ性最ヨシ○本艸洞詮云熟地黄以薑汁炒則
不泥膈然地黄乃濡潤之品若用薑汁變爲辛辣
失其本性惟以砂仁酒拌九蒸九曝蓋地黄性泥

得砂仁之香而竄スラ和合五藏之氣歸宿丹田此得
用地黃之精微者也 今案時珍亦用砂仁製地
黃之宜コトヲイヘリ綱目砂仁條下ニ見エタリ脾
胃虚ノ人ハ味丸ハ味丸ヲ久ク服ク往往泄瀉ヲ病
コトアリ人ニヨリ可用捨服地黃人忌ニ白ニ白葱
蒜蘿蔔也出于丹溪心法又俗醫松蔓菁ヲモ地黃
ヲ服スル人ニ忌ト云ハ非也

紫蘓 ウラヲモテ紫色ナルヲ用ユ久早ニアハ葉ノ色カ
ハリ性アレ梅雨前又ハ梅雨後ニ早ク葉ヲツミト
ルベレ六月ノ比葉早ニイタズウルハレキハ性最ヨレ葉

ヲツミ取り半日日ニホシテ後カケ干ニシ收ムヘレウフル
ニ葉ヲ忌ム本艸綱目紫蘓集解時珍云今有一種
花紫蘓其葉細齒密紐如剪成之狀香色莖子並
無異者ナレ入稱ス回回蘓云篤信案此紫蘓山野ニ有之
形狀氣味與紫蘓不異只其葉細ニ莖子モ細ナリ
香氣ツ子ノ紫蘓ニ比スルニ猶烈レ時珍所謂花紫蘓是
ナルベレ○國俗ニ朝鮮紫蘓ト稱スルアリ莖葉常ノ
紫蘓ニ異ナラス只ウラヲモテ共ニ紫ニシテ香氣ニサレ
リ是ヲ用テ可也○生葉魚膽ニ加ヘ食ス魚毒ヲ去
リ香氣アリ梅醬ニ和ス又煮テヒタレ物トス茹トス

ルモ可ナリ干タルヲ飯上ニシキテ蒸食モヨシ又葉盛
ナル時トリテ一日日ニ干シ未曾テアエテ日ニホ
シ壺ニ收メシク是皆胃ヲ開キ食氣ヲメクラス其
穗其子亦食スベシ

薄荷 一種アリ國俗ニ龍薄荷ト云ヲ用ユヘシ是龍
腦薄荷ナリ氣味香ク辛シ鼻ニトホル一種非薄荷
ト云ハ香氣アシ不可用龍薄荷家圃ニ又ハ四五月雨
後ニ早ク葉ヲツミトリ半日日ニホシテ後カゲボシニス
ヘシ乾ノ後器ニ納メ或厚キ紙袋ニ包ラクヘシ生葉ヲキ
サミ臈ニ加ヘ又煎茶煖酒ニ和シテノム本州ニ毛茶ニ代

ヘテノムト云ヘリ瘦弱久ク食ヘカラス猫クラハ醉フ
猫ノ酒ナリト云猫ノ咬タルニ汁ヲヌルベシ相制スル也蜂
蛇ニサシタルニ葉ヲモシテ付ヘシ

川芎 時珍云出蜀中者爲川芎出江南者爲撫芎
皆因地而名也○川ハ蜀ナリ川芎ノ葉ヲ名藤蕪本
艸曰川芎不可久服多令人暴死沉存中亦云然
荊芥 本艸約言曰性涼而輕能涼血疎風諸瘡風
熱皆當用之陳久者良○本州ニ荊芥及魚蟹河
豚一切無鱗魚又黃鱗魚ヲ食テ後荊芥ヲ食ヘハ
吐血レ或死又曰服荊芥忌食魚時珍曰荊芥乃日

用之藥其相反如此○荊芥八穗ヲ用テ良レ久キ
ガヨレ魚ト同食スル夏忌ム荊芥ヲ服スル病家ニ教
ユヘレ

萎蕤 詳テ于黃精條下

黃精 黃精ト萎蕤ト相似タリ黃精ハ莖青レ萎蕤
ハ莖紫ナリ萎蕤根ハ蘆根相似タリ藥肆ニ生薑手
黃精ト稱スルハ是眞ノ黃精也地黄手ノ黃精ト稱
スルハ萎蕤也黃精萎蕤ノ葉有兩々相對者有不
相對者相對スルハ一レナリ萎蕤ノ和名京都ニテカラス
ユリト稱ス黃精ハ根ツク子イモノ如ク莖葉青黃色

ニレテ長レ萎蕤ハ根細長ク莖赤ク多ク桃枝ノ如ク葉
短ク青白色粉ノ如クニ白レ黃精ハ葉尖アリ萎蕤
ハ葉ノサキヒノ如ク時珍曰南陽活人書曰萎蕤ハ一
切不足之證ヲ治ス用テ代參者其不寒不燥大有
殊功又時珍曰黃精萎蕤性味功用大抵相近而
萎蕤之功更勝一物雖通用亦可ナリ李中梓本
艸通玄ニモ用代人參トヘリ篤信案ニ今ノ人黃精
ノ性ヨキヲ知テ萎蕤ノ性最ヨキヲ不知ハ何ソヤ萎蕤
ハ人參ニカヘ用ユヘレ本艸ニ歲蕤トモカケリ黃精萎
蕤通用スヘレ性頗同レニ一種共ニ根ノ長二三寸許

ニ折テ植フニシテモウフヘレ黄精根ハ草薺似故ア
ニトコロト云

地榆 ワレモカウ也京大坂ノ植木屋ニアリノコキリ
草ヲ地榆トスルハアヤニリ也別ワレモカウト云物アリ
芒類ナリ花如穂似荻花

香附子 上代ハ藥ニ不用陶弘景曰方藥不復用是梁
ノ時モ猶未爲藥而用也○今案ニ古人ノ詩ハ莎草
ヲ多多作レリ然レ厄古昔要藥ナル夏ヲ不知レテ
不用後世ニハ用之テ要藥トス然ラハ本草ニ不載
藥ニモ猶功用アル物多カルヘレ本草香附子ノ集

解ニ時珍此事ヲ論セリ○軒岐救正論曰香附雖爲
快氣宜鬱之聖藥婦人所必需但味苦氣辛苦主
泄辛主散而一切陰陽氣血虛弱者忌之若脾胃氣
虛弱作痞虛寒生脹宜用四君六君或加薑桂治
之中氣既健痞脹自消此治本法也云云丹溪亦
謂此藥性燥○本州時珍云香附子或生或炒或
以酒醋塩水浸生則上行胸膈外達皮膚熱則下
走肝腎外徹腰足炒黑則止血今案凡香氣アル物
ハ火ヲ忌香附子ハ生ニテ用炒ニテ用則止ル藥ノ外
常ニ炒過スヘラス病ニ隨テ生ト炒ト黒炒ト三種用

ユヘレヤウニ過シテ用ヘカラス

忍冬

諸ノカツラ皆右ニトフ只忍冬ノカツラ左ニト
故ニ左纏藤ト云花開夕時白シ一二日ヲヘテ黄ニ
變ス故金銀花ト云四月ニ花ヲトリ陰乾ニス莖葉ハ
時ニ不拘トリテカケ于ニス莖葉花性同一切ノ
腫物諸瘡久不愈ニ煎シ服ス甚妙ナリ腫物久
シク穴アキ漏トナリ常ニ膿汁出或不出シ久
不愈ニ酒ニ浸夕日ニホシ爲末服ス或到テ煎服ス
久用ユヘレ必効アリ惡瘡ナト久不愈ニ日々煎服ノ
效アリ真ニ妙藥ト云ヘシ屢驗アリ試用テ得效多ク久

多シ其外功能多シ本州ニミエタリ至賤藥至貴ノ功
アリ或茶ニカヘテ煎シ服ス久シク服スレハ益アリ花
毛茶ニ加ヘテ服ス香ヨシ又生乾トモニ煮テ豆油ヤウユニ和シ
食スヘシ

續斷 俗ニ鬼アサミヲ續斷ナリト云非也與大小薺
不同葉如苧花似益母

葶藶 ナツナノ類也薺ヨリ大ナリ葉似薺ニ四月細
黄花ヲ開ク甜苦一種アリ甜ハ味ヨシ薺ニサレリ可
食四月ニモ不老柔軟ナリ其實ハヒラケテ圓シ

連翹 有兩種一種其枝條柔軟依物而生一種其

莖剛不依_レ物而特_レ立並花葉同皆有實與_レ自中華
來者不異但蔓生者其實氣味稍劣_レリ二月黃花
ヲヒラク四片アリ可賞其蔓甚長_レ正月ニ黃壤ノ土ニ
挾セハ能活ク竹棚ヲ作り其上ニ蔓ヲ引テ繁延セシ
ム花美ハシ

附子 時珍曰烏附毒藥非_レ危病不用而補藥ノ中必
加_レ引導ス其功甚捷又曰凡用烏附藥並宜_レ冷服
者熱因寒用也本草ニ葉石龍芮及艾ニ似タリ莖
方ナリト云紫碧花ヲヒラク花ヲ國俗トリカブトニ云○
附子製法本草通玄曰附子沸湯泡少頃去皮臍

切作四極用甘草濃汁一鍾慢火煮之汁乾爲度
隔紙焙乾或用童便製者止可速用不堪藏也又
薛己醫案ノ説ヨシ凡此藥急ニ製シカタシ兼テ製
シ貯フヘシ又外科正宗ニモ製法アリ可考用○附子
臍ハ向上生苗之處也非生根處○川烏頭ハ附子ノ
母ナリ本艸ニ烏頭ハ芋魁ノ如シ附子ハ其側ヨリ生
ス芋ノ子ノ如シト云母ニ附タル子ナリ故ニ附子ト名
ツク別録ニ曰長キ者三寸以上ナルヲ天雄ト云附子ノ
形正シク小_レ空ヲスエタル如ク節角スクチク重廿十文見
以上ナル者尤良トス十文目以上ハ一レナリ五文目以

上モ良ト本草ニイテリ大ナルヲ良トス禹錫云天雄強
志令人武勇力作不倦淮南子注天雄ヲ雄雞ノ
腸中ニ納テ搗テ食ヘ令人勇○艸烏頭トハ川烏頭
ノ野生ナリ一物ナリトイヘ凡別ナリ是附子ノ母ニアラ
ス苗葉ハ同シ然レ川烏頭草烏頭兩種ナリ混同ス
ヘカラス本艸綱目ニ川烏頭ハ附子ノ下ニ加ヘ艸烏頭
ハ別ニ烏頭ト名ヲ立異名草烏頭ト云烏喙ハ烏頭
有兩岐者名兩頭尖射罔ハ烏頭ノ前膏也時珍云
草烏頭取汁煎シ晒ノ爲毒藥射禽獸名射罔有大
毒又曰草烏頭射罔乃至毒之藥非若川烏頭附

子人所栽種加以釀制殺其毒性之比○顯昭法
師曰ト、キノ矢トハ奥ノ夷ハ鳥ノ羽ノ莖ニ附子ヲヌリテ
射ル篤信曰今モ蝦夷人ハ附子ヲ矢レリニヌリテ獸ヲ
射ルト云其名ヲブスト云是艸烏頭ニテ煎タル射罔ヲ云テ
ルヘレ艸烏頭亦功能多シ本草可考○白附子ハ與附
子別種ナリ少似タリ是亦有大毒

茵陳 川原ニアリ故カハラヨモキト云冬春ノ嫩葉ハ表
裏白シテ夏ノウラノ色ノトシ葉大也香アリ老葉ハ
表裏青ク如青蒿シテ色不白香ウズシ秋間葉細ニ
テ如杉老葉ト嫩葉トノカタチカハル又時節ニヨリ地

ノ肥瘠ヨリテ葉ノ形カハル青蒿ヨリ細葉ナルモアリ經冬^ツ莖葉不凋宿根不枯與青蒿異


細辛 一説賀茂葵ヲ細辛トス其根甚辛シ和俗ノ細辛ト稱スル者ハ杜衡也ト云モロコシニモアヤルヨシイヘリ又山野ニ種根ノ味細辛ニ似タルモノアリ是世俗ノ所謂細葉細辛ナルヘシ是白微ナリ京都蓮臺野藥園ニアリ

車前 大葉小葉ニ種アリ大葉ハ穗二三尺アリ本艸ニ大葉小葉アル夏ヲイハズ

麥門 大葉ハ葉アツシ五月ニ莖立テ頭ニ穗ノ如ク長ク

連リタル紫花ヲ開キテ實ナル秋熟ス林中ニ多ク生ス葉蕃茂ス實ヲクヘシ根モ小葉麥門ノ如ク大ナリ觀音艸ノ葉ハウスクシテ少廣シ花ナシ能似タリトイヘ別也大小麥門トモニ藥ニ用ユ性同大葉ハ蘭葉ニ能似タリ庭園ニウヘテモヨシ本艸ニモ大小三四種アリトイヘリ大小麥門共ニ根大ナルヲ良トス一種葉ハ大葉麥門ニ同シ葉春及夏初純白ナリ故ニ翁草ト云後漸青クナル根ハ門冬ナリ花モ大葉麥門ノ如シ異草ナリは大葉麥門冬ノ別種也又一種大葉麥門ニ似テ葉狭地筋ノトク葉^葉ツヨシ根同

澤瀉 水田中^ニ生^ス其葉^ノ形



如此^ニ根^ヨ

リ葉多叢生ス丹波土民是ヲ田ニウエテ利トス又蘇州アリ葉ハ澤瀉ニ似テ根ハ澤瀉ニアラス本草ニ見エタリ

獨活 本經曰獨活羌活一物同一類時珍云獨活

羌活乃一類二種以中國者為獨活西羌者為羌

活本草約言曰獨活與羌活原無二種後人分用

○今案一類二物ナルハ本邦昔ヨリウヱトク母ヲ獨活

トシ其小根ヲ羌活トス本州大明曰獨活是羌活母

也トイヘルニヨレリ然レ氏中華ヨリ來ル獨活羌活ト味

カレリ中華ヨリ來ヲ可用ウトク根ハ不可用

羌活 或曰一種其葉似前胡又シカ菜ニ似テ壯大

ニ莖根トモニ紫ニ葉莖有毛無香氣者アリ是羌活

ナルヘシト云未^キ知是也藥肆ニアル倭羌活ハウツノ根

ナリ唐羌活ト別物ナリ本草ト不合本草曰羌活

ハ氣雄獨活氣細今試中華之産果^ク然リ本邦之

産者與此異不可用二物共ニ中夏ヨリ來ヲ可用

紅花 其花新時早朝可摘採久ケレハ性アシク且脫

落ス然レ初テ開ク黃色ナルヲ不可取少日ヲヘテ紅

ニナリタルヲ可取其苗ハ菜トシテ食スヘシ紅花ハ沉

香麝香ヲム紅染衣ニ沈麝ノ香ウツリ又香囊ナ

トヲ納ラケハ色變ス倭語ニ未摘花ト云ハ紅花ナリ
黃連 常州ノ山産尤佳也賀州ノ産多シ是亦ヨシ奥
會津又藝州ニモ多シ葉ハヒカケノカツラニ似タリ日本
ノ黃連性ヨシ故ニ中夏朝鮮ニモ日本ヨリ多クワタ
中夏ノ書ニモ倭黃連ヲ良トス

瓊陽 少赤色ニシテ其形條々ノコトシ

巴戟 地黃玄參ニ似テ大ナリシヨリタルコト地黃ヲトシ

胡黃連 黃連ニ似テ大也黃ナラズ味苦シ蘆頭モ黃

連ニ似タリ中華ヨリ來ル此草日本ニアリヤ未詳干
振トテ秋白花ヲ開キテ葉細ニ味甚苦キ小草山野

ニアリ又多クヤクト云國俗是ヲ好ニテ用之殺蟲消積
コレヲ胡黃連ト云非ナリ或曰倭方ニ胡黃連トカケル
ハ皆センラリヲ用ユヘシト云

防風 倭防風ト稱スル者數品アリ其中ニ筆防風ト云ヲ
用ユヘシ其餘不可用若水云削防風ハ葉似牡丹色淺
綠俗牡丹人參ト云其根大故削之而售之又木防
風嫩小時爲菜莖青有香者是防葵也非防風世
俗以爲人參售之甚貴也○シヤク菜アリイトクリ
アリ濱防風アリ是皆防風ノ類ナルヘシ

柴胡 鎌倉藥胡與本州所記之形狀及自中華所

來者相同コシヲ用ユシ本邦ノ俗古來アヤリテ鷄腿
兒ヲ用ヒテ河原柴胡ト稱ス形狀性味大異不可用
可謂習矣而不察也古習故陋ニ泥ムヘカラス中夏
ヨリ銀柴胡來ル鎌倉柴胡ヨリ大也

升麻 若水云葉強クシテ管根空木ニ似タリ又苧葉
ニ似テ葉大ナリ葉皆向上ニ根叢生ス又有別ニ能似
者勿誤混本草曰生苗高二尺以來四五月著花
似粟穗六月以後結實黑色中華ヨリ來ル外黒ク
内青色ナルヲ用ユヘシ時珍云今人惟取裏白外黒而
緊實者○本邦俗醫升麻ト稱シ用物ニ種アリ一種

ハ鳥ノ足ト云其葉芥ニ似タリ一種ハ名テ升麻ト云葉毛莖
モ犬タテニ似タリ二種共ニ升麻ニアラス必不可用○今
案本草無忌火之說入門曰發散生用補中酒炒
止咳汗者蜜炒國俗以爲忌火者何也

夏枯草 若水云葉似金沸草裏有紫條花微紅似
空穗草而長ウツホ草ニハ非スウツホ草ハ用テ功ナド
云○國俗ニ氣腫ト云病アリ即結核也庸醫ハ氣腫ハ
即結核ナル事ヲ不知悉杏仙方一卷結核門ニ夏枯
草ヲ煎服シテ効アリト云ヘリ結核ハ不紅不痛不成膿
日久シテ漏下キリロヨリ水出ル症アリト醫書ニ見エタリ

大和本草卷六
九

三稜 葉有^二稜莖^レ有^二葉似^レ香附子高四五尺矢
カラ^レ如^レ故河内ニテハ矢カラト云水草也

遠志 小葉似^レ黃楊木^ニ而小ナリ處々有^レ之其葉小ナリ

小草ト稱スルモ宜ナリ西土ノ俗ハ野茶ト云花淡紫色
ナリ又海濱ニ小草アリ莖小ニ高キ夏一二尺花ハ桔梗
ニ似テ甚小ナリ根亦小ナリ根粗遠志ニ似タ^レ故俗アマ
リテ遠志トス非也

木通^{アヒカツラ} 蔓草也莖長ク大ニ堅シ蔓即木通也葉莖ヲ通州
ト云無毒鞍馬ノ木^{ツメ}芽漬ハ通草也葉ハ五葉ニ分ル二月紫
花開^レ花容ニ分^レ秋圓子^ツ結^レ此草山野林中ニ多ク生

ス和名アケビ赤實ナリ又トキハナルアリ

天南星 一種アリ一種葉芋ノ葉ノ色ニ似テ光アリ岐ア
リテニニワカル實紅ナリ一處ニ多クアツ^レリニル玉蜀黍
ノ實ノ如シ十月ニ熟ス一種莖弱ニ似テクキニ黒點多シ
本草ニモ一種アリトセル花ハ反リテ燈ノ如シ根ヲ
藥トス藥ニハ一種トモニ用ユ又白花アリ皆毒アリサレモ
虫コシテ食フ久ク貯ルニハアラク刻ミ時々日ニ干ヘシ不
然虫食フ大ナル根ヲ可^レ爾小根ハ性薄シ製法アラク刻
ミ沸湯ニ泡ス泡シテ湯ヒニテ後又沸湯ニ泡ス熱クサ
メサル内ニ又泡スヘカラズ能ヒエテ後又沸湯ニ泡ス凡七

本草綱目卷六

度又刻ミ日ニホシアラク末レ生薑ノ自然汁ニヨキホ
トニ和スヘシ甚レルク和過タルハアレ堅メテ小餅トシ
籃ニ入上ニ木葉ヲ掩ヒ器ニ入フタヲオホヒ又戸棚ノ
内ニ入置或カウジ屋ノムロニ七日ホト入置黄ナ九麴出
ル時取出レク多キ日ニホシ炒ル夏月ニ製スヘシ麴出ヤ
スレ製法ヨカラサレハ毒サラス半夏モ同レ本草通玄曰生テ
用者温湯洗過礬湯浸二日夜日日換水晒乾熟
用者酒浸一宿入甑蒸一日以不麻舌爲度○時
珍云小小者爲由跋乃一種也今案山中ニ似天南星
而小者者アリ是由跋ナルヘシ

半夏 大ナル粒ヲ用ヘシ小粒ハ性ヨハレ水ニヒタレ一ニ切リ
沸湯ニ泡スル夏七度麴半夏トスル夏南星ノ製法
ト同藥肆ニテ製シタル麴半夏勿用或曰丸散加ニハ
炒過ノ用ユ眉髮ヲツルニ半夏莖汁ヲ煉テ子ハリヲ髮落
丸處ニヌル本草ニ載ス

蒔蘿 小茴香ナリ子ヲケハ其年ミル又宿根ヨリ生
ス又イノドハ蒔蘿ノ一年立也冬ニイタリテ根死ル宿根
生セス春種子ヲケハ其年ミリテ冬ハ根枯ル蠻流ノ醫
用之是蕃國ヨリ來ルイノドハ蕃語ナリ

藜蘆 ヲモト訛ス非ナリ藥肆ニヲモト根ヲ藜蘆ナリト

テウル用ユヘカラスヲモトハ萬年青ナリエビ子モ藜蘆ニ
似タレ別ナリ又大葉蘭フネト云物アリ藜蘆ニ似テ非ナ
リ唐ヨリ來ルヲ用ユヘシ

砂仁 縮砂蜜トモ云功能多シ良藥ナリ結滯ヲ通行メ
其效アリ蒙筌云起酒味甚香調食饌亦妙又曰先
和皮慢火炒熟去殼取仁藥肆ヨリ殼ヲ去リ來ル成
ホトヤハラカナル火ニテ少アフルヘシ○砂仁ハ日本ニ無之伊
豆縮砂ト云ハ杜若ノ實ナリ縮砂ト異レリ不可用○
本草時珍曰砂仁引諸藥歸丹田同地黄九蒸取
其達下之旨也地黄九製生薑不用是用蒸ヘシ

白豆蔻 胃中ノ停積ヲ去リ日中ノ雲翳ヲ退ケ噎膈ヲ
通シ瘧ヲ除キ酒毒ヲ消シ吐逆ヲ止ムム子ワルク欲吐
丸ナカラカニテ食フヘシ忽ヤム胸中ノ滯氣ヲメクラス穀
食ヲ消シ脾胃ヲ益ス性大温良藥ナリ大抵縮砂ト性
相似タリ草豆蔻ニサレリ時珍曰入藥去皮炒用李
中梓本草通玄曰其功全在芳香之氣一經火炒
便減功力即入湯液但當研細待諸藥煎好乘沸
點服妙篤信云時珍曰炒用中梓曰經火炒便
減功力一說不同凡有芳香諸藥皆忌火然則隨
中梓說爲可歟

本草時珍曰草豆蔻草果雖是一物然微有不同今案異邦ヨリ來ル處一物ナリ然ルニ本草ニハ粗爲一物別品ヲ不分修治氣味主治亦同但附方ニハ病ニ隨テ一物ヲ用各異

木香 葉ハ皺アリテ鶴虱及牛蒡ニ似テセハク長シ其形紫苑葉ノ如シ莖ノ高サ數尺黃花ヲ開ク花ハ菊ニ似タリ本草ニイヘル形狀ニ同然レモ日本ノ産ハ性不好不可用又青木香トモ南木香トモ云馬兜鈴シモ青木香ト云本草ニ見エタリ木香狀如枯骨白多嚼之即粘齒馨佳シ

射干 和名カラスアヅギ漢名モ亦烏扇ト云本草ニ陳藏器曰射干葉如鳥翅秋生紅花赤點人間所種爲花草丹溪曰紫花者是ナリ紅花者非ナリト今日本ノカラスアヅギニハ未見紫花者但中夏ニアリテ日本ニテキ也時珍曰紫花者呼爲紫蝴蝶イナツト云物射干ニ似テ花紫ナル故是丹溪カ所謂花紫ナル者ナラント云人アレモ射干ト爲尾ハ全ク別ナリト蘓恭モイヘリ只日本ニハ射干ノ紫花ナル者ナレトスヘシ射干非一種有花白者花黃者花紫者トイヘリ

白及 園中ニウフルレラント云物アリ葉ハエヒ子ニ似タリ

四月ニ紫花ヲヒラク其根ヲ白及トスカラヨリモ來ル
 藥肆ニアリ花紫白ニ色アリ花賞スヘシ紫白一處
 ニ種レハ白者枯此類ノ別種ケイト云物アリ葉ヒロク
 短シ花尤ヨシ是亦白紫ニ色アリ葉何レモエヒ子ニ
 似タリ花園ニウヘテ賞スルモノナリ又花黄色ナルアリ葉
 廣國俗白及ノシラシナル夏ヲシラス蒙筌云山根ニ敷
 ケハ罅ヲ止ム山根ハ兩眼ノ間クホキ處ナリ疥癬ニス
 レハ虫ヲ殺ス糊ニスレハ甚子ハル裱畫ニ用ユ冬月手足ニア
 カバリキルニ此根ヲアフリテ糊トシ用テキレタル處ヲ
 フサケハ愈ユ白及ヲハクリト云説アリ非ナリ○丹溪

曰凡吐血不止宜加白及

五味子 朝鮮ノ産ヲ可用醫書ニ遼五味子ト云是
 又北五味子ト云顆大ニ色黒ク有潤有五味テ甚
 酸シ核アカシ日本ノ五味子ハ味苦キノミニテ五味ナ
 ク滋補收斂ノ功ナクシテ性アル用ユヘカラス唐五味子
 顆小ニテ苦ク燥ケリ倭五味ニニナル然トモ遼五味子
 ニラトレリ朝鮮ヨリ來ルハ實ハ苦辛ク皮ハ甘ク酸クノ
 皮實スヘテ鹹シ一物ニテ五味全ク備ル夏奇也 是真
 五味子ナリ草木ノ實ニ鹹味アルハ稀也時醫朝鮮五
 味子ヲ不用多ク和五味子ヲ用ユルハ何ソヤ補藥ニハ

熟用嗽藥ニ生用ユト李中梓イヘリ今倭俗倭五味
子ノ莖ヲ水ニヒタシ子ハリ出ルヲ用テ鬢髮ニヌル毛チラ
スト云

冬葵 冬ニニル葉有小岐五ニワカル花甚小不足觀者是也古ハ菜トシテ食ス内經ニ五菜ノ一トス後世ノ人不食之故時珍綱目ニ移入濕草錢葵ノ花ハ是ヨリ美也

穀精草 澤中水田ノ中ニ叢生シ葉中ヨリ一莖ヲ抽シテ其形藺ニ似テ莖ノ末ニ白花ノ圓キアリ但見分ケカタシ多ハ眞ノ穀精草ニ非ス

胡椒 本草蒙筌曰出自西戎蔓生苗莖軟柔六月

採收殺一切魚肉菰蓴之毒大明一統志曰蔓生
○今案胡椒ハ火ヲ助ケ目ヲクタクシ瘡ヲ發ス多食
フハカラス凡一時快物ハ必後ニ害アリ胡椒ハ蔓草ナ
リ本草綱目ニ秦椒蜀椒茱萸ト同シク味果類ニノ
セタリ故世人アヤマリテ木果也ト思ヘリ○葶苈茄ハ
胡椒ト一類ニテ能似タリ葶苈ハ別物ナリ實ノ長一
一寸桑ノ實ニ似タリ味ハ胡椒ノ如シ胡椒陶皿入瓢
タシテスレハ早ク細末トナル物類ノ相感スルナリ
山藥 薯蕷也圃ニモ多クククル味山ヨリ出ルニヲトレ
リ山ヨリ出ルヲ俗自然生ト云味最ヨシ凡薯蕷

根ハ毎年生じ替ル他物ニ異リ故ニ八月ニハ新舊二
根アリ蓋夏ノ間ニ新根漸生ス秋末ヨリ後ハ舊根ハ
クナル新根ノ形ハ舊根ト同シ奇異ナリ花ノ後ニ三角ナ
ル物生ス非花實ニ非ス真ノ實ハ零餘子ナリ藥ニハ
山ニアリテ年數ヲ久ク歷テ肥大ニテ皮赤ク四面ニテ
アルヲエラヒ用ユ臘月性ヨシ雷敷ハ銅刀ニテ赤皮ヲ刮
去^レ涎ヲ洗去蒸過メ乾シ用ユトイヘリ圃^{タテ}ニツクルハ藥トスヘ
カラス凡山藥ハ虫クヒヤスシ時々ホスヘシ腎ヲ補ヒ脾胃ヲ
益ス虚人久服スヘシ生ナルヲ丸ナカラ塩ヲ加ヘ煮テ果ト
シテ食フ只氣ヲ塞ク積滯アル人忌之金瘡産婦薯蕷

ヲ食ヘカラス大毒ナリ又産後ニ下口汁大毒也不可食或
曰山藥ハ頭小ク尾大ナリ是ヲ以下部ヲ厚ク補フ功アリ
ト云此理アルヘシ腫テ硬キ瘡ニ生シテスリク多キテ付レハ消散
スト丹溪云ヘリ今試ルニ有效婦人乳腫痛不可忍生薯
蕷^ク研多キ付ル甚效アリ痒ヲ忍フヘシ零餘子^カ性味ヨシ
又佛掌薯^クアリ是薯蕷ノ類ナリ菜蔬類ニ載ク
百合 本草ニ百合ト云ヘルハ花白キヲ用ユ日本ニ關東ユ
リ薩摩ユリナト云類也藥ニ入ヘシ卷丹ハ百合ニ非ス藥ニ
不可用只食スヘシ百合ハ何レモ味苦シ食スルニタヘス卷丹
ハヲニユリト云味ヨシ前ニシルセリ百合ハ根ノ上莖ノ下ニ

子生ス卷丹ハ葉間ニ實生ス一物ノ子生スルコト不同。
ヒメユリト云物アリ山丹也五月ニ花ヲ開ク消ヤスレ。
又ヒユリアリ是モヒメユリノイ也花深紅色也年々土
ヲカヘテ改ウフヘシ不然ハ消ヤスレムカレハ百合ノ品多カ
ラス近年世ニ其花ヲ賞ス故其品ヤウヤク多シ幾十種
ト云事ヲシラス百種ニ及フ其花向天アリ向地アリ
傍向アリ

白芷 蟲好シテ食スアラフクワリテ屢日ニ曝ヘシ中華ノ産
ヨレ山城州ニモウツ然レトモ中華ヨリ來ニハ不及又一種
白芷ニ似タる物アリ節紫ナリ香少ナシ若水曰白芷市

人以石灰拌勻晒收用時水洗淨ムヘシ當世ノ醫藥
香正氣散ヲ用ルニ無風邪頭疼症ニハ必白芷ヲ去ル去
サレハ食氣ヲ滯ラシメ嘔吐ヲ生スト云

零陵香 カラヨリ來ル芳草也昔日本ニ見知レニヤ延喜
式十五卷遠江國交易所進零陵香二十把トアリ
イフカシ今モ本邦ニアリヤ蠻醫ノ用ユルウタト云草アリ本
艸ノ零陵香ノ形狀ニ似テ異ナリ別物也

括蕒 蔓草也又瓜蕒ト云葉瓜ニ似テ岐ナシ色緑ニ
テウルハレ毛ナシ實ノ大如小瓜形ニルキアリ長キアリ瓢
黄色ニシテ清シ子ハ卽瓜蕒仁ナリ皮褐色仁ノ色青ク

内白シ根ハ皮黄ニ中白シ小花紋アリ即括萋根ナリ子モ
根モ味苦カラス冬月春初大ナル根ヲトリ皮ヲ去リ銅刀ヲ
以テ寸ニ切水ニ浸日々水ヲカヘ數日後ツキクタキテ水ヲ
加^{絹布}ニテコレ水飛^ノ乾カ^ノ爲粉是即天花粉ナリ葛
粉ヲトル法ノ如シ其法本州ニ詳也夏月ニハ粉ナレ暑
月水ニツケサラセバクサル臘月ニ水飛^{タル}尤潔白也モ千
ト^ノ食ヘレコレヲ用テリトス久^ニ堪ヘテクサラス括萋根天
花粉自取ヘレ藥舖ヨリ來ハ多クハ王瓜ナリ王瓜ハ蔓草
ニセタリ王瓜上異同可考觀其實殊^ニ不同○又一
種筑紫ニ牛ゴウリト云物アリ括萋ニキレヤスレ葉ハ

瓜萋ニ似テ岐アリ葉ノ色青黒ナリ燥テウルハレカラ
スモアリ瓢^色青黒キ多シ實ニラク仁苦レ瓜萋仁ニ
似テ同カラス藥肆コレヲ以テ瓜萋仁トシテウルエシ
デ不可用根ノ皮色青レ味苦ク惡レ村里ニ多シ根ヲ
ツ干ト云里人根ヲ粉トス味ヨカラス貧民凶年ニモチト
シテ食ス性アレ食スレハ身腫ル者アリ藥肆天花粉
トシテウルハ可用然天花粉括萋根括萋仁皆ニシ
カラ採用ユヘレ不然實物多シ

貝母 本邦亦有之本草約言曰散結氣除煩熱而
潤心肺所以治嗽消痰又曰用去心若獨顆ニシテ

不能兩片者不可入藥。今案與半夏之燥濕除寒痰性不同用之各有所宜可不混同。蠹好テ食ス大ニワリテレバク干スヘシ獨顆ハ不可用

藿香 今藿香トテ世人種ル物アリ本草所云ト粗相似タリ只香氣不相類其葉厚薄亦不同日本土地不宜ニヨツテ性不好カ若ハ可爲同類異品中華産ト云凡無香氣ハ不可用ウツニ藿香アリ青葉アリ用時洗テ少日ニホスヘシ青葉爲佳

馬鞭草 治魚肉癥瘕出于千金方又綱目附方載之此草野ニ多シ葉以麻ニ似タリ其莖馬ノムチニ似タリ

稀莖

和名ヲオモシク功能甚良シ殊風痺ニ用ユトシ本草

綱目唐慎微方説ヲセタリ成訥及張詠稀莖丸ヲ天子ニ進流表アリ其表ノ内ニ誰知至賤之中乃有殊常之效ノ文アリ其藥至賤ニテ非常ノ效アル物猶多ク黃精萎蕤忍冬薏苡胡麻蒼耳ノ類ナリ李中梓慎微方譽之太過ナル夏ヲシレリ今俗ニ稀莖ト稱スル草一種アリ與本草時珍之説不合宜詳之蘇頌説似多ク

艾

ヨモキヲ灸治ニ用ルユモ本草ト云シ畧シモクサト云モ

クサハ嫩葉ヨシニ月二日トシ上下ス莖長クシ過久ハ加ナシ莖短ク若キヲ良トス次ニ五月五日ニ下ル江州瞻

吹山ニ甚多シ其麓ノ里春照ナトノ民家ニ多クウル又下
野ノ日光山ノ下標地原ノ艾ヲモ用ユ此ニ處ニモクサ古
歌ニモヨメリ何レノ地ニモ山野ニアルウルハレキ莖短キ
ワカ葉ヲエラヒ用ユヘレ葉ヲツミテ洗ヒ一日日ニホシテ
後數日カゲ干シレカキテ罌又袋ニ入收ラクヘレ雨ニ
アツヘカラス又一所ニ多クアミカサ子テクサラレムカラス又
一日ノ外日ニホスヘカラスカベニ久クカケラクヘカラス早ク
モミテ袋ツホナトニ入置ヘレ年久レキヲ用ユヘレ三年ヲ
經テ用ユヘレ艾ヲトリヲサメ置コト用心テ精クスヘレ熱
痛忍シテ濕惡キ物ヲ用ユヘカラス○鍼灸聚英曰艾

葉須令焙太燥則灸直カ火易燃如潤無功又曰
艾ヲ製スルニカハキタルヲ白ニ入テツキ細ブルヒニテフルヒ
クツヲ去ヘレ石臼ニテツキ白クナルヲ上トス又曰艾以苗
短者爲佳 時珍曰老人丹田氣弱臍腹畏冷者
以熟艾入布袋兜其臍腹妙不可言○春月若葉
ヲトリ羹トシ又飯ニ加ヘテ食ス二月三日ニ饑ニ和レ食
ス煮テ乾レ蒸テ餅ニ加ヘツキ和ケテ食スルモ亦可也又
ホレタルヲ用テ朱ト黒ト二和ノ印色トス其方中華ノ
書ニアリヨクツキモミテクツヲ去リワタヲ如ク用ユ

龍膽 倭名リシダウ一名クダニト云又思草ト云秋碧

色ノ好花ヲヒラク山野ニアリ葉ハ末ニ尖アリ白花モ
 アリ又山龍膽アリ雜草載之又サ、リシタウト云草不
 葛根 葛ハ蔓草春月發生ス其カツラヲ用テ繩トス
 皮ヲ布トス葛布ヲカタヒラトス和漢同シ又喪服トス
 古コレヲ藤衣云其カツラヲ又藤トモ云河州ノ千井
 寺古來葛井寺トカク其葉ハホシテ多ク收シキ馬飼
 へシ生ナルヲモ飼フ根ヲ冬月或春未生苗時ホリテ用ユ
 長キハ數尺乾シ用ユ葛根是ナリ生根シツキクタキ汁ヲ
 トリ水飛シ曝シテ粉トス葛粉ナリ其功用多シ藥トシ
 養糕トス味最好シ又粉ヲ水ニ和シ沸湯ヲ多加フレ

ハ糊ノ如シ或水ヲ不用熱湯ヲソ、キテ飲ム皆渴ヲ止メ
 泄瀉ヲ治シ酒毒ヲケス又夏月冷水ニ入カキタテ、飲
 ム能止渴不傷胃本草ニ葛粉ノ能ヲ稱スル言スクナシ
 然レモ功能多ク且飢渴ヲ救ヒ甚民用ニ利アリ本草
 葛根性平然レモ消渴大熱ヲ解シ酒毒熱毒ヲ去ル
 葛花ハ酒ヲケス藥ニ入用ユ○葛粉ハヨク渴ヲ止ムレモ其性
 和平熟シ食スレハ不損脾胃其蔓葉花皮根粉用テ
 益入又粉ヲ用テ糊トス皆民用シタスク葛粉ハ吉野ヨ
 リ出ル者最ヨシ冬月曝乾ス凡凶年ニハ貧民春初ヨリ
 山中ニ入日日葛藤ノ根ヲホリテタキ其汁ヲトリ粉トシ

饑トメ食ヒ飢ヲ助ク遠村ノ民ハ妻子家人ヲ盡ク推テ
山ニ入り廬舎ヲ作り居ル苗生レ粉ナキ時山ヲ出ツ
其救人コト五穀ニツケリ葛藤ノ山野ニ多ク生スル天地
ノ民ヲ多クミテ自然ノ理ナリ民ヲアシカル人モ天地ノ心
ヲ體ノ民ニ仁アルヘシ日本ノ醫書ニ野生ノ者ハ有毒種
家園者可用トイヘリ本草ニハ此説不見凡葛ハ多ク野
生ナリ本草有野生有家種トイヘ下日本ニ家園ニ無之
野生ノ者有毒人コト未聞之野葛ト云毒草ハ別物
ナリノ葛布ヲ世ハ喪服トスフチ衣ト云蔓草ノ内紫藤ノ
下ニ詳ニ記ス葛カク多ク藤ト云

蓖麻子

西土ノ方書多クウヅニ其子巴豆ニ似タリ有毒點
仁有油印色ナレ油紙ニ用ユ有毒損入不可輕服但
外治ニ用ユ其功多クシテ腫物ニ付ル又難産ノ催生ニ
スツテ足心ニツク子生レハ早洗去ヘレ口眼歪邪右ユガム
ニハ左ニ貼ク左ユガムニハ右ニ貼ク手臂腫痛モツクル一
日ニツイユ偏頭風ニモ乳香ト合ソツキニセヌル右本草通
玄ニ出ツ胞衣不下ニモソキテ足心ニヌル下ラハ早ク洗
去ヘシラソケレハ子腸出テ子腸出テハ即此膏ヲ頂ニヌ
レハ子腸入ル又難産ニ方ノ手ニ七枚ツノ兩手ニ十四枚
ニキラヒムヘレ右本草ニ見エタリ附方ニ功能多ク可考用

本草綱目卷之六

卷之六

又油ヲモンスル法アリ可見丹溪曰追膿拔毒爲外科

要藥

淫羊藿

イカサカ

碗草ト云畿内處々ニ多シ

紫苑

葉ハ木香ニ似テ皺ナシ莖高キコト數尺淡紫花

ヲヒラク菊花形似多古今集ニシテ云云(リ又倭名

ヲニノレコクサト云

檉金

葉ハ美人蕉檀特花ニ似多葶藶花同類ナリ

甚畏寒冬月ハ早ク掘根日アテヨキ暖處ニ埋ムヘシ不

然根闌

土茯苓

中夏ヨリ來ル白キラ良トス國俗是ヲ山歸

來ト云能惡瘡ヲ治ス瘡ヲ思ム菝葜カクシノ土茯苓ト云

非ナリ但土茯苓モ菝葜ノ類ナリ此藥平淡健脾胃強

筋骨止泄瀉良藥ナリ本草蔓草類可考能去脾

濕○治楊梅瘡爲君藥搜風解毒湯ノ本草綱目

發明ニセタリ○凡楊梅瘡中夏ニモ古ハ無病者近

時南方ヨリ傳ヘテ四方ニ及フ日本ニモ近代異邦ヨリ

初テ傳ヘ西土ヨリヲヨリ諸州ニ及フ故俗ニ唐瘡ト云濕熱

ニヨツテ自然ニ病者アリト云(共多クハ男女淫慾ニヨ

テ傳染ス○脾胃ニ水濕停滯ノ泄瀉ヲ久シク病ニ爲散

爲丸用ユ甚效アリ無名腫毒惡瘡ヲ治ス本草附方

ノ外世俗所傳ノ功能猶多シ○犬猫癩ニコレヲ煎用或
爲末飯ニカキミセ飼フ甚效アリ

牽牛子

朝間花容美シク見カク則葉ム故朝白ト號カク多益

ニ植テ室下ニシケハ不早萎花ニ淡青淡青紫色ニ白色
アリ本草曰有毒雄烈泄人元氣毒藥ナリ勿妄用黑

牽牛子ハ花ノ深青ナルヲ可用油ヲトリテ燈ニ點ス可
也萬葉集ニハ木槿ヲアサカホトス古イ集物名部ニ

ケニゴレトイヘルハ牽牛花ナリ順和名抄ニハ牽牛花ヲア
サカホト訓ス然レハ木槿モ牽牛モ共ニアサカホト云同

名異物ナリ○小牽牛花アリ蔓ノ本ニ葉ヨリ花早ク

開ク其色紺白碧紫數種アリ晝ニ至テ不萎花ノ

サハ如常好種ナリ可栽賞ス

天名精

實ヲ鶴虱ト云和名ハミダカト又イシレリクサト

云葉ハ烟草ニ似テ皺アリ長シ林中多シ故ニ近世
ノ俗ヤブタバコト云葉ヲモンテ腫毒ニツクレハ能消

ス金瘡ノ血ヲ止ム毒蟲ノサレタルニモンテツクヘシ蛇毒最
良實ハ蒿ニ似テ粘人衣惡臭アリ虫クヒ齒痛ニ鶴

虱ヲ末シテ醸醋ニ和シラクムヘシ

百草

本草陳藏器曰五月五日采一百種草陰乾

燒灰和石灰爲團煨キ研傳シ金瘡○或曰本邦自古

採百艸有口訣牛膝澤漆藪菜此三種ヲトラス因
姪婦所禁且有毒有惡臭也本朝推古天皇十九
年五月五日大和ノ菟田野ニテ藥獵レモフ夏日本紀
ニ見エタリ是百草ヲ取セモフナルヘレ○百草クロヤキニ
芋ヲスリてセ蝮蛇弁カレタル處ニ付テ立口ニ效アリ

百草霜 鍋釜弁カミトクヒタヒノスニナリ綱目土部ニセ
タリ端午ニ百草ヲ採テヤクトハ別ナリ

威靈仙 九蓋草ト和俗名ツク葉莖ニ付テ段々ニアリ
一段有五葉五月開花ヲ花虎ノ尾ト云草花ニ似タリ
碧色ナリ如穗長八九寸アリ七重草類ニアラス

ナハララ威靈仙トスルハ非ナリ

蔓荊子 海邊生蔓似非蔓其莖如小樹葉似藜而
背白表青

民用草類

大麻 一名火麻雌公子アリ麻仁ナリ雄者名泉麻
又牡麻ト云實ナシ雌雄共ニ皮ヲトリテ布トス宿根
ヨリ不生每春實ヲラト上世ニハ麻仁ヲ五穀トス月令
ニ食麻トアル麻仁ナリ今ハ食セス胡麻ハ上代ノ穀ニ不
アラス麻仁ノ功能多シ本草ニ見エタリ麻葉ヨク瘧ヲ治
ス用ヤウ本草ニ見エタリ日本紀舊事紀ニ麻ヲウヘシ

夏アリ日本ニ上代ヨリ有之也

苧麻 本草十五卷載之大麻トハ別ナリ葉ハ紫蕪ノ

形ニ似テ青ク大ナリ又苧麻葉ニ似タリ一根ヨリ莖多生

長シタルヲ刈テ皮ヲ取り苧トシ布トス大麻ニサレリ冬

宿根不枯春又生ス又實ヲニキテ生ス圃ニ多クテ利

トス又野苧アリ是亦布トス

苧麻 又苧麻白麻トモ云倭名ヨサハト云葉桐ニ似

テ花黄ナリ實ハ農家ノ唐臼ノ半ノ如シ莖ノ高五六尺本

草綱目濕草上ニアリ皮ヲトリテ麻トシ布ニシム又繩

ニ用ユ本艸ニ莖ハ硫黄ヲツケテトモシ火トストアリ發

和品

燭ニ用ユヘト也又黒染ニ用ユ別ニ赤カレト云木アリ是

モ黒染ニス是亦赤ゴサイバト云同名異物ナリ葉似タ

リ○又一種葉似香薷而大ニ莖圓多高二三尺其皮可

爲繩葉柔ホニ子ハリアリ秋花ヲ開ク是亦苧麻ノ類ナリ

イチビ 葉ハ麻ニ似タリ又午時紅ノ葉ニ似テ實ハ木イチゴ

ニ似タリ故ニイチビト云苧麻ト一類ニ物ナリ是モ皮

ヲトリテ苧ノコトクニ用ユ農人圃ニツクリテ利トス藻

塩草ニ苧實ヲイチビト訓スアヤミレリ苧麻トイチビト

別也又先輩補骨脂ヲイチビト訓ス甚アヤミレリ

木棉 棉布ハ異國ヨリ近古ワタル其種子ハ文祿年中

ニ來ル朝鮮ニ洪武二十一年大元ヨリ種來ル由東
國通鑑ニイヘリ木棉ナキ時ハ貧士賤民皆麻布ヲカ
サ子テ寒ヲフセク近世木棉ノ種ワタリテ南北トモ
土地ニ宜レク四民寒苦ヲマヌカル誠ニ萬世ノ利群
國ノ寶也明王ハ金玉ヲイヤレニテ五穀ヲ寶ハ古人イハ
木棉モ五穀ニ同レク寶トスヘシ金玉ニサレリ中華ニ
モ宋ノ未始テ種ヲ南蠻ヨリ傳ヘ冬兵瓊山李時
珍諸說皆然リ然ルニ温公通鑑ニ梁武帝ノ木綿皂帳
ノ事ヲイヘリ史炤カ釋文ニ木綿江南多有之其形狀
ウヘ時ヲ詳ニ云ヘルコト今ノ木棉ナリイフカレ又本邦類

聚國史ニ桓武帝ノ御時崑崙人木綿種ヲモチ來ル
トアリ今ノ木棉ト同物ナリヤ是亦イフカレ斑枝花ハ
木ナリ別物ナリ是モ木棉ト云本草ニセタリ是亦布
トシ絮トスツ子ノ木綿ハ絮トスケ堅斑枝花ハ
ヲヘテモ堅クナラスパンヤハ蠻語ナリ神書ニ木綿ト云ルハ
紙ナリ棉花ニアラス今祝人綿花ノ絲ヲ用テ木綿襪ト
スルハ古制ニアラス木綿手繼日本紀允恭帝紀ニア
リ本朝賦役令曰木綿ハ紙木皮也順和名ニ楮ヲ
由布ト訓ス延喜式ニモ木綿ハ楮ニテ作ルヨシ見エタリ
○木綿ハ無毒子ノ油ハ微毒燈ニトモセバ目ヲ損スト本

草ニイヘリ商家此油菜油ニシテ食品藥品トスヘカラス
 芒^{スキ} 時珍曰芒有二種皆叢生葉皆如茅而大長四
 五尺甚快利傷人如鋒刃七月抽長莖開白花成
 穗如蘆葦花者芒也五月抽短莖開花如芒者石
 芒也○今案本邦ニ所在モ亦時珍カイヘル如ク長短二
 種アリ短者カヤト云山野ニ遍ク生ス薪トシ屋ヲフク
 者是也長キ者ヲスキト云莖紅ナリ私花アリウヘテ藩
 籬トシキリテ箔トシ壁代トシ箸トシ其莖穗ハ帚トス長
 短並ニ甚民用ニ利アル夏五穀麻棉ニツケリ屋上ノカ
 ヲフキノフルキトカヤス名ノフルキモ皆功能アリススキニモ亦

類多レ鷹ノ羽ス、キ葉ニ白文アリ鷹ノ羽ノ文ノコトトモ
 ス、キアリ冬ニ至テ葉不枯○歌ニ尾花トヨメルハ秋ノ末ス、
 キノ穗ニ出タル獸ノ尾ニ似タルヲ云レズ、キトハレノ如ナルヲ
 ニ云ハタズ、キトハ旗ヲアケタルヤウニ穗ニ出タル也。ホヤノス、
 キトハス、キノ穗ニテ作タル屋ナリ。十寸穗ノス、キトハ穗
 ノ長クシテ一尺ハカリナルヲ云。ニスウス、キトハ眞蘆方ク
 、キラ畧セリ色赤キラ云。糸ス、キハ葉細ニ糸ノ如クナルヲ
 ニ云右何レモ歌ニ詠セリ

烟花^{タバコ} タハコハ蓬溪類説ニ淡婆姑草ト云漳州府志ニ
 淡芭菰トカク。タハコ異國ノ方言ナリ或曰日本ニ初來

リ丹波ヨリ其粉ヲキカミ出ス故ニ丹波粉ト云此說妄
語也○清康熙時人陳扶搖著花鏡曰烟花一名淡
把姑初出海外後傳種漳泉今隨地有之本似春
不老而葉大於菜開紫白細花葉老曠乾細切如
線後美其名曰金絲烟一名返魂烟一名擔不歸
人喜其烟而吸之雖至醉仆不怨可以祛溼散寒
辟除瘴氣但久服肺焦非患膈即吐紅或吐黃水
而殞抑且有病投藥不效總宜少喫○漳州府志
淡芭菰種出東洋近多蒔之者莖皆如牡菊而高
大花如蒲公英有子如車前子取葉酒酒陰乾之

細切如絲燃少許置管中吸其煙令人微醉云
辟瘴此外夷吐火之習閩左少年競效以爲豪舉
然遂有眩仆者○姚可成曰返魂草出東夷海島
諸山夷人采得曝乾貨來中國形細如絲今閩廣
諸處燒入竹筒滿口便竅穴俱遍仍噓出之日行
一二次去百疾強健輕身夷狄之習豈中國之所
宜効違令越禮莫此爲甚姑錄以備博識者○本
草洞詮云煙草一名相思艸言人食之則時々思
想不能離也味辛氣溫有毒治寒濕痺消胸中痞
膈痰塞開經絡結滯人之腸胃筋脉惟喜通暢烟

氣入口直循胃脉而行自內達外四肢百骸無所
不到其功有四一曰醒能使之醉蓋火氣蒸表裏
皆徹若飲酒然二曰醉能使之醒蓋酒後墮之寬
氣下痰餘醒頓解三曰饑能使之飽四曰飽能使
饑蓋空腹食之充然氣盛如飽飽後食之則飲食
快然易消人遂以之代酒茗終日食之而不厭也
然人之宗氣一呼脉行三寸一吸脉行三寸晝夜
一萬二千五百息五十周於身脉行八百一十丈
此自然之節度也臟腑經絡皆稟氣於胃烟入胃
中頃刻而周於身不循常度而有駛疾之勢是以

氣道頓開通體俱快然火與元氣不兩立一勝則
一負人之元氣豈堪此邪火終日薰灼乎勢必真
氣日衰陰血日涸暗損天年人不覺耳凡病內痞
外痺者藉其開通之力驅除寒濕痰滯亦有殊功
若陰虛有火者得之是益之焰矣戒之○今案本
草洞筌三所載ノ烟草モ亦淡婆姑ト同物ナリ今南
京ニ烟ト云漳州福州ニ芬ト云キガニタバコヲ切芬ト
云朝鮮ニハタバコヲ南草ト云今長崎ニ來ル西域ノ人暹
羅人ナトハ烟草ヲカミテ食ス烟ヲモ吸フ今國俗スヘテ
莨菪ヲタバコト訓スアヤミレリ中華ニ莨菪ハ古ヨリアリ

延喜式ニ葎若ヲノセタレハ日本ニモ昔ヨリアル草ナルヘ
シタハコハ日本ニモ中華ニモ古ハナシ近代外國ヨリワタ
ルト云故本草綱目ニハノセズ日本ニ初テ來ルコト天正
ノ初年ナルヘシ或曰慶長十年初テ來ル初山州花山
刻ミウル花山タハコト云又吉野ニ植フ後ニ丹波ニウラ
初ハ竹筒ニ入テ火ヲ吸フ後ニ眞鍮ノ煙筒キヤルヲ用請取
ワタレノ禮アリ今ハ其禮スタレリ長崎ニテ唐人ハ三ナ
煙草ト云葎若トハイハズ是ヲ以葎若ニ非ル古夏ヲル
ヘシ○猿ハ好ニテタハコヲ食ス犬ハ甚キラフ物性各異
也蛇ニタハコノヤニツクテハ忽色カハリテ歿ス 六終

