

山林經濟三

養蠶
牧養

+ 1
2234
3



門十一
卷三
224

~~門十一
卷三
224~~

增補山林經濟卷之五目錄

○養蚕

養蚕吉日	祀蚕神	備蚕具	擇種	出蚕
下蟻	飼蚕	初眠	再眠	大眠
分撞總論	涼暖總論	八宜	蚕忌	晚蚕
繅絲附野蚕	儲葉法			



○牧養

○牧養論

○養牛 作牛牢年月吉日

相牛方	相毛色法	相母牛方	相耕	耕
耕法	牛雜病	飼養法	牛廐	牛衣

○養馬 相良馬法 並畜

辨駑馬形狀 並畜

辨三羸五駑法

相旋毛吉凶詞 並畜

相凶馬法

相馬壽夭法

相馬齒法 並畜

驗馬無疾

驗馬有疾

馬有天生三病

養馬法

造廐吉日 喂草料法

飲水法

馬遠回喂養法

放牧法

飼征馬令喫實法

割鼻法

治惡馬法

灌藥法

治馬瘦方

治雜病方

馬合牝牡吉日

養馬論

驪附 驢附

特附 馬色

○養豬

作圈吉日

母猪相法

閹豬方

豬兒蒸籠方

飼豬法

別飼方

治豬不吃食

方

治豬瘡疫方

胡高

船中養豬法

○養羊

羊種

作羊棧吉日

初生羊飼法

放牧法

水中

羊疥

羊夾蹄方

○養鷄

作栖吉方吉日

取種

作鷄栖法

相鷄法

令鷄不走方

肥鷄法

護鷄雛法

養鷄法

穀產法

治鷄雜病方

○養鵝鴨

擇種

花法

護雛法

棧鵝易肥法

收邪法

鴨郊令鷄花法

收鵝法

○養狗

納狗吉日

相狗方

相獵狗方

養狗方

治狗病方

救狗打死方

治狗瘦甚方

止小狗吠不絕聲方

累狗足善走方

○養狃

納狃吉日

相狃方

納狃法

狃病方

救小狃被人踏死方

治狃胎死腹中方

○養魚

放生法

養魚法

魚忌

衛魚法

生魚法

養金魚法

醫魚法

作小池法

作盆池法 石假山附

○養蜂 收蜂割蜜吉日

接蜂法

安窠法

割蜜法 救蜂飢法

蜂戒

護蜂法

取蜜俗法

養鶴

相鶴

鶴病

教鶴舞法

養鷹

相鷹法

馴鷹法

調肥法

治鷹病方

養鹿

養雉 鳥 鶩 鸚

增補山林經濟卷之

○養蚕

飢食寒衣關於人一也而非蚕何以為衣故別錄養蚕之方必遵其法則用力少而得繭多矣

養蚕吉日 ○浴連出蚕安槌入筐宜用戊辰壬午甲午乙巳甲寅丁

巳戊午日更得收滿天德月德月合明星五富等日又養浴蚕宜

甲子丁卯庚午壬午戊午又出蚕宜甲子庚午癸酉庚辰乙酉甲

午乙巳甲申壬午乙未癸卯丙午丁未戊申甲寅戊午收成開

日 ○出蚕交蝶浴種大忌日三月辰四月起五月卯十二月時又庚

戌蚕姑死日忌之 ○蚕室忌命官方此即蚕官所在方亥子丑

年未寅卯辰年方巳午未年丑申酉戌年辰此方春月動土蚕桑

俱失 ○祀蚕神吉日五月初五日 ○泥蚕室吉日二月五日

祀蚕神○吉日祀蚕神室當午處具香食餅酒以茶代酒令蚕婦禱祀齊

記吳縣張成夜見婦人於宅南掃人舉手招成曰此地是君家蚕室我即其神明年正月半宜作白粥泛膏於上以祀我已後年年大得登

備蚕具 凡蚕室北屋為上西屋次之蚕喜東照故也大忌東屋如無西窓亦可為西

日照暎又西風非長養之氣也○泥蚕室亦須擇吉日蚕生一

月之前預修蚕室要寬快潔淨通風氣暎日陽牆壁勿使有濕

屋前不宜有樹窓戶糊以新紙令虛明易辨眠起各備葦簾下

附地列置風竇令可啓閉以除濕鬱蟻生三五日之前先將蚕室

用火熏暖○臘月刈茅草收積勿令雨灑損來春作蚕蓐則作滿

加倍厚實今用檟栗枝或膏草○蚕喜牛糞牛喜蚕砂故牛糞熏屋大宜蚕

至月多收牛糞堆聚至春暖踏墊坏於蚕房內燒之令無烟○乾桑

葉臘月內搗磨成麵以瓮多數收貯飼蚕則能消蚕熱餘剩者可

做牛料甚美擇日每排上下間鋪三箔上承塵埃下隔溼潤鋪切碎擇草上中箔以備分擇

擇種○必謹審繭之雌雄尖細聚小腰小者為雄圓慢楞厚腰大者雌雄

也雌雄相兼而收佳開簇時擇近上向陽或在芒草上明潔緊實者

置透風涼房內淨箔上一一單排日數既足其蛾自出第一日出者為

苗蛾末後出者為本蛾皆不可用若有拳翅充眉焦尾焦脚赤肚無

毛黑毛黑紋黑身黑頭者亦不用只留完全肥好者以厚紙為連

散蛾於上以次日已後每一日出者為一連至十八日後西南淨地掘

坑貯蛾以土封之庶免虫禽傷食下蛾時二日相次為一輩若次三

日則為將來眠起成繭皆不齊其生子如環成堆者亦不用生子

數足更令連上覆養三五日後心云十遇天色晴明日未出時汲井

甜水浴連約一飯浸去毒氣掛於風涼房內一云連背相靠鉤掛又曰掛時蚕子向外恐有風塵甚

勿令烟熏日炙至十月捲收頓放於無烟淨屋內蚕最忌麻草勿近

麝○冬至日浴連臘之十二浸之於鹽水至二十四出則利於繰絲或

日臘之八日以桑柴灰或稻草灰淋沐浸連一日而出繼以雪水浸

懸乾桑木之屑兩雪三宿而收之則耐養又曰浴蚕流水為上并羊水次之無令水極凍

浴畢用桑皮繩懸掛於庭中高竿以受日精月華取忌麻芋線

懸之至除夜用五方草又方用馬藎 竟秋間採野同挑符木相以水同煎放冷元

日五更浴過歲之瓮內每十數日日高時一出每陰雨止即便晒曝

又方茅花野菜花韭花桃花白豆花於二月十二日摘之申而浴之蟻之放子也一方而止否則生蟻也不齊浴連不得

見日產婦與未滿月孕婦勿用線絮包裹勿近銅鐵蓋灰如或不

忌多乾死

出蚕○三月穀雨出蚕令蚕母洗手淨潔此即葉飼養種布之際並當如此將瓮中蚕種

遷於無風溫室懸過太高則傷風太卑則傷土凡蚕種初變紅肥

再變如春柳色三變如遠山色周盤其中此必收之種也若頂平

焦乾蒼黃赤色此不用之種也○蚕種變色遲速由已勿致損傷

自變桑葉已生自辰巳間將瓮內取出舒卷提撥亦無度數但

要第一日變三分第二日變七分各用紙密糊封了還瓮內收

藏至第三日午時又出連舒卷須要變至十分

下蟻○蚕變灰色已全以兩連相合鋪淨箔上緊捲兩頭繩束卓立於

無烟淨涼房內第三日晚取出展箔蟻不出為上若有先出者名

曰待馬留則蚕不齊復以鷄翎掃去不用又云不可以鷄翎掃撥蓋發生不齊

則其眠起至老俱不能齊故曰蚕欲三齊子齊蟻齊蚕齊是也候

蟻齊生和蟻秤連記寫分兩多少用細切搗軟得草均鋪箔上為

蔭又採淨紙粘鋪蔭上便取桑葉一云着懷中令暖細切如絲髮節於

蔭紙上矜令均簿將連合於葉上蟻自下連緣葉有不下者輕二振下

掃恐驚傷或過時不下連及緣上連背者此殘病蟻也并連棄了却秤

空連便知蚕分兩蟻可鋪一箔至老可分三十箔每蟻一錢即為

老蚕一箔量葉放蟻慎勿貪多不然則勞而無功矣

如桑可飼十箔
蚕必須養至七

八箔
可也

飼蚕○蟻初生色黑漸漸加食至第三日巳午時擘如小碁子布于

盆中漸漸飼葉

一云擘黑
一云分蟻

○桑必擇佳品桑條初一日一辰可飼四

頓一晝夜飼四十八頓或三十六頓第二日飼至三十頓第三日亦

飼三十頓當用心勤飼○初飼蟻時旋摘細葉用利刀細切用篩二

下不住頻飼蓋旋摘則不乾非利刀則無液非細切則蓋蟻非篩細篩

則不均桑槎微液不能久存少頃成枯故頻飼也

初眠○

一日頭眠
又云正眠

黑蟻瘦白則向食宜少加厚變青則正食宜益加

厚瘦白則慢食宜少減瘦黃則短食宜愈減純黃則停食謂之

正眠○頭眠擗飼候十分眠終可住食至十分起方可投食若八
九分

起便飼之至
至也老都不齊

一晝夜可飼六頓次日可漸次加葉○向黃之時宜

極暖眠起時却要微暖起後天氣清明巳午時間暫捲窓間筆簾

以通風日

南風則捲北窗北風則捲南
窓放八風氣不傷蚕

再眠

一日
停眠

正眠起後自黃而白食宜少加自白而青食宜益加自青復白

食宜少減自白而黃食宜愈減此又一眠也○向眠時見黃先便住食

擗解有候起齊慢飼葉宜薄糝厚則多傷一晝夜只可飼四頓

次日漸漸加葉○眠起時宜溫和起後天氣清明通風如上法

大眠○直候十分起齊投食一晝夜三頓次日加葉至第七八頓午後

天氣晴暖取菜豆麵白米麵或黑豆熟麵

右等麵預先
磨下以待之

與切下葉

一處微用溫水拌勻一箔可飼麵十餘兩却減葉三四則隔一日再如

此飼一頓不惟解蚕熟毒又省桑葉仍得絲多多易綵堅韌有色○

大眠後喫食十五六頓即先得絲多少全在此數日不可怠慢日見有

老者量分數減飼候十蚕九老方可八簇○大眠後飼罷三頓捲

簾去紙窓以透風日不必頻驚生病雖大晚後喜原亦避極風若天氣炎熱門

口置缸旋添新水以生涼如遇風雨夜涼却將簾幃放下

飼養總論○蚕必晝夜飼飼要均若頻數多者蚕必早老少者遲老

二十五日老一箔可得絲二十而二十八日老得絲二十而若月餘

或四十日老止得絲十餘而○若值陰雨天寒比及飼蚕先用乾桑

柴或去華桿草一把點火統箔照過燭出寒濕之氣然後飼之則蚕

不生病○蚕食雨濕葉及冷露濕葉則放白水成白殭會風日即乾

葉及舊乾熟葉則生腹結會浼臭葉則生諸疾濕葉則有可製之法

芟葉積實苦席覆之少時內發蒸熱審其得耶啓葉攤之濕隨氣

化葉亦不寒即可飼之至乾葉臭葉則無可製之法棄之可也○採

桑歸必踈突於室中出熱氣後乃喫食○育蚕而餵葉以甘草水

洒葉次以米粉糝之候乾與食可度一日夜成繭亦厚實謂之齊蚕

唯慎人知浴方蚕似有不實退老之勢以鹽梅糝之一新矣○凡蚕好成則一間可得繭八九

斗我國則以一箔稱一間

分撞總論○蚕滋多必須分之砂燠厚必須撞之共分則不勝蒸濕

故分撞宜頻任食即時分撞每撞之後布蚕若稠則強者得會弱者不得會

必繞箔遊走且於撞時久堆亂積遠擲高拋則蚕身相繼損傷生疾

切宜稀布而安款也布蚕時從高糝下則蚕身相撞已後籬內懶老翁亦類是也

涼暖總論○自蟻初生至兩眠蚕屋正要溫暖蚕母須着單衣自覺身

寒則蚕亦寒便添熱火自覺身熱則酌量去火至大眠後天氣炎熱

却要屋內清涼○晝夜之間大槩亦分四時朝暮如春秋正晝如夏

深夜如冬寒暄不一用火斟酌多少不宜一例

八宜○方眠時宜暗眠起後宜明蚕小並向眠時宜暖宜暗蚕大並起時

宜涼宜明向食時宜加葉緊飼新起時宜薄葉慢飼

蚕忌○烟熏○煎烤鱼肉○烧皮毛○燃火纸吹城○近臭穢○酒醋五辛膻腥麝香茅物○室宇掃埃塵○西照日○當日迎風○倉卒開門暗值賊風○燈火射窓○敲擊門戶○放刀竈上○屋內哭泣叫喚穢言淫辭○產婦孝子不潔人八蚕室○帶酒切菜飼蚕擗解布蚕○未滿月產婦不宜作蚕母○蚕婦不宜頻換衣服○蚕陽物火忌水故食而不飲○蚕畏鼓聲與雷聲伏而不起晚蚕○又有夏蚕秋蚕名曰晚蚕夏蚕自蟻至老俱宜涼惟忌蚊蠅必設帳而衛之秋蚕初宜涼漸漸宜暖養法同前○夏蚕不中繅絲惟堪綿繅而已夏蚕不宜多育或育之辟手黑後復一日早晨一撞其沙繅絲附○凡繭宜擇涼處薄攤蟻自遲出免使押絲相逼如不及則有瓮過籠蒸之法絲之訣唯在細圓緊勻無精節不勻也繅絲不及者用透繭法缸大則入四兩蓋荷葉乞之與繭同停缸內又以荷葉蓋實缸口外用泥固頻視之泥乾有少滂則蟻生宜添泥封隙如此至七日而蟻死不復生○俗

方新繭除置可以作種者其餘曝乾於烈日中三四日後收之則蟻不出若致陰雨鋪乾於乾架之內亦三四日後○長而瑩白者細絲之繭大而晦色青蒼者粗絲之繭皆擗去其蒙戎之衣然後繅之其內潰而漬濕者薄而雜者出蟻者繅湯無緒擗出者繭外衣蒙茸者並只合於綿繅而已漬濕者如欲為粗絲不可以經日經日則絲爛而攤抽不可以焚香焚香則蛆穴而難抽○繅絲有熟釜冷盆之異然皆有繅車絲輕然後可用大釜要大甌置于釜上甌中八水滿甌中用一棍攔斷可用二人對繅水須常熱旋旋下繭多下則繩不及鬻損些可鹿絲單繳者雙繳亦可但不如冷盆所繅潔淨光瑩也冷盆要大先泥其外用時添水八九分水宜溫暖長勻無令乍寒乍熱可繅全繳細絲中等蠶可繅雙繳比熟釜者有精神而又堅韌也

育蚕總論○凡育蚕之時必勤驅蠅子蓋蠅子吐蚕項背之以咏

穿穴吸汁又遺種而去其穴即合仍成小黑點至蚕老成便薄若
旋有蛆穿而後出蠶即無用矣○蚕簇必一一懸於架上層層
倒垂使不着地地上則藉以稻草承接墜下之蚕功不可積薪於
地上蚕作蠶若有賊鼠入其薪中則食蚕殆盡欲逐其鼠蚕方
絡絲不可動簇任鼠恣意隱伏無可奈何故懸簇則免此患矣
○育蚕固人家常業然亦不可歲歲廣育者似有損於陰功故
也曾見繅絲時投蠶於熱湯中則其蠶急動旋轉於湯面蓋其
蚕尚有生意不耐其焦爛之致也急於資生多行不忍之事豈仁
者心乎然不可全廢是業每年只育三四間蚕以備老人襦身紬
衣及若干壽服可也○春初癘疫始行功不可育蚕何也曾有砥
平村民世以蚕桑專業家頗豐饒歲當疫氣熾盛而猶育數十
間蚕老將八簇一室沒數痛卧以致採桑無人蚕飢至三四日無數

自散於外隣人之先痛向差者見而憐之連筐運棄於近山之丘其
蚕遍滿一山烏鳥百羣噪聒爭啄數日乃盡無餘厥後其家復如
前育蚕則其蚕稍大便腐爛皆死終不得一蠶之收年年如此目
而廢業以此觀之可不戒哉

于蚕老活蚕數箔治消渴神蠶蛹水亦止渴白殭蚕治風痰蚕砂
治小兒胎毒暑毒又多用糞毒藥用須收初眠砂 蛹未經痘兒宜喫之及繅

水治伏暑

野蚕○食榜葉而作蠶造布堅韌無比而世言人着之不詳此果何驗
未可曉也

儲桑葉方○盛夏多摘桑晒乾收空石中待明年春夏間蚕欲
老時水漬乾葉令潤喫蚕食之則作蠶堅細甚佳儲葉限百石飼
蚕有餘者飼牛亦好

增補山林經濟卷之六

○牧養

牛耕田馬載物鷄司晨犬防盜至牧羊猪魚鴨之屬可以充
庖深解牧養之道則可賴而資生矣時或馴擾鶴鹿鷓鴣作
伴遣間亦可矣

牧養論○既定人居必有常產畜牧之事亦不可少也故每七月間六
畜房園預先整頓以避風雪不使凍損夏亦留心保護勿致傷熱
可也○陶朱公曰子欲富當畜五特牛馬猪羊驢是也必廣占水
草便宜之地誠心畜牧則所得豈其少哉

牛○作牛牢年月吉日

參考卜居

○納牛吉日丙寅壬寅乙巳辛亥甲寅戊

午凶日乙丑壬申甲戌庚戌癸丑

又買牛吉日丙寅丁卯庚午丁丑癸未甲申
卯丁酉戊戌庚子庚申辛亥戊午壬戌又宜戊

牧開日又正月寅午
戌日六月辛亥未日

○相母牛方○毛白乳紅多產毛踈乳黑不產時犢卧與母面相向

數產相背稀產一夜下糞三堆一年一產一堆則三年一產

○相耕牛方○眼欲大白脉貫瞳眼去角近角欲細而根促近軀

欲危項骨長大毛欲短密尾稍長後脚股間謂兩脚間並快則為

上○又方頭小腦大頭長身短角方眼圓脊高臂低食毛不分

立齊足○頭欲瘦小不用多肉面欲方長短則命促尾稍亂毛

轉卷則命短毛踈長者不耐寒

相牛方○審威眼欲密密則有力不密則少力眼赤者觸人眼下

有旋毛名淚滴不吉鼻欲軟而大易牽鼻如鏘難牽無力鼻上

毛逞凶口欲方大能食盡欲白角向前吉向後凶而角間有難毛

妨主角圓紋細耳去角近略可容指方好骨欲長大目欲得明毛

短密而黑者耐寒踈長如鼠毛者怕寒前脚欲直而濶後脚欲

曲而開蹄欲大青黑紫為鐵蹄吉黃如螺旋用力如雷角欲厚重

尾骨麓少毛者有力○壁堂欲得濶脚股間也倚欲得如絆馬取而正也膺

庭欲得廣前也天關欲得成脊也傷骨欲得垂脊中下蘭株欲得大

尾豐岳欲得大膝也垂頭欲得高百體欲得聚○垂星欲得有努

肉垂星蹄上肉覆蹄間名努肉力柱欲得大而成骨也懸蹄欲得如八字○陰虹屬

頸兩節自尾骨屬頭陽鹽欲得廣夾尾也口中常有似唱者有黃也又云目赤亦○

洞湖無壽從頭至尾珠潤無壽目下也上池角中有亂毛妨主凶身欲得促

形欲得如卷信其形側○大膺踈肋難飽○龍頭突目好跳豨○筋欲得

成就後橫也歧胡壽收壽而收下分為三錄府方易飽

○相毛色法白牛頭黃角間一戶青赤黑牛額有台黃黃胎台白黃黑背有白條並吉餘云○餵養法○牛之為物切

于農用有功於人大矣善養畜者必有愛重之心順其涼暖時其飢

飽節其作息養其血氣若然則皮毛潤澤肌體肥腴力有餘而至

老不衰其何困苦羸瘠之有○方舊草凋朽新草未生之時宜取
潔淨葦草細割之和以麩穀糠豆之屬使之微濕槽盛而飽之春秋
草茂放牧飲水然後與草則腹不脹至冬月天氣積陰風雪嚴凍
即宜處之溫煖之地煮糜粥以啖之預收豆楮之葉舂碎而儲積
之溫米泔和割草糠麩以飼之又方乾桑葉未垂
或綿餅同飼之○俗方冬間每日豈
箕即角三四斗太數并煮熟釜中垂暖拌細割葦草朝夕飽喂
夜又頻與草得十分胖壯然後可以春耕○牛忌放斃晨露之
草必生病

○牛廐○須夏涼冬暖而必置家內深隱之處固其扇鑄廐傍安猛狗
宿所以備警守盜賊廐前又設木簾法見家
改葦網以防虎患○廐
下鋪磚石或木板則牛足必痛澁○春初必去牢欄積糞自此以後
旬日一除免穢氣蒸鬱為患且使無浸積蹄甲以生疾○廐地上鋪

場上糠穰使牛角踏下糞次日又以糠穰覆之每日一覆十日除之
春夏則鋪雜草櫟葉之屬使牛踏且糞尿之每四五日一除而積
之

○牛衣○上用莎草結綴則利水下用葦花結絡則溫暖相連織成
如結蓑衣法遇極寒鼻流微涕腰軟無力將蓑衣搭牛脊用麻
繩綫繫免致凍損可也

○耕法○每遇耕作之月晝以放牧夜復飽飼至五更初乘日未出
天氣涼而用之則力倍於常半日而勝一日之功日高熱喘使令體息
勿竭其力以致困之此南方晝耕之法也若夫北方陸地平遠牛皆
夜耕以避晝熱夜半仍以芻豆助其力至明耕畢放去蓋飢欲食
渴欲飲即物之情也至於後使困之氣喘汗流耕者爭于熟食或
放之山或逐之水牛之七竅皆空踈筋力疲乏顛蹶而僵仆者往往

相籍利其力而傷其生豈愛養之道哉○家有一牛可代七人之力
一云標牛者備九人挽犂可代一牛之力日耕可種二三十斗如教小牛必令慣耕老牛同負犂耙
使其純熟自然知耕道矣

○凡牛老疲或病殘不堪使者不可買諸屠肆雖自斃者亦不許隣
人剝割食之便即埋之蓋有功之物不忍如此故也○且使牛見屠
牛之狀牛必生病

○牛雜病

牛之為病不一其用藥與人相似但大為劑以散之無不愈者漸有
血傷於熱也以血藥治之冷結則鼻乾不喘以發散藥投之熱結則
鼻汗而喘以清利藥投之其或天行疫多些葉蒸相染則避地而投除疹氣而救藥或可偷生也牛患氣脹病冷熱相衝

傷重損脾先用攻胃散白芷一兩茴香一兩桔梗一兩蒼朮一兩細辛一兩
芍藥一兩橘皮九錢官桂一兩右為末每服一兩用生薑一兩鹽水一
井同煎溫灌之

○牛忽肚脹狂走觸人用大黃黃連各五錢鷄子清一箇酒一椀和勻灌

之○牛喫雜虫腹脹用燕子屎一合水或酒調灌之○牛多食生豆
腹脹垂死者研麻子作斗五升溫令熱灌口中甚良 牛肚脹及嗽
取榆白皮水煮熱甚滑以三五升灌之即差矣

○牛屎血用當歸紅花為末酒煮一合或日酒浸一椀灌之效

○牛糞血取竈中黃土二兩酒一升煎候冷灌之 ○牛尾焦不食

水草用大黃白芷黃連各五錢為末以鷄子清一箇酒調灌之立效○
凡牛不吃治方青木香四錢金銀花一升共煎湯灌下立效

○牛鼻脹四錢用巖散醋一盞灌耳中立效

○牛眼遮白膜用炒鹽并竹節燒存性細研一錢點膜上

○牛身上生虫用當歸搗爛醋浸宿塗之

○牛爛肩用蘆絮三兩燒存性麻油即真油調付忌水五日

牛漏蹄用紫磺木脂液結成形若爛石與血竭同條為末猪脂和填漏蹄中燒鐵烙之

牛咳嗽用鹽一兩豉汁一升相和灌之

牛以鬼氣其氣身戰汗出口鼻冷先灌鹽湯一升細切葱白一握好

酒一升同煎三五沸灌之如不差更灌之血轉脆者難治以血轉脆

牛患熱病口黃黑色似青泥四脚不收用白木散白木二兩蒼不二兩

紫菀三兩牛膝二兩麻黃三兩厚朴三兩當故三兩葶藶本三兩右細末每

服二兩用酒二升煎放溫草後灌之即差○一方用胡麻葉味甘搗

汁灌之立差 一方青菘味甘煎水灌之

○牛病後腸結不得放糞白木二升浸一宿研取汁生油半升相和灌

之差

○牛疥癩用藜蘆州為末水調塗之豉 蕎麥穰味甘燒灰淋洗煮

烏豆汁熱洗五度差

○牛虱以胡麻油塗之即愈猪肚亦得六虱塗之亦愈

○牛瘦活鱧納竹筒灌之易肥

○牛舌腫脹伸出口外不收者取草麻油蘸紙擦燒烟熏之而愈治人亦效

○牛發痘斑以青藜作粥啖之

○牛馬百病柳葉生牛乳同搗令爛丸如彈子晒乾用時搗細末仍和

生牛乳灌之神效○牛病用牛膽一介灌口中差○牛馬六畜回食

水穀有傷並瘟疫用酒加些麝香末灌之神效一方用酒麵煎汁灌

之立消

○牛子死腹中以朴硝煎湯灌之真奇方人喫六畜同效

○牛疫○預防法有病氣千金木味甘斫取擁廐又取葉剉和草飼

之又煮葉待冷令飲之或灌之又牛欄中燒安息香即此木之脂液蒼木以

鼻吸香止 疫近處先用小便使未病牛飲之日三四次則不傳泥水

常時牛喜人小便男子直放注其口則自能接飲最為神效○救豆

塗於牛角上辟惡○未發時預以羊蹄吳音汁二三升灌口始發亦灌
○未發時吐涎者是瘧疫也取黃白研汁白石燒灰二種以酒調和
灌口以防之○先吐涎不止者取真墨研汁藍汁各三合石灰一合酒
半升相和灌之

○牛得惡卒之疫以頭打脇者用巴豆唐七箇去殼搗爛以麻油生和
灌之又方巴豆兩介如無別大黃五錢作和生仍用皂角末子一搗吹入

鼻中更用鞋底中於尾停骨下四拍之或云○牛
疫芭蕉根汁一椀灌口連三日則雖毒疫必差但此草預多種之以備

牛疫○一方用石葛蒲淡竹葉葛粉鬱金菜豆蒼木等分為末
每一兩芭蕉自然汁三升八蜜一兩黃蠟二錢調和灌之未解則再

灌熱極加大黃鼻頭無汗加麻黃鼻口出血加蒲黃○一方臘月
糟生引一大升赤茯苓末四兩石蒲末大黃末各二兩地黃汁一升醋

半升小便一大升調和灌之隔日一灌五度即止仍鍼鼻毛際一分
許血出差○一方大黃柴胡各一剉水煎灌之立差或單用大黃二

水煎分兩次灌之以下泄為限曾見疫牛有至○一方黃柏剉水煎無
量灌口○真雀舌茶二為末和水五升灌之○臘月免頭預燒

灰和水五升灌之○狐頭尾燒灰和水灌之狐腸灰亦好○地龍多
取納牛口中撝其吭使下以差為度○取大膽中壓之放溺去皮

頭取肉搗爛和水灌之○屎秘以油塗手探穀道去結屎以通為
度

○牛馬時疫並治方攪口反屎或肝肚水煮汁待冷灌之○溫毒
墨豆煮水灌之○時疫用白木藜藿盧川芎細辛白石

菖蒲等分粗末燒薰兩鼻令烟八腹即愈○初發時身體中有
一腫至引仔細審之以燒鐵條烙其腫處又冷水浸豎令體寒

為度又以艾炷如小指大灸神關即臍中三壯○牛馬六畜疫並治方酒和麝香少許灌之

馬○相良馬法下頭欲高峻面如剝兔去皮也眼似垂鈴眼下有肉腦

骨欲圓耳如削竹食槽也欲寬鼻要寬火上唇欲方口又欲深

下唇欲圓頰骨欲圓項長彎曲鬃薄茸細前者似鳴鷄臆欲

平鬃甲也欲高脊梁欲平排鞍也肋扇骨也密腰短促後

省似狗蹲膝骨圓脛也骨細前蹄圓大而直掌骨也高尾骨

短尾欲茸細汗溝欲深外腎小腿如琵琶曲池深後脚欲曲鹿節

骨細後蹄尖壯也下生逆毛腹欲平乘鐙也肉厚前脚直筋

之筋欲鹿眼似乘鈴而紫色浸睛睛要分明而白襍貫睛日行

五百里目赤反也睫者善走瞳生五彩則壽高眼大則心大而

猛利不驚耳小則肝小而識人意擡頭鹿耳蹄曰騷風耳耳一

尺價直千金耳微一寸日行十里口深而口中色紅光者千里馬舌

如垂劍而色似蓮花肋骨過十二條者良三山骨平則易肥額

下欲深額欲方平耳下八肉大而明眼下直下骨欲直腦堂欲開

而望如雙鳥席口也欲開夜眼也欲大尿過前蹄及尿時舉一

脚尿而似犬者也日行五百里四蹄圓實而卓立羊鬣俗稱也有

距也距如鷄爪者日行千里骨角雙生蹄曰龍駒初產無毛是

謂龍種目有重瞳勿視輕○凡馬耳短小性寂快鼻大能奔四

蹄實則能負重且眼大鼻大筋骨壯行立好口內紅便是可畜之

馬

○辨駕馬形狀下○頭大而重耳濶慢大口又淺下唇急頰薄冷

項處短筋細皮急毛鹿臘大蹄下實足腕項足小膝骨小脈下肉急
膈下肋短腹大而垂後脚直脊高而直肋骨三山高尾本高項足
汗清淺而不明腹狹腰凹腿鹿羊眼象目猪腰駝皆不能奔
辨三羸互駕法○大頭小頭一羸弱脊大腹二羸小頭大蹄三羸大
頭緩耳一駕長頸不折二駕短上長下三駕大駘短脇四駕淺體薄
駘 體是川人可駘 五駕也
相旋毛吉凶謂 見下○項上騰蛇旋應為不利長喪門無挾尸元來
不祿良牛額無啣禍為禍固非常啣禍口邊銜時時逢主傷黑色
耳全白從來鬚虎頭離是千里足奉勸不須留帶飲渾閑事喪門
不可逢擔耳駝鬚頂鰲尾則凶眼下生旋毛遠看似淚痕古人如此
說莫謂是虛言

○相凶馬法○白首黑身銀鬃玉頂耳白腰花沙睛是也環眼面短肉橫

橫眼深無肉

白從額上八口者名曰愈膺又名的盧奴乘客死主乘乘市大凶馬也
左脇有白毛直上名曰帶刀不利人白馬四足黑者黃馬白口者並凶後
左右足白者殺婦膝骨圓大而如盃汗溝上通尾本者踏殺人目赤
反睫者善走傷人目下有橫毛者不利人○眼下無肉多咬人世言
毛長 咬蹄 齒左右蹠不相當難御 目不四滿不愛人下唇急亦然
○相馬壽夭法○眼中五彩俱及眼箱下注有字形壽九十鼻上紋
如王字公字壽五十如火字四十如天字三十如山字水字二十如介字
十八如四字八歲如宅字七歲旋毛在眼箱上四十在箱骨注中
三十在中箱下注十八口中見紅白光如宅中着火者壽若黑
不鮮明盤不通明者不壽盤言問也
○相馬遠法○夫遠者骨之精粹其感者雖上下咬平注猶有鋒
刃而行力依然其壽無可考也骨氣衰敗者二十歲區白俱平而無

項處短筋細皮急毛處腫大蹄下實足腕項足小膝骨小腋下肉急
 膈下肋短腹大而垂後脚直脊高而直肋骨稀三山高尾本高以
 汗清淺而不明腹狹腰凹腿處以羊眼象目猪腰駝皆不能奔
 辨三羸互駕法○大頭小頭一羸弱脊大腹二羸小頭大蹄三羸大
 頭緩耳一駕長頸不折二駕短上長下三駕大駱短脇四駕淺體薄
 駝體是川人可解五駕也
 相旋毛吉凶謂見下○項上騰蛇旋應為不利長喪門無挾尸元來
 不祿良牛額無啣禍為禍固非常啣禍口邊衝時時逢主傷黑色
 耳全白從來鬚虎頭離是千里足奉勸不須留帶飲渾閑事喪門
 不可逢擔耳駝鬚頂鬚尾則凶眼下生旋毛遠看似淚痕古人如此
 說莫謂是虛言

○相凶馬法○白首黑身銀鬃玉頂耳白腰花沙晴是也環眼面短肉橫

白從額上八口者名曰愈膺又名的盧奴乘客死主乘乘市大凶馬也
 左脇有白毛直上名曰帶刀不利人白馬四足黑者黃馬白口者並凶後
 左右足白者殺婦膝骨圓大而如盃汗溝上通尾本者踏殺人目赤
 反睫者善走傷人目下有橫毛者不利人○眼下無肉多咬人世言
 毛長毛長齒落左右蹠不相當難御 目不四滿不愛人下唇急亦然
 ○相馬壽夭法○眼中五彩俱及眼箱下注有字形壽九十鼻上紋
 如王字公字壽五十如火字四十如天字三十如山字水字二十如介字
 十八如四字八歲如宅字七歲旋毛在眼箱上四十在箱骨注中
 三十在中箱下注十八口中見紅白光如兒中着火者壽若黑
 不鮮明盤不通明者不壽盤言周回也
 ○相馬遠法○夫遠者骨之精粹其感者雖上下咬平注猶有鋒
 刃而行力依然其壽無可考也骨氣衰敗者二十歲區白俱平而無

鋒刃雖能食亦無其力是故駕駿於此亦驗矣蓋不周高不久疾不○一

歲駒齒四三歲駒齒三四歲成齒二五歲成齒四六歲肉牙

生七歲角區缺二八歲畫白一九歲咬下中區二齒

白外則下是則十歲咬下中區四十一歲咬下中區六十二

歲咬下中區二十三歲咬下中區四十五歲咬下中區七十六歲咬下中區九十七歲咬下中區十一十八歲咬下中區十三十九歲咬下中區十五二十歲咬下中區十七二十一歲咬下中區十九二十二歲咬下中區二十一二十三歲咬下中區二十三二十四歲咬下中區二十五二十五歲咬下中區二十七二十六歲咬下中區二十九二十七歲咬下中區三十一二十八歲咬下中區三十三二十九歲咬下中區三十五三十歲咬下中區三十七三十一歲咬下中區三十九三十二歲咬下中區四十一三十三歲咬下中區四十三三十四歲咬下中區四十五三十五歲咬下中區四十七三十六歲咬下中區四十九三十七歲咬下中區五十一三十八歲咬下中區五十三三十九歲咬下中區五十五四十歲咬下中區五十七四十一歲咬下中區五十九四十二歲咬下中區六十一四十三歲咬下中區六十三四十四歲咬下中區六十五四十五歲咬下中區六十七四十六歲咬下中區六十九四十七歲咬下中區七十一四十八歲咬下中區七十三四十九歲咬下中區七十五五十歲咬下中區七十七五十一歲咬下中區七十九五十二歲咬下中區八十一五十三歲咬下中區八十三五十四歲咬下中區八十五五十五歲咬下中區八十七五十六歲咬下中區八十九五十七歲咬下中區九十一五十八歲咬下中區九十三五十九歲咬下中區九十五六十歲咬下中區九十七六十一歲咬下中區九十九六十二歲咬下中區一百零一六十三歲咬下中區一百零三六十四歲咬下中區一百零五六十五歲咬下中區一百零七六十六歲咬下中區一百零九六十七歲咬下中區一百一十一六十八歲咬下中區一百一十三六十九歲咬下中區一百一十五七十歲咬下中區一百一十七七十一歲咬下中區一百一十九七十二歲咬下中區一百二十一七十三歲咬下中區一百二十三七十四歲咬下中區一百二十五七十五歲咬下中區一百二十七七十六歲咬下中區一百二十九七十七歲咬下中區一百三十一七十八歲咬下中區一百三十三七十九歲咬下中區一百三十五八十歲咬下中區一百三十七八十一歲咬下中區一百三十九八十二歲咬下中區一百四十一八十三歲咬下中區一百四十三八十四歲咬下中區一百四十五八十五歲咬下中區一百四十七八十六歲咬下中區一百四十九八十七歲咬下中區一百五十一八十八歲咬下中區一百五十三八十九歲咬下中區一百五十五九十歲咬下中區一百五十七九十一歲咬下中區一百五十九九十二歲咬下中區一百六十一九十三歲咬下中區一百六十三九十四歲咬下中區一百六十五九十五歲咬下中區一百六十七九十六歲咬下中區一百六十九九十七歲咬下中區一百七十一九十八歲咬下中區一百七十三九十九歲咬下中區一百七十五一百歲咬下中區一百七十七

區又如上法次茅黃此時則上下咬盡黃也自二十七歲至二十九

歲自下咬如上法次白自三十歲至三十二歲自上咬如上法次茅白

比則上下咬盡白也前見

○驗馬無疾○舌如蓮花唇如桃花四肢輕健糞潤尿清睛不迷皮

光彩精神多鼻氣溫和頭尾不動輪歇後蹄

○驗馬有疾○口腥舌穢顏色無形狀離常鼻流膿涕連嗽不已皮

毛焦瘦頭低耳搭耳精神少四肢困怠行步遲面浮鼻腫雙睛

閉腹細腰弓喘息微

○馬有天生三病○蹄薄而不能致遠前蹄是不能即驟後蹄不能

登峻此三者胎病無方治之

○養馬法○造厩吉日參考十○買馬吉日乙亥乙酉戊子壬辰乙巳

壬子己未又宜成收日○刀砧血忌血支日忌驢馬割鼻行鍼徹血

火烙又忌馬本命日忌治病鍼灸九月己日十月亥日十一月午日

十二月子日每月午日午地忌

○馬火畜也其性惡濕利居高燥宜南拴不宜北繫言繫宜冬須暖

厩夏必涼棚槽櫃須令潔淨毋得雜以羽髮蛛絲沙石灰土諸雜穢

惡之物食之即瘦瘁生病矣

○喂草料法○頭平繫行相雅稀潤須揀擇新草篩簸豆西米忌飼赤

重脚若熟料用新汲水浸淘放冷方可喂之切忌凍料宿水每夜二

三次起喂草若馬脹也肥大或騎少或炎熱休加熟料○飢時與惡

芻飽時與善芻引之令食常飽則無不肥挫草鹿雖足豆穀亦

不肥又細剉無芻而飼之則肥○飢腸休喂飽出門休喂飽遠未休

喂飽

○飲水法○一日三次朝飲少之晝飲酌其中暮飲極之不飲飲水宜

以新水忌宿水濁水沫水謂夏暵冬寒亦節飲大槩喂水不謹亦

能成疾○行路時母得飲水无忌近歇處○冬月飲訖便須騎三

即無傷○騎未母得飲料後母得飲有汗母得飲飢渴休飲足吐瀉

休飲足妊娠體飲足○或以鹽水飲者勿多則損其腰腹以成

腎冷致後失矣

○馬遠回喂養法○冬春遠回騎勞汗出則勿去鞍徐徐刷毛待其喘息

平定汗收後始去鞍音汗俗移時飲喂則使馬不致外感風寒

矣先飼長草一束後與切草良久又以料二三升和水草啖之又淨

水一大斗切草與料三四升和啖常飲淨水○凡騎馬遠行歇宜早

喂宜遲未喂之先飲水數口方可飼草不爾必有中結之症

○放牧法○五月後勿放至秋放牧八月份時一日騎出衙汗勿過勞着

草馬衣過夜收汗平明剉之無穗長草一二束喂之飲冷水一二碗一

息乃止還放隔十日如前法少加勞養良馬五度常馬三度若馬

八九月不肥草枯前給料豐肥飼稷宜馬吃露草則○苦霖嚴霜

必致憔悴生病宜收之

○飼征馬令硬實法○細剉芻斂揚去葉全取莖和豆穀喂之置槽

於露地雖雪寒勿令安廠下廄一日走令其肉熱則馬得硬實而耐

寒也

○割鼻法○馬四五歲有膿也者方許割蓋寬通鼻孔令馬不生熱

疾之法也

擇天氣晴明早晨草將馬縛於高柱用好鐵錐刺鼻左右手執觀填枕鼻孔右手持利刃自下而上割之驢馬直左右

治惡馬法○牛肉爛搗食之性即善○咬人以殭蚕拭馬唇內外

即不咬人

殭蚕未塗馬處則不咬草以桑葉拭去復喂草

○灌藥法○凡灌藥之法縛馬橋上從上灌下蓋恐藥入喉門則鼻

流黃水便死故也我東則縛倒馬灌之此是危方必令熟手用心

灌藥可也

○治馬瘦方○馬善喂而不肥者是有瘦虫也煮料時貫象

一二枚同煮久久喂之虫出而肥○猪膽或犬膽汁和料啗之則肥

○馬雖食草料腹不能充人參甘草白木當依各二錢大黃六錢貫

衆五分為末無水酒一鍾真油一盞鷄卵一箇和之早朝灌口高繫

不啗水草午後方啗水草未愈再服

○治馬目暈方○用霜後乾穀樹即楮之皮白者葉為細末一日兩度以蘆管

吹入眼中

○治馬眼骨方○此以指尖反出內眥細察則中有似魚鱗狀者非

肉非骨名曰閃骨先用綿紙度量膜皮間貫而引之以利鍼割

去閃骨不損血輪可也○初發未甚時削柘木世如簽子狀以鍼

橫刺頂上旋毛中向上直刺二寸即差後經宿拔去以燂蠟塞

其穴誤觸風必致頭腫而死○初有氣亂髮燒熏鼻中流清

涕至流濃涕則愈又方爛茅草燒熏鼻中○初發時百草霜

鹽炒等分細末一錢納眼中即差能膽小豆大細研毒酒一鍾

半和勻徐徐灌之後腹痛一日不給料即差○凡馬眼骨後腹

痛及諸他腹痛灸神闕穴中脘五十壯神驗○俗方反內腎納大豆各一枚任其自潤脫出差○又鯉魚膽少許納內腎○水荏子少許以手揉破作凡如菜豆大細目皆內鼻出黃水差○鼻孔內近上數寸許以鍼貫刺出血又刺兩耳內尖又刺尾尖上凡病眼骨馬施治後即起立振背放尿喂草是欲差也如有後腹痛灌燒酒一大鐘即馳驟少時

○治馬不進水草方○鷄卵一箇鷄卵用二箇去殼取水真油三合清蜜三合熊膽一錢半大蒜一顆爛研豆淋酒取黑豆炒令極熱投酒中即豆淋酒一升和空心灌之至夕先喫草料飽後少喫水一斗徐徐飲之不愈再灌○俗方馬熱不食以奴僕所着弊穢襪洗取其汁不飲又灌之即效

治馬傷水○騎驟緊息喘息未定時遇水飲之須臾間兩耳並鼻

息皆冷及流冷涕即此症也用葱白一握鹽一兩許搗為泥罨於兩鼻內須臾打嚏清水流是效也○一方前方內加油搗成團內鼻中以手捉馬鼻令不通氣良久待眼淚出即止○先燒亂髮熏兩鼻後用川烏草烏白芷胡椒猪牙皂角各等分麝香少許為細末用竹筒盛藥一字二分吹入鼻中須臾打嚏清水流即效更加荻蒂等分用之則兼治傷水中結一切病症其效如神不效再吹○治馬前結方○皆曰料後乘騎急驟歸來又喂喘息未定口涎未定口涎未清以致痰裹草料相和一塊通八大腸前面成結也令馬肚腹脹痛咬臆跑腦不時卧地足仰朝天用通關散續隨子滑石木通鼠糞黑丑酥油合皂角灸石為末每一兩生油四兩灰湯羊蓋苦酒馬醋也一升調煎三沸八大黃末硝各一兩灌之不住擗行用箒於腹下刮之

○治馬中結方○穀草積於大腸中面之症也令馬肚腹脹痛仆臥
腦連連起卧鼻哮喘粗將馬縛倒先以溫煖油三升灌八穀道
中然後使小手者再將油塗手臂上下徐徐八手於大腹中輕輕
搜尋如遇滑硬如毬打手者即是結糞握破其糞便是見效若
人手短難取馬價凡灌之五灵脂牽牛日逐大戟續隨子大黃
滑石香附子瞿麥木通各二兩為末醋糊丸彈子大每一丸碎溫酒
一丸和生油四兩灌之調理上同○用雄鷄一隻勿用刀割以拳挺死
就熱便開破肚取心肝腸嘴爪指甲帶糞八風和石灰一合舂碎
剝爛入直芝麻油四兩調勻灌之立效鷄不用只○又方大黃郁李仁
穿山甲黃各一兩風化石灰一升如無代升為細末作一服真麻油四
兩醱醋一升調勻灌之立效如灌藥不適用猪牙皂角為細末和真
麻油四兩填納於穀道中再灌前藥一服即時便透

○治馬後結方○草穀積於大腸後面之症也令馬肚腹飽脹靛後回
頭起而復起必用上手取法不然用打結凡續隨子四兩郁李仁一兩皂角
半兩瞿麥一兩鼠糞四兩榆白皮二兩牽牛一兩芫花草二兩石為末麵糊丸彈子
大每一丸碎與細切青葱三根苦酒一盞同煎三沸八生油四兩童便
半盞灌之調理上同

○治馬大小便不通方○卧起欲死急治可救以脂或油塗人手探穀
道去結屎又以鹽納溺道中溺出便差○小便不通滑石一兩朴硝木
通牽牛子五兩各二兩為末同濕水灌之未通再灌○大便不通
俗方南蠻椒一握碎納穀道中

○治馬泄瀉方好麩末微炒四兩蒼木末四兩溫泔湯調灌之未愈再灌○
冷腸瀉者令馬肛門瀉瀉水腹內如雷多飲火食懸吊毛焦用
猪苓散猪苓澤瀉青皮陳皮菖蓉牽牛子作末每二兩粟米二合

煮粥同調灌之後以無根水洗口鼻立痊調理飲須足飲了辛行百步空腸冷水三日忌之

○治馬轉胞方○此名腸結令馬肚腹脹痛踏地蹲腰欲卧不卧打尾跑蹄用滑石散滑石澤瀉燈心茵陳知母黃柏酒炒猪苓在末每二兩水一升

調煎三沸八童便半盞空草熱灌○調理徐奔走腹下割之也○用細辛防風芍藥各一兩以鹽一

盞水五盞煮取二盞分為二服灌後灌前用芒硝鬱金寒水石大青各一兩水五盞前至半以酒油各半盞調勻分二服灌口中

妙○用小兒屎和水灌之立差搗蒜細小便孔中深五寸亦可

○治馬溺血方○秦芫散秦芫黃芩麥冬當歸黃芩甘草紅花大黃芍藥梔子天花粉車前子右為末每服一兩半青竹葉煎湯一盞同調空草灌之又竹葉喂之勿駟驟

○治馬噎草方○奔走遠來喘環未御猝然喂草嚼不能細嚥之太猛涎草成塊至咽中半而噎令馬伸頭縮項鼻口回涎連連噎

嗽氣促喘粗治法遊韉明繫後脚帝往高坂趕逐急行十數遭噎自下矣油水灌之噎通暫停草料

○治馬傷料○喂養感而少騎穀氣凝於脾胃腸中不能運化邪熱妄行令馬神昏似醉眠閉頭低拘行步束四足如攢用麩葶子

散神麩麥芽山查四日草厚朴只南陳皮青皮麩不○右為末每服二兩生油二兩生薑當一介搗爛童便一升同調灌之

○治馬五臟噎嗽方○肺噎噎而喘息有音鼻流膿涕甚則死氣

出遺糞宜白芨散白芨苗藤梳子甘草黃連防風各四兩杏仁一兩一升煎三沸草能灌之也○心噎噎而前蹄跑甚則咬遠頭垂於地宜連翹散連翹吉更見母紫蘇菜瓜薑仁杏仁白芷山藥知母甜瓜子馬兜鈴當歸右為末每服二兩蜜二兩羌三片水一升煎草後灌之

○肝噎噎而頭則左顧甚則口吐涎宜枇杷散枇杷葉款冬花知母小蘗仁蘇子乾地黃

自然銅紅花子天門冬麥門冬馬薺鈴山藥杏仁貝母紫菀葶藶散芍藥木通甘草瞿麥浸藥阿膠珠地龍黃連右為末每服二兩童便一升同調草○脾噎噎而頭則右顧甚而嘔吐則出長虫宜百部散百

三兩枇杷葉四兩去毛青皮二兩厚朴一兩右為末分作三服卷 ○腎噎則

懸其後脚甚則小便而遺溺宜沒藥散沒藥當收玄參白朮子甜瓜子自然銅醋炮貝母紅

花白芷秦芫右為末每服用兩半花白芷秦芫右為末每服用兩半上五方各治五臟噎而肺噎而

肺噎甚又用漢防己散漢防己白朮款冬花陳皮甘草知母桑白皮黃連水通杏仁去皮夫右末每服一兩蜜二兩生羌三

治馬肚脹方奔走太急氣結胸中不能升降令馬肚腹脘滿膈

脹膨咽喉噎噎氣促喘粗宜天仙散天仙于當歸連翹大黃白芷貝母黑丑百合甘草白芍藥右末每服

二兩蜜二兩蘇汁二兩蜜二兩蘇汁○馬猝熱腹脹起卧欲死藍汁二升和冷水二升灌

之立效一年同調灌之

治馬喉骨脹○此熱極三喉之症令馬食槽脹腫硬核填喉伸頭

直項鼻孔流膿水草難嚥噎吸連聲宜黃芪散黃芪當歸歸鬱金日草梳子黃芥

黃連知母貝母吉更右末每服二兩蜜二兩黃連知母貝母吉更右末每服二兩蜜二兩徹鬲脉血忌生料休控暖處○俗

方幻駒此病稱項証明猶小兒之痘必經一次乃已未病前手摸喉下

有結核如鷄卵者用艾炷多多灸則核自散或云以大鐵裂皮挺出核

子用藥貼裂處待差好

治馬頰骨脹方○取羊蹄根卷四十九介燒炭熨骨上冷則摸楊柳枝指大者灸熨亦可

治馬鼻內出膿方○百合散百合貝母大黃甘草瓜蒌仁右末每服一兩蜜一匙蒸麵一匙蘿蔔湯一匙調灌之

治馬熱痛○即傷暑症令馬低頭眼閉行立如痴卧多立少惡熱

喜冷宜香蒿散香蒿黃芩黃連甘草柴胡當歸連翹山梳子天花粉右末每服二兩蜜二兩漿水送下半升童便半盞同調草後灌之

治馬患心經伏熱方○令馬舌唇赤腫口內垂涎精神困倦而眼如朱

宜洗心散天花粉木通黃芩黃連連翹茯苓神黃柏山查子白芷吉更牛勞子右末每服二兩蜜二兩茶甘水一升同調草飽灌

俗方茅根造策淨洗判喂菜豆亦飼之

微服堂血之涼桂生料忌之

忘料休控暖處徹鬲脉血水浸青草喂之

○治馬肺風毛燥○熱積心臑傳於肺則令馬渾身搔痒遍體風

生皮肌措擦脫落鬃毛宜五參散人參苦參玄參紫參秦花何首石末每半兩蜜二兩酸漿

一盞即粟泔也皂莢一挺搗碎取汁洗宜甘草湯甘草荳蔻防風荆

羊蓋同調灌之微鷄豚血勿近洗宜甘草湯甘草荳蔻防風荆

○治馬破傷風○馬體中或有瘡破處簷卷賊風曰虛入皮膚令

馬渾身麻痺眼急驚狂四肢強硬口內垂涎耳緊尾直牙關難

開不食水草宜千金散蔓荆子旋覆花白僵蚕何首烏桑螵蛸天南星

細辛乾葛一云蝎升麻蒼香獨活石末每一兩濕水

○治馬肺寒吐沫方○令馬精神困倦耳搭頭低頻頻咬齧吐沫垂涎

宜半夏散半夏升麻防風飛礬石末每兩半黃蘗一匙蜜一

匙生薑一瓦酸漿水一升同調草龍灌之

○治馬黑汗方○渾身肉顫汗出如油行如醉人目瞪頭低宜茯神散

茯神三錢朱砂一錢雄黃一錢石末黃蘗水半盞醴醴取汁猪膽汁半盞同調灌之

微鷄豚血又以利刀於尾尖尖上十字辟之以親衣蒙腦并華水頂上洗之如車行

效○又方乾馬糞安於瓦甌內上用人髮蓋之燒令烟入馬鼻中立

○治馬內障眼方○此毒氣衝肝也令馬眼生黃暈掩閉瞳人擇行亂

走撞壁衝牆宜瀉肝散石末明草次明龍胆草旋覆花青箱子梔子蔚金黃

連日草石末每一兩半水一升調灌草龍次日又灌

○治馬肝經風熱○肝熱生風令馬眼胞翻腫皆肉瘻紅睛生翳障

眩感難睜宜防風散防風黃連黃芩青箱子龍胆草荆芥石末明草浸藥甘草

同調草後灌之微太陽血割開骨烙睛胞在朝

○治馬肝熱傳眼○睛生白膜眩感難睜牽行不動耳搭頭低逢物

不見宜石決明散石決明黃連沒藥梔子大黃黃芪黃芩蔚金草次明石末每二

兩蜜二兩鷄子清二升米泔水一升同調飽後灌之微太陽

○治馬水冷傷脾方○令馬渾身發顫腹回頭連連卧地鼻咋喘粗

穴春冬喂菜豆夏秋水浸青草喂之停生料勿令冒風

其痛有五直尾行大腸痛捲尾行小腸痛蹲腰踏地胞經痛腸鳴泄瀉冷氣痛急起急卧脾經痛宜橘皮散加減清皮陳皮厚朴桂心細辛茵陳香薷白芷 栝榔右末每二兩葱三枝飛藍三錢苦酒一升同煎三五沸溫灌之○大腸痛去白芷加蒼朮木通小腸痛加吳茱萸蒼朮胞經痛加皂角艾葉脾經痛減茵香加白朮甘草鐵四蹄頭血冷水休拴冷處

○治馬胃冷方○令馬渾身發顫口吐清涎鼻寒耳冷臙吊毛焦宜健脾散官桂白朮當故只亮甘草茵陳厚朴澤瀉升麻半夏赤石脂右為末每服二兩生薑一片苦酒一升同煎三沸溫灌

之口讀理上同

○治馬寒傷腰膝痛方○寒濕入腎經傳於腰膝或閃傷促損瘀血注積腰間令馬前行後拽膝痛腰拖毛焦臙吊耳搭頭伍凡馬寒傷蹲腰行者宜苗香散火鍼大勝汗溝血閃傷吊腰行者徹尾本血大效忌湿地賊風○後溫散附治馬後寒方附

○苗香散苗香白附子川練子肉桂每服兩半鹽三錢苦酒一升煎

三沸溫灌 空草後溫散治上同並細辛左右末用子吳茱萸蒼朮厚朴白朮

沸使過入送薰門廣腸中不住幸行以 ○治馬後寒方用麩麩

拋糞帶出白膿為驗凡三次差矣 ○紅花散紅花當故沒藥苗香川練子巴戟

濕令勻炒無入中 ○紅花散紅花當故沒藥苗香川練子巴戟

格於腰上隔宿去之 ○紅花散紅花當故沒藥苗香川練子巴戟

每二兩飛藍一盞 ○馬腰痛久不愈方兩充係

子秋夏白湯一盞 ○馬腰痛久不愈方兩充係

深酒調微熱灌之 ○馬腰痛久不愈方兩充係

○治馬遍身黃方○黃者氣壯血盛而血堆經絡溢於膚腠凝結而成瘀血化為黃水黃者硬而不痛遍身黃者名肺風黃蓋緣心胸壅極熱注三焦料毒聚於腸內垢塵迷塞肌膚氣血相凝結而成黃令馬渾身疙癢之 適體生癰皮膚燥痒口眼風浮腫此肺熱生風也宜消黃散黃芪貝母連翹金甘草蟬退右末每二

兩蜜二兩朴硝一盞同調灌之 微骨脉血喂青草綠豆揜涼處忌生料

○黃腫起時便用鐵適刺腫處然後用黃栢雄黃木鱉仁糖各等分為細末末作糊調冷塗於瘡上紙貼之

○治馬敗血凝蹄方○速至卒拴未得掉散血瀝於蹄或久拴久立立亦致此症令馬蹄甲焦枯蹄頭堅硬令馬把嘴前把後腰曲頭

但卧多立少起走如損如削垂泉穴在蹄下烏金膏塗蹄烙之三修三烙差矣沙土鋪於厩內陳猪脂塗於蹄甲潤之切忌火灰熟地烏金膏紫黃滙青黃蠟人髮灰四味於鈿內溶成膏先用利刀削去死蹄硬甲塗此膏於蹄火鐵烙之

○治馬蛆蹄法○槽下立處掘一尺方埋鷄子許大圓石子令常立石上一二日即差

○馬患脾虫咬袖治方○肝垢相凝氣化為虫在於袖袋之中有似蜂錐蝎螫令馬忽然倒地四足稍辛引空起而復舊水草如常此謂虫咬陰疔之症醫人摘去其虫次翻袖口用貫眾鷓風花椒臭

橘蕪莖蛇床子水二升煎三沸將馬縛倒摘去虫後帶熱洗之

○治馬喉腫方○以物纏刀子露刃鋒一寸許刺咽喉腫處潰之愈

○又方取乾馬糞置瓶子中頭髮覆之火燒馬糞及髮煙出看馬糞熏之差○又方猪脊引脂亂髮燒煙熏如上法

○治結熱起卧戰不食水草方○黃連二兩白鮮皮一兩香油五合猪脂四兩以溫水四升和藥調停灌下牽行拋糞即愈○凡馬傷熱胡麻葉搗汁灌之立差

○治馬急黃黑汗方○取舊靴頭皮水浸汁灌之如不效用大黃當故各一兩鹽半盞以水三盞煎取半盞分兩服灌之如再不效鍼破馬尾尖血出即差黑汗條又在止恭考

○治馬空空毛焦方○用大麻子揀淨一升飼之大效空空條

○治馬諸病方○搗白鳳仙花連根葉熬成膏抹馬眼角上即汗出

立愈

○治馬脊梁瘡方○瘡欲破未破時將馬脚下屎屎濕稀泥塗上乾即易之如此三五度自然消散或用溝中臭泥亦可已破成瘡者用黃丹付之避風立差○磨打破瘡馬齒覓石灰同搗為團晒乾後再搗羅為末先口含鹽漿水洗淨用藥貼之驗○瘡焦痂以麩封之即落○俗方縛倒馬以利鍼割去惡肉用人尿洗淨塗真麻油又以細米糠糝於瘡上仍以穀草摺細作圈而掩之上用馬衣覆之逐日如此便差夏月則只以尿洗塗油法不須掩覆之○瘡大熱險用粘米粉並田螺肉同搗爛貼瘡上數日待腐去惡肉然後付生肌藥○乾黃獮_呼肉燒存性作末和香油塗之瘡便差○馬背瘡不即治之則瘡口合而內含汁水自然滲下皮中皮盡浮甚至於通浮脚皮即以火鍼從下逆刺水聚皮浮之處用藥治

瘡 馬腦為肚帶所傷腫起取藥葉履一隻浸入尿埋火灰中乘熱傳之數次便差○鬚甲磨傷不可鍼割一筋絡便作驢

○治馬癩瘡方○_{謂以}初生即塗法油_{謂以}或猫血塗之或以猫皮鞞付於鞍韉當處腫肉自消

○治馬疔病方○馬足毛際肉腫成頑肉令馬蹇其病初生時以錫鐵烙之去毛出血炒藍裹青布置瘡處以燒鐵炭熨令暫灼十日內可騎

○治馬鼻內癩病方○用蕎麥粉灌仍用麥稈飼

○治馬疥癩瘡方○用生杜衡搗搽或為末傳之又胡麻葉搗汁灌之○又蕎麥糠燒灰淋洗之

○治馬疥瘡方○馬受凍或沾舊草屋漏水則必生疥瘡先以米泔水淨洗用黃豆炒焦和生油麻搗爛傳之○採俗名藤葛根去土

洗作末水調搗之雖難治者不過一二度差○猛灰二斗白木末搗爛一斗水二盆煎半稍熱塗之二三度永差更無復發○好醋和石灰熱搭大炒又方芥子塗之又方蜊蚌外殼一梳許灌口效○單麻子一升連皮爛搗用麩五合釀酒過四五日待熟先以柘木尖其頭十餘枚束之刷其瘡處後以此酒塗之雖積年難治者不無即效○木麥浸小便一宿連皮搗爛作糊塗之即效○秋麩米八麩釀酒待熟塗之妙

○治馬瘟疫方○方見疫條中

○俗方治馬雜病方○徹蹄血法凡馬蹄甲烘熱且

燥硬或有自裂處或蹄上生毛之際稍有環蹄腫起之形者是血熱也令馬多蹶行走亦不可刺即徹蹄血去蹄甲左右各當中血者俗稱燕赤血用利刀去蹄頭血俗稱頂血縛倒馬用利刀刺

刺蹄甲直至蹄胎已見血色姑留之去對處如前刺刺見血即以鐵尖開出兩蹄二穴之血令一時注下而春宜多而秋冬夏不宜多出凡注血之時血若凝澁必少糝鹽則血自清而易出矣血出適宜便解縛倒立於乾淨板上以索懸馬腰令不得卧切忌污水滲入蹄穴必成膿夏間以綿或南草葉寒刺刺之穴以防蠅子七八日着鐵騎坐用佛時香油

○刺脛水俗法○馬足接腕上骨俗稱珠子骨骨後聚毛近處俗稱水家誤鍼之患蹇不治自水家直上數寸許脛骨此後鹿筋之前以爪指之則可知有空隙處瘀水聚此遂下鍼而必從脛骨邊刺去切勿犯筋誤犯亦蹇不治矣鍼去瘀水以物封之忌八水調理三四日馬患脛水致蹇不行鍼用石負鹽劈付之時以人尿注於其上差或搗生桔梗包付效鍼後如欲急時趕行用黃蠟松脂罌殼乳炙

○治馬皮浮方○馬被他馬相踢或為物撞觸則瘀血凝而不散令皮難肉矣馬必行走之間忽然乍蹇或蹇而即止欲知其傷處則毛必焦豎不擇便以水徧洗其近處拴於陽中則傷處自然後乾此是皮不貼肉故也即縛倒馬用鉞亂刺皮上則必出紫瘀血血未盡出以鹽擦其上先以艾數把浸人尿中待血止取艾安鍼孔上用鑊器燒烙艾上則血自止便以狗皮等物包裹鍼孔令不觸風數日後雖有他處相通作浮高之症旋以冷水洗之則差矣

冬月洗以過水此是俗稱耳外此或云以草麻油頻塗之則瘀血自散皮更貼肉而差

○治馬後腳節自腫方○將馬縛倒燒鉄器繞節烙成田字形或日字形以水芹火糞合搗付於烙字上令腐去惡肉見生新肉恐如前腫大時以瓦片輕之磨平仍以人尿洗淨凡幾次月餘可差

○治馬上勝腫法○治法以大鐵橫刺第三勝出血差或割去上勝肉喂而不判莖箕差然此法損馬不抄

○治馬中暑方○初眠蚕砂炒黃溫水出汗令飲

○治馬尋常患熱方○人尿合真黃土作泥塗馬槽兩頭內仍灌水令自飲汁又方真油每灌一升 馬合牝壯宜三月三日○飼馬猪食之餘損胎

○養馬論○莖草飲水是馬之本性故中國之馬草水之外所喂者即四五升莖穀而其馬驍肥壯健一日百里不喂而能走蓋養得其法故也裁東則不然勿論寒暑草料之外又飼朝夕糜粥其馬體雖易肥而肉不硬實性亦交柔每走三四十里輒汗喘飢倒片時瘦憊此實養不得其法故也有一武人買一劣馬只喂細剉草冷熟豆乾喂而不共水不共粥有時依中國法飲之以冷水則肥


健耐飢喂養甚便熟亦少散此實目見之驗也故曰喂馬之法必如中國可也

騾○驢父馬母生騾驢不生產有孕必死性剛戾不順者切勿蓄之
 ○以健壯體大牝馬待四月令壯大牡驢交之則必產名騾初生數三朔即以沙棘逐日馱行調習不然則項背強直決不可制矣
 騾生一年餘可試騎坐○治病略與治馬同



驢○養法與騾同治病亦同蛇咬則死
 特○馬父牛母生特稟性壯健喂養治病與馬同

馬色 栗色驢黃骨青白雜驢沙夫老赤淡白阿玉鼻者玉頂劍
 星花肚膊雁黑鬃尾黃鬚白臉佛粉嘴巨銀鬃尾淡赤馬黑鬃尾
 淡白溫黑雁豹腎割環眼者四明四明足白並鼻白五此白雁古王
 鼻尖鼻末青馬驢



良馬圖



辨駑馬形狀圖





相旋毛吉凶圖




驗齒圖

一歲駒
齒二



七歲駒
有區缺



八歲
盡一
如

餘破此

猪○作猪圈吉日甲子戊辰壬申甲戌庚辰戊子辛卯辛巳甲午乙未庚子壬寅癸卯甲辰乙巳戊申壬子○圈門宜高二尺濶二尺五寸放水惟寅申二位吉又乙方吉○修圈吉日甲子辰日忌正四廢飛廉刀砧天地賊受死日○買猪吉日甲子乙丑癸未乙未甲辰壬子癸丑丙辰壬戌○忌破羣日庚寅庚申壬辰戊辰甲寅乙卯○出猪凶日亥不出猪又忌破羣日

○母猪取短咏無柔毛者良咏長則牙多一廂有三牙以上者難肥不須畜小時餵糟不長牝者子母不同圈同圈則喜相聚不食牝者同圈則無害圈不厭小圈小只容一猪使不碍開轉則易長處不厭穢冬月小廄蓋之多其草藉以辟風雪

猪兒生三日抽尾六十日後捷捷而不抽則前大後小○閤猪了待瘡口乾平後復取巴豆兩粒去殼爛搗和麻粃粃外糟糠之類飼

之半日後當大瀉其後日見肥大

○猪兒蒸籠法○至臘月生者豚一宿蒸之不蒸則腦凍不出旬便死豚性腦少感寒不能自煖索籠盛豚着甕中微火蒸之汗出便罷

○餵猪法○春夏草生隨時放牧糟糠之屬當日別與八九月放而不飼所有糟糠則蓄待窮冬春初初產者宜煮穀飼之凡猪性甚便水生之草食之皆肥○今猪立肥法貫衆三斤蒼朮四兩黃豆一斗芝麻一升各炒熟共為末餵之十二日則肥大矣○麻子二升搗十餘杵鹽一升同煮和糠三升飼之立肥

○飼猪別法○冬苾一顆和桐葉飼猪一冬不與諸物喫自然不餓長三四倍○桐梓二樹花葉飼猪並能肥大且易養

○治猪病法○割去尾尖血出即愈

○治猪不吃食方○牙皂焙乾一錢研末麝香五里共研末吹入鼻內立效

○治猪瘡疫方○以蘿菔或葉其之此物猪所好食性涼能愈其熱毒又能宣轉其腸胃使之流通若不食則難救○一法灌以梔湯或灌米泔水及鹽水或嚼以水草菜豆即愈

○胡商船中養猪法○以廣木板鑿四穴以猪四脚插其穴中使不得轉動置在空中日三時飼粥食等物猪之屎尿任其自放如是月餘肥大勝於放牧者

羊○羊圈必須與人相近開窓向圈架北牆為廠圈中作臺開竇無
令停水二日一除勿使糞穢

○羊種臘月正月生者為上至月二月生者次之若母羊十隻則羝
羊二隻羝無角者更佳少則不孕多則亂群羊火畜也其性惡濕
利居高燥

作羊棧吉日戊寅巳卯辛巳甲申庚寅甲午乙未庚子甲辰○納
羊吉日癸未凶日七月戊巳日九月巳日

○羊初成時與細切乾草少著糟水拌輕五七日後漸加磨破黑豆
調糟水拌之每宜少飼不可多與多其則不食可惜草料兼又不
肥慎勿共水喫水則退脹疝溺多可一日六七次上草不可太飽
飽則有傷

○春夏宜早放早收若晚收過午未時熱必汗出有塵土入毛內即

生瘡疥秋冬晚放若放早喫露水草口内生瘡鼻亦成膿○已時放羊未時還入

○羊性好鹽常以鹽嚼之為妙或以瓦器盛一升鹽懸欄中羊自數還之不勞人收

○三月中種大莖一項雜穀並草留之不須鋤治

○八九月中刈作青芟若不種莖穀者草實成時刈雜草薄鋪使乾勿令鬱澆既至冬寒多饒風霜或春初雨落青草未生時則須飼不宜出放

○中水先以水洗眼及鼻中膿污令淨次用鹽一大撮就將沸湯研化俟冷澄清取汁注少許於兩鼻內五日立愈

○羊有疥者便宜間別之免致相染不爾則合羣致死疥先着口者難治多死凡羊經疥得差後夏初肥時宜賣易之不用後年春疥

發必死矣

○治羊疥方○藜蘆_州根不拘多少搥碎米泔浸瓶盛塞口置熱處邊數日俟未時先以瓦片刮瘡處令赤用湯洗之去瘡甲拭乾以药汁塗之再次即愈疥若多漸塗之○百草霜_{鍋底}及鹽桐油等分調勻塗之省多隨宜用之

○治羊夾蹄方○羝羊脂煎熟去滓以片鐵燒熱將脂勻鐵上烙之勿入水次日即愈

鷄 ○治鷄鵝鴨極吉方子午卯酉方名四極甲丙庚壬方為中皇此

八方治之主物大旺 ○作鷄鵝鴨極吉乙丑戊辰癸酉辛巳壬午

癸未庚寅辛卯壬辰乙未丁酉庚子辛丑甲辰乙巳壬子丙辰丁

巳戊午壬戌宜滿成開日忌刀砧大小耗四廢

○買鷄鵝鴨吉日甲子乙丑壬申甲戌壬午癸未甲午丁未甲辰乙

巳忌破庫日 ○出鷄忌酉日又臘月殺鷄不祥又忌酉日殺鷄 ○

菟鷄鵝鴨卯吉日宜天月德生氣福生蓋後黃道日忌月殺月厭

月破血忌血支死氣受死休廢四廢天地賊大小耗天瘟空亡閉

日獵日忌殺鷄一云忌臘日即十二月初八日也

取鷄種法 ○京落時或云霜生者良春夏生者不佳形小毛茂脚

細短者善守窠育雛

○作鷄極法 ○古方門上置鷄極令人家吉又云以李樹作架坐鷄

則威然鷄極必據地為籠籠內着棧雖鳴聲不即而安穩易肥又

免狐狸之患 ○凡鷄籠小而鷄兒多則氣熏令鷄目盲矣籠內積

屎必時時除去免致蒸成鷄病鷄極要冬暖夏涼

○相鷄法 ○白雄鷄辟邪然養三年則反為兇使即去之 ○鷄黑身

白頭者烏鷄白足者病六脂者食之並殺人 ○鷄有皮層半白半黑自取至足里白

烏鷄 ○瘦鷄毛色法用罌粟子二兩研黃二錢共為末以米湯拌

藥與鷄食之食盡其鷄如拳其毛五色可愛 ○鷄健鬪則不失其

雌於他雄矣霜降時生者性惡必善鬪雄黃末搜飯飼之可去其

胃虫此藥性熱又可使其力健又芳草烏頭末塗鷄冠上連鬪連

羸鷄方禽園時收其骨則氣塞便死 ○老甚鷄勿食

○鷄初到家令不走法 ○以淨溫水洗其脚足自然不遠走暑月籠內鷄方

其熟時飲
以冷水便死

○肥鷄法○以油和麵捏成指尖大塊日共數十枚食之或以硬飯
同土硫黃研細每次用半錢許同飯拌勻餵之數日即肥○餵小
麥飯則易大○用棧鴨法則易肥下法見○鷄雌雄皆斬去六翮無
令得飛出外蒸小麥飼之三七日便肥大矣拔尾則便肥
○令鷄下卵不肯抱法○母鷄下卵時逐日食肉夾以麻子餵之則
永不抱只下卵矣

○護鷄雛法○新下雛以瓜甲摘去嘴頭甲飼以碎米或細米之類
月餘無令出窠恐鳥驚取去○初生時飼以燥飯無甚妨若飼濕
飯則臍膿而死若燒柳柴則小者死大者目盲抱鷄窠下懸竿
子皆成雄鷄
○養鷄法○設一大園四圍築牆高丈許棘遮其頭中等一行牆分
為兩園園內各作一屋方廣丈五屋下懸筐一之牆內四方
各置四大鷄令鷄

宿花二月間先於左園內耕地令熟做林粘粥一日只洒之覆以草
二日盡化為虫便以雌鷄二十隻大雄鷄五隻雌一日十
雄一日十養於其中
如左園虫盡即駢之右依上再用粥洒之如此則鷄自肥俗方多
積穀極
在園內洒水令濕則
虫自生可作鷄食園傍種蜀黍許以取蔽蔭至秋收子又何
飼鷄易為肥長

○穀產法○取雌鷄去雄作柙窠多共穀令肥充則一鷄生百餘卵
不離食之亦無咎鷄卵一介有
或兩雛子

○鷄雜病治方○真麻油灌之立愈

○治鷄中蜈蚣毒方○研茱萸飼之

○治鷄哮喘方○白菜引葉包鼠糞蘸香油搥之

○治鷄疫方○一鷄染疫餘鷄皆死即須以藍威鷄叉口懸掛或棧
於閣上則免○猪肉切碎喂之愈又以雄黃為末飯喂之愈○生

谷和真末為凡大鷄則七八九或十九小鷄則令吞二三九砂

鵝鴨 ○諸吉日共鷄同考

○擇種 ○亦取桑落時生者為良形小毛茂脚細短者善守窠育雛

○鵝鴨母其頭欲小口上斂有小珠滿五日生卵多滿三日為次

○鵝鴨宜以一歲再伏者為種且貪伏不起者可為種其數起者

不仕為種大鵝三雌一雄鴨五雌一雄

○鵝鴨抱時大鵝十子大鴨二十子小者減之其貪伏不起者須五

六日一其食起之令洗浴鵝鴨皆一月雛出雛欲出時四五日之

內不可聞鼓聲砧春磨聲及車轍大呌猪犬等聲又不可用林灰

器作窠窠勿令新產婦鶴省須五六日凡鵝鴨六年以上老不復

生伏宜去之少者初生伏又未能工唯數年之中佳耳

○護雛法 ○雛既出籠之先以粳米為粥糜一頓飽食名曰填嗉不

爾病噎死然後以粟飯切苦菜蒸青莢為食以清水共之濁則湯

不易泥塞鼻則死入水中不用停久尋即驅出此既水禽不得水

即死臍未合久在水中冷徹亦死籠內高乾處敷細草令寢處其

上亦以臍未合不欲冷也

○棧鵝易肥法 ○以稻子或小米大麥不計煮熟先用磚蓋成小屋

放鵝在內勿令轉側門以木棒簽定只令出頭喫食日餵三四次

夜多共食勿令注口榻去尾際毛如此三日加肥一斤 ○鵝鴨以

土硫黃和飯飼之易肥 ○鵝唯食五穀生菜而不食生虫鴨靡不

食矣

○收卵法 雌鴨無雄者多喂豆粟麥常令肥飽則一鴨便生百卵

不可 ○雌鴨每年五月五日不得放棲只乾喂不共水則日日生

卵不然或生或不生○以白木作卵形置鴨窠誘之生時尋即收
取別置暖處以柔草覆之

鴨卵令雞花之雞雛既出替他雞花之恰滿其期始出鴨雛矣

善花雞則雞一雞亦能出鴨雛矣

○鵝能退蛇螫蓋而扁聞其聲便來食之故夜必收宿牢圍之內

狗○納宜辛巳壬午乙酉壬辰甲午乙未丙午丙辰戊午又宜龍虎

日戌日勿出勿殺忌戌日吃犬

○相狗法○黃狗尾白或耳白或四足白或前兩足白或純黃色或

胸白者吉一云四足白○白狗尾黃或前足俱黑或頭黃或虎文者吉

○黑狗面白或前足俱白或四耳白純黑色者能辟伏尸有青班

者識盜則吠或後二足白頭黃者或足黃或尾白或一足白者吉

○赤狗頭黑或純赤者吉○青犬黃耳者吉○黃狗三足白或口

黑或足俱白者凶○白狗尾黑或黃耳或心下黑者凶純白能為

性易畜一云養三年內辟邪三年外則為鬼使去之皆白者凶○黑狗尾足黃或四

足白者凶○凡狗項白掘地者去之○凡狗生三子俱黃四子俱

白五子六子俱青八子俱黃者皆吉狗生一子是其家將興之徵

慎勿與人畜之○青色短尾絲毛狗狀若獅子者俗云能辟邪

狗雖畜物有愛主之誠故家養者不可殺之然畜之四五歲之老

則多有作恠者須即去之

狗咬人毒發則雖久後必死故狗患多咬者及春間發狂咬齧之

狗急去之尾垂舌黑者是狂犬

○相獵狗法○額下有生鬚一根三根者是為良獵狗或生二根或

四五根者是為凡狗

○養狗法○兒狗多餵過飽則必生脚腫脫鬻之病須以糠粥之屬

細以與之令習喫小兒屎牛馬厩前或庫舍左右各置卧宿之窠
切勿令上軒房之內或放屎家內或舐食昇器之間各別打禁則
自然馴習成性矣○家或近山則扉皆噉食必於軒下排押真木
釘子牢設板門向夕豎狗納囚於其中或別立柴圈以防虜患可
也

○治狗病方○用水調平胃散灌之加巴豆丸炒

○治狗猝死方○以葵根塞鼻可活

○治狗遍身膿癩方○百部根濃煎洗之

○治兒狗疥虫方○赤小豆煮取汁洗之○狗疥用單麻子三四箇
細切和飯飼三五日又方巴豆二箇如前法飼一次

○治蠅虫咬傷方○麻油塗之或以南草莖作圈子套狗項上或以
油塗毛

○救打死法○狗被打死而體尚宛者置於地上以好黃土圍之覆
之以篋礮則半日能活

○治狗瘦甚方○活鱧納竹筒灌口即肥

○止小狗吠不絕聲方○香油半匙灌鼻中則徑宿不吠

○生胡麻油塗狗足裹之以帛能日行萬里

平胃散方蒼朮二錢厚朴陳皮甘草各一錢

○猫宜納日甲子乙丑丙午丙辰壬子庚午庚子壬子又宜天德月德
生氣日○忌飛廉日

○相猫法○身短尾長面短眼如金銀聲確者良可畜若露爪者喜
翻屋瓦腰長善走面長噉鷄尾大性懶不可畜

○納猫法○取袖古方用斗桶等物而俗方以布巾盛來勿令人見

可也○欲出猫亦威布佈過河棄之不然雖遠必復來○猫性至毒不可妄殺亦不可痛打人有往之遭其害者戒之戒之

○猫生子止一妨主生纯雄纯雌亦不吉

○治猫病方○烏藥水磨灌之

○治猫癩方○以桐油擦之三次除根

○治猫喜煨睡因火邊瘦瘁方○用猪腸或臭腸八疏黃煨熟喂之

○救小猫被人踏死方○蕪木濃煎水灌之

○治猫胎死腹中方○朴硝煎湯灌之即出人其牛馬亦然真奇方也

奠○五符之法一曰養奠二曰養羊三曰養猪四曰養鷄五曰養鴨

鴨經曰治生之術有五水畜第一奠池是也

放生法等塘須擇良年月日時下魚種亦在生門放如庚申壬子即坤方下種註曰庚申壬子在坤方壬戌庚子是狗鄉甲寅丙辰巽宮位祭卯辛未艮中歲乙酉辛丑還坎位己未丁亥尤上當只論生門下種子取法依排死路亡

○養奠法○以六卦地為池池中作九州可擬文許深以磚石壘埒凡奠池不宜太深則水寒而與難長矣求懷子鯉奠長三尺者二十頭牡鯉長三尺

者四頭以二月上庚日納池中上一句納池今水無聲奠必生至四月納一神守神守即曩也六月納二神守八月納三神守蓋奠滿

二萬三百六十則蛟龍為之長而魚將飛去有曩則魚不飛去奠

在池中周旋九州無窮自謂遊江湖也凡奠日行千里則肥不然

則瘦至來年二月得鯉長一尺者一萬五千枚二尺者萬枚三尺者五千枚至明年得長一尺者十萬枚二尺者五萬枚三尺者五萬枚四尺者四萬枚留長二尺者二十枚依種所餘皆賣至明年可不勝計所以養鯉者不相食易長又貴也此法

○凡有魚之所須擇泥土肥沃蘊藻繁盛為上然必有居人等舍守之仍多方設法以防獺害凡所居近湖之所依此法畜之可致速富此必然之效也今人但上江撈取魚種塘內留之飼以青草歲可及尺亦可供用○池此後宜特深魚必聚焉則三面有日易長飼草亦於後處一日兩番魚小時草必細飼至冬則止○一法作羊圈於塘岸上每早掃其糞于塘中以飼魚如是則可不必人打草但魚略有微滯耳○池水流去處挿以簾子以防失魚而簾密則水不流疎則小魚漏去須用大板亂鑿小孔以代簾子最好

○魚忌○橄欖渣肥皂水芥草黃柏實椒皮水各色油皆令魚死又池中不可漚麻及著鹹水石灰皆令魚死食鴿糞揚花及食鳥糞適皆沈以糞鮮之○魚食鷄鴨屎黃則中寒而不子○木瓜燒灰撒池中毒魚○巴頭川椒殺魚

○衛魚法○池傍種芭蕉則露滴而鮮魚沈又樹葡萄架兌泛池岸邊種芙蓉可辟水獺大忌鮎魚同人能食故也○魚遭毒翻如急疏去毒水引新水入池多取芭蕉搗碎置新水來處使魚吸之則鮮或以溺或以糞清洗池鮮面

○生魚法○取魚子將鷄蛋也去黃白以子入內用雞抱廿一日取出陰乾放水中即成魚

○養金魚法○土池最佳可置於草堂後窻之下土氣自與水相合其萍藻荷帶之類自能茂盛而魚得其水土自然之性游漾浮沉

於萍藻之間甚可觀。池中置一二箇上水石山可種石菖蒲於石根種錢蒲於石上。又以松竹梅蘭之類多種於上。儼然是一蓬島。餵飼當用無油鹽菜餅擊窓櫺而投之。久之聞其聲熟如有客至扣之。其魚可賞。頃遇清明日前忌畏

○醫魚法○魚瘦生白點名魚虱用楓樹皮或白楊皮投水中即愈。或新磚八糞桶浸一日晒乾投水亦好。

○作小池法○庭畔無水根處量大小掘地四面築石牆下則築堅以石後以瓦土極泥塗乾積柴燻熟則水不能漏。雖不燻若極厚堅等如磚又置大瓦貯水作細穴以竹引流則不涸。欲種蓮別用他泥中可養魚。

○作盆池法○別造大盆四坐掘地方正便安盆中盆口要與地面平以土填平空處繞盆口鋪莎草盆內約略干肥土貯水滿盆。

水面投泛萍葉種蓮及蘆蒲之屬養魚其中則遠見之髣髴真也。○石假山○水澗石則既難得若軟石則可以琢造恠石乾池邊疊積為山使岩壑幽深多種楓松烏竹及杜鵑躑躅石竹百合射干之屬池上又種唐蓼花山後置大窰貯水屈竹吸引自山頂縈回池池作瀑布而其水道以瓦土堅塗則不漏矣朝夕相對自多奇趣。

蜂 ○收蜂割蜜吉日 天月德 天月德 合月財 五福母倉日 ○忌天賊
天瘟受死 大耗小耗 月殿月殺 月破天火 九空四方耗 又忌建滿
平收破閉 又忌蜂王殺日 春忌甲寅庚申 夏忌辰戌巳 秋忌戌辰
冬丙戌 ○宜除危定執成開日

○接蜂法 ○三月間 蜜蜂移向他所 成團飛過 若低飛者是欲向遠
高飛者是欲向近也 急用細沙出灑 擊蜂團則當留掛簷簷樹木
之間 令人頭着艾 圈持艾箒 又持大瓢 瓢內塗若干蜜 傾在於蜂
團之側 以艾箒緩緩掃入 於瓢內 慎勿驚動 待蜂入瓢畢 以布巾
之類蒙下之 襦初用男子襦

○安窠法 ○穴居曰窠 古謂桶用大木心朽者 或用四片木作橫形
或卷箒作桶形 外以黃泥塗之 而終不如朽心木桶 矣擇向陽燥
潔高敞前無碍阻之地 安蜂窠 上結草作笠形 覆之 亦塗黃泥

令不透風 桶下延上三寸許 開一小竅 只容一蜂出入 若竅大而
蜂王逃出 則舉蜂皆失 桶內以米粥塗之 以為初糧 蜜蜂滋潤 一
年增至二三窠 前常置水一器 不致渴損 蜂團初入桶時則必桶內塗蜜引之

○割蜜法 ○六月開窠 為良 若非花後 則窠惡而不耐久 凡窠有數
十等者 為百花窠 色渾而味酸 又作腥氣 冬為稻花窠 色如麩脂
味亦易酸 皆不堪用 須擇真純夏窠 乃佳 ○待天氣微寒 百花已
盡 宜開蜂窠 後門用艾燒烟 微熏 蜂皆飛向前去 用薄荷葉嚼細
塗在 **手** 面上 蜂自不整 或用紗帛蒙頭 反身 或用皮五爪手套 甚
妙 約量好留 冬春間 蜂食之資 餘者 揀大蜂脾 以利刀割下 却封
其口 將蜜脾用新生布濾淨 不見火者 為白沙蜜 見火者 為紫蜜
却將濾下蜜渣 入鍋內 慢火熬 煎候融化 拗出渣 再煎 冷水內
凝定 自成黃蠟

○救蜂飢法○冬月割蜜過多則蜂飢死飢時可將鷄一二隻退毛去腸肚懸掛窠內其蜂自然食盡春來開門只存鷄骨而已○俗法以蕎麥麵作餛飩_此置窠內令蜂食之

○蜂戒○曾見峽氓養蜂取蜜必全桶屠殺好得其利慘毒甚矣諺云養蜂專業者必無子豈大損陰德之報耶戒之戒之

○護蜂法○用大方石作桶臺鋤淨臺邊雜草夏月則用小石子撐桶寸討以通風涼冬月則去其撐石以黃泥密封桶臺之隙以防風寒如有蟻子附入桶內用猛灰繞桶底又以索維桶四面免致風倒落損蜂脾

風倒落損蜂脾

○取蜜俗法六七月間待桶獨花始開之時脫去桶蓋以陶器或鉢不同則便不用矣以泥密封桶口令其相如透隙則蜜不能成草冠幕桶上若過十日後以瓜甲衣之蓋外則去封隙之泥用合蜜真為

也可玩即以此好子割也又牌冥於濕處則蜜自流下此是上品白清也其解即以此好子割也又牌冥於濕處則蜜自流下此是上品白清也

老則蜂下人物桶內不放出整人矣

鶴○但妄聲啖者為上啄短項長而瘦脚高者可觀○雌雄相隨如

步斗狀履而跡孕又曰雄鳴上風雌鳴下風聲交而孕歲生數卵

惟守卵雄往來衛之見雌起則啄之見人窺其卵則啄破而棄之

常以夜半鳴雛鶴三年頂赤七年翮具十年十二時鳴三十年鳴

中律古云鶴不發頂不能宏其聲

○鶴病○飼蛇鼠及煮大麥○鶴食全鰓死

○教鶴舞法○俟其餓置食於潤遠處拊掌誘之或鼓琴或則奮翼

而鳴若舞狀久則開拊掌聲必起此食化也一云房極令極極置

入房中則雀隨境熱欲坐物上而振子圓轉雀不能定極極置

鷹○取鷹雛於巢上取後須掛人草鞋一隻於巢上母鷹知人取去

明年必復養雛不然便移去○鷹產初年稱甫羅陳一年於架上

者稱手陳眼赤而毛白亦有山陳者伏於架上而頻鳴者是雌鷹

○相鷹○嘴欲短而曲鼻孔欲大而多毛此名貪毛佳眼欲垂若外

雖如裂則性喜颺腦頂欲平如突亞者喜颺肩欲聳而劔翮欲垂

下背欲仰背上毛欲一一掀起而不穩貼翮羽一一廣則雖遠飛

而不能疾若一一狹則雖飛疾而不能致遠頸欲縮短眼要圓頸

欲瘦足欲瘦如乾葛莖足掌下皮欲滋硬而不軟滑爪欲直如鷄

爪若爪曲則搏擊不捷尾欲似蘆葉而整時安摺疊如扇俗稱尾

垂緊下要不過一握若太長則喜颺坐足要狀如十字蓋小體者

頭欲大柱即脚欲高尾欲短大體者頭欲小柱欲短尾稍長無妨

矣鷹毛欲稀疎坐如立釘言其仰也凡鷹以體大為上然可器則

多在於體小者且毛骨異於凡鷹者必有奇才如一眼黑一眼黃

之類也白鷹多天難養矣凡鷹逐雉必高出雉上或捷徑迎擊或

故人雉下翻身抑搏墮於空中者可良品也或有見雉而直上雲

際俯瞰雉落之處疾下搏擊者尤良

○馴鷹法○山客設機捕鷹相其良者而馴養之日夜替人臂之夜必達曉明燈使不得暫睡至二十餘日欲回頭歲嘴而睡是為馴熟也始以小環繫絳用長繩貫之遠以肉呼之如此累日見其無疑然後方可調肥議獵凡鷹方馴之時必善飼得肥方好風大日則必颺夫勿臘可也

○調肌法○凡鷹飢耐人飽輒颺去故肌飽必就臑上肥而消息之肌肉堅實者內多脂而飽者也肌肉虛軟者飢而少脂也肌若太虛軟則令鷹氣弱不可蠟矣見其腦內堅實取雞肉割作片浸冷水連日量宜飼之待其肌不堅不軟始可出臘而先一日用綿子團如大豆大裹水浸肉飼之則俗稱加伊音鷹食此半日餘肉消而後只吐綿團子是拭出腸脂之法也鷹肉既淨肌又調平方許

獵雉而新試之時切勿多致須一次乃還

○鷹病方○鷹方感氣竭力備得一雉而人恐鷹飽妨於再獵終不共食則鷹不能充其欲而病便生矣故得雉必取頭腦髓或熱汗以飼之鷹病則放黑白相混之屎又看尾肉端瘦尖骨間挾者無病潤者有病○氣竭生病人參和肉飼之 鷹食燕必死

○陳鷹法○春獵罷後便坐架飼養而一鷄可飼三日三十鷄可以陳過諸般禽肉及鼠犬等物皆可飼之而雉牛肉昏眼忌飼蛇肉善退羽然其毒能損鷹爪云

鹿樟○取新生者作柴圈畜之而飼以軟香草熟豆之類多飢則易耐人且常令近人可也

雉鳧鵝鵝鷓鷓等取外使鷄抱之臨啄抱時頻以候視趁其殼毛未燥以唾塗乾則永不颺去

