



山林經濟八

救急

共十

ナ 1  
2234  
8





十一  
2234  
流卷

十一  
2239  
8

增補山林經濟卷之十四

○救急

居在山林隔遠城邑沉痾彌留之病固可尋醫問証試以鍼藥而若值猝急之疾束手罔措遂致有夭折者矣茲錄救急之方

一自縊死○自縊死者自朝至暮雖已冷必可活自暮至朝則難活心下微溫者一日以上猶可活當徐徐抱下解之不可截絕繩子令安卧被中一人用手厚裹衣物緊填穀道勿令泄氣一人以脚踏其兩肩手挽其髮常令弦急勿使縱緩一人以手據按胸中數摩動之一人摩擦臂脛屈之伸之雖得氣從口出呼吸眼開仍按引勿止更令兩人以竹管吹兩耳勿輟○急刺雞冠血灌口中即活男雌女雄又取雞屎白如



棗大酒和灌鼻尤妙又取椽上塵如大豆許納竹管中四人各執一管同時極力吹兩耳鼻中即活○又取半夏末或皂角末或細辛末吹入鼻中得嚏即甦須臾少與溫粥清令啖潤漸漸嚥下

二溺水死○溺水死者一宿尚可救急急拯出先以刀扳開口放筋一枚啣之使可出水然後解去衣服多灸臍中二三百壯令兩人以筆管吹其兩耳又取皂角末綿裹納穀道中須臾出水即甦○又以鴨血灌口中又將醋半盞灌鼻中又用蘇合元半丸薑湯調灌即甦○又法取甕中熱灰一二石埋其身只出頭面水出七孔即活○又法將牛一頭橫載死人腹覆牛背上兩邊用人扶策徐徐而行則水出亦活○用竹管削尖一端納于肛門令人熱手按腹則水從便出若值天

寒多用綿絮甕中蒸熱包裹全體冷則易之令暖氣透徹內外即活此法真箇起死回生也

三凍死○凍死而四肢強直口噤只有微氣者用大釜炒灰令熱袋盛熨心上冷則易之口開出氣然後以溫粥清或溫酒或薑湯稍稍灌之即甦若不先溫其心便將火灸則冷氣與火爭必死○又法用檀或藁薦裹死人以索繫定放平穩處令兩人對面輕輕滾轉往來如捍檀法四肢溫和即活○落水凍死者脫去濕衣以生人所著之衣乘溫包之救活如上法

四八井死○夏月淘井多致殺人五六月尤甚深井中皆有伏氣若八則令人冒悶奄忽而死身尸青了無傷痕者此其中毒也即取井水噴其面并冷水調雄黃末一二錢服之轉筋



八腹痛欲死者使四人捉住手足灸臍左邊許方曰左右二寸十

四壯又用生薑一兩剉好酒五盞濃煎頻服又醋煎衣絮令

熱徹濕裹轉筋處又濃煎鹽湯浸手足洗腦脇間即甦八塚

五猝死并者當先試之法以雞羽投井中垂直而下者無毒毛回○凡暴亡不出一時可救之雖氣閉絕四肢冷若心腹

溫鼻微溫目中神彩不轉口中無涎舌與陰卵不縮者皆可

活也○凡猝死者口張目開手散遺屎為虛宜補氣目閉口

噤手拳為實宜發表

救猝死急取皂角末或半夏末吹入鼻中即甦○取南星細

辛末如無則取樛上塵吹入鼻中得嚏即甦○雄雞冠血灌

口中又用竹管吹入鼻中又牛黃或麝香一錢溫酒調灌即

甦○胡麻油半合和薑汁灌之甚妙○薑汁多灌之亦活○

蘇合元或備急丸三丸溫酒或薑湯或童尿調灌如口噤則

幹開口或折齒灌之

○鍼灸法○鍼人中無鍼則以大指爪甲插刻○急灸人中及

隱白在足大指內側去爪甲角如韭葉又灸臍中百壯即活

○卧宿奄忽而絕急取雄雞冠血塗面乾則復塗又以灰縈死

人一周○勿以火照之但痛噴其踵及足母指甲際而多唾

其面即活又以井底泥塗目令人垂頭於井中呼其姓名便

起

○驚悸猝死以溫酒多灌之

○大醉行房猝死以冷水灌多之即活○凡猝死氣塞也以水

噴面醒心通氣妙

六中惡○凡人暮夜登廁或出郊野或上塚墓或遊空室忽眼



見鬼物口鼻吸着惡氣驀然倒地四肢厥冷頭面青黑兩手握拳口鼻出血復更不救此証與尸厥同但腹不鳴心腹俱暖為異心頭溫者一日亦可活切勿移動其尸即令眾人圍繞打鼓燒火或燒麝香安息香直候記省人事方可移歸○先用蘇合元三丸薑湯或溫酒和下○急取半夏末皂或角末吹兩鼻中即活○又取葱黃心刺鼻中八深四五寸令目中出血即活○取故汗衣須用內衣久遭汗者佳男用女衣女用男衣燒灰為末每二錢百沸湯調下○麝香一錢研和醋二合服之便差○生薑汁醇酒各半盞同煎百沸灌之○白犬斷頭取熱血一升灌之○韭汁灌口鼻中一方灌耳中○菖蒲搗取汁灌之○桃景酒磨服之○黃丹一錢蜜三合和服○使人尿其面上又以童尿灌口中

○鍼灸法○灸百會九壯人中七壯臍中氣海百壯○上唇裡弦有白黍米以鍼決去之

七鬼擊○此等病皆得之無漸卒者人如刀刺狀腦腹疔痛不可按抑或吐衄下血治法同中惡○犀角五錢朱砂麝香各二錢半為末每二錢新汲水調灌○以好酒吹納兩鼻即差○雞白屎麻一握酒七升煎取三升熱服發汗汗不出則熨斗盛火照兩脇下汗出即愈○血漏腹中煩滿欲死雄黃末吹八鼻中又酒調一錢服日三能化血為水

○灸人中立差不差則更灸○灸臍中一寸臍下一寸七壯八鬼魘○人到客館及久無人冷房睡中為鬼物所壓但聞其吃吃作聲便令人叫喚不醒乃鬼壓也不急救則死不可近前嗅但移動些少卧處徐徐嗅之又不可以火照之若元有



燈則存之無燈則切勿點燈痛咬其足跟及大母指甲邊多  
嚙其面水一方仍用竹管吹兩耳又取半夏末或皂角末吹  
兩鼻中即活○樛上塵吹入鼻中又以新筆尖刺鼻孔男左  
女右轉輾運動則即起○宜用麝香蘇合元○伏龍肝末二  
錢并水調灌服更吹入鼻中又生韭汁灌口中及耳鼻頰白  
汁亦可○若仰卧以手覆心則魔不得寤但捻下心上手然  
後徐徐嗅覺傍人手及他重物皆然大法宜與鬼同治  
九容忤痺厥○客忤者中惡之類也多於道間門外得之令人  
心腹絞痛脹滿氣衝心腦不即治亦殺人取百草霜五錢鹽  
一錢和研溫水調下○又取鹽雞子大青布裹燒赤研納酒  
中頓服當吐惡物又取細辛桂心為細末納口中○蘇合元  
以薑汁或溫酒或童尿調灌○熟艾一兩水煎取汁頓服即

差○銅器或瓦器盛熱湯用厚衣襯腹上於衣上熨之冷則  
易便愈○以皂角末吹鼻或研韭汁灌耳中

○灸臍中百壯

十尸厥○尸厥者即中惡之類身脈皆動而形無知其狀若尸  
故名曰尸厥凡吊死問疾或入暮登塚卒中邪惡手足逆冷  
頭面青黑牙關緊急暈倒不知人或錯言妄語又腹中氣走  
如雷鳴聽其耳中如微語輟音者是也急取蘇合元三九溫  
酒或薑湯灌下又取故汗衣燒末詳見中惡又菖蒲汁灌口中又  
薑汁酒各半盞煎百沸灌下仍以竹管吹其兩耳即甦

○鍼灸○鍼人中至齒立甦○灸百會七七壯氣海關元各三  
百壯

十一痰厥○痰厥暴盛不省人事喉中如曳鉅輟急取清油多



灌之即吐痰而愈又竹瀝和薑汁少許多灌之又清心元一  
凡調竹瀝和薑汁灌下又雞子黃三枚和童溺灌下並即甦  
十二會厥○會厥者多因飲會過度飲會之後或著氣惱變為  
異常急暴之疾口不能言目不識人四肢不舉急煎薑湯  
多灌探吐之即甦

十三蛇厥○蛇厥之證心腹疔痛暴作暴止惡心嘈亂時煩嘔  
吐冷涎清水面色青黃口唇紫黑色變不常者是也若貫心  
則殺人甚急使君子肉一兩水煎服又苦鍊根白皮一兩濃  
煎調檳榔末一錢五更頭頓服凡上半日虫頭向上前一日  
不食夕飯至夜半後先灸猪脯令香臭滿鼻即細嚼嚙汁隨  
即頓服蓋虫飢求食之時也痛時則不拘○方痛之時不宜  
飲會且會甘則痛後劇槩虫會甘則起會酸則醉會辛則伏

會苦則止○酸石榴根皮二斤檳榔十枚水七升煎至二升  
去渣以粳米煮稀粥平朝空腹會之少間虫并死快利○又  
法苦鍊根皮取白二兩水二椀半去渣用晚粳米三合煮糜  
粥空心服○服藥殺虫法先以炒肉一二斤吃引虫頭向上  
然後進藥粥一二口少頃又吃一二口漸加至一椀或二椀  
其虫盡下

○狐惑症凡人病後腸胃空虛三虫求會會人五臟殺人甚急  
上會肺係則喉門搔痒下會大腸下口則肛門搔痒令人不  
能堪以合歡木十斤燃竈而坐於曲突之上使其烟入肛門  
又使八口即差

十四血厥又名鬱冒○人平居無病忽如死人不動搖默默不  
知目閉不能開口啞不能言或微知人惡聞人報但如眩冒



移時方寤此由汗出過多血少氣并于血也婦人多有之藜  
芦瓜蒂雄黃白礬等分為末取少許吹入鼻中

十五氣厥

附中

○氣厥多生於驕貴之人因事激惱忿怒盛極

不得宣泄逆氣上行忽然仆倒不省人事牙關緊急手足攣  
搖狀如中風但口內無涎較為異急用蘇合元或便香附末  
二錢薑湯調灌即蘇不可妄用雜藥○中氣與氣厥同因與  
人相爭暴怒氣逆而暈倒也氣脈多沉風脈多浮風中身溫  
有疾涎氣中身冷無疾涎急用薑湯灌救○若中氣而用中  
風藥治之多致殺人○猝上氣乃大虛氣吹喉閉其較如鼾  
有如疾在喉響者此為肺絕之候宜用人蔘膏救之用薑汁  
竹瀝放開頻頻服之如未得蔘膏先煎獨蔘湯救之早者十

全七八次則十全四五遲則十不全一

十六中風○猝然昏仆不省口眼喎斜手足不遂急以手大指  
爪甲掐刻人中皂角末吹鼻即提起頭項髮候其噴嚏有嚏  
可治無嚏不可治口噤則以烏梅肉和南星細辛末頻擦牙  
口自開○取竹瀝三合薑汁一合調清心凡一丸或龍腦蘇  
合元一丸灌口中或多灌香油即甦○不省人事涎潮不得  
語側栢葉一握葱白一握并根細研如泥好酒一鍾同煎一  
二十沸去渣溫服○風疾壅盛者口眼喎斜不能言語者皆  
當吐之輕者取瓜蒂末一錢溫水調服重者取藜芦五分八  
麝香半錢為末薑汁調服如不吐再服之○用白礬二錢生  
研作末生薑自然汁調和開口灌下其涎或吐或化下便醒  
○口眼喎斜向左則石灰水調即於右邊塗之向右則左邊



塗之候其方正如舊卽以水洗下大效○身如角弓反張四肢不收煩亂欲死者清酒五升雞白矢一升搗篩和合揚之千遍乃飲之壯者服一升日三度服五合差

○灸足大指橫紋隨年壯立愈

十七中暑○夏月在途中中暑死者及昏冒痰厥吐瀉喘滿大渴汗出頭疼煩燥欲死者急扶在陰涼處取道中熟塵土積心上及臍上作窩令人尿其中卽活○以布巾衣物蘸熱湯熨臍中及氣海續以熱湯淋布上令暖徹臍腹如倉卒無湯搗道上熱土積於臍上冷則易之○以新汲水滴兩鼻孔以扇扇之重者地漿灌之卽醒掘黃土地作坎以水沃其中若與冷水飲卽死○生薑一大塊或大蒜一瓣水研灌之童便或清漿和水灌之又生馬通紋汁灌之蓼葉香油煎灌又石

古一兩煮取汁灌之卽差○取大蒜一握路上日曝土雜研以新汲水和之瀝去渣灌之藥氣到腹中卽甦此神人備急方也○使人噓其心令煨易人爲之○槐花軟荀濃煎服卽效後不復發○真末調冷水服蜜水亦可○如驚怕妄言辰砂益元散并水調下

十八中寒○傷寒有卽病有不卽病以漸而深中寒則其病卽發而暴暈倒口噤四肢強直拘急嘔吐涎沫脈浮緊或微或無若不急治死在朝夕急昇置煖屋以手灸火摩病人胸腹間取熱酒薑汁各半盞灌下兼用葱白二三升分二包炒令極熱互慰臍上冷則用水拌濕更炒熨之○冷極唇青厥逆無脈陰囊縮者急用葱白連根切小麥麩各三升鹽二升以手和勻炒熨臍上如上法又灸臍中與氣海關元各三五



壯一方曰氣海關元而脉不出手足不温者死氣海在臍下一寸五分關元在臍下三寸

十九傷寒○傷寒初症葛根汁竹瀝椀子十枚煎湯生梨汁皆效○無論傷寒房勞與染病九味羌活湯皆有大效其方羌活防風各一錢半蒼朮川芎白芷生地黃黃芩各一錢細辛甘草各三分八董三斤棗二枚葱白二莖水煎熱服無汗則加紫蘇葉一錢咽痛加桔梗一錢甘草加為七分頭痛苦重則羌活加為二錢必於始痛三日內用之過累日則無效重則日再服尤重則日三服○乾薑鹿剉浸月經待其透濕炒黑作末取三錢用月經童便各三鍾子微温調服無論房勞染病彌留十餘日或數十日未和鮮為隱熱時用之輒效

二十陰陽易○凡傷寒熱病男子病新差婦人與之交得病名

陽易婦人病新差男子與之交得病名陰易其證熱上衝腦頭重不能舉眼中生火四肢拘急小腹絞痛手足拳即死急取近陰處棍檔一尺方圓四五寸男曰童女曰童女棍燒存性為末温水調服又室女月經布近陰處燒存性末米飲調下又人手足心甲二十斤燒灰末米飲調下又青竹茹一升水三升煎取一升分二服小便即利陰頭微腫即愈

二十一脫陽○大吐大瀉之餘元氣不接四肢逆冷面黑氣喘冷汗自出外腎縮搐不省人事須臾不救與傷寒陰陽易同症急取連鬚葱白三七莖以酒濃煎服陽氣即回又生薑一兩研酒煎服又桂枝二兩剉好酒煎取汁服亦效又葱鹽爛搗炒熱熨臍上氣海即愈

二十二霍亂○增寒壯熱頭痛眩暈心痛腹痛不可忍不得吐



瀉謂之乾霍亂吐瀉不止謂之濕霍亂也乾者以吐瀉為主  
鹽一兩生薑切半兩同炒色變以童尿二盞同煎至一盞分  
二次服吐下即愈又鹽一大匙熬黃取童尿一升溫攪服  
又鹽湯一椀八皂角末少許調服探吐又百沸湯合新汲水  
服之能吐宿食惡毒之物和鹽服之尤妙又鹿皮或獐皮熏  
烟最多黃色者水浸揉取汁頓服即吐又飲醋一二升吐下  
○多飲冷水蜜水吐下為佳若痛不止再服吐效○濕霍亂  
吐瀉不止者香薷林檎青色者 皆可煎服又鍋底墨二錢  
百沸湯一盞投其中急攪服吐瀉立止又生薑五兩切牛屎  
一升同煎取汁服之即效○牛馬屎絞汁服一盞或炒熟綿  
裹着小腹○吐瀉過多四肢逆冷不省人事南星末三錢棗  
三枚或白礬末一錢沸湯點服亦效又藿香陳皮各五錢水

煎溫服○霍亂吐瀉之時切勿與穀食雖米湯粟食八胃立  
死必待吐瀉止過半日飢甚亦可與稀粥以漸而將息○霍  
亂轉筋吐瀉過多遍體轉筋手足厥冷氣欲絕者急取香薷  
暑霍不  
可厥或木瓜枝葉  
亦可或秫藷葉治轉筋  
李摩搖不可忍  
者或芦花  
煎服又取蓼一把濃煎乘熱薰洗仍服一二盞○一法男子  
以手挽其陰牽之女子挽其乳根兩傍牽之此千金方妙法  
也

○鍼灸○開衝穴無名指外邊去爪甲角僅容  
韭菜連肌處男左女右最要鍼刺出血即差  
○轉筋欲絕以鹽填臍中灼艾不計壯數立效霍亂已死而  
腦中有暖氣者依此灸之亦甦此法最妙  
二十三攪腸沙○此症心腹絞痛冷汗出脹悶欲絕與乾霍亂  
同或如傷寒頭痛嘔惡渾身壯熱手足指末微厥或腹痛悶



亂復更不救由山嵐瘴氣或因飢飽失時陰陽暴亂而致也  
先濃煎艾湯試之如吐即是也蚕退紙燒為末熱酒調服立  
效又多飲益湯吐之亦愈

○鍼法○以鍼刺其十指背近爪甲半分許血出即安先自兩  
臂按摩下其惡血令聚指頭刺之又法以手蘸溫水於病者  
膝內打拍有紫黑點處以鍼刺去惡血即愈又法兩臂腕中  
有筋必致黑色用砂鍼擊刺出紫黑血痛即止

○近海之地有急病症似霍亂土人名之曰殺腹痛不急治則  
能殺人其治法以絲緊縛兩臂中節之上下有青黑脉突起  
於尺澤近處尺澤在肘中動而或兩臂皆出或只出一臂隨  
其突起以鍼刺三分許出血如射其病即止百不一失一沙  
與殺音相近臂腕出血之法又與之同所謂殺腹痛似是攪

腸沙也

二十四律心痛○蘇合元五六丸薑湯或溫水調服或生雞卵  
八醋攪服或百草霜末二錢熱尿調服又多飲益湯探吐痰  
出病即止又熊膽豆大水和服又玄胡索二三錢溫酒調服  
艾葉濃煎服之又葱白湯亦好韭汁去血痛蒜汁治急痛若  
煩燥則豉五合以水三盞先煮至半去渣入椀子十四枚再  
煎取一盞去渣服又食刀頭盛益一匙置炭火上待紅細碎  
納于一甫兒水搗和灌之復更吐出即愈

二十五律腹痛○桂枝或乾薑或胡椒或川椒煎服○黑丑頭  
末葱白湯調服大便通利即止

○鍼灸○獨陰橫在足大指次指內中節大敦在足大指端去爪  
中毛并灸氣海見十三十壯○一切心腹脇腰背痛川椒末



醋和為餅貼痛處熟艾鋪餅上燒艾痛即止

二十六猝疝痛○小腹痛不得大小便名曰疝疔痛自臍下上衝名曰奔豚凡疝痛上連腦脇甚則外腎縮八咬牙反張冷汗如洗須臾不救取川烏梔子仁并炒各二錢酒水各半盞同煎八盞一撮或加薑汁服立效又沙參或桂心或橘核或葱白或玄胡索或牛陰莖或末服或湯服即差沙參常服至妙○韶皮或韶鼠四足燒灰酒調服青鼠足黃獮足亦好又苗香莖葉搗取汁熱酒各一合調服即差○蜘蛛散用蜘蛛十四枚熬肉桂五錢為末大人一錢小兒五分空心酒下或蜜凡服之甚妙

○灸○獨陰壯見二十五灸五口角穴以葉稈量病如人口吻如一兩傍盡處是穴二七壯○炒鹽熨痛處○千年瓦三七介碎

作奕子大列置臍下至橫骨上灸之以陰囊出汗為限

○小兒治疝偏墜囊縫後十字紋上灸三七春灸夏差夏灸冬差又癩疝鉸鉞取罽囊中水液或穢液即愈靈樞真訣也

二十七猝頭痛○頭痛如破是腦膈有痰飲厥逆氣上衝所致單煮茗飲一二升探吐之吐畢又飲又吐如此數度即差又

皂角末吹鼻令嚏亦止○頭痛不可忍是風痰所致梔子末和蜜濃付舌上吐即止○頭痛連齒者名厥逆頭痛宜白附

子散白附子一兩麻黃不去節川烏大南星各五錢全蝎五介乾薑末砂麝香各二錢半為末酒調一字即二分半服服訖去枕卧畧睡少時即止

二十八猝吐血○吐血危重者百草霜末三錢并水調服即止又蒲黃炒三錢冷水調服又松烟墨濃磨汁飲之又韭菜汁



飲之又生地黄生藕生梨搗取汁磨墨徐徐服之即止又藍葉汁服之

二十九猝衄血○衄血不止者百草霜三錢水調服又吹鼻中又萱草根汁一盞生薑汁半盞相和細呷又亂髮灰水調一錢服更吹鼻中方病人髮吹鼻中又人中白火煨八麝香少許研酒服更吹鼻中○生地黄三五斤搗汁連服以渣塞鼻中又蘿蔔取汁和酒飲之○糯米炒黃為末二錢新水調服即止棗肉以病人涎調付血不出邊又牛膝車前葉根和蜜服○以井水濕紙帖頂心上如左鼻衄以綿札左手中指右鼻衄札右手中指兩鼻衄兩指俱札即止又以大白紙一張作十數摺浸水令濕置頂中以熨斗熨之至二三重紙乾立止○勿令病人知以井華水忽然猛噴其面即止○大口魚皮蘸

水令濕塞鼻中亦止

二十九竅出血○人猝大驚則九竅血皆溢出或四肢指歧間亦出血取井水忽噴面即止勿令病人先知○小薊汁草藥

至曾升寸大小薊皆相似但薊高三四尺葉較小薊高一尺許葉不數與酒各半盞調和頓服

又新屠猪羊血熱飲二升即止○沙參側柏葉末各一錢半八白麪三錢水調如糊吸服即亦止

三十一毛竅出血○遍身毛竅節次出血若不出皮膨脹如鼓須臾眼鼻口被氣脹合此名脉溢飲生薑汁一盞即安

三十二血暈○一切去血過多則必致眩暈悶絕凡崩中去血多拔牙齒去血多金瘡去血多產後去血多皆有此證急用芎歸湯川芎當歸各五錢連進數貼即甦○出血過多昏迷不省生地黄三五斤取汁連飲不暇取汁則生吃呷汁以渣



塞鼻

三十三般暈○乘船大吐瀉頭旋眼花支體厥冷欲死急取枯  
白礬末一錢百沸湯點服無則益一匙醋一盞同煎服或益  
梅酸醃皆可煮服○暈者渴飲水即死飲童便最好自己尿  
亦好

三十四猝癲狂○猝癲狂妄言罵詈不避親疎或棄衣而走登  
高而歌或披頭大叫不避水火且欲殺人宜棄其會取鐵液  
常飲之○苦參蜜丸梧子大每十丸薄荷煎湯下○地龍十  
餘條研爛八薑汁薄荷汁蜜各一匙并水調灌之○臘雪水  
多飲之又野人乾漬水飲之並效○人發狂悲泣呻吟此為  
邪祟或歌或哭或吟或笑或坐溝渠啖食糞穢或裸體露形  
晝夜游走或向僻隱伏不欲見人取蚕退紙燒灰二錢酒調

下○穿山甲燒灰水調服又半天河水叶旦子早斗皆司與

飲之勿令知又虎豺肉煮食又桃梟桃梟已乾着木上經冬

以中窠者為良一云千葉桃花結酒磨服并即差○白狗血

飲之又草麻仁湯常服又敗天公列明燒末酒調服之

○取鳶并羽置兩尾間縛以藁索塗以黃泥埋火中燒存性

作末和酒或米飲服

三十五狐魅○着狐魅精恍惚走巡山野謂之狐魅取狐肝炙

為末水服一錢日三又取腸肚作羹臠食之又鷹肉食之嘴

及爪燒灰服之和水又取狐狸皮鼻端黑處為末酒調服並

效

三十六大便不通○大便久不通腹脹煩悶大麻子研取汁煮  
粥食之又牽牛子半生半炒搗取頭末二錢薑湯調下又猪



膽如雞子大熱酒調服又皂角燒末一錢米飲調下又萱草根搗取汁服之○又法生田螺三介鹽一匙和殼同搗菴臍下一寸三分用綿包係即通又令患人仰卧白礬末置臍中以新水滴之冷透裡即通○草麻子油一大匙以粥裹喫之即通累試輒驗○生桔梗浸油醬八肛門即通

三十七小便不通○小便猝不通臍下脹悶車前子取汁一盞

八蜜一匙調服又地膚子取汁飲一醃又菟蓄汁

飲一醃又瞿麥石竹草案濃煎服又蚯蚓搗爛冷水濾過服半椀

又蜈蚣活者一枚研八麝香少許調服并立通○紅花苗一

握剉煎服○生猪膽連汁籠住莖頭少時汁八尿自出婦人

以汁灌陰中即通又田螺生搗菴臍上○萵苣搗爛貼臍上

並即通又葱葉除尖頭納陰莖孔中三寸許令人用口吹氣

八即通○以磁瓶滿盛水以紙封瓶口病人臍內八盞一捻

倒置瓶口覆在臍上偃卧如覺冷小便即通○炒鹽數斗盛

袋熨下腹冷則易之

三十八咳逆○傷寒及灸病得咳逆皆為惡候取半夏五錢生

薑二錢細剉水煎服○蘇合元三凡生薑柿蒂煎湯調服即

止○皂角末吹鼻得嚏而止又作又嚏凡百餘次遂止又硫

黃二錢乳香一錢末酒煎急令病人嗅其熱氣即止○刮取

菴杵頭細糠吞之即效

三十九猝噎○猝噎食不下刮取菴杵細糠吞之

四十猝失音○失音不能言杏仁桂心各一兩末蜜凡櫻桃大

綿裹含化嚥之又橘皮濃煎湯頻服又苦竹葉或荊芥蘇葉

濃煎服立效



四十一急喉閉○會厭為吸門其兩傍腫者謂之雙乳蛾易治  
一邊腫者謂之單乳蛾難治通謂之喉閉此證先數日腦膈  
氣緊取氣短促忽然喉門腫痛手足厥冷氣閉不通死在頃  
更急用白礬末半錢烏雞子清調灌立效○石鱗搗取汁灌  
之又又蟻螬汁灌之又又雄雀屎研細半錢溫水調灌並  
即愈又馬蔴葉或根或花搗取汁灌之又射干根甘苦汁  
灌之並妙又皂角水浸按取汁一盞服之即愈○又法巴豆  
肉以紙壓出油作搃子點火吹滅以烟薰八鼻中即時口鼻  
流涎牙關自開又巴豆肉綿裹塞鼻中立通○喉閉枯白礬  
末吹八喉又薏苡仁七枚含之○咽喉閉塞遍身浮腫牛蒡  
子一合半生半熟為末酒調○急喉痺生油一合灌之如未  
效急解髮令散當頂心取方寸許急捉痛拔少頃即通○凡

喉閉急症速用鍼刺出血并吐痰涎為要若遲緩不救則死

開上血泡最宜鍼開下不見者令病人含水一口用荏管尖

刺鼻孔出血妙有鍼瘡者薑汁調

○灸○中封在足內踝前一五十壯又灸大杼穴在脊一

分百壯頤下

○法吐○冬月青魚膽用白礬八內臨用加百草霜炒鹽少許

醋調以鴨毛蘸藥引吐痰出如無魚膽用白礬半兩巴豆十

枚同枯過去巴豆用礬每一字吹八喉中吐出痰血立愈○

猪牙皂角白礬黃連等分瓦上焙為末以半錢吹八喉中少

頃吐出膿血立愈

四十二失欠脫頷○因呵欠牙車蹉跌口不能開合漿水不八

以致不救取酒灌之令大醉睡中吹皂角末八鼻令嚏即自



正又鹽梅肉二介擦牙即開又南星末薑汁調付以帛縛合  
一宿自愈又法令一人抱定病人頭一人以手指牽其頰以  
漸推之復入矣當疾出其指恐咬傷○黃蠟吹火作疔乘熱  
貼緩處限差

四十三眼睛突出○眼睛無故突出一二寸以新汲水灌漬睛  
中數易水睛自入○仍以麥門冬素白皮山梔仁各一錢水  
煎服○眼睛垂出至鼻如角黑色痛不可忍或時時大便出  
血名肝脹羌活煎服愈○眼睛被撞打出若眼系未斷即推  
入臉內於四畔以生地細搗厚付不令侵風若內有瘀血黃  
鍼刺出之自愈

四十四腸頭出○大人小兒腸頭出百草霜五倍子為末醋熬  
成膏鵝毛塗之即入

四十五重唇○口唇緊少不能開合飲食不得不急治則死此  
亦奇病重唇急服薏苡仁湯薏苡仁防已赤小豆炒甘草炙  
各一錢半無用黃栢二兩以五倍子蜜佗僧各二錢甘草二  
分為末水調塗黃栢上灸乾再塗再灸藥盡為度然後將栢  
作薄片臨卧貼重唇上天明即愈又白布作燈炷如指大安  
斧刃上燃炷令汗出拭取付唇上日二三度故青布亦佳猪  
脂調付尤佳又用青皮燒灰猪脂調搽唇上仍將青皮灰末  
每一錢酒調服之又蛇退皮或鱗鱗吐燒為灰猪脂調付  
四十六唇腫○唇腫生鼠剖腹去臟腑和血付之雖毒腫無不  
即差○六月採乾筴草浸水取汁以雞羽頻塗即效

四十七舌腫○舌平腫如猪胞狀滿口此患人多不識失治須  
更死不得食者亦死急取百草霜末醋調付舌上下脫去再



敷復更自消又并水漱口皂角刺燒灰八龍腦少許糝舌上  
下出涎卽差又蒲黃末頻糝之黃連煎湯頻呷之又單麻子  
取油蘸紙熬燒烟薰之卽愈

○鍼法○急用鍼刺舌下兩傍大脉出血又刺舌尖或舌上出  
血卽消切勿刺舌下中脉血不止則死若誤刺以銅筋火燒  
烙之

○舌吐不收名曰陽強傷寒熱病後舌出寸餘屢日不收以斤  
腦為末糝舌上應手而縮須用五錢方愈○產婦舌出不收  
以朱砂傅其舌令作產子狀以兩女扶掖之乃於僻外置瓦  
盆墮地作聲聲聞而舌收

四十八腦背腫○凡癰疽發腦發背至險必死宜用酒洗大黃  
及甘草每三錢煎服○忍冬花與葉生搗暖酒調服又槐花

四兩炒八酒二椀煎服○麻油一升煎十餘沸候冷八好酒  
二椀和勻分五次一日夜盡服○薜荔葉爛搗研絞取汁和  
蜜飲之數次滓付瘡上下利則愈○腫發背欲死雞腸草搗  
付又伏龍肝末酒調厚付頻易○背腫鹿黃色石如鵝卵者  
猛火燒令赤醇醋中投八自有石屑落醋裡頻消至石盡取  
屑晒乾為末醋調塗之○腫毒所及處以狗膽墨汁和於蒜  
根汁圍塗之愈頻愈好待其毒暈少挫漸次進塗以至腫頭  
之傍毒氣會腫頭成濃破腫後付粘米飯最善吸膿榆根皮  
搗付亦好○腦後髮際腫初起時取栢枝如指大者削作馬  
蹄樣插於慢火灰中來熱點烙腫處以差為度○腦腫初發  
時以無砂黃土和水造罐如煎膠陶罐而通其底安於腫處  
滿盛地龍又以其土作蓋而亂鑿衆孔置於地龍之上用艾



大炷四五列於其上而灸之俟其地龍盡消更納更灸連日不輟則腫自消○腫初發不知瘡頭以濕紙封其上先乾處是也

○灸法○凡癰疽生於腦背初如粟米大或痛或痒因作赤色人皆慢忽不為治不過十日而死但於瘡上灸二三百壯無不愈但早覺早灸為佳始發一二日十灸十活三四日五六活五六日三四活七日則不可灸惟頭為諸陽所聚艾炷宜小而少灸之

四十九疔腫○疔瘡初發突起如疔蓋故謂之疔生黃泡中或紫黑色初發必先痒後痛先寒後熱四肢沉重頭痛心驚眼花若大重則嘔逆多因食自死牛馬禽獸肉而發殺人於一二日之內發在手足頭面腦背骨節間者最急其餘處為緩

又有紅絲疔魚臍疔其毒尤甚○治法取蟾酥菴豆許置舌上仰卧取汁嚥下又鍼刺疔心納一丸於中紙貼護之神效又蟻螂子名取心下肉貼疔上半日易新者又班猫名一箇捻破以刺疔上封之又蒼耳叶名莖葉燒灰醋調塗又白狗糞和水絞汁服淨付疔上又馬齒莧名搗和頭垢封疔上并神效○疔初發時牛蒡子吞一粒其頭即出以真末作餅孔之用黃蠟鑿點又白礬熔化少許入鹽水名浸之一晝夜即解一方後浸之限差煮又生大豆一握嚼和涎塗之手足疔妙○取素枝如指大者削作馬蹄形插於慢火灰中乘熱點烙疔處以差為度○疔腫危重將死取土蜂窠一箇蛇蛻全者一條盛罌中黃泥固濟火煨存性為末每一錢空心好酒調服少頃腹中大痛痛止而其疔已化為黃水矣又甘菊葉



一方無  
甘字搗取汁飲一升又取莖葉搗付疔上即愈并神效方  
冬用根  
死亦神效○紅絲疔急鍼其絲出血取白苴汁滴孔中妙○

魚臍疔絲苽葉連根葱韭葉搗爛取汁和酒服以滓隨瘡左  
右貼腋下或胯下即安又蛇蛻燒灰雞子調付瘡上○吸疔  
毒法取大蜘蛛一箇放瘡上自啞其毒連易三五箇其毒自  
敗如蜘蛛困則浸水中以活之為妙又取蚯蚓八九條搗酒  
濾飲之滓貼四圍留頂出毒氣

○灸法○大蒜搗爛塗疔四圍留疔頂上以艾灸百壯以爆為  
效不爆難愈

手指忽腫痛不已地榆煮作湯漬半日愈又黃泥水調塗指  
周匝厚一寸許納熱灰中煨之令燥視皮皺即愈○疔毒腫  
初發土蜂窠上細土醋和為泥付之柳葉箬皮八鹽少許煮

洗之○人鬚燒付之又鹽湯溫洗日三次如已成濃白丁香

即雄雀  
屎也塗之立潰

五十蛇纏瘡○身上及頭面肉上浮腫如蛇狀取兩滴堦磚上  
苔痕一錢水和開塗蛇頭立效○瘡有頭尾儼似蛇形初起  
宜隔蒜於頭上灸之雄黃為末醋調付之又酒調服之○遍  
身生瘡狀如蛇頭取蠟礬凡每服百凡大有神效其方黃蠟  
二兩八明白礬末四兩衆手和勻作凡梧子大溫酒或熱水  
下

五十一猫眼瘡○面上及遍身生瘡似猫兒眼有光彩無膿血  
但痛痒不常多喫魚雞韭葱自愈

五十二櫻桃瘡○頂上生瘡如櫻桃大有五色瘡破則頂皮斷  
但逐日飲牛乳自消



五十三燎炮瘡○渾身生燎炮如甘棠梨每介破出水內有石  
一斤如指甲大疤復生抽盡肥膚肉不可治三稜蓬木各五  
兩為末分三貼酒調服自愈

五十四天疱瘡○引男女房室傳染有虫傷鼻眼腐爛陰莖或  
筋骨疼痛肢體拳攣與癩無異或皮破骨爛口臭難當以至  
於死○治法香油二斤八水一醃至白烟處收貯每黃酒一  
鍾八油一醃温服日三盡則全愈又鴨一隻餓三日只與白  
水飲之用輕粉一兩粳米飯四兩拌勻喂鴨待吃盡以葦根  
槌碎泡水令鴨飲之解去輕粉之毒待鴨毛落盡煮食妙○  
木通草薜用煎服外用野菊夷木根湯洗之○水銀炙肉和  
津唾同研作泥曬乾或温房取乾盛於烟竹吞烟輒漱口神  
效

五十五陰蝨瘡○凡男子陰莖生瘡變紫黑色蝕其莖盡則死  
溪澗急流水中石下有小螺傳石而生形細而長取來火上  
炒去肉取角火煨為末先以葱白黑豆煎水洗後以香油調  
付即生肥而合神效又地骨皮煎水洗後地骨皮末糝之又  
亂髮灰付之又豉一分蚯蚓濕糞二分研塗之并妙○石菜  
豨薟作泥付於蝕處即差最妙又假梧桐叶煎水温沉蝕  
處三日則虫自出仍差○多年盛藍石以水濃煎洗之○男  
子陰腫痛不堪者蕪菁根搗付之○陰莖瘡痛黃栢煎汁洗  
之更為末付之又蜜煎甘草塗之○男子陰瘡發毒皮肉毀  
爛諸藥不效生松脂菴蠶患處以木葉及軟帛裹之松脂乾  
即愈○陰邊生瘡及陰濕痺皮薄裂及濕痒停水處索根皮  
煮汁洗之○陰痒生瘡胡麻子即黑麻嚼付之○陰囊濕痒汗



出鑄鈕孔中黃土細末摸之又黃大豆生嚼付之又車前子煮去滓洗之

五十六鍼瘡出血不止○人屎燒灰付之

五十七破傷風○凡瘡瘍未合風八為破傷風濕八為破傷濕

害人甚急瘡口平無汁者中風也邊自出黃水者中水也並

欲作瘡瘡者口喎角方反張者是也急治之痛不在瘡處傷經絡亦死症

也初覺瘡腫起白痴身寒熱急用玉真散防風南星等分為末每二錢

薑汁調服以滓付瘡口口喎者童便調下南星為防風所除

服之不麻可以開闔定搐也傷在頭面者急用水調膏杏仁

水芎藭等分以新調成膏和雄黃付瘡上腫消為度又初覺急取蟻螬蟻螬

引一二箇用水捏住待虫口中吐些少水就抹在破傷處身

穿厚衣裳待片時瘡口覺麻兩脇微汗風出立效如風緊急

速取此虫三五箇剪去尾將肚內黃水塗瘡口再滴些少八

熱酒飲之汗出立效又取此虫安瘡口上艾灸虫尾即效○

若腰脊反張四肢強直口喎身冷不省人事急用蜈蚣去頭足

用灸黃細末擦牙或吹鼻中吐出涎沫立甦又蜈蚣一條江鱧

三錢為末每一錢防風羌活煎湯調下又蝎梢七介為末熱

酒調服日三此乃全蝎散也凡患破傷風非此不除○生人

十指甲脚下十指甲剪下香油炒研羅酒調呷汗出便好

○鍼灸法○天突在頸結喉中先鍼臆中在兩乳間正中太冲

足大指外間本肝膈去各二寸相委中膝內中崑

崑足後二寸陷中又百會旋頂中央大椎小椎節下灸茅

二椎五椎如半裏核大灸

五十八丹毒○走馬火丹用景天似馬藍四月七日七



日搗爛取汁塗之即效○石菜石菜搗付之又并苔付之至妙又芭蕉汁塗之又胎水服之塗之并可○驚蕪驚蕪搗付又藍葉汁飲之又單麻子五箇去皮作泥八麵一匙水調塗之小兒尤效又石灰和醋塗之○以鍼輕手亂刺出血頻付猪血最妙

五十九癰疹○清心丸月經水調下妙又近火使身體溫暖即消寒薄者最得○樺皮水煎服之又益母草煎服并效○石灰和醋塗之○黑紅兩色癰疹雞子黃赤豆荊芥搗勻調付六十諸中毒○凡解毒之藥皆不可熱服能使毒氣愈甚宜冷服之乃效手足面青過時者不救治法上宜吐之急以香油多灌鵝翎探吐之下以芒硝煎甘草湯調服利之○人自服毒者宜急救之大法甘草萊豆能解百毒又法不問何毒多

灌香油吐利即安○通治百物毒細茶白礬每取三錢末新水調服即效又五倍子為末好酒調下二錢在上即吐在下即瀉又甘草細末微炒隨酒量多少好酒調服須臾多吐瀉雖渴不可飲水飲水則難救又騰雪水飲之○甘草黑豆皆解百藥百物毒各取五錢水煎溫冷任意服神效或加竹葉或薺萋薺萋尤效凡中毒即燒所食之物作末服之

六十一一切飲會毒○中毒煩悶甘草薺萋濃煎飲之八口即活又白篇豆末水調服二三錢得利即安又人屎取汁服又白狗糞和水絞汁又藍葉或藍寶濃研汁飲之又多飲香油即差

六十二熱麵毒○枸杞根皮煮汁飲之又蘿菔汁飲之無生者則取子水研取汁飲之又杏仁研煎汁飲



六十三豆腐毒○過食腹脹氣塞欲死新汲水多飲即安多飲  
熱酒即死又蘿蔔汁煎一日飲之又杏仁研煎濃汁飲之○過  
飽幾死着垢組或或着垢衣領皮或水洗飲之即  
鮮

六十四燒酒毒○過飲中毒面青口噤昏迷不省甚則腐腸穿  
脇遍體青黑吐下血死在須臾初覺便脫衣推身滾轉之無  
數吐之則甦又以溫湯裸體浸灌常令得暖若灌冷水即死  
又急取瓜及蔓搗取汁斡開口灌之不住又碎冰納口中及  
肛門以醒為度又葛根搗取汁灌口中○柿葉搗汁灌之

六十五酒汁毒性性偏婦女多有飲此之患至於將死急灌  
溫蜜水連灌甘草水又雞或鴨急割去頭納頭於口中下熱  
血

六十六諸獸肉毒○會六畜肉中毒或吐下血胡荽子一升碎  
煮取汁冷服半升日二又犬屎燒灰和酒服一錢又韭汁一  
二升飲之又人頭垢和水服吐出即愈又水浸豆豉絞取汁  
數升服之

○猪肉毒○煮橘皮汁或荇蒂根汁或黑豆煎汁或大黃煎汁  
或川椒煮汁可飲○鳳仙花根莖葉取汁飲又好酒大醉即  
鮮生山藥水水磨服神效

○牛肉毒○甘草濃煮飲一二升即愈○人乳汁一二升飲又  
黃栢末三錢和水服又牛黃和水服○韭汁或人屎汁飲之  
又人頭垢熱水調服吐出○脇間刺痛不可忍手足青黑項  
額間氣絕者三四即服野人乾一盞無效又服一盞脇間急  
痛如裂有如脫落之聲聞傍人其痛即止累試神效又牛



黃五分服之即效累試皆驗○會牛肝膾忽然咽喉疼痛不可忍開口視之則咽嗑間毒肉亂生或如肝片或如重舌狀頃刻間咽喉閉塞氣息奄奄急以鍼亂刺毒肉生處出血一二升吞水漸差矣

○馬肉毒○韭汁飲之又犬屎燒灰和酒服又苧根煮汁飲一二升又多飲好清酒至醉即解濁酒則加又香鼓二兩杏仁三兩和蒸一炊久熟杵服日二仁一方只取杏○馬肝毒人頭垢和水服又雄鼠屎三七枚研和水服

○狗肉毒○苧根煮取汁飲又杏仁去皮研水煎去滓飲利下血片為效一方杏仁二兩和皮研細以熱湯三盞拌勻分三服所食皆全片瀉出肉

○羊肉毒○煮服甘草汁一二升  
會生肉毒○地漿飲之地漿見上十七中暑

○會自死禽獸肉毒○黃栢末三錢水調服不解再服又人頭垢一錢熱湯化服又黑豆煎汁藍葉汁人糞汁皆可服

○會中毒箭死禽獸肉中毒○狸骨燒灰和水服又黑豆汁藍汁飲之

六十七諸禽肉毒○會鵝鴨肉毒中糯米粘泔或溫酒飲之又

秫米啗香水研取汁飲一盞○雉肉毒吐下犀角末和水服

一錢或以水濃磨取汁飲○野鳥肉毒狸骨燒灰和水服又

黑豆汁藍汁飲之

六十八諸魚毒○會魚中毒飲冬瓜汁最驗又濃煎橘皮汁飲

之又海獺皮煮汁飲又鮫魚皮斗燒灰和水服 大豆汁

蘇紫汁服之

○鱸魚毒苧根煮汁飲一二升生汁亦可



○鯪디명鯪毒鼓一合投新汲水半椀取濃汁頓服即愈

○河狫毒諸魚中最毒其卵尤毒中者必死急取荏菁根汁飲

之或人糞汁或香油多灌吐出即愈又白礬末白湯調下又

白篇豆末和水服又羊蹄葉上豆搗汁飲又藍汁飲之又煮

榛皮甘平飲之又槐花末三錢新水調服或煎服又生紫

蝦이천정或鹽喫之

六十九鱗毒○鱗未經霜者有毒中之者飲生藕汁冬菘汁煮

蒜汁并佳又紫蘇葉煮汁飲之又黑豆汁豉汁荏菁汁并解

之類說曰中毒或死急取冬菘紫蘇大黃汁飲之即差

七十會生膾不消○生薑汁飲一升即消又日久不消成癥取

水中石子十枚燒赤投五升水中七次熱飲三五度當利出

癥○會厥腦髓即消

七十一會魚肉不消○成癥作痛狗糞五升燒存性為末漬五

升酒中經宿取清分十服即差○凡過飽魚肉積滯不下者

會厥腦髓即消

七十二會魚肉蔬菜毒○苦荬剉三兩苦酒至一升煎服吐出

即愈

七十三諸菜毒○烏雞屎燒研末一錢和水服又香油多飲之

即安又葛根濃煎汁服之生汁尤佳又甘草湯飲之又人乳

汁或小兒尿服二升即愈

七十四菌蕈毒○菌蕈夜中光者煮不熟者煮訖照人無形者

皆有毒人中其毒急取地漿暑中飲之又人糞汁飲之又馬

蘭根葉汁飲之又人頭垢和水服以吐為度又六畜及鵝鴨

之屬刺取熱血飲之又煎甘草冷飲只多飲香油亦好○龜



礬燒灰和水飲之○中毒吐瀉不止細茶芽即雀舌為末新水調服神效又荷葉搗爛和水服○楓樹菌會之令人笑不止而死飲地漿最妙人糞汁次之餘藥不能救

七十五苦瓠毒吐○誤會中毒吐利不止則死飲黍穰灰汁解之又稷米研取汁飲之即愈

七十六海菜毒○凡海中菜多會損人令腹痛發氣吐白沫飲熱醋即安神效

七十七諸果毒○中諸果毒桂皮濃煎飲之又猪骨燒灰末一錢和水服又茈蒂末一錢溫水調服吐之即差○銀杏毒香油多飲吐之又地漿藍汁甘草汁飲之○桃毒取桃葉見三四為末和水服即差

○會雜茈果子過多腹脹氣急桂心為末飯丸菜豆大以水吞

下十九凡末差再服又桂心末五錢麝香一錢飯丸菜豆大白湯下十五凡即效○茈毒石首魚灸會或者煮汁服自愈

七十八諸藥毒○服藥過劑或中毒煩悶欲死葛根汁飲之或煮服之又藍葉或藍實汁飲之又地漿見諸毒又生雞卵取黃

吞之又粳米粉和水服又豉汁飲之又甘草濃煎服又薺菴取汁服又黑豆煮汁飲又甘草黑豆薺菴同煎服之尤佳又

韭汁飲之又真黃土煮取汁暖飲之又畜六及雞鴨皆取熱血飲之即差

○巴豆毒令人大吐瀉煩渴發熱急用黃連黃柏煎湯冷服又菖蒲或葛根生汁飲之更以冷水浸手足忌會熱物又藍根

砂礫搗爛和水服又黑豆煮汁飲又寒水石磨水飲之○烏頭即川烏天雄附子毒此皆一物而異形者中其毒則心煩



燥悶甚則頭岑岑然遍身皆黑必死甘草黑豆濃煎服八口  
即定又菘豆黑豆煮汁冷服又乾薑煮汁冷服又多飲冷水  
大吐瀉即愈

○草烏毒令人麻痺暈悶甘草黑豆煎汁飲之又生薑汁飲之  
乾薑煮汁亦可又童尿飲之

○莨菪毒主午令人大煩悶眼生星火狂走見鬼水研菘豆汁  
飲之又甘草薺芫煎汁服之又甘草黑豆煎服又蠟汁服之

○大戟毒主根即令人冷泄不禁薺芫煎汁飲又菖蒲搗汁  
飲

○狼毒毒主五杏仁研水和取汁服又藍汁飲之

○藜芦毒主令人吐逆不止葱白煎湯飲之又溫湯飲之又雄  
黃末和水服又香油多灌之

○躑躅毒令人恍惚吐逆山梔甘草黑豆皆可煎服香油多灌  
之

○半夏南星毒生薑汁或乾薑煮汁服之

○苦練根毒令人瀉不止飲冷粥止之

○杏仁毒杏仁有雙仁者誤食必死藍葉汁飲之又藍實水研  
取汁飲又地漿飲三椀又香油多灌之

○川椒毒戟人咽喉氣閉欲絕喫大棗三枚解之○誤吞合口  
椒氣欲絕身軀冷痺急飲井水一二升便差又地漿飲之又  
黑豆汁或人尿飲之葵菜汁或醬汁飲之

○斑猫莞菁毒令人吐逆不止急用菘豆或黑豆或糯米和水  
研取汁服又藍汁飲之又猪肪服之

○艾毒艾葉久服亦有毒毒發則熱氣上衝狂燥不能禁至攻



眼有瘡出血者甘草黑豆煎湯冷服之藍葉菜豆汁飲之  
七十九石藥毒○人服石藥中毒人參煎湯服又雁肪服之又  
白鴨屎為末和水服

○礬石毒呬黑豆煎汁飲之

○雄黃毒防已煎取汁飲之

○硫黃毒令人心悶取猪羊熱血飲之又熟冷猪肉及鴨肉羹  
冷食之又黑錫煎汁飲之

○硃砂毒生菜豆水研取汁一二升飲之

○砒礪毒令人煩燥如狂心腹攪痛面口青黑四肢逆冷須臾  
不救急取黑鉛四兩磨水一椀服即解或青藍汁一椀灌服  
或香油一二升服又人糞汁多灌之又地漿三椀和鉛粉頻  
灌旋刺猪狗羊雞鴨熱血飲之又臈月猪膽水和服之立解

又稻稈灰淋取汁冷服一椀毒隨利下又冷水研菜豆取汁  
飲之又藍根砒礪搗爛和水服又好白蠟五六錢搗細冷水

調灌

八十金石藥毒○中毒者取黑鉛一斤鍋內熔成汁投酒一升  
如此十數遍候酒至半升去鉛頓服○黑豆汁藍葉汁水芹  
汁白鴨屎淋汁皆宜

八十一金銀銅錫鐵毒○人服金銀中毒服水銀即出又鴨血  
飲之又白鴨屎淋取汁飲之又雞卵吞之又黑豆汁藍葉汁  
水芹汁皆可服之

○錫胡粉毒○杏仁研汁服之

○水銀毒肥猪肉煮冷食之又猪脂服之

○鐵毒煮磁石飲之



八十二蠱毒○凡有蠱之家門限屋樑無灰塵潔淨當用心防  
之八蠱鄉遇飲食以屏角攪之白沫竦起者是蠱也遇會蠱  
家潛於初下筋時收藏一塊在手盡喫不妨少頃却藏所將  
一塊潛埋於人行十字路下即蠱於其家作鬧蠱主必反來  
求救或會時讓責主家先動筋或明問主家云莫有蠱麼以  
筋尊卓而後會如是則蠱不能為害

○中蠱毒者心腹切痛如有物咬面色青黃或吐血或下血不  
即治蝕五臟盡則死死後病氣流任染着傍人○驗蠱法令  
病人朝起取井水唾水中唾如柱脚直下沉者是也浮者非  
也又嚼生黑豆不醒嚼白礬味甘皆是也又煮一雞卵去皮  
日夕含口中勿令破夜吐出着霜露中朝着色大青者是也  
○送蠱法敗鼓皮燒為末水調服一錢病人須臾自呼蠱主

姓名令取蠱去即愈又取菴荷葉密安病人卧席下勿令知  
病人自呼蠱主令取去即愈周禮以嘉草除蠱即

○治蠱法○紫金錠重者一錠用薄荷湯化下又服玉樞丹一  
錠紫金錠料中加雄黃一錢朱砂五錢為玉樞丹八蠱獅覺

錠意思不快即服一錠或吐或利而愈誠濟世衛生之寶也  
或吐或利而愈又白礬甘草等分為末清水調服或吐黑涎  
或瀉下即安又甘草或升麻一兩煎服又馬蘭根為末水和  
服一二錢又櫛木立引吞此陰白皮煎取一升空心服并即  
吐蠱又馬兜鈴根為末一兩水煎服當吐蠱未快再服又商  
陸末和水服一錢又續隨子去皮研為末和水服一錢又斑  
猫一枚去頭足超研為末和飲服并即下蠱又班猫去足超  
熬大戟桃白皮東引者三物等分為末冷水調服半錢其毒  
即下若未出更一服奇效只單服大戟亦好又蚕退紙不拘



多少以麻油紙摺燒存性為末新汲水調一錢頻服雖面青  
脉絕昏迷口噤吐血者服之即甦又藍葉汁飲之又茜鈕五  
根煎服又與蕞荷同煎飲數升即愈又桔梗汁飲之危重者  
亦甦又蚯蚓十四枚醋一升漬之蚓死即飲其汁則吐下血  
如爛肝已死者皆可活又蜈蚣去頭尾足灸為末和飲服亦  
可又狐五臟及腸和五味煮食之灸食亦良有人病蠱夢食  
狐病自消覺而有狐入室烹食遂差又有人在海西買喫蝦  
鹽患腹痛甚暴知其中蠱毒即多飲燒酒乃吐所食鹽物已  
蠢動作魚形其病遂愈

八十三馬毒○馬毒瘡婦人月經血塗之仍飲之又生栗及馬  
齒覓立可搗付之又飲其汁又馬糞汁飲之以馬屎洗之又  
糯米飯冷罨瘡上即愈○馬汗八瘡毒氣攻作心悶欲絕燒

粟稈灰濃淋作汁熱煮蘸瘡須臾白沫出盡即差白沫即毒  
氣也又馬肝毒氣引八如紅線先以鍼刺瘡口出血烏梅核  
爛研醋調塗之又馬齒覓汁飲之又生烏頭末付瘡上良又  
黃水出立安又白礬枯黃丹炒等分調貼瘡上又馬汗及毛  
八瘡腫痛以冷水浸瘡數易飲好酒立愈○開剝死牛馬中  
毒遍身生紫疱俱潰叫痛急服紫金錠吐瀉即愈

八十四烟薰毒○炭烟薰人頭痛嘔吐往往致死生蘿菔搗取  
汁飲之即解無生則蘿菔子水研取汁服亦佳

八十五湯火傷○爛瘡痛牛屎濕付之又醋滓付之又醬汁塗  
之白蜜塗之止痛又蚪蚪搗付之又以好酒洗之以鹽付之  
又梔子末雞子清調塗又大黃末蜜水調塗又炭末香油調  
付并即差凡被火傷即以醋水塗之仍貼以紙連塗令濕雖



至焦爛止痛後又無痕又毛毳燒作末油付又新屎冷飲  
八十六熱油傷○蕎麥粉醋調付之又寒水石末油調塗之痛  
立止

八十七金刃傷○金瘡傷重暈絕不省人熱屎多灌即甦童尿  
尤佳又傷重痛悶欲死納牛腹中即甦詳見傷下○金瘡血不  
止急以石灰末裹之又石灰末和雞子白火煨為末糝之立  
止又糝上塵取傅之又蛇含草明世搗付之又壁錢甘日取  
汁點傷處○牛蒡葉八鹽少許搗付之藍葉汁八牛黃麝香  
少許塗之○失血則當渴然須忍之可與肥脂之物以止其  
渴○金瘡腸斷一頭見者不可連兩頭見者可連續之先以  
針縷續其斷腸便取雞冠血塗其際勿令氣泄即推納之金  
瘡腸出不斷者急以清油搥活推納之續以麻縷或素白皮

尖茸為線縫合肚皮取雞冠血塗之而外重皮則不縫糝藥  
仍服通利藥勿令二便秘澁若腸與脂膏俱出用手擘去膏  
不妨此是間肉放心去之然後推腸入內初飲粥清二十餘  
日仍喫糜粥百日乃可飯忌多飲粥血溢出殺人又忌飲冷  
水又忌嗔怒大言笑動作及醜酸熱酒熱羹○金瘡腸出不  
能納者小麥五升水九升煮取四升去滓令極冷使人含喫  
瘡上及背則漸入勿令眾人見又新汲水噴之令身噤腸自  
入並勿令病人先知○使四人執病人卧席舉搖之腸自入  
○乾人屎抹於腸自入○凡金瘡及墜傷折傷必有瘀血停  
積宜先逐去瘀血花葉石四兩硫黃一兩為末入瓦罐內鹽  
泥固濟曬乾安四方磚上以炭火從巳午時煨至經宿候冷  
取出研細先糝傷處其血化為黃水每取一大匙童尿八酒



煎契調服則睚眦瘀血化為黃水或吐出或瀉下○刀斧傷  
素白皮剝取裹之令汁入瘡中又蘇木末付之蚕蠶包付敷  
日如故又急取白麪付之藍葉汁飲之

八十八砲矢傷○戰陣砲矢所傷流血滿體悶絕者一牛剖腹  
納其人浸血中即甦○箭鏃入骨不可拔取蜣螂全者八麝  
香少許為末罨之即出又鼠腦及肝塗之又蝼蛄同同疏  
黃研付自出○毒箭傷芋根搗付日夜敷易藍葉汁飲之

八十九打撲傷○瘀血在內煩悶欲死蒲黃三錢熱酒調服又  
白楊樹皮叶酒漬飲之又生麻根葉搗取汁飲一升非時  
則取乾麻煮汁飲又童尿熱飲一二升即甦又犬屎燒存性  
為末熱酒調服二匙犬膽一枚分二次溫酒調服惡血盡下  
○打撲傷痛不可忍取葱白八糖火煨乘熱劈開其中有湯

便罨傷處冷則易熱者須臾定痛又芥子和生薑研微炒貼  
之亦妙

九十墮壓傷○凡墮壓死者心頭溫皆可救急安好處以手掩  
其口鼻上一會頃候眼開先灌熱小便又薑汁香油打勻灌  
之又蘇合元三五丸溫酒童便調灌即甦○松烟八好生酒  
灌之○半夏或皂角末吹鼻得嚏亦甦○被墮壓或車轆馬  
踏牛觸腦腹破陷四肢摧折氣悶欲死烏雞一隻合毛千杵  
和醋一升以新布搗病處取藥塗布上罨定乾則易之覺寒  
戰欲吐不可去藥須臾復上一雞神效又烏鴉右翅羽七枚  
燒灰和酒服當吐血便差○墮壓傷瘀血疼痛取水蛭炒焦  
麝香等分為末熱酒服一錢又稻稈燒灰和糟酒淋灰取汁  
乘溫淋洗痛處立差



九十一骨折筋斷傷○折傷筋斷骨碎生地黃取汁和酒溫服  
滓付患處又生黃地熬之裹傷處一日一夜十易一月筋骨  
連續又取蟬腳髓及殼中黃微熬納瘡中包裹之即連筋骨  
又取牡鼠生搗付之三日一易又蒿苳子微炒末酒服二三  
錢能接續筋骨○骨折取自然銅火煨醋淬七次研極細水  
飛同當歸沒藥末各半錢溫酒調服因以手摩傷處此藥直  
入骨損處東之神效此藥新煨者有毒若不折骨不碎骨則  
不可用○山梔生為末五分飛羅麵三錢薑汁和撲患處一  
日夜皮肉青黑是其驗也○腦骨破葱白和蜜細研厚付損  
處立差又取合歡皮去麁皮剉炒黑色四兩芥子炒研一兩  
末每二錢熱酒調和澄清臨卧飲滓罨傷處妙被研筋斷急  
取旋覆花根搗取汁瀝瘡中滓付傷處半月便續

九十二手足折傷○手足折傷出臼痛不可忍急用白礬末一  
匙和沸湯一碗乘熱薰洗傷處痛止若出外則須搗入內若  
出內則須搗入外者骨歸舊臼菜豆粉瓦上炒紫色熱酒醋  
同調成膏厚傅傷處用素木或柳木底夾定麻繩縛札時時  
鮮札拽屈拽直否則愈後曲直不得成痼疾○接指方蘇木  
為末敷於斷指間接定外用蚕蠶包縛數日如故○跌傷作  
腫痛不可忍搥于白麪為末水調搽之乾則灑水即效

九十三肢節解脫○四肢節脫但有皮連不能舉動名筋解黃  
芪三兩酒浸一宿取出焙乾為末每二

九十四耳鼻舌傷斷○治擦落耳鼻用油髮灰末乘急以所落  
耳鼻蘸髮灰綴定以軟帛縛定神效○顛仆穿斷舌心血出  
不止取米醋以雞翎刷所斷處其血即止仍用蒲黃杏仁鵬



砂少許蜜調噲化而愈

九十五陰囊傷破○有人落馬被所佩鎖匙傷破陰囊二丸脫落懸掛未斷痛苦無任有醫教其人漫漫托上多取壁錢廿可敷貼傷處日漸就安其囊如故

九十六杖傷○杖瘡忽乾黑陷毒氣攻心恍惚煩悶嘔逆者死凡杖畢急用童便好酒各一鍾合而溫服免血攻心甚妙仍用葱白搗爛搭杖處冷則易之止痛散瘀如神又斤豆腐鹽水煮熟鋪杖處其氣如蒸其腐即紫復換貼以色淡為度潰爛者亦宜又鳳仙花連根葉搗爛貼之乾則易一夜血散即愈又痛甚者以熱酒盡量而飲刺出惡血以大大黃黃栢為末生地黄汁調付○大黃為末童便頻付

九十七人咬傷○人咬成瘡龜板或鱉甲燒灰油調付

九十八熊虎咬傷○熊虎爪甲傷嚼生栗付之○熊傷人煮葛根取汁洗瘡十度并搗葛根為末調葛根汁服日五次○虎咬傷生葛汁飲之又洗瘡又杵薤取汁飲一升日三滓付傷處又飲清油一椀又白礬為末納傷處又飲酒常令大醉當吐毛出良又砂礮水調服一二椀并塗傷處又生雞肉食之俗生雞割又月經赤衣燒為灰和酒服一方月經赤衣燒灰○腹付瘡上

月經衣布付之傷處

九十九牛觸腸出○腸出不斷者急以清油摸腸用手推入以索白皮尖縫合肚皮縫上糝血竭末或百草霜末○以熱尿常洗之或枸杞根皮煎湯洗之

一百馬驢騾咬踢傷○馬或驢咬人取其尿洗瘡以糞塗之又飲糞汁佳○馬咬踢取益母草搗爛和醋炒付又獨顆栗子



嚼付之燒灰貼亦妙又取雞冠熱血塗之又用艾灸傷處取人尿或馬尿燒灰為末付之○被驟跑倒又咬傷濃潰臭惡

蛆蠅極盛服蟬花散

方見下諸傷辟蠅蛆

一百一犬咬傷○春夏初交犬多發狂但見其尾直下不捲口中流涎舌黑者卽是狂犬若被其咬九死一生急用鍼刺去血以熱小便洗淨卽殺所咬犬取腦付之或用杏仁嚼爛付之以帛係定或同馬蘭根吳研細葱湯洗後塗之急用斑猫七介去頭足翅為末温酒調服其毒必從小便中出可將尿缸盛清水令患人尿其中停半日見濁氣凝結如狗形則毒氣出無則須服七次極驗若小便澁益元散調服一方斑猫七日内用七介七日外每日加一介十日十介百日百介去翅足糯米同炒滑石一兩雄黄一錢麝香一字右為末温酒

調服不飲酒者米飲下毒從大小便出卽愈○患人頂心有

一或曰髮紅卽拔去後服藥快效又常服杏仁以防其毒或

作粥食之又常食韭菜常飲韭自然汁又葛根汁飲之又蚯

蚓糞封咬處出犬毛神效○咬瘡久不差口吐白沫叫喚似

犬聲為犬毒八心也蟾蜍作膾食數次勿令知又取後兩腿

搗爛酒服亦可又虎頭骨虎牙虎脛骨為末酒調服二錢又

虎膽和水服又黑豆汁服○治法無出於灸只就咬牙跡上

一日灸三壯至一百二十日乃止永不發一方連灸限三

月勿令完合

禁忌法○被咬者終身禁食犬肉及蚕蛹性此毒再發則

不可救三年內忌食一切毒物及房事又忌飲酒

一百二猪咬傷○屋漏水洗之又松脂作毒付之



一百三貓咬傷○薄荷葉細嚼付之又虎骨毛燒灰為末塗之  
一百四鼠咬傷○取貓毛燒灰麝香少許津唾調付貓糞塗之  
生薑擦貓口取涎塗之

一百五蛇咬傷○治蛇毒無如雄黃取細末貼瘡口立效又萬  
苴汁和雄黃末貼瘡口毒水流出腫痛即消又即以白礬火  
熔汁滴咬處立差無白礬則速作艾炷灸五壯良又中蛇毒  
眼黑口噤欲死蒼耳叶且嫩葉一擔取汁溫酒和灌之滓付  
瘡上又白芷末麥門冬湯調服滓付傷處又毒蛇螫急以熱  
人尿洗出血次取口中唾塗之又取人屎厚付布裹即消又  
急飲好醋二椀令毒氣不隨血走清油亦可○凡蛇毒取獨  
頭蒜或小蒜或水蓼或苦苣或豆葉或荏葉取汁飲滓付之  
又生蠟蟻搗付又生雞卵敲作一小孔合咬處又牛耳中垢

猪耳中垢取付之又即刮自己耳中腦子納傷處○真末和  
冷水服又和水作餅付之咬處及浮氣去處即消神效○忌  
食酸物梅子犯之必大痛

○蛇八耳鼻口中挽不出急以刀裂蛇尾納川椒胡椒云二三粒  
裹着即出又以艾灸蛇尾即出又割母猪尾頭瀝血八口中  
并孔中亦出後出雄黃末調人參湯服制蛇毒

○蛇繞身不鮮以熱湯淋之無湯令人尿之即解

○毒蛇尿草木着人似刺割便腫痛肉爛若着手足指節墮落  
研砒礬和膠清塗之

○蛇骨刺人腫痛燒死鼠為末付之○大豆葉搗付凡蛇咬取  
人乳汁頻塗又青魚白卵卵沉水待潤貼之即效○正月上  
亥日生榨芝麻油塗蛇咬又飲之甚效蛇咬死取大蟻腫神餘



管輸付蛇咬處  
之神效

一百六蜈蚣咬○取大蜘蛛安咬處當自吸毒蜘蛛死即投水中救活更用生者吸之又烏雞血及尿乾則塗之又獨頭蒜研塗之蝸牛取汁塗之積久○素白皮取汁塗之又地龍肝塗之又木米作餅付○雄雞冠血塗之

一百七蜘蛛咬○被咬人腹大如孕瘡中出絲屢有死者惟飲牛乳可制其毒又咬遍身成瘡飲好酒大醉虫於肉中小如米自出又青葱葉去尖納蚯蚓一條緊捻頭勿通氣候化水點咬處即差又藍汁一椀八雄黃麝香末各一錢和之細飲其汁并點咬處腫痛垂死者即愈只服藍汁亦好又素白皮汁塗之又雞冠血塗之又雞卵敲作小孔合咬處立差○醋磨生鐵塗之

壁鏡甘州咬毒人必死素灰淋濃汁調白礬末塗之又醋磨雄黃塗之

一百八蠟螋傷○此虫又名八角虫狀如小蜈蚣紅唇隱於壁間以尿射人遍身生瘡如熱麻而大繞腰匝不可療烏雞翎燒灰雞子清調塗之又取扁豆葉按付即差又鹽湯淋漬瘡上數日愈又雞屎塗之

一百九蜂螫傷○青蒿嚼付之又薄荷按貼之又芋莖按擦之又冬苾菜按付之酒糟或醬罨付醇酒塗之又梨汁付之

一百十雜虫傷○蝸牛巨積咬人毒遍身者蓼子汁浸之即差○螻蛄咬人巨豆石灰醋和塗之○天蛇即蟬毒黃花人被其螫因為露水所濡乃成疾似痢而非痢煮榛皮早汁飲之差○蚯蚓咬雞屎塗之又急煎鹽湯浸洗又飲一



盃○五毒虫毛螫赤痛不止馬齒莧按付之○諸毒虫咬傷  
大紙撚蘸香油燒火吹滅以烟薰之即愈又小薊或藍葉搗  
汁飲之又付之又香油浸紫蘇塗之

一百十一諸傷辟蠅蛆法○夏月諸傷損潰爛蛆虫極盛臭不  
可近蛇退燒存性一兩蟬殼青黛各五錢細辛二錢半為末  
每三錢黃酒調下日二名曰蟬花散服之蛆皆化水而出蠅  
亦不敢近又寒水石治夏月諸瘡臭爛

一百十二諸虫入耳鼻○取韭汁或葱汁或薑汁或麻油灌入  
并即出牛乳或雞冠熟血灌入亦出○生薑擦猫鼻其尿自  
出滴入即出又桃葉作枕枕之亦出又取小銅罌於耳鼻邊  
敲之亦出取鏡與陶罌打作聲亦出

○蜈蚣八耳取薑汁韭汁藍汁灌入即出或猪脂或牛脂灸令

香置耳邊亦出

○蚰蜒八耳取牛乳滴入即出又蝸牛汁或小蒜汁灌入即出  
又地龍八葱葉中化為水滴入其虫即死為水

○蟻子八耳取醋灌入起行即出又穿山甲燒末水調灌入又  
灸香肥脂或油煎餅枕卧即出又燈心浸油釣出

一百十三誤吞諸虫○誤吞蜈蚣在喉悶甚急取生猪肉吃之  
須臾以清油灌口中即吐出繼以雄黃末水調服解毒○誤  
吞蚰蜒飲牛乳二升自消下○誤吞水蛭味甘取田中乾泥  
小塊小死魚三四介將猪脂熔勻用巴豆十枚去皮研爛入  
泥內為丸如菉豆大以田中冷水吞下十凡蛭皆瀉下而愈  
又濃茶多飲自下又食蜜即化為水

一百十四諸吞諸物○誤吞鈎鈎連綿者莫引之急取珠璫或



琥珀珠水晶珠薏苡子推之鉤所引之自出市上所在火珠亦可用蓋其鉤尖八於珠孔而不礙也○誤吞鍼取磁石如車核大磨令光鑷作竅絲穿令含鍼自出又天豆豉豉者熟同韭葉喫之鍼與菜從大便出○誤吞鍼釘箭鏃多會猪羊肉肥脂物必自裹出又多會肥猪肉葵菜自出又豌豆煮熟同葵菜喫之從大便出○誤吞釵環竹木薙白曝令萎黃煮熟勿切會一大束釵即隨出又多會飽饅至數斤當裹釵環竹木而出○誤吞金銀取水銀半兩服之金見水銀如泥消去○誤吞鐵物銅錢恣會勃薺音刈又升外耳須臾自化狀又縮砂濃煎飲之其銅自下又多會胡桃其銅自爛又服煉蜜二升即出○誤吞木屑捨喉欲死鉄斧磨水灌之○誤

吞桃李骰喉不下狗頭煮湯摩頭上差○小兒誤吞錢不出煮葵汁冷飲即出根葉子同功○誤吞髮繞喉不出亂髮灰水調一錢服又舊木油梳末酒調服一百十五諸骨骰在咽○諸骨骰在咽不下嚼薙白令柔以繩係中吞到鯁處引之鯁即隨出又用韭白如上法以茶嚥下引之亦出又牛筋或鹿筋搥軟如彈丸持筋端吞之候至鯁處徐徐引之鯁着筋即出又綿絮一小塊以蜜煮用如上法即出又弓絃搥令頭散吞引之亦出○威靈仙為末酒服又好醋吞嚥長在喉中不久消化魚骨鯁在咽取鳳仙花子無根用水研取汁以匙送下不可犯齒恐致傷損又魚狗音似上翠取魚水燒灰和水服又萱草根汁飲之又縮砂甘草末綿裹舍嚥即吐出又飽饅作凡如雞子黃大吞之若不下大作凡



嚼下之又鯁魚鰓魚吐川鯉魚吐川膽皆下骨鯁膈月収者  
尤佳取皂子許温酒化呷之得吐便出未吐更飲温酒以吐  
為妙未吐更服又鯉魚鱗皮燒作屑和水服即出○又玉簪  
花醋煮不着齒吞下○大蒜塞鼻即出又鹿角含之津涎下  
○東流水一盃東向坐以手指水上書龍字訖飲之○鯁骨  
在咽取素木上虫屑醋煎灌嗽自下又將狗倒懸吊起涎出  
徐徐嚥下其骨化為水如神又虎骨為末水調服或煮汁服  
狸骨亦佳又象牙磨水服即下又雞足一對燒灰水調服○  
雞骨在咽野苧根洗淨爛搗如泥取櫻桃大以雞湯化下立  
出又白梅肉搥成大丸綿裹用線穿在內令藥送下扯住線  
頭在手一嘔即出

一百十六芒刺在咽○取螻蛄吐腦吞之即下又鼠腦厚塗

鯁上即出又鯽魚或鰱魚膽和酒服即出○稻麥芒在咽腫

痛急取鵝口中涎灌之即出又脂麻炒為末湯點服妙

一百十七諸物八目○稻麥芒八目不出白藜荷有赤白二種

根莖取汁注目中即出又以新布覆眼上取鱗鱗吐從布

上摩之其芒出着良又煮大麥取汁洗之即出又粟殼煎水

頻洗○粟殼刺八眼鱗鱗汁注之○沙塵諸物八眼腫痛不

得開取牛筋槌擘如絲着睛上輕按之自出又好墨濃磨點

睛上以新筆綴出妙又取蜣螂吐一枚手持其背於眼

上影之沙塵自出又魚衣吐以乳汁研和注目中即出又

雞肝血注之○飛絲八目腫痛不得開好墨濃磨點八目中

閉少時其絲自成塊着在睛上却用綿輕輕惹下即愈又頭

垢點八目中又刮人少甲上細屑以筋頭點津唾蘸屑八目



中其絲自聚拔去之又石菖蒲搥碎左眼病則塞右鼻右眼病則塞左鼻神效又菁菜汁點之又鹽炒細末點之

一百十八飛絲八口舌間○生嚼蘇葉以白湯下立效

一百十九匙着口中○匙自着口中漸引入不鮮落者由於胃熱急鍼三里即落又灸匙頭七壯即落

一百二十諸物八肉○鍼八肉不出烏鴉翎三五枚燒灰醋調

罨之自取又取雙仁杏仁爛搗車脂調罨自出又蜈蚣五引

腦同硫黃研傅裏定自出又鼠腦及肝塗之自出又磁石着

其上自出○鐵刺竹木刺八肉不出鼠腦厚調之即出○竹

木刺八肉不出蜈蚣研付之鈔又蠟即黑生研罨之

鈔又躑躅碎付之即出又乾羊屎燒灰和脂猪塗之自出又

烏雄雞生搗罨之自出又人頭垢一名百齒霜塗之又栗楔

生嚼罨之又牛膝根爛搗塗之并即出又蒲公英各取白

汁多塗之又松脂自流者為末裏定自出○魚骨八肉不出

嚼吳茱萸封之骨當爛出又象牙末厚塗自軟出又魚狗鳥

州燒為末和水頓服又海獺煮汁服又白梅肉爛研付之又

魚鱗付之四邊肉爛刺即出

一百二十一魚骨在肚○魚骨在肚中刺痛吳茱萸煎汁一酸

飲骨軟而出

一百二十二胎漏胎動子懸○胎漏胎動皆下血而胎動有腹

痛胎漏無腹痛曲春日○胎漏者徐徐下水暴下斗餘水則

其胎不墮○胎漏腹痛膠艾四物湯熟地黄當歸川芎白芍

藥阿膠珠條黃芩白朮縮砂艾葉香附子炒各一錢八糯米

一撮水煎空心服○胎動腹痛佛手散當歸六錢川芎四錢



水煎臨熟入酒少許再煎溫服○一方胎動一月用烏雌雞  
三月用赤雄雞十月用猪腰子餘月用鯉魚煮汁入藥煎服  
神效○胎痛腰痛或下血葱白濃煎汁飲之安胎若胎死即  
出○勿論胎動胎漏急用海松子及粥極有效必驗○子懸  
昏窒煎服葱白即差蘇葉亦效

一百二十三難產○孕婦不曾行動忍痛曲身側卧故子在腹  
中不能轉動致有橫生逆產甚則子死腹中慎之

臨產進粥飲令人扶策徐徐而行若不得則凭物而立痛陣  
轉蜜產候將至然後作草直待兒逼產門用力一下自然易  
產○臨產孕婦疲倦久坐椅蓐兒抵生路不能下生當於高  
處懸吊手中令產婦攀引輕輕屈足兒即順生

○難產日久漿水多下胞乾兒不得下黃蜀葵子研為末酒調

二錢瀝去渣溫服一方蜀葵花為末熱酒調下一錢即效又  
香油清蜜童尿各半醎慢火煎數沸調滑石末一兩即產尤  
益母膏為鈔益母膏方重午日不犯鐵器採取淨洗搗取汁  
銀石罌熬成膏催生神效○益母草連根葉搗酒服又兒  
頭骨并皮毛燒灰作末凡酒服

○臨產交骨不開日久垂死急用加味芎歸湯龜殼一箇生男  
女婦人頭髮一握燒存性當歸川芎各一兩為末每三錢水  
煎服良久生胎死胎俱下

○礙產兒頭謂雖正產門已露其頂而不能生下者此因兒轉  
之時臍帶攀掛兒肩不能生也令產母仰卧收生之人輕輕  
推兒近上徐徐通手以中指按兒兩肩理脫臍帶候兒身正  
用力一送即產



○盤腸產謂產時腸先出兒即隨產治法頂上貼如聖膏草麻子去皮一兩雄黃二錢同研成膏自然收縮即以水洗去如腸頭為風吹乾不能收八以溫腸潤湯令產母仰卧以言安慰却用好醋半醎新汲水七分調和忽噉其面則收每一噉一縮三噉三縮腸已盡收矣又以磨刀水潤腸微溫必煎磁石湯一盃飲之則收又鬼頭骨并毛皮燒為末凡酒服

○橫產者先露手逆產者先露足偏產者兒頭偏挂一傍不露正頂只露額角也凡橫產逆產當令產婦仰面安卧收生之人徐徐推兒近上以手正之候兒身順正門路却服催生藥上草易產

○手足先露者用細鍼刺兒手足心一二分三四次以鹽塗其上擦之輕輕送入兒得痛驚縮即順生又兒脚先生急以鹽

塗兒脚心一底方曰因急搔之併以鹽摩母腹上則自然正產

○以手中指取蠶蟄底墨交畫兒足下即順生

○橫產者及子死腹中難產危急當歸川芎各五錢益母草三錢酒一醎八藥先煎欲乾八水一醎再煎至半溫服連三次便產鈔又益母草濃煎或取汁頓服立效益母膏右鈔又艾葉半升清酒四升煎取一升服○又法人尋路傍草鞋一隻取鼻絡小耳繩燒灰溫酒調服即差得左足者生男右足者生女覆者死兒側者有驚

○死胎孕婦腹痛胎不動者以手摸之而面冷者為死胎溫者為生胎胎死則面青唇舌青指甲青口中極臭心腹脹悶舌黑者子已死母面赤舌青者母活子死面青舌赤口中出沫者母死子活唇舌俱青兩邊沫出者母子俱死兩臉微紅則母活



子死○孕婦舌黑者子已死全以舌為驗佛手散救之若加益母草三錢尤鈔用此探之胎不損則腹痛止若胎死則立便逐下神效○死胎着脊不出氣欲死猪脂白蜜各一升醇酒二升合煎取二升分兩溫服即下又子死腹中其母氣欲死伏龍肝末三錢水調服其上當兒頭戴出至鈔又鹿角屑二三方寸匙者葱鼓湯和服立出○明知胎死急用平胃散蒼朮二錢陳皮一錢四分厚朴一錢甘草六分本方有薑棗酒水相半煎臨服去滓調朴硝五錢再煎化服其胎即化血而下

○穰法○取產母常着衣以籠竈頭及竈口則易生勿令產母知又臨產赤馬皮鋪地令產母坐其上則易產又飛生皮此

斗即鼯鼠山中行之狀如蟪蛄大如鳩暗夜飛行甚難得產母兩手把之即產

○鍼灸法○急於右腳小指尖頭灸三壯即產又鍼合谷三陰

交即效在足內踝上陷中

一百二十四胞衣不下○產後急斷臍帶以小物係帶牢固然後切斷不爾胞上掩心而雖淹延數日亦不害人惟產母心懷安恭勉進粥飲終自下矣切不可妄用手法探取或致大殞或為終身之害○治法猪脂白蜜清油各半醃於火上燂化溫分二服便下只多服猪脂亦可益母草膏亦佳○蛇退全者一條蟬退十四箇男子頭髮雞子大并燒為末分二貼酒調服即下又童尿一升雞卵三介薑汁葱白汁各一合和勻溫服又冬葵子三合濃煎頓服即下不效更服又兒頭骨并皮毛燒灰為末凡酒服又大豆半升醇酒煎至半分三次服又伏龍肝醋調物納臍中甘草湯服之神效○若胞衣上衝至死但心頭暖急以童尿調花葉石散訪見上一錢服之



取下敗血如猪肝或化為黃水而出其胞即下

一百二十五產後諸病○產後瘀血衝心脹痛欲死兒頭骨并  
皮毛燒灰為末丸酒服

○產後腹痛戶限下土末一錢酒調熱服又白丁香即兩頭尖  
雄雀屎

方寸匙煖酒服○黃蠟一錢好酒一醃煎服

○產後壯熱頭痛頰赤唇焦口乾煩燥昏悶松黃湯松花蒲黃  
川芎當歸石膏煨等分紅花少許水煎細呷

○產後交熱文魚作末和藿羹喫之

○產後不能食煩懣小豆三七枚燒作屑篩冷水頓服

○產後陰戶不斂陳葱生搗炒熨

○產後陰痛蛇床子布裹蒸熨

○乳汁不下死鼠一頭燒存性和酒方寸匙服勿令病者知之

○乳腫初發蕎麥末水調塗四圍乾則又塗於其內漸漸入

塗至腫○乳腫增寒熱麥芽炒二三兩水煎服○乳腫堅硬

身熱增痛不進飲食椶皮其為末一錢酒下即睡而差○乳

腫濃潰久不完全合成癭瘡爛烏雞生剖其腦掩覆爛瘡則雖

成虫盡出于雞肉不過三雞而差

一百二十六陰病○陰戶挺出不脫白礬燒灰一錢空心溫酒

服蛇床子布裹蒸熨○陰戶作痛烏賊魚骨燒末酒下方寸

匙日三○陰冷痛取丁香顆大者作末封紗帛納陰中痛即

止○陰中生瘡如虫咬桃葉搗綿裹納陰中日三四易又胡

麻生嚼塗之 陰痒小蘇容川水煮熱洗日三小蒜亦好又

雞肝乘熱納陰中虫盡出又牛肝取三寸納之半日虫盡八

肝内猪肝亦好



一百二十七血崩帶下○血崩地榆湯一合服之○帶下桃仁去皮去雙仁細研和好酒一餅隨量飲之

一百二十八小兒初生急病○初生氣欲死不能啼必是難產或冒寒所致急以綿絮包置懷中勿斷臍帶且將胞衣置爐火中燒之仍作大紙撚蘸油點火於臍帶下熏之令火氣入腹更以燒醋湯盪洗臍帶須令氣回啼哭如常方可斷臍帶○初生面青身冷口噤乃胎寒也用白殭蚕散急救之白殭蚕木香肉桂陳皮檳榔甘草灸各五分右剉水煎取汁以縣蘸八兒口中

○初生急死者急看兒口中懸雍前腭上有泡如石榴者以指摘破出血以帛拭去髮灰糝之若惡血八口中即死

○初生急患撮口不飲乳名曰馬牙俗呼為齒便着兒齒艱上有

小泡子如粟米狀急以鍼挑出血用墨磨薄荷汁斷母髮少許裹手指蘸墨遍口內擦之勿飲乳一時許即差不治則百無一生又以指爪或鍼搔破點生蜜亦效○初生撮口不飲乳取牛黃二分半調竹瀝灌口妙又赤足蜈蚣一條酒浸炙焦研如粉每五分以猪乳汁二合和勻分數次灌口中○撮口者初生一臍也三日內之為疾也令兒氣促口撮如囊而不乳也面目黃赤啼散不出舌強唇青用白殭蚕二枚畧炒為末付唇口即差

○初生噤口不開南星末一錢腦子少許研勻調薑汁以指蘸擦兒牙齦上口立開○初生口內白屑滿舌上不能吮乳謂鵝口急以亂髮纏指頭蘸薄荷汁或井華水拭淨如不脫用雄黃三錢鵬砂一錢甘草半錢龍腦少許為末蜜水調塗或



乾糝之妙又鼠婦虫取汁塗之又白楊樹皮叶燒取瀝塗之

○初生遍身無皮但是紅肉以白早米粉撲之候生皮乃止

○初生遍身如魚泡如水晶碎則水流以蜜佗僧為末糝之因服蘇合元

○初生遍身發丹毒赤腫流走乃胎毒也八腹八腎則必死宜以細鍼或砂鍼隨赤暈周匝刺出惡血仍以芭蕉汁鱗鱒汁塗之又赤小豆末和雞子白塗之又溝渠中小蝦搗付之又蕎麥麵和醋付之又伏龍肝末和雞子白塗之乾則易之○丹毒單麻子五介去皮搗八麵一匙水調塗之甚效

○初生鼻塞不通乳不得下取猪牙皂角草烏等分為末葱涎調成膏貼顙門上又天南星為末薑汁調和貼顙門上

○初生穀道無孔不得大便急金用玉簪尖者看其的處刺穿作孔以蘇合香元少許作錠納孔中或以油紙撚絛八不令再合

○初生嘔吐不能飲乳乃穢惡八口用黃連只角赤茯苓等分為末蜜凡梧子大乳汁調一丸灌八口中又木瓜生薑煎湯灌口中亦好

○初生不飲乳不小便大蔥白一寸四破之以乳汁煎銀石咒灌口中立效

○初生大小便不通腹脹氣欲死急令婦人以溫水嗽口了吸啞兒前後心并臍下手足心共七處每一處凡啞三五次嗽口更啞取紅赤色為度復更自通不爾則死又葱白汁乳汁各半調勻抹兒口中與乳吮下即通



○初生小便不通急用生地黄數條蜜同研勻付陰莖上內用  
蚕退紙燒灰八朱砂龍腦麝香各少許麥門冬燈心煎湯調  
灌口中即通

○初生大便不通先以硬葱尖絛八肛門內如不下用朱砂丸  
朱砂水飛南星炮巴豆霜各等分右為末糊丸黍米大薄荷  
湯煎灌下二丸即通

○初生外腎縮八取硫黃吳茱萸各五錢為末以大蒜汁調塗  
臍腹上仍以蛇床子燒烟微熏之妙

○初生斷臍後為風濕所乘或尿濕裙裯遂成臍風面赤喘急  
啼聲不出臍腫突腹脹滿不能飲乳則發搐噤口宜用調氣  
益黃湯金頭赤足蜈蚣一條酒浸炙蝎梢四介白僵蚕七介  
炒瞿麥五分為末每半字半以鵝翎管吹入鼻噴嚏啼哭

則可治仍用薄荷湯調一字服之甚者用金烏散金頭赤足  
蜈蚣半條酒浸炙川烏尖三介生麝香少許為末每取半字  
二分五以金銀咒煎湯調下又或用宣風散全蝎二十一介  
里半全者浸酒炙為末八麝香末一字和勻每取半字以金銀咒  
煎湯調下當歸末付之瘡處

一百二十九小兒客忤中惡○客忤者忽有非常之物或未識  
見之人觸之或經神廟佛寺與鬼氣相忤者也其狀口吐青  
黃白沫或下水穀鮮雜面變五色腹痛反側狀似驚癇但眼  
不上竄耳其口中懸雍左右若有小小種核即以竹鍼刺潰  
之或以指爪摘破急作醋炭皂角燒烟薰之却以蘇合香元  
薑湯調和頻與服之次服雄麝散雄黃一錢乳香五分麝香  
一字為末每半字雄雞冠血調灌之仍以母衣覆兒身即愈



無用黃土散竈心黃土蚯蚓糞等分細研水調塗兒頭上及  
五心又取豉三合水濕搗為丸雞子大摩兒顛上及足心各  
五六遍次摩臍心及上下良久中自有毛於路上即擲之中  
惡者其狀卒然心腹刺痛悶亂欲死人中青黑即服蘇合香  
元未醒以皂角末吹鼻又以唾和麝香一錢重研和醋一合  
服之即差

○中馬毒氣或馬鳴驚忤取馬尾燒烟熏之兒面以差為度  
一百三十驚風○初生發驚者乃胎驚也朱砂雄黃等分為末  
取少許猪油汁調抹口中即效麝香少許為妙○小兒急驚  
者因風熱而生或聞犬吠大驚而發涎潮搐搦竄視反張身  
體與口中氣皆熱發時暴烈過則惺惺如故取牛黃大豆許  
調竹瀝灌之又猪乳汁灌之調朱砂牛黃各少許尤妙又天

漿子

叶叶

取汁灌之又梨汁和竹瀝灌之調清心元少許妙

○慢驚者大病之餘吐瀉日久中氣大虛及過服寒涼之藥而  
得渾身四肢冷口鼻氣亦寒昏睡露睛目上視手足瘳癡取  
大天南星一介炮裂放冷為細末以生薑防風煎湯調下半  
錢又天漿子白殭蚕全蝎各三介並微炒細末每二分半薄  
荷湯調下日三又丁香一立全蝎一介朱砂二分半俱為末  
男用左手中指血女用右手中指血一點蘸藥末擦唇上即  
愈又法取雄黃沒藥各一錢乳香五分麝香二分半為末吹  
少許入鼻如眼淚鼻涕俱出者可治又取半夏末皂角末各  
少許吹鼻有嚏可治無嚏不可治

一百三十種驚癇蛇蛻燒灰服雞冠血少滴口中又用無價散  
○驚癇客忤虎膽研水服蟬退水調開攤紙上貼心上



灸法○慢驚諸藥不效先診太冲脉若存則百會灸三壯又

兩乳頭上男左女右三壯灸髮際五分眉心顛會各三壯

則隨輕重七壯未效又灸之亦可

一百三十一吐瀉○水泄不止五倍子為末陳醋調稀熬成膏貼臍上○吐瀉日久不止津液枯渴煩渴引飲欲成慢驚宜用錢白朮散氏葛根二錢人參白朮白茯苓木香藿香甘草各一錢鹿末每二錢水煎服泄瀉加山藥炒白扁豆肉豆蔻煨已成慢驚加天麻細辛全蝎炒白附子不問陰陽多煎滿意會之

一百三十二疳瘡○口瘡糜爛五倍子細末糝之○走馬疳齒根潰爛齒黑脫落顛有穴者名曰走馬疳○乳香凡方乳香輕粉砒礪各五分麝香少許研細以薄紙一韭葉許按過揉

紙少許和凡如黃米大臨卧將藥填患處至明即愈忌食醬鹽醋○方效散方青黛黃柏白礬枯五倍子各一錢為末先以米泔嗽口糝之○銅青散方白芷五錢銅錄二錢半馬牙硝一錢麝香一字為末乾糝之○尿白散方人中白火煨白礬枯白梅肉燒存性各二錢為末先用韭葉根陳艾濃煎汁以雞翎蘸汁刷去腐肉洗去鮮血後付藥日一二次○獐肉會之付之

一百三十三瘡疾○滿身生瘡作爛半天河水微温頻洗○惡瘡竹葉燒和雞子黃付之又蜣螂杵絞汁塗之○月蝕瘡成爛兒屎納於蠟螟腹中燒灰付之○頭瘡及顛不合龜甲燒灰付之○外腎腫大牡礪為末雞子清調塗即消

一百三十四癩癬○三稜末量兒大小和乳又棗肉爛研乳調



與兕會之又老鼠肉煮汁下米作粥與會之

一百三十五虫痛○貫象赤小豆水煎空心服

一百三十六痘瘡○終始宜戒避風寒禁生冷○又忌香臭惡臭油炒烟臭滅燈燭燒頭髮毛羽臭切忌房中淫辱及梳頭巫覡僧尼外人切勿出入要令內外安靜○禁忌生梨红柿西瓜大棗水沈乾柿柑橘酸醎等物○痘熱感自不思肉而俗以為僧神舉家會素使病兕氣血大虛變症雜出多至不救所宜深戒也

○初熱三日○痛勢似傷寒勿論疑似急用升麻葛根湯葛根二錢白芍藥升麻甘草各一錢加八荆芥穗防風山查肉各七分薑一斤煎服日再或用金銀花忍冬茶取汗而終不如湯藥也○此時或發驚搐是吉兆切勿把持任其自搐以薄

荷甘草等分煎水調下牛黃抱龍丸或膽星抱龍丸或瀉青

丸亦鈔又宜加減紅綿散其方麻黃夏月慎用荆芥穗全蝎天麻

薄荷紫草茸蟬退各五分八葱一莖煎服此時或吐或瀉或吐瀉并作自此至出痘終日症雖苦劇皆不妨○此時腰痛將必黑陷急用神鮮湯溫覆出汗而不汗再服以痛止為度其方柴胡一錢半乾葛防風各一錢麻黃升麻白茯苓各八分甘草五分煎服若無藥則宜多取汗○此時必發渴切勿與冷水取紅花子炒黃煎水飲之此水始終飲之為可或金銀花茶或糯米飲或三豆飲皆可飲之

○出痘三日○始痛一日便出極重二日出重三日出例也遊戲四五六七日乃出者勿藥之類也○初見紅點而色淡紅且潤不必用藥色若太紅而枯者毒多也急用化毒湯日再



服以色淡紅為度毒太甚則難日其方紫草茸或三錢升麻

甘草各一錢加白芍藥一錢山查肉七分蟬退去頭五分此

藥能令痘稀且無痘後諸症蓋出痘初程之聖藥也毒多者

調辰砂五分服亦妙○此時痘出太多急用消毒飲日再鼠

粘子炒研二錢荆芥穗一錢防風甘草各五分或加山查肉

黃芩酒炒紫草或加犀角磨汁服尤佳服此飲則痘不害眼

○痘既多出而身熱尚未退用連翹升麻湯加升麻一錢葛根湯

更七分薄荷○此時吐瀉不足深憂或發驚搐窒塞逆症也

急用加減紅綿散○此時或大渴求飲不已紅花子炒一合

加鼠粘子煎服雖口中如烟起即止又大渴用定中湯和砂

糖服立止其方真黃芩湯泡取水和雄黃水飛一錢朱砂水

飛五分少加砂糖溫服吐瀉神妙止或用糯米飲所出月經

亦好○此時或有四肢百節皆痛者此由痘未快出或由未

盡和鮮而然勿藥自愈○出痘終日即見點後蓋多微痒者

以木麥末敗草散或效草或穀草蓋屋久糝於痒處以手搯

摩即止凡痘或爪破或潰爛流血流汁處皆可糝之○此時

必有咽痛宜如聖飲麥門冬吉更各一錢鼠粘子炒研甘草

各五分竹葉三片水煎徐徐呷下或消毒飲加升麻七分吉

更犀角屑各五分犀角則調服毒盛喉欲閉急用猪尾膏破未

精小確猪以刀裂尾天取血即和龍腦作丸以

○起脹三日○症頓者已自昨有脹意先出者先起以次漸起

而紅綿緊付於顛下不必用藥若色太紅近赤者血熱毒盛

也用活血飲日再紫草茸二錢生地黃白芍藥當歸各一錢

川芎五分紅花三分酒水煎服此乃起脹法若痘密勢重急用



神功散數貼黃芪人蔘紫草或用生地黃鼠粘子炒研各等分紅花前胡甘草減半煎服次日繼用內托散黃芪人蔘當歸川芎厚朴製防風吉更白芷甘草各一錢黃芩黃連各五分并酒炒水煎服若淡白灰陷去苓連加木香官桂各五分或加丁香五粒○痘色淡不起脹者虛也用保元湯日再入蔘二錢黃芪甘草各一錢加當歸白芍藥微炒各一錢官桂五分生薑一斤糯米五十粒水一升二合煎至三分和好酒三四匙服○此時身復熱困頓啼哭例也此時湯引飲連與糯米飲此飲能解痘毒養胃氣渴若太甚用紅花子水考出之治此時若泄瀉則大危急用保元湯加白朮白芍微炒乾薑炒黑官桂各七分薑一斤糯米百粒煎服日再以此為度○此時發微痒人以手摩之便止者為吉而若痒甚則危

急以水楊湯頻洗面部好痘顯焦枯而痒者固宜洗法而顯

若淡白虛軟而痒者用洗法則乃反糜爛自破矣溪邊大葉赤條之楊

到之用長源水猛煮五六沸乘其極熱以細布洗之又楊效此水能引出毒氣故項臨者皆起或黑陷處以蘇漬水付尤見奇效春冬用枝夏秋用葉○此時若痛甚不可忍則

白芍細末每一錢淡酒調下○此時取醇酒和水煮數沸殺

其毒頻頻與飲之又以酒醇和水以糯米末作心煮粥亦頻

與之此是脹膿之巧法然飲酒過取反有害○此時全以補

氣為主取陳雌雞去皮去脂又去尾端翹端及五臟腹中納

糯米少許用水十椀同煮大鼎中水縮至一甫兎許更去浮

脂與兎飲之鄉谷無人蔘之家必用此法則甚奇雖日用雞

三四首至貫膿終日則有百益無一害矣○此時面部浮大

例也



○貫膿三日○痘順則自昨日終日也面部顯白已有向膿之漸浮氣益加兩眼封合痘稀眼不合至中日面顯盡膿則浮氣稍減咽痛亦減矣○此時膿水若清淡則收斂必難急用參歸鹿茸湯數貼鹿茸三錢灸人乳黃芪蜜炙人參各二錢當歸身一錢甘草炙一錢桂皮七分或用官桂生薑一斤糯米五十粒龍眼肉一二介去大便潤水煎和酒四五匙服○此時吐瀉大危急用定中湯瀉甚急用木香散一二貼木香丁香桂枝陳皮半夏赤茯苓人參訶子皮大卜皮前胡甘草各五分薑三片水煎服或熱症輕用此藥則大害立至慎之○此時若膿未足而先有向乾意熱勢又劇此最惡候急用猪尾膏四糞散臘月以一人貓猪犬糞燒存性各一二錢水調服之屬以救之○此時痒甚急用內托散保元湯加味當歸白芍防風白芷用之亦好○凡痘自上

向下以次成就此時面部方膿肢體始脹蓋無不痛之處卽例證也

○收壓三日○此時必發熱引飲痘輕渴不甚者只砂糖水紅花子茶可以止之而若發熱大渴月經水亦可飲之○此時眼合者恐鬱熱生眼疾時時攀閱眼睫頻通風氣且以新汲水以紙蘸點眼中日四五次每次三四點此法甚妙○此時白睛上紅絲散漫中有凸之狀者痘出而然恐成翳犯黑睛以牛蒡子細末冷水作餅付顙門引子上日再易妙○此時有泄瀉或赤白痢者皆瀉熱而發也數日後自差不必用藥如氣血俱熱乘其隙而發者日將加重終至難治急用保元湯加白芍微炒白茯苓土炒各一錢肉豆蔻煨肉桂黃連酒炒乾薑黑炒各七分連用數貼○此時有腹痛者用蟬退湯蟬退二



十一介甘草一錢半水煎服或為末白湯調下出痘時腹痛者痘自腸胃  
中此亦如不效用木香理中湯木香人參白朮乾薑炮甘草  
灸各五分加鼠粘子研炒黃連炒酒各五分水煎服○此時胸脇  
之痛在中腕近處者是餘毒歸心也急用乳香二錢水一盃  
煎服只有脇痛者由瘀血而作韭菜取汁用之此時觸風寒  
腦腹急痛者候似霍亂若以霍治之則必至大危急用消風  
散荆芥穗甘草各一錢人參白朮白殭蚕炒川芎防風藿香  
蟬退去頭羌活各五分陳皮厚朴各三分加柴胡七分青皮  
五分八細茶一撮煎服三四貼即效傷此症細痛亦此時手足  
戰掉或顛戰氣虛也用保元湯加當歸白芍酒炒白茯苓各一  
錢肉桂五分○此時瘡顆濕爛不斂治法上同更加白朮炒  
一錢以差為度○此時陰串有浮大者痘毒與濕熱下注而

然也此症多勿藥自愈其藥消毒飲方見加黃芩生地黃并  
炒知母草龍膽各五分數貼甚效○此時耽睡之呼不應勸  
乳食亦不肯喫病弛氣困而然也宜用保元湯加白芍酒炒  
當歸身白茯苓粘子研炒各一錢肉桂七分薑一斤糯米百立  
煎服氣短耽睡者難救○此時謔語見鬼者熱也昏昏不醒  
者亦多熱也月經和牛黃膏連用之其方朱砂盤全各三錢  
交二錢甘草一錢龍腦五分此時吐瀉并作宜定中湯方見虛嘔  
者亦效此時合眼羞明流淚有赤白膜者可以急治而氣血  
未復之前輕用泄藥非徒無益於眼患或有閉於死生然亦  
不可等待完復而施治用黑豆皮萊菔赤豆皮生朮白皮  
勿用各五分水煎調甘菊花用白蟬退去頭等分細末每  
土根皮一二錢服之若眼疾輕者則服月經牛黃膏之屬亦效○凡



險痘則至脹膿之時疔痘多發於一身以黃蠟真油熔作膏  
候冷調石雄黃貼疔上則疔自落矣○痂落之後餘顯間間  
成瘡不飲以飲已散糝之又臈猪脂善收痘後瘡疥黃散連黃  
栢地骨皮五倍子甘草等分細末乾搥之○此時痘癩必出於關節處以鼠粘子  
生根爛搗炒溫貼之或黑棗赤三豆及鼠粘子同為末醋和  
付之或濕牛糞炒熱日貼數十次凡七八日自消免膿矣癰  
已成膿以大鍼決去以絨摵心插之貼糯飯待其生肉○餘  
毒成走馬牙疳急服月經牛黃膏外以搽牙散治之見上疔條  
○凡痘起脹時間發水泡急以保元加白茯苓白朮桂○紫  
疱及賊痘先大無根異於類者即拍去貼雄黃黃蠟膏或升麻水調乾  
臈脂頰塗之○反眼之症或出於收壓之時上睫之毛必倒  
豎或直豎向前所見異常或上睫之內有紅肉垂下恟恟不

省或狂言見鬼蓋眼胞屬脾胃是餘熱入脾胃也用連翹石  
膏湯連翹石膏煨研甘草水飛各一錢半葛根生地黃大黃山梔  
各七分升麻赤茯苓各五分甘草三分加黃芩黃連并酒  
七分輕者二貼重者三四貼甚效○已上即治痘大畧傳變  
諸症不能盡錄耳○全有馨曰痘家自初全不藥治延至收  
壓之境危症雜出然後始為來問若氣短氣虛嘔泄昏睡不  
省奄奄垂盡敗症俱見欲用他藥則別無指的之症其勢極  
危用人參黃芪補氣當歸身補血水煎石雄黃水飛寧脾胃  
治瘡毒助服之試服漸有回生者名曰四聖回天湯雄參各二錢如黑  
陷加白朮二錢

一百三十七麻疹○疹症畧似傷寒增寒壯熱頭痛臉赤目赤  
頰紅身體疼痛又火熱太盛多咳嗽噴嚏鼻流清涕眼光如







熱升麻葛根湯加黃連地骨皮如有失血四物加犀角汁或犀角地黄湯白芍一錢生甘草一錢半○大湯人參白虎湯如神知母石膏各一錢吉更人參各五分甘草二分

○總之麻疹前後燒熱不退飲食不進等症并屬血虛血熱四物湯加減以滋陰湯加麥冬犀角汁嗽加瓜蒌仁痰加貝母陳皮實熱加苓連防風連翹以涼其中凡汗不透燒熱不退倍加紫蘇葉葛根白芷助之當得大汗去病如掃○疹出沒謔語宜升麻葛根湯調辰砂益元散服○疹出沒喘嗽升麻葛根湯加麻黃沒而喘嗽涼脾散連翹四錢大黃一錢半○疹出沒許少加吉更地骨皮五味子

○喉痛失音○喉痛宜甘草吉更玄蔘甚加鼠粘子○喉啞宜清金降火湯當歸酒洗白芍生甘草并酒炒陳皮貝母甘草

黃連等分

○嘔吐○五苓散澤瀉一分赤茯苓白朮猪苓各五分加化班湯

上方見夏月加黃連滑石 乾嘔加竹茹

○腹痛○五苓散調益元散或水磨山查子服熱上治○腹悶五苓散加紫蘇香附

○泄瀉○疹已出時宜黃連解毒湯黃連黃柏黃芩各五分加四

苓澤瀉赤茯苓或人參白虎湯現最欵○疹沒後黃連解毒湯加導赤散甘草木通去麥門冬生甘草○吐瀉四苓加鼠粘子訶子

○痢疾 疹出時宜黃連解毒湯加枳殼白芍○疹沒後黃芩

湯黃芩黃連并炒當歸酒炒川芎人參青皮炒枳角殼炒檳榔甘草木香另研末臨服八如未效再調益元散服或用黃連解毒湯



○鼻口血○發熱時鼻口血無妨而如太多當歸六黃湯一服

即愈

當歸黃芩各一錢生甘草黃柏黃芩黃連各七分一方等分倍黃芩

又宜升麻葛根湯加

炒梔仁○已出口鼻血出宜黃連解毒湯加梔仁童便○已

沒後血宜涼膈散現加梔仁生甘草童便

○牙根腐爛鼻血流○急以四物湯加茵陳木通犀角外用獨

棗丹

乾紅棗一枚去核雄黃小一塊八塞肉燒存性為末米泔煎湯八盞少許嗽口擦之治之不可緩

或擦搽牙散

○初出大便出血○宜升麻葛根湯加犀角地黄湯現○已出

及沒宜黃連解毒湯加犀角地黄湯

○小便溺血○宜黃連解毒湯加木通○沒後赤濁五苓散加

車前子研炒木通

○嗽血吐血衄血失血下血或傷眼目俱宜犀角地黄湯

○眼角耳中或大便出血不止逆急用升麻葛根湯加當歸六

黃湯可救一二

○疹後不食四物加神曲炒砂仁炒麥芽炒煎服

○疹後未服清利解毒之劑則餘毒入胃牙根肉腐血出臭氣

宜清胃散當歸身黃連夏月倍用生甘草各五分涼膈散外用搽牙

散

○疹後瘡疥及眼疾宜黃連解毒湯加減治之

○疹後蛔痛極宜多連陳湯苦練根白皮半夏加烏梅肉山查

肉使君子肉檳榔生薑之類而治之○或病久虛寒虫動用

安蛔理中湯白朮人參乾薑炮甘草使君子肉烏梅二川椒

十五粒煎服

○疹後餘熱無價散犬糞燒漬溫水出汁調牛黃膏或龍腦安



神凡頻頻服之○或飲月經猪糞汁  
○疹初起時渴常服葱白湯或以穀糟糠用滾水潑淋候温飲  
之稍凉亦可

○禁忌○外犯風寒內傷腥冷生痰嗽成驚搐或皮毛開塞毒  
氣難出遂變紫黑而死食酒肉雞魚腥葷等物則毒入脾胃  
疹後生瘡癩下流大腸為泄瀉白痢流八小腸為小水赤洪  
為赤痢○忌食鵝鴨卵傷目忌食薑椒熱物只舌生瘡又忌  
甘甜生牙疳○凡疹退後須避風寒戒水濕忌食雞魚鵝鴨  
不則終身咳嗽患風瘡傷眼目無有愈日疹後一月切宜守  
戒虛者守戒百日冷曾見俗方曰疹出而熱浮於外腹中反虛  
後亦即生口味禁忌  
有不同者可疑矣  
已上亦治疹大畧見者以意忝量治之可也

### 神仙太乙紫金丹方

山茨菰

去皮淨焙二兩○臞仙云其葉似韭花似燈籠色白上  
有黑點結子三稜二月長苗三月開花四月葉枯空地

得之即今有兕田野所謂鷓鴣蒜不可識可於三月開花四月葉枯空地  
味不辣有粗皮和毛巽數引射製藥而食者類小蒜而  
然而本草云葉如車前根如葱蒜則與上野云不同本草野  
謂零陵有或無亦豈風土之異乎長苗殘花

開花

結子

葉枯

續隨子

一名殺子。以絨隔以生布絞去油取秤一兩。裹

五倍子

一名大文蛤。如槌破取洗淨至色黃勿用。早葉

紅芽大戟

去毒洗淨。凡乾使用。揀去附生者勿用。

麝香

三錢。別以研。○燕出多。屎溺中。覆之。皆有常處。人遇春。其

至一斗五升。○乾麝香。此勝。以細綫取。結香。雖得。三乾。燻。不  
可也。○乾麝香。此勝。以細綫取。結香。雖得。三乾。燻。不  
係坑。二尺許。以瓦盆覆之。經宿。待乾。取出。以熟木。於坑口。殊



勝多產  
西北界

右除續隨子麝香外三味為細末却八研藥令勻用糯米煮  
濃為糊於木臼內杵下合時宜用端午七夕重陽或天德  
月德日亦佳要在淨室焚香至誠修製毋令婦人雞犬見之  
杵後重畧為十四兩三四錢分為八十粒陰乾一粒重一錢  
一劑八兩此其大畧也此方加雄黃末砂為玉樞丹兩莫如單製此藥甚堅剛未  
易磨須用細鏽鏽之和水用之每服一立空心下侵晨早服  
見效尤速通利一兩行無妨只用溫粥止住此藥隨手取應  
萬無一失但孕婦不可服氣弱老幼量意服

治一切藥毒盡毒瘴氣狐狸毒喫惡菌河狍牛馬驢驘等肉  
一切飲食毒用凉水皆用并華水或長流水磨擦之○蛇犬  
蜈蚣一切惡虫所傷者并用冷水磨搽傷處○湯火燒者東

流水磨搽傷處○登高墜下撲打傷損以炒松節入酒湯用

○癰疽發背疔腫一切無名惡瘡未破之時用冷水磨搽痛

處并磨服良久覺痒立消○諸風癩疹赤腫諸瘤小兒急慢

驚風八疳五疳脾病黃腫并用蜜水用生薄荷一小葉同磨

下并搽如無生薄荷乾者煎磨用如小兒牙關緊急磨搽一粒分作三服

量見大小與之○牙疼酒磨塗及合藥少許吞下○陰陽二

毒傷寒心悶狂言亂語腦瞶壅滯邪毒未發及四時瘟瘧感

冒風寒頭風寒熱鼓脹浮腫急喉閉纏喉風用凉水薄荷一

小葉同研下○諸般瘧疾不問新久臨發時桃柳煎湯磨下

屢試無不愈但氣瘧壯瘧須服二粒乃愈或桃柳湯下而不

愈酒服乃愈○男子婦人急中及顛邪湯叫亂走鬼胎鬼氣

神迷譫語并用無灰煖酒下○自縊死溺水死心頭微溫者



及夢歷驚死鬼迷死未隔宿者并用冷水磨灌下良久復甦  
○諸般癩疾急卒中風中氣中惡腦腹卒痛口眼喎斜唇眼  
掣眈夜多睡涎言語蹇澁口噤車差牙關緊急筋脈攣搐骨  
節風腫手脚疼痛行止艱辛應是風氣熱酒磨下

喻良能云袁丞相傳此以為濟世衛生之寶凡人家或出  
八不可無此藥也毒藥最多於嶺表若遊嶺表纔覺意思不  
快便服之即安二廣山谷有草曰胡蔓草若以毒人急水吞  
之急死緩水吞之緩死又殺毒蛇以水灌之數日菌生其上  
取為末調酒以毒人始似無患再飲酒毒發立死若覺中毒  
四大不調即便服之或於雞豚魚羊鵝鴨等肉內下藥再食  
此物觸發其毒急服此一粒或吐或下便差昔一女子久病  
癆瘵命在朝夕為血尸虫所噬磨一粒服之一時間吐下小

虫千餘大者正為段段後更服蘇合香元半月遂愈

今按此藥功效不可枚舉一二僕初劑數姑此藥內序權叔  
均掌上有風腫數年服之立消康興海伯琮脇下暴腫一夕  
如盃雞鳴磨服洞下四五度未朝而愈有孫萬戶者年幾八  
十率中風語澁心癡服此即差尹永川壽泉妾得腹癢諸醫  
束手試服之立愈族人南羨終遍身湯灼縣吏金堅兒子火  
燒指臂并幾死依方磨搽有頃黃水流愈老吏全春中風  
口噤全身不遂三年試服之雖未永愈語音乃通引散為歌  
起而行步記官金戒章發背腫大如鉢邊厚而色黑乃服兩  
粒立消族人權寅妻路上卒中惡而絕服此更生其餘患疔  
癩瘡腫癢瘡得我而全者甚多信乎在家出入不可無此藥  
也茲不可不傳乃書顛末並圖山茨菰八梓流布云弘治丁



巳端陽節慵齋李宗準仲鈞識



