



813
卷 八

廣益本草大成卷之五

岡氏
杏庭

浴下

法橋

九折堂山田
氏圖書院

東白宮林院藏
抱子

黃連



苦寒。○清熱。治諸瘡諸痛諸血症目疾。消渴泄痢瘡滿。小兒疳蟲及胎毒。除濕熱。△此草根連。黃色ナリ。故黃連。下

各々清熱黃連ハ手少陰心經ニ入テ火熱ヲ瀉スルニ至ル。蓋心與牌子母其氣ヲ通ス。且黃連ノ黃色ナルヲ以テハ脾胃土ニ不可不行此藥心脾ノ熱ヲ涼ニ宜シ。故ニ腹痛消渴瀉痢ヲ治者ハ脾胃ノ熱ヨリ致ヲ云。治諸瘡。至真要大論ニ諸瘡ノ心火ニ屬スルコトヲ云。黃連能心火ヲ涼カ故ニ諸瘡腫ノ初メ實熱ニ屬者用之其既潰爛ノ處者ハ妄ニ勿用。尤上焦ノ腫瘡口瘡

岡氏
杏庭

ヲ治スルニ宜シ。蓋コ瘡等ハ心火ニ属スルヲ以ナリ。或婦人陰中
腫痛ヲ治スルノ義アリ。雖此モ亦直ニ下熱ノ致ニ非ズ。心部ノ
首火小腸ニ及テ然カ故ナリ。諸痛至真要大論病機。諸痛ノ
心火ニ属スルコトヲ云。故ニ或心腹痛。或諸瘡腫痛。皆心脾ノ實熱
一属者用之。諸血症。心生血。肝藏血。脾總血。血得熱妄行ス。故ニ
心脾肝ノ火熱ニ因テ血液妄行ノ或上竅。或下竅ニ血ヲ出者用
之。清熱則血自止。此モ亦實熱ニ因者ヲ治ス。或問黃連心脾ノ熱
ヲ涼者ハ辨前ニ明ナリ。何此ガ肝熱ヲ涼ニ至ヤ。曰肝ハ木トス。心
火ノ母タリ。亦母子其氣ヲ通ス。蓋心ハ南方離火ノ本藏タリ。凡
虛火ノ生スルマ其部各不同。虛空ニ生スルカ故ナリ。實火ノ諸症モ
亦其部各雖不同。心火ヲ主トセスト云コトナシ。是以實火ノ諸症
ハ佐使ノ劑ニ合同ノ皆黃連ヲ通用ス。獨心火ノ熱症ニハ不可

正目疾 眼目赤腫痛淚出暴發者ハ火熱ニ属ス。黃連ニ宜シ。凡本
草家ニ黃連ヲ以テ目疾ヲ治スル聖藥トス。蓋眼病多ハ實熱タ
ルカ故ナリ。然凡亦虛熱虛寒症アリテ各連等ノ苦寒ニ不宜者
アリ。一藥ニハ不可治。消渴 三焦ノ火熱ニ属スレバナリ。世痢世瀉
痢疾ノ初腸胃ノ實熱滯熱ニ属者用之。痢病多ハ濕熱ノ實滯ニ属
ス。且血痢ト不食禁口痢トハ加腸胃ノ熱滯ニ因コト多シ。故ニ劉河
間曰。治痢以黃連為君。然凡虛ヲ主トノ瀉痢スル者アリ。一藥ニ
通用スヘカラス。痞滿 心脾ノ積實熱結ニ因テ心下痞滿ノ惡心嘔
吐者用之。小兒疳蟲成無已曰。得甘則動。得苦則安。黃連ノ苦
ノ濕熱ヲ除ガ故ニ疳蟲ヲ療ス。胎毒 胎中ノ熱毒ヲ云。因此丹瘡
癩疹等ヲ發者用之。除濕熱 黃連ハ獨火熱ヲ瀉スルニナラズ。若ハ
勝濕寒ハ制熱除濕熱瀉痢腹痛ノ治方ニ用之者多ハコノ義ナリ

總條

黃連ハ心脾ノ實熱ヲ涼。心火ヲ瀉スルノ要劑タリ。且能中焦濕熱ノ實滯ヲ除ク。大抵一切實熱者ハ佐使ノ

藥ニ從テ皆

使藥

黃芩。龍骨。理石ヲ使テス。龍膽草ト合テ肝膽實火ヲ涼シ。甘草ト合テ胎毒ヲ除。當故

此ヲ合用ス

素考ト合テ熱眼ヲ療ス。枳實ト合テ痞滿不食ヲ治ス。廣木香ト合

ノ腹痛下痢ヲ治ス。吳茱萸ヲ佐テノ吞酸吐水ヲ治ス。蘆薈。白蕪荑。

毒

心元不足者。○脾胃怯弱者。○腎元虛冷者。○元氣不足ノ虛熱アル者

白槿花。白芙蓉花ト合テ

畏惡

菊花。玄參。白鮮皮。芫花。白殭蠶ヲ惡。疑々花。牛膝ヲ畏。烏頭ニ勝。巴

豆ノ毒

附方

痔瘡如雞冠。黃連末加赤小豆末傳出斗門方。痢或痔ニテ脫肛者。黃連末ヲ冷水ニ調塗。出經

驗良方

治目中百疾。乳汁ニ黃連ヲ浸テ此ヲ内外皆ニ點ス。目中

卒ニ痒痛者。左佳出。外臺秘要。口舌瘡。黃連煎酒。冷呷。出肘後方。

小兒鼻下赤爛者。先米泔ヲ洗。次ニ黃連末ヲ塗。出子母秘錄。小兒

初生。黃連煎汁。匕ヲ灌。則終身胎毒ノ患ヲ免。出湯液本草。巴豆

毒ニテ瀉不止者。黃連。乾姜。等分。

愚案

黃連ハ實火ヲ瀉スルノ要藥トス。其苦寒ナル

ヲ以テ也。夫四時ノ令マ。春夏暖陽ヲ得テハ万物生榮シ。秋冬冷

寒ヲ得テハ万物殺傷ス。人身ノ腹内モ亦常ニ春暖生發ノ氣ニ存

則何ノ病カアラシ。故ニ苦寒。冷沈ノ劑ハ喜所ニ非テ。雖實熱ノ當瀉

者アルニ於ハ不得也。用之。ニ是以若其黃連等ノ苦寒ヲ用ハ。明ニ實

熱タルコトヲ決メ。施之藥ノ效アラバ速ニ止テ。過用久服スルコト勿レ。且

反佐因用ヲ主トセヨ。古人寒劑ヲ用ニ熱藥ヲ加。熱劑ヲ用ニ寒藥ヲ

加此ヲ反佐トス。又熱劑ヲ服スルニ寒ノ飲シム寒劑ヲ服スルニ熱ノ吸シム此ヲ兩用「ス。如此則偏寒偏熱ノ害ナク。病邪與藥氣相拒爭コトナシ。今庸醫知之者アルコト希ナリ。或間反佐因用ヲ知凡苦寒反テ熱火ヲ生スルノ義ニ昧シ。夫黃連等ノ苦寒ヲ以テ實熱ヲ瀉者ハ水消火ノ義世人所知ナリ。若其元氣不足ニ因テ陰火生者ハ此龍雷ノ相火タリ。若寒ヲ以テ飲消則炎熱ナラ盛ニ灼惟補陽ノ溫藥ヲ以スレバ陰火自退此義ヲ不知者妄ニ黃連等ノ寒劑ヲ投ソ日ニ攻月ニ擊則元氣加虛陰火彌生ノ熱入此寒藥反テ生火ノ義ニ非マ。宗奭曰慎勿輕用「時珍曰中病則即當止豈可久服使庸殺之令常行而伐其生發中和氣乎「李士材曰惟不得已而後敢用「慎恐テ過用スヘカニサルコト明セ

修治

二八月ニ根ヲ採洗淨シ。蘆頭ヲ去。慢火ニテ炒。毛ノ焦ニ至テ太布

ニ包。揉磨テ毛ヲ去。ナラ。鑽ニテ毛ノ殘者ヲ篩去。再毛ノ香程炒用ユ。心火ヲ瀉スルニハ生。肝膽ノ實火ヲ瀉スルニハ猪膽汁ニ浸炒。肝膽ノ虛火ヲ瀉スルニハ醋ニ浸炒。總テ上焦ノ火ヲ瀉スルニハ酒ニ浸炒。中焦ノ火ヲ瀉スルニハ姜汁ニ浸炒。下焦ノ火ヲ瀉スルニハ塩水ニ浸炒。氣分ノ濕熱伏火ヲ瀉スルニハ茱萸湯ニ浸炒。血分塊中ノ伏火ヲ瀉スルニハ乾漆水ニ浸炒。食積ノ火ヲ瀉スルニハ黃土ヲ雜炒。眼目ノ劑中ニハ生ヲ用ユ。或人乳ニ浸蒸。○和黃連ハ加賀州ヨリ出者上品ナリ。他ハ皆細長多毛。内空ニ黃色薄シ。不堪用。

胡黃連



苦大寒。○瀉心火及肝膽實火。治陰分伏熱。一切濕熱。療骨蒸。方熱。消。目疾。傷寒。勞復。黃疸。痔瘡。溫瘧。泄痢。小兒驚

癩不下。食滯積。婦人胎蒸。去。菓子積。△此草。胡地ニ生。功用黃連ニ

似タリ。故ニ名テ胡黃連トス。瀉心火及肝膽實火。黃連ノ功用ト
 大槩同ニ似テ異アリ。胡黃連ハ大苦大寒ニ瀉心火ノ性。黃連ヨリ
 甚且黃連ハ瀉心火除。脾熱。胡黃連ハ心肝膽ノ火熱ヲ瀉ス。黃連
 ハ氣分ノ熱火ヲ涼ニ宜シ。胡黃連ハ陰分ノ熱火ヲ涼ニ宜シ。胡
 黃連ハ大苦大寒。實火ノ者ニ非バ勿用。治陰分伏熱一切濕熱。陰分
 ニ伏スル實熱。及一切濕熱ノ實積ヲ治ス。此皆其實ニ非バ用テ勿レ
 療骨蒸勞熱。陰分ノ伏熱ヲ去カ故ニ骨蒸熱。及五心煩熱等ノ勞
 熱ヲ除ク。然レ精液甚虚竭シ。中焦氣血虚弱者ハ骨蒸勞熱スト
 雖勿用之。消渴。實火ニ屬者ヲ治ス。目疾。眼ハ肝膽ノ所主。故ニ用
 之。肝膽ノ熱火ヲ瀉メ目疾ヲ療ス。此モ亦實熱ノ眼病ニ非バ勿用。
 傷寒ノ復。傷寒愈テ後。不養生ニ從テ餘熱復裏ニ鬱結ノ病再
 發者ヲ治ス。此モ亦胡黃連ハ能陰分ノ伏火ヲ去カ故ナリ。然レ肝

實ヲ詳ニシテ施之。輕用コト勿レ。黃疸。胡黃連ハ能濕熱ヲ除カ故也。
 濕熱ノ實鬱ニ屬ノ胃氣不虛者。用之。痔瘡。濕熱ヲ瀉スルカ故也。
 濕癰。寒少熱多。或單ニ熱ノ寒セサルノ癰ヲ治ス。凡癰疾ハ伏熱ニ
 生ス。故ニ雖用之。安ニ施コト勿レ。實熱ノ結伏ニ非バ勿用。泄痢。泄瀉
 痢疾。症濕熱ノ鬱實ニ屬者ヲ治ス。小兒驚癇。不下食。疳積。苦ハ蟲
 ヲ殺シ。寒ハ熱ヲ清ス。故ニ驚風ノ熱症。及疳熱ヲ治ス。驚癇者。不
 下食ハ胃口ノ熱實ニ因ハナリ。苦ハ疎テ推者也。故ニ疳病積熱ア
 ルヲ療ス。婦人胎蒸。婦人懷胎ノ中ニ勞熱ノ如クニ骨中ヨリ蒸熱
 スルヲ云。胡黃連能陰分ノ伏熱ヲ治スルカ故ナリ。去菓子積。菓子實
 ノ宿積ヲ去也。苦ハ能消推スルカ故ナリ。然レ久用テ胃氣ヲ傷ル
 コト勿レ。大苦大寒ハ
總槩
 陰分ニ伏スル實火ヲ瀉シ。濕熱ノ結
 滯ヲ除。小兒ノ疳疾驚風ノ積熱ヲ

去善蟲ヲ逐故
小兒寒多用之

毒

氣血虛弱者○胃氣不健者○一切冷寒ニ
傷者皆勿用○味苦ハ胃氣ヲ損易ク性太

寒者ハ陽氣ヲ伐易シ

故ニ過用スルコト勿レ

畏惡

菊花玄參白鮮皮ヲ惡猪肉ヲ忌
誤テ合用則漏精巴豆ノ毒ヲ解

スルニ

宜シ

附方

小兒赤目胡黃連末ヲ茶ニテ調
手足心ニ塗ハ即愈出濟急仙方

愚案

胡黃連
ハ黃連

ニ似テ其苦寒甚者也實熱

ニノ胃氣健者ニ非ハ勿用之

修治

剉テ生ヲ用ユ○今人當藥
草ヲ以胡黃連トス甚非也

其形質本草ノ説ニ不恰惟甚苦ノミ勿用唐ヨリ來者ヲ用ベシ

黃

本綱

芩

原加條



苦寒○治肺熱下氣去煩療泄痢熱瘡
赤目喉腥失血熱渴淋閉黃疸骨蒸寒
熱往來女子血閉安胎小兒腹痛火欬

肺疼秘結壅氣痰熱風熱濕熱皮膚痒痛痞滿上逆喘息○芩ハ説

文作蒼此草根黃色ニシ如金故ニ黃次ト名ク治肺熱黃芩ノ主能

千變万赫ト雖此力本根トスル所ノ者ハ手太陰ニ入テ肺熱ヲ涼ニ

在ノミ下氣肺ハ膈トニ在テ諸上氣ハ此カ總主所タリ故ニ熱氣肺

中ニ逆トシテ下者ハ用之黃芩ノ寒ヲ以テ清熱苦ヲ以テ氣ヲ下シ

其逆氣ヲ除去煩肺熱ニ因テ胸中煩悶スルニ宜シ療泄痢泄瀉痢

病症或風熱或濕熱一切屬熱ノ泄痢ニ皆用之蓋泄痢ハ下焦ノ

病タリ黃芩ハ上焦肺ノ藥トス何ゾ此カ泄痢ヲ治スルマ夫肺

與大腸表裏タリ源清則流從テ自清シ故ニ黃芩ヲ以テ肺熱ヲ

清則大腸從テ清シ泄痢ヲ治スルノ義明ナラスマ熱瘡丁瘡乳

癰發背疽等ノ熱ニ屬スル諸瘡ニ用ニ赤目肺熱上衝ニ因テ目

中腫赤痛者ヲ治ス喉腥腥ハ金肺ニ屬ス故ニ喉氣臭ノ腥ハ肺

熱ニ屬ス。黃芩ノ所主ナリ。失血ハ得寒止リ。得熱妄行ス。且血ハ從氣肺ハ主氣故ニ肺熱則氣熱シ。血熱シ。氣血亂テ或血或六小便血ヲ致ス。黃芩其熱ヲ清則血自止。熱渴肺熱ニ因テ渴者用之。凡熱渴症。虛實ノ兩辨ヲ存ス。渴ノ冷飲ヲ惡。頻ニ熱飲ヲ欲シ。然多不飲者ハ虛熱ノ渴也。切ニ黃芩等ノ苦寒降沈ノ劑ヲ不宜用。甘温補陽ノ劑ヲ用ヨ。渴ノ涼飲ヲ欲シ。然善多飲者ハ實熱ノ渴也。芩連等ノ寒劑ニシテ熱ヲ清ス。左寸ノ脈實大者ハ黃連右寸ノ脈實大者ハ黃芩ヲ主トセヨ。淋閉肺熱ニ因テ小便淋瀝閉塞者用之。蓋肺ハ金トシテ氣ヲ主ル。金ハ水ノ母。氣水ハ合ムタリ。故ニ肺熱則氣上ニ逆シ。水津順下スルコト不能ノ小便下ニ淋閉ス。黃芩清肺熱下逆氣則水自通利ス。本經黃芩逐水。甄權治五淋トハ皆是也。直ニ小便ヲ通利スルニハ非ズ。清肺熱下逆氣ヨリシテ此説アリ。

黃疸熱ヲ主トスル者用之。骨蒸此症兩辨アリ。陰火ノ伏熱ニ因テ氣分ノ伏熱ニ因トナリ。黃芩所主ノ骨蒸ハ氣分ニ伏スル結實ノ熱ニ因テ然者ヲ治ス。寒熱往來惡寒發熱ノ往來者ハ熱邪表裏陰陽ノ際氣分ニ爵ノ急ナルガ故ナリ。黃芩ノ寒其氣熱ヲ清シ。味苦ヲ以テ爵急ヲ疎利ス。小柴胡湯ニ黃芩アル者是也。凡熱微則氣緩故ニ汗出。熱甚則氣急故ニ汗ナシ。是以苦寒者ニ非ハ不能清熱何如トナレハ。惟其寒性ヲ以テ雖欲清熱熱甚ニ至テハ彼氣ノ急ヲ疎利セズンバ熱自清コト不能故ニ寒勝熱苦疎急其功盛ナリ。諸寒熱往來ハ半表半裏少陽ノ病トスト雖愚案ズルニ此症以蔵云則肺ニ屬シテ氣分ノ急ナルニ始者乎。譬ハ平人ト雖犯寒氣道憎ト急ナル時ハ惡寒ノ發熱ス。或恐驚ノ氣道憎ト急ナル時モ亦必惡寒ノ發熱ス。寒熱往來ハ氣道ノ急結疎條

セザルカ故ナリ。詳義此柴胡ノ條ト參考スヘシ。惟天地人身ノ道ハ緩急ノ兩道ニ在リ。天地ノ陰陽五行。人身ノ虛實補瀉。盡緩急ノ二端ニ止者ナリ。女子血閉氣熱。肺分ニ鬱シ。上逆ノ順下セザルカ故ニ。經水不調者。用之。婦人ハ性執。ノ氣鬱ス。氣鬱則熱。ノ肺ニ積。肺熱シ。氣鬱則上逆ノ不下。氣不下則經水順流スルコト不能ナリ。故經閉ノ症。其因多端タリト雖。氣熱上逆ノ症。黃芩ニ宜者。尤多シ。

安胎 胎中ハ清熱養血ヲ以テ法トス。故ニ補血ノ劑中ニ黃芩ヲ合同ス。然レ胎育ノ道。專胃氣ノ培養ニ從。苦寒者ハ胃氣ヲ損傷シ。明ニ氣熱ノ候アルニ非ハ妄ニ用コト勿シ。小兒腹痛。肺金與脾土母子ニシテ其氣相通ス。故ニ氣熱肺ニ鬱ノ此ヲ中焦ニ及則腹絞痛ス。黃芩主之。其症必渴。冷飲ヲ欲シ。小便赤澀。大便秘結シ。右寸脈實數ナリ。此症小兒胎熱肺ニ鬱者ニ多シ。故ニ別録ニ小兒

腹痛ト云。大人ニテウシ獨小兒ニシテ此病アルニハ非ズ。夫腹痛者多ハ宜温順。不欲寒冷。然レ亦熱厥肺熱ノ腹痛ナキニ非ズ。彼味苦ハ仲景少陽證。腹中痛者。去黃芩等ノ法ヲ見テ。絶ノ苦寒ヲ不可用トス。惟其因。其脈其證ニ從テ。或寒或温以勝者。制之。楊士瀛云。若熱厥腹痛。肺熱而小便不利者。黃芩其可不用乎。故善觀書者。先求之理。毋徒泥其文下。此彼仲景腹痛去黃芩。小便不利去黃芩ノ一法ニノニ執滯者ヲ辨セリ。

火欬 肺分ノ火熱上逆ニ因テ欬嗽喘急者。主之。若非熱症勿用。肺疼。肺熱ニ因テ胸中疼痛者。主之。其夜。肩背引テ且胸ノ左右乳上ノ痛。尤急ナリ。

秘結 大便秘結者ハ肺熱ヲ大腸ニ移テ然リ。故ニ黃芩ト主之。蓋黃芩ニ實空ノ兩種アリ。黃芩堅實者ヲ實腸。凡條芩。凡號。大腸ノ熱ヲ瀉スルニ宜シ。秘結泄痢ノ症用之。黃芩中枯ニ空飄者。空腸凡片芩。凡號。上焦肺熱ヲ瀉スルニ宜シ。詳

義ハ修治ノ條ニ見タリ。壅氣肺ハ氣ヲ主ル。氣ハ陽トス。氣壅則熱
 シ。熱鬱肺。黃芩肺ニ入テ苦ハ疎氣寒ハ清熱スルカ故ニ壅氣ヲ利
 スルノ功アリ。右胸氣ヲ利スルニ宜シ。然レ其症熱ニ非ハ勿用。一藥
 ニ利氣トノニ覺ヘカラス。痰熱風熱濕熱凡除熱ノ藥氣一同ナラス。
 或發汗ノ除熱者アリ。或通下ノ除熱者アリ。或行レ或潤ノ熱ヲ除
 者アリ。黃芩ハ非出汗非下非行潤惟氣熱ヲ清涼スルノ劑タリ。夫
 肺ハ金トス火ノ爲ニ乗セラレ易シ故ニ諸火熱邪。肺分ニ從スト云フ
 ナレ。黃芩能肺熱ヲ清則諸熱ヲ通治スヘキコト明也。然レ熱只其
 本藏ニ有テ肺ニ乗セラサル者アリ。詳ニ用之。大藥痰ハ氣ニ
 從風熱ハ皮毛ニ始ル。肺ハ主氣及皮毛カ故ニ。痰熱風熱邪ナガ
 ハ九八肺ニ在。且苦ハ濕ニ勝寒ハ制熱。黃芩ノ苦寒ナルハ濕熱ヲ治
 スルニ至ル。此モ亦濕熱氣分ニ有ニ非ハ勿用。皮膚痒痛皮膚ハ

肺ノ合タリ。故ニ肺分ノ風熱痰熱等ニシ然者主之。痞滿肺熱
 アリテ痞滿者。黃芩ノ苦寒ヲ以テ肺熱ヲ清シ。胸氣ヲ利シテ愈
 上逆氣上逆ノ胸中煩熱者主之。喘息喘息症多ハ肺分ノ風
 熱痰熱氣熱ニ屬ス。故ニ黃芩ヲ用ユ。然レ元氣
 不足ノ虛熱ニ逆セララル者アリ。詳ニ用之。總槩 肺熱ヲ瀉
 ノ熱ヲ除キ。上焦及皮膚ノ風熱ヲ去。使藥 山茱萸龍骨ヲ使
 胸中ノ痰熱ヲ退。氣熱ヲ利スル要藥也。トス。厚朴。黃連ヲ
 得テハ屬熱腹痛ヲ治ス。桑白皮ヲ得テ能肺火ヲ瀉ス。白朮ヲ得
 テ安胎。芍藥ヲ得テ下痢ヲ治ス。柴胡ヲ得テ寒熱往來ヲ治ス。五
 味子。牡蠣ヲ得テ子アラシム。黃耆。白飲。赤小豆ヲ得テ癰癧瘰癧ヲ
 治。肺虛者。○脾胃怯弱者。○肌寒者。○肺中ニ寒氣アル者皆勿用之。畏惡 葱實ヲ惡。丹
 砂。牡丹。藜蘆

毒

○肺中ニ寒氣アル者皆勿用之

畏惡

葱實ヲ惡。丹砂。牡丹。藜蘆

長

附方

灸瘡血出 不止手足冷テ絶セントスル者酒炒黃芩二錢爲末酒ヲ以テ服ス。出怪證奇方 產後飲水不止

者黃芩。麥門冬等分小煎ソ温服ス。出家藏方 黃芩湯 肌熱ノ如瘰癧煩燥引飲痰嗽晝重ハ氣分ノ肺熱也。片苓二兩水二鍾煎一鍾服。

東垣方 眉睭痛 風熱痰也。黃芩酒浸白芷等分爲末。每服二錢茶ニテ下ス。潔古方

愚案

李真曰黃芩養陰羅天益

云補氣。此兩説ヲ見テ直ニ補陰補氣ノ劑ト不可覺。養陰トハ火熱ヲ瀉スルガ故ニ云。補氣トハ火與元氣兩ナガラ不立熱ハ氣ヲ傷ガ故ニ其熱ヲ瀉則氣ノ傷ヲ免故ニ補氣ト云ノミ。時珍ハ謂黃芩ハ手少陰足少陽本經ノ藥トス。愚案ニ仲景少陽證下後心下滿テ不痛者ヲ治スル瀉心湯ニ黃芩アリ。成無己云黃芩苦而入心ト云カ故ニ黃芩ヲ以テ手少陰ノ藥トス。其少陽ノ本藥トスル者ハ小

柴胡湯ニ黃芩アルヲ以テナリ。此義皆不可トス。黃芩ハ手少陰手陽明ノ本藥ニシテ手少陰足少陽ノ本藥ニハ非ズ。學者決ノ勿惑。或問元素謂瘰癧上部積血トハ何如。曰凡一切積瘰則熱ス。熱則加積瘰入。黃芩ハ直ニ逐瘀血者ニ非ト雖其苦ヤ氣血ノ留積ヲ破ルベシ。其性寒ヤ積瘰ノ熱ヲ瀉スベシ。太依積血ノ下焦ニ在者ハ血ヨリ始ル上焦ニ在者ハ氣滯氣熱ヨリ始テ積血トナル。黃芩利氣清氣熱且上焦ノ藥タリ。故ニ上焦積血ヲ瘰スト云。學者深上焦ノ兩字ニ眼則此ガ積血ヲ除ノ意。修治 黃色深者ヲ擇テ外衣ヲ削リ。内ノ腐ヲ去剉用ユ。一偏ニ瀉熱トノミ欲セハ生ヲ用ユ。又酒ニ浸炒則上行ノ且苦寒ノ氣味ヲ緩ス。上焦ノ濕熱ヲ瀉スルニモ亦酒ニ洗炒用ユ。○黃芩ノ腐爛ノ中枯輕飄者ヲ枯苓片。空腸片。片苓片。宿苓片号。上行ノ肺火ヲ瀉シ胸氣ヲ利シ。

痰熱ヲ消。風熱ヲ除。肌膚ノ熱ヲ去。ニ用之。細實ノ中枯サル者ヲ
 條芩トシ。實腸ト号。大腸ノ火ヲ瀉シ下部ノ濕熱ヲ除。下痢秘結ニ用
 之。圓ノ實者ヲ子芩ト号。治功條芩ト同シ。片芩ハ旧根條芩ハ新根
 也。或其上。下ヲ分テ黃芩ノ上半身ハ上部ニ用ヒ。下半身ハ下部ニ
 用ユ。各其方ニ從ヘシ。○案ニ藥店ニ朝鮮黃芩アリ。色淺苦味サシ
 不堪用。或誤テ南天竹撒沙爺起草ノ根ヲ掘テ黃芩ニ偽者アリ。
 絶ソ不可用。宜擇之。

柴胡



煩熱嘔吐筋掣熱痰血凝氣聚食積濕痺婦人經水不調熱入血室
 小兒疳熱宜氣血去肌熱△柴本作此音柴此草山中三生嫩則可

苦微寒○治寒熱往來陽氣下陷傷寒
 瘧疾口苦耳聾鳴脇胸痛目赤眩運頭
 角痛肩背痛潮熱心腹結熱心下痞滿

茹老則采テ柴トス。故ニ根ヲ呼テ柴胡トス。治寒熱往來柴胡ハ

足厥陰肝。足少陽膽經ノ藥トス。少陽經ハ陰陽表裏ノ際トス。是
 以諸寒熱往來ヲ病者ハ皆少陽經ニ屬ス。且寒熱往來ノ本マ少
 陽ノ熱ニ因。熱其半表半裏ノ間ニ斷ノ氣道急則惡寒發熱ノ往
 來ヲ致ス。惟寒熱往來ハ少陽ノ熱ニ因テ陰陽ノ氣急ナレバナリ。
 柴胡ハ少陽經ニ入テ清熱且氣薄味苦ヲ以テ其氣ノ急ヲノ緩
 ナラシム。故ニ寒熱往來ヲ主治ス。蓋熱邪陽經ニ斷則惡寒シ陰經
 ニ斷則發熱ス。少陽ハ陽明與太陰ノ間ニ居ス。故ニ熱邪少陽經ニ
 在則或陽ニ出。或陰ニ入テ寒熱往來ヲ致ス。好古曰前行則惡熱
 却退則惡寒トハ是也。人身十二經ノ中手少陽足少陽アリト雖
 手少陽ハ膈臂ニ流。足少陽ハ上下ニ通行ノ法脇ヲ行。脇ハ腹背
 ノ際トス。背ハ陽經ノ行。腹ハ陰經ノ行タリ。故ニ熱邪足少陽經ニ

在テ引則或腹部或背部ニ往來ノ。腹背陰陽ノ經氣ヲ急引セシムルヲ以テ。思寒發熱ノ往來ヲ致ス。是以寒熱往來ハ獨足少陽經ニ屬シ此ガ本藥タル柴胡ノ主治スル所トス。仲景小柴胡湯モ亦此意ナリ。陽氣下陷足厥陰肝。足少陽膽ハ。膈下ニ在テ東方少陽木發生升騰ノ清陽タリ。四時ニ在テハ春陽生物ノ氣トス。故ニ人身ノ腹内ヲソ春陽發生ノ氣令ヲ得セシムル者ハ肝膽少陽ノ木氣ニ在。此氣ヤ順升其宜ヲ得則濁陰下降ノ陰陽交通シ胃氣中宮ニ生發シ。常衛周軀ニ生榮ス。是以東垣常ニ此清陽順升ヲ主トシ。胃氣ヲ補ノ最要トス。柴胡ハ足少陽ニ入テ彼清陽ノ下陷シ上行不能者ヲ順升セシムルコトヲ得タリ。東垣曰能引清氣而行陽道又白能引胃氣上行升騰而行春令ト。章宜曰肝為春令主升陽故陽氣下陷者不可缺トハ是ヲ謂ナリ。或問本草謂升

麻引陽明清氣上行。柴胡引少陽清氣上行ト。升麻ハ本經ニ平微寒ト。元素曰性温ト。柴胡ハ本經ニ平。別錄ニ微寒トスルノニ。遂ニ温トスルノ説ナシ。夫性温者ハ實ニ上行スベシ。寒性者ハ當下行。柴胡何ゾ引清氣上行ノ功アルニ至マ。曰本草匯曰按柴胡稟仲春微寒之氣春氣升而生ト。此實ニ章宜カ明達ニ出テ古人ノ未辨ノ義ヲ發セリ。夫仲春ノ月ハ時陽タリ。故ニ温氣微アリト雖。曰冬ノ殘陰存ノ其令ハ微寒ナリ。然凡春陽生發ノ氣ハ順升ノ地上ニ行草木萌芽ス。此其令ハ微寒ナリト雖。其氣ハ順升生發ノ氣ヲ存メ。下焦清陽氣ヲ引テ上行セシムルニ至ル。然凡柴胡獨用テ此功ヲ成コト不能。仲春ノ月微寒タリト雖。温陽化ヲ兼。非ハ升發ノ政ヲ致コト難シ。故ニ參朮木耳等ノ補氣温陽ノ劑ト令入スル時ハ能清陽ヲ上行セシムルノ功ヲ明ニス。東垣補中湯ノ

方意是ナリ **傷寒** 傷寒陽症ノ邪熱ガ陽經ニ入テ。半表半裏者用之。仲景小柴胡湯一用之和解者是也。若或傷寒熱邪太陽經ニ在者誤テ柴胡ヲ服スレバ熱邪ヲノ反テガ陽ニ入レム。若或熱邪既ニ陰經ニ入者誤テ用之重テ表ヲ傷ル。彼庸工未知之。傷寒ノ熱邪表裏ノ辨シ難者ヲ見テハ必柴胡ヲ用テ治之害ヲ致者間存セリ。章宜曰世俗不知柴胡之用每遇傷寒傳經未明為不汗不吐不下可以截拙輒混用之不死何待 **瘧疾** 瘧ハ此熱病經足厥陰ガ陽ニ属ノ寒熱往來ス。故ニ諸瘧症皆用之。 **口苦** 膽熱ニ因テ膽汁ヲ吐ガ故ナリ。柴胡ハ肝膽ノ熱ヲ除バナリ。又心熱ニシテ口苦者アリ。脈ニ從テ辨之 **耳聾鳴** 足ガ陽膽經ハ耳後ヲ行耳ヲ貫テ耳前ニ行故ニ膽熱ニ因テ耳聾耳鳴者ニ用之。或陽氣下陷レ濁陰上ニ壅テ然者亦用之。清氣ヲ上達スレバ濁陰下行ノ愈 **脇胸痛** 脇ハ肝

膽部タリ故ニ脇痛症ハ足厥陰ガ陽兩經ノ結熱ニ属ス。柴胡主之。无脇痛者尤宜シ。或脇ヲ主トノ胸痛ニ引者亦用之。或清陽上行セス濁陰上ニ埋テ胸痛者亦用之。 **目赤眩運** 眼ハ肝ノ竅トス。柴胡ハ足厥陰ノ刺タリ。故ニ諸眼病用之。眼赤腫痛テ肝膽ノ風熱ニ属者尤宜之。或陽氣下陷ノ虛眼障翳者亦補氣耳温ノ刺ト合用スレ **頭角痛** 足ガ陽經ハ頭角ヲ行故ニ足陽經ノ熱ニ因テ頭角痛者用之。 **肩背痛** 足ガ陽經ハ肩ヲ行背ノ胛骨ニ流故ニ足陽經ノ熱ニ因テ肩背痛者用之。 **潮熱** 時ヲ定テ來熱ヲ潮熱ト云。日中ハ總テ陽虛ノ潮熱。日中後ハ總テ陰虛ノ潮熱トス。柴胡ハ下陷ノ陽氣ヲ升提スルガ故ニ陽虛ノ潮熱ヲモ主治ス。柴胡ハ足厥陰ノ藥タリ。足厥陰肝ハ藏血者ナリ。故ニ陰虛ノ潮熱ニモ亦用之。元素謂治早辰潮熱トハ陽虛ノ熱ヲ云。章宜謂治日晡潮熱往來トハ陰

虛ノ熱ヲ云也。葶藶胡ハ除熱劑タリ。東垣曰諸有熱者宜加之。故
 二傷寒半表半裏ノ熱寒熱往來ノ熱瘧疾ノ熱ヲ除凡使藥ニ
 從テ表裏中外氣血陰陽ノ熱ヲ治ス。心腹結熱肝膽ノ火ニ因テ心
 腹ノ間ニ熱ヲ結者用之。心下痞滿清陽氣上行セザルガ故ニ濁陰不
 下ノ心下痞者又肝膽ノ熱火ニ因テ痞者皆用之。煩熱虛實俱
 二用之。嘔吐肝火乘胃嘔者又清氣不上濁陰不下吐者俱用之。無
 熱者ハ斟酌スヘシ。筋亦筋ハ肝膽ノ合タリ。故ニ肝膽ノ熱ニヨツ
 テ筋挛多者用之。熱痰肝膽ノ熱ニ生スル痰滯ヲ治ス其症多ハ
 胸脇ニ塞テ病ヲ致ス。血凝肝熱ニ因テ血分凝滯者用之。若因寒
 血凝者勿用。氣聚肝ハ血ヲ納ト雖肝膽俱ニ屬木發生角益ノ陽
 氣ヲ致ス。故ニ肝熱則血凝氣聚柴胡ハ肝膽ノ鬱ヲ順行セシムル
 者ナリ。是以氣分ノ積聚ヲ治スルニ至ル。然此惟熱ノ有無ヲ察シ
 無熱者ハ斟酌スヘシ。李杲曰用柴胡以散諸經血結氣聚功與連
 翹同也。故ニ瘧家有熱者亦用之。食積神麴麥芽等ノ如ク此
 ガ直ニ食飲ノ積滯ヲ消化スルニハ非ス。然柴胡ハ清氣ヲ引テ上
 行セシムル者ナリ。清陽一度升則胃氣生發シ中焦健ニ行テ食積
 消散スヘシ。然則尤カチニ過飽ノ食積ニハ非ス。清氣下陷シ胃氣生發
 セザルガ故ニ中焦ノ行不健ノ食積下成者神中行中藥ニ合用ノ治之
 章宜曰陽升則清氣上升脾胃健行食積消散。濕痺濕熱ヲ除
 經ヲ行カ故ナリ。滙曰柴胡爲風藥風能勝濕也。又曰氣薄能行經也
 婦人經水不調肝ハ納血藏タリ。柴胡ハ肝經ニ入テ氣血ヲ順シ肝熱
 ヲ除カ故ナリ。熱入血室血室ハ血海也。婦人經水行時ニ或傷寒熱邪
 ヲ病或諸熱症ヲ患テ熱其血海ニ入テ苦者柴胡ヲ用テ其熱ヲ除
 ニ宜シ。小兒疳熱小兒ノ疳熱多ハ肝膽ノ兩經ニ屬スレバ也。宣氣血

無熱者ハ斟酌スヘシ。李杲曰用柴胡以散諸經血結氣聚功與連
 翹同也。故ニ瘧家有熱者亦用之。食積神麴麥芽等ノ如ク此
 ガ直ニ食飲ノ積滯ヲ消化スルニハ非ス。然柴胡ハ清氣ヲ引テ上
 行セシムル者ナリ。清陽一度升則胃氣生發シ中焦健ニ行テ食積
 消散スヘシ。然則尤カチニ過飽ノ食積ニハ非ス。清氣下陷シ胃氣生發
 セザルガ故ニ中焦ノ行不健ノ食積下成者神中行中藥ニ合用ノ治之
 章宜曰陽升則清氣上升脾胃健行食積消散。濕痺濕熱ヲ除
 經ヲ行カ故ナリ。滙曰柴胡爲風藥風能勝濕也。又曰氣薄能行經也
 婦人經水不調肝ハ納血藏タリ。柴胡ハ肝經ニ入テ氣血ヲ順シ肝熱
 ヲ除カ故ナリ。熱入血室血室ハ血海也。婦人經水行時ニ或傷寒熱邪
 ヲ病或諸熱症ヲ患テ熱其血海ニ入テ苦者柴胡ヲ用テ其熱ヲ除
 ニ宜シ。小兒疳熱小兒ノ疳熱多ハ肝膽ノ兩經ニ屬スレバ也。宣氣血

若ハ氣血ヲ疎條シ。微寒ハ氣血ノ執ヲ清シ此ガ清氣ヲ引上スルノ
氣ヲ兼テ氣血ノ結聚ヲ宣通ス去肌熱柴胡氣味薄ノ輕性微寒。
故肌熱ヲ去。元素曰
苦寒以發散表熱也

總槩

柴胡ハ肝膽ノ熱ヲ除下焦ノ清氣ヲ
引テ上行セシメ氣血ヲ宣暢ス。故ニ
寒熱往來ヲ治シ肌熱及骨髓ノ熱鬱ヲ去。陽氣ノ下陷ヲ升提ノ
胃氣ヲ上行セシム。
尤癰疾ノ要劑也

使藥

半夏ヲ使トス。黃連ヲ佐トスレハ瘡熱
ヲ療シ。又手足厥陰ニ行。黃芩ヲ佐ト
スレハ手足少陽ニ行。三稜莪朮ト合ノ堅積ノ滯血ヲ消入。升麻ト合
ノ胃氣ヲ
上行セシム。
傷寒執邪太陽ニ在者用之熱ヲ三陰ニ入レシム又三陰
ニ在者用之重テ傷表也陽半表半裏者ニ非ハ其ニ
勿用○柴胡ハ五勞七傷羸瘦ヲ治スルノ說アリト雖實執アルニ
非ハ過用スルコト勿レ東垣曰傷寒外諸有熱則加之無熱則不加

毒

也○勞症雖有熱久用コト勿レ。得效早止。宗奭曰熱去即須急止
○下元虛冷シ相火上炎者勿用○實氣上逆ノ嘔吐喘息咳嗽者
俱ニ斟
酌スヘシ
畏惡
火ヲ忌。又銅鐵ヲ忌。皂莢ヲ忌。女苑。藜蘆。薑藜ヲ
畏○本綱ニ銀カヲ以テ鬚頭ヲ去リ用ト入門忌

銅鐵ト然ニ今ノ庸工多ハ鐵カヲ以テ柴胡ヲ判實ニ謬リ。蓋本綱
ニ所謂銀カハ惟其製ヲ重ズルノ義ノミト覺テ不及用之且世ニ銀カ
ヲ存スル家希ナリ。故ニ無ニ任テ惟鐵カヲ用テ銅鐵ヲ忌義ヲ不知

附方

傷寒餘熱傷寒ノ後餘熱經絡ニ入テ躰瘦肌熱者柴胡
四兩。甘草一兩。每一貼三錢二分。水一盞煎服。出本事方
積熱ニテ下痢者柴胡黃芩等分半酒半水煎七分浸水冷テ空心
服。出濟
愚案
本經ニ勞症ヲ治スルノ說ナシ。後世五勞七傷
急方
勞之羸瘦ヲ治スルノ說アリ。故ニ今ノ勞症ヲ

治スル方中ニ柴胡ヲ不用者アルコト鮮シ。蓋柴胡ハ苦寒劑タリ。熱ノ有無ヲ辨ノ用之。夫劣症熱邪アリテ脾胃虚シ陽氣下陷者ハ快用テ清熱下陷氣ヲ升ベシ。若或無熱者妄ニ過用スル。勿レ。宗奭曰今人治劣方中鮮有不用者嗚呼凡此誤世甚多ト。又曰或無熱得此愈甚ト。章宜曰日華子竟信爲實謂補五劣七傷除煩益氣藥性論又謂治劣多羸瘦如此等病苟無實熱醫者執而用之不死何待可見本草釋註一字不可忽也。明達者固知去取中下者寧不蹈其轍哉。愚案ニ宗奭ハ一際ニ劣症者ニハ不可用トス。蓋本經ニ其說ナキガ故ナリ。然凡劣症有熱者氣陷者寒熱在來者ハ必用ベシ。若或無熱及氣陷者ハ不用ノ可也。然凡劣虚ヲ病テ全ク熱ナキ者アルコトヲ不見。惟病源ヲ詳ニレ加減使ノ道ヲ盡テ用之。何ノ恐カアラン。章宜談ハ宗奭ガ言ヲ取テ無實熱ノニ字ヲ加テ辨

スト雖未是。蓋柴胡ハ必實熱ニ從テ用者多クハ東垣内傷不足ノ大熱ヲ治スル補中益氣湯ノ中ニ何ゾ柴胡アルニ至マ。不思甚也。柴胡ハ苦ケレ凡薄シ。寒ナレ凡微ナリ。且氣ハ陽ニノ上行ス。故ニ除熱ノ功不烈。使引導ニ從テ虚實表裏氣血諸經ノ熱ニ用ベキノミ。然下雖虚怯者ニハ過用スルコト勿レ。時珍曰精思病原加減使可也。冠氏不分藏府經絡有熱無熱乃謂柴胡不治劣乏。一槩槩斥殊非通論ト。龐元英談藪曰熱有在皮膚在藏府在骨髓非柴胡不可ト。此豈盡實熱ノミノ謂ナランヤ。李士材曰銀柴胡主用相做勞癩者尤爲要藥。

修治

銀力ニテ蘆頭鬚ヲ去。米泔水ニ洗淨シ。銀刀ニテ剉去ト雖強テ不及去之。○上行ニハ根ヲ用。酒ニ浸干乾使下行ニハ根細ヲ用。外感ニハ用生。○和産ニ鎌倉柴胡沙柴胡ノ兩種アリ。時

珍曰其苗有如韭葉者如竹葉者以竹葉者為勝今人鑠倉柴胡是也沙柴胡八即雞腿兒草也又犂牛柴胡一云アリ即狗草根也俱二柴胡ハ非ス不可用近世銀柴胡ト号者ヲ渡セリ根形ハ沙参ニ類ノ大ニ皮皺色黃白肉ニ黃紋アリテ真種ニハ非ス此時珍謂述時有ニ一種根似桔梗沙参白也而大市人以為充銀柴胡殊無氣味トスル類者ナリ不足用○章宜曰產銀夏者獨勝色微白而軟者為銀柴胡用以治勞弱骨蒸也微黑而細者用以解表散熱ト李念我云治勞與疴證乃銀州柴胡別為一種ト此兩說不同李氏ハ銀州ノ柴胡ハ別種ト入章宜ハ銀夏ニ産スル同柴胡ノ中ニ於テ白黑軟細ヲ以テ分之何カ是ナル未詳

前胡



昔辛微寒○去風除熱下氣消痰開胃通食治吐喘息咳嗽胸滿煩悶小兒

夜啼婦人安胎△前胡ハ何ニ由テ各々其義不明時珍曰名義未解去風除熱下氣前胡ノ要能也此カ辛寒ハ風ヲ去苦寒ハ除熱下氣心ノ上熱ヲ下ニ宜シ時珍曰清肺熱ト是也消痰除熱下氣カ故也熱痰ニ宜シ寒痰者ニハ斟酌スベシ開胃通食ト辛ヲ以開胃下氣故ニ通食反胃隔症ニ用者此義也然凡中焦虛弱虛寒者勿用因實熱因結氣者宜之治嘔吐喘息咳嗽胸滿煩悶此皆開胃去風下氣除熱カ故ナリ小兒夜啼前胡ノ末ヲ蜜ニテ赤小豆ノ大ニ丸ノ日一丸熱水ヲ以テ服セシム多用コト勿レ五六丸ニ至テ愈普濟方ニ出タリ婦人安胎下氣除熱カ故ナリ然凡久用コト勿レ若ハ胃氣ヲ損寒ハ氣ヲ伐易ケレハナリ總既前胡膽二經ノ風痰ヲ去膈上ノ熱ヲ除下氣ノ要藥タリ通玄曰種人功力皆是搜風下氣之效肝膽經風痰為患者捨此莫能療

使藥

半夏ヲ使トス。杏仁。桑白皮。甘草。桔梗。ト合メ。風痰熱嗽ヲ治ニ去テ致ス。

毒

氣虛者○下。陷者○血虛。

症皆勿用之。○陰火盛ニ氣不取元ノ胸膈滿内熱心煩寒熱往來咳嗽ヲ發メ。外感ニ似者アリ。禁用之。○前胡ハ辛ト雖性微寒也。虛寒者勿用。

畏惡

火ヲ忌。皂莢ヲ惡。藜蘆ヲ畏。

附方

小兒夜啼ヲ治。方見干石。

愚案

前胡與柴胡俱ニ風痰ノ要劑タリ。故ニ不知者ハ謂柴胡前胡其功均トハ誤ナリ。前胡ハ手足太陰陽明藥。上焦胸中ノ氣ヲ降ス。柴胡ハ足少陽厥陰藥。ニ下焦清陽ヲ升提セシム。實ニ不同。陶弘景曰與柴胡同功非矣。治證雖同而所入所主則異。李士材曰柴胡主升前胡主降。爲不同耳。

修治

蘆頭ヲ去。土氣ヲ洗淨。割テ日ニ乾用ユ。或酢汁瀝ニ浸。乾用。トアリ。痰火ヲ去者。

宜之。○野蒿根。此ト相似誤用レハ人ヲノ反胃ヲ發セシム。宜釋之。○

本草家ニ謂前胡ニ數種アリトハ非也。其實ハ一物也。其根白色ニ香氣アリ。蒙筮曰秋月採根。色白兼黃。氣香甚。竈ト藥店ノ者ハ多ハ夏月ニ採テ洗淨。コトヲ不善故ニ色淡黑。香味不佳ナリ。○本草家言前胡葉野菊ノ如ク。根黑皮白肉ニシテ其黑皮ヲ削去トハ謬ナリ。

升麻



辛甘微苦平。○治額鼻牙根痛。肌間風熱邪毒。發浮汗。療瘡疹。治肺痿。行瘀血。治陽陷眩暈。胸膈痞痛。久瀉下痢。後重。

脫肛遺瀉崩帶喉痛。衄血吐血。血下血。血淋。狂亂。△此草葉麻ニ似テ其性能上升。入故ニ号升麻。額鼻牙根痛。升麻ハ手足陽明太陰ノ藥。升テ頭高ニ達シ浮テ皮膚ニ行。且夫風除熱逐毒者ナリ。夫足陽明胃經ハ鼻莖ニ起。牙根及額ニ行。手陽明大腸經モ亦牙根ヲ行。鼻

孔ノ旁ニ至ル。升麻ハ手足陽明經ニ入テ去風除熱逐毒故頭額痛或
 鼻莖痛或牙根痛腫爛惡臭ヲ發者ヲ治スルニ用之。九太陽頭痛ハ
 兩頰ニ在。陽明頭痛ハ頰中痛テ鼻莖ニ引。升麻能陽明頭痛ヲ治
 入。蓋頭痛症ニ因アリ。曰。虛曰實。虛モ亦二因アリ。曰氣虛曰血虛
 也。升麻ハ陽明經ニ入テ去風除熱逐毒則陽明頭痛ハ實邪者モ
 宜之。又胃氣虛シ清陽下陷ノ不升則濁陰上ニ埋テ不降故頭痛
 者アリ。參芪ノ類ニ合メ用之。肌間風熱升麻ハ足陽明胃經ノ藥
 胃ハ肌肉ヲ主。且升麻ハ浮テ肌表ニ達ス。故ニ肌皮間ノ風熱ヲ去
 ニ宜シ。大抵裏熱者ハ芩連半表半裏ノ熱ハ柴胡。肌熱ハ升麻ヲ用
 若肌熱ノ其本連胃者ハ葛根ト合用ス。邪毒升麻ハ百毒ヲ除ニ
 宜シ。故ニ疫癘風毒腫及蠱毒ヲ解ス。若人毒物ニ中ラル者ハ爵
 金ト合用ス。毒在上吐在腹下テ愈。神ノ妙方也。發浮汗汗肉間ニ

浮テ未出者用之。發之升麻葛根湯ノ意是也。然升麻ハ陽明ニ
 入ノ聖藥タリ。若邪熱太陽分ニ在者誤テ升麻葛根湯ヲ用則反
 テ邪氣ヲ陽明ニ入シメ害有コト不少。詳ラテ宜用之。東垣曰初
 病太陽證服升麻葛根湯是遺太陽不惟遺經反引太陽邪氣入于
 陽明不能解也。療瘡疹好古曰爲瘡家聖藥ト或風疔或口瘡或
 豆瘡麻疹症去風除熱逐毒治之。益癩疹痘瘡ノ初毒迫肉表未解
 者用之逐毒解表出發セシム。升麻葛根湯症是也。豆瘡序病時多ハ
 此湯ヲ用テ逐之。豆瘡已ニ出ノ後ハ升麻ヲ勿用。若其出豆ノ後
 用之重テ解表起張スルコトナレ。或出後ト雖元氣弱或泄瀉者ノ
 類ハ補中ノ劑中ニ合用ス。然升麻少用ヨ勿多。其升麻葛根湯ハ出豆ノ
 後ハ必勿用。時珍曰其升麻葛根湯則見後必不可用爲其解散也
 ○痘瘡患上古ニ有コトナレ。後世父母ノ慎ヲ過テ胎毒盛ナルガ故ニ

此患アルコトヲ致ス。是以其始ニハ此カ治法モ亦未具。或升麻一味ノ煎湯ヲ以テ綿ニ浸テ瘡上ヲ拭。或蜜煎ノ升麻湯ヲ時飲シムルノ治ノ。此痘瘡ヲ療セン。温筋ナリ。甄權曰療豌豆瘡水煎綿沾拭瘡上。治肺癆又。肺癆。膿ナキハ肺癆。升麻ハ升テ肺ニ入。除熱毒。逐肺膿ヲ消シ宜シ。行瘀血陽明胃ノ瘀血ヲ行ス。然凡獨此一物ノミヲ以テハ行瘀血ニ弱。行血ノ劑中ニ合用シ此功アリ。古人謂陽明ノ瘀血ニハ血衄血者犀角地黄湯ヲ用。ニ若犀角ナクハ升麻。代用ト。蓋升麻ハ根。地黄等ノ藥ヲ引テ陽明ニ入シメ。兼テ瘀血ヲ行ガ故ナリ。陽陷此升麻ノ要能ナリ。陽陷トハ陽氣ノ下陷ヲ云。夫柴胡ハ足少陽ノ清氣ヲ引テ升ス。升麻ハ足陽明ノ陽氣下陷ヲ升提ス。此東垣益氣湯ノ意也。夫陰ハ降陽ハ升。此陰陽ノ常氣也。若其陰虛則反テ升。陽虛則反テ降。陽虛ノ降則人ノ腹内秋冬收殺ノ令トナリテ遂ニ死。

惟清陽能升發。春令アルコトヲ貴。故ニ或飢飽失宜。或生冷ニ傷ラレ。或勞役ヲ太過。脾胃ヲ損。元氣ヲ虛セシメ。内傷ノ諸症ヲ致ス。若ハ皆陽氣ノ下陷ニ生ス。故ニ補中ノ藥中ニハ必升麻ヲ用テ胃ノ清陽氣ヲ升發セシメ。諸甘温ノ劑ヲ引テ陽道ニ上行セシム。此東垣家ノ奧旨也。李杲曰升麻升胃中清氣。又引甘温之藥上以補衛氣之散。而實其表。故元氣不足者用此。於陰中升陽。云。滙曰升麻稟極清之氣。升散提氣功最大。得陽氣之全者也。故補脾胃藥中非此爲引。未能取效。能升陽氣于至陰之下。ト。凡人五十以上ニ至。ハ氣ノ消者多。長者少。降者多。升者少。秋冬ノ令勝テ春夏ノ令劣。故ニ老病ヲ療者多。ハ補氣補中ノ劑ニ升麻柴胡ヲ合用。春升ノ令ヲ得セシムルニ宜シ。或問方書ニ謂柴胡ハ左ヨリ升シ。升麻ハ右ヨリ升ストハ何ゾヤ。曰此声面ノ云ノ。左ハ東方ノ木位。右ハ西南

ノ間土位ナリ。柴胡ハ肝膽木部ノ清陽ヲ升ス。升麻ハ胃土ノ陽氣ヲ升ス。故ニ左右ヲ以テ云。此左右ニ不可拘。惟柴胡ハ下焦ノ清陽ヲ升シ。升麻ハ中焦ノ清陽ヲ升ス。左右ニ偏ナレ。有テナレ。[弦運] 清陽升提セサルカ故ニ濁陰上ニ爵メ。眩運者用之。或清陽下陷ノ虛眼病亦宜之。其逆上實邪ノ眩運ニハ禁用。[胸脇虛痛] 虛字ヲ取トス。裏ニ實滯アルニ非ノ。惟清陽不升故ニ濁陰埋上。胸脇虛痛者用之。久瀉下痢後重。此皆升提ノ功ニ從ナリ。[脫肛] 此モ亦升提ヨリ致所ナリ。大抵痢疾脫肛ノ症ニハ必用之。升提ス。然其虛冷ニ屬者ハ獨多用コト勿レ。温藥ト合メ用ニ宜シ。[遺濁崩帶] 遺精白濁婦人崩漏帶下ノ症。其清陽下陷ニ屬者用之。[喉痛] 足陽明經ハ喉ヲ括升麻ハ陽明ノ本藥タリ。故ニ喉痛ヲ治スルノ能アリ。[衄血] 此血陽明經ノ瘀血ニ因テ然者宜之。若其實火ノ升逆ニ屬スル者ハ勿用。又陽明胃氣虛陷ノ不能攝血カ故ニ然者ハ補氣行血ノ劑ニ合メ用之。下血血淋。此モ亦升提スルガ故ニ治之。[狂乱] 狂症ハ皆陽明ノ熱ニ屬ス。故ニ清熱行氣開胃ノ劑中ニ用之。藥ヲノ能陽明ニ非レシガ爲也。[總藥] 升麻ノ功能總テニアリ。諸藥ヲ引テ陽明ニ合シムル第一也。中焦脾胃土ノ中ノ陽氣ヲ升提セシムル第二也。頭面及皮膚ニ行テ除熱去風逐毒掃瘡第三ナリ。[使藥] 葱白。白芷ト合メ手陽痛石膏ヲ得テ陽明ノ齒痛ヲ治ス。參芪ト合メ元氣ヲ升補シ。柴胡ト合メ生發ノ氣ヲノ上行セシム。葛根ト合メ陽明ノ汗ヲ發スル也。[毒] 實氣升逆者禁用。○陽氣虛冷者過用スルコト勿レ。○痘疹已ニ出ノ後升麻葛根湯ヲ用コト勿レ。○自汗アル者勿過用。○升麻ハ能下陷氣ヲ升提ス。此陽氣在下不升者ヲ升シム。若其陽氣下ニ不

ハ勿用。又陽明胃氣虛陷ノ不能攝血カ故ニ然者ハ補氣行血ノ劑ニ合メ用之。下血血淋。此モ亦升提スルガ故ニ治之。[狂乱] 狂症ハ皆陽明ノ熱ニ屬ス。故ニ清熱行氣開胃ノ劑中ニ用之。藥ヲノ能陽明ニ非レシガ爲也。[總藥] 升麻ノ功能總テニアリ。諸藥ヲ引テ陽明ニ合シムル第一也。中焦脾胃土ノ中ノ陽氣ヲ升提セシムル第二也。頭面及皮膚ニ行テ除熱去風逐毒掃瘡第三ナリ。[使藥] 葱白。白芷ト合メ手陽痛石膏ヲ得テ陽明ノ齒痛ヲ治ス。參芪ト合メ元氣ヲ升補シ。柴胡ト合メ生發ノ氣ヲノ上行セシム。葛根ト合メ陽明ノ汗ヲ發スル也。[毒] 實氣升逆者禁用。○陽氣虛冷者過用スルコト勿レ。○痘疹已ニ出ノ後升麻葛根湯ヲ用コト勿レ。○自汗アル者勿過用。○升麻ハ能下陷氣ヲ升提ス。此陽氣在下不升者ヲ升シム。若其陽氣下ニ不

足ノ元氣不升者用之。下益虛ノ元氣愈不足入。此章宜滙ノ發明也。故ニ李士モ亦謂下虛者勿用。○熱邪太陽ニ在テ未入陽明者勿用。反テ邪氣ヲ陽明引人。

附方

李腫毒瘡 升麻ヲ醋

ニ磨テ頻ニ塗出。肘後方。胃熱齒痛。升麻煎湯熱ノ口漱。或加生地黃。出直指方。口舌瘡。升麻一兩。黃

愚案

李果曰胃虛傷 升麻過陽氣干

脾土爲火爵之病者宜升麻葛根以升散其火爵。下時珍モ亦如此。一病者。升麻葛根湯ヲ用テ治ノ神效アルコトヲ言世ノ庸醫多ハ升麻葛根湯ヲ以テ外感發散ノ劑トシテ覺テ。此義アルコトヲ未知。益胃ハ陽トシ。脾ハ陰トス。胃陽不足ノ脾ニ陰邪旺者。妄ニ寒冷物ヲ飲食。則陰邪益旺。胃陽寒リ。遂ニ火爵トナリテ病ヲ致ス。其症實火ニ似。誤テ苦寒陰劑ヲ用。則陽彌爵ノ病加甚シ。故ニ升麻

ヲ以テ胃陽ノ陰邪ニ屈セラル者ヲノ升發セシメ。葛根ヲ以テ陽明ノ火爵ヲ伸。則陰邪自開。陽氣能和。ノ效ヲ致ス。若其胃氣不足スルコトノ太者ハ四君子湯與升麻葛根湯合劑ニテ柴胡蒼朮黃芪ヲ加。若其人常嗜酒者ハ時々温酒サ許シ。與テ發陽ヲ助。此時珍發明ノ意也。由テ愚案ニ夫酒ハ大熱物也。故ニ酒病者ハ冷寒劑ヲ以テ雖如可治。寒藥反テ閉陽。遏濕不能治。惟辛温劑ヲ以テ陽爵ヲ發シ。濕滯ヲ散。則效アリ。此東垣葛花解醒湯ノ意也。故ニ酒モ亦絶ベカラス。時温酒サ許シ。與テ酒爵ヲ發ノ助トス。ヘシ。酒ヲ絶トキハ酒爵難發。藥力難行。然凡久ク飲シムルコト勿レ。爵稍發。病稍退。ニ至ハ反テ絶テ酒ヲ飲シムルコト勿レ。凡酒病ハ續ハニ酒ヲ與。ヨトハ愚カ臆見ニ非ス。河間ノ法也。酒病ハ少。與酒藥功ヲ助者ハ時珍ノ意也。然ニ今醫者酒病ヲ見テハ必酒ヲ恐テ禁之。此皆醫書ニ不傳

無

修治

氷泔水ニテ土氣ヲ洗淨シ。黒皮及腐ト蘆頭トヲ削去。若鬚アル者ハ其毛ヲ去。判用ニ○升麻ハ細黒色

堅實者良。青綠色者。雞骨升麻トス。外黒裏白ノ緊實者ヲ鬼臉升

麻トス。有鬚俱ニ用ヘシ。虛火者不堪用。○今藥店クリト云者ヲ

上升麻トス。惟細黒色堅實者ヲ擇テ第一トスヘシ。○和謂升麻ハ

忌火ト。然凡本草ニ此説ナシ。案ニ獨此ノミナラス。本草ニ忌火ノ説無

ク。和ニ忌火者多シ。蓋本草ニ焙炒ノ製ナキ者ハ皆以テ爲忌火。豈製

焙炒セザルヲ以必忌火トセンヤ。或如有香氣者恐失其芳香。忌火ノ新

法ヲ立者ハ或可也。升麻ハ芳草ニ非ス。何以力忌火トスルマ。未審トス

知母



若寒○治命門相火有餘。瀉肺火。療消渴熱中。傷寒久瘧。心煩。熱厥頭痛。骨蒸勞熱。熱欬。熱痰。陽明熱。△知母。本ノ名

ハ蟻母也。宿根ノ旁ニ初テ生子。故ニ母ト号シ。根ノ狀蟻竃ニ似

タリ。故ニ蟻ト号ス。後世訛テ作知母。治命門相火有餘。知母ハ

氣味俱ニ厚。沉テ下降ス。足少陰腎經ノ本藥也。夫命門ノ相火

ヲ以テ獨右腎ノ火トスル者ハ誤也。兩腎水中ノ龍火ヲ以テ命

門ノ火トス。此火ヤ水靜ニシテ潤則水土ヲ養テ陽氣ノ源トナル。水

動テ不足則此火熾ニ升テ水ヲ涸シ土ヲ乾シ。金ヲ燥シ。元氣ヲ

賊呼テ命門相火有餘トス。此ヲ清除者ハ知母。黃蘗ニ過者ナ

シ。蓋黃蘗與知母俱ニ腎火ヲ瀉スル良劑ニシテ。間兩藥兼行ト雖

其清火ノ部有リ不同。黃蘗ハ足少陰太陽ニ入テ腎膀胱ノ熱ヲ

涼シ。知母ハ足少陰ノ藥ニシテ且手太陰肺ニモ亦入者ナリ。然則知

母ハ獨腎熱ノミナラス。腎火ノ上焦肺分ニ薰者ヲ清ス。此龍火ノ

炎ノ在上者。上ヨリ逐テ次第ニ降り。下焦水底ニ達メ。相火ノ熾

火ヲ清ス。古人謂黃蘗無知母猶水母之無蝦也。蓋水母無目以蝦
爲目。水母ハ從蝦行。蝦動水母沉テ互ニ依附ス。黃蘗ハ知母ニ從テ
能下焦水底ニ沉。知母ノ肺腎ノ火ヲ清スルニ從テ黃蘗能腎火ヲ
瀉ス。肺ハ金。腎ハ水トス。肺火ヲ瀉スル者ハ化源ヲ清スルノ義。金生
水ノ理ニ合メ。此兩藥相依附ノ其功ヲ合扶者ハ水母與蝦ノ相依附
メ水母ハ蝦ニ從テ行。ニ似タリ。水母ハ黃蘗。蝦ハ知母ニ譬テ云ナリ。
然則腎水不足ノ無根ノ相火。水底ヨリ蒸升テ肺ニ上炎者ハ知母ヲ
用ユ。腎水弱ノ相火水面ニ升遊者ハ黃蘗ヲ用ユ。瀉肺火。肺熱ヲ治
スルノ法ニアリ。ハ熱惟肺分ニ在者ハ黃芩ヲ用ユ。若心脾ノ熱。肺
ニ客者ハ黃連ヲ用ユ。知母ノ治症ハ不然。腎水不足ノ無根相火升テ
肺ニ在者用之。獨肺ノ火熱ニハ反テ勿用。療消渴熱中。多食ノ數

溲者ヲ消中ト云。多飲テ數溲者ヲ熱中ト云。多食シ多渴シ且數溲
者ヲ消渴ト云。消渴熱中ハ熱火雖在胃其本ハ下焦腎部ノ無根
相火。上中焦ヲ煎熬メ然シム。故ニ用之。傷寒。傷寒邪熱陽明胃ニ
入者用之。仲景白虎湯ニ石膏ヲ君トシ。知母ヲ佐トシ。傷寒陽明ノ
邪熱入胃。惡熱有汗。作渴。脈大ニ長者ヲ治ス。或問然則知母ハ瀉
胃火ノ劑タリヤ。曰。元素言入足陽明ト按ニ知母ハ瀉肺火。去腎火
ノ劑タリ。胃ハ肺腎ノ中ニ居ス。故ニ知母ノ上下兩焦ノ火邪ヲ瀉スルニ
從テ中宮ノ火熱ヲモ亦瀉スルニ至ル。然レ獨胃火ノミナラス。白虎湯ノ
症不眠ノ煩躁ヲ本トス。蓋煩ハ肺熱。躁ハ腎熱ニ出ガ故ナリ。此仲景
白虎湯ニ用知母雖治胃火。獨胃火耳ニ非ズ。熱邪肺腎ニ繫テ有ノ
以ノ故ナリ。久癩。久字ヲ眼トス。癩熱久ノ陰分ニ入テ肺熱。或夜陰
ニ熱シ。盜汗口乾ニ至者用之。心煩。腎火升。肺胸煩熱スル者ヲ治ス

熱厥頭痛下熱逆厥ノ頭痛者ヲ治ス骨蒸勞熱勞瘵骨蒸ノ
 熱ヲ治ス蓋腎火ノ所爲ナレハ也或問本經謂補不足益氣好古
 曰滋腎水李杲曰法當用黃蘗知母大苦寒之藥以補腎與膀胱
 然則知母ハ滋陰補氣ノ劑タリヤ曰諸氣血ヲ補益者ハ其味ノ
 劑ニ非バ不能苦寒劑ハ瀉火損陽者也何如ノ知母ノ苦寒補陰
 益氣ノ義アラシヤ大腎苦燥氣惡火東垣謂火與元氣不兩立下
 知母苦寒敗胃火ヲ瀉ノ其燥ヲ除カ故ニ滋腎水ト云命門相火ヲ
 瀉スルカ故ニ益氣ト云ノ直ニ滋陰益氣ト其ベカラス凡苦寒劑ハ
 損陽伐氣勞熱症ト雖勿過用暫用テ其火ヲ瀉シ火熱稍收則速
 ニ止ヨ久用則損胃氣減食泄瀉シ損肺氣反テ咳嗽盜汗ヲ致ス滙
 曰苦寒之味非長養万物者也即實火燔灼亦宜暫用而世皆
 以爲滋陰上劑勞瘵神丹虛病大柱何可勝數又問曰腎火者ハ

通ノ可用之マ曰不然腎火症虛實ノ二辨アリ虛實ハ水部ノ沙
 汰ニ非ズ腎中ノ陽氣ノ虛實ニ因テ此カ可否アリ蓋腎水虛スト
 雖水中ノ元火未虛ノ相火上炎者此ヲ實火トス知母黃蘗等ノ
 苦寒ヲ用ユ若腎水虛シ水中ノ元火モ亦從テ不足シ命門ノ虛火
 上炎者ノ如キハ桂附等ノ溫劑ヲ用テ其火源ヲ養則虛火自本
 位ニ返ス若誤テ知母黃蘗等ノ苦寒瀉火劑ヲ用則加燔灼ノ虛
 炎ヲノ上騰セシム此玉冰謂人火與龍雷火也下氣未虛實火ハ火
 火也得水寒消者也下氣不足ノ虛火ハ龍雷火也得水寒ナラ炎
 上入以火逐之虛炎自退者也此二症似同異者難明難治渾スル
 コト勿レト云熱欬熱痰腎火升上ノ效ヲ致シ痰ヲ成者用之陽明
 熱仲景白虎湯ニ用之故元素謂治陽明火熱ト然凡陽明熱邪肺
 腎ニ繫者ニ非ハ勿用之獨胃火ノミノ症ニハ勿用前ノ傷寒ノ條

ニ詳ナリ

總條

知母ハ命門相火熾ニノ上焦肺分ニ向フ者肺ヨリ逐テ上下兩焦ノ火實ヲ清者也

使藥

黃蘗ヲ得テ腎火ヲ瀉ス

毒

久用則損氣伐陽傷胃氣弱肺氣酒ヲ得テ肺火ヲ瀉ス

者皆禁用之

○胃虛肺虛諸虛寒者勿用之

○通玄曰多服令人泄瀉亦令人減食此惟實火燔灼者方可暫用若施之于虛損之人如水益深矣蓋苦寒之味行天地肅殺之令非長養万物者也近世未明期義誤以為滋陰上劑勞瘵神丹因而天柱者不可勝數余故特表而出之永

爲鑒戒

入出衛生

畏惡

鐵器ヲ忌塩逢砂ヲ伏ス

附方

紫癩風 知母ヲ醋ニ磨テ捺コト日三度

愚案

古人ノ謂知母ハ氣分ノ火ヲ瀉シ黃蘗ハ血分ノ火ヲ瀉スルヲ以テ故ナリ分ノ火ヲ瀉ス上愚案ニ知母黃蘗俱ニ腎火

ヲ瀉スルノ良劑タリ。古人何ヲ以テ氣血ニ分マ。蓋肺ハ主氣腎ハ精血ノ藏タリ。知母ハ肺火ヲ瀉シ。黃蘗ハ腎火ヲ瀉スルヲ以テ故ナリ。然レ知母ハ肺部ノ本藥ニ非ズ。腎經瀉火ノ本藥タリ。相火腎ニ旺ニノ肺ニ不向者ハ黃蘗ノ所治。腎火向肺者ハ知母ノ所治。知母ノ肺火ヲ瀉スルハ餘力ナリ。獨肺分耳ニ非ズ。何ゾ氣血ノ分アラシマ。惟知藥兩種ハ腎部本藥。水分ノ火ヲ瀉者ナリ。通玄曰知母爲腎經本藥兼能清肺者爲其肅清龍雷勿使僭上則手太陰無銷燦之虞也。ト時珍謂潤腎燥而滋陰トハ腎火ノ向肺者ヲ瀉則金清ノ金生水ノ義アルニ取ルシモ潤燥滋陰ノ劑ニ非ズ。○或問古人謂小便閉塞ノ渴者ハ淡滲劑ヲ用ユ。不渴者ハ知母黃蘗ヲ用テ然則此兩藥俱ニ小便通利ノ劑タリマ。曰此東垣說ナリ。本經モ謂下水ト蓋渴者肺中ノ伏熱ニ因テ水道不通ノ三。故ニ知藥ニ不宜不渴者ハ

熱ノ本腎膀胱ニ在テ其標向肺故ニ知藥ヲ用テ肺腎火熱ヲ除則
 金水ノ氣清ノ水道通利ス然レ必シモ渴與不渴ニ不可拘惟肺熱ノ
 ミニ水道不行者ハ知藥ニ不宜腎熱升テ肺ニ伏スルガ故ニ水道
 不行者ハ用之ニ宜トスヘシ夫小使ハ膀胱ヨリ出下雖專肺氣ノ傳
 送ニ從故ニ水生高源ト云知母黃藥ハ直ニ通水ノ劑ニ非ト然レ此ハ
 腎火ヲ瀉シ肺熱ヲ除則膀胱不熱金氣清水ノ源委俱ニ通ノ水道
 自通ス内經ニ

修治

鐵器ヲ忌竹刀或銅刀ヲ以テ毛ヲ去到
 焙用エ○和ニ多ハ粗皮ヲ去用エ然レ凡

本綱ニ去毛ト云テ去皮ノ説ナシ案ニ龔氏萬病回春ニ去皮毛
 ト世人皆從之然ス○腎水不足ノ瀉火ニハ塩水ニ浸焙肺火ヲ瀉
 スルニハ酒ニ浸焙乳汁ニ浸焙者ハ胃氣ヲ損コトヲ恐テナリ
 實火ヲ瀉スルニハ生ヲ用エ○知母ハ肥潤裏白者ヲ擇用エ○或問

知母常ニ製置テ通用スルニハ何ノ製ヲ以ヒン曰酒ニ塩少許ヲ加
 テ浸シ又炒テ褐色ノ如ク用ヨ此李士材ガ法ナリ

天麻



微辛微温○主諸風濕治諸痺四肢拘
 急眩運頭痛小兒驚風中風癱瘓通血
 脈強筋力利古本疏痰氣中風家要劑

△釈名ノ義未詳此ガ本名ハ赤箭也主諸風濕天麻一名ハ定風
 草有風不動無風自動故号是以天麻ハ勝風者タルコトヲ知且辛
 温ハ能外ニ發達入故ニ天麻ハ風濕ノ内ニ爵者ヲ逐テ外ニ出入
 心焦頭面及筋骨經絡ノ間ニ功アリ章宜曰有自内達外之功
 ト是也經ハ足厥陰太陽ニ入足厥陰ハ肝木風化ノ經ニ筋ヲ主ル
 足太陽ハ膀胱水濕化ノ經ニ且骨ヲ主ル故ニ風濕ノ内ニ爵筋
 骨經ヲ主ルニ寒者用之逐之治諸痺痺ハ痛風也風濕ノ筋骨經

絡ニ塞ヨリ致ハナリ四肢拘急風濕ノ經絡筋骨ニ鬱ノ然者ヲ療
入眩運頭痛至真要大論曰諸風掉眩皆屬于木一者頭旋眼運黑者
ハ肝風ノ鬱トス風木ハ動搖ヲ主ハナリ天麻ハ足厥陰肝木ノ經ニ入
テ風鬱ヲ逐故ニ眼運ノ良劑トス東垣半夏白朮天麻湯一用者
是也羅天益曰眼黑頭旋風虛內作非天麻不能治又此方頭痛ヲ
療スル風熱ノ鬱ニ因者ヲ治ス天麻ニ宜キ所ノ頭痛ハ其症多ハ眩
運頭旋ヲ兼此風鬱ノ兆也小兒驚風肝風ヲ逐ガ故也中風癱瘓
真中風風鬱內手足癱瘓皮膚不仁語言不遂者必用之通血脈風
濕ニ血脈滯者用之強筋力風濕ニ筋骨ノ力衰テ腰膝痠弱
等者用之風濕ヲ去血脈ヲ通則筋力自盛ナリ和舌本筋ハ肝ノ
主ノ下ハ陰器ニ聚上ハ舌本ニ會天麻ハ入肝去風故ニ風ニ因テ筋
不和舌本或緩リ或強テ舌不利者用之中風舌麻ノ語盡不語症

必用之疏痰氣風痰氣上焦頭面ニ鬱塞者用之故ニ風痰ニ屬スル
頭痛眩運ノ治ハ宜之中風家要劑逐風疏痰治癱瘓舌麻諸真
中風家ニ必用ノ要劑ナリ
羅天益曰爲治風之神藥
頭旋目眩中
風ノ要藥也
毒 天麻風劑トス燥易シ故ニ血虛津液不足口乾
咽乾舌燥大便燥閉血虛頭運類中風不屬風
皆勿用以上諸症若其風
鬱ヲ兼者ハ或サ用之
附方 天麻丸 去風痰利頭目寬胸
膈治頭運頭痛肩項拘急肢
節煩痛皮曹癢痒面目虛浮天麻半兩川芎二兩爲末煉蜜ニテ丸シ
芫子大食後一丸茶
酒ニテ下ス出普濟方
愚案 天麻ハ風劑ノ裏藥ナリ何如トナ
レバ風在表者アリ宜發散風在裏
者アリ宜逐天麻ハ風氣ノ内ニ鬱者ヲ逐テ外ニ達セシム逐ノ

劑タリ時珍曰今有久服天麻藥遍身發出紅丹者是其祛風之驗也。内風ヲ逐ノ義明ニ知ヘシ。且天麻ハ佐使ノ藥ニ從テ其功ヲ見ス。獨用テハ功力不益。宗奭曰天麻須別藥相佐使然後見其功。仍須加而用之。

修治

洗淨ノ酒ニ浸コト一宿。取出濕紙ニ裹テ糠火ノ中ニ煨シ取出テ剉焙用之。○奥州ヨリ天麻ヲ出ス。根莖花形皆本草ノ説ニ合ト雖。和天麻ニハ枝葉アルコトナシ。本草ノ諸説ニ皆枝葉アルコトヲ辨則惟唐ヲ用テ可ナリトス。○天麻ハ煨熟ノ破開シ。明亮堅實者ヲ佳トス。○奥州ヨリ出ス所ノ天麻ヲ野人呼テ盜人ノ足草トス。○雷敎説ヲ案ニ御風草ノ一種アリテ似天麻御風草ハ根莖斑葉背白青點アリ。若誤テ御風草ヲ用則人ヲノ腸結ノ患アラシムト也。

遠志



苦温。強志固精。定心氣。治健忘陽痿。夢洩。聰明耳目。療驚悸。客忤。腎積。長肌。肉。助筋骨。理癰疽。腎ハ藏精。精中ニ

志氣ヲ存ス。此藥腎中ノ志氣ヲ心ノ遠ニ能達セシムルノ功アリ。故遠志ト号。強志夫心ハ藏血。血中ニ存神氣。腎ハ藏精。精中ニ存志氣。心腎ノ神志交通則水火既濟ノ陰陽精血平和ナルコトヲ致ス。遠志ハ足少陰腎經ノ氣藥。乃腎中ノ志氣ヲ強ソ上心ニ通達セシム。志氣通心則心神モ亦安定也。故ニ遠志有定心氣功。然凡心家ノ本藥ニハ非ズ。定心氣者ハ補腎志ノ餘力也。通玄曰。主治雖多。總不出補腎之功。或以爲心經藥則未也。固精。遠志ハ補陰ノ劑ニ非ス。腎經補氣劑。陰中氣ヲ補者ナリ。腎中氣虛則精不固。遠志能腎中志氣ヲ強スル則ハ精自固守ニ至ル。時珍益精補陰氣ト云モ亦腎中

志氣ヲ強スルヲ以テナリ 定心氣 腎志不通心 心氣浮動テ不定 驚
腎志ハ心氣カ爲ニハ牛馬ノ羈縻ノ如シ。羈縻ニ從テ牛馬定テ妄
ニ不動カ如ク。腎志能心ニ通則心氣自定テ妄ニ動キ跡コトナシ
治健忘 此遠志ノ要能ナリ。夫人ノ事ヲ忘サレシムル者ハ心腎
神志ノ所致也。然レ獨神獨志耳ニシテ亦致コト不能。神志ノ氣互
ニ通ノ忘コトナカラシム。蓋心神ハ陰陽靈妙無測主人公也。腎ハ北
方水蔵タリ。水性能遠ニ達ス。志ハ腎ノ水中ノ神タリ。故ニ心神ノ主
人公ト。腎ノ水神遠ニ達スル所ノ志氣ト。其氣ヲ相通ノ持則永忘
ト云コトナレ。是以健忘症心腎二氣ノ不足ト雖。其本ハ腎志不足
不通心故ノニ。遠志ハ志氣ヲ強メ心ニ達セシムルノ良劑タルヲ以テ
治健忘ノ要藥トス。陽痿 陰莖柔弱ニシテ不舉者ハ腎中ノ氣虛ト
入。遠志主之。太者ハ肉桂ト合用ノ下元ヲ温補セヨ。夢洩 夢中ニ

洩精者ハ下焦ノ氣虛ノ精固カラサルカ故ナリ。遠志ヲ以テ固精
則夢ミレレ不洩精 聰明耳目 耳ノ聰ハ精氣ノ盛ニ從。目ノ明ナルハ
精血ノ潤ニ從。遠志ハ腎志ヲ強メ心ニ達セシムル者ナリ。腎志強ニキ
達則精氣從テ耳目ニ潤。故聰明ノ功アリ。療驚悸 亡安 驚悸者ハ
腎志不足ノ上達セサルカ故ニ。心氣ハ浮。腎氣ハ陷テ。上下ニ氣交通
セサルヲ以ナリ。故ニ遠志ヲ以テ腎氣ヲ強メ上達セシムレバ。上下ニ
氣互ニ固張テ驚悸ノ患アルコトナシ。客忤 小兒睡中ニ驚入ノ息
氣ニ犯サレテ驚者ヲ客忤トス。遠志治之者ハ右ノ療驚悸ノ理ト
同シ。腎積 名テ奔豚ト云。臍下ヨリ逆ノ心下ニ升衝。此本腎氣弱
ノ下ニ收コト不能。故ニ逆ノ奔升。遠志ハ腎氣ヲ強メ下元ヲ固スレハ
也。長肌内助筋骨 此皆腎氣ヲ補ノ餘力也。一理癰疽 遠志多サニ
不拘米泔水ニ洗。搗去心爲末。每服三錢。温酒一盞ノ中ニ調サ。項澄

テ清酒ヲ飲^ミ津^ヲ腫^上ニ傳^此一切ノ癰疽ヲ治^テノ神効^{アル}者也。出^三因^方遠志ハ補^腎氣^ノ良劑^{タレバ}。熟地^參芪^ノ劑^ニ合^用メ。癰疽ノ不足^ヲ補^フニ宜^者ナリ

總纂

遠志ハ腎ノ水中^ノ氣^ヲ強^クシ此^ヲ上^達セシムル者也。下^氣ヲ固^シ心^腎氣^ヲ交通^シ。健忘^驚

悸^ヲ治^{スル}ノ要藥也

使藥

茯苓^冬 葵子^龍 骨^ヲ得^テ良^キ

毒

心^腎實^火實^心 逆^者勿^用之

畏惡

遠志ハ去^心宜^用。不去^心煩^心セシム。珍珠^藜

附方

腦^風頭^痛 甚^ノ不^可忍^ス

者遠志ノ末^鼻ニ留^山宜^明方^ニ乳^腫 小兒^口中^ノ惡^氣ニ吹^レテ乳^腫者吹^乳ト名^ク。遠志^焙研^酒ニテ二錢^ヲ服^シ。滓^ヲ腫^處ニ傳^出袖^珍方

愚案

或^問遠志ハ腎^中氣^ヲ補^ヒ志^ヲ上^心ニ達^{セシム}ルトキハ此^木上^行ノ劑^{タリ}ヤ否^ヤ。曰^遠志^ハ下^焦水^部ノ氣^藥タリ

此^ガ志^氣ヲ心^ニ達^{セシム}ルノ義^{アリ}ト雖^強テ上^行トスルニ不^至。惟^腎中^氣ヲ強^クシテ志^氣ヲ心^ニ通^{カシム}ルノ劑^{トス}ヘシ。上^行ヲ必^トスルノ劑^ニハアラズ。修治 米泔^水ニテ洗^淨シ。蘆^頭ヲ去^キ甘草^湯ニ浸^シ。丁^宿中^ノ骨^ヲ去^キ皮^ヲ取^テ判^日ニ乾^焙用^ユ。中^ノ骨^ヲ不^去人^ヲ煩^心セシム。案^ニ今^時師^遠志^ヲ製^{スル}ニ或^忌鐵^器者^{アリ}。然^レ凡^本草^ニ此^説ナレ未^詳トス。蓋^遠志^ハ腎^經ノ本^藥タリ。腎^ハ水^トノ肝^木ノ母^トス。忌^火者^火氣^ノ燥^ヲ心^忌鐵^者ハ伐^木傷^肝子^能母^ヲノ虛^{セシム}ルノ義^ニ取^者欤。此^皆庸^工ノ所^致也。レモ忌^ニ不^及。今^人葉^細ニ紫^色ノ小^桔使^花ノ根^ヲ採^テ遠^志ト入^然凡^此真^ノ遠^志ニハ非^ズ。謬^{コト}勿^レ

貝母



辛苦^微寒[○] 治^心下^滿煩^熱消^燥痰^潤 肺^散項^下癭^瘰瘰^瘰治^喉痺^乳難^咳嗽^惡瘡

△形貝子ヲ聚ニ似タリ。故ニ号^{ホウ}治心下滿煩熱。貝母ハ手太陰肺經ノ藥。苦ハ下シ辛ハ散シ。寒ハ清ノ胸中鬱結ノ氣ヲ下散シ。胸中ノ鬱熱ヲ清シ。心下滿及煩熱ヲ治。仲景治結胸小陷胸湯ニ用。貝母作主者。是ナリ。消燥痰。此貝母ノ要能ナリ。半夏ハ濕痰ヲ燥レ去。貝母ハ燥痰熱痰結痰ヲ潤テ消化者也。故ニ陰虛火實ノ燥痰ニ必用之。潤肺。貝母雖潤肺。麥門冬ノ類ニ非ズ。肺中結熱熱痰アリテ燥者用之。肺氣虛燥者ニハ勿用。苦辛寒ハ肺氣ヲ耗虛シ。易ガ故ナリ。散項下癭瘰。癭瘰ハ俗謂古武也。瘰癧ハ瘰癧皮間ニ結核ヲ生シ。深ク入タル者ヲ云。癭瘰ハ皆痰飲ノ結聚者也。貝母ハ手太陰ニ入テ上部ノ痰結ヲ消化ス。故ニ項下癭瘰ヲ治スルニ宜シ。治喉痺熱痰邪。肺ニ鬱ノ喉痺者宜用之。漚曰除胸中煩熱喉痺自愈。乳難。婦人乳汁難通者ハ皆胸中ノ氣結結熱結痰ニ屬ス。故

ニ貝母ノ辛ハ氣結ヲ開。苦寒ハ結熱結痰ヲ通。乳汁自出。咳嗽肺中燥痰ニ屬者必用之。惡瘡。一切無名ノ惡瘡ヲ療ス。昔江左ノ商人左膊上ニ一瘡ヲ生ス。形如人面。病者戲ニ酒ヲ其口中ニ滴レハ其瘡面赤色ナリ。食ヲ含シムレハ能食。多食シムレハ膊内ノ肉脹不食則臂痺。工醫アリテ諸ノ金石草木ノ藥ヲ含シムルニ皆無所若。貝母ヲ含シムルニ至テ瘡面眉自ヲ聚閉。病者喜テ貝母汁ヲ以テ多灌ハ逐ニ瘡ヲ成テ瘡タリ。此實ニ惡瘡ヲ治スルノ兆也。

總條 貝母ハ燥痰ヲ潤去胸中ノ煩熱氣結ヲ除ノ要劑ナリ。

使藥 厚朴。白微ヲ使トス。天門冬。麥門冬。桑白皮。枇杷葉。百部。桔梗。甘草ト同ノハ。肺熱效。喉胸中煩熱ヲ治ス。百合。百部。薏苡仁。麥門冬。紫蘇子。爵金。童便ト同ノハ。肺熱吐血ヲ治ス。番降香。爵金。橘紅。遠志。蘇梗。蘇子。香附子。白豆蔻。ト同ノハ。爵痰

ヲ開川芎神麴ト同ノハ一切ノ氣鬱ヲ
開ニ宜シ連翹ト同服ノ項下ノ癰ヲ治ス

毒

寒痰、虛寒、肺
氣怯弱者、勿用之

畏惡

秦艽、莽草、礬石ヲ畏
烏頭ニ反シ桃花ヲ惡

附方

燥痰ノ嗽ヲ治、貝母
ノ末ヲ砂糖ニ和シ丸

シ合、惡瘡ノ口ヲ欬、貝母、燒灰ニシ油ニ調塗、以上大明法、目中磨
翳ヲ去、貝母研末ノ點目、難産及胞衣不出、貝母七枚爲末、酒ニ
テ服ス、以上甄權法、紫白癜、貝母、南星等分爲末、生姜汁ニ合シ
擦、蛇蚋咬傷、咬處ヲ縛テ毒ヲ不行、貝母末、酒ニテ半兩ヲ服ス、
醉ニ至テ良久ノ酒化、水瘡口ヨリ水出盡テ痊、出仁齋直指方、目
生翳、貝母、丁香等分爲末、乳汁ニ調テ目中ニ點ス、出摘方、
牛蒡ハ有毒、且濕痰ヲ燥ス故ニ世人其毒與燥ヲ恐テ

愚案

古方中ノ半夏ヲ貝母ニ代テ用者アリ、蓋半夏ハ辛温

脾胃家ノ濕痰ヲ燥ス、貝母ハ辛寒、肺家ノ燥痰ヲ潤化ス、其位其
功天淵異ナリ、豈代用ベケンヤ、肺ハ燥熱ヲ惡、脾胃ハ寒濕ヲ惡、故
寒濕痰食積痰、脾胃濕痰、腎虛邪水、溢痰、痰世、痰嘔、痰厥、頭痛等ハ
辛温ノ痰藥、半夏、南星、天麻、蒼白朮、茯苓ノ類ニ宜シ、此ニ貝母ヲ代用
ハ濕瀰旺シ、痰加甚カラス、凡古人ノ方ヲ製スル各、主トスル所
アリテ、或ハ半夏ヲ用テ肺家濕痰ヲ燥シ、或ハ貝母ヲ用テ肺家ノ
燥痰ヲ潤ス、然ニ其方意ノ本旨ヲ不知、古方中ノ半夏ヲ以テ
貝母ニ代用、則方劑ノ所向ヲ異ニシ、所治ノ寒温ヲ過ニ反テ害ヲ致
サン
修治
黄白色ニシ輕皺ヨリテ兩ニ劈ハ中ニ米粒ノ如者、
顆アルヲ良トス、其中ノ米粒ノ如者、蒂トテ去テ
剉、糯米ト同様炒テ、米ノ炒タル度トシ、米ヲ去リ用テ、或ハ姜汁ニ浸焙
用、則大ニ結痰ヲ開、蒙筌曰、黄白輕鬆者ヲ爲良、油ツキテ黑色

重硬者勿用之。皺ナク夕圓兩ニ不劈中ニ米顆ナキ者ハ禁服此
 フ丹龍睛ト号。誤服スレハ筋脉永不收若此毒ニ中者ハ黃精小
 藍汁ヲ合服スレバ愈。今藥店ニ小者ヲ上品トシ。大者ヲ下品
 トス。然レ本草ニ以其大小辨スルコトナシ。本草原始ニ土貝母ア
 リ。頗類栗仁色黃白治馬ト云。此ガ形類栗仁ト云則大者ナリ。然
 則藥店ニ大者ヲ下品トスルハ土貝母ニ類似スルコトヲ嫌ガ故乎。
 惟形ノ大小不可拘。黃白色ニメ。輕皺ヨリ。劈ハ兩片ニ分テ中ニ
 一顆アル者ヲ佳トスヘシ。尤モ懸壞者ハ擇捨ヨ

廣益本草大成卷之五終

廣益本草大成卷之六

浴下

法橋

岡本爲竹一抱子

撰

肉菰蓉



其酸鹹微温。壯陽強陰。暖腰膝。治腰
 痛。癢。瘦。精。遺。白。濁。尿。血。帶。下。崩。漏。

止痢益龍治陰痛。男女有子。△此草ノ生時似肉。此ガ補ト雖從
 容トノ不峻。故ニ肉菰蓉ト号。從容ハ和緩。貞壯陽強陰。肉菰蓉
 ハ命門陽氣不足ヲ温補シ。且精血ヲ温潤ス。故ニ五勞七傷ヲ補。男
 子ノ陽痿ヲ興シ。女人ノ子宮ヲ温潤ス。暖腰膝。治腰痛。腰膝ハ身
 ノ大關節。腎氣ノ所至也。肉菰蓉ハ腎部ノ陰陽俱ニ温補ス。故ニ暖
 腰膝。治腰痛。尤腎熱ノ腰痛ニハ勿用。下焦虛冷ノ者宜用之。其症必
 腰膝冷痛ス。癥瘕。肉菰蓉ヲ以テ。下焦ヲ温潤則陽行。精行。血流
 清。血温行則帶血自流。テ癥瘕愈。然レ瘀血ノ實滯ニ屬者。獨此ガ

カニ不及。惟行血ノ劑ヲ以テ治ス。下虛ヲ主トシテ從者尤凡
宜之。洩精精自洩ル者ハ下氣ノ不足タレ也。遺瀝小便餘瀝ハ
腎部ノ陽虛タレバ也。白濁尿血帶下崩漏皆下元虛冷ニ屬者
用之。止痢瀉痢久シテ下焦虛寒スルニ因テ不愈者用之。下氣ヲ温
補則止。益髓髓ハ骨中ノ液也。腎精ノ充ル所ナリ。肉從容。腰腎
潤精則髓自益テ骨力盛ナリ。治陰痛男女前陰或痛或寒熱
者ハ多ハ下焦ノ虛ニ屬ス。然レドモ亦下焦ノ實火ニ因者アリ。肉從
容ヲ不宜用。下焦虛寒者宜用之。今男女有子。凡天地ノ萬物ヲ
生ズル。乾元ニ資テ始リ。坤元ニ資テ生ズ。元ハ何ゾヤ。一元ノ陽氣也。
天ハ以陽始生地ハ以陰生育スト雖トモ獨陰耳。生生育スル不
能。陰中ニ温陽ノ一氣ヲ存シ。温潤ノ地ヨリ物ヲ生育ス。故ニ人ノ種
子孕テ。男女ノ精血ニ因テ。雖トモ男子ノ下焦ニ温陽ノ一氣不能種子

女子ノ下焦ニ温陽ナクハ育テ不能。是以テ肉從容ノ藥ヲ以テ
育ニ入リ。酸ヲ以テ補血。甘ヲ以テ補精。温ヲ以テ下焦ヲ温。則精血
温ニ潤ヒ。下焦温暖ニ資始テ生ズル。男女乾坤ノ元氣盛ニ。男ハ能ク
種シ。女ハ能ク孕テ胎育成シ。別錄曰。益精氣多子。以氣之深。種
肉從容ハ精血ヲ補ノ功アリト雖トモ。實ハ命門ノ真陽ヲ
温補者也。下焦温則從之。精潤血流。補精血者ハ補命門ノ
餘カ也。使藥 人參。鹿茸。白膠。杜仲。補骨脂ト合シ。腎虛ノ要。補陽
補也。使藥 痿ヲ治ス。肉桂ト合シ。命門ヲ補。熟地黄ト合シ。精ヲ
補。腎熱ノ強陽者勿用。○多。畏惡 鐵器ヲ忌ム。勿犯之。○
毒 用久服則太便泄ヲ致ス。肉從容ヲ用生。中ノ絲
縹ヲ去用。若不去之。人ノ心補。附方 腎虛白濁。肉從容。鹿茸。山
二隔リテ氣不散。ト氣セシム。藥。白茯苓等分。爲末。米

和言... 卷之六

〇二

爛三ノ梧子ヲ大サニ丸ニ煉湯

愚案

宗奭曰入藥少則不效ト愚案ニ肉蓯蓉ハ温ニ不熱

三ノ二十九ヲ下ス。出聖濟總錄

補ノ不峻其功從容ナリ。故ニ少則不效ト。然レトモ丹溪曰驟用反

動大便滑也ト。此兩說皆其中ヲ取ベシ。必シモ多用ヘキニ非ズ。必シモ

少用ヘキニモ非ズ。惟病ノ輕重。陰陽ノ虛實ニ從テ。或ハ少用。或多用

ベシ。好古曰凡服蓯蓉以治腎必妨心ト。此モ亦一隅ニ執スルノ說

水剋火ノ義ニ從者乎。腎既ニ不足者用之補ト云トモ何ノ餘力

アリテ妨心ヤ。若或ハ此義アリテ。藥品相制ノ其節ヲ得バ。何ア妨心

コトアラシヤ。章宜曰藥配合

修治

酒ニ浸コト一夜。沙土ヲ去。淨甲

宜陰陽交制亦何妨也。裏ニ在。新條ノ如キ白膜一重ヲ去。日ニ乾焙用ユ。○蒸コト半日シテ

酥ヲ塗焙。或ハ蜜ヲ塗焙用コトアリ。○肉蓯蓉皮ハ松栢ノ如ク鱗

甲アリ。形肥大柔韌如皮者佳。乾枯瘦小者劣レリ。○李中立曰。肉

蓯蓉今人多以金蓮根。州蓯蓉。嫩松脂。鹽潤充之。賈利ト。今所渡

者。塩ニ潤テ鱗甲アリ。詳ニ眞偽ヲ辨ノ可ナリ

列



本綱 其温 ○治男子五勞七傷補腰腎令

當 事不興 ○州蓯蓉也。巖石ノ上ニ生シ。藕根ノ如シ。此ガ功能木低肉

蓯蓉ト同。肉蓯蓉ヨリモ功力殊ニ劣レリ。製法ハ肉蓯蓉ト同シ

瑣



其温 ○大補陰氣益精血利大便虛

養筋治痿弱 ○輟耕錄曰功力百倍於蓯蓉也 ○愚案ニ肉蓯蓉只

下焦ノ陽ヲ補シ。鎖陽ハ下焦ノ陰ヲ温潤ス。故ニ丹溪曰。小燥結者

勿用ト。蓋下焦津潤ニ過則反テ大便溏泄ノ患アルヲ以テ ○洗

淨之上ノ薄皮ヲ去。切晒乾用。○案ニ入門ニ肉蓯蓉根爲瓊陽。本綱ノ説ヲ詳ニス。六肉蓯蓉。肉蓯蓉瓊陽ハ同類三種。功力モ大槩同シ。一物ニ非ズ。

麻

本綱



黃

始原



辛甘温。○發表出汗。去邪熱氣。去榮中寒邪。洩衛中風熱。治傷寒除寒熱。破癰積通九竅。膝理治欬逆風毒。脇

痛。斑毒。水腫。風腫。赤目腫痛。温疫。惡氣。温瘧。不仁。產後血滯。調血脉。○其味ハ如麻。其色ハ黃ナリ。故ニ麻黃ト号ク。發表出汗。麻黃ハ手太陰肺。足太陽膀胱ノ二經ニ入ル。肺ハ皮モヲ主リ。太陽ハ身表ヲ主ル。且麻黃ハ氣味俱ニ薄ク。輕清テ浮升ル陽劑ナリ。然モ其狀中空ニ通ス。故ニ麻黃能皮表ニ達シ。汗ヲ出サシム。發汗ノ劑。此ヨリ大ナルナリトス。故ニ秋冬ノ寒涼外ニ閉ノ時ニ非ハ。冬

勿用之。去邪熱氣。一切ノ邪熱ニ非ズ。寒邪其表ヲ閉テ身陽鬱則熱邪トナル。麻黃ヲ用テ發表寒閉ヲ散シ。開則鬱陽伸越ノ熱邪自退去。然則此ガ去熱邪者ハ。直ニ其熱ヲ去ス。非ズ。寒閉ノ邪ヲ散セシムルガ故ニ。邪熱自去コトヲ致ス者也。○麻黃ヲ用テ若汗出テ不止者ハ。冷水ヲ以テ頭髮ヲ浸シ。撲法ヲ用テ止之。去榮中寒邪。洩衛中風熱。管ハ屬血。陰多。寒モ亦陰多。故ニ同類求テ寒邪先管ヲ傷ル。衛ハ屬氣。陽多。風熱モ亦陽多。故ニ同類求テ風熱ハ先衛ヲ傷ル。麻黃ハ管衛中ノ寒風ニ邪ヲ去者也。然トモ寒ハ傷管閉衛無汗鬱熱セシム。麻黃必用ノ劑也。風ハ傷衛動管有汗發熱セシム。麻黃發汗ノ劑ヲ用則汗多亡陽ノ害アリ。何元素謂麻黃洩衛中風熱トスルヤ。蓋風ハ東方寅卯ノ木化トス。木ハ主春生發ノ少陽トス。故ニ風素陽多。然トモ今其化令ヲ候則全陽化トセラレズ。

何如トナレ六扇テ致風身熱涼。夏暑極熱ノ時ト雖ドモ風吹則清涼。足防熱。秋冬涼寒ノ時ハ風尤モ烈然則風ハ生陽行陰生温行涼者ナリ。故ニ古今連テ風寒ト云者是ナリ。由テ愚案ニ感風感寒俱ニ其初ハ涼寒束表無汗表鬱ノ生熱鬱熱既ニ生則風化ノ本性ヲ發シ表疎ノ汗出寒ハ本ヨリ陰閉タルガ故ニ鬱熱既ニ生スト雖ドモ惟束表汗出ルトナレ。若其風邪甚者ト秋冬陰時ノ涼寒ト並行ハ烈風ト鬱熱既ニ生スト雖ドモ本性ノ陽ヲ發セズ。惟束表汗出テアルコトナレ。故ニ風症必非有汗風症必非恐麻黃風甚ノ發熱スレドモ無汗者ト。秋冬陰時ノ涼寒ト並行ハ寒風束表無汗發熱者ト。麻黃何ノ恐ルトカア。元素謂洩衛中風熱ト。風邪束表發熱シ無汗者ヲ治スノ義也。一切ノ風症ニ通用スト覺六カス。仲景ノ麻黃湯ハ傷寒ノ表劑ナリ。桂枝湯ハ傷風ノ表劑ナリ。

然レトモ仲景必シモ風寒ヲ以テ不_レ分_レ之。有汗麻黃湯無汗桂枝湯トス。惟汗ノ有無ヲ以テ辨_レ之。麻黃ハ發表發汗ノ良劑必シモ風寒ヲ以テ勿_レ辨_レ之。惟汗ノ有無邪氣ノ表裏輕重氣血ノ虛實時ノ寒温ニ從テ宜用之。治傷寒傷寒ニ即病不即病アリ。九月ノ霜降以後ニ發者ヲ即病トス二月春分以後ニ發者ヲ温病トス。五月夏至以後ニ發者ヲ熱病トス。温病熱病ヲ不即病トス。麻黃ハ秋冬即病正傷寒ノ陽症太陽ノ表症ヲ治ス。蓋秋冬涼寒ノ邪束表陽ヲ鬱セシメテ邪熱トナリ。邪熱傳經行者其寒邪膚皮ニ在。邪熱太陽經ニ在テ發熱惡寒頭疼項急身痛脉浮緊無汗者用之。發散ス。仲景麻黃湯是也。夫麻黃ハ辛温發表第一ノ藥ナリ。彼正傷寒ハ時涼寒ノ令盛ニ行テ人身ノ表氣閉塞ス。此時感ノ即病者ハ發熱スト雖トモ寒邪在表束故ニ用之。温散發表スルニ宜シ。彼温熱

病ハ秋冬感寒不即病時ヲ過テ春夏暖熱ノトキニ發則太陽ノ表症ト雖モ時温熱ノ令外ニラコトハレテ。人身ノ表氣發易シ其感不トコロノ寒邪モ亦時ヲ越テ久トキハ秋冬即病者ノ如ニ非ス故ニ不即病ノ表症太陽ニ在者ハ辛冷ノ劑ヲ以テ發表ヲ輕ク麻黃辛温發表ノ專ニナレ者ヲ用シ不及ナリ。仲景麻黃湯ハ即病ノ表症太陽ニ在者ヲ主ノ劑ナリ。不即ノ温熱病ニ用ユベキ方ニ非ス然ラ後世謬テ春夏温熱病ノ表症ニ麻黃湯ヲ用ハ少ク寒藥ヲ加ヨト。活人書夏至後加石膏知母ト皆仲景立方ノ本旨。傷寒ノ病由ニ未達ノ誤リ。王安道獨辨之明ナリ。愚モ亦從テ病因指南ヲ撰ノ解之詳ニス。○或問。世ニ謂ル麻黃ハ發汗桂枝ハ止汗ト然レ在仲景傷寒發表ノ麻黃湯ノ中ニ桂枝アルハ何ソヤ。曰麻黃發汗桂枝止汗ト。味者ノ説ナリ。此仲景謂存汗不得服麻黃

無汗不得服桂枝ノ言ヲ過テ云ノニ。此麻黃桂枝ノ藥品ヲ云ニ非ス。麻黃湯桂枝湯ノ發表ノ輕重ヲ以テ治療輕重ノ法ヲ示ス者也。詳ニ桂枝ノ條ニ記ス。考視ヨ。○或問。一曰客アリテ曰麻黃ハ手太陰肺經足太陽膀胱經ノ藥ト雖モ實ハ肺經ノ本藥タリト然分不モ。曰此說時珍發明ニ出。時珍曰麻黃乃肺經專藥故治肺病多用之ト。蓋麻黃ハ風寒ノ邪在表無汗者用之。仲景麻黃湯ノ意モ亦是也。夫津液ノ行營者ハ爲血行衛者ハ爲汗。若寒邪傷營津血内ニ滯テ外衛分ニ達スルト不能衛氣爲寒閉ラレテ表津外ニ不行故ニ無汗發熱惡寒ス。此邪氣皮膚ニ在テ衛氣塞ル皮膚肺ニ屬シ。衛氣ハ肺ノ主トス。此時發熱惡寒頭痛項急ノ證太陽ニ屬スト雖トモ實ハ邪氣ヲ受ル所ハ肺部ニ在リ。故ニ其症中ニ面時赤。欬嗽痰喘胸滿アルハ肺病ナリ。治スニ仲景麻黃湯ヲ用ユ。

麻黃湯ハ太陽發汗ノ重劑ナリト雖上モ實ハ肺部ノ熱鬱ヲ發散スルノ藥也然則麻黃ハ肺經ノ本藥タルコト明ナリトス實ニ李時珍ガ發明ナリ愚案ニ麻黃湯ノ症ハ其本肺部ニ繫テ其末太陽ニ在麻黃ハ肺經ノ本藥ニテ太陽ニモ亦行者ナリ然レ麻黃ハ肺ノ本ニ行者ニ非ズ肺ノ標ニ行者也本ハ藏也標ハ其經ト與合ラ云肺ノ合ハ皮膚及衛氣ナリ除寒熱風寒ノ實邪在表寒熱者用之有汗勿用破癥積麻黃ハ氣味辛温ヲ發開シ其狀中空ニ通行ス故ニ癥瘕積聚ノ壅實ヲ破通ス然レトモ寒結ノ者ニ非バ妄ニ勿用通九竅腠理麻黃ノ中空ナルヲ以テ九竅ヲ通シ且氣味辛温輕浮ニ腠理汗孔ヲ開通ス治欬逆風毒欬逆ハ咳嗽也喘逆ニ非ズ風寒表ニ實スルノ欬逆及風寒ノ毒表ニ實スル者俱ニ用之脇痛風寒實邪在表脇痛者用之痲毒尋常ノ痲症ニハ

非ズ風寒ノ邪毒表ニ鬱實スル者用之妄ニ用バ痲爛ノ患アリ水腫風腫風水水腫俱ニ治ス偏ニ水耳ヲ腫者ヲ水腫トシ水ニ風ヲ兼テ腫ル者ヲ風水トス風水ハ上先腫水腫ハ下先腫ル按テ不起ハ風水起ル者ハ水腫ナリ風水水腫ノ症水寒甚表ニ閉實ノ腠理不發者或用之腠理ヲ發シ寒實ヲ散シテ衛氣行則痊ルコトアリ惟衛氣ノ虛實寒風ノ輕重腠理ノ開闔ヲ詳ニ用之妄ニ投スコト勿レ赤目腫痛風寒ノ實邪ニ因テ眼目赤腫痛者用之温疫温疫症不正ノ風寒表ニ實スル者用之尤凡秋冬ノ疫症表ニ在者ヲ主ル惡氣一切不正ノ惡毒具氣ニ感シ其邪表ニ實スル者用之温瘧不正ノ瘧瘧ヲ云此モ亦秋冬ノ間涼寒ノ邪在表者用之不仁風寒ノ實邪在表氣血此ガ爲ニ閉澁ノ不仁者用之産後血滯産後ニ風寒ヲ感シ邪氣表ニ實ノ血滯スル者用之然レトモ産後ハ氣血ノ

大虚ニ屬ス。實邪アリト雖ドモ。麻黄等ノ攻劑。安ニ輕シク用ルコト勿レ。通血脉。麻黄ノ中空ク辛温故ニ血脉ノ壅塞ヲ通ズ。然レドモ風寒ノ實邪。表ニ兼ルコト有ニ非ズ。安ニ用コト勿レ。

總槩

麻黄ハ。秋冬風寒ノ邪氣。表ニ閉テ。頭疼發熱惡寒。煩急ノ者。用テ。頭疼發熱惡寒。煩急ノ者。用テ。

之發表出汗ノ良劑ナリ。諸發表ノ劑アリト雖ドモ。此カ汗ヲ出スニ及者アルコトナシ。

使藥

黄芩ヲ佐トス。厚朴。白薇ヲ使トス。時珍。

日佐以黄芩則無赤眼之患ト。桂枝ト合。

毒

秋冬涼寒ノ月ニ非ズ勿用。秋冬。

月。寒邪在表。太陽ノ症ヲ見ト雖ドモ。有汗者ハ勿用。○秋冬ノ月。風寒邪在表。發熱惡寒ノ雖無汗。不頭痛身痛項急。脉浮緊者ハ不可用。或此諸證ヲ具テ。汗ノ證ト雖ドモ。邪ノ輕重。脉ノ強弱。人ノ虚實ヲ考テ用之。○麻黄ハ多服スルコト勿レ。汗多亡陽ノ患アリ。

○傷寒表症可汗症ト雖ドモ。多服ノ汗ニ過則心血動。陽亡血溢テ壞症トナル不可不慎。○尤ニ表虚。自汗盜汗。陰虛。肺虚。及平素陽虚ノ腠理不密者。皆禁用。○脉浮虚。沉微細弱。伏者勿用。○麻

黄ヲ用テ汗ヲ出ス者ハ出入ヲ止テ風ヲ避ベシ。其表ノ開ニ乘ノ風寒復入テ病再發スル者ハ難治。

畏惡

忌鐵。辛夷。石韋ヲ惡ム。○麻黄ハ煮ト數沸ノ沫ヲ抹去。沫ハハラノ煩心セシム。○麻

黄ハ陳久ノ者ヲ用ニ新者ハ烈多汗ヲ出スニ大過ス。○麻黄ハ根節ヲ去ベシ。根節ハ及テ汗ヲ止ム。

附方

麻黄湯。麻黄二錢。桂

枝一錢三分。甘艸六分。杏仁十箇。水ト盞半。先麻黄ヲ煎スルコト一沸ノ上沫ヲ去。次ニ餘藥ヲ下シ。八分ニ煎ジ。温服ノ汗ヲ出ス。此仲景冬月正傷寒。太陽ノ表症。頭痛發熱惡寒。身疼。腰骨節不利。喘ノ無汗。脉緊ナレ者ヲ治スルノ方也。○李時珍ガ綱目ニ麻黄ノ

附方數品アリト雖トモ皆古ノ上工病ノ真ニ通ノ用ル所ノ者ニ
 今ノ人ノタヤスク用ス者ニ非ズ故ニ畧ノ更ニ麻黃湯ノ一方ヲ
 附スル
愚案 發表ノ藥品多ト雖トモ麻黃ノ發汗ニ及者アルト
 ナキ所以ハ何ソヤ蓋麻黃ハ自中空ニ筒ナリ

且性温ニ味辛射輕レ其輕ト與辛ヲ以ハ表ニ達シ其空筒與辛
 温ヲ以ハ能汗孔ヲ開ク他ニ辛温發表ノ者アリト雖トモ如此空筒ニ
 シテ輕キ者アルトナレ故ニ麻黃ノ根節反テ止汗根節ハ中實重
 ニ空輕ナラザルヲ以ナリ其空ハ發汗實ハ止汗ノ理然ルコトヲ不期
 然リ此生物ノ天然ニ由テ人ノ能致ス所ニ非ス○繼洪云
 有麻黃之地冬不積雪ト此辛温發散ノ性烈コトヲ知ベシ
 陳父ノ者ヲ擇テ銅刀ヲ以テ頭根節ヲ切去煮ルコトニ三沸ノ沫
 フ取捨對テ日ニ乾シ焙用ユ○本綱ニ麻黃ノ鐵ヲ忌コトヲ言ス然

修治

トモ原始ニ用銅刀細割ト云則此ガ忌鐵コトヲ知ニ足リ○麻黃ヲ煮
 テ沫ヲ取ノ法弘景ハ十餘沸トス蒙莖ハ惟數沸ト云原始ハ煎ニ
 四十沸竹片涼去上沫盡漉出熬乾用ト湯液ニ熬一二沸ト數
 說不同愚案ニ此ガ毒ヲ恐テ數十沸スル者是多リト雖トモ煮テ數
 十沸則恐ク此ガ氣味ヲ脱シ其功能ヲ失シトヲ故ニ原始ハ三四
 十沸ノ沫ヲ取去ナラ漉テ沫ヲ盡去其煎汁ノ清者ヲ以テ再麻
 黃ヲ煮乾シ煎汁ヲ麻黃ニ熬ツテ其氣味ヲ全クセンコトヲ欲ト
 雖トモ此モ亦遂ニ其氣味ノ素ヨリ存スル者ヲ失フコトヲ致ベシ麻
 黃ハ氣味輕清ノ者タリ恐毒妄ニ製ヲ過サバ其氣味ヲ失フコトナ
 クバラス且麻黃ヲ用ル所ノ者ハ實邪盛ニ病ノ急症ナリ其氣味
 性功ヲ脱薄失治療ノ善ヲ盡コト不能惟湯液ニ謂ニ三沸ノ
 說ヲ以テ得タリトスベシ

麻黃根節其平○止汗氣虛血虛脾虛陰虛中暑亡陽ノ症自汗盜汗者皆用之麻黃根能周身肌表ヲ行テ諸藥ヲ引テ衛分ニ至リ。腠理ヲ固メ止汗ノ良劑ナリ。當歸六黃湯ニ麻黃根節ヲ加ニ盜汗ヲ治ス。ト尤捷シ。或ハ麻黃根節ヲ粉ニ絹袋ニ入レ皮毛ニ攪テ止汗ニ神也。修治ハ右ノ麻黃ノ製法ト異ナルコトナシ。

乾地黃



其微苦寒○涼血生血補腎水真陰ヲ填骨髓長肌肉利耳目主掌中足下熱痛煩熱吐血衄血尿血便血唾血。

崩中帶下。産後腹痛血運皮膚燥折跌絕筋痿躄嗜臥驚悸齒痛破惡血通血脉除濕熱通大腸結燥治骨蒸勞熱熱喝○地黃其色黃生者ヲ以テ水中ニ浸テ驗ニ水面ニ浮者ヲ天黃トシ半浮半沉ノ者ヲ入黃トシ水底ニ沉者ヲ地黃トス入藥沉者ヲ用ユ。

浮者ハ不宜用。地黃ノ名義是ニ因也。涼血生血補腎水真陰後世ニ謂ル生地黃ト。本艸ニ謂ル生地黃ト不同。本艸ニ所謂生地黃ハ新ニ掘テ其儘ニ用者ナリ。別錄曰生地黃者乃新掘鮮者故其性大寒ト。今ノ所謂生地黃ハ掘取テ其儘ノ者ニ非ズ。生地黃ヲ耕日ニ干乾ス者ナリ。熟地黃ニ對シ此ヲ生地黃ト云ト雖トモ實ハ眞ノ生地黃ニ非ズ。如此日ニ乾者ハ本艸ニ呼テ乾地黃トス。然則今ノ謂ル生地黃ハ本艸ノ乾地黃也。余古例ニ從テ乾地黃ト呼テ生地黃ト共ニ視者此乾地黃ハ即世ニ云フ生地黃ノ性功多クトヲ知ベシ夫レ地黃ハ手少陰心足少陰腎手厥陰心包足厥陰肝經ノ藥ナリ心ハ南方ノ離タリ。離中ノ一陰生血即心血トス手厥陰ハ心ト屬メ不異肝ハ藏血腎ハ北方ノ水藏精血ノ本源也。血與精各ヲ異ニシ。色ヲ別ニスト雖凡俱ニ屬陰同水類多。故ニ血盛則精盛。精盛則血盛。其衰

亦互ニ相從者也。地黄ハ北方純陰ノ水性ヲ稟テ生ス。且味甘ハ宜
 補陰其性寒ナリ。故ニ血熱ヲ涼シ。陰血ヲ生ジ。腎水眞陰精ノ不足
 フ補フコトヲ得タリ。實ニ心肝ノ血虛血熱腎藏ノ水虛火旺ノ症。此
 フ外ニ不能治。或問地黄ハ補陰涼血其補與涼何カ勝ル。曰乾
 地黄ハ涼ニ勝。熟地黄ハ補ニ勝者也。何如トナレバ。血ハ陰ヲ以テ
 純陰ニ非ズ。南方ノ陽ヲ兼テ血道盛ナリ。故ニ血色赤。精モ亦陰ヲ
 ト雖純陰ニ非ズ。陰中必一陽ヲ存ス。即坎中ノ陽也。故精不凝。滑ニ
 腎藏ノ色黒中ニ赤ヲ兼テ紫也。是以精血ヲ補者ハ陰劑ヲ以テ
 ト雖純陰寒耳。トハ不足潤之藥。質ハ陰ニ。味甘。性ハ温者ヲ
 以テ温潤スルニ非バ。精血陰液ヲ不能補。視ヨ水ハ物ヲ潤ト雖トモ
 凝氷ノ水ハ不能潤。故ニ地黄ノ質潤濕ニ重ク。陰ノ象アリト雖トモ
 地黄ノ性惟寒ナルノ三譬ハ氷水ノ如シ。純陰ヲ温潤ノ氣ナレ。是以乾

地黄血熱腎火ヲ涼ニ捷。潤補ニ薄シ。然トモ惟涼耳。ト全補ノ義
 ナレト云ニ非ズ。補ハ微ヲ涼ハ盛ナリトス。熱則藥質ノ陰解。藥性ノ
 寒ヲ減。譬ハ氷ノ解テ流潤スルガ如シ。精血ヲ潤補スルニ盛ナリ。然
 ドモ熟地黄ハ惟補耳。ト全ク涼ノ義ナレト云ニ非ズ。涼ハ少ニ補ハ
 大ナリトス。專ラ精血ヲ補ト欲ク。熟地黄ヲ用ヨ。專ラ陰分ノ熱火ヲ
 涼ト欲ク。乾地黄ヲ用ヨ。時珍曰。雖主治證同。而涼血補血之功
 殊異ト。地黄ノ乾熟ニ從テ其治ノ異ナルコトヲ云。填骨髓長肌肉
 髓ハ以テ精血充ス。肉ハ以テ精血肥シ。地黄ハ精血ヲ補ハ也。利耳目
 耳以テ精聰目以テ血明也。地黄ハ精血ヲ補カ故ニ聰明ナラシム。然モ乾
 地黄ハ涼熱ニ勝テ。補ニ微ナリ。精血ヲ補テ耳目聰明ナラシム。ト欲
 ク。熟地黄ヲ用ヨ。乾地黄ハ血熱ニ目赤痛。或ハ翳。或ハ外障ヲ
 生シ。腎熱ト耳聾鳴等ヲ致ス者ニ用ユ。主掌中足下熱痛煩熱此

ヲ五心ノ熱ト云心腎ノ精血虛ノ熱火三陰經ニ旺者也蓋掌中
ハ手少陰厥陰兩經ノ所行足下ハ足少陰經湧泉ノ位胸中煩熱
者ハ陰火衝逆ニ心火ト合テ心熱也陰虛火旺症必五心ノ熱ヲ
致ス治法乾地黄ヲ用テ精血陰分ノ熱火ヲ涼ニアリ○熱痛ハ
俗ニ云熱ヒリソクノ義痛ニ非ズ吐血衄血尿血便唾血崩中陰虛
火旺血熱ニ因テ吐血或衄血出或血ヲ尿ニレ或ハ大便血レ或唾
ニ血ヲ咯或ハ婦人不時ニ經水卒ニ山ノ崩ガ如ニ多ク漏下ル所ノ
崩中ヲ致ス者用之熱火ヲ涼陰ヲ補益血ハ得寒留リ得熱妄行
今陰虛ニ火旺ノ血分得熱動故ニ上竅下竅ニ溢泄乾地黄ノ寒ヲ
以テ其熱火ヲ涼則血自止帶下或ハ腎熱或ハ心熱ニ因テ血熱
引所致ノ帶下ニ用之產後腹痛產後陰虛血熱ニ因テ腹痛
者用之然レ產後ハ氣血俱ニ不足ス尤レ生發春陽ノ氣虛怯ス故ニ

產後ニ芍藥ノ如キ其酸寒收斂ヲ恐テ酒炒ニ用ユ或ヤ地黄ノ純
陰寒性ノ者ヲマ妄ニ施テ重子テ陽和ヲ傷コト勿レ惟瘀血血熱
陽化不虛者ハ少用テ涼之過用スルコト勿レ或ハ酒炒ニ宜ニ
產後ノ血熱衝逆ノ攻心眩暈スル者ヲ云用之其血熱ヲ涼テ皮膚
燥精血不足ニ火旺ノ皮膚燥熱者ヲ治ス折跌絕筋打身蹇折傷
因テ筋ヲ斷絶者用之精血ヲ補ニ宜ニ益筋骨ハ精血ニ從テ養
ルガ故ナリ然レ折跌絕筋ノ症熱ナキ者ハ勿用痿躄生血補精故
也惟其熱ノ有無ニ因テ用之又脾胃ハ主手足中氣虛ノ健者ハ
必地黄ヲ勿用嗜臥精虛ニ火旺レ熱其氣ヲ緩テ嗜臥者ハ用之
又胃氣虛レ或ハ心氣不足ノ嗜臥者必勿用之驚悸腎精與志
肝血與魂ハ心氣與神ヲ藏ス或ハ血虛ノ血熱レ血熱心肝ニ動
神魂不寧或ハ精虛ノ腎熱レ熱其志氣ヲ動テ腎氣不寧者俱

驚悸ヲ致ス。用之。血熱腎熱ヲ涼則其氣寧ニ愈。又元氣不足ノ症アリ。絶テ勿用之。齒痛腎熱血熱ノ齒痛ニ用ユ。破惡血地黃雖破惡血此ガ要能ニ非ズ。瘀血アリテ血熱スル者ハ他ノ破血ノ劑ト合ノ用ユ。通血脈生血破惡血涼血故也。除濕熱元素曰去諸濕熱ト。然レ下切ノ濕熱ニ非ス。血虛腎虛ノ濕熱ヲ除ク。脾胃虛ノ濕熱ニ反テ勿用。通大腸結燥。血熱腎熱ニ因テ大便燥テ秘結者用之。胃虛ノ者ハ禁用。治骨蒸勞熱熱渴。血熱腎熱ヲ涼シ。陰ヲ補カ故ニ勞瘵骨蒸ノ熱及血熱腎熱ノ渴ヲ療ズ。

總案

乾地黄ハ血熱腎熱ヲ涼シ兼テ陰ヲ助ル者也。使藥 酒及ヒ來門冬ヲ得テ良。當歸ヲ得テ補血。木通ト同ノ小腸熱ヲ

毒

諸虛冷ノ胃虛ノ氣虛ノ大便滑ノ不食ノ膈不和ノ痰凝ノ氣鬱ノ升降痞塞ノ陽虛下陷者皆勿用之。

畏惡

銅鐵ヲ忌。葱蒜蘿蔔ヲ忌。此ヲ各テニヨト云。若ニ白ト合服スレバ腎ヲ洩シ髮ヲ白シ榮衛ヲ滯滞ス。又諸血ヲ忌。貝

母ヲ惡。蕪荑ノ畏ル

附方

血 乾地黄。地龍薄荷等分爲末。冷水ニ下。出聖惠方。產後惡血不止。乾地黄焙末。食前

愚案

時珍曰本經所謂乾地黄者乃陰乾日乾火乾者上。愚案ニ陰乾者

尤ヒ寒。專涼熱ニ宜シ。日乾者寒性微減ス。涼熱功。陰乾者三次。火乾ノ者ハ寒性少シ。涼熱ノ功稍衰。故ニ大ニ欲涼熱者ハ陰乾ヲ用。惟尋常ニ用テ涼熱ニ日乾ニ宜シ。甘寒恐妨胃。日乾者ヲ復酒ニ浸焙。乾テ用ユ。或ハ膈滿不食痰家ニ。日乾ノ者ヲ生姜汁ニ浸。焙乾テ用ユ。好古曰。日乾者平。火乾者温トハ誤也。日乾者寒ニ陰乾ノ寒ニ次。火乾者ハ寒性減スルノミ。何ゾ平。或ハ温トナルコトヲ得。時珍

日乾用則涼
此說近之
修治 地黄ハ掘取ニ新根ヲ宜トス宿根ハ肥大ナリト
維氏腐テ不宜凡地黄ハ沈水者ヲ宜トス然レ

取テ米泔水ヲ以テ土砂ヲ洗淨シ其色黃白ニ成ホド洗テ刀ヲ
剉或ハ陰乾日乾ニス或ハ用時再焙乾テ使コトアリ
冬月掘取洗淨シ風ヲ透處ニ置テ陰乾ニレ春ヲ越レ能乾キテ中
黃ニ外白ノ宜トス
○姜製ハ膈痰ニ不泥
○酒製ハ不妨胃
○今ノ
藥店ノ者ハ山城大和ヨリ出ス然レ冬月取テ或ハ席中ニ包春ニ至テ
枳濕時上沫ヲ掛或ハ鍋内ニ置テ熱水ヲ沃テ灰ヲ拌晒乾テ其
斤兩ヲ增者也天ニ藥性ヲ損不可用如此者ハ再洗ト雖ニ惟
黒ニ黃色ナレコトヲ不得
○藥鋪ニ白乾ト呼者忌鐵且灰ト末ヲ
不拌黃白ヲ宜シ醫求之擇用ヨ

熟地原
始



其微温
○生精血滋腎水益真陰
填骨髓長肌肉補五藏不足通血脉利

耳目黑鬚髮去癩腹急痛病後瀉股痛目運調經候胎漏胎前
百病
○生精血滋腎水益真陰
右ノ乾地黄ニ辨スル如ク生地黃
氷水ノ如シ熱地黄ハ氷ノ解テ潤ガ如シ故ニ乾地黄ハ火ノ涼ニ
長ノ陰ヲ補ニ微ナリ熱地黄ハ温潤ノ能諸血諸精腎水真陰ヲ補
益スルニ長セリ此モ亦除熱ノ功ナレト云ニ非ス然レドモ除熱ノ功ハ
微ニシ生地黃ノ寒ニ不及錢仲陽六味丸ニ此ヲ主トシ腎陰ヲ補
四物湯ニ此ヲ君トシ血ヲ補血虛精虛一切陰虛ヲ補者ハ此ヲ外ニ
スコト不能易簡方曰熟地黄能補精血又云男子多陰虛宜用熟
地黄女子多血熱宜用生地黃此乾地黄涼熱熟地黄補陰ノ
主劑タルコトヲ示ス填骨髓長肌肉此二句右ノ乾地黄ノ條ニモ存

本草綱目卷之六
地黄

セリ。然レモ乾地黄ノ填骨髓長肌肉者ハ涼血熱腎熱ノ餘助陰
 コノ功アリ。熟地黄ハ能補能潤シ骨髓肌肉ヲ填長スルノ功大
 シ。乾地黄ノ及ベキニ非ズ補五藏不足精ハ腎ノ三有ニ非ズ。諸藏
 腎精アリ。五藏不足トハ五藏ノ精虚ヲ補ナリ通血脉利耳目此
 二句モ亦右ノ乾地黄ノ條ニモ存セリ。然トモ彼ハ涼血熱破惡血
 微助陰通血脉利耳目者モ血熱腎熱ノ耳目病ヲ利ス。熟地黄ハ
 能精血ヲ補テ通血脉腎虚血虚ノ耳目病ヲ治ス。補血明目補
 精聰耳スルノ功ハ熟地黄ニ在ノ三黑髮髮精血ノ滋補スルガ故也
 去臍腹急痛臍下腹痛急迫スル者ハ腎虚ニ属ス用之補ニ宜シ元
 素曰臍下痛属腎經非熟地黄不能除病後脛股痛補陰故ナリ
 目運陰虚ノ頭目眩暈レ或ハ坐ノ起ント欲スハ目瞤ハトノ不見者
 ヲ治ス若陰虚火旺ヲ然ハ乾地黄ヲ用ユ調經候婦人血虚ノ

經水不調者ヲ治ス治胞漏產前ニ胞胎漏下スル者ハ多ハ血虚ノ
 胎ヲ不養カ故ナリ古人譬之實客來テ如不供食客怒去ニ似ナリ
 トス熟地黄能補血故ニ胎漏ヲ止然トモ胎漏ノ由多端ニ獨血虚
 ノニナラス詳ニテ治療スレ胎前百病胎前ノ病ハ惡破血ニ爲補血
 故ニ産前ノ百病諸治ニ多ハ此ヲ兼用テ補血胎産ヲ助ク以上六
 本細熟地黄條ニ以所述記之然モ愚案ニ右ノ乾地黄ニ於テ掌
 中足下熱痛煩熱吐血衄血尿血唾血崩中帶下産後腹痛皮膚
 燥折傷絶筋痿躄嗜臥大腸結燥骨蒸勞熱ヲ云此諸症盡陰虚
 ヲ主トス何故ニ獨乾地黄ノ主治ニ任ス熟地黄ノ條ニ不述之ハ蓋
 古人別ニ熟地黄ノ功ヲ不述惟乾地黄ノ功ヲ辨セリ時珍ニ至テ始
 テ乾生熟ノ二條ヲ別故ニ熟地黄ノ主功細ニ盡カル者アリ掌中
 足下ノ熱痛ヨリ骨蒸勞熱ノ四十二字ハ乾生熟ニ宜キ所ノ三

症アリ。皆其因ハ陰虛熱旺ニ屬スト雖トモ。陰虛ヨリ熱旺ノ勝者ハ
乾地黄ニ宜シ。其火熱ノ旺熾者ハ生地黃ニ宜シ。熱旺ヨリ陰虛ノ
勝者ハ熟地黄ニ宜シ。乾地黄ニ所進其五心真熱

總藥

熟地黄
ハ能精

大腸結燥。骨蒸勞熱者ハ反テ熟地黄ノ治症ニ多シ
血ヲ補除熱諸陰

使藥

牡丹皮當歸ヲ得テ和血生血涼血滋
陰補髓。肉桂附子ヲ得テ腎藏。虛冷

ヲ温補ス。黃蘗知母ヲ得テ腎火ヲ涼シ。茯苓肉蓯蓉鹿茸山萸
五味ト同ノ能男精ヲ益。人參遠志麥門冬酸棗仁栝子仁茯神耳
艸ト同ノ心虛驚悸怔忡健忘ヲ治ス。女貞甘菊枸杞菘菔ト同ノ
能明自益精氣。連連翹薄荷甘艸甘菊木通ト同ノ暴ニ眼赤痛ヲ
治ス。砂土沉香ヲ佐トス。六氣ヲ腎ニ歸セシム。附
子ヲ使ス。其氣不滯シテ能ク歸腎。下焦ヲ温ム。**毒** 右ノ乾地黄ト
同シ。○胃氣味

弱者尤

畏惡

銅鐵器ヲ忌。三
白。諸血ヲ忌

附方

黑髮固齒地黄蒸ニ膠コト
三度搗テ爲小餅。一枚ヲ

喻。神藥院方。無神散婦人産後ノ塊。或ハ經水ノ後。腹痛。少調者

熟地一斤。陳生姜半斤。同炒乾爲末。每服一錢。温酒ニ下。出婦人

良方

或問。好古曰。熟地黄假火力蒸九數。故能補腎中元氣

思案

ト然ヤ否ヤ。曰。此說不宜。夫地黄ハ本寒ナル。此ヲ蒸熟

則平中ノ微温トナルベシ。然其甘潤重質ナラ。乾生ノ地黄ヨリ盛ナリ
何以カ元氣ヲ補ノ義アリシ。蓋熟地黄ハ陰ヲ補コト盛ニテ除熱ノ
功ハ不盛。且其性平中ノ微温トナルヲ以テ。六ニ陽氣ヲ不損而已。
此ガ兼テ補氣トセバ。害アルコト不レ。又問。乾生地黄ノ凉熱。熟地
黄ノ除熱ト別アルコトヲ問。曰。乾地黄。與生地黄ノ凉熱。各有ハ
譬。寒雪ノ炎。夏有二勝ガ如シ。熟地黄ノ除熱者ハ水ヲ生ノ火ニ勝

レムルノ義

修治

肥大ニシテ沈水者ヲ擇テ竹刀ヲ剉好酒ニ砂
 也不得同
 仁ノ末ヲ拌テ地黄ヲ浸濕ラシ。柳木ノ醜ニ入
 テ瓦鍋ノ内ニ水ヲ盛醜ヲ掛テ蒸之。蒸氣地黄中ニ透時マダテ
 眼乾シ又蒸コト如此九蒸九眼ス。蓋酒蒸眼乾ノ地黄ノ純陰ヲ
 制シ砂仁ノ末ヲ以テ地黄ヲ滯滯シラシム○一法ニ地黄中ニ
 黑豆ニ二三粒ヲ拌瓦鍋ニ酒ヲ盛テ酒蒸ニス。豆柔ニ蒸タル時ヲ度
 少眼如此スルコト五六度ニ宜ト○或ハ生地黃浸酒一宿ノ湯水
 ニテ蒸コト三時ノ日ニ乾。又浸酒一宿如此蒸乾コト九度ス○或ハ
 誤テ醜中ニ酒ヲ灌テ水蒸ニシ。或ハ酒蒸ニシ一日ノ間ニ九蒸シ。或ハ
 水與酒合同スニテ蒸。或ハ直ニ酒ニテ煮ル者アリ皆不是○痰滯
 不食腸滿ノ者ハ熟地黄再蒸汁炒ス○熟地黄再酒炒ニスバ不
 妨胃○案ニ地黄製不同蘇頌ハタトハ地黄三十斤ヲ製共六別

三十斤ノ生地黃汁ヲ調浸之。水蒸ニシ曝シノ又地黄汁ニ浸蒸。地
 黃汁ノ盡ヲ爲膏雷敷ハ伴酒蒸時珍。李士材ハ砂仁ノ末ヲ合ノ拌
 蒸トス。俱ニ蒸コトハ皆湯水也。今和ノ時師多ハ酒蒸ニス。軒岐救正論
 今入酒蒸非也ト。惟直ニ浸酒水蒸ニスヲ以テ宜ニスベシ

生地黃 大寒○治婦人胎中血不止。產後血上薄心悶。絕傷身
 胎動下血。胎不落。墜胎。崩。瘀血留血。鼻衄。吐血。皆搗飲。別解
 諸熱。通水道。搗貼心腹。能消瘀血。○此新ニ地黄ヲ搗取テ蒸者
 ヲ以テ生テス。今生地黃ト云ハ前ノ乾地黄也。此ト不同。眞ノ生地
 黃ハ大寒ニシテ偏ニ血熱腎火ヲ冷シ。大ニ陽氣損氣ヲ損。古人多クハ
 搗テ其汁ヲ用ユ。宗奭曰若與生地當慮大寒

牛膝



雄 雌

苦酸微温○盛筋骨寒濕痿痺腰膝
 痛續絕助精血填骨髓月水不利逐

惡血癥瘕。心腹痛。癰腫。惡瘡。金瘡。折傷。淋痛。尿血。血運止。久瘡。墮
死胎。下血。不出。行。休。別。○弘景曰。其莖有節。似牛膝。時珍曰。言其滋
補之功。如牛之多力也。盛筋骨。寒濕痿痺。牛膝八。肝腎二經之劑。凡
肝。主筋。腎。主骨。牛膝八補肝腎。盛筋骨。逐惡血者也。諸功。皆此。三
引。致者。方。且。筋骨ノ間ノ寒濕ヲ去。故寒濕ニ足痿弱。痺痛ヲ
治ス。推曰。主用多在腎。肝下部。上焦藥中。勿入。腰膝痛。腰膝ノ痛
或。寒濕ニ因。或。肝腎筋骨。不足ニ因者。皆用之。續絕筋ノ斷絕
ヲ。繼續ス。助精血。腎精。肝血ヲ補。然。此方滋補ノ功。不。入。漸
用。下。漸。助。之。三。填。骨。髓。非。血。ヲ。助。力。故。也。月。水。不。利。逐。惡。血。故。也。
逐惡血。瘀血。生。用。則。能。去。惡。血。癥瘕。此。亦。逐。瘀。血。故。也。心。腹。痛。
瘀。血。ニ。攻。ラ。レ。テ。熱。者。ニ。用。之。癰。腫。惡。瘡。金。瘡。折。傷。八。撲。傷。也。
此。皆。瘀。血。ヲ。逐。テ。所。治。也。淋。痛。小。使。淋。ノ。莖。痛。甚。者。ヲ。治。ス。時。珍。治。

五淋。其驗ノ神。ト。述。然。モ。通。玄。曰。按。五。淋。諸。症。極。難。見。效。惟
牛膝。一。兩。入。乳。香。少。許。煎。服。數。劑。即。安。尿。血。逐。瘀。血。故。也。血。運。產
後。二。瘀。血。衝。逆。之。候。運。ス。ル。者。ヲ。治。ス。止。久。瘡。癩。久。則。肝。腎。不。足。之。瘀
血。滲。道。ニ。塞。ル。故。ニ。用。之。墮。死。胎。下。胞。衣。麝。香。ト。同。之。墮。胎。甚。捷。之。藥。
子。ト。同。之。胞。衣。ヲ。下。ス。是。以。牛。膝。ノ。下。行。盛。ニ。九。ト。ラ。知。ベ。シ。肉。竹
木。刺。牛。膝。ヲ。嚼。爛。シ。塗。テ。竹。木。ノ。肉。ニ。刺。者。ヲ。出。ス。俗。云。ト。ケ。キ。
藥 肝腎ニ入テ筋骨ヲ盛ニシ。瘀血ヲ逐。精血
ヲ助。下切膝以下。膝脛足ノ諸症ヲ療ス。
使藥 肉桂。蒼朮。同。
腎氣ヲ益得。
毒 下行ノ能。滑。竅。故。ニ。夢。遺。洩。精。○氣。虛。下。陷。○氣。虛。
ヲ。補。ニ。宜。シ。不。漏。故。血。崩。不。止。者。○膝。筋。急。不。能。立。○膝。能。屈。
凡。不。能。伸。者。八。皆。禁。用。蓋。酸。味。收。急。ス。バ。也。○
上行。上。焦。ノ。藥。中。ニ。勿。用。○孕。婦。妄。勿。用。
畏惡 惡。龜。甲。畏。白。前。發。火。墜。基。

和語集解 卷之六

思牛 附方 婦人血塊 牛膝根焙為末酒煎之温服入出時後方卒
生惡瘡何氏不識者八牛膝根搗爛之塗出千金方

金瘡痛打身 思案 或問牛膝八腎ノ補氣カ補血ト曰其味
酸ニハ補血其微温ニ補氣ベレト雖トモ蓋甘

酸ハ能補血牛膝ハ苦酸ヲ瀉シ易シ甘温ハ能補氣牛膝ハ苦酸微
温ニ難補故ニ微ク血ヲ補ニ能ク瘀血ヲ逐者也補氣ノ功アル

コト 修治 節大ニ蒸紫根長柔潤者良浸水ト土氣ヲ洗淨シ蘆
頭ヲ去剉日ニ乾後浸酒中乾焙用或ハ浸酒蒸コトアリ

○生ハ下行ノ瘀血ヲ去酒焙酒蒸ハ肝腎ヲ滋補ス○丹溪曰凡
用土牛膝春夏用葉秋冬ハ用根惟葉汁效尤速也○牛膝節細

蒸紫根短堅脆者ハ功カ少シ
○和牛膝ハ苦味盛ニ潤少ノ不宜詳ニ擇用ヨ



大 苦大寒○瀉諸實熱不通破下瘀血
除下焦濕熱蕩滌腸胃治火瘡熱腫
痢疾裏急腹痛痰實宿食傷寒温疫

熱瘧○其色大ニ黃ナリ故ニ大黃ト号瀉諸實熱不通大黃ノ大ニ
苦ハ破大寒ハ涼苦寒密陰ニ味厚シ故ニ降テ升コトナレト切實

熱ノ者ニ非ニ勿用不通トハ實熱裏ニ結滯メ大便不通者ヲ云大
黃ハ實熱結滯ヲ破涼シ引テ下カ故ナリ破下瘀血大黃ハ氣分劑ニ非

血分ノ藥トス時珍曰大黃乃足太陰手足陽明手足厥陰五經血分
之藥凡病在五經血分者宜用之若在氣分用之謂誅伐無過矣

ト此藥能凝滯ノ積血ヲ破下ス故ニ癥瘕積聚打身蹇ノ瘀血
痛或ハ高ヨリ墜テ惡血入腹者女子ノ經閉瘀血ノ心腹痛ヲ治

スルノ功アリ除下焦濕熱濕熱下焦ニ實滯メ大便秘結ス者用

之益經曰濕勝則濡泄也故濕熱之中於熱勝者大便結
醜テ大黃ヲ用ユ濕勝者ハ大便滑ナリ大黃ヲ禁ス蕩滌腸胃大黃
ヲ以テ實熱秘結ノ大便ヲ通則腸胃ノ滯凝此ニ蕩サレテ滌カ如シ
治火瘡熱腫瘡腫火熱ノ實ヨリ致ス大便秘結ス者用之痢疾裏
急腹痛痢疾ノ始食積腸胃ノ中ニ在テ下盡サルガ故ニ數劑ニ至リ
赤白裏急腹痛ス者用之其積滯ヲ破テ推下則痢疾自安此
至真要大論ノ通因通用ノ治也痰實熱痰膠滯メ中下兩焦ノ
間ニ積實ス者用之宿食宿食腸胃ニ積テ大便結者用之推下
傷寒傷寒ノ症表アリ裏アリ仲景製スル所ノ諸承氣湯及大柴
胡湯瀉心湯大陷胸湯丸等ニ皆大黃ヲ用者ハ熱邪ノ裏ニ入テ
陰分血分ニ實者ヲ下サテ爲ナリ傷寒ノ熱在表汗ニ在裏下ト
雖トモ安ニ大黃等ヲ用テ不可下裏症全足テ一毫ノ表症ナキニ

非ハ禁下法温疫熱瘧其裏ニ實ノ大便結者
醜テ用之尤能熱瘧ノ症詳ニ宜用安ニ施テ勿レ
焦ノ瀉劑タリ裏ニ結スル實熱ヲ涼シ大便ヲ導血積ヲ
破下其功皆峻ノ安ニ輕用易キ劑ニ非ズ詳ニ斟酌施之
黃芩ヲ使トス 病在分者○胃虛○陰虛○陽虛○姪娠產
得酒上行ス 毒 後○太便滑泄者俱ニ禁用○傷寒ノ熱邪既
裏ニ入ド雖トモ一毫ノ
表症有者ハ勿用之 畏惡 忌冷水 惡乾漆
附方 滾痰丸 一切屬
但水瀉產前後ニ不可服大黃浸酒蒸熟切晒八兩生黃芩八兩
沈香半兩青礞石二兩各夫レ水ヲ梔子ノ大ニ丸レ病ノ緩急ニ從
テ温水ヲ吞下ス臥テ勿動藥ノ上焦痰滯ヲ逐テ候次日先大便
ヲ下レ次ニ痰涎ヲ下ス出養生主論雞鳴丸木石ニ壓傷一切傷損

總要

大黃ハ 中下二

使藥

附方

滾痰丸 一切屬 熱實痰症ヲ治ス

畏惡

忌冷水 惡乾漆

毒

後○太便滑泄者俱ニ禁用○傷寒ノ熱邪既

瘀血痛甚者酒蒸大黃一兩杏仁去皮三七粒細研酒一盃煎六
分雞明ノ時ニ服ス其曉瘀血ヲ下メ愈暴眼赤痛實火ニ屬者ヲ
治ス四物湯ニ加大黃酒

愚案

大黃ハ能結積ヲ破者也氣積
ノ外諸ノ凝積ヲ破ル濁血積ニ

煎ヲ服ス出傳信適用方
ナラス然レ左凝積屬熱者ニ非バ勿用其性大寒ナラ也或問仲景
治心氣不足吐血衄血瀉心湯ニ大黃ヲ用ユ然則大黃補心氣者
ナレ九曰此論宗奭震亨前ニ辨シ時珍後ニ盡ス蓋邪ノ有處其氣
必虛ス心氣ノ不足ハ微ナリト雖左熱邪乘之陽亢甚ク陰血此ガ爲ニ
妄行ノ吐衄血ス大黃ヲ用テ其甚熱亢陽ヲ瀉ス心ヲ補ハ非ズ抑文
其義ヲ失コト勿レ或又問大黃ハ沈テ降則上焦ノ病ニ絶テ不可
用者歟曰李杲曰邪氣在上非酒不至必用酒浸引上至高之分
驅熱而下如物在高巔必射以取之也上實熱結積上焦ニ在者ハ

酒ニ浸テ用之然則上焦氣分ノ者ニ不可用上焦血分ノ實熱結
積者或用之中焦ノ濕熱脾胃血分ノ結熱上焦ヲ犯者用之下之
凡大黃ハ苦味大寒ノ者也熱ノ虛實胃氣ノ強弱熱邪所伏氣血ノ
位ヲ詳テ宜用之○大黃ヲ用テ大便通利セシメント欲共食ト相遠
ベシ食ト近則爲食妨ラレテ通利ニ難シ下ノ後胃氣積疲
騷テ食ヲ進ベカラス飢ハ白粥少許ヲ與テ胃氣ヲ養フニ宜シ

修治

其儘剉用ユ酒ニ浸炒用則上焦ニ至リ大陽經ニ行酒ニ洗ヒ日ニ乾
或ハ炒用則胃經ニ入ル或ハ酒ニ浸シ煨熟スルコトアリ或酒蒸或酒煮
コトアリ裏熱ヲ推下シテ切下行ヲ欲スルニ生ヲ用ユ○大黃用酒製
者ハ寒因熱用ノ義也○大黃若酒製ニセガハ至高ノ熱ヲ遺レテ
愈後目赤喉痺頭腫膈熱等ヲ生スト此東垣ノ説ナリ然レドモ中下
焦ノ裏熱欲下者ハ用生欲破血者ハ酒炒ニ宜シ○大黃ハ重實紫

地錦紋ノ如者ヲ爲良コトハ朽黑カサヲ輕者勿用コトハ承曰大黃采時皆以火石煇乾貨賣更無生者用之亦不須更多炮炙蒸煮コトハ今ノ藥店ニ片者鐵大黃ト稱ス堅重黃色コトハ上品ナリ孔アリテ連者アリ維ト種輕虛コトハ不宜今山城大和丹後ニ有之然トモ清ヨリ來ル者ヲ用テ佳コトハ○洋蹄艸ノ根ヲ以テ羊蹄大黃ト呼此真ノ大黃ニ非ズ又山本黃土大黃アリ此ガ本名ハ酸模ト号ス俱ニ大黃ニ似テ真種ニ非ズ詳ニ誤ルコトカシ

半夏



原始
癰腸鳴喉腫結核白濁夢遺帶下腸疼水腫不眠墮胎消癰○此艸一夏ノ半五月ニ生ズ故ニ半夏ト号コトハ消痰半夏能ク濕痰寒痰

辛苦温○消痰下氣燥脾濕開胃健脾除胸寒治頭痛頭暈肩稜骨痛嘔吐欬嗽心下急痛心腹痞滿癰瘰癧瘰癧

消ス又脾胃虛氣虛ノ痰ヲ治ス生宜コトハ甄權曰虛而有痰氣宜加用之コトハ是方陰虛血燥ノ痰ニ喜所ニ非ズ夫腎ハ痰ノ本脾ハ痰ノ標肺ハ貯痰ノ器トス此蓋腎ハ津液ノ源多リ諸痰ハ皆津液ニ生ズヲ以テ腎ハ痰ノ本トスルト雖トモ中焦胃ハ陽土脾ハ陰土ニ屬ス土ノ化ハ濕多リ脾濕一動則痰生コトハト云コトナレ故ニ脾ハ爲生痰之源半夏ハ足ノ太陰脾經足ノ陽明胃經ノ藥ヲ中焦ノ濕痰食痰寒痰ヲ去者也濕ハ土ノ本化多リト雖トモ潤液ノ濕ハ喜テ留濕痰ハ惡ム古人脾胃家ノ劑ニ多ハ用之中焦所惡ノ留滯ノ濕痰ヲ去テ脾胃ヲ健ナラシム半夏ノ皮白ヲ以テ世人多ハ誤ニ肺藥トスル者ハ尤非ナリ不知此故ニ貝母ヲ以テ半夏ニ代ル者アリ半夏脾胃ニ行貝母ハ肺ニ行其向導主治不同互ニ代用スベキ者ニ非ズ詳ニ前ノ貝母ノ條ニ辨ス亦不贅或問丹溪ハ半夏ノ性燥烈タリ勞痰失

血ノ諸痰ニ用ヒ反テ血液ヲ燥テ病ヲ加テ然カ否ヤ曰凡テ辛ハ
走氣化液内經曰以辛潤之ト半夏ノ辛ハ潤ノ義アリ且半夏中
ニ自涎液存セリ故ニ半夏ノ辛温留濕ヲ去テ痰ヲ除ト雖其辛ト
與涎ヲ以テ除濕ノ間ニ自潤ノ義ヲ存ス愚案スルニ譬ハ風ハ雖燥濕
風起テ雨澤降風雖燥濕滿溢ノ流水ハ燥減スルコト不能半夏雖
燥濕滿溢ノ津液ヲ減コト不能惟其病ノ虛實ニ從テ燥ト成燥ト
不可成精血津液虚燥ノ人ニ用之實ニ燥トナルベシ陰液不虛ノ惟
濕痰留滯スル者ハ用之除濕反テ辛温ノ氣ニ從テ液化シ其藥涎
從テ液和センノ三丹溪極テ燥トスルモ非ナリ成氏極メテ潤腎燥ト
云モ非ナリ或ハ又和劑局方ノ半硫丸ノ條ニ治老人虚秘ト云ハ彼
温補ノ義ノ三以之半夏ニ滑潤ノ義アリト取者ハ亦誤也下氣半
夏ノ辛ハ開モ温ハ行テ能氣ヲ下ス燥脾濕開胃健脾半夏ハ太陰

脾陽明胃ノ藥タリ脾ノ留濕ヲ燥ノ中焦ノ濕痰ヲ去且辛温開
胃口脾ハ惡濕濕ヲ去則脾氣自健ナリ補脾ハ君子ノ半夏茯苓
蓋此義ニ取ル人身ノ脾胃ヤ坤ノ土タリ泥濕ノ土地ニ物生スルコト
不能人ノ脾胃土中ニ留濕アル時ハ胃氣及五藏ヲ生スルコト不能
故ニ脾胃家多ハ用之去濕健脾理アルカチ除胸寒或冷痰或飲
寒或ハ寒濕胸中ニ留滯スル者此カ辛温ヲ以テ除ニ足リ頭痛頭
運痰氣逆厥ノ頭痛頭眩眩運スル者ヲ治ス眉稜骨痛眉毛ノ骨ヲ
眉稜骨ト云此カ痛者ハ痰厥ニ因ハナリ嘔吐開胃去痰故ナリ效嗽
冷痰濕痰ニ屬スル效症用之後世ニ謂有痰曰嗽無痰曰效トハ誤
ナリ凡テ此二字俗云世幾也始痰ノ有無ヲ以テ号ラテ不立詳
余所撰病因指南ニ辨アリ心下急痛中焦ノ濕痰冷痰逆心下
急迫疼痛スル者用之心腹痞滿痰濕中焦ニ滯則升降否テ心腹痞

滿腹脹者用之。瘦癯瘦瘠。痰氣ノ結滯。二因カ故ナリ。痰癯主痰
所生瘧ヲ云。丹溪謂無痰而不爲瘧。上諸ノ瘧症皆中焦不順ノ
生痰痰滯管衛テ然リ。故ニ瘧家多ハ痰劑ヲ兼用。腸鳴濕痰腸
胃ニ溢テ腹瀉々トノ雷鳴スル者用之。喉腫痰嗽ニ因テ。喉或腫或
痛者用之。結核皮肉ニ果核ノ如ナル者ヲ結生ス。瘰癧ノ類ナリ。此皆
痰氣ノ結滯ニ生ズル也。白濁夢遺帶下。中焦ノ濕。下焦ニ溢レ。小便
白濁帶下シ。或ハ從之。下焦モ亦不固。夢遺洩精スル者ヲ治ス。皆其
本中焦ノ濕ヨリ致者ヲ療ス。下焦腎陰ノ虛ニ生スル者ハ喜所ニ悲
脇疼脇疼ノ症多ハ痰厥ニ属スルガ故ナリ。水腫半夏ノ辛温能ク濕ヲ
去ガ故ナリ。不眠夜不眠者ハ衛氣陽蹻ニ鬱滿ス。半夏氣ヲ下レ。氣ヲ
開テ。陽蹻ノ鬱ヲ散ベク也。内經ニ治夜不眠半夏湯ノ意是也。墮胎
半夏ハ胎ヲ滑ラ墮易シ。孕婦輕ク勿用。若用ハ姜汁ニ浸炒過テ用

消癰腫腫毒ヲ消化ス。此亦驅

濕除痰ノ餘功ナリ。主能ニハ非ズ

厥ノ頭痛。欬

使藥

射干ヲ使上。柴胡ヲ使少。寒熱往來ヲ治ス。枳
實黃芩ヲ佐少。熱痰ヲ治ス。南星。前胡ヲ佐少

風痰ヲ治ス。白芥子。乾姜ヲ佐少。寒痰ヲ治ス。蒼朮。茯苓ヲ佐少。濕

痰ヲ治ス。白朮。茯苓。陳皮ニ合テ脾胃ヲ補。陳皮。白朮ト同シ。痰痞ヲ

治ス。白朮ト同シ。脾胃

毒

半夏ノ主治雖多。端其實ハ留濕ノ痰
滯ヲ去ニ在。故ニ濕症ニ非ハ用ベカラス

○半夏ハ實ノ燥劑ニ非スト雖モ。陰虛内熱津液不足ノ者勿用。

○孕婦ニ用ルコトヲ忌。然レモ生姜製ハ恐ルコトナシ。○諸失血。○腎

虛血虛ノ。二便閉澁スル者勿用。○自汗盜汗。○口乾飲渴者勿用。○

虛勞勞損スル者禁用。○半夏多用コト勿ク。適用則脾胃ヲ瀉ス。○肺

氣虛耗ノ者妄ニ用ゴト勿レ
辛温ハ氣ヲノ奔ラシメ易シ

畏惡

皂莢ヲ惡シ。雄黃。生姜。乾姜。秦
皮。龜甲ヲ畏ル。烏頭ニ反ス。羊血。

海藻。飴糖ヲ忌ム。半夏有毒。製不詳。

附方

痰熱效嗽。煩熱面
赤。口燥。心痛。脉洪。數。

丸者ヲ治ス。半夏天南星各一兩。黃芩一兩半。爲末。生姜汁ニ蒸餅ヲ
浸テ。梧子ノ大サニ丸シ。食後ニ姜湯ニテ服ス。小黃丸ト号シ。出活法機要

胃寒。噦。半夏湯ニ泡シ。炒黄シ。一兩。藿香一兩。丁香半兩。每一服四
錢。水一盞。姜七片。煎服ス。藿香半夏湯ト名ク。出和劑局方。○本綱

半夏ノ附方繁多ト雖モ。皆古方ノ分量
多過テ。今人ノ用易キ者ニ非ズ。故ニ略之。**愚案**
或問。好古曰。半
夏能泄痰之標。

不能泄痰之本。泄本者。泄腎也。然カ否ヤ。曰。腎ハ精液ノ本ナリ。言
ハ半夏ハ脾胃ノ濕痰ヲ去ト雖モ。腎藏ノ精液ヲ燥スコトナレト云ンガ

爲ニ不能泄痰之本トス。然モ前ニ辨ズルガ如ク。腎精虛燥セザル者。思
惟脾濕ヲ去。耳ニ不テ。燥之。腎精虛燥ノ者ニ用ハ。豈腎燥ヲ加テ其

本ヲ泄コト不
能者ナランヤ。**修治**
大粒ニシテ白キ者ヲ良トス。水ニシテ砂ヲ洗シ。熱湯

ニ浸レ。外ノ滑ト與皮ヲ洗シ。洗淨之。總テ七
度。毎洗熱湯ヲ換テ淨ス。或ハ浸水五日。毎日水ヲ換テ皮滑ヲ洗去モ

亦良。如此洗淨シ。日ニ乾シ。半夏一斤ニ生姜汁四十目ヲ拌入シ。復
日ニ乾シ。焙用。○或ハ姜汁明礬皂角ト同煮テ晒シ。乾用。半夏粉

半夏ヲ研末シ。湯水ノ中ニ生姜汁ヲ入シ。此ニ半夏ヲ浸コト三日。滑皮ヲ
漉去テ。澄テ下ニ凝者ヲ取興テ晒シ。乾用。半夏粉ト云フ。半夏餅半

夏研末シ。姜汁ニ和シ。餅子ニ作テ日ニ乾ス。半夏麴。半夏洗淨シ。滑皮ヲ
去。白ニ入テ搗碎シ。生姜汁ヨキホドニ加テ團子様ノ如ク丸ク。麻ニ作テ。楮

葉ニ裹シ。子カセテ黄色ニ麴。華生スル時ニ取。日ニ乾シ。炒テ用。半

夏ハ六陳ノ内ニ属ス。新者ヲ勿用。太槩ニ集ヲ過ズバ勿用。治濕痰
姜汁。白礬湯ニ和ス。治風痰。姜汁皂莢湯ニ和ス。治火痰。姜汁竹瀝
或ハ荆瀝ニ和ス。治寒痰。姜汁白礬湯ニ白芥子ノ末ヲ和シ麴ニ作ル。○
生。冷入吐熱。冷入下。○藥店ノ半夏麴ハ粒ニ用。難キ不潔者ヲ以
麴ニ造。且其製法ヲ略ス。故ニ氣味性功不佳。惟自製ノ擇用ヨ

麥門冬



其微寒。○治肺中伏火。定心氣。去心
熱。療煩熱。飲渴。口乾。欬嗽。面目浮腫。
聲啞。勞瘵。骨蒸。血安行。經水枯。乳汁

不通。肺痿吐膿。瘵癯。明目。強陰。○此肺根似麥。其葉如韭。凌冬不
凋。故ニ麥門冬ノ名アリ。○此ガ門ノ字義ハ天門冬ノ條ニ註ス。治肺中
伏火。手太陰肺經ノ藥多リ。其潤シ。微寒ハ清ス。故ニ肺燥ヲ潤シ。肺氣
不足ノ伏熱ヲ清ス。定心氣。肺心ノ氣虛ヲ熱ヲ伏シ。此ニ從テ心氣不

定ノ驚者用之。去心熱。麥門ノ心熱ヲ去者ハ肺熱ヲ去ノ餘力ナリ。
蓋肺ハ心ヲ蔽ノ華蓋多リ。故ニ心熱則肺熱シ。肺熱則心熱ス。麥門
冬。所去ノ心熱ハ肺熱ヲ移テ然者ナリ。獨心ノニ熱スル者ハ非。煩
熱飲渴口乾。此肺ノ熱燥ヲ主トシ。胸中煩熱シ。渴ノ飲シ。及口中乾
者用之。欬嗽。肺中ノ熱燥ニ因テ然者用之。虛冷ノ欬ハ勿用。面目
浮腫。肺熱ニ因テ面目浮腫者用之。聲啞。肺ハ金トシ。音聲ノ源多リ。
肺ノ熱燥ニ因テ金不清。故ニ聲啞者ハ用之。行經水枯。婦人經水
不通者ヲ血枯ト云。肺ハ金ニシテ氣ノ母。水ノ源多リ。肺金清則氣行。水
生ノ精血通ズバ也。乳汁不通。肺熱シ。胸中迫燥ガ故ニ。乳汁不通者
用之。肺痿吐膿。久欬不止。吐膿。面萎黃ナル者。肺痿ト号。其症肺中ノ
熱燥ニ因ナリ。瘵癯。肺金ハ腎水ノ源多リ。瘵癯ハ腎液ノ不足トシ。麥門
冬ニ地黄等ノ滋陰ノ劑ヲ合用シ。金肺ノ燥熱ヲ清。則腎水自生。

痿躄愈明目腎陰不足之目不明者用之蓋金生水之義也肺金爲
 熱衰之肝木之不制故也木邪逆之目不明者亦用之蓋西方虛
 也東方實也西方補之東方之虛也強陰之藥也
 手ノ太陰肺經ノ藥也足ノ少陰腎經ノ藥也非スト雖用之金肺
 ヲ清則腎陰自生ス内經謂資化源ノ義ナリ然地黃等ノ補
 陰ノ劑ヲ使スルニ非ンバ強陰ノ功ヲ致ニ不足故ニ儒醫精要ニ云
 麥門冬以地黃爲使服之令人頭不白補髓通腎氣定喘
 息令人滑澤蓋有君而有使也若有君無使獨行無功矣
 麥門冬ノ主治多端タリト雖在惟肺金ノ熱
 燥ヲ清スルヲ以テ要トス他ハ皆此ガ枝葉也
 阿膠麻仁ト同ノ潤經益血復脈通心ノ劑トス五味子枸杞
 子ト同ノ生脈ノ劑トス五味子人參ト合シ肺中ノ元氣ノ不足ヲ補

總攷

使藥

地黃車前子ヲ使ス

毒

肺寒○胃寒者勿服○肺氣虛弱ノ者ノ參
芪等ノ補氣茸温ノ劑ト合スルニ非ンバ勿用

畏惡

欬冬苦瓠

附方

生脈散六七月ノ間濕

附方

七月ノ間濕

苦艾ヲ惡ム苦參青蘘木耳ヲ畏ル石鍾乳ノ
 毒ヲ伏ス○麥門冬ノ心ヲ不抽用則令人煩
 熱旺シ人因之骨之身重氣短頭旋眼黑甚則足痿軟スル者ヲ治ス
 麥門冬人參各三錢五味子十五粒煎服ス出千金方乳汁不通
 麥門冬焙末ノ三錢犀角屑一錢奇
 温酒ニ下ス神効アリ出熊氏補遺
愚案 麥門冬ハ秋令ノ微
 寒ヲ稟西方金ノ白
 色ヲ得テ生ス故ニ肺金ノ熱火ヲ清ス愚案ニ麥門冬ノ賢自潤テ
 不燥嚙之枯齒則其熱ヲ清ス耳ニ非ズ肺中ノ燥ヲ潤ニ至ル故ニ
 虛勞乾咳ノ者用之清肺火潤沛燥且獨肺火ヲ清ス耳ナラ何ソ
 強陰益精ノ功ニ至ン此ガ清金潤金ニ因テ金能生水ノ功アルニ

至ル。或麥門與天門其功同。如レ此辨。アノコトヲ問。曰。麥門冬ハ手
太陰ニ入テ清肺熱ノ餘ニ兼テ手少陰心熱ヲ清ス。天門冬モ亦手
太陰ニ入テ清肺熱ノ餘ニ兼テ足少陰腎熱ヲ清ス。此天麥ノ兩冬
俱ニ手少陰ニ入テ清金ノ劑ナリト雖。凡。麥門ハ手少陰兼。天
門ハ足少陰ヲ兼。則同ガ如シ。ニ
修治
麥門冬ハ其葉大小ノ二
種アリ。小葉ニシテ如
冬ノ功各異ナリ。混ズルコト勿レ

者。其根モ亦小ニシテ不可。大葉ノ者ハ其根大シ。黃白色尤佳。炮圍
爐ニ少ツク入テ少焙。則柔ニナル時。中ノ心ヲ抽去テ。剉用ニ。或ハ夏暑
極熱ニ干。柔ニナリタル時。心ヲ抽去。剉テ焙用モ佳。若此ガ心ヲ抽去
ズレテ用バ。冷入煩。○或ハ此ガ寒性ヲ減サント欲セバ。酒ニ浸シ焙用。○
凡。麥門冬ヲ製共。強炒燥コト勿レ。此ガ潤濕ノ質。尤凡。主治ノ要ナリ。○
夾門ノ心ヲ抽ニ。或ハ湯ニ浸シ。或ハ水ニ浸テ。取者アリト雖。凡。不佳。其氣

味ヲ損シ。潤濕ヲ減シ。惡レ。○或製之。鐵ヲ忌者有ト。雖凡。本艸家ニ。遊
忌鐵ノ說ヲ未考。然ルカ否ヤ。○今ノ藥店ノ者。多ハ小葉ナリ。四國ヨリ
出者。大葉ノ根ヲ佳。凡。肥大白實ヲ上トス。赤嫩及黑輕ノ者ハ下品
トス。其氣味不宜勿用之。

天門冬



其苦寒。○清金潤燥。降火通腎。益精
強骨。治欬嗽。消渴。喘息。煩悶。大便閉
結。肺癰。吐膿。吐血。足下熱痛。陽痿。

盜乾渴。勞傷。痛痺。體燥。寒熱。熱中風。濕疥。身上一切不潔疾。去勞
熱。除痰。結利小便。○天門冬ハ本。顛。藥。冬ニ作ル。凡。艸ノ。葉。夏。葉。下
ス。此。艸。蔓。茂。故ニ。藥。上。云。夾。門。冬。モ。本。麥。藥。冬。ナリ。皆。其。茂。盛。ナ。ク。以
也。俗ニ。略。シ。門。ニ。作。且。顛。藥。冬。其。葉。細。シ。如。顛。髦。也。或ハ。此。艸。藥。上。テ
如。髦。其。功。麥。門。冬。ニ。似。タル。ガ。故。ニ。顛。門。冬。ト。号。ト。清。金。潤。燥。降。火。通。

腎天門冬ハ大槩麥門冬ノ功ニ似タリ。麥門冬ハ肺心ノ熱火ヲ清ス。天門冬ハ肺腎ノ火熱ヲ涼ス。故ニ心火乘肺金者ハ麥門冬腎火乘肺金者ハ天門冬ヲ用ユ。清金ハ肺熱ヲ涼ノ義。潤燥ハ肺熱ヲ清シ。腎火ヲ除則金能水ヲ生シ。腎陰清ノ燥自潤。然レ燥ニ兩種。血精不足ノ燥者アリ。地黄當歸ノ類ヲ以テ潤之。腎肺ノ熱ニ因テ燥者アル天門冬ヲ用テ除熱其燥ヲ潤ス。降火ハ腎火ノ肺ニ炎上スル者ヲ降ス。通腎ハ除肺熱ノ餘ニ下腎熱ヲ清ス。腎氣ヲ通ス。趙繼宗曰。生地黃貝母爲天門冬之使。上。生地黃ハ腎熱ヲ涼ノ良劑タリ。天門冬此ヲ使トスヲ以テ其腎熱ヲ除コト知ス。益精強骨天門冬ハ直ニ益精者ニ非ス。肺腎ノ熱ヲ除則自陰精ヲ助テ益コト有ノ義也。骨ハ腎液ノ所養也。骨燥則軟。潤則強シ。腎熱則骨モ亦熱シ。枯故ニ天門冬除腎熱則骨不熱不燥。骨髓自強トス。治欬嗽消渴喘息煩悶。

腎熱乘肺部。此諸症アル者ヲ治ス。大便閉結肺與大腸表裏タリ。腎ハ竅ヲ二陰ニ開ク。故ニ肺腎ノ熱ヲ大便結燥スル者用之。潤通ス。肺癰吐膿吐血此症モ亦肺熱ニ因者用之。肺熱ニ腎熱ヲ兼ハ宜。之肺熱シ心熱ヲ兼テ然者ハ麥門冬ヲ用ユ。足下熱痛少陰腎缺。足下湧泉ニ起ル。故ニ腎熱スル者足下熱痛ス。天門冬宜清之。陽痿男萎弱ヲ不起者其因兩アリ。或ハ下焦真陽氣虛寒ニ萎スル者ハ桂附ノ溫劑ニ宜シ。或ハ腎陰不足シ下熱旺スニ因テ萎者アリ。天門冬ノ類ニ宜シ。然レ下熱ニ因テ陽事不起者ト陽事剛強ニ至者ト二因アリ。蓋腎熱旺シテ不太則小筋萎弱ヲ陽事不起。暑ノ時ニ遇テ蔓州萎弱ナルノ義ト同シ。若腎熱ノ燥キ熱燥甚至極則大筋燥枯ノ陽事暗ニ剛強ハ彼樹木ノ枯ル者ハ堅剛ナルノ義ト同シ。此兩ノ者俱ニ陰虛熱旺症。天門知槩ノ類ヲ用ユ。其下焦虛寒ニ

和言本草 卷之六

因テ陽事不起者ハ天門冬等ノ寒劑ヲ不宜用或ハ足ノ陽明經ハ
衝脉ト俱ニ宗筋ノ會ヲ總故ニ陽明胃經ノ不足ニ因テ陽事不起
者アリ此亦天門冬等ノ寒劑ヲ不宜用盛乾渴肺熱ニ腎熱ヲ兼
テ盛乾飲水ニ渴者用之勞蟲五勞七傷勞瘵勞蟲ヲ治ハ益勞症
腎陰虛スレバ熱シ眞水不足スレバ濕ヲ致シ濕熱下焦ニ生則蟲ヲ生
且勞ノ肺心ノ氣虛鬱シ其氣ノ虛鬱下焦ノ濕熱ニ移則此ヨリ諸
惡蟲ヲ生化ス彼泥滓濕熱ノ地ニ異蟲ヲ變生スルニ同ジ其勞蟲
狀種々不同者ハ肺心ノ虛氣所鬱ノ情志ニ從テ變生ス天門冬ソ
苦寒ヲ用テ肺腎ノ熱ヲ去則濕モ亦自除且其味ノ苦ハ濕熱氣
結ノ留積ヲ疎シ苦ハ又能蟲ヲ逐故ニ本經ニ殺ニ蟲去伏尸痛痺
即痛風也風熱濕熱骨髓ニ在テ然者ヲ治ス然レ右寸與兩尺脈
熱象アルニ非バ勿用體燥寒熱熱中風肺ハ皮膚ヲ主リ腎ハ身ノ潤

ヲ主ル肺腎ノ熱ニ因テ或ハ體燥者滑之或ハ腎熱向肺肺熱ニ
因テ寒熱往來ス者ト亦用之或ハ肺腎ノ熱久ニ屬スル類中風宜
用之濕疥濕熱ニ生ス疥瘡ヲ云肺腎兩部ノ熱ヲ主トスル濕疥ニ用
身上一切不潔疾狐臭躰氣等ノ類ヲ云肺ハ主皮腎ハ主骨肺腎
熱皮骨ノ部ニ發則種々不潔ノ疾ヲ致ス或ハ躰燥テ白屑等ヲ致
ス者アリ肺熱去則皮清腎熱去則躰滑ナリ其清滑則何ノ不潔ト
云コト有シ去勞熱天門冬ハ腎熱ノ肺ニ行者ヲ去故ニ勞瘵骨蒸ノ
熱ヲ去ニ用之除痰結中焦ハ屬土主濕腎ハ屬水主液津液不行則
濕トナル濕則痰ト生故ニ中焦ノ濕痰ハ標トス半夏主之腎液ハ結痰ハ
本トス天門冬主之腎液不足ノ熱シ熱ニ因テ津液結滯ノ痰ヲ生ク歟
嗽喘息等ノ症ニ用之夫半夏ハ痰家ノ燥劑天門冬ハ痰家ノ潤劑ナリ
故ニ半夏ヲ用シ者天門冬ヲ施則痰ヲ溢天門冬ヲ用キ者半夏

ヲ投則燥痰ナラ盛ナル。詳ラ勿誤。利小便。天門冬ハ小便通利ノ劑ニ非ト雖也。此能肺熱ヲ清。則氣化シ水通シ。腎熱ヲ去。則膀胱ノ水道自利ス。ニ取ノ三。肺腎ノ熱ニ因テ小便不利者用之。

總案

天門冬ハ手ノ太陰。足ノ少陰經ニ入テ。肺熱ヲ清シ。腎熱ヲ除キ。

陰虛上熱燥痰ヲ治スルノ要劑ナリ。然レモ此ガ氣味苦シ。過服久服則胃氣ヲ損ジテ反テ害アリ。

使藥

垣衣。地黃。貝母ヲ使

上。肺氣虛熱ノ者ハ人參。黃芪ト合ス。五味子。麥門冬。枸杞子ト合ス。肺腎ノ燥ヲ潤ス。熟地黃。當歸ト合ス。精血ヲ潤清ス。生地黃ト合ス。腎熱ヲ涼シ。炎

毒

肺熱スト雖トモ元氣ノ虛甚者ハ參芪ト合ス。悲火ヲ降ス。勿用。○肺腎ノ寒者○胃氣不足者○大使滑

泄ノ者ハ禁用。宗莖云寒多人禁服之。○久服スルコト勿レ過服則大使泄シ反テ咽喉疾ヲ致ス。

畏惡

曾青ヲ畏。○天門冬

ヲ服スル者ハ鯉魚ヲ食コトヲ禁忌ス。若誤テ食之由毒。浮萍汁ヲ服シ解。○天門冬汁ハ雄黃。磁砂ノ毒ヲ制ス。

附方

陰囊

偏墜者天門冬三錢。烏藥五錢。水煎ス。出活人心統。風顛癩耳。蟬ノ鳴ガ如ク。脇痛者。天門冬去心皮。曝搗爲末。酒ニテ一セテ服ス。日

愚案

天門冬門ノ兩冬。大槩同。肺藥ニ名。麥門冬兼出外臺秘要。心。天門ハ兼腎。且麥門冬ハ微寒。ニテ其子ノ

故ニ參芪ノ類ト合シ。肺氣虛ノ熱燥者宜用。天門ハ甘ト雖モ苦ヲ兼テ寒ナルノミ。故ニ肺氣ノ虛甚者ハ熱燥ト雖モ。女ニ用難シ。况ヤ胃虛ノ者ニ於テヤ爲難施。愚案ニ天門冬ハ清肺熱。潤燥ノ劑。麥門冬ニ勝リ。腎火炎上ノ乘肺。肺氣未傷。胃氣未損者少用ヘシ。多服ハ

修治

湯ニ浸シ。四ニ割破テ心ヲ去。間皮アルヲ去テ。堅木板ニ載。日ニ干乾シ用ユ。或ハ酒ニ拌蒸。風ノ通處ニ置テ干乾

用コトナリ或酒ニ浸焙用コトナリ皆其寒性ヲ減セシコトヲ欲ナリ

牽牛子



辛熱○利大小便治水腫除氣分濕熱逐痰飲治腰背漲重氣滯喘滿連命門○弘景曰此藥始出田野人牽

牛謝藥故以名之利大小便牽牛入淡滲者二非則直二膀胱入之非利水牽牛八雖入大小腸經苦寒者二非則直二大便通利者二モ非然二何ソ此カ要上ル所公兩便通利ヲ以テヤ益牽牛子ハ肺胃ノ濕ヲ去其辛熱ナラヲ以テ且辛ハ氣ヲ散行セシム故濕肺胃分上中焦ニ鬱滯シ氣亦此ガ爲ニ滯滯ノ不行故二氣與津俱ニ下焦ニ施化スルト不能是以或ハ小便不利或ハ大便不通コトヲ致ス牽牛子辛熱ヲ用テ其濕ヲ去其氣ヲ行則津施氣化ノ下焦潤通ス二從テ小便自利シ大便自通ス或ハ厚味ヲ食コト大過又津液皆痰ト成テ

上ニ壅リ氣上ニ滯テ不降故ニ下焦不潤大便秘結スル者アリ此陰虛血燥ニ非ス津氣不行下故ノニ此時若潤陰ノ劑ヲ用則氣痰ヲ加滯セテ彌結ス惟牽牛ヲ用テ去濕行氣則氣痰化シ津液小大腸ニ潤テ大便通利ス世人多ク牽牛ヲ以テ直ニ利水ノ劑トシ或此ガ利水ノ功ノミヲ知テ大便通利ノ義ヲ不知故ニ東垣曰牽牛非神農藥也名醫續注云味苦寒能除濕氣利小便治下注脚氣此說氣味主治俱悞矣何也凡用牽牛少則動大便多則泄下加水乃瀉氣之藥其味辛辣久嚼猛烈雄壯所謂苦寒安在哉夫濕者水之別稱有形者也若肺先受濕濕氣不得施化致大小便不通則宜用之實此カ氣味主治古未明東垣始テ發之治水腫水與濕異名其類同濕鬱則水生水鬱則濕上生內經ヲ案ニ諸ノ水腫ノ本ハ在腎其末在肺上肺ハ屬金主氣金與氣俱ニ水ノ母ニ非ヤ故ニ下焦ノ邪水溢

テ肺ニ合リ肺其濕ヲ受テ氣不行濕氣上焦ニ壅則水道不通則溢
湧テ水腫病成テ深シ故ニ牽牛ヲ用テ肺濕ヲ去其氣滯ヲ行則高
源ノ水流テ膀胱ノ溺從テ通ズ濕去氣行小便通則何ノ水腫不
愈者アルコトアゾ然レモ肺氣ノ虛實ヲ定テ氣虛ノ者六カ本宜用
此カ辛熱元氣ヲ散ズルカ故也或ハ濕熱氣分ニ無ク惟血分濕熱ニ因テ
腫脹ス者ハ牽牛子ノ非所治是以仲景治七種濕熱小便不利不用牽
牛者モ亦其濕熱皆血分ニ在テ氣分ニアラザルカ故ナリ除氣分濕
熱濕熱在血分者ハ先下焦ニ受苦寒苦温ヲ以テ治之牽牛ノ辛熱
ヲ用則反テ其元氣ヲ傷ル濕熱氣分ニ在者ハ先上焦ニ受牽牛ノ
辛熱主之李杲曰牽牛止能泄氣中之濕熱不能除血中之濕熱濕
從下受之下焦主血血中之濕宜苦寒之味反以辛藥泄之傷元
氣逐痰飲去濕利氣故也治腰背脹重此症兩因アリ濕熱下焦血

分ニ在テ然者ハ牽牛不宜用濕熱氣分ニ在テ然者宜用之蓋濕
熱血分ニ在者ハ腰ヨリ小腹腹陰際ニ及テ脹重ス濕熱氣分ニ在者
ハ腰背ヨリ淵陽ニ及テ脹重ス氣滯上焦肺分ノ氣滯ヲ行ノ能小
便ヲ通入喘滿或ハ濕熱肺ニ塞リ或ハ肺氣胸中ニ滯テ喘滿ス者
或ハ水氣肺ニ鬱シ喘滿ス者用之達命門此李時珍ガ發明ニ出
牽牛ノ辛熱上六手ノ太陰肺經氣分ニ入下八右腎命門ノ氣分ニ達シ
下焦氣分ノ濕熱壅遏ヲ去テ二便ヲ通ズ酒色過度ノ濕熱邪精
道ニ在テ會陰脹痛ニ二便不通者用之時珍曰牽牛能達右腎
命門走精隨人所不知下故東垣下焦ノ陽虛ヲ治ス天真地靈水
炒黑ノ牽牛ヲ用或問吾子前ニ所謂牽牛ハ直ニ下焦ニ便藥ニ
非ズ然レニ右腎命門ニ達ストハ下焦ニ行者ニ非ヤ曰左腎ハ下焦
血分トス右腎ハ下焦ノ氣分トス牽牛ハ氣分ノ劑ニ血分ノ藥ナラズ

故二下焦二行下雖元右腎命門ノ氣分ニ達ス精道ノ
濕熱ヲ去ト雖元此モ亦右腎ヲ温行セシムル餘カナリ

經氣分ニ行テ濕熱ヲ去小便ヲ利シ大便ヲ通ジ氣ヲ
行テ水腫秘結ヲ療スルノ要藥ナリ病血分ニ在者勿用

香乾姜ヲ得テ良大黃ト同用則血分ニ入テ能
大便ヲ通ス肉桂ト同用則右腎命門ニ達ス

甚シ故ニ安ニ用コト勿レ元氣耗損シ易ヲ以テ
ヲ落易シ○久服則人ノ元氣ヲ傷ル○病在胃一分者○大便不

結者○無濕者俱ニ勿用○大小便通世者○脾虛ノ腫脹○肺氣
不足ノ喘滿等ニ禁用○病ノ虛實ヲ不詳ノ疾ニ牽牛ヲ用テ

時ノ快ヲ取コト勿レ丹溪曰若非痛形與證俱實不脹滿不大便秘
者不可輕用驅逐致虛張文懿云牽牛不可耽嗜脫入元氣ト不可

總聚

牽牛 八肺

使藥

木青

毒

牽牛ハ辛熱 雄烈泄氣尤

不慎輕クニ安ニ

畏惡

孕婦ニ忌○牽牛ノ用バ其黒皮ヲ
去皮ハ能氣ヲ滯ラス誤用コト勿レ

附方

快

尿瀉者牽牛子末毎服方寸匕小便利止止出千金方○牽牛ノ

附方繁多ナリト雖元皆單方ヲ今ノ弱質ノ人ニ輕用ヘキ者非ズ故
略ノ只其ツツ

愚案

牽牛子ニ黑白ノ二種アリ丹溪曰黒屬木白者
屬金ト愚案ニ黑白ノ性同ノ不異氣味性功

黒色ノ者ヲ以テ勝トス之益物ノ外陽チル者ハ内陰内陰チル者ハ外
陽自吹ノ理ナリ牽牛ノ華ハ陰ヲ其子ハ陽チル故ニ華ハ得由其子ハ

南方ノ陽化ヲ得テ辛熱ナリ故ニ子モ亦外ノ皮色ハ或黒或白陰ニ
シテ氣味性功ハ陽チル黒皮ノ者ヨリモ陰ノ暴ト盛ナリ

表ノ陰盛則裏ノ陽モ亦盛ナリ是以テ
黒牽牛子ハ其功白者ニ勝ト云而也

修治

牽牛子黒者ヲ黒
丑ト名ス白者ヲ白

且下名。俱ニ藥ニ入用。水ニ入テ浮者ヲ去。日ニ干。紙ヲ隔テ燻香。頭末ヲ用ユ。頭末トハ粗クト碾テ第一番篩ヲ用ユ。此ヲ頭末ト名。一
 番篩ノ外ハ細粉皮麩ヲ不可用。若一 番篩ノ中ニ毛皮與粉混テラ
 ハ擇捨ヨ。或ハ酒ニ拌蒸コトアリ。或ハ半生半熟ヲ用コトアリ。○
 本州家ノ諸説ヲ考ルニ。牽牛子ハ皆碾テ頭末ヲ取用ノニ遂ニ剉用
 ノ説アルトナシ。然ニ今人多ハ剉テ用。頭末ノ製ヲ致ス者ナシ。○
 云々

廣益本州大成卷之六

