

廣益本草大成



木之部 自才士卷至才十四卷
果之部 才十五卷

自才十五卷
至才十五卷

三 1
3267
4



3267
卷 4

大成卷之十一

洛下 法橋

岡本爲竹一抱子

昭和十九年三月三日
小田新吉氏
長男友太郎
大寄贈

木部

肉桂



通血脉 宣導百藥 堅筋骨 止嘔治欬 嗽鼻鼾 利肝肺氣 理疏不足 隨

水皮 厚肉 走以云 肉桂 足少陰腎 入兼足大陰脾 行于俱二血

分藥也 益肉桂 氣厚 下行下焦 達且色紫 腎藏色名其甘

辛熱 下焦命門 欠虛 溫補者也 仲景 八味丸 二用 義毛 亦是也 腎

水藏 雖厄 獨陰耳 非水 中二陽火 アリテ 水源 養此火 木養

土 故三下焦 欠虛者 真陰皆虧 水成 精虛 致中焦 胃土 亦

和語本

本草

卷

虛冷ノ飲食ヲ消化スルヲ不能是以脾モ亦水穀ノ精氣ヲ稟テ微ニ生
 スルヲ不能肉桂能命門ノ火ヲ補則下焦暖ヲ真陰生化レ中焦溫和ニ
 ノ飲食消化レ脾能水穀ノ精氣ヲ稟テ血ヲ生故ニ肉桂補火助陽滋補
 精血補益脾胃ノ要劑トス或大陰陽明ノ虛寒ニ因テ痘瘡薄黑色ヲ
 壞ニ陷者下香ト合テ温托レ膿ヲ化スルモ亦温中ノ用也沉寒痼冷一
 一タ謂ニ非ス日月久陳ノ寒冷ヲ云其本陽火ノ衰虛ニ始ル肉桂能中下
 焦陽火ヲ補寒冷ヲ退テ治之主藥ナリ甚者或附子ト合用ス霍亂
 吐瀉俱ニ發者ヲ濕霍亂トス欲吐瀉不吐瀉者ヲ乾霍亂トス俱ニ中
 焦塞ノ升降ノ不通ニ因テ也夫胃ハ欲温惡寒欲通惡塞肉桂甘マ
 中焦ヲ緩和レ辛熱ヤ胃ヲ開通温暖ヲ散寒利塞中氣順和レ升降
 和通ノ霍亂瘧凡一切嘔吐症多ハ宜用之且酒客ノ嘔吐ノ如キ亦宜用之
 蓋酒ハ大熱ノ物ナリ雖凡其體水濕ニ屬シ中焦ニ粘滯ス安ニ寒涼劑
 ノミヲ用則寒藥閉胃口濕熱ナラ中焦ニ粘滯ス故ニ辛温辛熱劑ヲ
 用テ粘滯濕熱ヲ開散開利スルニ非ハ不足治之東垣葛花解醒湯
 ニ乾姜アル者モ亦是也酒ヲ席ニ浸衣ニ潤涼水ヲ以テ洗之則酒濕ノ
 粘滯ヲ去テ不能熱湯ヲ注洗則去之易庸醫多ハ此義ヲ不知惟酒
 性大熱ナリニ泥テ安ニ涼寒ノミヲ投テナラ其嘔吐ヲ增ニ至者不ハ轉筋
 陽明胃虛ノ肝邪ノ狂者トス蓋胃ハ衝脉ト俱ニ宗筋ノ會ヲ治肝ハ諸
 筋ヲ主故也肉桂温胃平肝且筋脉ノ冷之逐血ヲ行則筋温ニ潤テ筋
 脉ノ縮急轉疾者潤和神緩ヲ得テ瘥或云肉桂ノ辛熱實ニ寒ヲ逐ベ
 レ何潤ノ義アルヤ曰經曰以辛潤之ト肉桂走血分温者也血得寒凝
 得温行行則藏府筋骨皆能潤譬水ノ解テ潤流ニルカ如レ故血虛精
 虛症補陰劑中ニ加之滋潤功ヲ盛ニス夫氣水ハ合一者トス氣行則水
 行若氣ナク水獨行ノ不能故肉桂治煩渴且通水劑ニ加ニ是以温腸

不足ノ津液凝聚故ニ煩渴者用之陽氣ヲ温行セシムルキハ津液流
行ノ煩渴解レ猪澤淡滲劑中ニ此カ下焦温行ノ氣ヲ得バ水道通
利ノ功ヲ速ニス此古方小便通利ノ五苓散ニ肉桂アル所以ナリ腹痛
諸腹痛症ヲ治ス胃欲温故也尤中下焦ノ寒腹痛ヲ主或熱痛者
ト雖凡痛甚ノ寒藥反ニ難得者ハ以加之反佐向導ニ中焦ノ藥ヲ服
シ胃氣之行結熱ヲ劫ニ宜ニ元素謂春夏爲禁藥秋冬下部腹痛非
此不能止ト規矩ヲ示ノ一端也拘泥ス牛勿内經云用温遠温用
熱遠熱ト上温熱ハ藥性ヲ云下温熱ハ時ヲ指也春夏ハ君相二火ノ
旺分温熱ノ時タリ肉桂ノ辛熱時令ノ温熱ニ並ラ恐テ爲禁藥秋冬
ハ金水ノ旺分涼寒ノ時タリ肉桂ノ辛熱實ニ宜ニ下部腹痛トハ寒結下
焦臍下絞切ノ痛ヲ云桂ハ下焦ノ温劑タレ也然在春夏ト雖凡其此ヲ
用ベキノ症ニ適セハ恐リ勿レ且獨下部痛ニ不止中焦ノ寒結ニ因ニ大腹
痛者モ亦用之文字ニ執スルコト云冷痰其辛熱ナルヲ以テ九痰劑
ト合用ノ此功ニテ致ス腰痛内經腰爲腎之府故ニ諸經ノ腰痛アリ
ト雖凡俱ニ其本ハ腎ニ在肉桂能腎氣ヲ温補シ血脉ヲ通シ以テ諸
痛症ハ瘀血ヲ兼ズト云ト腎ハ主骨節腰ハ身ノ大關節且氣血之必ニ
滯滯易故腎氣虛冷則骨節滯滯腰關ノ氣血凝滯爲痛桂
ノ辛熱ヲ以テ腰腎温暖ノ化ヲ得則機關流利ノ痛解ス愚按二本州ニ
肉桂通瘀血ノ言ト雖凡別錄ニ隨胎通血脉ト云則此辛熱ヲ以テ瘀
血ヲ通ス少理アル知ヘト邊玄曰破胎ト肘后ニ治產後腹痛肉桂末酒
服直指方治打撲損傷瘀血困悶疼痛肉桂末酒服此豈通瘀血功
ナレト云ト時珍曰桂性辛散能通子宮而破血故別錄言其隨胎ト此
破血ノ義アルト明也是以孕婦雖忌之七月後ハ或服用害アルトナレ寒
痺中藏經痺者閉也風寒濕三邪交合ノ經絡ヲ閉塞シ氣滯滯疼

和語本草

痛者之云其風勝者為風痺濕勝者為濕痺寒勝者為寒痺肉桂辛
熱通血脉逐寒滯治寒痺且寒二因之血氣滯滯麻痺不仁者亦治
之失血肉桂温血通血脉非瘀血故也瀉痢温中下焦逐寒濕故也
驚癇小兒驚風大人癲癘俱二中焦不足肝邪過亢肉桂温補中
焦平肝邪故也傳曰木得桂而枯肉桂平肝木太過知通血脉
温血利經能血脉宜導百藥寒開泄氣熱八開通和利氣夕
桂辛熱能百藥氣宜通道利諸藥切盡故癯病久藥
效得方者必用之堅筋骨温血温精通血脉故也止唾下焦
虛冷邪水溢浮多唾咯者用之效嗽或寒邪或寒痰肺寒二
嗽用之又或下焦虛冷無根孤陽逆肺嗽者亦用之下焦温
補則孤陽歸根嗽痊滙日下行而補腎能導火歸原八是也鼻鼈
此亦上效嗽義同鼻鼈八鼻氣不通也利肝肺氣肝八

東方木藏發生條達欲強閉惡肺八補氣主温和欲寒
滯惡肉桂辛熱肝氣開利肺氣温利疏不足肉桂温中
焦補命門中下兩焦陽不足理雖此獨此之三之一切不
足理於八用之補劑其力得之四物湯二加八補血盛
四君子二加八補氣盛三大補湯二用八氣血補七八味左二用八下
氣補真精養或問別錄不謂補不足何之理疏上云肉桂
八純陽下焦不足八補中焦温之要劑然此百藥宜導諸
補劑其力得之一切不足理此中下焦温補スル餘力
也故二直三補上不云之理上云且桂能一切不足補理スル於之補中
二自温順和利存故二理疏上云是以肉桂八補劑之助之一切不
足理諸補劑之温順和
利之雷滯セレザル者トス
總要 肉桂八下行命門火補中焦温
温中下兩焦虛冷治血分

ヲ温血脉ヲ通レ肝肺氣ノ利スル要劑ナリ。故ニ陽痿不舉小便頻數
陰莖陰戶中冷小兒夜遺溺婦人帶下經閉虛冷ノ難產子宮冷テ子
ナキ者脫肛下血瀉痢後重飲食不消下冷テ小便不利產後下元
衰冷下冷孤陽迎上ノ頭痛寒噤寒嘔手足逆冷等一切中焦ノ陽虛
冷寒ニ屬者皆非此不能治或陽裏ニ虛ノ真寒多リ雖无根ノ孤
陽表ニ浮テ假熱ヲ致者亦用之真寒ヲ救則假熱自收其裏ヲ不
知ノ惟表ノ熱ヲ見テ妄ニ
用之テラ忠者ハ庸醫ナリ

使藥

黃芩黃連ヲ使トシ熱性ヲ制ス烏頭附子ヲ使トシ熱性ヲ入ニス人參

毒

孕婦勿用 雁安時日

甘草交門冬ト同ノ調中益氣柴胡紫石英乾地黄
ト合ノ治吐逆熱地黃ト合ノ下焦ノ氣血ヲ滋補ス
炒過則不損胎ト然在七月ノ後強テ心ニ不及也
○陰虛熱燥者○中焦實熱者○血症有熱者○目疾不屬脾腎虛冷者皆皆用テ勿

畏惡

火ヲ忌生葱石脂ヲ忌○肉桂有小毒色豆礞石
乾漆穿山甲水蛭ト同用ハ小毒化シ大毒ナシ

附方

死胎不下 肉桂末二錢腹痛緊時ニ童便ヲ温テ服ス觀音救生散
ト號難產橫生者ハ麝香少許ヲ加酒下尤功アリテ不損人何ハ方
足蹙筋急者肉桂末酒和塗一且一度出甲乙經中風失音肉桂
末著舌下嘔汁喉痺不語者モ亦用之出千金方小兒陰囊偏腫者
肉桂末水調塗梅酸方椒毒銅吻
芫青毒ヲ解ス肉桂煮汁服本綱

愚案

本經ニ肉桂性大熱トス愚按ニ肉桂性大熱ニ

非ス味甘ノ稍辛性大温ナル者也蓋大熱者ハ其氣酷烈温補ヲ化
ヲ施シ難夫肉桂温中補下焦不足何大熱酷烈ノ迅氣ヲ以テ補
和ヲ致テアラシヤ其稍辛大温タル故ニ温補ノ
和化アリテ一切不足ヲ療ス少要劑トハナル者也

修治

粗皮ヲ刮去テ用忌火○

凡桂二數名アリ。雖凡皆一樹ノ中ニ於テ功ヲ異ニシ名ヲ別ニスルノニ。各其別木アルニ非ス。桂樹ノ根ニ近處ノ皮肉厚味甘辛者ヲ以テ肉桂トス。宮桂ト云モ亦肉桂ナリ。其尤皮厚味辛ニテ上品者ヲ呼ビテ謂筒桂肉桂ノ類。氣味性功不可者也。肉桂ハ皮厚重色黑赤ヲ不腐。昔辛香ニル者ヲ以テ此即宮桂也。藥家ニ謂東京ト呼者有可也。其皮薄細輕者ハ桂枝也。藥店ニ多ク肉桂中ニ桂枝ヲ雜宜擇用。○吾朝俗間ニ肉桂樹ト云者ヲ植香味微肉桂似タリ。雖店直種ハ非ナリ。

桂枝

甘辛溫。○治傷風有汗者。療頭痛心脇痛。效逆結氣。喉痺利肺氣。及關節溫筋通血。止煩去皮膚風濕。瘡行手臂。治痛風爲奔豚之向导。○桂ニ云アリ。桂ノ近根厚皮者ヲ肉桂トス。外皮ヲ刮テ裏皮ヲ取テ桂心ト號頂上ノ細枝條皮ヲ以テ桂枝トス。故桂枝ハ輕

浮テ上升シテ太陰肺經ニ行。皮膚ニ達ス。且兼テ足太陽ニ入者也。傷風有汗症ヲ主。蓋桂枝ハ達表衛中邪ヲ解ス。バ也。夫邪氣傷衛則汗アリ。傷營則汗ナレ。故ニ傷寒邪傷營發熱無汗者ハ麻黃ヲ用テ直ニ開表發汗散邪解熱。傷風邪傷營發熱有汗者。麻黃ヲ用テ發散ニ過則重テ出汗表虛。邪氣反テ深ノ患アリ。故ニ桂枝ヲ用テ惟其衛中邪ヲ逐則熱解シ汗自止。別錄桂枝出汗ト云。仲景治傷寒無汗不得服桂枝。上漚云無汗能發有汗能止。桂枝ハ直ニ腠理ヲ開テ發汗者ニ非ス。又直ニ腠理ヲ閉テ止汗者ニモ非ス。桂枝ハ衛中邪ヲ逐。血脉ヲ調者也。凡汗ハ血液ニテ氣ニ從者也。故邪在衛分表氣不和及血脉不調則汗自出。桂枝直ニ腠理ヲ開密セスト雖此。此が衛分邪ヲ解シ及血脉ヲ調則汗自止。又桂枝出汗者ハ直腠理ヲ開發セスト雖此。此が調血脉和營則營衛和調。邪氣無所容

此二辛甘發散之義ヲ兼テ汗自出者也。或問桂枝ハ實ニ開表劑ニ非テ明々夫桂枝辛甘温劑也。内經辛甘發散スト。然ニ吾子何直發表劑ニ非ト云ヤ。曰桂枝ハ直ニ腠理ヲ開發者ニ非ト雖也。其味辛甘。性温ヲ以テ表邪ヲ解散セシムル義。自存セル者ナリ。故ニ發汗止解兩能アリト雖也。其本トス所ハ出汗解邪ヲ以テ主トス其止汗者亦表邪ヲ解スト。故ニ邪去テ汗自止トス。故ニ仲景ノ發表解散麻黃湯ニ桂枝アリ此桂枝ハ解表ヲ以テ主トスリト云ヒシ今人多謂桂枝止汗ト其意開表劑ト云護ナラズヤ。桂枝直ニ開表止汗者タラ何故ニ仲景用テ麻黃湯中ニ合セシヤ。蓋世ニ如此ト云者ハ傷寒論謂無汗不得服桂枝有汗不得服麻黃言ヲ以テ直ニ桂枝麻黃藥品タリト覺テ桂枝開表止汗者トス仲景所謂桂枝ハ桂枝湯ニ桂枝ノ藥品ハ非ズ麻黃モ亦然言ハ傷寒表症自汗アル者ハ桂枝湯ニ十九發散ヲ用テ輕其邪ヲ解セヨ麻黃湯ノ烈キ發散ヲ用テ勿レ又無汗麻黃湯ヲ用テ烈ク發散ヲ施ス。桂枝湯ノ柔ナル發散ハ其力少ク不及ヲ以テ也。故無汗不得服桂枝ト云。桂枝止汗故無汗勿用之ト云ニ非ズ。無汗者ハ強汗セシラ欲ス。桂枝湯ハ解表ノ力弱不足發之カ故ト云。或又問吾子謂邪傷營無汗傷衛有汗ト。然仲景謂太陽中風陰弱者汗自出衛實營虛ト。又云太陽病發熱汗出者此爲營弱衛強也。此汗出者ハ比有衛ノ實強トスルキハ吾子カ謂有汗者ハ傷衛ノ言ト反スルハ何ヤ。曰仲景謂衛實衛強トハ邪氣在衛ヲ以テ云營虛營弱トハ有汗者ハ血液ノ不固ヲ以テ云ニ。衛氣正實強ナルハ非ズ。營血衰虛スルハ非ナリ。衛氣正實強トス風寒邪何ニ從カ感入セン營血既ニ衰虛セハ桂枝湯ノ發散柔ナル者ト雖也。輕ク難投大抵寒ハ北方水陰化感人則腠理ヲ密閉ス故ニ麻黃ノ

表發別劑ニ非ハ急ニ其密邪ヲ解ニ不足麻黃湯可也症是也風
ハ嚴凝劇烈ノ時ニ行テ其化雖比寒其氣本東方木ニ生ノ陽タリ
故ニ風邪感入則此モ亦燄理ヲ改閉スト雖比寒邪ノ禁固密閉ス
ルガ如ク非ス是以不至用麻黃惟桂枝ヲ用テ輕輕ニ其邪ヲ解
散ス彼桂枝湯不可發汗症是也宗奭曰仲景桂枝湯治傷寒
表虛比自疑此藥正合辛甘發散之意人能桂枝湯ノ深義ヲ得
者ナリ傷寒表症ニ表虛者其表ヲ補ト欲ハ邪氣アリテ補住
ヲ忠偏ニ其邪ヲ發散セント欲ハ重テ表虛ヲ忠惟桂枝湯之良
表ヲ開ニ非ス輕輕ニ解肌邪去ノ劑ヲ以テ當リトスルニカス愚諸家
ノ言ヲ詳スルニ承曰仲景發汗用桂枝乃枝條非身幹也取其輕薄能
發散成無已曰風邪于於衛氣者乃可投桂枝時珍曰桂枝透達營
衛故能解肌而風邪去ト此實ニ桂枝ハ直ニ腠理ヲ開發セスト雖比肌
邪ヲ解散セシムルノ要劑也決ノ開表止汗者ハ非ス頭痛桂枝輕解
之ヲ行ス故ニ傷風頭痛ヲ治スルヲ主ル心脇痛桂枝通血脉逐風寒橫
行ノ心脇痛ヲ治ス欬逆桂枝辛溫散寒甘溫行脾肺氣治欬逆結氣
辛ハ散シ甘ハ緩溫ハ行故桂枝解結氣義アリ且桂枝ハ手太陰藥肺
主氣故也喉痺桂枝輕浮上行レ逐風寒行肺氣也利肺氣及關節
桂枝ハ其形細薄ノ氣味モ亦肉桂ニ對則薄トス故ニ上行ノ利肺氣
透骨隋利關節溫經通血入筋也樹木ノ枝條ニ比故桂枝辛甘溫
溫舒通血脉筋脈ノ寒滯ヲ逐ベ血得寒凝得溫流通ス也止煩
利肺氣及結氣通血脉故胸中煩悶ヲ治ス然在實火在肺者勿用去
皮膚風濕桂枝氣味薄體輕ノ透肌達表去皮膚風濕寒濕橫行手
臂治痛風桂枝ハ桂樹ノ枝上ノ皮也故入ノ手臂ニ橫行ト上行ノ關節
經筋ノ風寒ヲ逐通血脉治痛風要劑也爲奔豚之向導奔豚ハ

腎積名也其狀癰下二起テ心下二衝腎氣虛ノ逆ヨリ立有也桂枝ハ手

太陰肺足太陽膀胱二行肺腎上下氣ヲ温行ス故用之腎積ノ起

下衝上者ヲ向導ノ本位ニ歸セト向導トハ桂枝温利上

温利下腎積ノ上下二奔者ヲ本位ニ向導セシムルノ義ナリ

味薄體輕ノ上行頭透達表解肌邪治傷風有汗者要劑横散

手臂關節痠痛風

桂枝雖出汗發散ヲ不專故傷寒表邪禁密ニ

之無汗者偏發汗ヲ欲者ハ獨桂枝治スル所非ス

肉桂ノ細薄者也此桂ノ枝條ノ皮也色紫赤者良白氣タルハ

不可其味本肉桂ヨリ薄ト雖在甚淡者ハ不可桂枝ノ中ニ於テ

其味烈者ヲ擇用此モ亦粗皮ヲ去斷使已心火○今ハ桂枝者ア

リ此今謂官桂ノ枝ヲ打ヒキタル者也今謂官桂ハ本州所謂茵桂

類ニシテ真桂ニ非ナリ或松蒲桂心一種アリ此ヲ桂枝トノ用者

アリ尤非ナリ桂心條惟肉桂ノ中ニ於テ枝條皮ノ細薄者ヲ擇用ヨ

桂心 甘辛苦温○治心痛腹内冷氣痛欬逆結氣麻痺不仁風僻失

利關節下胞衣解毒○桂心ハ手厥陰心包手少陰心足太陰

脾ノ血分ニ入テ通血脉破瘀血且扶陽逐寒利心氣宣壅塞者也心

痛腹内冷痛心ハ生血屬陽惡寒桂心通血破瘀温上中焦逐寒

宣血氣壅塞故ニ諸心痛及腹内冷痛甚者ヲ治ス熱邪實ニ因テ

心腹痛者ハ勿用欬逆逐寒致温冷虛氣歸元故也結氣專胸中

心氣結ヲ利ス麻痺不仁血不通氣不行血氣温濟則此患アリ桂

心血氣壅塞ヲ温利故也風僻中風口眼喎斜者ヲ云千金方法中

風口目相引頰急舌不轉者桂心酒煮取汁散布ニ蘇左鳴者撮右

右喘者楊左常二用之入效アリ喘正則止此桂心通血脈宜壅塞也失音中風音不出者風寒乘陽位血脈壅上陽氣結胸故也桂心陽位之寒逐心胸之溫利壅結之運行也喉痺失音之治スル義同蓋熱火之實逆二因者ハ勿用五勞七傷扶陽氣溫血脈故也下痢瀉間云行血則便膿自愈調氣則後重自除桂心辛甘苦溫通行血氣壅塞故治下利後重主劑上入月閉通血破瘀治婦人月水閉滯挛縮通利血氣逐寒利關節治四肢筋骨挛縮癱瘓瘰癧瘰癧積八屬瘀血甄權曰桂心破血大明曰消瘀血下陽虛桂心八入少陰心君火厥陰心包相火陽虛ヲ扶下陷氣ヲ溫提ス失血桂心ハ手少陰手厥陰足太陰ノ血分ヲ治故也然凡血熱者ハ妄用丁勿レ婦人良方神應散アリ婦人月經不時崩出不止者桂心不拘多收砂鍋煨存性爲末米飲服肘后法吐血下血者桂心爲末水服一

引血化膿故癰疽疔瘡用之溫柁ス利關節通血行氣溫利骨節治風痺腰痛脚痛下胞衣溫通血氣破瘀血故也解草木毒傳曰木得桂而枯桂樹ハ艸木ノ所畏ノ者タリ故ニ解艸木毒ノ功アリ

總槩

肉桂ハ補命門溫中焦助心火桂枝ハ達表解肌利肺氣桂心ハ心脾肝腎血分ヲ溫利又心陽腎氣兼治

者○心熱アル者○孕婦皆

畏惡

心火皆肉桂下同

附方

頭痛太陰風雨ニ發者桂

心末酒調頭上項上塗出聖惠方小兒傷濕臍腫者桂心炙熱熨臍日四五度出姚和衆方

愚案

本艸匯云甄權謂殺二蟲

治鼻中息肉大明謂益精明目此皆非其性所宜也何者味既帶甘焉能殺蟲愚案桂心專辛苦甘其性溫多辛苦實二退蟲

味温勝濕濕去則蟲奔退ノ義アリ。豈一槩ニ甄說ヲ以テ非トセン
ヤ。又漚云息肉由于肺有積熱。瞳子神光屬腎。桂辛而大熱其
不利于肺。執腎陰不足亦明矣。益精明目。徒虛語耳。愚按二息
肉症。肺二積熱。凡者實二桂心不可。若其心肺氣不足。上陽不
行。故二津液鼻中二凝。致者。六桂。温熱ヲ用テ。行陽温津順氣
血。二宜。余息肉ヲ連。久。補中益氣湯。二桂附ヲ加テ。遂愈。且瞳
子。鼠月陰。二因。雖。獨陰。ニ。以。其光明ヲ致シヤ。內經。目。八神ノ
使。入。荷陽氣ノ精和二非。八目睛ノ光明アルナレ。又腎ノ精陰ヤ。陽
氣根陰中下焦ヲ固ス。仲景八味丸ノ意是也。陽氣虛陷ノ日疾下
焦虛冷ノ精虛用桂附得全效者不少。豈一槩ニ息肉屬肺積熱ト
シ。益精明目說ヲ以テ。皆虛語トセンヤ。惟醫道ハ臨機應變ニリ。凡
病因千變萬能ナ。治法亦千變萬能ナリ。必レ一定ノ義アルナレ

修治

肉桂ノ粗皮ヲ削去テ。剉去テ。裏ノ皮肉一片ヲ用テ。桂心トス。
其氣味尤正。精者也。劉使忌火。○時珍雷斂說。六肉桂ノ內
外ヲ剉去テ。中心ヲ用ユト。然。尼。味。之。肉。桂。ノ。粗。皮。及。中。心。ハ。味。淡。辛。味。
ナシ。惟。裏。皮。ノ。三。味。精。者。也。二。氏。說。混。心。字。去。內。外。用。中。心。ト。入。誤。也。蒙
筌曰。迦木黃肉。但去外。形。鑿。皮。集。要。云。削。皮。厚。近。裏。者。爲。桂。心。ト
此兩說尤可也。肉桂ノ外皮ヲ厚剉去テ。裏ノ皮肉ヲ用。味甚辛。精者
ヲ以テ桂心トス。心ハ中心。義ニ非ズ。心裏ノ意也。○和ニ松蒲桂心一種
アリ。香氣少。桂ニ似タリト。雖。尼。味。其。異。也。真。種。ニ。非。ズ。不。可。用。○桂樹
一木ノ中ニ於テ肉桂。桂心。官桂。薄桂。桂枝ノ五品アリ。各其主能ヲ
異者也。藥性賦曰。其在下最厚者曰肉桂。在上下有入腎之理。去其麁
皮爲桂心。入心肺。其在中心次厚者曰官桂。入肝脾。其在上薄者曰薄
桂。在上而肺胃亦。其在嫩枝。開發者曰桂枝。四發有發散之義。本州

漚云官桂即在中之次厚者味稱淡于肉桂皮薄少脂因桂多品而取其品之最高乃上等供官之桂也入足厥陰大陰經主中焦有寒結聚作痛上今四等ノ桂ヲ

桂四品



圖ノ初學ニ示テ如此ト云
桂葉膏碎浸水洗髮去垢除風

側柏



葉苦辛微温○治吐血衄血血崩血漏血崩血赤白帶下濕痺風歷節痛輕身益氣生肌耐寒暑

益人久醫凍瘡燒取汁塗頭黑髮髮傳湯火傷止痛滅癩煎湯常服殺五藏蟲避邪 柏二數品ノ人入藥惟葉扁側生者ヲ用故側字ヲ加凡萬木皆陽此木獨西方白金二向故柏ト號○柏ハ西方金位ニ向テ陰木タリ故ニ其葉ヲ采モ亦月建ニ隨テ采故補陰血分

ノ要藥トス是以諸血症ニ用之止血補血且氣味苦辛温ニ風濕冷ヲ去テ痺痛歷節疼痛ヲ治ス夫有性柔木ノ體ニ從テ久榮大地堅剛ノ氣質ヲ稟テ多壽ノ木也故人服則輕身益氣生肌四時寒暑一耐忍ニ至昔秦王之宮女關東ノ賊至ニ遇テ驚馬走テ山中ニ入飢ニ至テ一老翁アリ救テ松柏葉ヲ喫シム久食テ遂ニ不飢身ニ雖無衣服冬夏不怨寒熱身生黑毛如飛燕時ヲ去テ二百餘歲ニテニ木死號テ毛女ト云葛洪抱朴子ニ見タリ此輕身益氣生肌耐寒暑人命ヲ補益元ノ證驗也又麝香柏葉ヲ食テ體香故ニ不正ノ瘡疫ヲ避元且二柏葉浸酒飲ハ歲中ノ邪惡ヲ辟丹溪日柏性多燥久得之入益脾土以滋其肺上此が苦辛温燥濕温中益脾土滋肺上土生金ノ義ナリ

總槩

柏葉性堅善守故安行人血ヲ止補陰ノ要劑

使藥

得酒宜瓜子壯

毒

柏葉雖補陰劑過服

壅滯セシムルノ害ナキ者ナリ

則燥ヲ致ス。雖血

症多服スル勿レ

思惡

菊花羊蹄諸石。麩麩ヲ畏。得酒反宜。砒礬毒ヲ伏ス。

附方

酒毒下血或下

痢嫩柏葉九蒸九晒陳槐花炒焦一兩爲末蜜丸梧子大空心溫酒

多服出普濟方。瘰癧核痛未成膿者柏葉搗塗其上復熬鹽熨氣

下即治。出集驗方。月水不止。側柏葉炙芍藥等分。每用三錢。水酒各

半煎服。室女八側柏葉木賊炒焦等分爲末。每服一錢。米飲下。出聖

濟總錄。柏二數種アリ。入藥葉上二微赤毛アリ。不葉扁二側生

者良。采之春東夏南秋西冬北葉ヲ用。此ヲ月建二隨

採上云。枝ヲ去葉ノ兩畔ト心トヲ鑷去テ用。或生或炒使。

柏子仁

甘辛平。益氣安五藏。令人潤澤耳目聰明。益血止汗。潤肝養心。氣潤腎燥。安魂寧神。智興陽道。除風濕。治頭風腰腎冷。膀胱衝水。小兒驚癇。驚悸恍惚。節痛。腰中重痛。虛損。短氣。燒濕。去百邪。鬼魅。治亦癲。不飢不老。延年。柏子仁。肝經氣分藥也。性

不寒不熱。平。味甘辛也。甘ハ補辛ハ潤。其氣清香。ノ行入體。二

油アリ。滑也。能燥ヲ潤ス。故達心定神。透腎潤精。益脾胃。涼血補

氣。降妄動邪火。仙家上藥。滋養之良劑也。古赤松子食柏實。齒落更

生。行步馬奔。如如ト

云者。虛語ニ非ズ

總聚

柏子仁。心神肝氣ヲ安。以腎燥ヲ潤。魂魄ヲ安。智志ヲ益。驚悸恍惚ヲ治ス。ノ要

劑。鬼惡邪ヲ避。之良藥也。多者。大便瀉者。勿用。

畏惡 菊花羊蹄。附

方

下血。柏子仁十四箇。搥碎。囊貯。浸酒三盞。煎八分。服立止。出普濟方。老人大便虛秘。柏子仁。松子仁。大麻子仁。等分。同研。蜜蠟

丸。梧子大。少。黃丹湯。

修治 紙二張。テ搥テ油ニ去。炒乾。レ春碎テ。食前服。寇宗奭方。

修治 紙二張。テ搥テ油ニ去。炒乾。レ春碎テ。食前服。寇宗奭方。

蒸熟。曝乾。春。取仁。炒。研。用。

本神。雁。云。印。去。油。已。油。者。勿。用。

香沈



辛苦温。補右腎命門。暖腰膝。壯陽。治上熱下寒。精冷。温和中氣。降逆氣。治霍亂。轉筋。氣痢。禁

口。氣淋。大便秘。噎逆。麻痺。骨節不任。心腹痛。涎血。喘逆。風毒。水腫。皮

膚。癩。癢。癢。瘰。癧。中惡邪氣。瘡。腫。入此蜜香樹。積年。老木。根。下。繼。下。枯

者。入。等。雨。露。二。浸。サ。テ。外。皮。朽。爛。其。心。節。不。壞。堅。黑。芳。香。入。水。沈

者也。故沈香或沈水。號。或。云。蜜。香。樹。ヲ。切。テ。坎。二。填。經。年。雨。水。浸

漬。レ。枯。槁。ノ。成。香。者。也。上。〇。沈。香。入。水。沈。故。二。達。腎。補。命。門。元。陽。暖

腰膝。壯陽。事。功。アリ。上。熱。下。寒。此。下。寒。ヲ。本。上。入。命。門。陽。虛。ノ。下

寒。故。二。陽。氣。逆。ノ。上。熱。者。也。用。之。温。下。則。陽。歸。根。上。熱。自。退。精。冷。男

女。精。冷。者。八。因。命。門。不。足。温。和。中。氣。脾。神。欲。芳。香。沈。香。八。獨。命。門。三

入。ノ。三。ナ。ス。中。焦。脾。胃。二。入。テ。中。氣。ヲ。和。レ。胃。ヲ。温。胃。口。ヲ。開。其。辛。温。ヲ

香。アル。ヲ。以。テ。且。此。香。木。ニ。沈。水。故。肝。木。ニ。入。テ。衝。逆。氣。ヲ。降。ス。又。辛。ハ

散。レ。苦。ハ。疎。レ。香。ハ。順。レ。温。ハ。行。開。ス。故。氣。血。ノ。鬱。滯。ヲ。順。行。セ。シ。ム。又

辛。ハ。散。通。レ。香。氣。ハ。筋。骨。經。絡。ノ。間。隙。ニ。透。レ。辛。温。能。逐。冷。濕。是。以。治

霍亂。ハ。温。和。中。焦。故。吐。瀉。自。止。轉。筋。温。中。經。筋。ノ。冷。ヲ。除。故。也。氣。痢。温

下。順。氣。故。後。重。自。除。禁。口。痢。ノ。不。食。者。之。云。温。和。中。焦。胃。口。故。也。氣

淋。沈。香。雖。不。通。水。能。氣。ヲ。順。レ。下。ヲ。温。則。氣。化。ノ。水。通。ス。六。也。大。便。秘

下。温。二。氣。順。ノ。氣。結。ノ。大。便。秘。ヲ。治。噎。逆。靈。樞。口。問。篇。ヲ。以。テ。考。二。噎

ハ。中。下。焦。ノ。寒。ニ。因。沈。香。温。中。下。焦。故。也。麻。痺。骨。節。不。任。不。任。上。或。痛

或。痿。テ。不。屈。云。沈。香。達。經。絡。筋。骨。去。冷。風。濕。順。氣。血。故。也。心。腹。痛。温

中。下。行。氣。故。也。寒。痛。者。尤。宜。涎。血。脾。胃。ノ。痰。涎。帶。血。出。者。胃。陽。薄。脾

濕。動。肝。氣。逆。也。用。之。辛。苦。香。去。脾。濕。辛。温。養。胃。陽。其。沈。性。降。逆。氣。愈

喘逆肝氣衝逆症及下寒之虛氣上衝者俱用風毒水腫沉香雨露
ノ精氣ヲ得テ風毒ノ經絡ニ爵者ヲ去辛苦溫除脾濕治水腫非通水
劑也皮膚癢癢沉香ハ蜜香樹久年雨露風寒ニ曝サレ皮朽テ其心節
堅者也故皮膚溢滯邪ヲ排テ癢癢ヲ治癩瘕其性ノ堅ト辛香ノ順
緻トヲ以テ癩瘕結滯ヲ破中惡邪氣燒之薰スハ穢臭氣ヲ失實ニ
鬼邪ヲ除テ證驗也瘡腫或薰或煉膏中療瘡腫樞鈎玄痘瘡點疔者
沉香白檀乳香等分ニ燒テ
撫兒薰之痘頂起法アリ

總標

補命門溫中焦開胃口順氣
皮膚經絡筋骨間滯氣利入

使藥

人參首補遠志茯神酸棗仁生地黃麥
門上回思慮傷心氣結鬱者ヲ治ス

毒

真氣沈虛者
心胃腎三火

熱了者○陽氣下陷者皆勿用○非命門不足不宜入下焦劑○沈
香順氣散氣久服過服スル勿○氣虛老人勿妄用辨冷熱或火用

畏惡

火三烘日ニ
曝フヲ忌ム

附方

胃冷久嘔沈香紫蘇白豆蔻仁各一錢爲
末柿蒂湯服五七分出活人心鏡小便不

通或強テ忍房事或忍小便所致者順氣愈沈香水
香各二錢爲末白湯空腹下通小便止出醫壘元戎

愚案

沈香辛
溫通行

上其性沈水當行下降氣導火歸元溫腎升水功アリ故王璠百一
選方ニ朱雀丸アリ沈香五錢茯神二兩爲末煉蜜丸小豆大食後人
參湯服治火不降水不升健忘驚悸者此愚所謂水火既濟
功アリヲ自ハハ雁曰通天徹地保和衛氣爲上品藥也

修治

沈香全皮先朽ヲ刮去テ剉用丸散ニ先剉後末ス煎湯ニ別ニ磨
末服時ニ隨湯中ニ加他劑ト同合煎スル勿レ火ニ烘日ニ曝フヲ忌
○凡沈香ニ品アリ沈水者ヲ沈香トス半沈者ヲ棧香トス浮者ヲ黃
熟香トス入藥水底ニ沈者ヲ宜トス半沈者次之不沈者負藥ニ入勿

檀薰衣枝燒鬼神又雖沈水中空三ノ朽凡者有雞骨香七號不堪入藥
○今本邦ノ藥店ニ所謂沈香ハ水ニ入レ不沈香氣モ亦清精ナラス
此後實熟香蜜香ノ類ニ。眞沈香ニ非也或謂奇南香此眞沈香也
ト蓋今度伽羅香中ニ水ヲ入浸テ來不沈香氣吾朝ニ於テ乾テ賣
之今所謂沈香ハ其儘櫃ニ入テ度之則奇南香ハ此眞沈香ニ今
所呼ノ沈香ハ本州ノ蜜香也ト○愚按スルニ沈香蜜香奇南香ノ三
種皆一類之中ノ別種也或云沈香ハ老木ノ自斷外テ久年ニ香ヲ結
者也奇南香ハ沈香ノ生木ヲ伐外テ積年香ヲ結者ト云モ亦不
是沈香奇南香一類ニ異種也本綱ノ諸説ヲ考ニ此本番國ヨリ
出者ヲ諸説紛綽ノ時珍モ亦未能決其樹狀葉實香氣結成之製
者ニ似タリ余竊嘗思之奇南香其香清精ニ奇ナリト雖凡沈水
ノ別ナレ蜜香ハ其香蜜ノ如ト雖凡此モ亦沈水ノ別ナレ沈香ハ水
沈ノ義アリ故ニ此香獨沈香水香ノ名ヲ得タリ各其取不正乎今
所度者皆亂雜ノ三香ノ中ニ於テ惟其香氣ノ清精者ヲ擇拔テ迦
羅ト號シ壺ニ藏ノ價ヲ高ノ度スニ香ノ中ノ香氣不清精者ヲ
取テ沈香トシ櫃ニ入テ價ヲ卑ノ度者トシ乎此本邦ノ藥物ノ
沈香ヲ輕シ薰衣迦羅ヲ輕スルガ故ニ異域者王亦其價ノ高下
從テ沈水與不沈ノ別ナク香氣清專ナルヲ迦羅トシ度シ香不清
專者ヲ沈香トシ藥物ニ度テ今ヤ欲用藥者ハ必シモ奇南香ニ
モ不止復沈香ニモカキルベカラス沈香迦羅ニ香ノ中ニ於テ色黑
體堅不朽不空味ニ辛香ヲ辣カラス燒之香清專者ヲ取テ水
能水底ニ沈者ヲ擇用テ沈香トスベシ色體黑堅不朽不空味不辣
香清專ナリト云モ水ニ不沈者ハ眞沈香ニ非ス勿用惟此香獨沈香
沈水香ノ號アルヲ以テ擇用ハ莫不可者乎○時珍說ニ沈香ヲ欲

本草綱目

卷之十一

香

宋景紙中待燥研則粉二成易上此法尤可也沈香忌火故二難未此法蓋火二燬代十リ

沉香

辛溫去臭氣除鬼惡邪去傳尸注○此モ亦沈香種類也然沈水ノ義ナク且香氣味不如沈香○今所度沈香ノ中二雜之多被入水不沈者此等方若以此真沈香功ヲ求ト欲其難カク

丁香



辛熱○溫胃去胃寒治霍亂吐瀉壅脹噎逆腹痛反胃嘔逆痘瘡灰白不發口臭毒痢酒毒症

胸痺胸痺陰痛陰冷腎積冷勞風毒諸種五痔殺蟲辟惡邪壯陽腰膝○禹錫日以其似丁子故呼爲丁子香原始日形加鉤子故名丁香○丁香辛熱氣厚味烈純陽能升散入手大陰肺足少陰腎足陽明胃經二入溫胃去胃寒此方要能也故治霍亂吐瀉丁香

香烈味辛八走散之壅滯氣之行入故中氣壅塞ノ腹脹ヲ療ス冷厥逆反胃腹痛嘔逆亦溫胃去胃寒故也熱痛熱嘔者不宜用痘瘡灰白

不發小兒痘瘡灰白色不光澤不起發或腹脹瀉下或瀉或息氣促者寒氣鬱陽明陽氣不得伸順然故丁香辛熱ヲ以テ陽明寒鬱ヲ退陽氣ヲ伸順セト六痘紅澤ニ起發入陳氏ガ異功散木香散ノ

義是也然一藥二例ノ不宜用苟陽明寒鬱ニ非ハ輕此辛熱ヲ用ト勿レ口臭去口臭良藥也口臭症冷熱ノ不同アリ或ハ中焦冷

濕ノ氣鬱過ノ致者丁香辛熱尤可也若脾胃鬱火溢入肺中濁氣口ニ衝上ヲ致者アリ此亦丁香辛熱ヲ以テ鬱火ヲ劫散セシム

然凡脾胃火ニ屬者ハ本丁香ノ主ニ非ズ香薷主之丹溪云脾胃有鬱火溢入肺中發爲口臭若以丁香治之是揚湯止沸爾惟香薷治之

其捷毒痢五色爛錦ノ如者ヲ下ス此ヲ毒痢トス冷濕濁惡氣タリ

丁香辛熱去冷濕其芳香辟惡毒邪也酒毒辛熱ヲ以テ酒毒濕熱

フ却散ス**疝癖**辛香走散ノ血氣ノ壅滯ヲ行也**齒疳**蟲食齒痛落

者ヲ云丁香殺蟲除穢惡邪也**胸膈**陰邪閉上焦胸痺痛者ノ云丁香

香升テ去陰邪順陽氣也**陰痛**陰冷腎積丁香雖純陽亦足少陰

腎二人故寒氣爵下焦前陰痛及冷ヲ治且下焦虛冷腎積奔

豚症ヲ收**冷勞**虛冷勞症或用之然凡辛香走散劑勞症ニ於テ

妄用テ勿**風毒**諸腫風寒毒ニ因者及諸腫痛毒氣用之寒ヲ排

滯疑ヲ行**穢毒**去五痔下焦ノ冷濕或蟲痔症用之或熱ニ因

者モ亦微用テ**排穢氣**殺蟲諸蟲ハ濕與爵ニ生ス丁香熱勝濕辛

香散爵排穢**辟惡邪**此其香氣ヲ以ナリ**壯陽**暖

腰膝入下焦溫腎故壯陽專腰膝ノ冷痛ヲ暖治**總槩**丁香ハ温

退肺氣冷滯一切壅滯穢毒邪惡氣ヲ去**使藥**五味廣茂ト同ノ

者也温下功アリト雖凡此ガ主能ニ非ス腎積奔豚ヲ治ス

毒好古曰此師ト丁香ハ升上走散ス氣虛者勿妄用久服過

服スルヲ勿損肺氣傷目冷寒ニ屬者ニ非ハ勿輕用

畏惡忌火畏爵金使ニ去丁香蓋乳**附方**反胃吐食丁香一兩為

子用不然令人發背癰**大噲**一丸出袖珍方呃逆不止丁香一兩柿蒂焙一兩為末每服一

錢入參湯下出濟衆方婦人陰冷丁香末囊盛如指大入陰中出

本艸衍義**鼻息**因丁香綿裹入鼻孔出聖惠方**齒疳**黑臭丁香香

煮汁含出外臺秘要**唇舌**瘡丁香末綿裹含出外臺**乳頭**破丁香香

未傳之**修治**丁香ニ雌雄アリ雄ハ顆小也此ヲ丁香ト號雌ハ顆大

梅師方山茱萸ノ如母丁香在雞舌香在號擊破ハ兩解雞舌

ノ如雞舌香治風毒水腫霍亂心痛去惡熱ノ功雄者ニ勝リ使ニ頭

ノ圓蓋ト四出タル尖ト尾トヲ去若不去テ背癰ヲ發ス到テ其儘用雜

我此毛亦擇去べし勿見火○或問雷敷日雌者人如山菜萐名母丁
香入藥最勝時珍曰雄爲丁香雌爲鷄舌今通用者八皆類小丁
雄者即丁香也雷敷說人如則所大鷄舌ヲ擇用テ可ナラシ者歟曰
本綱ヲ考ニ鷄舌香條ニ於ハ主能ヲ述テ不詳丁香條ニ於ハ反テ
詳審也然則強テ八者ニ不可拘惟味テ辛香氣全不朽不陳者
用テ可也

下皮氣味同香○治齒痛心腹冷氣諸病方家用代丁香○此丁
香樹ノ皮也桂枝ニ似テ厚者也

枝八丁香樹枝○治一切冷氣心腹脹滿惡心泄瀉虛滑水穀不
消丁香樹根辛熱有毒○治風熱毒腫不入用心腹劑

白檀 辛温○利氣調脾肺利胸膈治膈噎吐食心腹
冷痛霍亂中惡鬼氣散冷氣引胃氣上升殺蟲



水磨塗外腎及腰痛面生黑子每夜以水洗拭令赤塗之甚良○檀
八善木也故字从木从直直善也○白檀芳香辛熱ニ至高分ニ行

胸膈上至咽嗑專利氣要藥也入手太陰肺足少陰腎足陽明胃經
佐姜棗輔葛根縮砂益智豆蔻通行足陽明經○真氣耗虛者○熱

燥者勿用○瘰癧潰後諸瘡膿多者忌用紫檀鹹微寒○磨塗惡瘡
腫毒風毒腫傳金瘡止血止痛又治林磨醋調塗一切卒腫○檀ノ

紫色者入血分涼
血熱行滯血也
修治 用藥白檀尤宜トス其儘用外皮一片ヲ
秘去或剉或絞磨末之使忌火○色白者ニ

之不朽堅重者良朽
輕及赤色者不可也



烏 辛温○散結氣治中風脚氣疝氣厥頭痛腫脹
喘急小便頻數及白濁反胃吐食瀉痢霍亂心

腹痛宿食不消去中惡鬼氣疫癘小兒腹蟲除腎膀胱冷氣攻衝其
 腎婦人血氣痛治癰癤疥癩猫犬百病△色烏ヲ以テ號○足陽明胃
 足少陰腎經ニ入一切結毒氣ヲ散ス其香窠辛温ヲ以テリ且逐冷温
 中又利血蓋結氣ヲ散則血自利ス少義也此惟散氣降氣ノ劑也
 故治中風脚氣疝氣亦氣ヲ順則風寒濕邪自散血行經通宜トス
 厥頭痛或結氣厥ノ頭痛或風寒氣厥ノ頭痛者用之散氣降氣宜
 トス**腫脹**順氣則脹自緩且又此カ温中也氣順中温則水濕自退
 テ腫消ス**喘急**順氣降氣也小便頻數白濁小便屬腎膀胱從氣烏
 藥腎膀胱間冷氣ヲ散降氣順氣故小便長通ノ頓數止白濁愈反
 胃吐食瀉痢霍亂心腹痛宿食不消此皆入足陽明胃温中順氣故
 也然凡其症冷ト結氣ト非ハ勿用平氣虛耗者上熱症者上六對酌
 スベシ蓋香藥ハ散氣辛温ハ助熱也去中惡鬼氣疫癘香窠ヲ以テ
 鬼ヲ散シ辛温ヲ以テ其邪滯ヲ散也小兒復蟲蟲ハ生穢與濕此カ
 香窠辛温ニ穢去濕除也除腎膀胱冷氣攻衝背脊虛冷氣ハ此
 ガ主治ニ非ス腎膀胱間ニ冷氣ノ客滯アリテ此カ背脊ニ攻衝テ拘強
 急痛者ニ用テ温散シ且其厥衝邪ヲ降ス婦人血氣痛或忿怒或
 思悲ニ因テ血氣衝上心腹攻痛者用テ順氣降氣治癰癤氣順
 則血行氣血順行則腫消痛退疥癩順氣血行且風冷ヲ温散殺
 蟲辟穢惡邪也猫犬百病猫性遲澁ニ不忍寒冷犬性速疾ニ惡
 閉隱故猫病用之散氣温冷犬病用之速疾氣性ノ病テ閉隱者ヲ
 開散ス猫犬性遲速異ナリト雖凡治之者烏藥獨宜トテ得ハ實ニ
 理ナルカテ蓋性遲者病テ加遲ニ苦速者病則遲ニ苦ノ義ナリ

總

藥

結毒壅滯ノ氣ヲ順散温氣血及中焦退中下焦冷降衝上氣
 散氣滯治中氣要劑也或小便通利劑用之者ハ氣順則水自

利ス

義ナリ

毒

此順氣散氣其勢烈也香附ノ氣性ト不同香竄辛温
真氣ヲ散シ易ク久用過服スルコト勿ク參芪木ノ類ト合用

スベシ○雖治中氣中風詳ニ察虚實

附方

烏藥ハ香竄散氣劑
補益者ニ非ス古人單

使弱者ハ勿用○内熱者ハ斟酌スベシ

修治

柔肉白者良粗皮ヲ去
頭尾ノ細處ヲ去テ側

取リ有テラ恐故今其附方ヲ缺者也

生用或酒浸一宿ノ炒使○烏藥根ハ直根ノ老根ヲ勿用色黑堅

難到者ハ直根也不堪入藥惟直根ノ旁ニ附テ横生スル嫩根連珠ノ

者ヲ用ユ然モ海南ノ烏藥黑褐色ニ堅ニ功カ尤モ大也然則黑堅者

中ニ於モ其横生ヲ當人刀者ハ用テ可也黑甚堅ノ直根不入刀者ハ

勿用○今所度者括云者雀頭尾細如括節アリ一種ハ無括堅ノ難入

刀者ヲ雜ニ此直根ノ老根ナリ擇テ勿用烏藥葉下通少陰腎經上理

乳香



即此薰陸香也辛温○療諸瘡疥血定痛長肉
托毒護心治耳聾中風口噤不語婦人血氣痛

理風冷止大腸瀉痢伸筋補腰膝治不眠治產難折傷止霍亂中惡

邪氣心腹痛治風毒水腫ハ其垂瀝テ乳頭ノ如シ故ニ號○乳香入

手少陰心經活血定諸痛能使腫毒外出不致內攻故護心十二云護

心腫毒ヲ花出内心ヲ攻ガラムル義也外科合沒藥入用膏中蓋乳香

活血沒藥散血復療諸瘡也治耳聾或問乳香大明謂下氣益精治

腎氣元素謂神腎下其治耳聾者亦補腎義ニ從歟曰大明元素說

ヲ察スルニ乳香ハ樹脂ノ出テ結者也然則乳香ハ其脂液タルヲ以テ故

ニ益精補腎功ヲ云ニ似タリ然モ其氣味辛温香竄也補陰者ハ甜

潤氣味ヲ以テ致ニ在。或内經ニ以辛潤義アリ。雖モ辛香走氣。潤陰義ヲ以テ致ニ在。或補腎陽トスガ然。在香劑ハ散氣何補氣ト云フ有ヤ
二家以テ益精補腎說恐ハ謬言乎。其下氣說ハ或可也。此亦降氣
ニ非ズ。下散ノ義也。或又問醫林集要治遺精乳香一塊。指
大臥時細嚼含至夜半嚥下。三五服愈ト。得效方治淋病。湯血乳香
研細米飲服。一錢。山居四要治玉莖在腫乳香。葱白等分搗搗。此
書行堅治下氣ニ非ヤ。曰不然。積屬腎。膀胱屬三屬。上雖モ亦心氣
ノ化ニ從者也。乳香入心經。治血辛香當行心氣。彼所治遺精淋病ハ
心爵ノ然リ。湯血ハ血分ノ滯テ然リ。彼玉莖腫ハ此ガ腫毒ヲ逐ニ
從者也。此ヲ見テ。誤テ乳香治腎補腎者トナス。勿レ然。在愚狂矣
ノ愚見ヲ以テ。元素大明二賢說ヲ辨スルニ不足。後學復。是否ラ
何如。中風口噤不語。舌ハ心苗トス。心經ノ中風ニ。上癰。陽氣不開。

則口噤舌或緩或急。不語。乳香辛温。心經。疎風。開陽。活血。治口噤
不語。婦人血氣痛。婦人齒怒等。二因。血氣衝上。心痛者。用之下
氣活血。則愈。理風冷。乳香辛温。祛風退冷。止大腸瀉痢。風冷。二因。テ
泄瀉者。及冷痢血痢。症ヲ止。蓋理風冷。活血也。伸筋。筋得血。潤。則
筋緩和。ス。乳香活血。即伸筋。一知。補腰膝。天低補腰膝者。ハ腎藥
所致也。乳香ハ腎藥ナラズ。雖モ此功。ル所以。者。ハ。凡。骨節。筋。會
スル所ナリ。腰膝ハ身ノ大關節也。故筋モ亦腰膝ニ會ス。一最多。乳
香ハ伸筋者也。筋伸。則腰膝自調。故補腰膝。上云。且温血活血。則
腰膝關節自通利。乳香ノ腎藥ニ。治不眠。神ハ心血ヲ舍トス。或血冷。或
血不行。心舍不調。神氣亦不化。神不化。則不得眠也。乳香温血活血。
則心舍調。テ神能化。和。得眠者也。治產難。温血活血。則產門滑。二
潤。テ產レ易。ヲ致ス。時珍曰。產科諸方多用之。亦取其活血之功。能

本草綱目卷之二十一 乳香

折傷此亦溫血活血伸筋故然。水類鈴方枝陰瀆爛者捺油

正霍亂中惡邪氣心腹痛乳香入心其辛溫ヲ以テ上焦ヲ開温則

升降通ノ霍亂止又此ガ辛香中惡鬼邪氣ヲ辟故ニ傳尸ノ心腹痛

及中惡心腹痛其外一切ノ冷氣滯血ノ心腹痛ヲ止治風毒水腫

辛溫香竄ヲ以テ風毒ヲ祛濕滯ヲ逐テ水腫ヲ驅按ニ乳香ノ薰陸

香ト俱ニ一樹ノ脂液也樹脂ノ外ニ溢出テ乳頭ニ似タル者ヲ乳香ト

ス。乳頭ノ如クナラザル者ヲ薰陸香トス。陳承曰薰陸是總名乳是薰

陸之乳頭也。原一物タルト明也然ニ李珣云薰陸是樹皮乳是樹

脂ト不是也。由テ按ニ別錄云薰陸主風水毒腫去惡氣癰癤瘰癧毒

乳香同功也。此薰陸所治功皆皮表ニ在疑ハ別錄所述薰陸六訣テ樹

皮ヲ指者ニ似タリ其樹皮タルガ故ニ所治亦皮表ヲ以テ義ヲシメ歟

別錄說非正薰陸乳香俱一物。主治モ亦異ナルトナレ然モ乳香ハ其

脂液溢出テ結積一薰陸ヨリ精ヲ以テ故ニ癰癧功モ亦薰陸ニ勝レリ

トス且治風毒水腫一切腫毒ヲ挖者ハ其樹脂ノ溢テタルニ出ル性

ヨリ致ス又香辛溫者ハ燥ト雖モ其本脂液タルガ故ニ

燥ニ不至活血ノニ然積温成熱義アリ。空虛者非所覺也

瘡腫活血温血散氣止十二經諸痛伸筋

治折傷服藥ニ用テ希也外科ノ要藥トス

藥地黃川芎治内傷胸脇痛同紫花地下白芨百餘白芷連翹

貝母金銀花夏枯草芍藥花甘州穿山甲沒藥治一切瘡腫疔瘡

瘡已潰者勿服○膿多者勿敷○筋骨伸緩者ニハ忌

○血熱者ニハ宜用佐藥○臭氣耗虛ノ者ハ勿服

乳香燒烟薰以順

血氣出證治要訣

修治

木破沙石ノ雜者ヲ去テ坐用。或充散ニ入ニ乳香粘テ難末少酒ヲ加テ研泥ノ

使藥

同續斷。牛膝。當歸。紅。牡。丹。沒。

總纂

治毒

三母

附方

口眼

如シ水飛過シ晒乾用或若上ニテ烘テ去油燈州ト同研或糯米ト
 同研則細ニ成易シ或器中ニ熱湯ヲ盛其中ニ乳鉢ヲ坐セシメテ
 研之亦可也○和謂乳香忌火ト其非也大明曰入丸散微炒殺毒
 則不粘ト何忌火ト云々○乳香薰陸香俱一樹ノ一節也其
 滴垂テ乳頭ノ如クナラ乳香トシ乳頭ノ如クスル者ヲ總テ薰陸香
 トス薰陸ハ總名也今本邦ノ藥店ニ別ニ薰陸ノ一種アリ此他物也
 眞種ニ非ス○乳香ハ色白スキトアリテ沙石ヲ不雜者上品也雜沙
 石中品綠色者下品不堪用或松脂楓脂ノ乳頭ニ似者ヲ以テ偽テ
 乳香トスル者アリ燒テ其香氣ニ從テ擇用ヨ今藥店所謂薰陸ハ
 薩摩ヨリ出之此乳香薰陸ニ非ス即琥珀也設用テ薰陸トスルニ
 苦平○破血止漏治金瘡杖瘡諸瘡腫跌僕落
 馬癢瘕産後心腹腫下血目翳腫胎▲沒藥或



馬癢瘕産後心腹腫下血目翳腫胎▲沒藥或

未詳在ハハハ梵語也○沒藥ハ瘰癧血ヲ破テ諸腫
 諸痛ヲ治スルノ要劑也古人多乳香ト合用ユ

用 附方 筋骨損傷 米粉四兩炒黃入沒藥乳香
 末各半兩酒調成膏攤貼御藥院片

藥店ニ種アリ煉沒藥花沒藥也花沒藥ハ薄赤色ニテ
 狀ハ米屑石ノ如ク堅氣味及香ナシテ堪用煉沒藥ハ黃黑色
 ニテ狀乳香ニ似テ味苦香アリ此眞沒藥也

藥家ニ呼之或ハ生ト云ク

駃騠



此樹ノ脂膠也狀乾血ノ如シ故血竭ト號騶騶トハ血竭ノ名ヲ隱
 藥ヲ稱美ノ號者也○騶騶狀乾血ノ如ク味甘鹹ノ血分ニ定テ滯

和語本草

血ヲ散シ諸血痛ヲ止要劑也其功雖如同乳香沒藥彼ハ血分ニ入テ蒸氣分騃騃鳴ハ專血分ニ入テ氣分ヲ不兼者也或問騃騃治小兒瘰癧何ヤ曰瘰癧ハ身ヲ縮手足ス多テ細伸騃動搐瘰癧此症獨小兒ニミアルニ非ス大人婦人主病之尤小兒ニ多トス其症足厥陰肝經滯血ニ屬ス諸風掉眩屬肝木義也
騃騃鳴ハ手厥陰心包足厥陰肝經血分ニ入故也
使藥 瘰癧瘰癧

毒

血病ト雖在瘰癧血ナキ者ハ勿用
瘰癧家不宜多用却テ引膿

附方

瘰癧騃騃鳴瘰癧等
分爲三吹鼻出醫禁

集要血痔金瘡出血騃騃鳴未傳之出直指方

麻瘡不瘰者騃騃鳴未傳之乾止出濟急仙方

修治

其儘研末ノ用ニ外色黒

赤餅之紅赤ヲ如血色嚙之并鹹之不爛如蠟者ヲ良トス其鹹之腥

氣人者ハ海母血也勿用真騃騃鳴ハ山梔子ノ氣ニ似タリ騃騃鳴ニ

偽多シ故時珍曰今人試之以透指甲者爲真以火燒之有赤汁漏

出久而灰不變本色者爲真ト然凡所度騃騃鳴塗指甲其色ヲ透

者トク燒之灰色黒ノ不變者モナシ○今所渡粉樣ノ中ニ於テ紅如血

色嚙之不腥不爛如蠟似山梔子氣者ヲ擇用ヨ粉樣ノ中ニ於テ甚

堅者アリ此石灰ヲ雜者也勿用粉樣ハ艸葉ニ包者也又艸葉ニ不

包ノ一塊ニ三四兩者アリ此一種夏熱ニ至則爛溶此血竭ニ松脂ヲ

煉雜者カ其亦黒ノ

不紅擇去テ勿用

龍腦香



辛苦温○治目疾通諸竅散風火治腦痛骨痛喉痺息肉脫肛傷寒舌出小兒痘陷五痔難產

△龍腦ハ其狀ヲ以テ名且貴重ノ稱アリ○龍腦氣味辛凉説アリト雖凡豈此至香ヲ以テ其性凉タルヲ得マ治目疾辛温能散熱散風

散血治赤白瘡。內障外障。然虛眼者不宜點。通諸竅。辛香能通諸

竅。利壅塞。結氣。故耳聾喉痺。息肉。治之。功。散風火。風。爵火。爵

ヲ散入。其辛散。以。凡。龍腦。辛香。達。骨髓。故。風病。在。骨髓。者。用。之。

驅散入。若。風。在。血脉。肌肉。未。入。骨髓。者。誤。用。之。反。テ。風。ヲ。引。テ。入。

骨。其。邪。迷。不。得。去。龍腦。辛。温。飛。越。ノ。火。爵。熱。爵。ヲ。發。散。入。內。經。從。治。

ノ。道。也。辛。温。其。熱。ヲ。散。ス。ル。ヲ。見。テ。多。ハ。謂。龍腦。性。寒。ニ。テ。涼。熱。ト。ハ。誤。

也。治。腦。痛。骨。痛。龍腦。ノ。辛。香。達。骨。逐。風。散。熱。除。濕。治。骨。痛。且。其。性。陽。

中。ノ。陽。ヲ。升。故。至。頭。腦。其。痛。ヲ。去。又。齒。痛。ヲ。治。ス。喉。痺。息。肉。通。利。諸。

竅。脫。肛。其。性。陽。ニ。升。且。利。竅。也。傷。寒。舌。出。傷。寒。大。陰。ノ。壅。熱。二。因。テ。舌。

腫。口。外。ニ。出。者。龍腦。未。微。摻。之。即。愈。小。兒。痘。陷。熱。火。壅。塞。經。絡。痘。

頂。陷。黑。者。用。之。散。壅。熱。則。經。絡。條。達。瘡。毒。散。シ。テ。痘。能。外。ニ。出。テ。起。發。

ス。世。ニ。目。病。小。兒。驚。風。痘。瘡。二。用。ニ。從。テ。謂。龍腦。ハ。辛。涼。入。心。經。涼。心。熱。逐。

赤。血。ト。ハ。誤。也。龍腦。ハ。手。足。太。陰。肺。脾。兩。經。ニ。入。者。也。且。非。涼。熱。散。熱。爵。

者。也。又。非。逐。瘀。血。通。利。一。切。壅。塞。者。也。或。合。精。血。引。則。入。心。散。毒。了。

リ。龍腦。獨。心。竅。ニ。入。者。ニ。非。ス。五。痔。散。爵。火。利。壅。塞。也。難。毒。氣。血。虛。

產。龍腦。研。末。少。許。新。汲。水。服。立。下。此。通。竅。利。壅。塞。故。也。耗。者。○

熱。火。未。至。壅。爵。者。勿。用。○。孕。婦。尤。禁。用。○。驚。風。痰。涎。壅。閉。者。或。用。ト。

雖。凡。慢。驚。慢。脾。風。等。屬。虛。者。勿。用。○。小。兒。痘。瘡。黑。陷。者。或。用。ト。雖。凡。詳。

熱。爵。壅。毒。用。之。安。施。ト。勿。○。眼科。多。難。用。之。肝。腎。及。神。氣。虛。眼。症。ニ。ハ。不。宜。點。之。

開。不。能。入。藥。者。五。月。五。日。午。時。龍腦。天。南。星。等。分。爲。末。每。用。一。字。指。

齒。二。三。十。遍。口。自。開。出。集。簡。方。外。痔。內。痔。龍腦。一。二。分。葱。汁。化。搽。之。

出。簡。其。儘。研。末。ノ。用。ニ。色。紫。白。透。明。輕。薄。片。ニ。白。梅。花。ノ。如。入。雲。

便。方。修。治。母。片。ノ。如。上。者。ヲ。梅。花。片。片。腦。片。號。上。品。也。用。藥。尤。

畏惡 附方

忌 火 風口 噤不

功了。一種胡麻鹽ヲ塊タルカ如クニ色蒼赤過半細ニ碎テ如沙質
 重者アリ。此番硝ヲ以テ混偽者ナリ。龍腦ニ非ズ勿用。或樟腦ヲ煨
 返テ偽者アリ。誤使フ勿。今藥店ニ片腦者ハ龍腦ノ梅花片ニ非ズ。
 彼樟腦ノ煨返者也。勿用。方書所謂片腦ハ龍腦ノ梅花片ノ異名也。
 他物ニ非ズ。和人別物トノ樟腦煨返ヲ以テ甚誤也。○龍腦ハ耗易シ。
 小竈ニ燈ヲト同合入テ密封スバ久ノ不耗。或杉木炭ト合貯藏モ亦
 可也。蒼龍腦治風瘡野蠻人膏煎不可點眼傷人。○此龍腦ノ蒼龍
 者也不堪用。波律香膏治耳聾摩一切風痛。○龍腦ハ樹中ノ脂也。波
 律香ハ根下ノ清油也。夫龍腦ハ深山窮谷中千年老杉樹枝幹不損
 動者中ニ存スル脂腦也。惟白色龍腦宜用。藥其他ノ蒼龍腦。波律香
 膏等皆不堪用。子龍腦子似豆蔻辛温下惡氣消食散脹滿香入口
 ○按ニ方書所謂腦子ハ即龍腦也。龍腦樹ノ子ニ非ス。○龍腦樹。或
 子花アルノ説アリ。或子花ナキノ説アリテ
 未詳。其有無ハ地勢ニ從テ然者乎。

樟腦



辛熱。○殺蟲通關竅利滯氣去惡邪氣治心
 腹冷痛霍亂寒濕脚氣。○樟腦莫用服藥其

性純陽。煨消ト同。此能水中ニ生火則稟龍火氣者也。辛熱香竇去
 濕除寒殺蟲故疥癬齒ノ瘡痛ヲ治ス。或藥中ニ塗去路ハ寒濕脚氣
 ヲ治ス。虫蝨齒痛ハ樟腦硃砂等分擦齒神效アリ。惟氣
 味辛熱香竇純陽者也。或外科ニ用之。服藥ニ使フ勿レ
 或煨返テ用樟腦一兩磁碗ニ入。又磁碗ヲ覆蓋之。兩碗ノ口ヲ紙ニ
 糊ノ張封シ。氣ノ不泄ヤウニ。灰火ノ不武不緩ニ置テ燻。一小時許シ。
 火上ヲ去テ凉定。碗ヲ開ハ樟腦升テ蓋裏ニ在。塵砂土ハ下碗ニ殘其
 蓋ニ升ツク所ノ者ヲ掃取テ。復上法ノ如クニ燻如此。二三度ノ止。又樟

修治

其儘 七用

腦ヲ煉法。陳壁土ヲ粉ニ銅盆内ニシキ。其上ニ樟腦ヲ散。又其上ニ壁土ニキテ樟腦ヲ散シキ。如此四五重ノ終ノ土上ニ薄荷葉ニキ別ノ銅盆ヲ覆蓋泥ニ封固火上炙之半時許。火ヨリ下候冷開樟腦升テ上盆ニ在。掃之復如上法燻一二二度ノ止。繁清ニ龍腦ニ似アリ。○樟腦ハ樟木ノ脂也。其樹出漳州故名樟腦煎之法。樟木新者切片浸井水三日。一夜入鍋煎。柳木頗攪汁半分。二減時。覺柳木二白霜。ルヲ度トシ瀘テ去滓汁入磁盆。一斗入。夜ヲ經バ自然ニ結塊。樟腦上成。



阿魏 辛温。殺小蟲去惡臭。鬼邪破癥積。治心腹冷痛。解諸毒。阿ハ我也。魏ハ鬼也。此極臭之阿

尸病ヲ治。又癥瘕積聚肉積ヲ破。故治癰疽。其積滯ニ屬故也。且氣味辛温。ヲ以ハ心腹冷痛ヲ治ス。又能一切毒藥毒。

常山。砒霜藥毒。牛羊馬自歿ノ肉毒ニ中ノ解ス。○惡心者。○

癥積痞塊ナキ者ハ皆勿用之。附方 麝香硫黃蘓合油上同煎。膏貼一切痞塊。出本艸。修治 今人酒ニ浸ヤワ

テ用。○阿魏黑色者不宜用。黃散者良。詩曰阿魏無真上。偽多ノ真

物希也。今所度者多ハ蒜白ヲ煎ノ偽者也。燒之蒜氣存ス。不堪用

此カ真偽ニ辨スルニ阿魏半銖重ヲ取テ。銅器中ニ沾セバ。一夜ノ後

其阿魏ヲ沾處ノ銅白。銀ノ如ニ成者。此真物也。苦寒。○殺蟲清熱。治濕癬。疔蟲疔熱。風熱煩悶。

會盧 胸膈熱氣。小兒驚癇。痔瘡。明目。鎮心。解巴豆毒。



會盧 苦寒。○殺蟲清熱。治濕癬。疔蟲疔熱。風熱煩悶。胸膈熱氣。小兒驚癇。痔瘡。明目。鎮心。解巴豆毒。

研末傳靈齒△盧八黑色也此木ノ脂液黒ノ凝聚會者也故名○盧會八足厥陰肝足大陰脾經ニ入殺虫清熱去濕熱諸功皆此ヨリ致ノ三濕瘡黃汁出テ不乾者盧會一兩炙甘艸半兩研末先温水ニ洗瘡拭乾テ藥末ヲ傳尤効也出傳信方小兒胆疳症盧會使君子等分爲末米飲服一二錢出衛生易簡方小兒科疳虫疳熱驚熱ヲ治スルノ要劑也他ニ於テ用ルル希ナリ

毒

脾胃虛寒ノ瀉易不思食者

修治

ハ勿用○虛色黒者良搗テ成粉入藥丸散ニ入ニハ衆藥ト熱者不宜用同鳩勿レ別ニ末ス○或土器ニ入蓋レ土ニ塗封シ日ニ乾テ塗タル土ノ乾ワレタルヲ復塗封ス坎穴ヲ掘テ入之四邊摺糟寸許ヲ積廻ニ火ヲ付テ燒之糟盡テ火消ニ至テ取出シ末ノ用ユ

辛夷



辛夷ハ手ノ太陰肺足陽明胃經ニ入鼻ハ天氣ニ通ノ肺ノ竅陽明胃脈ノ所環也辛夷ハ足陽明胃ニ入テ中焦ノ清陽ヲ升提ノ肺ニ至レム肺氣得之能宣通入故ニ鼻竅通利ノ治鼻塞涕出鼻癢ノ功アリ且獨鼻竅ヲ通スルニテ益中焦清陽不升則頭面七竅爲之不利辛夷性輕浮テ胃中清陽ヲ助テ上行セシムルキハ頭面七竅皆通利ノ治頭腦痛面黧面腫齒痛眩暈如在車船明月ノ功アリ肺ハ主皮膚體寒發熱往來者ハ肺氣ノ壅也辛夷辛温肺氣ノ壅ヲ走散ス故ニ治寒熱及表風脾胃主肌肉辛夷辛温入足陽明胃解散肌肉邪其去寸白蟲者ハ辛ハ蟲ノ所畏且胃中清陽

總條

胃中不足清陽ヲ助升テ肺ニ達セシム其辛温又肺氣ヲ達セシム故ニ頭腦面目鼻病ヲ治スルノ要劑也其症皆清陽不升故ニ濁陰壅上上氣不行ニ屬スルノ病ヲ主或問本艸謂利九竅

上。吾子何七竅上云。曰辛夷。清陽ヲ升レ。氣ヲ起テ肺ニ入シ。清陽一升則濁陰下行ノ上竅下竅俱ニ通利スト雖凡辛夷厚辛温

輕浮ニ利下竅功ハ微也。使藥。川芎ヲ使トス。同菊花蒼耳細辛薄荷菴活藁本防風川芎

甘艸風寒入腦。毒。氣虛者雖鼻病不宜用此辛香走散ヲ以テ也。頭痛者ヲ治ス。也。○風寒ノ頭腦痛ト雖凡血虛火熾者ハ勿

用。○雖齒病。畏惡。五石脂ヲ惡。菖蒲蒲黃。附方。瘧後ノ鼻瘡。胃火者禁用。黃連石膏黃環ヲ畏ル。辛夷ヲ研末

入麝香少許。葱白汁蘸入。修治。味。花敷時。正二月二港ノ尖長ノ筆。鼻數次甚良。李時珍方。頭ノ如ク半寸許者ヲ採リ皮ヲ

刷外赤毛ヲ拭去。内實者ニテ水煮一二三沸。日二晒。微灸用。子或不煮即微焙用モ可也。

蘇合香

甘温。○辟邪惡鬼氣。去瘴瘧。及勞瘵。三蟲。治癰疽。冷入無膿。麗久服。通神明。輕身長年。○此香出蘇合國。故號蘇合。其香

諸竅藏府氣ヲ通シ。一切不正ノ邪氣ヲ辟。辟ヲ開。竅ヲ利。竅結ヲ除。凡香劑多ハ辛ノ散烈也。蘇合。雖芬香味甘。故雖香散散中。自

補ヲ存ス。是以通神。附方。蘇合香丸。治諸傳尸病。肺痿。鬼邪瘴瘧。赤白暴痢。卒心痛。霍亂。吐瀉。時氣

明。輕身長年ノ功アリ。瘧。赤白暴痢。卒心痛。霍亂。吐瀉。時氣。瘀血。月閉。瘕瘕。下腫。小兒驚癇。客忤。大人中風。中氣。狐狸鬼魅。○蘇

合油。安息香。以無灰酒。釀成膏。入蘇香油內。白木香。附子。青木香。白檀香。沉香。丁香。麝香。畢撥。訶梨勒。煨去。硃砂。烏犀角。各。龍腦。

薰陸香。各一。爲末。以香膏加煉蜜和調。蠟紙包收。每服九。梧子。大早。朝取井華水。或温或冷。任意化服。修治。粘テ如。蠟膠筋。挑起。二。四九。老人小兒。一丸。出和劑局方。張テ不斷者。真物也。濃ノ

滓ナキ者ヲ良トス。常ニ水ニ漬テ貯。不然則乾テ難貯。製時ニ茶碗ニ煉蜜少許ヲ入。其上ニ香油ヲ加テ。布ヲ以テ瀘テ。復茶碗ニ入。重湯ニ煎煉ス。煉中ニ少許次第二煉蜜ヲ加テ可也。蘇香圓ヲ製時ハ安息香末モ同加テ煉ベシ。蘇香ハ黃白色者良。赤黒者不直。

安息香



辛苦平。去惡邪氣。行氣下血。其香安息惡邪。故號。入少陰心經。分香ニテ諸鬼惡邪氣ヲ去ノ上藥多ク。故婦人鬼胎鬼交ニ燒テ煎陰ヲ薰ハ。永鬼夢ヲ失益。婦人夢ニ奇怪人ト交合スルヲ鬼交ト云。因此孕者ヲ鬼胎ト號。其他一切邪魔勞瘵傳尸惡邪結滯心腹卒痛者ヲ治。凡燒之薰則去鬼來神。且行血下氣。故霍亂痛風產後血運及婦人爵怒情ニ從テ血逆ノ卒ニ口噤者ヲ治ス。功アリト雖。

附方

小兒驚邪。安息香少許。燒之。自除。出奇效。

良方 修治

松脂。桃膠。ノ如ク。黃黑者。良。溫酒ノ中ハ入。二沸ノ底ニ居。者又取テ。冷水ニ入。堅ナリタルヲ。日ニ乾。研末ス。若粘ハ。復酒煮テ。如上法。其真偽ヲ辨ス。ニ。燒之。從煙。鼠來者。真也。粘テ。如錫者。安息油ト號。

酸棗仁



甘酸平。治煩渴。虛汗。堅筋骨。療不眠。治眠主。驚悸。寒熱。久泄。臍下滿痛。實味酸。極大如棗。

故號。酸棗仁ハ肝胆ノ藥也。肝ハ血ヲ藏。胆ト俱一筋ヲ主。且肝胆發生雄猛藏府。竅ヲ目ニ開者也。故ニ肝血虛ノ煩渴盜汗。或肝胆生發氣虛ノ煩躁自汗者。用之。酸味補肝血。甘味補肝胆氣。則愈。堅筋骨者ハ肝胆氣血ヲ補カ故也。療不眠。治眠。人安ニ眠。胆氣虛熱トス。不眠者ハ。胆氣虛寒トス。故ニ不眠者ハ。酸棗仁ヲ炒熟ノ用。則能眠。眠者ハ。生ニ用。則眠ヲ止。藥ノ妙也。驚悸。人安ニ驚悸者ハ。肝胆生發

氣怯故也。寒熱足，少陽胆病，寒熱往來，主之。此胆氣之虛，所以然者，用之。久泄，或久泄症，脾血衰，肝血燥，木邪乘土位者，用之。肝血之養，則木邪自退。脾氣安，取臍下滿痛，肝胆之虛，迫之，因之，然者也。酸棗仁，八肝胆氣血之補，尤肝血之養，經之歸，世之凡功專也。歸脾湯劑中用之者，亦是也。

使藥

茯神、遠志、麥門冬、石斛、五味、龍眼、人參、同之，驚悸止。

毒

肝胆之實熱，凡此者，勿用。

酸味收斂，以之故也。

畏惡

防己、芍藥。

附方

汗症固表藥，用之不止者，酸棗仁、地黃、白芍、龍眼、五味子、竹葉。

上同煎服，效。神也，出本州。匯。

修治

皮尖去之，研末，用治眠，生之使治。不眠，炒熟，用之。方從之，製之辨世。

廣益本州大成卷之十一終

廣益本州大成卷之十一 木部

洛下

法橋

岡本為竹一抱子

撰

黃藥



苦寒。為腎膀胱伏火，治小便不通，下血，下痢，女子漏下，赤白帶汗，目熱赤痛，目淚，消渴，黃疸。

口舌瘡，諸瘻，入原始藥巨也。此樹高巨，其皮黃色，故名。俗名黃栢。作。瀉腎膀胱伏火。此黃藥，要能去夫氣味厚，沉，降，陰劑。入足，少陰腎足，太陽膀胱下焦水部，伏火，瀉火，要劑。入益腎家，火，兩義。治苦寒，與辛溫也。以苦寒所治者，火氣下焦，伏火，水部，陽根不衰，火根實，藏之，症，黃藥，知母等，苦寒，降沉，所主也。以辛溫所治者，火氣下焦，動，水部，陽根衰微，火根虛寒，之症也。肉桂，附子等，辛溫，所主也。若此治法，誤，虛火，苦寒，用，實火，辛溫，用。

其害ヲ致コト甚シ或問黃蘗ハ濕火ノ要劑ナリ古人何ノ謂補腎水
 不足乎曰黃蘗ハ滋潤ノ劑ニ非ズ所以補陰者腎惡燥相火下
 焦ニ動則腎藏ノ水精爲之燥熱ス黃蘗瀉火則水陰自安直陰
 ノ不補ト雖此制火則陰ヲ補ノ義ヲ存ス且元素曰苦厚微辛上以
 辛潤之ノ義ナキニモ非ズ又問古人謂黃蘗無知母猶水母之無蝦
 也何之曰水母ニ目ナシ蝦ニ從テ遊夫黃蘗ハ雖入至陰未至腎
 家水底其木皮々方故ナリ且火ハ炎上ス下火一旺則上肺金ニ炎ス水
 源ニ乘ス黃蘗ハ入腎膀胱ノニ不能清肺火知母ハ上肺熱ヲ清下
 腎家水底ニ至テ相火ヲ瀉ス時珍曰黃蘗能制膀胱命門陰中之火
 知母能清肺金滋腎水之化源上黃蘗ハ從知母火ヲ肺ヨリ降テ水底
 至テ相火ノ煎煮ヲ瀉則上肺金ノ炎熱去ル水源清テ下邪火ノ水底ニ
 動ス者ヲ制シ上下子母俱ニ安キトテ致ス故ニ古人知母黃蘗ヲ合同

火動ヲ治スノ要劑トス又問然則黃蘗知母ノ兩藥必ス合用スレヤ曰
 不然相火水底ニ動レ肺ニ炎上ス者ハ實ニ知母ト合用スレ相火水
 面ニ動レ未至煎煮未受火炎者ノ如ク惟黃蘗ノ所治知母ト合用ス不
 及也大明謂治男子陰痿ハ前陰ハ宗筋ノ會也肝腎ノ熱ニ因テ筋
 緩テ陰痿スル者用之若其下焦虛寒ニ属ス者只不宜用桂附ノ所主
 也元素謂堅腎壯骨髓療下焦虛李果謂殺腎水ト瀉火則腎陰自
 堅固ニ骨髓モ亦壯ナル直ニ陰ヲ補ニ非ズ制火助陰ノ義ナリ太
 明曰洗肝トハ黃蘗ハ足ノ厥陰肝經ノ劑ニ非ズ雖肝木與腎水子母
 其氣ヲ通シ俱ニ相火ノ藏アリ黃蘗ハ腎火ヲ瀉ルガ故ニ肝入モ亦目ヲ
 消退ス洗トハ清ノ義也小便不通元素謂利下竅上黃蘗ハ雖入膀胱
 淡滲通利ノ劑ニ非ズ然レ何ノ治小便不通乎蓋火邪下焦腎膀胱
 ノ血分ニ伏シ水道爲之不利及小便黃澀ル者酒洗ノ黃蘗ヲ用テ

下焦ノ伏火ヲ瀉スレハ水道自通利ス故ニ東垣謂之治衝脉氣逆不渴
而小便不通上衝脉ハ腎脉ト合メ下焦ニ起リ十二經ノ血海ト衝腎
火逆者ハ熱邪爲在血分熱邪在血分則不渴在氣分則渴邪熱伏
肺中氣分水源不清故小便不通渴者ハ澤瀉猪苓淡滲劑ヲ
用ニ邪熱伏衝腎血分故不渴小便不通者ハ黃蘗知母陰中
劑ヲ以ス且黃蘗ハ下焦ノ濕ヲ去ノ義アリト雖凡此モ亦直ニ小便通
通ヲ去濕除腫ニ非ズ黃蘗ノ味苦ハ燥濕其寒性ハ熱ヲ制ス故ニ
焦ノ濕熱ヲ去テ下部ノ腫及痛ハ痔瘡ヲ治ス下血腎熱ノ動ニ因
下焦ノ濕熱ニ因者用之血痢此モ亦腎熱及下焦ノ濕熱ニ因者用之
獨血痢ノ三ヲス諸痢腎熱ニ屬スル者皆用之女子漏下赤白帶下
女人不時經血漏下及赤白帶下ノ症多ハ下焦ノ火動及濕熱ニ因
也目熱赤痛目淚目肝ノ竅ノ精血ノ會ス所也腎肝熱邪衝眼目
痛淚出者ハ黃蘗ヲ用之若命門ノ陽氣不足ニ虛熱ニ因テ眼淚出
赤熱ノ不明者ハ黃蘗ノ苦寒ヲ用コト勿レ溫陽ノ劑主之消渴因
火者アリ因腎火者アリ腎火ノ者ハ黃蘗主之胃火ノ者ハ雖ニ
火佐之太甚多渴ノ不止者ハ屬肺爲上消多食ノ飢者ハ屬胃爲中
消不渴ノ小便多利ノ數者ハ屬腎爲下消亦号消腎又強中ノ
了陽事妄起強ノ不弱精氣自泄亦知母黃柏ノ所主也凡消渴
症上中下肺胃腎ノ別アリト雖凡不兼腎火者ハ希ナリ苟モ下
チハ上中焦ノ火邪何ニ從テ生ゼンヤ或ハ生ズ雖凡太カラズノ治
而已黃蘗去濕熱カ故ナリ黃蘗ノ症中焦ノ濕熱ニ因下焦ノ濕熱ニ因
下焦ノ濕熱ニ因テ身躰黃色下部黃腫小便黃澀者ハ尤モ黃蘗所
治也口舌瘡腎經上テ挾舌本故ニ腎熱衝上ノ口舌生瘡者凡之或
炒末蜜調塗且因腎熱陰莖陰戶瘡ヲ生者及諸瘡腫痛

中五本 卷之十一

雜考 一屬

者用之或末小兒之頭瘡傳諸痿足痿之症多端了りト雖在總之腎
家ノ濕熱ニ屬ス故ニ黃蘗ハ諸痿癱瘓ノ必用要藥ト古人足痿ノ
腰無力者其湯ノ中ニ黃蘗ヲ加用ノ治入足膝氣力ヲ生スルニ泉
瀝出カ如ト然レ在命門ノ陽氣虛衰ノ足膝痿冷ノ者アリ桂附所主
黃蘗等ニ不宜也或問別錄謂療驚氣在皮間肌膚熱赤藏器曰治
蟲瘡ハ何ノ曰小兒驚熱在皮間發熱赤ト此腎火ノ遊行ト故黃
蘗爲所治又治蟲瘡ト黃蘗ハ解濕熱且味苦
濕熱去テ蟲ノ隱ト所チク味苦ハ蟲ノ所畏ト也
ノ濕熱ヲ去テ故ニ治癰熱
骨蒸陰虛火動要劑也
山柘黃連解
三焦火毒

使藥

毒

命門真元ノ陽不足ノ虛火ニ用カテ陰虛ノ命
門ノ邪火實盛ノ者用之○天脈洪大按之有力

總概

腎家ノ伏火
ヲ瀉シ下焦

者ニ非バ勿用○命門ノ邪火實熾ノ者ト雖在胃氣不足ノ穀食不
進者ハ勿用腎火實盛ニ胃氣健ニ能食者用之○胃氣不足及
命門ノ真陽虛衰ノ大便瀉レ易ク或ハ小便頻數ノ者ハ禁用○老
人小兒産後安ニ用テ勿レ○黃蘗ハ苦寒降沈ノ劑ナリ衣服過服元
コト勿レ真陽ヲ損胃氣ヲ傷リ反テ陰ヲ傷葉氏醫學統旨四物湯加
黃蘗知母入服傷胃不能生陰ノ戒アリ○陽氣下陷者禁用○凡用
黃蘗者ハ丹溪謂虛人可補宜用實
火可瀉宜用ノ義ヲ辨スルヲ主トセヨ
畏惡 乾漆 伏硫黃
附方 大福 九治
腎火諸病黃蘗鹽酒ニ浸炒褐色爲末梧子大二丸血虛ニ四物湯氣
虛ニ四君子湯ニテ下丹溪方小兒臍生瘻瘻不洽者黃蘗末塗之出
子母秘錄火毒瘡人冬月向火火氣內ニ入テ兩股瘡ヲ生シ汁出テ
不止者黃蘗ノ末ヲ塗バ立愈出醫說小兒顛腫者黃蘗末水ニ調テ

口舌八直
式之三

足心二趾

修治

肉厚ク色黄丸者ヲ良ト鹿皮ヲ刮去對テ炒テ

出普濟方

熟スレバ不傷胃○酒ニ浸シ炒用六治上○搗水ニ浸シ炒用六治下○

蜜水ニ浸シ炙用六治中○今人黄蘗ヲ用多ハ燥ク燈テ使誤也

炒之稍過テ褐絶ラ要トスレ若命門不足ノ虛火ヲ治ス者桂附

等ノ温陽ノ劑ヲ用ニ於テ黄蘗ヲ反佐セント欲共炒黒ク斬ク用ユ

檀栢黄蘗燒對ノ小根ナリ苦寒○治心腹百病安魂魄不飢海人服

輕身延年通神長生神仙去萬病爲散飲服方寸匕盡一枚有驗

厚 苦微辛温○治腹痛宿食膨脹霍乱嘔吐瀉痢



泄瀉下氣殺腸蟲△此木質朴ヲ皮厚レ故号

○脾胃ニ入テ中焦ノ冷寒面ヨ去結積ヲ疎散レ胃土ノ太過ヲ平ルン

要劑ナリ是以テ平胃散ニ以此爲君藥厚朴ハ本中焦ノ瀉劑ナリ世

人此ガ性ノ温ナルヲ以テ補トスル者ハ誤ナリ治腹痛此厚朴ノ要能也

或寒痛或食滯痛俱ニ用之胃氣不足ノ虚痛ニ用コト勿レ宿食苦

噎辛ハ散レ温ハ消レ食飲ノ宿滯ヲ化ス尤冷物ノ積滯ヲ消ス膨脹中

焦ノ實積ニ因テ胸腹膨脹ヲ主治ス夫厚朴ハ苦辛温胃土ノ太過ヲ

平ル者ナリ脾胃ノ積滯實滿ノ症ニ非ハ勿用故ニ好古曰泄實滿ト

成無己曰泄腹滿ト李杲曰散湿滿ト元素曰雖除腹脹若虛弱人

宜斟酌用之誤服脫人元氣ト丹溪謂瀉胃中之湿平胃中之太過

以致於中和ト厚朴ノ功能ヲ盡ス者ナリ霍乱嘔吐温胃消積滯氣ヲ

下ガ故ナリ属胃虛者ハ勿用大明曰治反胃ト按ニ反胃ハ中焦ノ虚冷

タルヲ以テ云然厚朴ノ苦瀉胃氣反胃ノ症或ハ少用テ温胃胃ヲ

行スト雖ハ過用スルコト勿レ恐クハ重テ胃氣ノ虚ヲ致シコトヲ瀉劑去

寒湿消積滯ガ故ナリ酒痰下氣消湿痰冷痰蓋中焦ハ痰ノ官也何如

トナレバ脾胃土六湿化ラ主レ諸痰ノ生スル湿ニ非ト云コトナレ。厚朴苦辛
温中焦ノ湿冷ヲ疎散則痰自消退不此ガ氣ヲ下ス者ハ其苦味ヲ以
ノ故ナリ別錄ニ治煩滿上好古曰治喘欬よ痰ヲ消レ氣ヲ下レノ功也
殺腸蟲苦ハ蟲ノ所畏湿ハ蟲ノ所隱也厚朴ノ苦温湿ヲ去則腸虫不
能生○或問別錄ニ厚腸胃ハ何ノヤ曰厚朴ノ温腸胃湿ヲ去積滯ヲ
消則腸胃自厚コトヲ致ス補ノ義ニ非ズ又問本經ニ謂ル治中風傷
寒頭痛寒熱驚悸氣血痺死肌ハ何ノヤ曰厚朴ノ苦中ノ辛温ヲ以テ
風寒ヲ祛苦味ハ能氣ヲ下ガ故ニ治中風傷寒頭痛寒熱ト云歟
治血痺死肌ハ苦辛温能去湿發結滯ニ從歟治驚悸ハ痰ヲ消シ
氣ヲ下ガ故歟然レドモ驚悸ハ心虛ニ属ス厚朴ノ入脾胃者非所
關其中風傷寒寒熱頭痛血痺死肌モ亦此ガ要能ニ非ズ標能ノ
微也夫別錄曰益氣去留熱大明曰健脾治轉筋冷熱氣瀉膀胱
及五藏一切氣婦人產前後腹藏不安明耳目調關節甄權曰治積
年冷氣腹内雷鳴虛吼去結水破宿血ト許酸水主病人虛而尿白
ノ諸説ヲ案ニ其義ニ可與不河アリテ盡ク信用シ難キ者也厚朴ハ
中焦ノ瀉劑ナリ何ゾ氣ヲ益シヤ厚朴ノ性全温ナリ何ゾ去留熱乎或
陳皮蒼木等ト合同中焦ノ湿ヲ去則助氣ノ義アリト雖モ直ニ氣ヲ
益シ非ズ惟氣ヲ順ズルニ丹溪曰若氣實人誤服參芪藥多補氣脹
悶或作喘宜厚朴瀉之ト此本益氣ノ劑ニ非コト知ヌベレ或ハ食滯ニ
因テ熱ヲ留ル者ハ用之消食滯則留熱自去ト雖モ此モ亦厚朴直
留熱ヲ去シ非ズ食滯ヲ消ガ故ノ三大明健脾ハ消胃滯湿ヲ去ガ故
也亦補ノ義ニ非ズ治轉筋者ハ胃ヲ温メ冷ヲ去ガ故ナリ冷熱氣ハ
中焦冷熱氣ノ不和ヲ云瀉膀胱及五藏一切氣婦人產前後腹藏
不安ト未詳案スレ謂レ一切氣トハ此ガ苦温ヲ以テ故歟苦ハ氣ヲ

和語本草 卷之十一

疎。温ハ氣ヲ行共也。狀モ厚朴ハ開鬱順氣ノ劑ニ非ズ。惟下氣ノ
藥ノ三腹藏不安ハ婦人産前産後ハ食飲中焦ニ滯易シ。故ニ食滯
ニ因テ腹藏不安者用之滯ヲ消スノ義歟。然レ元素曰孕婦忌之
ト。産後ハ氣血脱ノ胃氣怯レ實ニ産前後腹藏不安者必果用此
乎。明耳目ノ説モ亦不通。中焦ヲ疎レ氣ヲ下カ故歟。未詳トス。調關
節ハ温胃去湿ガ故歟。然レ關節ハ屬腎厚朴ハ脾胃ニ入ル必モ此
關ル所ニ非ズ。甄權ガ謂積年冷氣ハ温胃ガ故ナリ。狀トモ厚朴ノ苦温
總テ中焦新舊ノ冷氣ヲ去獨積年ノ冷氣ニ不止。腹内雷鳴ハ温
胃中焦ノ滯ヲ和スバ也。虚吼ハ轉矢氣ヲ云。胃滯ヲ消ガ故ナリ。去
結水ト冷水ノ中焦ニ結滯スルヲ云。水腫ハ非ズ。然レモ胃實ノ水腫兼
腹腫者ハ用之。温胃消胃積去湿冷コトアリ。破宿血ハ未詳。中焦ノ
滯血ヲ指テ云歟。梅師ガ方婦人經水不通者厚朴三兩炙剉水三
升煎。并分二服。瘵心飲不過三四劑。補加桃仁。紅花。紫參。經
閉ノ症。數因アリ。厚朴ヲ用所ノ症ハ中焦ノ氣結積滯ニ因者也。厚朴ハ
中焦瀉氣ノ劑トス。本血分ノ藥ニ非ズ。中氣結積ノ經閉ニ用ル。然レ
或ハ桃仁。紅花ヲ加テ血ヲ破コトヲ致ス。甄權以厚朴爲破宿血者ハ。
此ヲ孕婦ニ忌及。經閉ヲ通スルニ從テ云乎。孕婦ニ忌者モ亦此方直ニ
血ヲ破ルニ非ズ。温胃ヲ以テ也。胃氣ハ胎養ノ根蒂ナレバ也。豈獨用之
破宿血ニ切アラシヤ。止吐酸水ハ温胃胃滯ヲ消ガ故ナリ。主病人虚
而尿白ハ經三良方ニ心脾不調腎氣白濁用厚朴。姜汁炙一兩。白
茯苓一錢。水酒各一椀煎。一椀温服ト。此心陽健テス。脾湿旺ニ湿
濁下焦ニ流テ小便白濁ノ者用之。温中湿ヲ去ノ義ナリ。然レ甄權何
病人虚而ト云ヤ。此虚ノ字指心陽乎。指胃氣乎。指腎氣乎。未詳。厚
朴治白濁者ハ去脾湿温中ガ故ナリ。虚ノ義アルコトナレ。凡本冊各藥

主治ノ諸條。一定ノ義アリ。不_レ一定者アリ。學者妄ニ主治ノ諸條ニ所
述ノ言ヲ以テ。盡ク信シ。皆其要能ナリト致サバ。反テ害ヲ加ルノ端ナル。

總纂

厚朴ハ胃ノ實滯ヲ平ゲ。湿冷ヲ去。中ヲ温メ。食及_レ痰ヲ消氣ヲ
下シ。腹脹瀉痢ヲ治ス。ノ要劑ナリ。或問。治瘧ノ劑中ニ用之。

者ハ何ゾヤ。曰。發散ノ爲ニ非ズ。凡_レ瘧疾多ハ中焦ノ積滯ヲ兼用之。テ
疎胃。衛氣行易シテ。邪氣容地ナシ。且瘧モ亦痰ヲ主トス。厚朴痰ヲ

消ス。ト也。章宜曰。除瘧不發之發。爲裏之表藥也。ト。益_レ苦辛温胃ニ
入テ以テ。又問。山嵐ノ障氣ヲ辟ル者コレヲ用ル。何ゾヤ。曰。山嵐不正ノ

障氣ハ原湿濁ノ氣。喜テ脾胃ヲ犯ス。使藥 乾姜ヲ使テ。同枳實
用之。胃ヲ温メ。湿ヲ排ノ義ニ取而已。大黃泄實滿同陳皮

蒼木。泄湿滿。向。檳榔。木香。黃連。滑石。陳皮。甘草。白芍。治痢疾初發同
白木。人參。白芍。茯苓。消胃虛。腹脹。佐。生姜。陳皮。藿香。縮砂。半夏。止胃

寒吐逆。孕婦ハ禁用。厚朴ハ瀉胃泄氣。胃氣不足者勿用。○
及痰阻。毒 老人小兒ノ中氣不壯者ハ斟酌ス。○久服過服則

脫元氣。○胃熱ノ者ハ勿
妄用。詳ニ或ハ少用。畏惡 忌豆。若同食ス。バ動氣
澤瀉。消石。寒水石。ノ惡。附方

男女氣脹。心悶。飲食不下。冷熱相攻。久患不愈者。修治 皮厚色
厚朴姜汁ニ浸炙焦ノ爲末。陳米飲調服。出斗門方。紫ニシテ

苦辛中ニ帶辛者良。皮薄ク色白。味惟苦。ノ不帶辛者ハ不堪用也。
粗皮ヲ刮去。剉テ姜汁ニ浸シ透シ。炒焦テ用ユ。○炒下不足。及姜汁ニ

不浸則損口舌。○厚朴一斤 百六十 錢目。ヲ製共。姜汁八兩 八十 錢目。良トス。

多少皆此度ヲ以テス。○楊氏ガ漢語。釧及_レ順。類聚。釧ニ。厚朴ホウノ木
トス。故ニ本邦相繼ニ從之。ホウノ木ノ皮ヲ以テ厚朴トス。察スルニ本綱ニ

所述ノ厚朴樹ノ花形及_レ皮質俱ニ和ニ謂。ホウノ木ト不同。今六議ニ

和語本草 卷之二十一

云。本邦ニ所謂ノ夢窟木也。夢窟ニ兩種アリ。一種ハ閩中記ニ所
加條也。其葉ヲ採テ犀角象牙等ヲ摩テ光ヲ出ス者ナリ。和ニ呼テ
雌夢窟トス。一種ハ皮厚ク鱗ガキ。皺テ角シ。和ニ呼テ雄夢窟トス。厚
朴是也。雌夢窟ノ皮ハ雄夢窟ノ厚ニ不及。用之。厚朴トス。樹皮花
形。本綱ニ述ル所ト下異。且ホウノ木ノ皮ハ強テ不厚。厚朴ノ名ヲ得
ベキ者ニ非ル也。古今繼誤改知者希ナリ。鑿スヘトス。如此。類問存
昔。不可不詳。

杜仲



其微辛小温。治腰膝痛脚疼。陰下。癢。濕。小便
餘瀝。堅筋骨。益精氣。潤肝燥。補肝經風虛。△昔

杜姓仲名ト云者。服此得效ヨリ始。因テ各トス。章宜カ説ニ杜從土
仲從中。即中土義。其色褐。土ノ如シ。此土克水ノ象アリ。此制腎邪
防濕土害者トス。此從各義。雖辨主治。土克水説未是者乎。○杜

仲ハ足少陰腎經ニ入テ。潤精強腎志。温下。兼テ足厥陰肝經ニ入テ。潤
肝燥肝。主筋腎主骨。腰膝ハ筋骨府會ノ處ナリ。故ニ杜仲ヲ用テ肝腎
ヲ潤シ。筋骨ヲ堅。則腰膝痛脚疼。及脚軟ヲ治ス。尤腰膝冷痛者。宜シ
陰下癢。濕陰囊癢。濕者。下焦ノ虚冷トス。用之。潤陰温下。小便餘
瀝。モ亦腎部ノ虚冷トス也。堅筋骨。益精氣。潤肝燥。此杜仲ノ要能
也。他ノ諸ノ主治ハ皆此ヨリシテ致ス所ノ者ナリ。潤腎肝。養筋骨。温下
焦。ノ功ニ不過。補肝經風虛。此好古ガ發明也。古方ニ腎ヲ滋コトヲ知ル
肝燥ヲ潤シ。養ハ不知所ナリ。風虚トハ。肝ハ東方風木ノ藏ナリ。肝氣虚則
自風燥ノ化病ヲ生スルヲ云也。杜仲ハ肝燥ヲ潤。則風化自退ヲ以テ。○
案。元ニ時珍カ曰。能入肝而補腎。子能令母實也トハ。未是。何如トナリ。時
珍カ説ノ如シナルトキハ。杜仲ハ入肝ヲ本トシテ。腎ヲ補ヲ標トス者也。杜
仲皮ハ粘滑ニシテ。折之有絲。豈此潤質ヲ以テ。潤腎ノ義ナシトセンヤ。

和語本草

腎肝ニ入テ兩藏ヲ潤ス者トスヘシ獨肝ニ而已入テ肝ヨリ腎ヲ養トスベカラズ

總藥

杜仲、肝腎ヲ潤シ筋骨ヲ堅メ治腰膝脚

疼痛有孿強直及軟弱要藥也

使藥

同牛膝、枸杞、續斷、地黃、五味、兔絲子、白膠、黃蘗、山藥、治腎虛腰痛及脚軟無力

毒

腎熱ノ者ハ勿用。或ハ黃蘗、知母ト合用ス

畏惡

玄參、蛇蛻ヲ惡

附方

腰痛風冷傷腎者杜仲一味炒

黃酒ニ浸コト十日ノ炙乾シ爲末。毎日温酒ニテ服ス。出ニ因方。婦人頻墮胎者。或ハ三四箇月ニ墮胎ノ者ハ。兩朔ノ前ニ於テコレヲ服ス。杜仲八兩、糯米煎湯ニ浸透シ。炒テ絲ヲ去。續斷二兩酒ニ浸シ焙乾シ爲末。

山藥五六兩爲末作糊。梧子ノ大ニ丸メ。每服五十九。空心ニ米飲ニテ下ス。出簡便方。○別後方ニ杜仲一味焙爲末。棗肉ニテ爲丸。糯米飲ニテ下

修治

脂厚多潤フ者良。粗皮ヲ去。或ハ其汁

或加塩酒ニ浸テ炒コト絲ノ竭テス。○腰痛ノ者ハ。必ス塩酒炒ヲ用。○本邦ノ人或ハササ木ヲ以テ爲杜仲者ハ誤也

乾漆



辛鹹苦温。○削年深堅結之積滯。破日久凝結之瘀血。去腸胃蠅蟲。△漆ハ本作漆。木中ノ汁

水滴テ下ノ形ニ象ル。用藥者ハ黑漆ノ乾ヲ使フ。故ニ此名アリ。○漆性急烈ニシ。年久キ積滯ノ堅ヲ削去テ痞塊ヲ治シ。日久キ瘀血ノ凝滯ヲ破テ。女人ノ癥瘕經閉。腰痛。心痛ヲ治ス。腸胃ノ蠅蟲ヲ殺テ傳尸勞蟲。蠱心痛ヲ治ス。其氣下降シテ産後ノ血運ヲ治ム。本經ニ續筋

骨。填髓腦。大漆性ノ堅ク粘ラ以テナリ。治風寒濕痺。除風療欬嗽。トハ。其辛温解散スルヲ以テナリ。然レ此等ハ乾漆ノ要能ニハ非ズ

總

概

乾漆ハ下降シテ破瘀血殺蟲ノ要劑ナリ

使藥

半夏ヲ使ス

毒

血虚ノ者ハ輕シク用コト勿レ。蓋乾漆

和語本

獨瘀血ヲ消スノニナラズ新血モ亦破レバ也章宜曰血見乾漆即化
為水其損新血可知○生漆ハ毒烈レ服之損腸胃若其毒ニ中ル者

飲鐵漿黃蘆汁并豆豆湯黑豆湯喫解愈○生漆瘡者ハ杉木湯

紫補湯蟹湯ニテ浴コク○凡入漆室者蜀椒塗口鼻免生漆瘡

雞子ヲ畏レ婦人婦人産後乾漆ヲ燒テ烟ヲ聞血運ヲ免ル

油脂ヲ忌附方若乾漆ナケレバ陳舊ノ黒漆器ヲ燒テ聞朱

漆器ハ本銀ノ愚案今ノ小方脉以生漆指灸穴灸艾ニ代ル者有

毒下リ不可用古今ノ醫書ニ遂ニ此義アルコトナシ有ドモ余

味見歟用後方ニ下部生瘡生漆塗之ノ説アルノニ察スルニ小兒ハ灸

紋ノ熱ニ不耐故ニ漆ヲ指テ其穴處ラレテ漆瘡ヲ生レ膿ヲ致シ

結ヲ去テ欲スル者歟此蓋シ山谷ノ野人希求於修治

醫者ノ始ニテラン醫ノ眞法ニ非ズ知道者敢勿用漆桶ノ

然ニ乾堅キ者良狀蜂房ノ如ク孔々アリ黒漆宜用朱漆ハ不可用

使フニ打碎テ炒テ烟ノ盡ラ度トス烟ヲ盡サバ腸胃ヲ損ス○濕漆ハ

煎ジ乾ス○或ハ燒テ存性用ル者アリ○清ヨリ渡ス所ノ者多ハ桐油

ヲ雜ス勿入藥○本邦北國ノ山中ヨリ多ク乾漆ヲ出ス藥店ニ所用

ノ者ハ皆是ナリ然ドレ此真ノ乾漆ニ非ズ其山中ノ黒石炭ニ碎易ク

土人火中ニ雜テ炭ニ代即チ本州ニ謂エ石炭也誤テ用之爲乾漆者

不少燻スレトス漆葉殺勞虫暴乾研末ノ日ニ用酒服錢漆子

治下血漆花治小兒解腹脹苦酸寒○導熱結下行通水道治心腹暴痛諸

金鈴子鈴子○毒殺蟲△瘰ノ實也黄色ヲ小鈴ノ如シ故ニ名ヲ○

金鈴子ハ小腸膀胱ノ結熱及心包ノ相火ヲ引テ下行ス故ニ結熱因

テ水道不通者ヲ利シ熱厥ニ因テ心腹暴痛ヲ治ス亦痛ヲ治スル



亦引結熱下分故也。此方味苦，能蠱殺蟲痔，疥癬瘡毒，腹內凡此蟲ヲ治ス。本經ニ治ス傷寒，大熱煩狂，上金鈴子，八足陽明經ニ入ル。傷寒ノ熱，陽明ニ入ル者，煩在ス。故ニ用之。其結熱ヲ瀉スノニ。又下焦ノ結熱ニ因テ。下血膏淋ヲ致ス者ニ用ユ。金鈴子ハ小腸膀胱胃及心包ノ結熱ヲ涼下シ。熱厥ノ心腹暴痛ヲ治シ。殺腸蟲ノ要劑也。

使藥

茴香ヲ使トス。酒ヲ得テ良。益寒因熱用ノ義ナリ。

毒

虛寒ノ者○脾胃不足ノ者勿用。

畏惡

金鈴子ヲ使ニ用肉不使核。核ヲ用ハ不使肉。核肉合用ルコトヲ忌。

附方

熱毒下血。金鈴子炒黃爲末。蜜丸。梧子、大米飲ニテ服。出經驗方。修治。用ニ或ハ少炒コトアリ。核ヲ用ハ槌碎テ水ニ煮ルコト一時許シ。晒乾用。或ハ炒コトナリ。凡肉核俱ニ合用ルコト勿レ。○和産ハ肉少シ清ヨリ來者肉厚ノ向。苦楝皮同根。苦微寒。○治。蛇蟲瘡。蟲利。大腸。葶酒和塗。疥癬甚良。治熱毒瘡。風疹。惡瘡。疥癩。小兒壯熱。○楝皮。楝根。俱ニ追。蛇蟲ノ要劑ナリ。故ニ小兒家ニ多用之。○楝ニ雌雄アリ。根赤ク子無キ者ハ雄ナリ。毒有テ入ラ殺ス不可用。根白ク子多キ者ハ雌也用。藥皮根俱ニ鹿皮ヲ刮去テ剉。少焙用ユ。根ハ東方ニ向者ヲ良トス。治。蛇蟲瘡。根。皮。每二兩糯米五十粒。同濃煎ジテ。上十五日間ニ服ス。先雞肉及餅少許ヲ啖テ頓ニ服藥。若服後ニ多瀉。冷粥ヲ食テ止不瀉。熱葱粥ヲ食テ下ス。石茱萸。楝ノ花落子也。服藥ニ不用外科ニ使之。楝花。熱瘡ニ焙末ノ摻之。鋪席下殺。瘧風。楝葉。治疝氣。陰囊痛。發ル時ニ煎酒飲。

槐



苦酸鹹寒。○涼。熱。清。頭。目。治。五痔。腸風。瀉。血。陰。角。槐實也。槐。懷也。

中。語。本。草。卷。之。五。十。一。槐。實。也。槐。懷也。

筋引結熱下分故也。此方味苦，能瀉火殺毒，實二歸也。故此

名アリ。○槐角八潤肝燥，涼大腸，散一切火，涼血熱，要劑也。

也。故二治火瘡熱腫，口齒風熱，心間燥熱，風熱眩倒，目淚日熱，要熱

大熱難產，療因下熱致五痔，腸風瀉血，陰囊陰戶濕痒瘡者，此方治之

所皆熱ヲ涼レ結ラ散スニアリ。景天ヲ

尤血熱ノ下血ヲ療スル要劑也。使藥 使ス

熱下者○胃 附方 槐角丸 治糞前糞後下血，脫肛諸痔瘡，槐

氣不足者勿用。角 去梗炒 地榆當歸 酒 防風黃芩 枳殼 炒

各半 爲末酒糊丸梧子大米飲下，出局方。目熱昏槐

角黃連 各二 爲末蜜丸梧子大米下，出聖濟總錄。修治 銅鏈ヲ

破醋ニ浸ク一宿ノ蒸炒ヲ用ユ。○子ノ一粒與五粒連ル者ハ毒アリ勿

用。二粒ニ粒連ル者ヲ良トス。槐花 苦涼。○涼陽明厥陰血熱及大腸

熱治下血吐血小便血血崩崩血赤白下痢帶下五痔眼赤去藏蟲

除皮膚風熱炒香嚼治失音喉痺。○涼血熱治一切出血要劑也。○

胃虛虛寒者用コト勿レ。○花未開ノ時采テ陰乾ヲ炒用。陳久ノ

者ヲ良トス。今本邦ノ醫新花ヲ用ユ。案スニ普濟方治藏毒下血新

槐花炒研酒服三錢ト云トキハ新花ヲ用ルモ可ナリ。槐葉 苦平。○煎

湯治小兒驚癇壯熱赤癩及下腫難產癰疹牙齒風痛痔疾療霍亂

煩熱槐葉桑葉 各一 炙甘草 分煎服。○嫩葉ヲ采陰乾ヲ判用。槐枝

氣味同葉。○煎湯洗瘡疥陰囊濕痒痔核煮汁釀酒療大風痿痺諸

疾ヲ燒テ汁ヲ出シ塗癬瘰癧馬少指牙虫燒灰沐頭長髮治赤日風眼

崩漏傳信方治痔痛出血槐枝濃煎湯先洗以艾灸七壯以知爲度

子母秘錄孕婦日月未足胎動欲產者取槐枝向東令孕婦手把之

即易產。○槐樹ノ大枝ヲ斬テ再嫩葉ヲ煎テ支ノ膏ヲ先陰瘡濕痒

六向北日ヲ不受枝ヲ用ニ槐木皮根白皮等平煎湯漱喉痺口齒
風腫痛牙蟲血治中風皮膚不仁下血煎汁洗男子陰囊腫痛婦人
陰門痒痛五痔一切惡瘡煎膏治湯火瘡爛瘡止痛長肉木皮根
皮俱ニ粗皮ヲ去テ白皮ヲ用ニ槐膠苦寒治一切風熱瘰癧涎抽
製口瘡四收頑痺周身如蟲行破傷風口眼喎斜腰背強直煨熟綿
裏塞耳治風熱耳聾槐樹ノ膠ナリ或ハ丸トシ或ハ散トシ或ハ煎テ諸
藥ニ和雜ノ用ニ



合 并平和血消腫止痛續筋骨長肌肉明目煎
膏塗癰腫治折傷跌撲研末酒服一錢△此樹

葉至夜合木皮安五藏和心志令人歡樂無憂故名○合歡屬土補
陰功甚捷筋骨折傷及筋攣
ヲ治シ腫痛ヲ消スルノ要劑ナリ
修治 夜合樹ノ皮ナリ粗皮ヲ去
剝ニ妙用ニ花枝俱濃煎
汁拭口中并洗治小兒癩風撮口



秦皮 苦酸寒○療目疾治風寒濕痺熱痢婦人帶下
小兒驚癇△秦本作柗此木小ヲ終高故名○

秦皮ハ青色ニ入肝胆兩經涼熱故ニ療目疾蓋目ハ肝竅トス肝
胆ハ木ニ屬シ相火ノ藏府風熱ノ氣多シ是以目疾多ハ肝經ノ風
熱ニ因目中之青翳白膜目赤腫痛熱淚睛瘡ヲ治スニ秦皮ヲ以テ
此モ亦肝胆ノ風熱ニ屬スガ故ナリ或問秦皮ハ苦寒ノ劑當除熱何
治風寒濕痺乎曰風寒濕ハ病因也痺ハ病證也夫痺病タル風寒
濕ノ三邪交合シ經絡ヲ閉澁シ血氣凝滯シ筋脉急縮ス為痺痛
其經絡ノ閉澁血氣ノ凝滯スルキハ熱アリテ筋脉燥縮ス故ニ其
病因ハ風寒濕ニ難在既ニ痺痛縮急之變スニ於テ開澁ノ熱燥ヲ
主ス秦皮ハ苦寒涼壅熱酸味ハ潤燥開澁筋脉通利ノ縮痛愈又治

熱痢帶下。不受枝ヲ用ニ槐木皮根。及屬熱帶下。崩血ヲ治ス。治小兒驚風。亦解用。熱平木也。故二別錄曰。治小兒癩身熱。上通用ノ義ニ非ズ。身熱ノ二字ヲ主トシ用之。○別錄療男子少精。又曰。久服皮膚光澤。肥大有子ト云。恐ハ不是。蓋秦皮ノ氣寒。味苦酸。性收瀉ス。其酸收瀉ヲ以。益少精有子ノ說アリト雖。或ハ酸温。酸微寒。或ハ酸甘。或ハ甘温。其微寒等ノ者。只補益ノ功ヲ致ス。秦皮ハ本經ニ微寒ト雖。別錄ニ爲大寒。此苦酸大寒ヲ以テ何ノ益精ノ義アラシヤ。此ヲ久服ス。ケシヤ。且今人有子ノ義アラシヤ。秦皮ノ苦酸大寒ヲ久服共。其下焦偏ニ如秋冬收殺令。失春温生發氣。何ハ有子ノ義アラシヤ。惟因熱精不堅者。因熱肌膚不光澤者。因熱無子者。ハ或ハ少ク用ニキ。本艸言盡。信シ難シ。學者一隅ニ執スルコト勿レ。

總纂

秦皮清肝胆風熱。熱眼崩痢及小兒癩熱。

ヲ療ス。○大戟ヲ使藥。○大戟ヲ使藥。○中下焦有冷者皆勿用。○畏惡。

苦瓠防葵吳。○附方。○赤眼生翳。秦皮兩。水一升半。煮七合。澄清温洗。下左滑石黃連等分。二加。出外臺秘要。

修治。○外皮ヲ剥去。用ニ。○浸水。碧色塗紙青色ノ者。眞也。本綱。○忌火ノ言ナシ。和法。○忌火ノ義。然カ否ヤ。

皂。○大皂莢。○辛鹹温。○通九竅。療腹脹。治咽腫喉痺。消風疹。○同蒼木燒烟辟瘟疫邪氣。薰及痢脫肛。破堅癥。

散腫痛殺蟲墮胎。○莢ノ皂色ナルヲ以テ号ク。○皂莢ハ肺大腸ノ金部ニ入テ。厥陰肝木ノ病ヲ平ク。藥性浮テ疎散通利ス。上下ノ竅ヲ開利シ。關節ヲ通シ。痰滯ヲ疎導シ。風之散レ。痰ヲ逐。腫毒ヲ消ス。故一切ノ咽口舌ノ腫痛ノ諸症ヲ療レ。牙痛頭痛中風口噤口喎癰病。

喘息咳嗽ヲ治ス。此利上竅通壅滯逐風。痰力故テ。腹脹腹痛久痢
 脱肛下血堅癥ヲ治ス。者ハ利下竅壅滯ヲ通ス。ハ也。上吐逆不通
 且二便不通ヲ名關格。皂莢治之者。不利上下竅也。治霍亂轉筋
 者ハ通關節也。治便毒腫痛陰囊腫疼。婦人乳腫疥癩者ハ腫ヲ散シ
 消毒導滯殺
 蟲ノ功ヨリ致ス

總藥 上下竅ヲ通シ風痰ノ壅滯ヲ逐治
 諸咽喉腫痛中風口燥ノ要劑也

使藥 鐵ラ忌惡麥門
 冬畏空青人參

柏實ヲ
 使ス

毒 孕婦ハ禁用。陰虛ノ類中
 風者ハ勿用辛温恐燥之

畏惡 鐵ラ忌惡麥門
 冬畏空青人參

苦
 參 附方 自製皂莢末吹鼻中。出外一方水溺卒死者一宿向
 可活紙裏皂莢末納肛門。女子納前後陰須臾出水活

由外
 秘要

修治 不睡者ヲ擇ミ水ニ浸ス。一宿レ銅刀ニテ粗皮ヲ刮
 去蜜ヲ塗反復ノ夜透テ。子ト蔓トヲ去用ユ。○圓ク

厚ク肥短ク皮薄ク肉多キ者良。和産ニ此種多シ。細ク瘦尖テ牙ノ
 如丸者ヲ猪牙皂莢或ハ牙皂ト号ス。齋ヨリ來者ニ牙皂多シ。風痰
 壅滯開竅者ハ宜用牙皂其銳利ノ象ヲ以テ。他ノ通用ハ圓厚肥
 短ノ者ヲ宜トス。○方書ニ謂皂角ハ即皂莢也。皂角子ハ皂莢子也

皂莢子 辛温。○疎導五藏風熱壅滯利肺氣治胸痰吞酸和血潤通
 大便燥結療癩癰腫毒瘡癬腰脚風痛下痢裏急後重不止。牙痛
 婦人難産。○皂角子ハ滑ヲ燥結ヲ潤通シ肺大腸ノ氣ヲ利ス大便
 閉ノ要劑也。孕婦ハ勿用。○堅滯者良者熟ノ外ノ黑皮一片十内ノ
 黃丸者トヲ去テ銅刀ニテ割晒シ使ス。或ハ焙丸内ノ黃丸者ハ消腎勿
 雜入。皂角子核燒テ存性用利大便。○皂莢刺治諸瘡腫不潰癩瘋
 乳癰惡瘡楊梅瘡胞衣不下殺蟲。○皂莢刺ハ能諸藥ヲ引テ上行
 治上焦去血中風熱壅滯ヲ利シ蟲ヲ殺ス。皂莢ノ功ト同。刺ハ惟銳

利之能病ノアル所ニ造リ瘡腫ノ未潰者ヲ。能潰シテニ神效アリ。已潰者ハ勿用多。用ハ落髮。○銅刀ニテ割シ。六燒ニ刺ノ末。微許ヲ燒去。用ニ。○今藥店ニ皂莢刺ト呼者。歸子皂莢刺也。子與刺音相近。故ニ皂莢子。皂莢刺ノ相混シトテ恐テ。以刺易利呼者。トシ歟。

訶子



苦酸。瀉溫。○止泄瀉痢疾。嘔吐。欬喘。下血。婦人。瀉胎。崩血。帶下。止木道消痰。下氣。寬中。降火。△

訶子ハ俗語リ。本名ハ訶黎勒。蓋梵語也。○訶子。苦。能降。酸。瀉。能收。瀉。故ニ降火。下氣。收斂。泄止ノ功ヲ致ス。故ニ瀉痢。嘔吐。欬喘。喘息。下血。胎漏。崩帶。止瀉。夫瀉ヲ治ス者。其寒熱ヲ調。中焦ヲ和。滯ヲ消。木穀分利ノ愈。ヲ以テ法トス。若夫法ノ如キ。治。久。不愈者。用之。止瀉。其治。嘔吐者。ハ。其寒熱ヲ調。中焦ヲ和。并。利。瀉。瀉。順。愈。ヲ以テ法トス。若其法ノ如キ。毛。不止者。ハ。用之。止瀉。其治。欬喘。息者。ハ。外邪ノ有無ヲ察。邪。ハ。瀉。散。痰。ヲ消。氣。順。或。濕。或。涼。或。瀉。或。補。テ。愈。ヲ以テ法トス。若其法ノ如キ。不愈者。ハ。用之。止瀉。其治。下血。崩。血。帶。下。ノ如キ。亦。皆。先。其。本。因。ヲ。治。不愈者。用之。止瀉。其治。若瀉痢。欬喘。嘔吐。下血。等。先其本因ノ邪ヲ去ス。始。用之。早キ。トキ。ハ。反。テ。止。邪。增。病。害。ヲ。致。ス。ト。甚。レ。凡。ノ。訶。子。ヲ。用。テ。止瀉。ス。ル。於。テ。ハ。脈。證。ヲ。詳。察。シ。其。時。ヲ。候。待。テ。施。セ。輕。瀉。ニ。勿。用。瀉。瀉。ノ。如キ。ハ。此。例。ニ。非。ズ。此。症。ノ。急。テ。ル。者。補。血。養。胎。ノ。劑。ト。合。テ。速。ニ。用。之。唐。本。州。治。冷。氣。心。腹。脹。滿。下。食。大。明。謂。化。食。開。胃。調。中。霍。亂。心。腹。虛。痛。奔。豚。腎。積。ト。訶。子。苦。溫。寬。中。溫。中。下。氣。力。故。ナリ。大。明。謂。治。五。膈。婦。人。胎。動。脹。悶。氣。喘。除。煩。火。氣。下。胎。瀉。ス。ガ。故。也。甄。權。謂。破。

和語本草

胸膈結氣通利津液蕭炳力謂下宿物ハ皆誤ナリ蓋訶子ハ收澁劑ナリ何ゾ破胸膈結氣ノ義アラシヤ惟氣ヲ下ノ訶子ハ腸胃ヲ澁ス何ゾ下宿物ノ義アラシヤ若夫宿食ヲ下ス者多ク古人何ゾ瀉劑ノ始ニ忌之ノ説アラシヤ蕭方説尤モ誤ナリ甄權方謂通利津液ノ言モ亦未適理訶子ノ苦酸澁ハ當收津液何ゾ通利ノ義アラシヤ且甄曰止水道下通利津液ト云テ亦止水道ハ自相矛盾セリ或問訶子消痰下氣寬中降火ト何ヤ曰古今ノ相傳ニ波朮國ニ大魚アリ若澁ヲ水中ニ略トキ凝滑ニ船通コト不能時ニ舟工訶子ノ煎湯ヲ投入テ澁凝化水船行ト是ヲ以テ訶子ノ痰ヲ消スコトヲ知スレ氣ヲ下ス者ハ此カ味苦ニ由寬中者ハ性ノ温ニ從火ヲ降ス者ハ苦酸ノ味厚ヲ以テ也然トモ性温カ相火衝上ノ者ニ不可用惟此ガ火ヲ降ス者ハ其收澁ノ餘ヨリ致ス知母ノ降火ノ類ニ非ス

總

緊

收澁大腸通利瀉劑收寧肺氣止澁效嗽消化痰延要劑也

使藥

同入參補肺同白木益脾同五味子烏梅

斂肺同陳皮厚朴下氣

毒

痢病未行消導推下始○泄瀉未得水穀分利消化始俱勿用○效嗽初發邪未去病未久者不

驟用○肺有實熱者○氣虛者○喘欬因火衝者皆勿用

附方

下疳瘡先以米泔水洗或以荊芥黃柏甘草馬鞭葱白煎湯洗後太訶子燒灰入麝香少許搽之並爛一二寸者用此神效也

出夷室志惠久痢肛門急痛或產婦陰門痛訶子末和臘燒烟薰之或煎湯薰

修治

六稜ニ黒色肉厚キ者良麩粉ヲ水ニ和シテ訶子ヲ裹煨シ透テ麩ヲ去核ヲ去テ肉ヲ取坐焙

用○或ハ酒ニ浸蒸コトナリ○若用核去肉核止效嗽痢疾爲未調白蜜注目去風眼赤痛葉下氣消痰止渴及瀉痢煎服功同訶子

没石子



苦温○治赤白痢益血固精温中和氣止大腸
虛冷瀉痢不止治小兒疳積陰瘡陰汗生肌肉

烏髭髮治痿△本名八没食子波斯人每食代果故名今人傳訛テ

没石子或ハ無食子トス○腸胃ヲ温メ精血ヲ助ケ氣道ヲ和ス大腸

虛冷ハ大便滑ヲ難禁及瀉痢久レテ大腸虛滑ニ難止止瀉ス

訶子ト相似ク然レテ訶子ハ偏ニ止瀉ス此ハ精血ヲ補ヒ氣ヲ和シ

能温腸胃止瀉ノ功訶子ヨリモ緩和ナリトス大腸虛

冷ノ滑瀉ヲ治スニ宜トス然レモ獨用ヒ過用ルハ宜カラス

者ハ勿用○腸胃熱

實ノ者モ亦ハ不宜用

飯丸小豆大每食前

米飲下出普濟方

畏惡

銅鐵ヲ忌火

附方

血痢不止没

修治

佳砂盆ニ入レ以石研碎隔紙焙用ユ

銅鉄并ニ火ヲ忌ム

榆白皮

其平滑利○利竅通大小便治五淋腫滿喘嗽不眠滑

利ニ下降る胃大腸膀胱ノ三經ニ入通小便濕熱ヲ滲レ水腫ヲ治シ

利淋症大便ヲ通シテ除腸胃熱邪腹滿ヲ治る喘息效嗽不眠ヲ治ス

者ハ一便ヲ通シ氣ヲ下シ熱ヲ導カ故ナリ榆皮ノ性惟滑ニ竅ヲ利ス

而已彼滑胎通月經消癰腫傳癰瘡毛亦皆滑利ヨリシテ致ス

者ナリ時珍曰利竅滲濕熱行津液尤此カ要能ヲ盡セリ

脾胃寒虛者○小便過多者○大便滑泄者俱勿用○陽氣下陷者

不宜用○孕婦尤禁用○久服多服則洩真氣本經ニ久服輕身不

飢ノ訖ヲ信用スルト

勿蕪頌日多食不損

入者恐非確論

附方

秘錄小兒禿瘡榆白皮末調醋塗法

下火胎

榆白皮煮汁服二升出子母

出テ愈出

愚案

榆白皮性平ト云ト雖凡愚案ズルニ平ニ非ズ微涼ナル者ナリ療腸胃邪熱氣治胸喘滲濕熱洩

癰腫ト時珍曰胃寒而虛者勿服等ノ諸説

修治

粗皮ヲ刮リ去焙用エ○水ニ

六其此ヲ平ナル者トシカ微涼ナルト明ケシ浸コト勿レ濕ハ損性**葉**利小便消水腫治石淋○榆葉ハ其白皮下功ヲ

同ス此モ亦滑ニテ小便ヲ利スル者ナリ○采テ暴乾ノ爲末淡塩水ニ拌

テ或ハ炙リ或ハ曬乾シ用エ酸棗仁ト等分爲末蜜ニテカシ服胆虛勞

熱不眠**榆花**治小兒疳熱小便不利**榆莢仁**微辛平○助肺殺虫下

氣余人能食冷人能眠消心腹間惡氣治卒心痛末塗諸瘡治帶下

○陳父ノ者ヲ用テ可也



蕪 辛温○殺蟲消食積治癥瘕小兒疳瀉冷痢散皮膚骨節中如虫行治心腹積冷氣痛婦人子宮

官虛冷下血痔漏惡瘡疥癬△蕪ハ穢也蕪ハ傷也此ガ氣ノ臭キコト

傷敗ノ穢物ノ如シ故ニ号○蕪莢仁ノ功ハ腸胃ニ下走ニ蟲ヲ殺シ鼻

積ヲ消スニ在リ三寸白蟲鼈癭痕小兒ノ疳蟲一切ノ蟲症ヲ療スル

要劑ナリ夫嗜酒者血與酒凝積久則酒鼈痕ト成常ニ氣滯鬱ス

者滯氣與血凝テ久則氣鼈痕ト成虚勞痲冷ノ者瘀血與痰雜凝

コト久則血鼈痕ト成蟲ノ狀大則如鼈小則如錢擗頭掉尾如

蟲行上侵咽下蝕一陰或隱脇背或胸腹爲痛爲縮急惟蕪莢ヲ用テ

治スニ在リ三兼テ用煖胃益血理中劑治小兒疳瀉冷痢難止者殺

蟲且辛温暖腸胃故也或ハ調子豆蔻ト合用ス猪脂ト同ク擗テ塗熱

瘡爲末和蜜塗濕瘡散皮膚骨節如虫行者ハ此風痰ノ動トス蕪莢

辛温散之治心腹積冷氣痛婦人子宮虛冷者モ亦辛温破冷積癭

腸胃下焦也治下血者ハ通例ニ非ズ或ハ腸胃ノ冷ニ因テ血ヲ不收

下。或八蟲積。因下者。用之。他八此方。主治。疳積。疔瘡。疥癬。虫
尸。二屬。スル者。用之。治スル。宜。危氏。方。得。效。久。治。蟲。牙。痛。蕪。美。仁。納。蛙
孔。中。安。縫。中。甚。效。ト。此。蕪。美。ハ。獨。腹。内。ノ。蟲
ノ。三。十。ラ。ス。上。下。内。外。一。切。ノ。蟲。ヲ。殺。ス。ニ。宜。ト。ス。

使藥

同。肉。豆。蔻。胡
黃。連。蘆。薈。使

君子。青。黛。五。穀。蟲。雷。丸。檳。榔。陳。皮。小
兒。疳。熱。瀉。痢。及。泥。土。ヲ。食。フ。ヲ。好。マ。ル。治。ス。

毒

多。服。久。服。ス。ハ。發。熱。心。痛。ヲ
致。ス。○。熱。症。無。蟲。積。者。ハ

不。宜。

附方

脾胃。有。蟲。者。食。即。腹。痛。面。黃。無。色。蕪。美。仁。兩
最。麩。粉。炒。黃。爲。末。不。時。米。飲。下。出。千。金。方。

修治

陳。以。二。腥。ク。大。ナル。者。佳。小。者。ハ。不。堪。用。去。皮。用。仁。麩。粉。ニ。拌。炒。シ。テ
黃。色。ニ。シ。去。麩。用。之。此。藥。小。兒。ノ。疳。症。及。ヒ。蟲。ヲ。殺。ニ。用。他。ニ。於。テ。使。下。希。也

蘇木方



其。鹹。微。辛。酸。涼。○。和。血。破。血。治。產。後。血。脹。血。運。
婦。人。血。氣。心。腹。痛。月。經。不。調。血。瘕。赤。白。痢。消。癰

腫。撲。跌。瘀。血。痛。癢。赤。白。痢。消。癰。△。蘇。木。方。園。ト。云。烏。リ。テ。其。地。ニ。此。木。ヲ
生。ス。故。ニ。名。ク。○。蘇。木。方。木。ハ。三。陰。ノ。經。血。分。ノ。藥。也。少。ク。用。則。血。ヲ。和。シ。多
用。則。血。ヲ。破。ル。所。治。ノ。諸。症。皆。瘀。血。ヲ。破。シ。任。ノ。三。產。後。瘀。血。ニ。因。テ
致。脹。滿。者。名。血。脹。產。後。二。惡。血。衝。逆。レ。テ。敗。逆。昏。倒。口。噤。者。血。運。下
名。ク。產。後。二。瘀。血。下。竭。ス。或。ハ。氣。鬱。逆。等。ニ。因。テ。惡。血。衝。上。レ。テ。心。腹
卒。ニ。痛。者。ヲ。名。血。氣。痛。婦。人。ノ。月。經。不。調。者。ハ。多。ハ。瘀。血。ニ。屬。ス。婦。人。瘀
血。ニ。因。テ。腹。ニ。塊。瘕。アル。者。名。血。瘕。以。上。六。皆。是。レ。瘀。血。ニ。因。ル。蘇。木。方。木。宜
治。之。赤。白。痢。及。ヒ。癰。腫。撲。跌。痛。ヲ。治。ス。膿。ヲ。排。シ。痛。ヲ。止。ル。功。モ。亦。破。瘀
血。ガ。故。ナリ。失。音。口。噤。ヲ。治。ス。ル。者。ハ。此。ガ。味。微。辛。與。性。涼。ヲ。以。テ。風。熱
ヲ。散。散。ス。故。ニ。防。風。ト。合。用。中。風。ノ。邪。ニ。陰。ノ。血。分。ニ。在。テ。口。噤。不。語。者
ヲ。治。ス。又。婦。人。ノ。瘀。血。ニ
因。テ。失。音。者。ヲ。治。ス

總槩

蘇。木。方。木。ハ。破。瘀。血。ノ。要。劑。也。宿。血。ノ
外。他。ニ。於。テ。功。アル。ニ。ナ。レ。陳。藏。器。曰。

霍亂吐逆及人常嘔吐用水煎服ノ説アリト雖凡思案ズルニ此通例
義ニ非ス彼瘀血壅滯中焦霍亂嘔吐ノ者ハ用之其他ノ霍亂吐逆
者ハ不
宜用也

使藥

同防風治中風口噤不語或乳香末方寸匕以酒
煎蘇方木調服中風口噤不語立吐惡物瘥

毒

孕婦ハ斟酌スレ○不兼瘀血
血虛者○胃氣虛冷者勿用

修治

粗皮并二節ヲ去中心
ヲ用之細ニ剉使○本

邦ノ藥ニ忌火上雖凡本綱ニ蒸製アリト雖凡忌火ノ説ナシ南方州木
狀云藕方樹類槐黃花黒子出九真煎汁忌鉄器煎色黯上從此雖
如忌鉄本綱修治ノ條ニ忌鉄ノ説ナシ

巴豆



辛微苦熱○破癥瘕結聚堅積留飲痰癰停寒水
腫瀉痢驚癩心腹痛疝氣耳聾喉痺牙痛癩痺積

瘡女子月閉去惡肉除膿血殺蟲魚消腫毒△此物巴蜀ノ地ヲ出

テ形ノ豆ノ如シ故ニ名ク○巴豆ハ辛苦熱雄剛猛烈ノ氣性ヲ稟テ
堅ヲ破リ壅ヲ通ス病屬痰積壅塞氣血未衰胃氣全者ニ非ハ勿
用之癥瘕結聚堅積痰飲留滯ヲ破ル者ハ皆是破堅ノ功也藏府
間ニ寒冷ヲ停積スル者ヲ治スハ辛熱退寒且破堅ヲ以テ治水腫
者モ亦辛熱勝寒水陰邪ノ凝滯壅塞ヲ破通スルカ故ナリ然レ例
シテ水腫必用ノ劑トスゴト勿レ水凝寒積テ滯結ノ深固ハ於テ
用之破ルノ三然ト雖トモ亦胃氣未全者ハ斟酌スレ惟宜用實腫
不宜用虛腫治泄劑トハ深義ノ存スルコトアリ泄瀉痢疾ノ症宿積
冷滯ノ深固ナル者或ハ用テ破之利之或ハ瀉劑久ク有形ノ宿積稍
去ト雖凡冷滯腸胃ニ凝積ノ瀉劑不止者モ亦或ハ用之止之好古曰
可以通腸可以止瀉大是ナリ有形ノ宿積腸胃ニ壅凝スル者用テ通
利スレ寒冷腸胃ニ結積ノ瀉下スル者用テ止之實ニ通止ノ兩功病

因テコレアリ。王太僕カ謂ル太寒疑内久利溇泄愈而復發綿歷衰年者法當以熱下之則寒去利止ハ是也。世ニ巴豆ノ破積通腸ノ義ヲ知テ此ガ止利ノ理アルコトヲ知ル者ナク深ク此道ヲ得ル者ハ海藏時珍ノ二氏ノ三。然レバ巴豆ハ猛烈雄剛破堅刮積ノ劑ナリ久瀉ノ症多ク胃氣ノ傷敗ニ因ル粗工妄ニ用テ止スト欲共恐クハ害ヲ取コト甚シカラシコトヲ驚痛心腹痛血氣ヲ治スル者モ亦常例ニ非ス蓋巴豆ハ能痰積瘀血ヲ消散し通利シ壅滯ヲ解散シ寒積ヲ暖破ス故ニ驚痛症痰瘀血心氣ニ壅積者心腹痛ノ症或痰滯或ハ血積或ハ寒積ニ因者亦氣ノ症寒積血凝者皆巴豆ヲ用テ療之狀ニ此皆其滯積堅結ノ邪深ク病甚ク胃氣未傷者ヲ治ス尋常ノ義ニ非ス耳聾喉痺牙痛或ハ中風口喎ヲ治ス者ハ氣血ノ凝積痰飲ノ留滯ヲ消破ス力故テ然レトモ喉痺牙痛口喎ノ症偏ニ熱ニ因者ハ斟酌シ或ハ痲熱ノ者ハ用之却スコトアリト雖凡常法ニ非ス耳聾久キ者用テ效アリ痿痺痿弱與麻痺痰滯瘀血寒積ニ因テ病久ク不愈藥效ヲ得難キ者用之積滯痰積血積食積凝滯塊聚ノ瘡久ク不愈者用之然トモ痰瘡ノ症多ハ胃氣ノ全カザルニ因ル況ヤ久瘡ニ於テマ胃氣ノ虛ニ因者ナリ積滯ト雖凡疾ニ巴豆ノ劑劑不宜用女子月閉破瘀血カ故テリ虛人ハ不宜用去惡肉除膿血怪症方一切ノ惡肉ヲ腐一切ノ瘡毒ヲ解陳膿血ヲ推新肉血ヲ生ス巴豆仁炒焦シ研テ膏トシ痛處惡肉ノ上ニ塗ス或ハ乳香末少許ヲ加ト此亦凝積ヲ破消瘀血ノ力ナリ殺蟲腹蟲疥癬癩癩牙蟲一切ノ毒蟲ヲ殺ス此毒巴豆ハ辛熱有毒ノ物ナリ其辛熱殺蟲散毒以毒攻毒ノ義ナリ故ニ除鬼毒蠱毒功アリ消腫治下腫惡瘡腫毒三三粒麻油三煎黑レ去巴豆油調硫黃輕粉末頻ニ塗テ效カクノ義普濟方ニ見エタリ

總概

巴豆八瘵積血積食積寒積等一切之凝滯結積ノ堅ヲ破
塞塞留滯ノ固ヲ通ス獨リ穀道ヲ通泄スルヲミナラズ上下左
右ノ積滯不消トニコトナシ世ニ巴豆ハ推泄ノ劑ニトスル者ハ甚誤也
大黃ト同ク攻破ノ劑タリ大黃ノ性ハ寒ニシテ熱ニ屬スルヲ破リ巴
豆ノ性ハ熱ニ屬スルノ積結ヲ破ル實ニ巴豆與大黃破滯劑堅ノ
功ヲ同ク多ク寒熱ノ性ヲ異ニス且巴豆ノ猛烈雄剛ハ勝大黃者ナリ

使

藥

使上

毒

孕婦ハ禁服別錄曰爛胎上藥性論曰落胎上
產前ニ不可用ト見ズレ○丹溪曰胃中無寒積
者勿用○藥性論曰質○產後小兒老人一切虛症羸瘦ノ者○
胃氣不全者○真陰ノ不足○陰血枯燥ノ者ハ皆禁用○熱ニ屬ス
者ハ固附スレ○久用多用ヲ禁ズ○章宜曰巴豆湯五臟滌六府幾
煎腸胃上性ノ雄猛ナルコトヲ知ヌレ○脹滿ノ症或ハ大黃巴豆

藥ヲ以テ攻下スコトアリト雖モ此皆實滿ノ者暫ク用テ急ノ權
道ノ三法屬霸非王道是ヲ以テ若下之過則土衰木愈乘之脹
加急ヲ致レ且巴豆ノ辛熱上下トヲ以テ真陰ヲ損ニ藏府ヲ
爛ス故ニ實滿ノ者ト雖モ過用スコトヲ恐ルレ○巴豆ハ病屬實
篤者暫ク用テ攻之ノ劑也上工ノ術
上工ノ取テ安ニ用テキ劑ニ非ズ
水惡藜柳
反牽牛
附方 中風口喎巴豆七枚去皮研左喎塗右手心右喎
塗左手心暖湯一盞手心盛則須更上上其
洗去出聖惠方錢瘡巴豆仁三箇連油并泥
生稠包擦日一二三次三日瘡出經驗方
心上張破ヲ去テ炒黑ニ紙ニ裹打テ去油用ユ○一傳ニ板ニ裁木匙
ヲ以テ輕ク打バ皮殼破裂ス其皮殼ヲ捨テ仁ヲ取用テ炒藥研カ

畏惡

修治

神聖本草

以テラコニ碎ニ。雞卵紙ニ裹テ上下ニ板ヲ夾ミ重キ壓石ヲ置ク則
油出ラ紙ニ染ル紙ヲ換テ復如此スゴト數遍ニシテ油ヲ紙ニ小染
ラ度トノ用ユ此ヲ巴豆霜ト号ク或ハ心膜皮ヲ去水ニ煮ルゴト一沸ノ
水ヲ換テ煮ゴト五度ノ前法ノ如ク油ヲ去モ可ナリ。或ハ殼ヲ用ル者アリ
油ヲ用ル者アリ。生ニ用ル者アリ。麩ヲ水ニ調ヘ巴豆ヲ包ニ炒者アリ。醋
煮ルゴトアリ。燒テ存性用ル者アリ。○小ニ黃ナル者ヲ巴豆名ク三稜黒キ
者ヲ豆ト号ク。俱ニ並用ユ。○巴豆不云心作嘔曠使ヲ不云胃ヲ傷ル
生ナル者ハ毒有テ猛也。炒熟則性緩能吐能下シ能止能行ス。浸
沈香水能升能降大黃ト同ス。反テ瀉人コト緩レ。○菴巴豆ノ毒中
者ハ公水黃連汁。大豆汁ヲ服テ解ス。○之オ曰。得火良ト故ニコニ兵
炒熟テ用ルゴトヲ欲ス。○九ノ巴豆ノ丸劑ハ蠟ヲ以テ裹テ行ベシ此ヲ
蠟置蠟丸ト号ク蓋巴豆ハ毒有テ猛烈ノ劑ナリ。此ヲ直ニ服スレバ速ニ
胃氣ヲ傷ルコトヲ恐ル。故ニ蠟置ノ行則納胃其氣ノ雄猛ヲ發スルコト
不速ニ蠟ノ溶化スルニ從テ。漸ニ藥性發レテ病ヲ攻胃ヲ傷ノ害ヲ
免ルヲ以テ也。○剛子巴豆ノ兩頭尖ル者ヲ号ク藥勢尤モ猛ナリ。安ニ用
コトナカレ。○巴豆油。治中風痰厥氣厥中惡喉痺。一切急病牙關閉
○中風。或氣惱。或惡毒ノ異氣ニ因テ卒ニ牙關禁忌ト人事ヲ不
知者。及ヒ喉痺甚ク息ヲ不通者。巴豆ヲ研爛レ紙ニ包打テ油ヲ
染燃テ紙條ト作。火ヲ點テ吹油煙ヲ鼻中ニ薰フ。或ハ其熱烟紙條
ヲ喉内ニ刺入則涎或ハ惡血ヲ吐出。即時ニ甦ル。或ハ故無シ舌上
ヨリ血ヲ出ス者。舌ノ上下ヲ熏ハ自止。○巴豆殼。消積滯。治瀉劑脫肛
○殼性尤烈。輕シク用ゴト勿レ。凡巴豆有毒猛烈ノ劑。加ニ適ノルコト
暫用則神効アリ。若其症ニ非ズノ誤リ用則人ヲ殺ス。夫藥ハ皆毒ス
存ス。故ニ毒藥ノ稱アリ。是ヲ以テ參芪ノ等ト雖モ誤リ用則害ヲ致ス。

和語本草 卷之十一 廿五

况ヤ巴豆太黃等ノ剛劑ニ於テヲヤ。妄ニ輕シク施スコト勿レ



大風子 辛熱○治大風癰疥楊梅諸瘡攻毒殺虫○大風子ハ治瘡殺蟲劫毒ノ功アリト雖モ其辛熱

ヲ以テハ津ヲ燥シ血ヲ傷ル。タトヒ病ニ適ノ用ニト云上モ。服之病愈ルノ後。眼ノ明ヲ失コトアリ。惟用テ外ニ塗ベシ。大風ノ他。服藥ニ不宜用

治大風ノ功尤モ大ナリ。故ニ号大風子。普濟方ニ。大風子油兩。苦參末。少シ酒ヲ入レ。糊ニテ。梧子。大ニ丸ス。每服五十九。空心ニ

温酒ニ下ス。仍以苦參煎湯洗之。大風諸癩ヲ治スト云。附方 癰 疥 不痊者大風子樟腦水銀油胡椒

搗テ如泥ニテ搽ハ有驗。出本艸匯。修治 久クノ黃ニ油ツク者ハ用ニ搗テ如泥ニテ搽ハ有驗。出本艸匯。不堪新ク白者良。殺ラ

去。在ヲ取テ紙ニ包テ油ヲ去用ニ大風子取油之法。大風子三斤。白

色ノ者良。殺ラ去テ研爛シ極テ細シテ瓷器ニ入レ。口ヲ封シテ滾湯ノ鍋

中ニ浸レ。鍋ニ蓋シ密テ湯氣ヲ泄スコト勿レ。不武不緩中道ノ火

ヲ以テ湯煎シ。瓷中ノ大風子。黑色ニ膏ノ如クナルヲ度トス。此ヲ号

テ大風油トス。諸藥ニ和ノ用スレ

桑 其辛苦寒○瀉肺熱去肺中水氣下氣消痰治

皮白 喘嗽水腫煩渴唾血吐血衄血崩中胸腹滿脹

勞熱癰瘦利大小腸散血瘡治小兒天疳驚癇開胃下食殺藏

蟲ハ桑ハ神木也。其葉蠶ノ所食。以葉爲貴。桑ハ葉ノ形ニ象ル。故ニ木上ニ加テ桑作字。○肺ハ西方白色ノ金藏。輕ク浮テ居上。桑根皮。白

色ニ輕軟ナリ。故ニ手ノ太陰肺ニ入テ。肺熱ヲ瀉シ。肺中ノ水氣ヲ去

此桑白皮ノ要能ナリ。或問。桑白皮去肺中水。治水腫則猪澤等ノ功ニ相類スル者歟。曰。不然。猪澤等ハ淡滲通水ノ劑タリ。桑白皮直ニ通水ノ劑ニ非ズ。蓋シ肺金ハ生水ノ源タリ。且水ハ從氣行。桑白

皮肺熱ヲ瀉シ氣ヲ下ス。金清ク氣降則水流自通利ス。故時珍曰。利大小腸ト。此獨水道ヲ利スルニ不止。肺熱ヲ瀉シ。氣ヲ下ス。トキハ大腸モ亦通利ス。ト也。河痰濕痰熱痰。肺中ニ鬱スル者ヲ消ス。冷痰者ハ不宜。喘嗽此モ亦桑白皮ノ要功ナリ。痰與熱鬱肺喘嗽ヲ發シ。或ハ水氣肺中ニ衝上。喘嗽スル者用之。要トス。然レモ肺氣虛羸ノ者。及肺寒ニ屬ノ熱火ナキ者ハ勿用。或問桑白皮ノ性寒スリ。實ニ肺ノ寒氣ニ不宜。然レモ本經ニ補虛益氣ト。甄權曰。補不足ト。吾子何ゾ肺虛ノ喘嗽ニ不宜トスル。曰。元羅天益曰。其瀉肺中伏火而補正氣。瀉邪所以補正也。若肺虛而小便利者。不宜用ト。章宜曰。古稱補氣者。非若參芪之正補。乃瀉邪所以補正也。愚者信爲補劑。而肺虛亦用之。大失。桑皮之面目矣。桑白皮ハ瀉肺ノ劑ナリ。故ニ錢乙瀉白散用之。爲主。古人補虛ト云者ハ。肺ハ金藏。惡熱火。若金肺熱ノ爲ニ傷ラレ。者用之。肺熱ヲ瀉。則金肺清ク。肺氣ヲ助。義アルヲ以テ也。此瀉ヨリノ補ノ義アリ。直ニ正ク補ニ非ス。本經ニ。但五勞六極者モ。亦陰不足ス。ハ陽有餘シ。陽有餘ス。ハ熱狂ハ肺ニ乘シ。火旺ノ元氣疲東垣曰。火與元氣不離。立ノ義也。ノ症ヲ云。桑白皮ノ寒瀉肺熱。則有餘ノ陽火退キ。テ元氣ノ害ヲ免ニ取ノ。直ニ勞極ヲ補ノ理ニ非ス。水腫桑白皮水源ヲ清シ。テ氣ヲ下シ。水道ヲ利スルガ故ナリ。且愚按。此桑根ノ皮ヲ刮取テ。粗皮ヲ刮去テ。裏ノ白膜ヲ用。則人ノ皮裏分肉ノ間ニ行テ。氣水ヲ利スルノ功アルベキ者歟。然レ其性寒ナルトキハ。冷ニ所屬ノ水症ハ不宜。水腫ノ症。肺ニ水アリ。伏熱アリ。テ喘嗽ハ小便不利者ノ主劑也。

煩渴肺熱ヲ瀉スガ故ナリ。唾血吐血衄血。此皆肺熱ニ因者ヲ治ス。然トモ肺氣虛羸ノ者。只用コト勿レ。崩中ハ婦人月經不時。大ニ崩漏ヲ云。胸腹滿脹。肺ニ熱アリ。且ツ氣逆トテ喘シ。水道利キ。胸滿腹脹者ヲ治

勞熱羸瘦勞症熱之羸瘦者。兩辨アリ。元氣虛乏之然者此寒劑ヲ
用カテ。勞熱在肺。肺氣逆鬱シテ表達ス上不能。羸瘦スル者。用之
肺熱ヲ瀉シ。且此ガ苦モ。下氣辛散鬱則肺氣表二行テ治之。世ニ桑
白皮ノ味其ヲ以テ元氣ヲ助ト爲脾肺虛極。要肉脫ノ羸瘦勞熱
スニ用テ害ヲ致ス者アリ。詳ニ施之。利大小腸。肺與大腸表裏タリ。
肺ニ熱アリ。及肺氣下行共ノ大便不利。小便難利者俱用之。散血桑
白皮ハ手ノ太陰ノ氣藥ナリ。何ゾ散血乎。蓋血ハ氣ニ從テ行。桑白皮
ノ其辛苦ハ。肺氣ヲ利ス。且肺中ノ伏鬱ノ熱ヲ清ス。肺氣行。伏熱清
則血ノ雍滯逆塞ノ者自散行ス。トカレトモ散血ハ此ガ要能ニ非ス。惟
桑白皮。膏日ニ煎シテ。墜馬ノ損傷。金瘡。石癰。不作膿等ニ塗テ。能血ヲ
散ノ功ヲ見ス。縫金瘡。金瘡腸出者。腸ヲ納テ。桑白皮ヲ打ヒ。揉
柔ニシ。細ク線ニ燃テ瘡口ヲ縫。雞ノ生血ノ熱タルヲ塗ハ全愈。小兒天吊
驚癇。天吊ハ天鈞也。身ヲ縮ス。クメテ。搐搦。目直視上視。レテ。魚ノ鈞ニ
懸ルガ如キヲ云。天吊驚癇ノ症。氣痰逆上。熱伏肺然者。用之。開胃
下食。此其辛ヲ以テ開胃下食。故ニ霍乱吐瀉ヲ治スルノ功アリ。殺藏
蟲。苦辛ノ味ヲ以テリ。然トモ其キコト厚シ。寸白藏蟲ヲ去ノ功アリト
雖トモ。單ニ用テ其效アルコト少シ。加藥ノ用レシ。或問。章宜曰。因風
寒而嗽者。不宜用ト。然トモ。今ヤ。風寒ニ感傷ノ嗽者。發散ノ劑ニ合同
シテ。效アルコト不少ハ何ゾヤ。曰。章宜ガ説ハ。風寒感肺寒在肺嗽者。
戒ム。今感冒ノ嗽ニ用之。效アル者ハ。風寒外ヲ閉テ。鬱熱逆肺嗽者。
用之。瀉肺熱。消痰下氣。且此ガ辛味ヲ
以テハ。少シク散發ノ氣ヲ兼テ。效アルニ
總概
瀉肺熱。消肺中熱
痰逐肺中水氣下

氣治喘息。然嗽息迫煩渴。
小便不利。水腫ノ要劑也。

使藥

續斷。桂心。麻子ヲ使トス

毒

肺寒ノ者○
肺氣ノ虛極

スル者○小便多利ノ者皆用コト勿レ○凡ツ肺中ニ熱ナキ者ハ妄ニ用
コト勿レ若肺氣ノ虚ト雖ドモ熱アリ痰アル者ハ補中ニ少用テ位トス

畏惡

鐵鉞ヲ忌○桑根ノ土上ニ
見レ出ル者ハ勿用有毒殺人

附方

消渴尿多者桑根
ノ地ニ入ルコト三尺ノ

者ヲ取テ。白皮ヲ剥ハク黃黑色ニ炙リ對テ水ニ濃煮テ意ニ
任セテ飲ム。亦少シ米ヲ入テ煮ヨ塩ヲ用コト勿レ。出肘后左

修治

刀

ヲ以テ桑根ノ土ニ入ノ者ヲ掘取ル土上ニ見レ出ル者ハ人ヲ殺ス東ニ指
タル嫩根ヲ良トス其根ノ土氣ヲ洗ヒ淨レテ日ニ晒シ乾キ極テ後
刀ヲ以テ其根ノ皮ヲ剥取テ粗薄皮ヲ刮去裏ノ白皮ヲ用テ割
使テ○貯之多クニシテ惟根皮ヲ剥置製シ久則其功少シ○今人根ヲ掘取
ノ時即チ皮ヲ剥テ洗ガ故ニ其根皮ノ汁涎流去テ藥力ヲ失フ根ヲ
掘テ未皮ヲ剥ズ洗ヒ淨ク晒シ乾後皮ヲ剥トキハ其汁涎ヲ不
藥力全トス數カ曰皮中涎勿去之ト藥力尤皮中ノ汁ニ在バチ

桑

白皮中汁桑根ノ生者ノ白皮ヲ以テ搗テ汁ヲ取小兒ノ口瘡金瘡
ニ塗血及痛燥ヲ止或ハ桑白皮ノ生者ヲ以テ金瘡折傷ヲ裹バ甚
效アリ或ハ蟲毒ニ塗或ハ桑ノ根枝燒テ其汁ヲ塗テ大風疥瘡ヲ
治シ眉髮ヲ生ス桑椹其微凉○凉血補陰止渴生精瀉小腸熱烏
者尤良利關節血氣治痛利水氣消腫脹晒乾貯宜食飢歲○桑椹
白黒アリ烏者良暴乾レ爲末蜜ニテ丸メ服ス汁ニ搗テ飲ハ酒毒ヲ
解ス酒ニ作テ腫脹ヲ治ス○脾胃虚シテ大便滑丸者不宜食○小
兒多食ハ冷心寒桑葉苦甘寒大明日家○汁塗蟲毒煎服除脚
氣利大小腸通關節下氣止霍乱吐下腹痛煎膏服治久風疥血勞
熱欬嗽經霜不落桑葉煎湯洗風眼下淚明目服止渴洗髮長○桑
葉爲末捲紙燒テ烟ヲ赤眼澀痛ニ熏フ采垂露葉焙研テ末レ空心ニ

飲服之止遍身盜汗煮湯洗麻木痛風嫩葉煎酒治中風搗爛塗
 撲損桑枝苦平○利關節除諸痺痛治四肢拘攣脚氣欬嗽作鈎鈎
 中風口喎桑木灸法 諸瘡久不潰不愈者乾桑木枝細切片繫作
 小把燃火吹消點灸患處惡肉柔動爲度按毒止痛內服補花藥也

廣益本州大成卷之十二

廣益本州大成卷之十二 法橋 其岡本爲竹一抱子 撰

枳實



苦酸辛寒○破結實積堅消痰癖痞滿食積瘰
 血除胸脇痛傷寒結胸上氣喘欬逐停水止泄

實△時珍曰枳乃木名從只諧聲枳實枳殼上世未分魏晉以來始
 分實殼用枳實與枳殼本一木之子二其功用ヲ異ニス青皮與陳
 皮義如之入藥實殼之功似同剛柔緩急ノ異アリ章宜曰破積有
 雷厲風行之勢瀉痰有衝牆倒壁之威上枳實破結實積堅消痰癖
 人然如此故氣血弱者忌服多用胸中至高肺氣ヲ損入惟肺氣
 實結堅積者用之破之或問好古枳實主下枳殼主高枳實主血枳
 殼主氣何ヤ曰俗枳子小者ヲ實上大者ヲ殼上スルハ誤也秋採者

ヲ枳實トシ冬採者ヲ枳殼トス故ニ枳實ハ氣性全ク烈ク枳殼ハ老テ
氣性不烈ク枳實氣性全ク以テ下ヲ主トシ枳殼氣性老クヲ以テ高
ヲ主トス且枳實枳殼ハ俱ニ破氣劑ト雖也枳實氣性烈ク以テ有形
血ヲ破ニ至有形ハ破難無形氣ハ破易枳殼氣性老不烈故不及破
有形獨破氣積ニ然也枳實亦破上破氣枳殼亦破下破血必シモ
上下氣血ニ分配スルノ勿レ仲景胸痹痞滿ノ上焦ヲ治スルニ枳實ヲ
用ユ古方痢疾秘結ノ下焦ヲ治スルニ枳殼ヲ用ユ此枳實ハ獨治下
枳殼獨治高ニ止テ知レ枳實氣性全烈ノ以テ腸胃結積ヲ破
ニ宜ク枳殼老氣性不烈ヲ以テ胸膈結積ヲ破ニ宜クニ惟枳實ハ破
ク烈ク枳殼ハ破ク稍緩ク以テ主治ヲ辨ス上下氣血ノ分テ痞
滿心下痞急胸滿腹脹者用之其氣血ノ結積ヲ破若其偏肺氣ノ
結積ニ因テ胸痞胸膈痛者桔梗ト合シ枳殼ニ宜ク心下痞滿ノ肺氣與
脾血結積ニ因者ハ白朮ト合シ枳實ニ宜ク東垣曰枳實去脾積血
脾無積血則心下不痞矣食積枳實ハ脾胃ニ一經ニ入テ破堅消積
故能食積ヲ消ス瘀血脾經ノ瘀血ヲ破東垣曰潔古用去脾經積血
上患按ニ此方破瘀血者ハ獨脾胃間ニ入ルニ諸經敗血ヲ破ニハ非ス
胸脇痛中焦壅塞結積ノ肝氣鬱下逆ノ胸脇滿痛者用之中焦ノ
結積ヲ破則肝鬱舒逆氣下テ愈傷寒結胸心下緊滿脹ニ癰堅如
石者結胸ト號此傷寒邪熱中焦ニ結積者也枳實苦寒破之主劑多
上氣喘欬逆氣上胸中ニ結積レ心下痞滿ノ喘息欬者用之然也
氣實結積ノ候ツルニ非ハ矣用テ勿レ喘欬症兼虛者多逐停水胸腹
間ニ邪水ヲ停積ノ胸滿腹脹息迫等ヲ患者用之其停積ヲ逐ク或
問然則枳實ハ通水劑タリヤ曰不然枳實惟破結積劑タリ積氣積血
積痰積食積熱積水一切結積ニ於テ無ク不破故ニ水ノ溢テ腫脹者

上雖在木氣之疑結積實者二非勿用止泄痢枳實八止瀉劑二非之
止泄痢者何也蓋枳實能陽胃之積結ヲ破故陽胃之積結二因テ
泄痢者用之其滯積ヲ破則不止自止此積結之實胃氣之健也
治也○或問李經長肌肉益氣人何也曰此脾胃ヲ補テ肌肉之長
元氣ヲ益ノ義二非ス凡積結在腸胃則穀氣不能長肌膚ノ肉瘦者
アリ用枳實其積結ヲ破則穀氣運テ充肉也其益氣人溼邪者所
以助正義也若積滯壅結且止氣虛者人參白朮姜棗類合用
ス又曰元素謂去胃中濕熱人何也曰枳實苦寒ラ以テ濕熱ヲ去ト
雖此亦尋常ノ義二非ス濕熱ノ腸
胃二結積凝結者用之破除スルニ
其功尤腸胃ニ在治積實
脹滿積熱結胸要劑也

總條

枳實ハ氣血熱痰食水
一切ノ積結堅滯ヲ破

使藥

厚朴ト合ノ腸胃積結ヲ破
大黃ト合ノ腸胃積熱ヲ破

毒

胃氣不足者忌用○老人小兒婦人產前
ハ斟酌スベト○枳實ハ破積結剛劑也

ニ久服過

附方

積痢脫肛枳實石上磨平炙黃
亦更瀝肛門縮則止出千金方

愚按

製枳

木丸治脾胃益白朮二枳實二用其立方本旨ヲ按二積結在胃
中焦コレガ爲ニ不強者一兩ノ枳實ヲ用テ消化ス然在枳實其積
ヲ消耳二不能助胃及胃ヲ損フヲ恐故ニ白朮二兩ヲ用テ補中枳
實ノ傷ヲ防古人處方詳一見今以此等深義ニ未達痞滿腹脹
症ヲ見ハ安ニ枳實等剛劑ヲ用テ殺入者不少也夫痞滿腹脹積
結氣實者ハ實ニ宜用之若其積結アリト雖在真氣虛疲者或素ヨ
リ脾胃虛弱ニ中氣ノ運不和故積結壅滯ノ痞脹者補中益氣ノ
品ニ非ハ不能治之内經謂塞因塞用義也補中則升降通之益氣則

積結退之痞脹自消退入醫其虛實ヲ辨也。例ノ安ニ枳實等剛劑
ヲ用テ其虛ヲ攻則痞脹加盛也。遂ニ參朮補氣劑ト雖正難救危
症ヲ致ス。
修治 水ニ浸柔核葉ヲ除去テ切片曬乾再少濕テ麩ニ
護之戒之。拌炒ヲ麩焦ニ至テ麩ヲ拵去テ碎用。今人水浸核
穢ヲ去テ剉不晒即麩ニ拌炒ニ麩ヲ不拵思者ハ誤也。○秋採者ヲ
枳實トシ冬採者ヲ枳殼トス。俗ニ小者ヲ枳實トシ大者ヲ枳殼トスルハ
誤也。○枳實ハ陳久者ヲ良トス。新者氣味甚烈ノ不是也。○枳實
ハ色黒者ヲ良トス。綠色者ハ真ニ非ス。枸橘也勿用。○韓彦日近
時難得枳實ハ多植枸橘干籬落間收其實割乾以之。和藥ト。今本
邦ニモ亦作離カラタチト呼此スナキ枸橘也。藥店ニ此實ヲ採ニ小
枳實ト號真枳實ニ雜並ス。宜擇去真枳實ハ香ノ不臭枸橘ハ臭ノ
不香故呼テ臭橘トス不堪用者也。

枳殼

苦酸辛微寒。○除胸膈痰滯。留結氣消。胸痞。脹滿。腸脹。癥癖。下
氣逐水。治欬嗽。嘔逆。水腫。噎膈。泄痢。裏急後重。通大小腸。治關
節風痛。皮膚癢。瘰癧。麻木。背膊悶倦。諸氣痛。腸風。痔疾。○枳實枳殼俱
一樹實也。所採以前後別號。功ヲ異ニス。彼青皮與橘皮一樹子ト所
採以前後其功ノ不同義ノ如シ。前枳實條ニ如辨實殼俱ニ破積結
下氣消痰劑ニ。枳實ハ烈ク。枳殼ハ緩益。殼ハ實ノ老者。其氣散ノ性
不益也。實ニ對スル其行徐遲トス。大嫩者ハ其氣實ノ重シ。故ニ枳實
其功ヲ專腸胃老者ハ其氣緩ノ輕シ。故ニ枳殼ハ其功胸膈肺氣皮膚
關節ノ間ニ及ブ。然正枳實ハ腸胃ノミ。枳殼ハ胸膈ニ止ニ非ス。惟其
功專者ヲ奉ニ云トス。枳實ハ腸胃枳殼ハ胸膈劑トスル也。詳ニ前ノ枳
實條ニ見タリ。胸膈痰滯留結。枳殼ハ能胸痰ヲ除胸中肺氣ノ結ヲ
破。故元素曰多用損胸中至高之氣。胸痞脹滿腸脹。此亦前ノ枳實ノ

和語本草 卷之二十三 四

治スル所ト同但胸痞腹脹腸脹症其積結ノ重者ハ枳實ヲ用積結ノ
輕者ハ枳殼ヲ用之且枳實ハ氣血ノ兩積ヲ兼破枳殼ハ血積ヲ破
ニ至ス故痞脹症胸膈ノ滿重ノ氣積ニ屬者ハ枳殼ニ宜心下胸腹
ノ滿重ノ血積ヲ兼者ハ枳實ヲ主トス然レ肺氣胃氣ノ不健者ハ
實殼俱ニ斟酌スヘシ癥瘕癥瘕瘕瘕ハ氣血ノ積結也此亦實殼俱
ニ主惟其積結ノ輕與重積ノ所胸與腹ノ部位ニ從テ實殼ヲ分用
下氣逐水治欬嗽嘔逆水腫噎膈枳實ハ足陽明胃足太陰脾經ニ
行枳殼ハ手太陰肺手陽明大腸經氣分藥也能胸膈ノ結氣ヲ下テ治
欬嗽嘔逆反胃噎膈霍亂皆此至高ノ結氣ヲ下故也逐水治水腫
者前ノ枳實逐水治水腫義ニ同然レ枳實ハ能水氣ノ凝積ヲ破者
也枳殼ハ胸中至高ノ氣ヲ利ノ逐水故水氣凝結者ハ枳實ニ宜水
氣ノ胸中ニ逆結者ハ枳殼ニ宜或問香附桔梗能下氣枳殼下氣同
カ否ヤ曰不同香附ハ逆氣ヲ散下ス桔梗ハ能升テ濁氣ヲ下ス枳
殼ハ胸膈結積氣ヲ破下ス泄痢重急後重治泄痢者モ亦前ノ枳
實義ト同夫裏急後重ヤ二焦氣壅結ノ不利故也枳殼ハ能胸中
所氣ノ結ヲ利ス肺ハ氣ノ注大腸ノ本タリ肺氣利スレバ二焦氣利シ大
腸氣和シ後重自除是以痢病裏急後重者ノ主劑トス河間謂治
血便膿自愈利氣後重自愈ト是也通大小腸前ノ枳實條ト義相
同大藥枳實與枳殼其功相同但勢ノ烈ト不烈ト別ト三且實ハ腸
胃ヲ利スルニ宜殼ハ胸膈ヲ利スルニ宜トス此ヲ以テ實殼ノ治ヲ辨論ス
之治關節風痛皮膚痒痛麻木積殼苦ヤ踈酸ヤ深ニ透辛ヤ散ス故
ニ風熱濕熱ノ關節ニ壅滯ノ疼痛者ヲ通利ス又枳殼ハ手太陰
肺經氣分藥ニ兼テ足陽明胃經ニ入肺ハ皮膚ヲ主胃ハ肌肉ヲ主
故皮肉ノ風熱壅滯ノ痒痛麻木ヲ致者ヲ治ス然レ此等ハ枳殼ニ要

枳實 枳殼

能六非ス背膊悶倦氣塞之背膊悶痛倦怠者用之其壅逆氣ヲ行ス諸氣痛氣滯ニ因テ諸痛ヲ致者用之元胸中氣痛背痛肩痛ヲ治ス腸風痔疾枳殼手太陰肺藥肺與大腸表裏タル枳殼利肺氣清肺熱則大腸肛門自清利腸風痔疾愈然元虛寒者亦不宜用枳殼ハ胸中至高ノ氣ヲ下シ又大腸ヲ利レ能上

總槩

中焦ノ氣結ヲ破氣結痰壅ヲ利スルノ要劑ナリ

使

藥

桔梗ト合シ消胸痞白朮ヲ佐トシ安胎甘艸ト同ノ瘦胎黃連ト合シ治痔肉桂ト同シ治右脇痛

毒

氣虛者禁

用胎前產後勿妄用之氣血性弱者

附方

順氣止痢枳殼兩錢甘草六錢為末每

用沸湯服二錢出嬰童百問若導

愚按

但枳實ハ烈ク枳殼ハ輕ノミ故ニ虛中ニ結積ヲ兼者補中ニ攻ヲ兼テ治セント欲者ハ枳殼ヲ佐トシ行之ニ宜シ實ヲ殼ヲ惟結積ノ輕重ニ從テ用之苟結積

アルニ非ハ勿用之古方瘦胎飲一方アリ之難産ノ主藥トス枳殼兩甘脚兩ヲ以ス此蓋氣分ノ結積壅滯ノ不行故ニ胎産不安者ヲ療ス今人其虛實ヲ辨スルヲナクニ用之及テ害ヲ致者アリ夫婦人胎産道ハ全氣血ノ培養ニ從ニ枳殼ハ破氣劑也氣ノ壅滯實積ニ非ハ妄施用則正氣破テ血モ亦損シ氣血疲不足養胎知産難ノ患ヲ致ス或問參蘇飲敗毒散ニ枳殼ヲ用者ハ何ヤ曰此モ亦行氣下氣用取肺ハ主皮毛風寒邪客皮毛則胸中肺氣コガ爲ニ壅結ス故ニ欬痰ヲ致シ胸背痞急ス枳殼ヲ用テ其壅結ヲ行則欬痰消シ胸背通緩ス且胸肺氣行則紫蘇羌活等ノ發散劑モ亦能解表功ヲ盛ニス蓋裏氣不行則表氣モ亦解ガタシ枳殼ハ裏氣ヲ行ハ即

表ヲ解スルノ助

修治

製法 枳實ト同シ陳久者ヲ良トス。水ニ浸柔穰

トナリト大ナリ 核ヲ去テ切片晒乾復少蒸テ麩ニ拌炒黒ノ

山 子 厄



苦寒 〇 濕火退熱清血治面赤。赤癩紫癩目赤

厥頭痛。諸血症。勞熱。疝氣。瘡腫。折傷。湯火瘡。入厄。酒器也。此實狀

厄ニ似タリ。故號俗或作施。〇 山施。色赤黃。殼輕ノ空也。故設ハ肺ニ入。

仁ハ心ニ入。且穀仁俱ニ中焦ニ入。血分行。是以肺熱。心熱。胃熱。血熱。ヲ

清ス。且經絡及大小腸曲屈熱ヲ清。蓋山厄子ヲ碎。檢則黃色。染手洗

之。黃色皮理ニ透達ノ去。ラ致難。此透達氣ヲ以テ。經絡及大小腸

ノ曲屈隱伏ノ火熱ヲ除。丹溪謂濕痞塊中火邪トハ透達氣アリ。以テ

リ。又曰。其性屈曲下行。能降火。從小便中泄去。トハ山厄子直ニ小便ヲ

利スルニ非ト雖厄。厄子能肺熱ヲ清。則氣化ノ膀胱津液通ス。蓋金肺

ハ水ノ源氣ノ母ニ。膀胱ノ水ハ氣ニ化セラレテ通利故也。或齊下ノ血熱血

滯ニ因テ小便不利者用之。通利ス。冷面赤赤癩紫癩目赤熱痛者ハ

皆血熱ヲ清故也。酒酸鼻ハ屬血熱。厄子能治之。心煩懊懣。不得眠

者ハ肺心ノ熱タレ也。酸棗仁ノ治。不眠。上不同。彼ハ胆虛ヲ主トス。此ハ心

熱ヲ主トス。詳ニ辨スヘシ。黃疸。脾胃ノ濕熱ニ屬ス。濕熱如生。薤花。厄

子。苦寒。中焦濕熱ヲ去テ小便ヲ利也。淋疾。清肺熱。氣化ノ小便ヲ利也。

然厄熱ニ屬セサル者ハ勿用。冷淋症。禁用。消渴。肺心胃。及大小腸熱

ヲ除テ。ニ焦火ヲ瀉也。厥心痛。厥頭痛。熱厥。心。肺。胸痛。心熱。厥

頭痛者用之。熱厥ヲ涼下ス。諸血症。血得寒止。得熱妄行ス。因血熱

吐血。衄血。下血。血痢。血淋等者皆用之。然厄實熱ノ血症ニ非ハ勿用。

又用テ久ク勿レ血症用之久則寒傷血反テ瘀血ノ患アリ勞熱勞症
 初血熱ノ其虛未太者用之清血熱降火既勞極ニ成テ虛太者
 ハ雖熱苦寒劑輕用テ勿レ亦氣清血熱行結氣故也益厄子獨瀉
 火清血熱耳ニ非ス味苦ヲ以テ氣分ノ結爵ヲ行解ス此ガ小便ヲ
 利スルモ氣ヲ行ヲ兼テ也瘡腫諸瘡腫ハ屬火及血熱也然瘡腫未
 潰者用テ清熱既潰テ瘡口未斂者ハ勿用古人謂既潰之後毫厘
 寒藥不可用是也折傷跌撲一切腫痛厄子對浸水白麩同拌塗甚
 效出集簡方湯火瘡厄子末雞子清ニ和シ濃塗出救急方此皆除
 熱清血功ヲ
 致者ナリ

總條
 厄子ハ苦寒心肺胃及大小腸經經曲屈隱伏
 ノ熱ヲ去テ血熱ヲ涼ニ良トス且苦勝濕寒勝
 熱主除
 血症ト雖厄實熱者ニ非ハ勿用陽氣虛冷者胃寒
 症不宜用○久服過服則疑血損陽詳ニレテ用之

附方

酒毒下血若山厄子仁焙末新汲水服一錢出
 聖惠方血不止厄子燒灰吹鼻出易簡方

修治

七歲
 九種

者希ナリ雖厄藥ニ用ニ此ヲ宜トス赤色ニ新不腐不黑不舊者
 ヲ用テ頭尾ヲ切去剉テ能炒透上焦中焦齊ニハ殼俱ニ用テ下焦劑
 ニ去殼用仁洗テ黃水一片ヲ去炒血病ニ炒黑ス心中熱ニ七
 仁ヲ生ニ用ユ肌表ニ殼ヲ生ニ用○大抵通用ニ殼仁俱ニ剉テ炒
 透ス○或甘州水ニ浸一宿焙テアリ○家園者ハ不宜山野自然生
 者ヲ良トス今藥店ニ藥山厄子者ハ舊腐テ色不善ヲ用色善者
 ハ漆物ニ用新ノ色赤尤善コレヲ求テ用藥紅花ノ如シ惡花ヲ
 用漆物ニ善花ヲ用自擇取テ藥家ニ任ハテ勿レ極人畏ニ藥物ニハ
 不善ヲ用テ他ノ無用ノ物ニ善
 ヲ以スルヲ多シ嘆ズベレト

山菜黃



酸鹹辛溫○補腎氣滋精興陽事煖腰膝止小便
 多利逐寒濕痺止月水不定出汗治疝瘕鼻塞耳
 鳴耳聾明目△宗奭曰木審何緣命此名也○山菜黃味酸入肝
 鹹入腎肝腎ヲ温補ス仲景八味丸用之者亦下焦ヲ温補センコトヲ
 欲シ也且酸ハ收澁ノ不泄者也故此酸温ヲ以テ補陽助精血精滑ヲ
 安ニ泄及婦人月水亂泄者老人虛人小便安利ノ不節者皆用之
 止テハ其酸味收澁功ヲ以テ興陽事煖腰膝逐寒濕痺者ハ肝腎ヲ温
 補メ筋骨ヲ温養シ藥性温能勝寒濕也○疝氣ハ寒濕ニテ肝腎ニ屬
 則尤山菜黃ノ所治也瘕瘕ハ血氣ノ結聚タリ何ソ此酸收澁ヲ以テ化
 之乎蓋山菜黃ハ酸鹹ニメ辛性全温ナリ此酸鹹ヲ以テ陰分ニ入リ
 其辛温ヲ以テ血結ヲ劫開ス然疝瘕瘕症獨山菜黃ノ主治スル所ニ非
 ス破結積劑ト合用スベシ鼻塞耳鳴耳聾ハ下焦虛冷ノ陽氣ノ升達
 セザルガ故也山菜黃ヲ用テ温補肝腎則陽氣自升達セ七竅通利也
 山菜黃ノ主治スル所萬端ト雖凡惟肝腎ヲ温補スルニ止ルニ然ニ此
 出汗者ハ何ヤ蓋發散ニ非ス凡汗ハ津ニ生スト雖凡陽温ニ化セシテ
 出者也若肝腎ノ氣虛ニ下焦ノ陽氣温蒸力ナク汗出ガル者凡用
 之補下陽則皮膚津汗ヲ温蒸シ汗出ルニ明目下焦ノ温
 陽補精故也虛寒ノ眼疾ニ用之實熱ノ眼病ニハ用テ勿
 ヲ使トス人乳葵熟地黃人參麥門牛膝
 甘菊ト同ノ精髓不足ノ頭腦骨痛ヲ治ス

之黃蘗
 上合同ス
 畏惡
 山菜黃去核用核ハ及テ腎精ヲ
 滑泄ス○桔梗防風防已ヲ惡ム
 附方
 山菜黃酒浸
 取肉斤破故紙酒浸焙斤當歸兩麝香錢爲末煉蜜丸梧子六
 臨臥鹽酒下益元陽固元陰壯元神延年續嗣至藥也出扶壽方

世ザルガ故也
 山菜黃ヲ用テ温補肝腎則陽氣自升達セ七竅通利也
 山菜黃ノ主治スル所萬端ト雖凡惟肝腎ヲ温補スルニ止ルニ然ニ此
 出汗者ハ何ヤ蓋發散ニ非ス凡汗ハ津ニ生スト雖凡陽温ニ化セシテ
 出者也若肝腎ノ氣虛ニ下焦ノ陽氣温蒸力ナク汗出ガル者凡用
 之補下陽則皮膚津汗ヲ温蒸シ汗出ルニ明目下焦ノ温
 陽補精故也虛寒ノ眼疾ニ用之實熱ノ眼病ニハ用テ勿
 ヲ使トス人乳葵熟地黃人參麥門牛膝
 甘菊ト同ノ精髓不足ノ頭腦骨痛ヲ治ス
 之黃蘗
 上合同ス
 畏惡
 山菜黃去核用核ハ及テ腎精ヲ
 滑泄ス○桔梗防風防已ヲ惡ム
 附方
 山菜黃酒浸
 取肉斤破故紙酒浸焙斤當歸兩麝香錢爲末煉蜜丸梧子六
 臨臥鹽酒下益元陽固元陰壯元神延年續嗣至藥也出扶壽方

治 藥結ニ實山茱萸者未去核者也此ヲ求テ其新味善ヲ擇リ
枝ヲ去リ酒ニ浸柔テ核ヲ去リ緩火ニ燂乾用少モ核ヲ雜用
勿レ藥店ニ去核者アリ此山茱萸ノ馨ノ味ヲ失タルヲ梅醋ニ味ヲ
ツクル者也必勿用

郁李仁



辛甘苦酸平○下氣利小便治水腫臍下急痛
破血潤燥治大腸氣滯秘結破癖消食得酒去

膽結治目張不瞤者礬和龍腦點赤眼△此カ花實香郁ニ樹ハ如
季故號○郁李仁ハ降テ下氣利水要劑也故水腫腹大面目四肢
浮腫ヲ治シ關格不通ヲ療ノ妙劑タル臍下急痛メ水道不通者或
腰臍間ニ膿熱ヲ結者俱ニ用之導泄ス此カ辛苦味ヲ以テ結血ヲ破
テ治痰癖氣結又其甘潤苦泄ヲ以テ大腸氣滯テ大便燥澀ノ不通
者ヲ治ス且辛ハ開苦ハ疎テ消食功アリ凡郁李仁ハ足大陰脾經氣
分藥ニ下氣ヲ以テ要ス利小便亦上氣ヨリ致者也又足陽明胃

手陽明十指ノ結氣ヲ利ス又大小便不通症結氣ニ屬者用之得酒
去胆結トモ此木酸ノ胆肝ニ入ト雖也酸收ヲ以テ速ニ結氣ヲ去ニ難シ
故得酒能結ヲ解テ速也夫且系八胆肝ニ連若人驚恐ノ氣結胆橫
不下故二日張不得瞤者郁李仁酒煮飲テ醉シ覺ニ及テ愈者ハ
隨酒速ニ結去胆橫下テ目能瞤ス此錢ト傳也酒性雄猛胆モ亦雄
猛氣府々同類求テ酒ハ入胆郁李得酒入胆テモ亦速也此古人ノ使
藥詳ク見レ由テ愚按ニ以郁李仁欲破結氣者ハ此ヲ酒製ニ可テシ
歟

毒 津液潤者○大便滑利小便多利者勿用○郁李仁甘潤雖
下利ニ過則津液衰燥ス此惟急則用テ治標義也下多凶陰

附方 腫滿息急不得臥者郁李仁 一大搗末和
製作餅喫入日即大便通氣泄愈出產乳

修治 本綱
製法

以湯浸柔皮ヲ去取仁去尖及雙仁者ヲ除之生蜜二浸一宿ノ際
以研之如膏用ト○本州雁二日曬乾ト此義可也愚按ニ欲破結氣
者生蜜浸晒乾復酒浸潤テ用之○本邦人其儘炒テ中仁ヲ用打テ
如巴豆去油使此製法何書ニ存スルヤ未審トス

五加皮



辛苦溫○順氣化痰行血養精神肝腎堅筋骨
明目去風寒濕逐瘀血治疝氣腹痛痿痺陰痿

囊濕小便餘瀝女人陰痒腰痛脚足疼痛四肢緩弱中風骨痛△
此樹五葉交加者根皮ヲ以テ良トス故號○肝腎二經藥也陽氣ヲ
順之痰結ヲ化シ精血ヲ行ス肝藏血腎藏精肝亦發生陽氣ヲ出腎
亦元陽ノ氣ヲ生ス凡肝腎ヲ補ニ於テ兩辨ヲ存ス血ニ精血ヲ益テ
補者アル肝腎ノ陽氣ヲ溫テ其精血ヲ補者アリ地黃芍藥ノ如バ益
精血神肝腎五加皮補肝腎者ハ直ニ精血ヲ補ニハ非ス肝腎ノ陽氣ヲ
溫養シ精血ヲ補益ス譬水ノ解テ潤滿カ加レ痰結ヲ化スル義亦倣
之或問然則氣ヲ補ト不云何順スト云ヤ曰本經益氣ニ六ト雖凡思
按ニ甘溫辛甘溫者ハ實ニ氣ヲ補益ス此ガ氣味辛苦溫也以溫養
氣以辛苦行氣強補ト云ヘカス故惟順ト云順字中ニ於テ行ト補ト
ノ義ヲ存ス堅筋骨肝主筋腎主骨故也明目目ハ肝竅ニ精血ノ
注處也然凡精血中得溫陽氣化目能物ヲ視故五加皮ノ精血ヲ溫
潤スルヲ以テ明目義アリ去風寒濕辛溫ヲ以テ風寒濕ノ經絡筋
骨間ニ結滯者ヲ驅逐逐瘀血瘀血ノ經絡筋骨ニ在者ハ破除シ
皮肌ニ在者ハ破散ス疝氣寒濕ヲ溫散シ氣血行故也腹痛或瘀血
或結氣或寒濕ニ痛ヲ治ス痿痺補精血溫下焦逐寒溫行瘀血
故也陰痿囊濕小便餘瀝女人陰痒下焦虛冷ノ氣血不順則男莖
痿弱陰囊濕小便餘瀝女人陰戶中痒ヲ致ス故五加皮溫下順

氣血則愈。腰脊痛。腰脊八腎之主。或寒濕。或瘀血滯。腰脊。或腎氣虛冷之痛者。俱用之。脚足疼痺。去風寒濕。逐瘀血。故也。大抵脚足病多屬寒濕。五加皮辛溫。去寒濕。故二脚足病。治之。主之。四肢緩弱。溫潤精血。行氣血。堅筋骨。故也。中風骨變。五加皮辛溫。逐筋骨寒。行血氣。故中風四肢骨節。攣急。治之。或問五加皮補精血。逐風寒。濕功。皆筋骨。在之。肌表。二於。八功。ナキ者。歟。曰。辛溫能行肌膚。故。甄權曰。主。多年。瘀血。在。皮肌。ナ。且能肌表。風寒濕。固結。散之。然。此。肝劑。多。肝腎。八。主。筋。骨。故。其。功。筋。骨。二。專。ナ。リ。ト。ス。肌。膚。二。於。モ。其。功。ナ。キ。ト。ハ。温。補。肝。腎。養。精。血。堅。筋。骨。逐。風。寒。濕。固。結。要。劑。也。故。本。非。ス。經。謂。治。小。兒。二。歲。不。能。行。別。錄。謂。補。虛。羸。久。服。輕。身。耐。老。大。雖。若。過。情。亦。此。

總藥

温補肝腎養精血堅筋骨逐風寒濕固結要劑也故本非ス經謂治小兒二歲不能行別錄謂補虛羸久服輕身耐老

使藥

遠志ラ使トス酒ヲ得テ良○牛膝木瓜黃蘗麥門生地菘苈石斛虎膠骨山藥

上同。濕熱痿痺。腰以下不能動者。治之。續斷。杜仲。牛膝。山藥。巴戟。破故紙。上同。腎虛。寒濕。客。腰痛者。治之。

毒

肝腎熱火

勿用之。畏惡。玄參。蛇。皮ヲ惡。附方。五加皮酒。五加皮以水煎。汁和。糯米。作酒。時時飲之。或加遠志。明也。或五

加皮者。酒飲亦良。治風濕痿痺。壯筋骨。順氣。化痰。補精。髓。延年益老。凡風病。二飲。酒。雖。生。痰。火。惟。此。五加皮酒。八數。不。血。飲。无。害。亦。益。之。諸

浸藥酒。リ。ト。雖。生。惟。五加皮。與。酒能相合。且味亦甘美者。ナリ。修治。五葉。四葉者。根ヲ取テ皮ヲ

ソケテ。少。焙。用。或。酒。洗。焙。葉。作。蔬。食。去。皮。膚。風。濕。



地骨皮。甘淡苦寒。去下焦肝腎虛熱。降肺中伏火。治骨蒸消渴。在表無定風邪。吐血傳尸。齒血。金瘡。

△此枸杞根皮也。其根長地下。行。故地骨名。アリ。地骨皮。ハ。性寒。

肝腎ニ入テ熱ヲ瀉ト雖其氣味甘淡ニ單ニ苦寒ナラス故肝腎虛熱ヲ
 去ニ宜トス世入肝腎熱症ヲ見ハ黃柏知母ヲ用テ地骨皮ノ虛熱ヲ
 去ニ殊功アルヲ知者ナク黃柏知母ハ單ニ苦寒ノ實火者用テ瀉
 スベシ虛熱者ニ至ハ地骨皮ノ甘淡苦寒ニ非ハ治之害アリ時珍深
 此ニ達シ地骨皮ノ去虛熱妙ナルヲ論セリ降肺中伏火ト云此下焦
 肝腎虛熱升テ肺中ニ伏者ヲ云肺ハ氣ヲ主肺中伏火アリ且上
 焦元氣不全者苓連等ノ苦寒ヲ用則火ヲ瀉ト雖反テ其不足
 ヲ損地骨皮ノ甘淡苦寒ヲ用テ治之火ヲ降テ其元氣ヲ伐ノ害ヲ
 免膏蒸勞症腎虛ノ熱熱骨髓如蒸者用之有汗骨蒸尤宜蒸虛
 ヲ主トスルガ故也且骨蒸ニテ肝腎虛ノ肌熱者至亦宜之消渴
 去肝腎熱降肺火故也在表無定風邪無定トハ不定所云肝東方風
 木歳々肝熱狂狂ハ風自内ニ生シ行表外感ノ風邪ニ非ハ地骨皮ヲ
 用テ肝熱ヲ瀉則火退テ風自息者也吐血肝腎虛熱肺中伏火ヲ
 去血熱ヲ涼故也傳尸此能肝腎虛熱ヲ去故ニ勞瘵傳尸病ヲ治
 齒血齒縫ヨリ血ヲ出者地骨皮ヲ煎シ嗽或齒牙ニ醋煎シ嗽金瘡
 治金瘡外科ニ用テ神效アリ男子下疳ニ末ニ搽婦人陰腫ニ煎シ
 洗其外諸癰疔惡瘡ヲ治ス外科ニ用ユ○按ニ本州益精氣ト地骨
 皮ハ腎虛熱ヲ去熱退則精安ヲ以テ堅筋骨トハ肝腎虛熱ヲ去
 則筋骨自
 安ニ取ノミ
總條 去肝腎虛熱降肺中伏火治勞熱骨蒸消渴要
 劑也且因肝腎虛熱致腰痛赤目小便血口舌
使藥 青蒿ヲ佐トシ
毒 肝腎虛寒者勿用○雖去虛熱
 者ヲ治 退熱ニ功アリ 脾肺元氣太不足者補氣劑ト
 合用
附方 地仙散骨蒸勞熱一切虛煩大病後煩熱ヲ治地骨皮
 二 防風 一 甘草炙 半 每貼五錢 生姜五片 水煎服 出濟

和語本草

卷之三十三

三十三

生 **修治** 米泔水ニシテ土氣ヲ洗去心皮ヲ剝取甘草煎湯ニ浸シ一宿
ノ到焙乾テ用○本邦人或云鉄器ヲ忌ム本州ニ此言ナ
シ然カ否ヤ

枸杞子

甘潤平○補精潤肺助氣堅筋骨補虛勞興陽事治消渴
盜乾效嗽明目制火輕身耐老△枸杞與杞二樹ノ名也此

木形枸杞一樹象アリ故名○枸杞子甘潤性平也故不能瀉熱火
止能腎精ヲ補氣ヲ助肺ヲ潤テ虛癯ヲ補ノ要劑也時珍曰此乃
平補之藥上藥性不寒不熱平補ノ良劑也或問吾子謂不能瀉熱
火上然二何制火上云ヤ曰不能退熱トハ時珍言也制火上章宜說
也枸杞ハ不寒不熱平補劑ト雖不能瀉熱火此能補精則水生
ノ制火ノ義ナレト云ヤ王氷謂盛水主制
陽光效是ニテリ章宜實ニ此理ヲ得タリ **使藥** 地黄五味夾門地骨
皮青蒿鼈甲牛膝

同ノ虛勞分内熱或寒熱者ヲ治天門百部枇杷葉ヲ加テ陰
虛肺熱ノ咳嗽ヲ治若脾胃弱者山藥蓮肉車前茯苓ト同

方

枸杞酒生枸杞子五搗碎絹袋盛好酒二斗中ニ浸密封勿漉
氣二七日服勿醉補虛去勞熱長肌肉益顏色肥健人治肝虛

下淚出外

修治

紅潤圓ノ微長味甘粒小二核少者良枝梗ヲ去洗淨
ノ酒ニ浸シ一宿ノ搗爛ノ用粒大二色黯者不應用

○和產枸杞子多ハ粒大味苦此止利大小腸除心熱不可用補劑

枸杞葉

苦甘涼○去上焦心肺客熱除煩去皮
膚骨節間風熱消熱毒散瘡腫明目止渴

蔓荆子



苦辛温○治頭目痛利關節瘡濕痺筋骨拘攣
堅齒長髮治乳癰△古刑杖ニ以荆故字从刑其

蔓蔓生ス故名○陽明胃厥陰肝風熱ヲ散ス能上行ノ頭目風熱ヲ逐

和語本草

卷之二十三

四

頭痛連目腦鳴目淚目赤痛目昏皆風熱二屬者ヲ治關節風熱ヲ
逐テ筋骨拘攣ヲ治散肝風療癩癧風熱客陽明經牙齒動搖腫痛
ヲ治蔓荊子熊脂等分醋調塗髮長黑乳癩初起蔓荊子煨末
酒服一七渣傳蔓荊子八上行ノ頭自風熱ヲ散スルノ要劑ナリ

毒

頭目痛ト雖厄不_レ因風邪屬血虛有
火者勿用○胃虛者服之主痰疾

畏惡

烏頭石

修治

葶ラ去
布袋ニ

入テ罈ア白膜ヲ去打碎用或蒂膜ヲ去テ酒浸蒸ツアリ

茯苓



甘淡平○利小便除濕益脾胃導氣治水腫淋
瀝痰飲泄瀉腹脹煩滿欬逆嘔逆消渴解脇逆

鎮心下結痛好睡者長陰益氣安胎△茯苓舊作伏靈松ノ神靈氣
伏結ノ成故號○茯苓性浮テ升陽也其功ハ降テ下陰也此陽中陰
手太陰肺足太陽膀胱氣分藥也味甘淡ニ水道ヲ利ス内經曰飲

入胃遊溢精氣上輸於肺通調水道下輸膀胱ト飲水入胃即膀胱
ニ行ニ非ズ胃ヨリ出テ輸肺肺ヨリ下テ流膀胱故茯苓ノ浮升ニ從テ

水精輸肺其淡滲ニ從テ水氣降膀胱小便ヲ利スルノ功アリ或問茯
苓ハ利小便要劑也然ニ何東垣好古謂小便多能止之上スルヤ曰東

垣好古謂多トハ頻數義也凡小便多利症虛實ニ辨アリ肺ニ實熱盛
ニ膀胱氣化コ方爲ニ不和ノ小便頻多者ハ茯苓ノ淡滲ヲ以テ肺

熱ヲ道_ニ肺氣ヲ利シ水道ヲ通ノ小便調彼肺虛心虛及清陽陷虛
ノ小便多利者ハ甘溫補氣升陽劑ヲ用茯苓等ノ淡滲藥ノ治スル

所ニ非ズ又問茯苓利小便則津液ヲ燥ハ元素謂益燥然ニ元素東
垣亦謂生津液丹溪謂陰虛者不宜用義皆相反スルニ似ハ何ヤ曰茯

苓利小便除濕則實ニ此燥劑陰虛者ニ難用然生津液ト云所以
者ハ益肺金ハ氣ノ母水ノ源也茯苓淡滲ト雖厄其性浮テ上行シ

肺氣ヲ利ス。氣化ノ津液行故本經治口焦舌乾義アリ。生津液ハ行
津液意也。除濕益脾胃トハ此亦茯苓甘淡能滲濕脾
胃屬土亞濕用之除濕則脾胃氣自全ヲ得。蓋土堅則濕泥ナシ。土
弱則濕泥生ス。故ニ補脾胃六君子湯等ニ用之。除濕去則參朮補氣
ノ力盛也。然ニ東垣補中益氣湯ニ不用之何ヤ。夫益氣湯ハ胃氣不
足ニ清陽下陷症ヲ治ス。故升麻柴胡ノ升提ヲ以ス。此ニ茯苓甘淡滲
降下ヲ用則其升提ヲサメタケテヲ恐レニ導氣淡滲降下ノ導氣水
腫淋瀝痰飲泄瀉腹脹利小便故水腫及小便淋瀝ヲ治除濕故
痰飲ヲ治ス利小便則穀道堅ノ泄瀉止治腹脹者亦利小便除濕
也。煩滿欬逆嘔逆茯苓浮升テ降則胸膈利ニ逆氣下行治煩滿欬
逆嘔逆且煩滿欬逆嘔逆屬痰濕者尤宜之別錄曰開胸府甄權曰
開胃李杲曰導氣上煩滿欬逆嘔逆ヲ治スベキヲ知ベシ消渴中焦濕
熱ヲ本トシ消渴者用之胸膈逆氣心下結痛此皆利小便導氣故逆
降上氣利愈好睡者濕在脾胃中氣倦故ニ睡者用之長陰好言ニ云
依腎邪ト茯苓利小便瀉陰邪去邪則正自長スル義也。然直補陰
者ト覺ベカラス元素曰多服則損人目丹溪曰陰虛者恐未宜
惟陰邪ノ爲ニ正陰不長者用テ邪ヲ瀉之長正ノ義或問仲景ハ味丸ハ
補陰兼補陽者也何茯苓ヲ用ヤ曰此腎膀胱ノ陰邪ヲ伐テ正陰ヲ助
瀉陰助陽義也。夫腎真陽真陰俱不足則陰邪印下焦ニ爵ス。因此真
陰真陽彌不足ス。故茯苓澤瀉ヲ用テ瀉陰邪真陰陽ヲ補助トス。
陰邪トハ邪水ヲ云。丹溪曰八味丸用之者去胸中久積積垢爲搬運
之功爾上益氣茯苓益心脾氣者也。蓋茯苓瀉陰邪除濕者也。陰邪
去則心陽氣伸濕去則脾氣行故益心脾氣功アル直此ガ補ニ非ス。
然元素曰淡爲陽之天ト。是以氣虛大ヲ騰理疎ニ汗自出ガ如ニ至

和語本草

茯苓

卷之十三

一六

ハ勿用之蓋茯苓下雖在淡滲也。淡滲ハ氣ヲ泄シ之狀也且膜理汗空
 之疎利ス故元素曰汗多人服之亦損元氣大入爲其淡而滲ハ是也
 東垣謂茯苓甘以助陽好古曰雖利小便而不走氣上此兩說ハ其
 甘味アルヲ以テ下ト雖在茯苓甘也。淡ノ性トス故彼皆滲瀉等ノ滲
 泄ノ如ク非ト雖在其淡ヲ以テ遂ニハ氣ヲ泄シムニ惟氣虛ノ甚者ハ
 斟酌スベシ或問吾子ガ言ノ如クハ補氣ハ君子湯ニ何ゾ茯苓アルヤ
 曰ハ君子湯ハ中焦ノ補劑也。用之去脾濕且茯苓ハ氣泄ノ義チキニ
 非ト雖在。此ヲ人參白朮甘草ノ補氣補中劑ニ合同則茯苓惟脾濕
 ヲ去耳ニハ氣泄ノ力ヲ致シ不能也。凡瀉藥ト雖在補藥群聚中ニ合
 ハ其瀉力ヲ怒ニスルヲ不能。補藥ト雖在瀉藥群聚中ニ合ハ補力ヲ致
 難故藥ニ定性アリト雖在衆藥ニ合ハ其本性ヲ盡シ不能。且氣性功
 力爲他藥奪テ己ガ本性効力ヲ變スルヲ學者必一隅ニ拘泥スル
 勿レ安胎能氣ヲ導痰ヲ去ガ故ニ此
 功アリト雖在茯苓ノ要能ニハ非ス

總樑

利小便除濕健脾胃導氣
 要劑也人參白朮合

補中氣甘草ト
 合ノ不致燥

使藥

馬蘭ヲ使ス。白朮ト合ノ能燥脾濕助中氣
 甘艸防風芍藥紫石英交時冬ト合ノ五藏ヲ

療
毒

多用則損人目、小便多利者ハ汗多者皆勿用。○陽氣
 虧ノ升麻柴胡ノ升提ニ宜者ハ禁也。○陰虛燥潤者ハ斟酌

ス
畏惡

茯苓ノ赤筋ヲ用フ勿レ誤服積蠱子蠱蟻皆目ラレム。白銀
 ヲ惡牡蒙地榆雄黃秦朮龜甲ヲ畏。水腫及一切酸物ヲ忌

附方

龍液膏堅實白茯苓去皮焙研清酒流末浸浮者ハ茯苓煎
 也去之復焙乾渣内ニ入好蜜二和分銅釜内ニ之重クニ蒸

炭煮一日取出收之空心白湯下二三七解
 煩躁渴一切下部疾皆可除出積善堂方

愚按

茯苓ハ木道ヲ通
 利不雖在猪苓

澤海等ノ性功ト不同猪澤等ハ直ニ下焦水部ヲ通要劑也扶苓ハ性升
功多故ニ水ヲ上肺ヨリ逐テ膀胱ヲ利ス内經謂遊溢精氣上輸于
胞通調水道ヲ輸膀胱ノ功也

修治

白色ニ堅實者良多堀取テ
片斷ニ於テ乾透サズ之財故腐

學者猪澤功ト混同スル勿レ
テ赤色ヲ帶不堪用製法去皮赤筋ヲ除割テ水浸ニ浮者ハ扶苓節
也去之沉者ノヲ用テ日ニ乾焙使不去筋損入且○扶苓ニ抱蕨根

者此此蕨地ヨリ堀取者也此亦扶苓ナリ其地今ハ松林ナリ雖正
上古松林ニリテ人伐枯テ松餘氣地下ニ結テ今日此ヲ得者ナリ或

誤テ謂扶苓ハ獨松氣ノニシテ蕨根亦結成上甚非ナリ

赤茯苓

甘淡平○通水道除濕熱破氣結血結治水腫泄瀉淋
病積癥○扶苓赤白俱通水其功大槩不異惟白者利水

疾速也故ニ水道通利ノ五苓散ニ赤茯苓ヲ用補中四六君子ニ白

茯苓ヲ佐トス○弘景曰扶苓白色者補赤色者利元嘉曰扶苓赤

瀉白補ト然正白茯苓ト雖在直補益劑トハ致難赤者ニ對則補ト云

ベキニ赤茯苓ハ通水氣血ノ結ヲ破瀉濕熱ノ三他於テ其功ノ長不

ルナレ○上古ニ赤白ノ別ナレ中古以來

分別ノ用彼芍藥分赤白養ノ類ナリ

毒

小便多利者○陰虛燥
潤者○氣虛下陷者皆

勿用○補中劑兼用欲除濕者白茯苓ニ宜赤茯苓ハ反テ補劑ノ

害トナル○泄瀉水穀分利ニ於ハ赤茯苓ニ宜白者ハ功力ニ不足ア

リ○他ハ皆白扶

畏惡

白茯苓
ト相同

附方

治痔漏神方赤茯苓去皮
沒藥各二破故紙四石臼

搗成一塊春秋酒浸二日夏二日冬五日ノ蒸熟曬乾爲末

酒糊丸梧子大每服酒用一十九漸至五十九出集驗方

愚按

白茯苓與赤茯苓氣味性功相同惟白茯苓性功八緩和也赤茯苓
性功八疾也白茯苓所治功能疾止之ヲ欲使赤茯苓ヲ用ニ脾
胃ノ助トナスニ於八獨

修治

白茯苓ヲ製ト同皮及筋ヲ去剉水ニ
浮者ヲ除焙使藥店ニ白茯苓ノ腐

テ赤色ニ變者ヲ以テ赤茯苓トス氣性ヲ失テ不堪入藥宜擇用

茯神

甘平○定心志治眩暈健忘止驚悸怔忡多志辟不祥治心
下滿痛○茯神モ茯苓ト一種也茯苓ハ松ノ津氣ノ溢者下

結テ成者也茯神ハ松ノ津氣ノ厚者下テ松根ヲ抱テ疑結者也此
其根ヲ抱則依附ノ義アリ故心志魂魄ノ浮亂者ヲ定收セシムケシ
所治功皆因定神魂也神魂定收則何眩暈健忘驚悸怔忡ノ患アラ
シ且治心下滿痛者モ心志ノ浮テ不定故ニ胸氣亂テ然ヲ療ス又

開心益氣養精神補虛乏ノ義アルモ皆心志ヲ安スルニ因テナリ或問
定心志ニハ茯神利水道ニハ茯苓ニ止マ曰茯苓モ亦微ハ心氣ヲ定

レ茯神モ亦微ハ水道ヲ利スキ也故甄權曰茯神ハ虛而小腸不
利者加而用之上然居此方要能トスレ

畏惡

茯苓ト同

附方

朱雀丸心

氣不定恍惚健忘ヲ治ス茯神二沉香兩半末

修治

茯苓ノ抱木者
也抱松根者畏

酸及他木ヲ抱者ハ不明白色堅實ヲ畏トス皮ト所抱木トヲ去レ

剉水浮者ヲ除焙使神木此茯神所抱木也風寒冷濕在經脈筋骨

攣痛牽縮者ヲ治レ中風偏枯口面喎斜不語心驚健忘ヲ療ス○神

木二乳香錢石器研末每服二錢木瓜酒下名松節散治風毒攣痛

脚氣難走者神木一名○神木八鐵

器ヲ忌石器ニ碎用畏惡茯苓上同

茯苓皮


治水腫。瘡脹。開水道。開膜理。○即茯苓之皮也。故能皮膚
走之。膚表之水。逐之。宜之。○上古赤白。及茯苓神木。茯
苓皮。不別。中古以來。別之。功用。異之。茯苓神木。別錄。始之。出之。

猪苓



淡甘平。○利小便。除濕。治水腫。腹滿。淋病。白濁。
帶下。脚氣。口渴。懊懣。開膜理。△其塊黑。猪屎ノ

苓



如。此木ノ餘氣。上底。三零。落之。成者。故名。苓。八零。義也。○猪苓。八腎

膀胱。入之。利小便。要劑也。主治。皆通小便。除濕。瀉。致。口。渴。懊懣。瀉。

治者。通水。則氣。下。熱。泄。力。故也。小便。淋。澀。之。腹。滿。痛。及。婦人。妊。娠。小便。

澀。腫。者。胎。腫。或。子。治。之。宜。或。問。時。珍。謂。猪。苓。淡。滲。氣。升。而。又。能。

降。故。能。開。膜。理。利。小便。與。茯苓。同。功。但。入。補。藥。不。如。茯苓。也。上。然。吾。

子。前。謂。茯苓。水。ヲ。肺。ヨリ。逐。テ。輸。膀胱。猪。澤。直。通。水道。不。同。上。八。恐。

誤。ニ。似。タリ。請。詳。辨。之。曰。諸。淡。滲。通。水。劑。ハ。皆。一。升。テ。降。二。因。十。リ。然。正。

茯苓。八。升。ヲ。性。ト。ノ。降。ヲ。功。ト。ス。猪。苓。澤。瀉。八。升。モ。性。也。降。モ。亦。性。也。是。以。

茯苓。八。利。水。功。緩。和。也。猪。澤。ハ。通。水。勢。疾。ト。リ。故。直。通。膀胱。ト。云。猪。苓。ハ。

黑。實。ニ。勝。脱。水。底。ニ。達。ス。水。底。ノ。邪。水。ヲ。逐。ベ。レ。澤。瀉。ハ。水。面。浮。溢。ノ。邪。水。

去。ベ。レ。ハ。味。九。ニ。茯苓。澤。瀉。ヲ。用。正。猪。苓。ヲ。所以。不。用。者。モ。亦。此。水。裏。

ニ。達。ス。水。底。ノ。邪。水。ヲ。逐。テ。恐。テ。也。益。猪。苓。ヲ。用。テ。水。底。ノ。邪。水。ヲ。逐。

則。反。テ。真。水。ノ。不。足。ヲ。恐。故。惟。澤。瀉。ヲ。用。テ。水。面。ノ。浮。濁。邪。水。一。片。コ。

逐。ス。太。低。邪。水。ノ。胸。中。ニ。留。者。ハ。茯苓。小。腹。ニ。留。者。ハ。猪。苓。澤。瀉。ノ。主。

治。ス。ル。所。ナリ。本。州。ニ。與。茯苓。同。功。ト。云。者。ハ。一。物。惟。利。水。ヲ。以。テ。リ。其。利。

水。功。ノ。輕。重。ナ。ク。等。ト。云。ハ。非。ス。故。入。補。藥。不。

如。茯苓。ト。此。猪。苓。ノ。利。水。ヲ。烈。テ。見。ベ。シ。

澤。瀉。ヲ。佐。ト。ノ。陽。分。ノ。水。腫。ヲ。治。ス。白。芍。生。地。桑。奇。生。桑。白。皮。

茯苓。琥珀。石。斛。薏。苡。仁。肉。桂。ヲ。佐。ト。ノ。陰。分。ノ。水。腫。ヲ。治。ス。

毒 陰 虛

使藥

白芍。白茯苓。人參。陳皮。白朮。

燥者勿用。小便多利者。陽氣虛者。腎弱者。無濕證者。皆易用。久服多服。則損腎陰。昏人目。

畏惡 鐵器 忌

附方

本艸二附方。一曰。雖在。皆單服。劑常。人。施。へ。キ。ニ。非。ス。故。今。畧。シ。テ。不。述。

修治

皮黑。肉白。不。真。者。良。鐵器。忌。

テ銅刀ヲ以テ粗皮ヲ去。米泔ニ浸テ一宿。剝。乾。用。腐。者。ハ。擇。去。ベシ。或。蒸。晒。テ。用。テ。リ。ト。雖。在。利。水。劑。ニ。通。用。ス。ル。ハ。皆。生。ニ。使。時。珍。曰。猪。苓。取。其。行。濕。生。用。更。佳。

竹葉



甘寒。涼。心。胃。熱。治。胸。中。痰。熱。煩。悶。逆。上。氣。吐。血。嘔。吐。消。渴。熱。在。中。風。失。音。不。語。驚。悸。驚。癇。

頭痛。頭。旋。△竹。八。其。形。ヲ。象。シ。字。ニ。作。○竹。葉。八。足。陽。明。胃。手。少。陰。心。手。太。陰。肺。ノ。熱。ヲ。涼。肺。氣。ノ。逆。上。ヲ。降。ス。蓋。竹。ノ。枝。葉。ヲ。生。ス。ル。中。半。以。上。ニ。在。テ。中。半。以。下。ニ。生。ス。ル。希。也。故。ニ。用。人。上。焦。及。中。焦。ニ。於。テ。功。有。リ。且。竹。葉。ノ。性。ス。ル。下。泄。テ。不。舉。故。ニ。逆。氣。ヲ。降。ノ。功。有。リ。治。欬。逆。吐。血。嘔。吐。消。渴。熱。在。者。モ。皆。胃。熱。ヲ。涼。胸。中。心。肺。ノ。熱。痰。ヲ。清。シ。逆。氣。ヲ。降。ガ。故。也。中。風。失。音。不。語。ハ。熱。痰。爵。胸。中。者。タリ。故。用。之。胸。部。ノ。熱。痰。ヲ。除。也。小。兒。驚。風。六。人。癩。癩。ハ。痰。熱。閉。心。竅。症。也。驚。悸。ハ。痰。熱。爵。胸。中。心。氣。故。也。皆。用。之。胸。部。ノ。痰。熱。ヲ。涼。治。頭。痛。頭。旋。者。ハ。此。モ。亦。痰。熱。ノ。逆。厥。ニ。屬。ス。ル。症。ヲ。療。ス。或。問。元。氣。ノ。益。元。氣。緩。脾。ト。ハ。何。ヤ。曰。竹。葉。ハ。涼。劑。ト。雖。在。苦。寒。者。ニ。非。ス。味。甘。ノ。寒。ト。ス。苦。寒。者。ハ。元。氣。ヲ。損。易。シ。竹。葉。性。寒。ニ。雖。在。涼。熱。味。甘。故。ニ。強。テ。元。氣。ヲ。損。ノ。害。ナキ。ヲ。以。テ。益。元。氣。ト。云。益。ト。ハ。惟。不。損。義。也。補。益。ノ。理。アル。ニ。非。ス。且。緩。脾。ト。ハ。竹。葉。ノ。甘。寒。涼。胃。熱。緩。脾。急。義。也。又。問。然。則。內。傷。氣。虛。熱。症。盡。用。ベキ。者。歟。曰。甘。八。陰。陽。俱。ニ。補。ベシ。然。在。虛。甚。者。ノ。如。ハ。此。性。寒。ナル。恐。ハ。陽。氣。ヲ。害。ス。ル。義。ナク。非。ス。學。者。味。甘。ニ。抱。テ。安。ニ。過。用。ス。ル。ト。勿。レ。

甘。八。陰。陽。俱。ニ。補。ベシ。然。在。虛。甚。者。ノ。如。ハ。此。性。寒。ナル。恐。ハ。陽。氣。ヲ。害。ス。ル。義。ナク。非。ス。學。者。味。甘。ニ。抱。テ。安。ニ。過。用。ス。ル。ト。勿。レ。

總

槲

胸中心肺ノ煩熱痰熱及胃熱ヲ除逆氣ヲ降ス。陰虛熱邪胸中ニ鬱者ヲ涼ニ尤モ宜トス

毒

心肺氣虛甚者○胃

虛ノ世利者俱勿用○

修治

淡竹ノ生葉ヲ取テ拭淨シ頭尾ノ尖ヲ切去其儘用○竹類甚多其

久服過用ハ斟酌スベシ
箏ノ味甘淡者ヲ良トス淡竹箏ノ味甘淡也竹荪竹茹竹瀝ニ用皆

淡竹ヲ以スレ苦竹ハ味燥辣ニテ不宜凡藥○本綱卽部ニ淡竹葉

ト名者アリ利小便治喉痺功ニニ方書ニ淡竹葉トアルニ於テ直ニ

竹葉ヲ云有アリ草部ノ淡竹葉ヲ云者アリ其公方劑ノ治功ニ從テ

辨之誤ヲ勿

竹茹

甘微寒○治嘔吐吐血崩血唾血衄血肺痿五痔腫瘡傷寒勞復小兒癩熱婦人胎動○竹茹功大藥竹葉ト同ハ異也

陽明胃熱解火ヲ降肌熱ヲ除壅熱ヲ通レ血熱ヲ涼ス蓋竹

茹ハ生竹ノ外青皮一片ヲ去テ次ノ第二層ノ青膜皮ヲ用則此中

尖ヲ守人身ニ於ハ肌肉分血脈流行位ナリ故胃熱肌熱血熱ヲ涼

ス且竹皮ヲ剝ニ安シ瀝著セス故ニ能熱邪ノ壅滯ヲ利ス治嘔吐

者ハ解胃熱也治吐血崩血衄血者ハ涼血熱降火也治肺痿欬嗽

五痔腫腸者ハ利壅熱亦降火也傷寒餘熱未除ニ男女交合ノ男

子ハ陰囊腫股痛身寒熱婦人ハ熱衝胸手足搐搦拘急者此勞復

症ナリ治之者血熱胃熱ヲ解故也治小兒癩熱者モ屬陽明熱症

ヲ療ス收胎動者ハ涼血熱也又陽明ノ壅熱ニ因テ狂症ヲ致者ヲ

治ス太低竹葉ハ涼上焦竹茹ハ涼中焦各其氣位ニ從餘ハ倣之知ベシ

毒 胃虛胃寒者○**修治** 熱ナキ者皆勿用

淡竹ノ生者ヲ切取節ヲ除テ外ノ青皮一片ヲ薄コソケテ次ノ

薄青膜一片コソケ用第二層ノ白黃肉ハ勿用淡竹根除煩熱解

丹石毒發熱渴者服消痰去風熱驚悸迷悶小兒驚癇同其煎湯
死婦人產後子宮下脫

竹瀝

甘滑寒○除陰虛熱燥治風痰在胸中及經絡四肢皮裏膜
外者止煩悶消渴癲在治中風失音不語風痙傷寒勞復胎

產金瘡口禁血虛自汗效嗽肺痿○竹瀝八節竹之液汁味甘氣性
寒滑也故陰虛熱燥ヲ治スル要劑トス且此津汁流利滑通ス故ニ

空竅間隙ニ走テ痰熱ヲ逐又此竹ノ皮裏膜肉ノ間ヨリ瀝出ノ液
タルヲ以テ人ノ經絡四肢皮裏膜外ニ達ス其風痰ノ壅塞ヲ宜通ス

風痰ノ外來ノ風ニ非ス陰虛ノ燥熱シ燥熱自風ヲ生レ痰ヲ致者ヲ
云竹瀝甘寒滑除陰虛燥熱故ニ此風痰ヲ治ノ類中風家要藥トス又

手太陰肺經ニ入胸中ノ痰熱煩悶消渴ヲ治ス癲與在此亦風痰ノ
胸印ニ壅ヲ以テリ又陰虛ノ燥熱ヨリ熱ヲ生シ熱ヨリ風痰ヲ生ノ失

空且不語者用之其燥熱ヲ清レ壅ヲ流則風自退又婦人產後及金瘡
家血虛燥熱ノ風痰ヲ生シ口噤身直手足反張者尤宜之或胎動或

胎中胸煩者亦用之丹溪曰產後不礙胎前不損子ト血虛燥熱
者ハ產前產後ヲ不忌ノ用然凡久服過服ハ斟酌スヘシ風痙症多ハ血

虛ノ燥熱シ自風痰ヲ生スレ因傷寒餘熱未解形ヲ動シ腎ヲ勞病
復生者ハ勞復症トス此モ亦陰虛燥熱ニ屬ス血虛ノ自汗者ハ熱

乘陰者ナリ效嗽久不止顔面萎黃名肺痿此亦陰虛ノ燥熱痰爵胸
中症ナリ以上諸症皆陰虛燥熱シ熱痰爵胸中及經筋者也竹瀝ハ

陰虛ノ燥熱熱痰ヲ涼シ胸中及經筋ノ間隙ニ達ス熱痰ノ爵壅ヲ
除ノ要劑也丹溪曰陰虛之病無不用之又曰竹瀝味甘性緩能除

陰虛之有大熱者雷斅曰久渴心煩宜投竹瀝時珍曰竹瀝性寒而
滑大抵因風火燥熱而有痰者宜之章宜曰痰在皮裏膜外者直達

滑大抵因風火燥熱而有痰者宜之章宜曰痰在皮裏膜外者直達

滑大抵因風火燥熱而有痰者宜之章宜曰痰在皮裏膜外者直達

滑大抵因風火燥熱而有痰者宜之章宜曰痰在皮裏膜外者直達

滑大抵因風火燥熱而有痰者宜之章宜曰痰在皮裏膜外者直達

滑大抵因風火燥熱而有痰者宜之章宜曰痰在皮裏膜外者直達

滑大抵因風火燥熱而有痰者宜之章宜曰痰在皮裏膜外者直達

滑大抵因風火燥熱而有痰者宜之章宜曰痰在皮裏膜外者直達

滑大抵因風火燥熱而有痰者宜之章宜曰痰在皮裏膜外者直達

滑大抵因風火燥熱而有痰者宜之章宜曰痰在皮裏膜外者直達

以宣通痰在經絡四肢者。屈曲而搜剔滌藏府之煩熱。又曰竹瀝即竹液。猶人身之血也。以上數者。皆此竹瀝之要能也。學者從之。引其主治。辨之。丹溪曰。竹瀝滑痰。非助以姜汁。不能行。上蓋竹瀝性滑。之痰。流下雖。味甘。甘味者。難運。故姜汁。辛溫。以之。此。甘滑。之開通。走。行。且。竹瀝。性寒也。姜汁。之溫性。以之。制。反。佐。因。用。之。義。存。或。問。竹瀝。性寒也。虛症。之。於。不。宜。用。者。歟。曰。竹瀝。之。製。スル。炭。火。ヲ。以。テ。炙。取。故。二。大。寒。之。ヲ。且。姜。汁。ノ。辛。溫。ヲ。以。テ。反。佐。則。單。二。寒。ノ。純。ニ。セ。ス。此。ニ。味。甘。與。性。滑。ヲ。以。ス。ト。キ。八。虛。熱。ヲ。治。ニ。於。テ。宜。一。ヲ。得。タ。リ。性。寒。ニ。拘。テ。深。恐。一。勿。レ。尤。陰。虛。熱。ヲ。涼。ニ。宜。然。凡。氣。虛。胃。虛。者。八。斟。酌。ノ。安。ニ。輕。用。一。勿。レ。寒。本。氣。虛。不。助。者。也。

使藥

姜汁ヲ得サバ

毒

氣虛胃虛者斟酌スベシ。腸胃虛滑ニ大便瀉者。寒痰濕痰食積痰者皆勿用。熱ナキハ禁用。久服過用不能

修治

淡竹ノ生者ヲ切去節。或四或兩ニ劈開。礮ヲ兩左右ニ立。横ニ竹ヲ架レ下ヨリ炭火ヲ以テ炙ハ竹汁兩切口ヨリ瀝出

ノ。礮器ニ承入テ用。大低竹瀝一盃。生姜汁二匕。加ヲ法トス。此蒙客ノ渡也。○竹瀝ヲ用。六餘藥ヲ煎。服之時。ニ至テ調入用。

荊瀝

甘平。去心悶煩熱。頭風。頭眩。目眩。心頭澆養。欲吐。失音。止消渴。治小兒心熱驚癇。除風熱。導痰。開經絡。行血氣。解

熱。痢。命。人。不。睡。△荊。字。義。ハ。蔓。荊。條。ニ。見。タリ。○此。牡。荊。ヲ。炙。タル。瀝。汁。其。功。ハ。大。低。竹。瀝。ト。同。此。亦。姜。汁。ヲ。佐。ト。能。行。不。凝。滯。或。問。竹。瀝。荊。瀝。二。汁。功。ヲ。同。メ。別。ナキ。者。歟。曰。汗。俱。胸。中。熱。ヲ。除。風。痰。ヲ。去。ノ。要。劑。ト。雖。正。各。其。用。ヲ。別。ニス。丹。溪。曰。氣。虛。不。能。食。者。用。竹。瀝。氣。實。能。食。者。用。荊。瀝。上。延。年。秘。錄。曰。熱。多。用。竹。瀝。寒。多。用。荊。瀝。上。愚。按。牡。荊。實。別。錄。苦。溫。時。珍。曰。辛。溫。牡。荊。葉。別。錄。苦。寒。牡。荊。根。別。錄。甘。苦。平。時。珍。

曰苦竹葉能降辛溫能散降則化痰散則祛風故風痰之病宜
之牡荊葉ノ氣味未記荊瀝時珍曰氣平味甘化痰去風爲妙藥上
田テ考ニ荊瀝氣味甘ノ微苦辛寒者也竹瀝ハ甘滑ニ寒者也蓋
牡荊ノ實葉根ノ氣味上荊ノ瀝汁所治功トヲ以テ通考スバ甘ノ微
苦辛寒者也此微苦辛味ヲ兼ニ非ハ去風功ヲ致シ不能彼除風熱
開經絡行血氣者辛ハ散苦ハ推トヲ兼也然則荊瀝ハ散推ノ義ヲ合
テ治心胃煩熱風熱風痰者也竹瀝ハ甘淡滑寒ヲ治心胃煩熱風
痰者也故丹溪謂氣虛不能食者用竹瀝ハ荊瀝ニ散推義ヲ合テ
其氣虛ヲ重虛セシメテ也氣實能食者用荊瀝トハ荊瀝ハ散
推義ヲ合則氣實者ニ非ハ不宜用之示セリ氣虛與氣實俱胃ヲ主
ト云不能食者ハ胃虛熱能食者胃實熱タレ也又涼熱功竹瀝ヲ勝
ト去風功荊瀝ヲ勝ト入涼熱功ハ反テ竹瀝ニ不及延年秘錄熱多
用竹瀝寒多用荊瀝トハ涼熱功ハ竹瀝ヲ勝トハ荊瀝ノ劣ニ云荊瀝ハ
甘辛苦寒劑タリ何寒ヲ温ノ理アラセヤ秘錄云寒ハ熱ノ少ヲ推者
乎或謂秘錄謂寒ハ舊風字ナルベシ寒ハ傳濕誤ト此亦可也或問
荊瀝ハ風痰熱ノ妙藥トス此六淫ノ風邪客症歟曰不然熱火ニ因
テ藏府中ヨリ所生風也曰然ハ前ノ竹瀝ニ所謂同者乎曰同ノ少
異アリ竹瀝所治風熱風痰ハ熱燥ハ勝テ風ハ輕シ故竹瀝ノ甘淡滑寒ニ
風愈荊瀝所治風熱風痰ハ風ハ勝テ熱燥ハ輕シ故甘苦辛寒ノ荊
瀝ヲ用テ風ヲ散シ痰ヲ推熱ヲ解入吾子謂荊瀝ニ散推義ヲ合トハ
恐ハ新說ニ似タリ詳ニ其據ヲ示ハ可ナラシ曰外臺秘要赤白下痢五
六年者荊瀝每日服五合肘后方治目中卒痛燒荊木取黃汁點之
深師方治濕癩瘡癬荊木燒取灰日塗之ト此等治皆甘寒取ヲ致
シ不能苦辛最推義アルヲ以テ痼熱ヲ開熱痛ヲ利シ腫瘡ヲ散入

學者深察詳考

テ愚言ヲ詳テ勿レ

使藥

其功ヲ盛ニス 毒 氣虛不能食者○ 胃虛者○中風無

熱者ハ 畏惡 石膏

附方

真此心胃ノ熱及風痰ノ實ニ屬者ニ用ノ 喉痺喉瘡腫ニ荆瀝細細嚥之出千金

法也通

修治

荆瀝ヲ取ノ法ハ竹瀝ノ製ト同シ新ニ生牡荊ヲ採一尺 餘ニ截テ磚ヲ兩左右ニ並立テ荊ヲ架以火灸レハ兩

切口ヨリ瀝汁ヲ磁器ニ承盛或ハ荊木ヲ二四寸長ニ截束テ瓶ノ中ニ

入ヌ一ノ海ヲ以テ口ヲ合固ノ糠火ノ中ニ熨シ燒バ汁瀝テ瓶ノ中ニ下

名ル此亦妙法也凡荊瀝一杯ヲ用ハ姜汁一七フ加テ可也○諸家

本草ニ牡荊ヲ説テ亂雜ノ不正圖經説ヲ得タリトス圖經曰牡荊俗名

黃煎是也枝莖堅勁作科不作蔓葉如芭麻更疎瘦花紅作穗實細

而黃如麻子大或云即小荊也

天竹黃

甘寒 治小兒驚風天中風痰癰失音不語癰疾一南

經ヲ涼心氣ヲ鎮風熱ヲ去痰癰ヲ豁テ小兒驚風潮熱ノ要藥トス

他ニ於テ用フ希也竹黃ハ大竹ノ津氣結聚テ成其氣味刃用大槩

竹瀝ト同氣性和緩ニ小兒家ニ宜小兒驚風與大人癲癩症治相

同俱心熱ニ屬シ心氣不鎮風痰心胸ニ壅塞者也故竹黃主之天

弔ハ天鈞也小兒壯熱ノ眼ヲ翻手足搐搦手ノ魚ノ鈞ニ上カ如シ此亦

痰熱ノ心胸ニ壅者也故竹黃治之又小兒心氣痰熱ニ劫レテ客

作者ヲ治ス章宜日除小

毒

驚癇症無熱者勿用○ 久用ハ寒中ノ害アリ

附方

治小 兒驚

熱天竹黃 雄黃 牽牛末 研勻麪糊

九粟米大 每服五丸薄荷湯下 錢乙方

修治

其儘用○清ヨリ 來者多ハ偽者也

厚地曰今人多燒諸骨及蛤蚧等雜之ト云類也或本邦藥店ニ竹
 外ノ節間ニ所粘著黃粉ヲ刮聚テ竹黃トス此亦誤也大竹ノ内ニ
 竹津自然ニ結成ノ黃土ノ如ク竹内ニ著テ片ヲ成者ヲ以テ靛ト
 ス碧色者中品黑色者ハ下品不堪用也

廣益本州大成卷之十三終
 廣益本州大成卷之十四 附錄
 洛下 法橋 岡本爲竹一抱子 撰

○木之部

松脂苦甘温○除胃中伏熱強筋骨利耳目潤心肺治婦人癩血
 下安五藏治咽乾消渴風痺从肌煎膏生肌肉止痛排膿抽風貼諸
 瘡白禿疥癬膿爛塞牙孔殺蟲久服輕身延年不老

松節苦温○治筋骨間風濕病療脚弱脚痛燥血中濕煎水合煎或
 燒灰指治風蟲牙痛治筋骨痛燥焦用治

松葉苦温○治風濕瘡生髮安五藏去風痛脚痺灸骨凍瘡風癩細
 切搗屑丸服不能延年去惡疾

松花甘温○潤心肺益氣除風止血功勝皮葉脂多服發上熱病
 松木皮治瘡口不合生肌止血治白禿湯飲或煎或煮

杉辛微温○煮湯洗膝瘡疥洗脚氣腫服心腹脹痛風毒腎積
上氣治小兒前陰赤腫痛皮爛老杉燒灰入輕粉清油調傳治
黑爛老杉木節燒灰調麻油隔箬葉絹包貼愈○杉木皮燒存性研
傳治金瘡血出及湯火傷或入雞子清可也○杉葉同川芎細辛煎酒
合漱治風蟲牙痛○杉子治疝氣痛一歲一粒燒研酒服
箇桂皮辛温○益精神和顏色治百病為諸藥先聘通使久服輕身
不老△時珍曰箇桂土治與桂心牡桂迥然不同上今藥家二皮薄卷
味少官桂上呼此箇桂也

天竺桂皮辛温○治腹內諸冷血氣脹痛破產後惡血治血痢下血
補暖腰脚功與桂心同方家少用
月桂子辛温○治小兒耳後月蝕瘡研碎傳

木蘭皮苦寒○治皮膚中大熱去面熱赤熱酒飲惡風癩癩陰下
濕明耳目瘡中風傷寒瘡疔水腫酒疸利小便治重舌去臭氣

降真香辛温○燒之辟時疫它含怪異小兒帶身辟邪惡氣用節療
金瘡折傷止血定痛消腫生肉可代乳香血竭

楠木辛苦温○煎服霍亂吐下不止洗轉筋足腫水腫自足起○皮
苦温煎服霍亂吐瀉小兒吐乳暖胃止氣

樟木辛温○治惡風中惡心腹痛霍亂腹脹宿食不消常吐穢臭水
酒煮服無藥處用之煎洗脚氣痛風疥癬作履除脚氣

鈎樟根皮辛温○治金瘡止血調經傳之磨服治霍亂煎服腎積脚
氣水腫浴瘡癩疥癬或研傳○垂葉置門辟疫氣

懷香根苦温平○治頭癩腫毒穢末麻脂調塗七日愈落
必粟香辛温○斷一切鬼惡邪煎服或燒香殺蟲魚

楓香脂辛苦平○活血生肌止痛解毒治一切腫瘡金瘡外科要藥

治吐衄血前浴浮腫風痺燒過指牙治齒痛水無牙疾○木皮辛平

○治水腫下水氣止水痢煎服

質汗甘温○消瘀血治金瘡折傷瘀血內損婦人產後諸血結腹痛

經閉內冷不下食竝以酒消服或傅補肌肉

詹糖香苦微温○治風水毒腫去惡氣傳尸惡核惡瘡和胡桃青皮

搗塗髮令黑如漆

兩桐淚鹹苦大寒○除熱治口齒要藥治風蟲牙痛牙宣露咽喉熱

痛走馬疳去心腹煩滿水服吐愈入骨軟一切堅治瘰癧非此不

能除殺火毒疔毒取延今謂延藥

青檀苦寒○除煩熱治癩疥酒疸目黃洗赤眼湯火漆瘡

小蘇苦大寒○治口瘡疔毒殺諸蟲去心腹中熱治婦人血崩

檉柳苦寒○煎洗瘡疥風疽白禿不生髮椿桃柳葉湯汁燒塗小生

○木白皮根皮苦温○治口鼻疔毒殺諸蟲傳尸蟲治赤白痢

痢下血性地榆止女子血崩產後血不止赤白帶濁瀉血不止滑腸

不止治前痢縮小便利溺澀止精滑夢遺燥下濕去肺腎陳積痰○丹溪曰

椿根白皮性涼而能澀血凡濕熱為病瀉痢濁帶精滑夢遺諸證無

不用之又曰有除濕實腸之力痢疾帶氣未盡者不可遠用時珍曰

椿皮色赤而香性皮色白而臭多服微利入蓋椿皮入血分而性澀

樗皮入氣分而性利不可不辨其主治之功雖同而瀉利之效則異

正如茯苓芍藥赤白頗殊也凡血分受病不足者宜用椿皮氣分受

病有爵者宜用樗皮下椿樗八一種中分別之香為椿臭為樗其功

亦異也椿皮八止血實大腸樗皮八利氣及小腸俱脾胃虛寒腎陰虛燥

者勿用椿芽久用動風神昏血氣衰猪肉熱麪同食八中滿壅經絡

○丸散二入用不入煎湯或椿皮煎洗瘡疥可也東二向根之取洗淨之

粗皮去膜皮用剉焙使實腸止血離浸焙生用性通利和俗山
茶花以椿樗スルハ誤也

梓白皮苦寒○去熱毒勞蟲瘡目疾吐逆反胃温病壯熱胃嘔煎洗
小兒壯熱一切瘡疥皮膚癢癢熱瘡或癩傳

楸木白皮苦小温○消食益腸下氣殺勞蟲皮膚蟲治上氣欬吐
逆煎膏傳惡瘡疔腫癰腫疔口吻瘡除膿生肉長筋骨外科要藥

也○葉搗傳瘡腫煎洗膿血癰潰內有刺不出者葉重貼冬用
也葉同之功亦

桐葉苦寒○消腫毒生髮煎手足腫浮○木皮治腎積氣病五淋
殺三蟲沐髮去頭風生髮膏金五痔惡瘡小兒丹毒

梧桐木白皮燒研和汁塗髮髮致黑治腸痔○子甘平搗汁塗拔
白髮心生黑燒存性研和子小兒口瘡

罌子桐油甘微辛寒○吐風痰治喉痺欲命病者吐以水和桐油搽
入喉內探吐或桐子研末吹入喉內取吐塗疥癬蟲瘡毒腫鼠咬毒

一切惡瘡癰瘡湯火桐油燈熨著頭烙風熱爛眼○桐油吐入
得酒即解

海桐木皮苦温○行經絡通病所入血去風殺蟲治霍亂中惡赤
白久痢久瀉腰脚不逐頑痺腫痛除疔蟲蟲牙痛疥癬或煎最
或合洗目除膚赤

刺桐花止金瘡血殊效

檀皮根皮辛平○和榆皮食醋殺根皮塗疥瘡殺蟲
葵菜枝葉甘苦平○殺三蟲下氣煮汁和小兒甚美

無患子皮微苦平○漸垢研喉中喉痺立開洗頭去風洗面
去面黧眼目○子中白辛平○燒研惡邪氣燉食去口臭

桐木白皮
桐子
桐油
桐葉
桐花
桐皮
桐子
桐油
桐葉
桐花
桐皮

藥華苦寒決明○治目痛淚出目腫合黃連煎洗目赤爛

溲蘇得子辛溫○溫中去冷補腰腎可染髮令黑

柳木皮苦大寒○治時行頭痛熱結在腸胃去眼中赤血夏日煎飲

去熱俗煎取療水氣斷痛血安寧止壯婦腹痛山樗皮性平去熱毒

風治腫毒

柳華苦寒○治風水黃疸面熱黑○柳實緊治痲疥惡瘡金瘡潰瘍

通膿血止血療濕痺四肢攣急膝痛子汁治渴○柳八葉長狹青綠

色枝長軟也春初黃十九葉生春晚三葉長成後花中二細黑

子ヲ結云花落テ絮ヲ出ス白絮ノ如シ風ニ因テ飛取收テ灸瘡ニ貼

テ良○葉煎洗惡瘡痲疥馬疥疥癩煎膏續筋骨長肉止痛服心腹

內惡血天行熱病傳九消蒸等熱白濁服金石入發大熱悶湯火瘡

毒入腹熱悶及下瘡下水氣○枝根白皮氣味去風消腫止痛治瘰

熱淋病黃疸白濁煎洗風腫痺或煮酒飲者酒漱齒痛嗽枝葉為牙

枝○柳膠治惡瘡

煙柳甘鹹溫○枝葉消痞積解酒毒利小便○幹小枝弱皮赤葉細

二絲ノ如ク沙地水旁ニ生ス刺之易生者也

水楊枝葉苦平○散濕熱治久痢赤白主癰腫疽毒○疽瘡數日ヲ

不起痘頂陷漿水不行或風寒ニ阻ル者水楊葉枝若無葉枝ヲ用

テ煎湯溫浴ス冷ハ添湯浴良久ノ燈ニ照見ハ膿起ノ暈結アルハ漿水行

ノ兆也如漿不滿再浴ス若氣力弱者ハ浴頭面手足如屢浴スレモ不起

發ハ氣血敗也強テ浴スル勿レ此法湯暖ヲ透達セシメ和暢爾蒸ノ氣

血通徹シ暖氣ニ隨テ起發行漿ス或内氣血ヲ助藥ヲ服メ浴ト相兼

亦尤可也○木白皮根治金瘡痛乳癰諸腫疽瘡生搗貼熱瘡即火

者水楊八葉圓闊ノ赤枝短硬者也

白楊木皮苦酸冷○治風毒脚氣腫痛四肢緩弱不隨風毒在皮膚
中癢腫游易瘰癧去撲損瘀血在骨肉間痛不可忍皆煎酒浸酒服
煎膏續筋骨煎服止孕婦煎醋含漱止牙痛煎水入鹽含漱治口
瘡煎酒消癭○銅刀去粗皮用○枝治腹痛口吻瘡○葉煎含漱
治牙痛搗頻傳治骨疽○白楊木高大葉圓似梨肥大有小四面青光
背甚白鋸齒了

扶移木皮苦平○去風活血治脚氣痺疼腕損瘀血腫痛○去粗皮
取白皮炙酒浸服和五木皮煎湯洗脚氣五木八桑槐桃楮柳也

松楊木甘鹹平○治折傷破瘀血養好血安胎止痛生肉○皮治水
痢不問冷熱濃煎含黑服

檉榆皮甘寒○下熱除積水道令人睡治小兒解熱
烏木甘鹹平○解毒治霍亂吐利研末溫酒服

樺木皮苦平○治諸黃疸冷飲治傷寒時行熱毒瘡豆瘡乳癰因
熱小便短小涂黑髮髮○脂燒之辟鬼邪

緜木甘溫○治風血羸瘦補腰脚道陽道宜浸酒飲
檉木辛熱○治產後惡露衝心癢瘕結氣赤白帶下血塊疥嗽為枕
令人頭痛性熱故也

櫻欄笱子花苦滑平有毒○益大腸止瀉痢腸風崩血帶下養血○
藏器曰有小毒乾人喉未可輕服笱曰有大毒不堪食○皮止血

吐血破癥治腸風下血赤白痢崩血帶下燒存性用治金瘡疥癬生
肉止血○櫻灰澁失血過多瘰癧已盡者用之佐亂髮更良

檉木白皮辛平○大腹水病煎膏平且空心飲下氣水從小便出愈
烏白木根白皮苦微溫○利水又利大便治水結腫滿癥積頭風去

脚足濕癢解蛇毒氣虛人不可用之利水通腸功勝大戟○葉食牛

馬六畜肉生疔腫欲成者搗服自然汁得利大便愈冬用根○相油

甘涼○塗頭黑髮塗一切腫毒瘡疥服一合令人下利去陰下水氣

炒子作湯亦可也

海紅豆微寒○治人黑皮黧花癬頭面遊風宜入面藥及溲豆

相思子苦平○此人通九竅去心腹邪氣止熱悶頭痛風痰瘴癘殺

腹藏及皮膚內一切虫中毒研服即當吐出

豬腰子甘微辛○治一切瘡毒毒前傷研細酒服并塗之

石瓜苦平○治心痛煎湯洗風痺脚氣

柘木白皮東行根白皮甘温○治婦人崩血血結瘕疾小兒驚口重

舌煮汁釀酒服治風虛耳聾補勞損虛羸腰腎冷夢與入交接洩精

者煎洗目令明

又柘刺苦小温○治老婦血瘕男子痲痺除痞痞和稜州馬鞭州作

煎煉膏病在心食後在臍在心服當下惡物

楮實甘寒○治陰痿水腫益氣充肌明目助陽氣補虛勞治肝熱目

翳壯筋骨健腰膝說下口雖久服骨軟之痿致入○葉甘涼○

治小兒身熱食瘦作浴湯治惡瘡生肉刺風身痒瘰癧血不止搗汁

服去四肢風痺赤白下痢利小便去風濕腫脹白濁疝氣瘰癧

○枝莖治癰癧疔前洗搗汁飲治小便澀○樹白皮甘平○豕木利

小便治水腫氣滿喉痺水腫短氣咳嗽煮汁釀酒飲為散服治下血

血崩○皮間白汁甘平○療癰瘡傳一切毒蟲咬

桐橘葉辛温○治下痢膿血後重喉癭消腫導毒○刺治風蟲牙痛

煎含○橘核治腸風下血不止同檇根白皮等分炒研每服一錢皂

熬子湯服○樹皮治中風強直不得屈伸剉酒浸一宿每日温服

白棘辛寒○治心腹痛癰腫潰膿止痛療男子虛損陰痿漏精補腎

氣益精髓○**鍼**療腰痛喉痺不通治尿血○**枝**燒油塗髮除垢

○**花刺**苦平○治金瘡內漏○**實**治心腹痿痺除熱利小便○**葉**治

腫脹瘡瘍傳或曬研麻油調傳同煎者白又若水煎服

雞核仁甘微寒○明目療目赤痛淚出目腫背爛眼目要劑也治心

腹邪熱心下痰結痞氣血生用治睡熟用治不睡○湯浸皮尖

去一兩二片煮之研膏之使或紙二包打去油用

胡頹子酸平○止水痢○根煎洗惡瘡疥煎服吐血不止喉痺痛塞

煎酒灌喉○**葉**治肺虛氣喘咳劇者葉焙研米飲服一錢氣虛甚

合入參○**胡頹子**寒熱病不可用

金櫻子酸溫○益氣固精治脾泄下痢止小便多利遺精久服耐

寒輕身○**化**止冷熱嘔吐寸白蟲和鐵粉研勻拔白髮塗之生黑髮

○**葉**嫩葉研爛入山鹽塗瘡腫頭洩氣又金瘡出血五月五日同

桑葉等葉等分陰乾研末傳之血止血合名軍中一念金○**東行根**

治寸白蟲一二兩入糯米三十粒水一升煎五合空心服須臾寫

神驗其皮炒用止瀉血崩中帶下滑痢煎醋服化骨硬

女貞子苦涼○治寒熱癰腫水腫腹脹下血疝瘕瘰癧魚陷治疥癬

有蟲○**實**苦平○補中安五藏養精神除百病強陰健腰膝變白髮

明目○**葉**微苦平○除風散血消腫定痛治頭目昏痛風熱赤眼諸

惡瘡腫疔瘡潰爛口舌瘡舌腫脹

冬青子木皮甘苦涼○浸酒去風虛補肌治痔○**葉**滅癩痕殊效

狗骨木皮微苦涼○浸酒補腰脚○**枝**葉燒灰淋汁或煎膏塗白癩

瘡疥苦甘溫寒○去鬼惡邪破瘀血治中惡心腹毒痛女子血崩經

閉癥結產後血咬腹痛帶下殺藏蟲寸白蟲能落胎去惡邪療婦人

血氣要藥也孕婦禁服

山蒼葉酸清微甘○治久痢止渴殺蠱山蒼葉二十片同老姜麩水蒸熱洗爛弦風眼

檉木苦平○破產後惡血者汁服葉煎洗瘡癬搗碎封蛇蝎

南燭枝葉苦平○止泄除睡強筋益氣力長髮髮益顏色

瘦疏辛微寒○治皮膚中熱除邪氣止遺瀉利水道除胃中熱下氣

○漏蘆ノ使トス

楊樞葉苦寒○治疽癰煎湯洗之

石南葉辛苦平○養腎氣治內傷陰衰利筋骨皮毛療脚弱風痛五

藏風氣除熱殺蟲浸酒治頭痛女子不可久服冷男思五加皮ノ使トス

牡荊實苦辛温○除骨間寒熱利男氣止欬逆下氣治濕痰白濁得

相實青柏木療風炒焦ノ使トス未飲服治心痛及婦人白帶用半升炒熟

入酒一盞煎ノ使トス一沸熱服治小腸血氣甚效浸酒飲治耳聾防已ノ使トス

風濕痛不止為蒸藥ノ使トス根苦辛温○此藥祛風風痰要劑也解

肌邪發汗治心風頭風肢體諸風○荊莖治熱瘡ノ使トス爛同荊芥葉

煎水漱風牙痛治青盲內障

藥荊子辛苦温○治大風頭面手足諸風癩癩在經濕痺寒冷寒痛

四肢不遂通血脉明ノ使トス石膏ノ使トス

石荊燒灰ノ使トス林汁浴頭生長髮毛

紫荊木皮苦寒○破瘀血消腫毒下五淋通小腸解諸毒治喉痺在

血行氣治婦人血氣疼痛經水凝滯

木槿皮根甘凉滑○潤燥活血止腸風瀉血痢後熱湯赤白帶下腫

痛疥癬洗目ノ使トス明炒用令人得氣治痔瘡脫肛煎薰洗○花利小便

除濕熱消瘡腫治腸風赤白痢並焙入藥

扶桑葉花甘平○治癰疽腫

芙蓉葉花微辛平滑○清肺涼血散熱解毒治一切瘡毒癰腫排

膿止痛外科要劑也

山茶花○治吐血血腸風下血花紅者良用麻油調塗湯火○子研

末婦人髮腫搽之

蠟梅花辛温○解暑邪生津液

伏牛花苦甘平○治風濕瘰久痺四肢拘攣骨肉疼痛風眩頭痛五

痔下血根葉枝治一切腫痛風疾焙末温酒下

密蒙花苦微寒○治青盲翳障赤腫眩淚羞明赤脉小兒疳氣痘毒

攻眼入肝經化氣血潤肝燥眼目要劑也

木綿白綿布甘温○治血崩金瘡燒灰用○子油治惡瘡疥癬能催生肉

柞木皮苦酸澁平○治黃疸燒末用治瘰癧難產利竅能催生肉

治癰腫腫毒

黃楊木葉苦平○治難瘡又治暑月生瘡搗爛塗之

不凋木苦温○調中補裏治腰脚却老變白

青子木甘微鹹平○治折傷血內留續骨髓絕止痛安胎

木天蓼枝葉辛温○治癰結積聚風勞虛冷細切釀酒飲

小天蓼甘温○治一切風虛羸冷手足疼痛浸酒煮汁服○子苦辛

微熱○治賊風口面暈斜冷痲痺氣壅女子虛勞○根治風牙痛

放木甘温○治一切風血理腰脚浸酒服輕身不老

接骨木甘苦平○續筋骨折傷治產後惡血一切血不行或不止佳

根皮吐痰飲水腫痰瘰瘰癧器日搗汁吐入不可多服外科要劑也○葉搗汁吐痰瘰

靈壽木根皮苦平○止水

白皮辛平○治水腫下水取根搗碎冷病者坐氣水即下又能

爛人牙有牙虫內托中印爛落

木麻甘温○治老血婦人經閉風氣癱瘓癢痕久服令人有子

大空根皮苦平○殺三蟲作末和油塗髮蟻虱皆死

琥珀甘平○利小便消瘀血治五淋癥結產後兒疝痛安魂魄辟鬼

那合金瘡清肺明目澀緊燥濕

璽甘平○補心安神破血生肌治癩瘕磨瀉目翳小兒帶之辟惡邪

雷丸苦寒○殺蟲逐毒氣除胃熱逐鬼邪赤者殺人白者善○今人以大風

子為雷丸者甚誤也

桑上寄生苦平○治腰痛小兒背強癰腫充肌堅髮齒治女子崩血

產後餘疾下乳汁療金瘡助筋骨益血脉治孕婦漏血不止固胎

○實甘平○明目輕身益神鐵器并火ヲ忌ム○或サハノコレカケト云者ヲ以テ

桑寄生トスハ誤也

松蘿甘平○平肝邪去寒熱利水道去痰涎治女子陰戶寒腫痛頭

痛頭瘡癩癭怒氣令人得睡

楓柳皮辛大熱○治齒痛積年痛風久治無效者蒸酒服

桃寄生苦辛○治小兒蠱毒腹內堅痛面目青黃淋露骨立

柳寄生苦平○治膈氣刺痛搗汁服一盃

占斯苦温○治濕痺寒熱瘰疽惡瘡除水治堅積血癥經閉無子者

小兒寔不能行腹痛去脾熱洗手足水爛

石刺木根皮苦平○治產後餘血結瘕血

篋竹葉苦寒○治欬逆上氣筋急惡瘍殺小蟲除煩熱風瘕喉痺嘔

吐煎湯熨霍亂轉筋

苦竹葉苦冷○治口瘡目痛翳目利九竅治不睡止渴解酒毒除

煩熱發汗療中風瘖瘡殺蟲和雞子白塗一切惡瘡

苦竹根煎湯益氣止渴補虛下氣解毒

甘竹根煎服安胎止產後煩熱

苦竹根下心肺五藏熱毒氣

苦竹茹下熱壅煎服止尿血

苦竹茹治勞熱瀝治口瘡目痛明目丸竅治疔瘡同功淡竹

慈竹瀝療熱風和粥飲服○釋治小兒惡瘡燻末和油塗

竹實通神明益氣輕身

山白竹燒灰治瘰癧腐爛

爆竹辟妖氣山藥

仙人杖甌冷○治疔氣嘔逆小兒吐乳大人吐食反胃小兒驚癇夜啼又療痔病下魚骨每食肉

鬼齒苦平○治中惡心腹痛下骨瘦燒存性入輕粉以許油調塗小兒頭瘡治尿血

淮木苦辛平○治久咳上氣虛瀾女子陰瘡赤白帶下難產濕痺補

中益氣淮木八古城中木也一名八城裏赤杜

城東腐木鹹温○治心腹痛泄瀉膿血鬼氣心痛塗喉咬手足攣

痛不仁不隨煎瀝痛處城東古木ノ土中ニ在テ腐爛者也或古城東墻上ノ中ノ腐木也

東家雞棲木治失音不語燒灰水服一升效

舌刺木治鬼魅傳尸瘟疫鰥鰥神崇以太歲所在日時當戶燒薰入

薰杖蒼冷風火

廁等治難產霍亂身冷轉筋中惡鬼氣血於牀下燒取熱氣散上此

物雖微其功可錄門下卑人小木ヲ以テ大便後ノ肝

古欖板治鬼氣中惡心腹痛背急氣喘惡夢悸常為鬼神所祟者水

及酒和東引桃枝俱煎服當得吐下治小兒夜啼古塚中棺木也杉木

九良千歲者通神

和語本草

震燒木治火驚失心煎湯服掛門戶大辟火災電擊擊

河邊水令人飲酒不醉五月五日取七寸投酒中一偏飲之必能飲也愚按此河邊堤坊ノ木ナルニ蓋水流ヲ防ノ義アリ故服之不醉數

○新增附錄

雷左良之木根○治小腸疝氣寸白蟲五積六聚血塊破血利氣殺

激滯

紀牟也宇一名海椰子油用實詳義八菓部二見夕リ

地利女年天伊古木液ノ地下ニ結成者也○治積聚腹痛寸白蟲

波不天古不羅治疝氣腹痛未塗蟻蟻蟻一切毒咬傷帶身辟

諸蛇蟲毒氣

廣益本州大成卷之十四 附錄終

廣益本州大成卷之十五

洛下 法橋 岡本爲竹一抱子 撰

○果部



杏

甘苦温○治欬嗽上氣喘息喉痺驚癇心下煩熱急滿痛大腸氣秘瘡腫頭面風氣脚氣殺蟲

解錫毒消食積去痰潤聲音△杏字ハ子ノ木枝ニ在形ヲ象○杏仁

潤燥下氣散結解風諸主治皆此ヲ主ト致ス欬嗽上氣喘息喉痺

此皆肺氣ニ屬スル病也杏仁入手大陰肺肺系ハ呼吸道路ヲ肺燥

則溢テ咳喘入肺ハ諸藏ノ上ニ在テ上逆氣ハ先此ニ入肺ハ皮膚ヲ主

風化ハ熱燥ヲ致ス是以逆氣在肺又風熱燥從皮膚犯肺皆咳喘ヲ

致ス杏仁潤燥下氣解風故治欬喘上氣喉痺或問甄權曰發汗元

素日除肺熱上然則杏仁ハ發散涼熱劑也九日不然杏仁甘苦温也

肺主氣合皮膚肺氣利スレ皮膚氣利入杏仁甘苦温肺氣ヲ利ス故
二皮膚氣亦利シ發汗然正獨用テ發汗ノ功ナシ輕發劑ニ合入ノ此能
了且除肺熱ト杏仁下氣潤燥則肺熱自除此方實ニ熱ヲ解ニ非ス
又問東垣曰杏仁散結ト發散ニ非ヤ曰散ト云其緩苦ハ疎
温ハ行也發散ニ非不章宜准曰杏仁主散痰從痰理中發散而去
表虛者忌服ト此方實ニ發散スルニ非ト雖石杏仁入肺利氣道氣ハ
遠痰理肺氣利スレ痰理亦利ス故從痰理中發散而去表虛者忌
トスルニ驚瀾驚風癲癩症ハ逆氣衝上ノ胸中ニ爵結ス杏仁ハ能
下氣胸中氣結ヲ利也元素曰利胸膈逆氣是也心下煩熱急滿痛
此亦下氣潤肺燥也大腸氣秘此亦杏仁ノ要能也肺與大腸表裏
々々氣降燥潤則大便秘結者通利ス益杏仁桃仁俱ニ利大便秘仁ハ
血結ノ大便秘ヲ利ト杏仁ハ氣結ノ大便秘ヲ利ス李杲曰杏仁桃仁
俱治大便秘當分氣血書則便難行陽氣也夜則便難行陰血也又
曰脉浮者屬氣用杏仁陳皮脉沉者屬血用桃仁陳皮ト杏仁潤肺
氣燥桃仁潤利血燥俱ニ陳皮ヲ用テ佐トスル者ハ中焦順氣ノ劑ト
ハ也杏仁桃仁氣血ヲ利シ燥ヲ潤メ大便ヲ利スルノ功アリ雖是胃
氣不利則大便不能通故陳皮ヲ合同ノ胃氣ヲ導杏桃ノ通利ヲ佐
三取瘡腫杏仁散結行滯故也但用テ外科トス金瘡口感風寒反張
者杏仁杵碎蒸テ絞脂摩瘡上或服ト出必效方下疳陰瘡爛痛者杏仁燒
黑研成膏傅之出鈴請瘡腫痛杏仁去皮研瀼取膏入輕粉麻油調
搗方頭面風氣凡上焦ハ屬風下焦ハ屬腎杏仁ハ入肺治上焦風燥
下上氣故輕發風劑ニ合ノ治頭面風氣功アリ脚氣脚氣ハ下焦病ト
杏仁治之者何ヤ肺ハ在上焦爲金下焦ノ母ナリ且下焦大腸ト表裏又
リ杏仁入肺下氣潤燥熱又大腸氣燥ヲ潤利レ結ヲ散則脚氣自愈

ベキノ義アリ脚氣症氣結大便秘者用之殺蟲杏仁ノ苦温タラ以ナリ

解錫毒錫ハ砒石ノ毒存毒故錫器ノ飲食久則毒ニ中ラレ杏仁能解之

消食積此亦苦温ニ散結下氣利腸故也尤索餅食積ヲ爛ス去痰

利氣下氣潤燥故也尤燥痰寒痰在瀰者ヲ主ル潤聲音肺ハ金トシ

聲音ノ從テ出所也或氣或寒或痰或燥傳肺聲

音ヲ枯ス者皆主治ス尤肺燥ノ失音ヲ潤ニ宜トス

總標杏仁ハ下氣

肺寒治咳嗽喘息

大便秘結要劑也

紅紫苑治風寒入

肺咳嗽生痰者

日此カ燥ヲ潤者ハ仁中一脂アタ以ナリ然ニ性温タリ丹溪謂

性熱ト故ニ陰虛ノ久熱在肺咳嗽者用之肺熱ノ旺ヲ明ヲ恐レ也

畏惡 肺家ノ毒熱ヲ畏レ

母妙錄小兒頭瘡杏仁

燒研塗出事林廣記

ヲ主皮表ハ肺氣ノ合タリ寒熱皮表則氣逆ノ肺氣壅痰鬱胸杏仁ヲ

用テ胸肺ノ氣ヲ不利則皮表不解麻黃ノ散發力ヲ致難故ニ佐之利

氣則表邪解易ノ發

修治 杏仁者有毒勿用又桃花ノ五葉ハ葉ノ

散力盛ナリトス

對細ニ燒黃ニ用加風寒症或肺中氣痰ノ壅塞者ハ皮尖ヲ去

用ニ蓋尖ハ壅ヲ利スルニ取皮ハ發散ノ義アリ○杏梅桃ノ仁見分ガタシ


桃仁ハ扁ニ長梅仁ハ圓ノ尖杏仁ハ梅仁ヨリ大ニ圓微皺アリ此ヲ以テ

分テ擇用ニ藥店者多混雜ス矣ニ使フ勿レ○杏仁ヲ用煎劑湯中ニ百味

ヲ生ノ味久不解者ハ勿服杏實百酸熟○生多食傷筋骨寒食止渴
心果也花温補不足令女子存子葉身面平腫大煎熱洗枝治瘧
撲瘀血根食杏仁中每者對煎服

烏梅



酸微寒○欬肺生津化痰下氣除煩清熱益腸
安蚘調中去惡肉△梅古文作木上二在

形二象鳥ハ熏テ色ノ黒ニ取○烏梅ハ脾肺二經血分藥也主治凡所
皆酸收ノ氣味ヨリ出其能止大便血尿血血痢婦人血崩者モ亦收
ヲ以テ益血得酸則欬得寒則止也又久嗽燥嗽者二用之能止新
邪未發者ハ勿用邪氣ヲ收溢ノ嗽ナラフ不止反テ害ヲ致一不生津
酸味ハ收陰不泄故也人梅トニツテ口津ヲ生以テ是故止渴治口
乾療噎膈壹與福ハ皆胃口ノ乾燥ニ因ナリ又反胃吐逆ヲ治者ハ收
欬ニ從也然凡鳥梅性寒凡胃寒ニ因テ止者ハ對酌スベシ如其吐甚

難止者ハ温中劑ニ合ノ少用夫烏梅ハ酸收氣味ヲ存入收ハ發達
止越ヲ推東收固テ不能ヲ云故正血止嗽止吐止利下氣功烏
梅ニ存入化痰烏梅ハ氣液ノ遊溢ヲ收テ化痰此カ治痰雍者亦化
痰故也諸瘧疾ハ痰ナラフ不致痰アルトキハ榮衛滯滯ス邪氣此ニ結
テ不能去邪與衛結會ノ瘧ヲ致ス是以治瘧去痰要ト入下氣此
亦酸收ヲ以テリ肝肺氣上逆者ヲ收下二宜除煩烏梅ハ入肺味酸
ハ收津寒ハ勝熱故胸膈ノ煩ヲ治スルニ宜シ清熱此亦酸寒ニ從
テ也尤彌熱骨蒸熱酒熱毒ヲ清ス蓋人酸ヲ食ニ味深透五實ニ
酸ハ透深味タリ故ニ陰虛勞熱骨髓ノ深ニ在テ蒸者烏梅ノ酸寒
ヲ以テ能清ス又酒容ハ不欲甘此カ酸寒能消酒毒流腸此亦收
東ニ從テ也尤熱痢血痢久息痢久瀉血瀉ヲ止瀉要ト入安蚘蟲佳
甘善惡苦得酸縮故ニ蚘動ヲ安スルニ烏梅ヲ要トス調中調中二善ヲ

存ス。夫脾ハ裏血胃ハ庄氣俱土ニ屬ノ木ヲ畏烏梅ノ酸收扶脾血是
一也酸ハ木ノ本味ト雖正收斂ノ發生升達ノ木性ニ反ス故ニ瀉木以
酸且肝木ハ藏血血液枯則木氣急迫ニ土位ニ横ル酸味收血液潤肝
急是以烏梅ノ酸收瀉肝邪潤肝急則脾胃土ノ木乘ラ免テ年焦安
レ是レ一也然正酸寒多過則胃腸ヲ損直ニ中焦ノ調補ト覺ベカラス脾
血ヲ扶木邪ヲ退ノ義アルニ云云惡肉一切惡肉ノ腫起テ難退者研テ
塗其效神也此亦收テ平ニスルノ理也○本經ニ安心トハ除煩テ收斂
也止肢體痛治偏枯不仁ハ收液潤急扶血也別錄肌筋脈トハ筋ハ
血ノ潤ニ因烏梅ノ血ヲ收テ以テ然正筋病者酸收ヲ過テ勿レ多ケル
反テ筋氣縮急ヲ致ス經曰筋病無多食酸○或問弘景曰治好腫大
何ヤ曰此氣浮津溢者也烏梅能收氣收津故此引アリ

總攷

截瘧除煩熱潤津燥去痰要劑

毒

外邪未盡新瘡者勿用○肺氣寒虛ノ者○胃寒者ハ皆勿用

畏惡

豬肉ヲ忌黃精ヲ食ハハ忌之

附方

惡肉突出不退者烏梅肉燒存性研

愚按

烏梅ハ吐ヲ止テ養アリト雖正時珍曰瀉痰ノ痛

塗一夜ヲ立處ニ平也出鬼遺方
トハ溢テ上出ヲ云吐養也凡酸苦ハ令人涌吐蓋酸ハ上ヲ收推テ不
泄味也譬ハ水ノ流ニ逆テ留塞ハ水ノ涌テ溢カ如レ烏梅酸ヲ以テ痰

溢ニ逆テ收推則反テ涌テ吐出ス故ニ吐家必用則逆ヲ收テ能
止多用則反テ吐ヲ增偏ニ止トニ覺テ太過スルヲ勿レ

修治

洗淨ノ乾核ヲ去到テ微炒用○青梅ヲ取テ籠ニ入突上ニ懸テ煙
ニ熏黒乾タルヲ磁器ニ收貯○本邦ノ造法ハ五月ニ青梅ヲ取テ皮ヲ刮
核ヲ去テ籠ニ入熏生梅酸平○多食損齒傷脾胃發痰熱久食泄腎
梅ヲ食テ齒ヲ損者ハ胡椒肉ヲ嚼ハ愈

白梅

酸鹹○治瀉痢煩渴霍亂吐下下血血崩功

同烏梅中風驚癇等并開禁閉者搗碎塗患肉乳癰腫毒刺入肉者嚼塗即出和一謂梅干也或鹽梅霜梅上號梅仁酸○明目益氣除煩熱治指痛腫搗爛和醋塗花微酸清神明目白梅花半開者用葉酸○治久息痢霍亂煎服夏衣二微庄者煎洗即去其妙ナリ根治風痺霍亂久息痢小兒初生同桃李根煎湯浴免瘡熱之患上二見世者ハ殺人

桃



甘苦辛温○破瘀血通潤大便利月水止心腹痛消心下堅硬治肝癰效逆上氣疼痛產後血

仁仁病殺蟲△桃植易子堅故字从木从兆兆八十億云其繁多ナルヲ以テリ○桃仁ハ沈テ降肝經血分藥也其功專滯血ヲ行ニ在且仁中自脂一リテ便道ヲ潤ス治癥瘕血塊經閉又能血結ノ大便秘結ヲ通潤ス凡桃仁ノ行血其功四アリ熱入血室血結者ヲ治ス一也心腹ノ血滯ヲ破二也經絡ノ凝血ヲ行三也皮膚ノ滯血血結燥癢ヲ散四也又能肝急ヲ緩ス蓋肝ハ藏血如血凝テ不流則血ヲ肝ニ入レヌ故二肝燥テ急ヲ致者桃仁ヲ用テ凝血ヲ破テ流則肝燥潤テ急自緩レ是以

肝癰及寒熱往來ヲ治スノ功アリ癰與寒熱往來ハ皆肝經ノ急ニ因バテリ治心腹痛心下堅硬者皆滯血ニ因ノ症也治效逆上氣者ハ桃仁ノ沈テ降ヲ以テ下氣則效逆ヲ治スル明也疼痛一切ノ凝血ニ屬スル疼痛者皆用之產後血病產後瘀血ニ屬スル諸病皆用之瘕殺蟲本草曰桃仁苦重於甘ト苦味勝テ辛ヲ兼ヲ以テ殺蟲養アリ然甘味ヲ兼カ故ニ雖殺小蟲不能殺大蟲○桃仁能血結ヲ行ト雖虛實ヲ分テ用ヘシ但實者用之虛ノ結者ハ不可用茲補スレバ自行或問李杲曰桃仁苦以滯血甘以生新血ト然三五子謂虛結者不可用トハ何ヤ曰桃仁ハ苦辛ヲ以テ何生新血養アラ思案ニ桃仁雖破瘀血味甘ヲ兼テ且體ニ脂氣アリ故攻中ニ潤ヲ兼テ破ト太ケレ未至甚東垣謂生

新血ハ其甚カラザト聞義アムト以ナリ本州ヲ讀者安

使藥 附香

文字ニ拘テ本旨ヲ失フ勿レ惟意ヲ以テ意ニ向者ヲ得ナク

子ヲ使トス同當歸芍藥澤蘭延胡蘇子五靈脂紅花牛膝生地黃益

母治産後瘀血作痛亦治經閉同當歸地黃麥門芍藥黃芩甘肅肉

菴蓉麻子仁治大

腸血燥不通者

用之○血熱者ニ

ハ使使ノ用ヘシ

ハ可字ヲ書シ片ニハ出字ヲ

書テ吞之即生出新血本州

雙上ノ者ハ殺人勿用太低尋常ニ用ハ皆皮尖ヲ去炒使

邪治中惡腹痛破瘀血治腰痛心痛去鬼癘又吐血諸藥不效燒存

性研末米湯服燒烟熏痔燒黑油調傅小兒頭瘡桃實ノ不

一ノ木上ニ懸者也十一月ニ采テ酒拌蒸焙乾銅刀ヲ以テ切

ヲ剉テ復焙用**桃實** 辛酸 肺果肺病者宜食多食發熱致脹生瘰

之浴水爲淋病惟有損無益果 齧十同食 桃毛 辛破血閉下血瘰治帶

下崩血積聚辟惡氣 桃實ノ外毛ヲ刮取用**花** 平殺惡鬼除水氣破

石淋利大小便下三蟲消腫滿治心腹痛疔瘡痰飲積滯 二三月

采テ陰乾ニス千葉者殺入**葉** 苦除傳尸蟲瘡中小兒疔瘡小兒容

作治頭風霍亂腹痛通大小便**枝白皮** 苦除邪惡腹痛去胃熱辟疫

氣治黃疸殺瘡蟲 樹皮及根皮皆用 桃膠 苦下石淋破血治中惡鬼

邪下痢和血下氣止痛煉服保中不飢忍風寒 刀ヲ以テ桃樹ヲ割ハ久ノ膠出

大 甘温 和陰陽調榮衛生津液養脾血平胃氣

東棗 通九竅利四肢助十一經潤心肺補虛損除腸



胃滯氣治下痢止嗽殺烏附毒堅志強力△棗性高故東之重字ヲ
 作 棗ノ甘ハ助陰温ハ助陽甘温合テ能不足ヲ補尤脾經血分藥也素
 問ニ以棗爲脾果劑中ニ姜棗ヲ用者ハ榮衛ヲ調和シ脾胃升發ノ氣ヲ
 生養セシメトス古人ノ方中ニ棗ヲ用ハ皆深意存ノ切要者也然今醫
 多ハ生姜ハ用レ棗ヲ略シ用フ希也此皆藥性方意ノ理義ニ不詳故也
 中焦補氣ノ劑中ニ棗ノ必用ヲ缺レ東垣曰大棗氣味俱陽
 也温以補不足胃氣甘以緩陰血脾血成無已曰用姜棗以和榮衛
 生發脾胃升騰之氣章曰甘能補中温能益氣甘温能補脾胃生
 津液ト仲景滋脾土平腎積以棗益土勝水飲以十棗湯然
 此棗益中養榮功微者云非又豈古方中ノ棗ヲ畧シ可シラヤ
 宗奭曰煮取和和脾胃藥甚佳
 生姜ト合ノ和榮衛生發脾胃氣
 使藥
 脾胃實滿○酒客病○一切
 毒
 齒症○齒病ニ皆用テ勿レ

畏惡

食スレバ腰腹痛ヲ致ス
熱ト同用フヲ忌心魚ト同

附方

大棗湯婦人藏燥テ安ニ悲
 泣テ不止邪祟症ニ似者大棗

十小麥升一升卅二每一貼一兩水煎服出本事方○此症
 姪婦四五箇月間亦アリ皆大棗湯ニノ神效ヲ致ス

愚按

或問

吾子ヲ謂葱ト同食ヲ忌然凡千金方ニ煩悶不眠者大棗十四枚葱白七
 莖水煎服世レム五子又謂蟲症齒病勿用ト然在古方治走馬牙疳
 以棗肉治下部蟲癢以大棗膏皆吾子所謂異者ハ何ヤ曰忌與葱
 同食ハ大明說也然千金同用者此變法執權道也古ノ神醫ハ相
 畏相惡相反及已者ト雖在劑中奇效ヲ取此皆上醫ノ妙手ヨリ
 出テ常人ノ學ヘキ所ニ非ス又牙病蟲癖ニ用者ハ皆外科非內服大
 明日有齒疳疳疔病
 修治
 六七月ニ采本綱ニハ采テ即曬乾劈テ去
 核入劑今本邦人蒸テ晒乾入時珍謂今
 蟲麤入不宜咳棗

人蒸棗多用糖... 軀之法トス然... 二種アリ小者ハ不入藥大者ト雖... 大肥テ色紅肉厚核小膏潤多味甘美... 助濕熱瀉者尤不可食... 履瘡葉溫和葛粉搗熟... 治毒毒煎服吐愈根... 煎洗月一且二洗腎者復明忌... 煎洗月一且二洗腎者復明忌... 煎洗月一且二洗腎者復明忌...

木 日酸鹹溫○治霍亂轉筋脚氣濕痺腹脹
瓜 腹痛濕腫噫氣利後渴△此木實如小瓜故

號○木瓜收肺氣除脾胃寒濕濕熱土中木邪ヲ平夫霍亂轉筋
 脚氣ハ肝病ニ非ス陽明胃經ハ宗筋ノ會ニ屬シ脾胃兩經ハ足經ノ内外
 ヲ行故寒濕濕熱邪脾胃ヲ襲則吐下轉筋脚氣ヲ致ス木瓜能脾
 胃寒濕濕熱ヲ除肺氣ヲ收土中ニ乘スル木邪ヲ制シ免冠金旺ノ
 木不亢則脾胃土益調テ宗筋ヲ養是以轉筋脚氣腰膝無力者ヲ
 治ニ木瓜少以テ煎劑トス治腹脹腹痛濕腫噫氣大便溇痢後渴症者
 皆此脾胃ノ寒濕濕熱ヲ除故也且木瓜ハ津血ヲ筋ニ行酸ハ走筋收
 津不泄也筋得血和調ノ能束骨利關節無筋病實ニ筋病ノ良劑轉
 筋ノ主藥也故轉筋時木瓜名ヲ呼或轉筋ノ所ニ
 木瓜字ヲ書テ止所愈此其功神妙理不可解者也
毒 通張則損齒及骨伐肝○
畏惡 鐵器
附方 脚氣腫急痛木瓜切片囊
 二盛常踏之愈出名醫錄
修

淋瀝者皆勿用

和語本草

修

治 忌鐵器銅刀ヲ以テ切切破破皮ヲ剥剥去去槌槌ヲ除除ク切片切片。砥砥銅刀ヲ以テ割割用用陳久陳久者者尤尤良良。○本邦人多多八關地八關地錦實錦實ヲ以テ木瓜トス誤也誤也今人今人謂謂カクホク此真ノ木瓜也此真ノ木瓜也。槿槿實ト一類也一類也。槿實ノ實ハ花脫處ニ鼻ナレ鼻アル者ハ木瓜也皮薄五赤黃ニ香ノ味甘酸不温者ヲ擇用。○槿實槿實モ本一類類治霍亂轉筋霍亂轉筋藥也藥也。槿實味ハ酸平酸平木瓜味ハ酸ノ少少其性温者ナリ

山



酸甘温○消食積消食積化血塊化血塊氣塊氣塊痰滯痰滯活血活血發痘發痘治腹痛治腹痛吞酸吞酸腰痛腰痛婦人產後婦人產後冠枕痛冠枕痛癰瘰癰瘰小腸

疝氣△木瓜ノ短小ニ味酢味酢者ヲ槿子トス山植味似槿子故號此物山林中ニ生スル也俗槿ヲ作作查者ハ誤也○山植子ハ能食積ヲ消化ス尤肉積ヲ治スルニ功アル且氣血瘀ノ結滯ヲ化ス故ニ食積ノ腹痛腹痛吞酸者吞酸者帶血帶血腰痛腰痛產後產後屬瘀血腹痛屬瘀血腹痛及癰瘰ヲ治ス小腸疝氣ハ小腹三塊アリテ痛山植能治之又能活血活血活人血結ヲ温行温行氣ヲ行ノ血ヲ導導云云痘痘疔疔乾黑乾黑陷者ハ血分冷結トス故用之用之活血則痘頂起發紅活ス吳瑞謂補脾丹溪謂健胃上健胃上直直ニ脾胃ヲ補補ハ非ス此此能食積ヲ消則中焦自健ナルヲ以テ云若其脾虛ノ常食不消者用之用之轉轉中氣ヲ害

總槩

山植ハ魚鳥油膩腥膻ノ肉食ヲ消化スルニ要劑也麥芽ハ食積ヲ消シ山植ハ肉積ヲ消ス兼テ宿血宿血氣滯ヲ行行ニ宜傷ス

使藥

苗香ヲ佐トシ苗香ヲ佐トシ胃無食積者勿用○肥虛ノ常食ヲ不消者者雖雖如宿食宿食勿用勿用或若補中劑中

毒

者者雖雖如宿食宿食勿用勿用或若補中劑中

附方

肉食不消山植四水水煮食之飲汁飲汁出簡便方○老雞

修治

湯ニ浸湯ニ浸柔柔ニ核ヲ去核ヲ去肉ヲ割用○按スルニ山

和語本草

檀核化食磨積下然則消化食積功專核二在者也化食功之盛三欲者八連核用之化食功之緩七欲者八去核用之也今所渡者二九山檀子肉山檀子上二種アリ俱二用之凡山檀皮核去之使ヲ山檀肉上ニ其儘用者ヲ山檀子トス不寒冷水痢頭風身痒根消積治反胃益菓煮汁洗漆瘡

橘皮



苦辛温〇開胃脹氣消穀化痰快膈除寒治嘔吐欬嗽霍亂瀉痢反胃嘈雜瘧疾癰疽疔瘡大

小便秘澀解魚毒去寸白蟲△雲ノ外亦内黄丸ヲ商上ニ云此木實外赤内黄三番雲三似夕故字以示从商或橘皮ハ陳久者ヲ良上故二一名陳皮上號ス〇橘皮ハ肺胃氣分藥也味苦ハ疎燥辛ハ散開温ハ和利運行ス補劑ニ合ハ能補瀉劑ニ合ハ能瀉升藥上同ハ升降藥上同ハ降能諸藥上合同ノ不逆補瀉升降ノ佐使上ナリ元百病ヲ療ス尤中焦ニ功アルト不此東垣謂得諸甘藥乃明右獨用爲脾胃ト此實ニ橘皮ノ要ヲ明スルニ足リ李杲亦曰破滯氣原曰順氣奇珍カ曰理氣然則陳皮ハ本肺胃ノ氣滯ヲ順行開散セトル劑也故ニ發散劑ニ多ハ此ヲ合用ス彼謂得甘藥乃可トハ入參炙甘草等ノ補氣補中ノ劑ハ性重味厚氣道ヲ持固テ不泄者也故ニ動ハ中氣ヲ引テ滿ヲ致ス是以參朮炙甘草等ノ補氣補中ノ劑取テハ順和運行ノ機ヲ文ニ難ハ不順不行則周充ニ難故ニ陳皮ノ行氣順氣ヲ必用其間ニ行補瀉ノ内ニ此カ行氣ヲ得テハ焦能運肺氣能行補藥不滯氣道不逆ノ補功周體ニ充テ致ス此得甘藥乃可トルノ義ニ非ヤ夫心補劑中ノ陳皮ハ其量ヲ過テ勿レ過則反テ參朮炙甘草等ノ補中補氣ノ功ヲ減シム諸補瀉ノ間ニ於テ少ク此ヲ用テ補益ノ助トナシ足若其陳皮ヲ獨用テ甘補劑ヲ兼施花時ハ恐ハ已ガ本性ノ破氣滯功ヲ忽シテ

和利運行ス補劑ニ合ハ能補瀉劑ニ合ハ能瀉升藥上同ハ升降藥上同ハ降能諸藥上合同ノ不逆補瀉升降ノ佐使上ナリ元百病ヲ療ス尤中焦ニ功アルト不此東垣謂得諸甘藥乃明右獨用爲脾胃ト此實ニ橘皮ノ要ヲ明スルニ足リ李杲亦曰破滯氣原曰順氣奇珍カ曰理氣然則陳皮ハ本肺胃ノ氣滯ヲ順行開散セトル劑也故ニ發散劑ニ多ハ此ヲ合用ス彼謂得甘藥乃可トハ入參炙甘草等ノ補氣補中ノ劑ハ性重味厚氣道ヲ持固テ不泄者也故ニ動ハ中氣ヲ引テ滿ヲ致ス是以參朮炙甘草等ノ補氣補中ノ劑取テハ順和運行ノ機ヲ文ニ難ハ不順不行則周充ニ難故ニ陳皮ノ行氣順氣ヲ必用其間ニ行補瀉ノ内ニ此カ行氣ヲ得テハ焦能運肺氣能行補藥不滯氣道不逆ノ補功周體ニ充テ致ス此得甘藥乃可トルノ義ニ非ヤ夫心補劑中ノ陳皮ハ其量ヲ過テ勿レ過則反テ參朮炙甘草等ノ補中補氣ノ功ヲ減シム諸補瀉ノ間ニ於テ少ク此ヲ用テ補益ノ助トナシ足若其陳皮ヲ獨用テ甘補劑ヲ兼施花時ハ恐ハ已ガ本性ノ破氣滯功ヲ忽シテ

反テ中氣ヲ瀉スルニ至ラズ或高橘皮ハ肺胃氣分ノ劑タルトキハ血分ニ於テハ功ナドセシカ。曰橘皮實ニ氣分劑ナリト雖正血分ニモ亦用ガル者ナシヤ。夫血ハ得氣運氣順則血運氣滯則血滯故三行血劑中ニモ亦用之氣道ヲ順行セシムルトキハ血能運テ行血ノ佐トスルニ足リ然レ陳皮ノ苦辛温氣味並ニ燥易シ補血劑ニハ斟酌スベシ滯血ヲ行ノ劑ニハ佐使トスルニ宜中焦屬土惡濕白木ト合同ノ能燥濕温胃然レ白木ノ燥濕ト陳皮ノ燥濕ト合則反テ中焦燥ニ過テラ恐故ニ古人補中劑ニ白木陳皮ヲ同用則必甘草ヲ施ス甘草ノ甘厚者ヲ以テ中焦ニ津ヲ持シテ陳皮ノ燥ニ過者ノ防トス古人ノ方ニ處スル實ニ盡極テ精滯ナキヲ見ベシ又間橘皮ノ功ヲ總築之云則補トセシカ瀉トスベシヤ。曰此ガ性功ハ本瀉也補ニ非ス東垣曰多用久服能損元氣ト是也然レ陳皮積穀等ノ類ニ非ス惟順氣行氣ノ劑ノ稱強者也強ニ畏ベキノ品

總築

上中焦ノ氣道ヲ温行順和セシメ去痰快膈消嗽調胃要劑也甘温補益ノ劑ニ合シ能シ氣ヲ補胃ヲ益行氣劑ニ合

ノ能滯氣ヲ破發散劑ニ合シ能邪氣ヲ散ス諸藥ノ佐使トスルニ宜テラ得タリ

使藥

同白木甘草補脾胃同枳殼枳氣除痰合

蒼朮厚朴平土邪合杏仁治大腸氣閉同桃仁治大腸血閉合青皮治氣滯

毒

脾胃不足者單服則元氣ヲ損ス甘藥ト合同ス

ベシノ燥潤者及氣

附方

寬中丸脾氣不和冷氣客胃升降不通脹滿者橘皮四兩白木二兩為末酒糊ヲ梧子六

二九食前二木香煎湯ニ用出指迷方

愚按

時珍曰世醫徒知半夏南星之屬何足以語此哉トハ陳皮ノ利痰功ヲ稱スル也

半夏南星能痰ヲ治スト雖其氣烈陳皮ノ氣痰ヲ利スルノ功不烈也半夏南星ノ猛ナルニ勝リ今醫痰症ヲ見テハ其主方中ニ陳皮ヲ

雖在痰之輕重ヲ不察（カシマ）之者。其夏南星ヲ加。此陳皮ノ氣痰ヲ利スルヲ知（カシマ）ルニ非也。其功ノ盛衰ヲ不知。惟陳皮一物ヲ以ハ氣痰ヲ利スルニ不足トシ覺故也。古人一切氣痰ヲ利スルニ賢丸ハ陳皮ノ一物ヲ以ス醫其方中ニ陳皮アリテ。症ニ氣痰ノ不利ヲアルニ於ハ其輕重ヲ察シ。陳皮ノ量目ノ輕重ヲ以テ惟用之治療也。必シモ順氣化痰ノ劑ヲ加ニ止（カシマ）テ勿レ。今人多ハ陳皮甘草ノ兩藥ヲ輕シ。此ガ氣味性功ヲ不詳製法ヲ畧ス矣。

修治 赤熟者ヲ取テ晒乾年久貯テ陳者ヲ良トス。用實ニ煨カテ（カシマ）。用水浸柔對テ晒乾焙用。利氣去痰開胃散邪劑ニ裏ハ筋白膜ヲ甜去。補氣補中劑ニ用者ハ不去白。其儘劉不去白ノ用ニモ亦裏ハ筋筋ハ甜去ベシ。醫書ニ橘紅ト云ハ去白者也。劉白ト云ハ裏ハ白膜ヲ不去者也。愚按ニ參朮ノ劑泥隔製用者ハ虛症ト雖在陳皮去白者ヲ用テ可也。凡陳皮ハ補劑ヲ導テ溢シテハ功アリ。草宜曰如藥中多用人多以此同入不作脹。時珍曰橘皮紋細色紅而薄。內多筋脈其味苦辛。柑皮紋粗色黃而厚。內多白膜其味辛甘。柑皮最厚而虛紋更粗。吾貴內多膜無筋其味甘多辛少。但以此別之即不差矣。以上ノ説ヲ以テ詳ニス。時珍所謂橘ハ本邦ニ呼テ香子ト號者也。蜜柑ニ非ス本草ニ謂柑ハ此即本邦ニ蜜柑ト云者ナル橘ト異也。今ハ橘皮ニ蜜柑ノ陳皮ヲ用者ハ誤ナリ。柑皮辛甘寒下氣調中解酒毒及酒渴去白焙研末點湯入鹽飲之。治產後肌浮爲赤酒服傷寒飲食勞復者濃煎汁服。山柑皮治咽喉痛效。橘皮與柑皮其性ノ寒溫異ニシテ主治ノ功不同。何ゾ柑皮ヲ用テ橘皮ノ功ヲ致テ有。時珍曰橘皮苦辛溫。柑皮辛甘。外形雖似而氣味不同。然石柑皮ヲ以テ橘皮ニ充悞ハ本邦ノニテラ不異。橘皮モ亦悞混入時珍曰多以柑皮雜之。柑皮猶可用。柑皮則悞。橘皮功ハ橘皮功ト雖不同。柑皮モ亦

此別之即不差矣。以上ノ説ヲ以テ詳ニス。時珍所謂橘ハ本邦ニ呼テ香子ト號者也。蜜柑ニ非ス本草ニ謂柑ハ此即本邦ニ蜜柑ト云者ナル橘ト異也。今ハ橘皮ニ蜜柑ノ陳皮ヲ用者ハ誤ナリ。柑皮辛甘寒下氣調中解酒毒及酒渴去白焙研末點湯入鹽飲之。治產後肌浮爲赤酒服傷寒飲食勞復者濃煎汁服。山柑皮治咽喉痛效。橘皮與柑皮其性ノ寒溫異ニシテ主治ノ功不同。何ゾ柑皮ヲ用テ橘皮ノ功ヲ致テ有。時珍曰橘皮苦辛溫。柑皮辛甘。外形雖似而氣味不同。然石柑皮ヲ以テ橘皮ニ充悞ハ本邦ノニテラ不異。橘皮モ亦悞混入時珍曰多以柑皮雜之。柑皮猶可用。柑皮則悞。橘皮功ハ橘皮功ト雖不同。柑皮モ亦

下氣調胃功アル者多ク其用ハ藥害ヲ致シ不至故柑皮猶可用ト云
 橘皮ニ代テ用ニト云六非ス柑皮ハ不堪入藥絶ノ用ヘカラゲルヲ示故
 懸絶上云。余蜜柑ノ陳皮ヲ以テ橘皮ニ代テ用之驗ニ无害トシ上雖正功
 アルトテ詳擇テ用ニ和謂香子皮ヲ采テ法ニ從テ製用ベシ好古日令
 人又多以乳柑皮亂之不可不擇也柑皮不甚苦橘皮極苦至熟亦
 苦上橘皮ヲ煨亂テ漢和同久不可不改者也實甘酸温潤肺聚痰止
 消渴開胃除胸中隔氣肉生痰皮消痰 橘核苦平治腎膀胱氣痛腰
 痛腎冷酒渣鼻小腸疝氣物理之自然也 疝氣卵痛與青皮同功葉苦平○導胸膈
 逆氣行肝氣消腫散毒治乳癰腸痛

青皮

苦辛温○破氣滯消肝積治胸膈氣逆脇痛小腹疝氣堅癰
 消乳癰治瘰癧△橘實ノ青未熟皮トバ也○肝胆一經ニ今
 氣分ノ積滯ヲ破良劑也古ハ陳皮青皮ノ分ナシ宋朝以來用別積實積

殼ノ別ノ如ク橘皮ハ脾胃ノ氣分ヲ利ス故胸膈ノ氣ヲ利スルニ宜青皮ハ
 沈テ降腸下小腹ノ氣滯ヲ破故脇痛小腹陰囊ノ疝痛一切肝胆ノ氣
 分ノ結積ヲ破ニ宜ト入治瘰癧多用之者王亦肝邪ヲ疏利スバ也或炒黃
 ノ入肝胆ノ血結疝亦用之或小兒消積多用青皮能發汗トアリ有汗者
 ニ不可用蓋肝ハ生發ノ氣ヲ主氣ハ陽ト入氣結
 開則陽氣發入陽發則汗自出理ノ然所ナリ

疝痛ヲ疏利
 スル要劑也

毒

東垣曰破滯能堅皆治在下之病有
 滯氣則破滯氣無滯氣則損真氣

附方

快膈
 湯冷

百沸湯ニ浸四兩ハ醋浸四兩ハ酒浸各浸三日 取出去白切細鹽一兩炒
 微焦俱ニ研末ノ毎用二錢茶送下
 分ヲ以テ水煎ノ温服シ

愚按

橘皮與青皮性功大既同
 異アリ蓋橘皮ハ熟紅皮ニ

ノ性不重氣不烈青皮亦熟皮性重ノ降氣烈ノ氣滯
候橘皮ハ熟皮青皮ハ未熟嫩皮以此其性功ヲ辨スベシ

修治

實 橘

未熟ノ青色者ヲ採モキ去肉皮ノ剝テ晒乾用時ニ水浸白膜筋
ヲ刮去テ晒乾炒過テ用或ハ採テ皮ヲ不剝ノ其儘晒乾用時ニ湯
ニ浸桑葉核ヲ去切片醋ニ拌瓦ニ入テ炒過テ用○此亦今謂香子ト
呼者ノ嫩青皮ヲ用ヨ蜜柑ノ青皮ヲ用テ勿時珍曰青橘皮乃橘之
未黃而青色者薄而光其氣芳烈今人多以小柑小柘小橙偽爲
之不可不慎辨之

柑實

甘冷○利腸胃熱解丹石毒止暴瀉利小便驅陰乾癯存性
研末温酒服一錢治難産多食令人肺脾冷冷痰癰瘡瀉利

陰汗皮

右ノ橘皮
條ニ見タリ

核作坐面藥葉治聾耳流水或膿水并癩汗愈○

柑ハ和二謂蜜柑也橘ト異也今人用此陳皮トスル者ハ甚誤トス詳義
右ニ見タリ然則柑與橘二類別種氣味治功ハ各不同也

龍眼



甘酸温○開胃益脾補虛長智安志強魂久服
輕身不老通神明ハ形似龍目故號○本綱二

龍眼ノ主治ヲ辨スル未詳章宜匯曰八手少陰足太陰經補心虛而
長智悅胃以培脾除健忘與怔忡能安神而熟寐上愚按ニ龍眼肉ハ
皮核ノ間ノ肉膜色赤黒ノ潤味尤甘厚也手厥陰心包足太陰脾經ニ入
テ潤血養氣ノ良劑トスベシ蓋此カ肉膜ノ皮裏核外ニ粘著者ハ心包ノ
象アリ且人脾藏ハ中部二位ノ血ヲ裹者也此カ皮核ノ中間ニ存甘潤
ナル脾ノ在中裹血ノ象ヲ得タル又甘温能氣ヲ養ヲ得ベシ故ニ心
脾ノ血ヲ潤收亦心脾ノ氣ヲ養益ノ劑トスベシ古人歸脾湯ノ中ニ用之
治健忘怔忡虛煩不眠自汗驚悸者モ亦此義也心脾ノ氣血
ヲ潤養ノ神意志智ヲ養目劑治健忘怔忡不眠ノ要藥也

毒

胸腹飽滿不食

愚按

錄龍眼去三蟲說アリト雖此カ味其者ニ斟酌スヘシ多酸少何以去蟲理アルヤ未詳凡虛症ニ苦

味ヲ惡蟲症ニ甘味ヲ惡ハ皆古ノ法

修治

皮ヲ去肉膜ヲ剝取テ碎テ藥ニ入用味多酸少

酸肉厚ノ潤者ヲ良トス酸味厚ノ甘トス肉薄潤少者ハ下品也

檳榔



苦辛溢温○下膈氣破壅滯消穀利痰結逐水

殺蟲治瀉痢後重心腹痛腹脹一便氣秘喘急

瘴疾瘴癘一宿與即俱貴客ノ稱也交廣人ハ貴客至ハ必檳榔ヲ設

進故以采从賓从郎○檳榔ハ沉テ降陰中陽也胸中至高ノ結氣ヲ

泄テ下行セシムルノ劑多其性功ノ沉重下行ヲ鐵石ノ如シ故能諸藥ヲ

下ニ墜テ肛門ニ至且苦ハ疏辛ハ散故氣滯痰癘風壅食積ヲ破テ推

下ス是以下膈氣破壅滯消穀利痰結功ノ云逐水水濕ノ冷結ヲ逐

下殺蟲味ノ苦辛ナルヲ以テ也瀉痢後重泄瀉痢疾後重症ハ氣滯結

積ニ屬ス用之ニ下氣行氣破滯則自愈内經謂通因通用義也蓋瀉

痢後重ノ初氣滯實積ニ屬者ヲ治ベシ其瀉痢後重久ノ積結已ニ

除テ惟正氣ノ陷虛ニ因テ然者ハ絶ノ檳榔ヲ用テ勿レ反テ害ヲ致ス

升麻等ノ升提ノ劑ニ宜トス心腹痛腹脹下氣利痰破結積故也此皆

氣分ノ實積ニ因者ヲ療ス虛人ノ如ハ勿レ也一便氣秘氣分ノ結實ニ

因テ一便秘瀉者用之ニ大法痢疾ノ初大便頻瀉後重者專食積氣

滯ニ屬時用之ニ神效ヲ致ス喘急胸中至高ノ氣ヲ下シ痰結ヲ除バ也

瘴疾除痰下氣破壅滯也凡瘴疾ノ初痰氣結滯邪氣壅滯ノ狀

故ニ瘴癘屬氣實者ニハ勿レ用瘴癘濕熱不止ノ瘴疫ヲ禦益苦辛温ヲ

以テ濕熱不正氣ヲ驅散ス檳榔水

露日嶺南人以檳榔代茶飲之

總纂

檳榔ハ胸中ノ氣滯ヲ破至高ノ氣ヲ下シ痰癘ヲ除テ

胸痛腹脹痢疾後重逆大便氣秘ノ要藥也
毒 氣不足者勿用。其氣壯實ニ非ハ
亦施。○久服過服スルヲ勿レ。○老人虛人

ハ斟酌スベシ。○正氣
下階者尤禁服用
畏惡 忌火見火
功カラ失
附方 痔瘡大便後重患アル者
檳榔爲末。毎日空心以

白湯調服本小兒頭瘡
水磨麩取粉調塗此聖
愚按 龔氏萬病回春。檳榔一雌一雄者
ヲ用。義了。李氏綱目ニ於テ考

二此説ナシ。本州原始曰。尖小者俗呼
雄雌大者俗呼雌上。雄上解
修治 空心者ヲ擧去テ。臍ヲ去
皮ヲ刮去テ其儘到使雌

雄説上三見多。雌ヲ擧トシ。雄ヲ擧トス。檳力ハ小ニテ。檳力大ナリ。凡用者
大ニ圓坐シ堅實者ヲ良トス。半黒半白者。及腐空者不堪用。

大腹 辛微温。○下一切氣。開胃。中焦冷熱利大小
腸。澀肌水。去癩瘰。治霍亂。醋心。脚氣。痞滿。惡阻。



脹悶。瘴癘。大腹子ノ皮也。大腹ハ以形號。○大腹ハ中焦冷熱ノ結。胃
ヲ温散シ。胃ロヲ開。氣ヲ下ス。故治霍亂瘰瘵醋水刺心者。及婦人惡阻除

心腹痞滿脹悶。去腸痰者亦下氣開胃也。脚氣症氣ノ壅逆ニ屬者用
之。利大小腸。此亦下氣開胃故也。消肌水。此カ大腹子ノ皮。炙ラ以テ。

肌膚ニ走氣味。辛温ヲ以テ。水濕ノ結ヲ逐。瘴癘
辛温ヲ以テ邪ヲ散。且上氣去痰。治不正瘴癘。
總要 調中焦冷熱
開胃下氣去

腸痰。要。可。治。霍亂。痞
滿。婦人惡阻。良藥也。
毒 胃熱アル者
斟酌スベシ
畏惡 鳩鳥多集。大腹樹故
木腹皮ハ制衣法ヲ詳ニ

ノ輕スルヲ勿レ。鳩
毒ノ存セシヲ
修治 水ニ浸テ洗淨シ。内ノ堅皮ト。外ノ黒皮トヲ去。毛ノ
ニヲ取テ以酒洗過復黒豆ノ煮汁ニ再洗過シ

晒乾焙テ判用。本邦製ニ水洗。次ニ黑豆汁ニ洗。終ニ以酒洗ハ制衣法ノ
前後ヲ誤者也。終ニ黑豆汁ニ洗。良トス。大腹子辛温。○與檳榔同。

功○大腹子。檳榔中ノ一種也。腹大ニ形扁ニ味澁。檳榔ノ形大長味良ニ異也。

吳茱萸



辛苦熱○温中下氣除濕逐風邪開腠理去痰消食殺蟲毒開胃化滯治心腹絞痛霍亂轉筋。

腰脚軟痛冷痺水腫陰痿大便氣秘痞滿欬逆膈咽不通吞酸頭痛陰毒疝氣血痢寒瀉婦人產後餘血病腸風痔疾喉舌瘡辟鬼邪△菜萸ハ吳地ノ者ヲ好ス。菜萸ノ名義未詳○吳茱萸ハ肺胃及肝腎ヲ

温其功散寒温中燥濕解鬱下氣諸主治スル所ハ皆此ヨリ致ス且吳茱萸、獨氣分ヲ行ノニテス。血分モ亦温行セシム逐風邪開腠理ハ辛

温ヲ以テ也。主咳嗽濕痰冷痰ノ結鬱ヲ去消食温胃故也殺蟲毒苦辛味烈ヲ以テ治牙蟲勞蟲惡毒蟲開胃氣血痰冷濕ノ雍鬱ヲ開散ス

化滯尤氣分ノ滯積ヲ驅兼血滯食滯ヲ化ス凡苦ハ疏辛ハ散温ハ開行ス故茱萸苦辛温ノ烈ヲ以テ一切ノ雍鬱積滯ヲ化ス心腹絞痛寒濕

ノ結滯二因テ腹絞痛氣滯氣逆二因テ心痛者ヲ治ス熱痛症ハ鬱酌スレ霍亂轉筋温胃散寒濕下氣故也腰脚軟痛或寒或濕或濕熱鬱

肝腎足陽明經腰脚或軟弱或疼痛者ヲ治ス冷痺去冷熱開氣血雍鬱也水腫茱萸ハ雖非利水道温肺胃散寒燥濕故ニ此功アリ陰痿

肝腎ヲ温テ去寒濕故ニ陽事ヲ起ノ功アリ大便氣秘痞滿欬逆膈咽不通茱萸温胃下氣功速也東垣曰泄其逆氣用之如神上益寒氣

寒中焦腹滿膨脹逆氣填上焦咽膈不通者用之功アリ速テ吞酸寒熱ノ二因アリ胃寒者用之頭痛胃寒ノ逆厥二因者及足陽明經ノ風

寒二因者ヲ治ス陰毒陰寒毒攻腸胃心腹如切痛面青手足逆冷者ヲ治ス疝氣利氣滯寒濕ヲ温散也血痢寒瀉此亦温胃温行氣血除寒

濕也熱瀉熱痢者ハ勿用婦人產後餘血病產後ノ餘血ニ因テ心腹痛

及身體痛痺ヲ致者用之血積滯之溫行腸風寒濕熱二因下
 血者用之痔疾肝腎ノ寒濕熱ヲ去故也喉舌瘡集簡方治口瘡
 疔瘡未醋調塗足心一夕愈下此茶葉性熱多引熱下
 行ス内經從治ノ理ト昂○茶葉ノ苦辛熱尤烈ノ味之刺舌散寒燥濕
 開胃下氣利結功皆一片ノ輕浮ニ非ス寒濕熱氣痰等ノ深留滯
 隱沈者ニ透ニ其底ヨリ散開温散ス其勢實ニ烈故ニ過多則衝眼脫
 髮損元氣辟鬼邪吳茱萸懸屋
 辟鬼疫補頭辟惡氣禦冬寒
 中逆氣滿 使藥 毒 散寒温中燥濕解毒下氣去
 塞要藥也 使上ス 氣不足者禁用 多服則傷神走氣
 動火昏目發瘡 畏惡 附方 噦氣胃敗目ノ
 命兩喉不通 閉口者有毒禁用惡丹 虛寒氣逆上
 ノ噦氣數ノ聲難得息者吳茱萸醋炒熟陳皮附子各一 爲末煎湯
 九梧子大生姜湯ニ下ス此方ヲ不止灸期門關元腎腧穴出仁存

方 閉口者有毒勿用陳之良去六陳ノ一也○枝ヲ去熱湯ニ浸
 テ苦雜黃汁ヲ揉洗去テ七次ノ晒乾剉焙テ用葉 辛苦 治霍
 亂下氣止心腹冷痛大寒犯腦頭痛枝治大小便不通根及白皮殺
 蟲治喉痺效逆泄瀉宿食牙蟲痛寒腹痛痢疾漆瘡婦人產後餘血病

茶茗葉 苦寒○清頭目下氣疏食消酒毒除熱痰止煩渴利小便
 令人以睡治頭痛吐風痰解炙燂毒治冷熱痢△早采爲

茶晚采爲茗○機曰茶體輕浮采摘之時芽葉初萌正得春升之氣
 味雖苦而氣則薄乃陰中之陽可升可降利頭目蓋本諸此時珍曰
 瀉茶能令人吐乃酸苦涌泄爲陰之義非其性能升也上愚按清茶
 少服則升之能降清頭目下氣疏食消酒熱除熱痰治頭痛益味苦

性寒ナルヲ以テリ。濃茶多服則苦寒損胃冷腎而中下焦氣不行反滯食重酒濕致嘔吐胸腹滿小便頻澀大便澀為甚則體瘠黃或水腫攣痺體重患アリ皆苦寒降下ノ氣味ヲ以テリ故ニ真茶少藥劑ニ入用則清頭目下氣右ノ效ヲ致ス無病人及胃氣不健腎膀胱ノ冷虛者常ニ嗜好テ日夜ニ服ノ間ナク食前空腹ノ別ナク老嫗小兒ニ服ノ濃ヲ以テ喜トシ多ヲ樂トスル者ハ損生ノ道習俗ノ難改弊也時珍曰茶之害也民生日用踊其弊者往往皆是而婦孺受害更多習俗移人自不覺爾况真茶雜茶更多其為患也又或勝言哉人有嗜茶成癖者時時咀嚙不止久而傷營傷衛血不華色黃瘁痿弱抱病不悔尤可嘆惋清頭目涼熱下氣故ニ此功アリ川芎薄荷等ノ辛散ノ清頭目義ト不同下氣苦ハ泄テ其下下行也疏食味苦ヲ以テリ庶胃氣健且熱食滯ヲ疏レ中焦寒虛ニ有ニ茶ス消酒毒酒熱ノ毒ヲ消スルニ生姜ト同煎メカアリ姜ヲ以ハ酒濕ヲ散シ茶ヲ以ハ酒熱ヲ解也除熱痰苦疏痰寒涼熱也寒痰者ニ反テ害ヲ致ス止煩渴胃腎ノ實熱ニ因者用之利小便腎膀胱ノ熱實氣逆ニ因テ小便不利者用之令人少睡凡夏暑時ニハ人氣倦テ睡易冬寒時ニハ人氣清爽テ睡難茶氣味苦寒ニ胃腎ヲ涼則氣化清爽テ睡ヲ以ス頭痛下氣清頭目也吳瑭曰同芎藭葱白煎飲止頭痛吐風痰濃煎多用吐風痰解炙燻毒汪頴曰一人好燒燻炙燻日常不缺人咸防其生癰疽後卒不病諒知其入每夜必啜涼茶一椀乃知茶能解炙燻之毒也此亦苦寒ノ氣味ヲ以テリ冷熱痢生姜ト同煎服ノ冷熱不和之泄痢者及暑濕酒毒ノ瀉痢ヲ治ス蘇東坡用此效ヲ得○以上ハ此藥劑ニ配合スル功ヲ云彼常ニ嗜好

毒 多服則損胃冷腎令人瘠去人脂令人不睡種種內傷ノ病ヲ致ス○酒後及湯太過

服則損胃腎致腰脚冷痛水腫癰痺○脾胃虛者○陽氣下陷者○
下焦冷虛者禁用○空腹二服スルヲ忌腎胃ヲ寒虛セト濃冷茶ハ
聚痰茶ハ薄熱ノ服ス夕宜トス○空腹入鹽飲
茶直入腎且冷胃此引賊入室ト同尤禁セヨ

畏惡

身重○土茯苓
樵ト同食命人

威靈仙ヲ服者ハ

修治

新芽始テ發ノ長三四分許如針者味甘少
苦芳太苦カラス澁カラサル者ヲ上品トス入藥

異之味苦澁芳ナク大葉者ハ不堪入藥○常二服者ト雖其味苦澁ノ

雜茶ハ絶テ勿飲本邦愚俗ハ平常食飲者精粗ヲ擇リナク惟價ノ

輕ヲ以テ喜求口ニ病アル時ハ患苦テ擇醫請治悞トスレ金銀何ノ

要シヤ飲食何ノ供シヤ皆生命ノ具ニ非ヤ病テ醫藥ヲ擇求ヨリ人平常

食飲ノ上品精物ヲ擇テ多少宜ヲ得ヲ以テ要トセハ病不生生スレ

淺メ治レ易醫ハ藥ノ精粗ヲ擇者間アリト雖凡衆人ノ食飲精粗ヲ

擇者アルトハ故世ニ大病多ク且治レ難者ノ多所以ナリ

柳葉

清苦温○治噦逆要劑也○柳葉澁苦温ニ下氣澁氣治噦
逆咳逆能降衝逆氣者也夫噦逆ノ症諸因アリテ不同脾陰

不足ニ胃火暴逆ノ致者アリ精血不足ニ腎火衝逆ノ致者或胃寒或

腎寒因元氣不足陰邪衝逆ノ致アリ或痰氣過清道神昏ノ氣衝逆ノ

致アリ故古人治噦主柳葉或佐生姜或加丁香或加人參或佐良姜

或以滋陰降火不同者ハ其因症各異故也然ト雖凡治噦入法以温

爲宜或熱逆者ト雖凡以温從治ノ效ヲ致ス噦ノ逆スルノ氣其勢烈ノ

猛也苦寒降沉劑ヲ用則其衝逆ノ氣ト相爭拒テ收テ得カタレ内經

ノ法輕ハ逆治レ重ハ從治ス噦ノ衝逆猛烈者多ハ從治ニ宜トス然必温

法耳ニテ涼法ナトスルニ非ス學者陰陽虛實寒熱輕重ヲ

辨ノ一隅ニ執スルヲ勿レ臨機執中ハ醫家ノ要道ナリ

修治

柳類
甚多

藥入六方稱之宜之蓋去蒂到其儘用

枇杷葉

苦甘微辛小冷。下氣除熱順痰治嘔咳。口乾渴疾。胸面上癢解暑毒療脚氣。血。葉形似琵琶故以亦从

比从巴。枇杷葉能下氣除肺胃熱氣。下則火降痰順。逆者收。故嘔噦咳嗽。治スルニ要トス。治口乾渴疾。面胸熱瘡。酒查鼻者。涼肺。胃熱下氣也。解暑毒亦下氣除熱也。療脚氣下氣除肺胃熱也。益胃。主四肢足陽明經。主宗筋會故也。止衄血不止者。肺氣乾。鼻二開胃經。八鼻蓋二起。枇杷葉涼肺胃熱下逆氣故也。

總論

此が主治スル所ノ功ハ逆氣ヲ下

毒

陽氣下陷者。肺胃有寒者。勿用。

修治

五月。二利。

葉ノ裏ノ毛ヲ小刀ヲ以テ去テ粗布ニテ拭淨シ水ニ入テ洗復綿ヲ以テ拭淨復甘州煎湯ヲ以テ洗フ一遍復綿ニテ拭乾シ到テ焙用

治胃病。姜汁ヲ塗。治肺病。蜜水ヲ塗。大抵生葉一收。輕一兩者。乾之。三葉一兩重者。多以テ用。藥尤功カアリ。枇杷葉ヲ製スルニ惟能毛ヲ去ベシ毛ハ人肺ヲ傷テ咳嗽不止ヲ致ス。實。止渴下氣。利肺氣。止咳。逆。注。上焦熱。滯。五藏多食。傷肺。發痰熱。同。灸。肉。熱。野。食。令人患熱黃疾。花。同。辛。夷。等。分。研。末。酒。服。治。頭。風。鼻。流。清。涕。木。白。皮。治。吐。逆。不。下。食。



楊。木皮煎洗惡瘡。疥癬。瘡。蟲牙痛。服解砒石毒。梅。燒灰油調塗。湯火瘡。實酸甘温。鹽。食。去。痰。

下氣止嘔吐。消食下酒。蒸。曬。乾。末。臨。飲。酒。時。服。方。寸。匕。止。吐。酒。止。渴。和五藏能滌腸胃除煩懣。燒灰服。止下痢。久食。反致。痰。發。瘡。熱。損。齒。及筋。忌。生。葱。同。修治。此が子形似木楊子。味酸。似梅。故號。楊梅。食。核。仁。治。脚。氣。皮。樹。皮。ヲ。剝。取。粗。皮。ヲ。去。テ。剉。焙。用。或。根。皮。ヲ。

毛用○揚梅皮ハ皮厚者ヲ用テ良トス

蓮肉

甘微瀋温○補中養神益氣力交心腎厚腸胃固精氣除寒
濕熱治泄痢腰痛泄精赤白濁女人血崩諸血病○蓮ハ

淤泥ニ生ノ然モ泥ニ不染水中ニ居ノ然モ水ニ不没中通外彫ニ不變
不枝清香芳遠也其實黃ニ青青ノ緋綠ニ黒ク中ニ白肉ヲ含肉ニ

青心ヲ隱ス乾ニ至テ堅剛ナル如石永久ニ不腐生意ス心ニ生ノ復
蘇生ス生生造化ノ不息者也且甘與温俱所欲脾胃所以生氣也故

能中焦脾胃中和氣ヲ補脾胃土ハ在中宮水火ノ所交金木ノ所合
上下ノ所通元氣ノ母榮衛津液ノ源タリ故養心交通心腎二氣上下君

相火邪ヲ安靖益氣力助精血古人愛蓮論君子此力實功不偏不
奇致中和義知ヘシ厚腸胃泄瀉久難止者痢疾久不愈者脾胃ノ氣

ヲ補腎氣ヲ固腸ヲ澁テ止固精氣夢遺精滑症心腎二氣不交通
土不足ノ水モ亦不固者用之交上下補土水固則精道自持テ澁

ザレ也且蓮肉甘温中火瀉ノ熱腸澁精ヲ能止泄痢精滑ニ功アリ又小
便赤白濁女人赤白帶下血崩諸血病ヲ治者心腎ヲ交通ニ下氣

ヲ固澁ニ補土水固ニ因方彼清心蓮子飲及瑞蓮丸治心腎益精血
療白濁精滑夢遺者皆是也且蓮肉ハ除寒濕熱ヲ以テリ益運ノ水

泥ニ生フ泥ニ不染水ニ不没其性温ナルヲ以テ中下焦ノ寒濕熱ヲ除ノ
義アリ○或問蓮肉ハ氣血兩分ノ補劑タルカ上中下ニ焦ノ藥タリヤ曰此

ガ水泥ニ生ノ亭ノ直立スルヲ以ハ實ニ中焦胃氣ヲ補ヘシ且此ガ氣性
ノ善テ水泥ニ生スルヲ以ハ實ニ下焦腎氣ヲ助ヘシ且其泥底ヨリ生立ノ枝

ナク不曲高透テ達スルヲ以ハ上焦心氣ニ通シ其淤泥ニ不染ヲ以ハ實ニ
心氣ヲ澁スベシ然則心胃腎ノ氣分ヲ補助シ心腎兩氣ヲ交通セシムルノ

要劑也然用ニ焦ノ劑ニ非ス中焦胃ノ良劑トスヘシ何知トナレハ此カ中通

之不滯直之不積不枝一蓮淤泥不潔水中不沒其實永入之歷生

意之不失者八皆此土氣中和ヲ得テ不偏不奇五土ノ生化ヲ洽

スク義ニ非ヤ故中焦ノ本藥トス彼止瀉劑者ハ尤交心腎上ヲ補

下氣ヲ固スルニ因ト雖此カ甘中ニ少瀉ヲ入ルヲ以テ止瀉ノ義ヲ致テ也

使藥

得茯苓山藥白朮枸杞子良姜

毒

大便閉澀者勿用。特食微冷動氣之劑ス

畏惡

使去心用。心ハ金人作

附方

反胃吐食蓮肉爲末入以肉豆蔻末米湯調服出直指方

愚按

大明日蓮實止瀉去熱上此蓮實ノ青心

修治

蓮實至秋蓮房椀子黑堅ノ如石者石蓮子ト號用藥功力アリ兩ニラリテ暫水浸外黑殼ヲ去次ノ赤皮ヲ去中

生スル木實ニ石蓮子ト號者アリ不宜入藥出時珍及蓮實蓮肉中ノ

苦寒○治產後血暈霍亂瀉心去熱張上舍治勞心吐血用蓮葉七箇糯米九一粒爲末酒服醫林治小便數遺精蓮葉一握爲末入辰

砂一分每服一錢白湯下蓮花苦鎮心益顏色身輕惟難產治墮

損嘔血七月七日七分二開者ヲ采蓮葉甘清心通腎益血

烏髮止血崩吐血治痔漏泄痢花中ノ蓋ヲ采陰乾ニス蓮房苦

肝經血分之劑也消痰散血治血脹腹痛經血不止血淋血崩下血

瀉血解毒采テ陰乾ニス陳久者良上

荷葉 苦平○生發元氣補助脾胃滋精滑液散瘀血消水腫癰腫發

痘瘡治吐血咯血衄血下血溺血血淋血痢崩血產後惡血

血脹腹痛損傷敗血產後口乾心肺躁煩下胎衣荷葉胎殺毒

△嫩葉ヲ荷鏡ト號貼水者ヲ藕荷ト號出水生花者ヲ支荷ト號葉ノ

蒂ヲ荷鼻ト號俱ニ皆劑ニ入用○荷葉ハ水土ノ下汚穢ノ中ニ生シ挺然

トノ獨立ニ其色青其形仰テ且廣其中空ナル震卦ノ體ヲ象震動也
陰中ノ陽氣自下生發升達セント欲ス少氣也藕ノ泥中ヨリ直ニ生ノ細
高其葉ハ廣開テ仰其色青ハ東方生發升達ノ木少陽ノ氣震卦ニ非
ヤ故此ヲ人ニ用則足少陽膽木ノ氣ヲ生化シ人手少陽三焦元氣ト命
テ胃氣ヲ上行生發セシム潔古先生口授東垣枳朮丸ヲ荷葉飯ヲ爲
先者理是也白朮神中者上荷葉升發者ト恠乃滋養スハ金匱厚
不致内傷其利廣矣大

以上八東垣先生ノ言ヲ
主トシ愚ガ管見ヲ雜ユ

毒

單多服
令人瘦

畏惡

畏桐油伏白
銀硫黃毒

附方

金南

歐痘瘡已出ハ風寒ニ應テ毛竅閉血凝テ痘頂陷黒色ニ變者ヲ倒靨ト
名身痛手足冷ヲ治ス霜后荷葉如氷背紫者炙乾白僵蠶直者炒去
糲等分爲末每服半錢胡荽湯或温酒下出證治要訣陽水浮腫敗荷葉餅

存性末每服一錢米飲下出證治要訣產後因惡血心腹痛及胎衣不下

者荷葉炒香末方寸匕沸湯或童便下或燒灰或煎服出證治要訣

修治
旺血略血荷葉焙末米湯下出證治要訣血痢不止荷葉蒂水煎服出證治要訣

生者ハ洗淨シ其儘用或焙或燒灰用久貯則洗淨シ陰乾ス出證治要訣荷葉飯

出穀部藕根甘微冷忌鐵器○心脾血分之藥散留血治產後血悶

金瘡傷折止怒止泄消食解酒毒病後乾渴霍亂後虛渴除煩開胃

止暴痛解蟹毒破瘀血要物也○凍瘡裂坼者藕根蒸熟搗爛塗○

藕根不得鹽損人口○今ノ愚俗謂藕發三年病ト此能散瘀血則瘡

家反テ眞食之俗家恐テ瘡家忌食之者ハ何ヤ○或生シ搗汁ヲ取

用或曬乾末ノ用藕密五六月嫩時利用甘平○生食治霍亂後虛渴煩悶

不能食解酒食毒下瘀血老根ヲ藕ト號嫩根ヲ密ト號藕節温冷○治吐血衄血不

止消瘀血解熱毒產後血悶止效血血淋瀝血下血血痢婦人

血崩藕汁藕根搗爛取汁冷血熱止出血或和生地黃汁服效

和語本草

和語本草

芡實



甘澁平。治濕痺腰脊膝痛止。澁治小便不禁遺精白濁。

愚按

芡實八食用ノ

品也。劑藥二用。一必治小便頻數遺精四精。凡三有芡實。治小便濁病。分清丸。三有芡實。皆甘澁ノ氣味。以之澁ノ用。三取ノ三本經曰。補中益精。氣強志念耳自聰明。久服輕身不饑耐老。神仙曰。華曰。助氣。此亦甘澁ノ氣味。以之。然。凡直三補中益腎者。二非不充。入服過食。ス。勿レ。弘景曰。小兒多食。食不長。說曰。生食多動風冷氣。宗爽曰。食多不益脾胃。兼難消。或作粉食。八。取中氣。三。

修治

利

蒸熟烈日三晒乾。裂取仁。春三。作粉用。澁精藥中。入二。殼俱二。

枳椇子



甘平。解酒毒。止煩渴。去膈熱。利二便。潤五藏。辟蟲毒。和謂ケ。ホ。梨是也。酒毒ヲ解ス。一。

此三勝者。ナ。屋內ニ此水ノ。酒變水。愚采之。浸酒中。二宿。ノ味。酒味ヲ失テ全。清水ノ如シ。實ニ解酒毒。功神。ナ。ト云ベシ。丹溪薛已常用。治酒病。今人遇酒。病葛花等ヲ用。凡此カ酒病ノ要劑。タルヲ知者。必シ多食。ハ發。蚊虫。ノ梨。テ其儘。判用。此カ木汁。治腋臭。木皮。甘温。治五痔。和五藏。

果之部附録

李實

苦酸甘。微温。

晒食。去痼熱。及骨間勞熱。調中。

味苦澁者。不沉。水者。勿食。多食。致腹脹。虛熱。

水食。發痰。癰。霍亂。雀。蜜。茶。白。木。

核仁

苦平。

治跌折。瘀血。骨痛。女人。小腹腫滿。利小。

便。治浮腫。去面黥。

根白皮

甘苦。

治心煩。腎積。消渴。脚氣。小兒丹毒。

赤白痢。女人。赤白帶下。

花

香。苦。

去面黑子。葉。甘酸。治小兒痞滿。驚。

癩。煎湯浴。膠。苦。去目翳。定痛。消腫。

巴且杏。甘温。止欬。下氣。消心腹逆滿。

此今謂ア。メ。ダ。ウス。也。

柳梅實。甘酸。生津。止渴。清神。下氣。消酒毒。

栗實 温 益氣厚腸胃補腎命人耐飢生食治腰脚不遂生嚼塗筋骨

碎腫痛瘀血 腫食有補益生者滋難化熟食滯氣膈 薄皮名栗茨

甘瀉 搗粉和蜜塗面去皴燒存性末吹咽治骨鯁 栗殼治反胃消

渴止血瀉血 毛毬煎洗丹毒 樹皮洗瘡毒五色丹毒 花治

癩癧 根治癩疔酒煎服

天師栗 甘 久食治風癱

苦棗 苦大 治傷寒熱伏藏府在躁煩滿二便閉澀取肉煮研和蜜丸服

仲思栗 甘 温 補虛益氣潤五臟去咳嗽冷氣久服令人肥健

梨實 甘微 治風熱潤肺涼心消痰降火解瘡毒酒毒治胸中熱結心

煩喘嗽熱狂二便熱閉驚熱傷寒熱發中風不語止渴貼湯火傷止

痛不爛 血虛脾胃冷者勿食生多食致冷痢 花去面黥 葉止

霍亂治風及小兒寒疝解菌毒水毒 木皮解傷寒瘟疫結氣

鹿梨實 酸 熨食治痢 木皮煎洗瘡疥

棠梨實 酸 止滑痢 枝葉治霍亂轉筋腹痛壯食

海紅子 酸 海棠梨也治瀉痢

檀子 酸 治痢去惡心咽酸酒痰黃水治霍亂轉筋功近木瓜多食

傷氣損齒及筋

檳榔 酸 解酒毒去痰治惡心酸心痢疾霍亂轉筋 此亦木瓜

温梓 酸 温中下氣消食除潮間酸水止渴去煩散酒氣治水瀉多

發毒熱秘大小腸聚胸痰 木皮 熨未傳瘡

菴羅果 温 止渴調血脉通女子經閉 多食動風疾時疫後飽食

柰實 苦 補中焦治卒飽氣壅不通者益心氣生津止渴多食肺壅腹

脹有病入尤甚禁

林檎 酸 下氣游痰治霍亂腹瀉消渴水痢泄精小兒頭髮堅黃瘦

弱多食弱百脉發熱冷痰滋氣生瘡命人好睡煩心○根治蛇蟲消

渴好睡

烘柿性寒○生柿性寒通耳鼻氣治腸胃不足壓胃間熱止口乾續經

脉氣生者多食腹脹致疾日乾者多食○白柿性寒補虛勞消宿血

滋腸健脾胃消痰止渴潤心肺治咳嗽止血療口舌瘡痛○烏柿性寒

殺蟲療金瘡火瘡生肉止痛止痢止口苦嘔逆○酸柿性寒治下焦健

脾胃消宿血○柿餅小兒食治下痢下血

柀柿性寒去石藥熱利火毒除胃熱止煩渴潤心肺久食寒中入

君遷子性平止消渴去煩熱鎮心令人輕健

安石榴性酸多食損肺及齒成痰服藥物人忌食之治咽喉

燥渴○酸石榴性酸治瀉痢腸中帶下○酸榴皮性酸止瀉痢下血脫

肛崩血帶下筋骨風痛腰脚不遂行步掣痛點目止淚下蛇蟲○根

止瀉痢帶下治蛇虫寸白口齒病功與皮同○花陰乾治心熱吐血

末吹鼻止血千菓者良

柑實性甘利腸胃熱毒解疔石熱毒止暴瀉利小便燒存性末溫酒下

治難產核作面藥○皮性酸治耳流水

橙性酸相鹽蜜食止惡心行風去毒癩癬殺魚蟹毒○皮性苦辛散腸

胃惡氣消食下氣解酒去痰橙實皮八分○核性平去面黧

柚性酸消食解酒治孕婦不食口淡○皮性平下氣消食化痰快痛入

藥○葉治頭風同忍白痔貼大腸疝○花作面藥長髮潤燥

栲櫟皮性辛酸下氣除胸痰治咳嗽心氣痛○根葉同皮

金柑性酸下氣快膈止渴解醲

櫻桃性甘調中益脾止泄精水敷痢多食致吐逆熱病傷筋骨○葉性平

汁塗蛇咬傷○根下寸白蟲○枝性平面黧○花去面黑粉滓

山櫻桃 辛 止泄痢除熱調中益脾止疝精

銀杏核仁 甘苦 熟食溫肺益氣定喘嗽小使止白濁生食降痰解

酒消毒殺蟲醫塗疥癬陰囊肺經氣分之藥也多食致腹脹壅氣動

風小兒多食發驚引疳同鰻鱺食患軟風

胡桃核仁 甘溫 補氣養血潤燥化痰益命門利三焦溫肺潤腸治虛寒

喘嗽腰脚重痛心腹疝痛血痢下血散腫發痘制銅毒黑髮多食利

小便去痔治淋令骨肉油膩令人肥健多食致風痰吐水吐

○油胡桃 辛 殺蟲攻毒 腫癰風疥癬楊梅瘡白禿諸瘡潤髮

○胡桃青皮 苦 深澀及帛皆黑 ○桐皮 止水痢浴頭黑髮

榛仁 甘 益氣力實腸胃止飢調中開胃

阿月渾子仁 溫 治諸痢治腰冷陰冷房中術多用之 ○木皮 辛大 浴陰

萎囊濕疥癩核

楮子仁 微寒 破惡血止渴及瀉痢 ○皮葉 止產婦血燥葉貼瘰癧

鈎粟仁 甘 多食不飢厚腸胃令人肥健

橡實 苦微 止飢禦飢嚴止瀉痢厚腸胃令人肥健 ○殼 溫 止瀉痢下

血崩血帶不添髮 ○木根皮 苦 洗惡瘡因風露致腫者止痢消瘰癧

檲實仁 苦 澀腸止痢 ○葉 治痔止血利小便止渴治血 木皮 苦 除

蟲洗惡瘡止赤白痢下血治癩癧

荔枝實 甘酸 治煩渴頭重心燥背膈勞悶通神益智健氣治癩癧

赤腫疔腫發小兒痘瘡多食致害火病人尤忌 ○核 溫 治心痛小腸

疝痛癰疔婦人血氣痛 ○殼 解熱治痘出不快 ○花根皮 治喉痺

橄欖實 甘 溫 消酒毒解魚毒沙豚毒開胃下氣生津止渴治喉痛 ○仁

甘 傳唇治燥痛 ○核 甘 治滑癭瘰癧瘡下血

木威子 酸 治心中惡水水氣

番摩勒實甘治風虛熱氣補氣制金石毒生髮

毗梨勒實甘微煖腸治風虛熱氣去冷氣下氣止瀉痢黑髮

五飲子甘酸去風熱生津止瀉

五子實甘治霍亂金瘡

榧實甘常食治五痔能殺蟲治咳嗽白濁助腸道多食明目輕身

助筋骨亦不發病多食反藜豆殺人

海松子仁治骨節風頭眩去灰肌散水氣補不足潤五藏温腸

胃久服延年不老多食發熱

椰子實氣治風漿肉空處有積甘温止消渴塗髮黑治吐

血水腫風熱多飲根皮苦止血治霍亂吐逆卒心痛殼治楊梅

瘡筋骨痛燒存性炒液酒泡服二三錢暖覆出汗痛即止神驗

無漏子温補中益氣治咳嗽補虛損消食令人肥健

桃心子平破瘀血作粉甘平補虛損治腰脚無力輕身辟穀

蘇木温補虛冷消食久食不長生

波羅蜜酸平止瀉解煩醒酒益氣仁補中益氣令人不飢

無花果平治諸痔開胃止瀉痢治喉痛葉微熏洗痔痛

阿勃勒子苦大治腸熱風骨蒸下痰通經絡療小兒疳蟲疳熱

沙棠果平却水病

椰子平生食止水痢熟和蜜食治嗽

鹿目酸甘多食發冷痰

都桐子平益氣止瀉安神治痔解酒止煩渴

都念子小温治咳嗽殺氣除腹藏益肌肉

却成子平止渴潤肺去煩除痰去積寒滯效逆上氣同功

摩厨子平益氣潤藏安神養血生肌久服輕健

韶子 甘 治暴痢 心腹冷氣

馬檳榔 核仁 苦甘 治難產 久服子宮冷 不孕 治傷寒熱痘瘡腫

秦椒 温 除風邪 温中去寒 痺 堅齒 髮 明目 治喉痺 吐逆 痲瘋 去瘀血

治產後餘疾 腹痛 出汗 利五藏 治欬嗽 血痢 久痢 女人經閉 產後瘀

血痢 腹中冷痛 下腫 濕氣 修治同蜀椒

蜀椒 温 入肺散寒 入脾除濕 入右腎補火 温胃消食 治欬嗽 風寒 濕

痺 水腫 瀉痢 陰痿 溺數 腰足弱 泄精 腹內冷痛 解爵結 通三焦 殺

蟲 開胸膈 破瘀血 治瘰癧 乳疔 下氣 治頭風 目淚 瘡大風 汗不出

逐骨節 風寒 濕脚 膝理 下惡氣 用藥去且 閉口 者勿用 殺火 微炒 下

冬花 附風 附子 雄黃 多食 損氣 傷心 失目 動傷 血脈 命 椒目 苦辛

入健忘 生火 於水中 腎弱 虛寒 者用之 引上逆 歸經 椒目 寒

下水 燥濕 定喘 治水腫 腹滿 下氣 補腎 治腎虛 耳鳴 葉 辛 治腎積

虛冷 癆血 淋 邑 清者 勿用

檉椒 辛 治肺氣上喘 欬 息 咳

薑椒 温 治風寒 濕痺 歷節 痛 根煎 浸 痔 枝 葉煎服 治水腫

地椒 辛 淋 腫 痛 殺蟲 除牙痛

胡椒 温 夫中焦 寒痰 除 物胃 寒濕 下氣 快膈 治胃寒 吐逆 大腸寒

泄 冷積 陰毒 牙齒 浮熱 痛 冷痢 腎冷 心腹 寒痛 宿食 霍亂 寒厥 殺一

切 魚肉 毒 癆 腸胃 去寒 濕 要物也 氣虛 血虛 熱病 目病 及 咽喉 口 齒

煎火 發瘡 損

畢澄茄 温 下氣 消食 治皮風 心腹 氣脹 辟鬼 氣 治一切 冷氣 痰 癆 霍

亂 腹痛 腎膀胱 冷氣 暖 脾胃 止嘔 吐 噦

山胡椒 辛 大 治心腹 冷痛 破滯 氣

食茱萸 辛 苦 大熱 治水氣 心腹 冷氣 痛 中惡 欬逆 冷痢 帶下 消食 殺 腫物

胃燥濕功同吳茱萸力峻劣爾畏紫石英發不瘡忌脾火日病

鹽麩微寒降火化痰生津潤肺止痢收汗治風濕眼病止渴治痰

嗽酒毒痰癰喉痺○樹白皮破血止血殺蛇蟲治血痢○根白皮治

酒疸宿煎空心湯服醋濃煎服骨癭

醋林子溫治久痢痔漏下血心腹蛇咬痛寸白蟲小兒疳蟲諸症醋

藏者生津多食令人舌粗折也

茶子寒下氣去痰治喘嗽痔仁洗衣除油膩

旱蘆葉苦止渴明目除煩消渴利水治淋病頭痛令人不睡胃冷者

甜瓜甘寒消除煩熱利小便通二焦壅氣治口臭瘡解暑邪勿

致病百端尤反胃脚氣氣虛者忌食之同油餅食發病○子仁甘破

腹內膠血治內癰止月經太過清肺潤腸和中止渴去口臭腰腿痛

壓乾細篩什粉○瓜蒂除陽明經濕熱吐胸膈痰涎治頭目

草天酒服○花治心痛效逆○葉去瘀血治小兒疳打傷損折為

朱酒服擗花塗生無髮

西瓜甘淡消煩止渴解暑熱下氣降火利小便治血痢酒毒喉痺口

瘡同油餅食損脾多食致害不少○皮甘燒末噉口舌唇內瘡

蒲葯甘酸利小便逐水治筋骨濕痺淋疾煩渴多食空煩○根寒

利小便消腫滿止嘔噦霍亂後惡心孕婦胎衝心治腰脚痛煎洗

黃蘗甘酸止渴益氣○藤甘止渴利小便止傷寒後嘔噦○根治下

焦熟痛淋閉消腫毒

猴桃酸甘治煩渴熱淋骨節癢風非胃實熱者勿用之○藤中汁甘滑

汁治反胃又下石淋○枝葉殺蟲

藤中汁甘滑

藤中汁甘滑

辨故二略之不載時珍曰方冊所記諸果名品甚多不能詳其性
未狀既列于果則養生者不可不知因略采附以俟上時珍
詳雖如此形狀性功不明者不足述云爾



廣益本草大成卷之十五

