


體俚諺鈔
前集
卷八九

1-9
822
9



門 9
號 822
卷 9



增補廣類願體俚諺鈔卷八目

第一

醫藥章

一葉

三段

增附驗方

四葉

八十一方

頤豐集印解卷八

增補廣類願體俚諺鈔卷八

○楊梅瘡ハ皆風流ニ因テ致ストコロ。間染觸ル_レ有
 テ得ル者ハ百ニ一ニモナシ。若コレヲ治ムルニ其法ヲ
 得ズンバ。但一身ノ害ヲナスノミニアラス。且殃妻子
 ニ及ンテ甚ダ_ク迹ヲ嗣_ガサルノ嘆キアリ。然レ_モ凡治スル
 所ノ法各不同アリ。其毒ヲ遏抑_スヘテ出シメサル者ア
 リ。行藥ヲ重用テ其毒ヲ行去スル者アリ。升生ノ劑
 ヲ用テ其毒ヲ發出スル者アリ。解托ノ劑ヲ用テ其
 毒ヲ敗リ去ル者アリ。四_ツノ者ノ中。惟升生解托ノ二_ツニ
 從フベシ。遏抑_スニ出サ_レルニ至テハ。將來必結毒ニ
 至ル。行藥ヲ重用_スレバ。勢必大ニ元氣ヲ傷ル。余一方ア

リ。藥數味ニ止ムル。既ニ行藥解托ニアラス。更ニ平和ナルコトヲ覺フ。且新久ヲ論スルコトナク。二十劑ナラスレテ。能功ヲ收。獨リ永ク後ノ患ヲ除ノミニアラス。更ニ且生育ニ碍ナシ。但功ヲ收ノ後。視テ容易ナリトシテ。又復ビ情ヲ恣ニシ。慾ヲ縱ニセシコトヲ恐ル。豈紂ヲ助ケテ。虐ヲナスニアラス。是誰か過ゾヤ。余狂道ニ依テ。前非ヲ慚ミ改メ。善事ヲ廣行ヒ。天地ノ惡浮ヲ挽キ。父母ノ遺體ヲ保チ。自己ノ罪孽ヲ免レ。子孫ノ福壽ヲ培ベシ。得ルトコロ。易ク多カラスヤ

當歸 五錢

淨銀花 三錢

防風 三錢

荆芥 三錢

何首烏

鐵器ヲ經ス。木棒ヲ以テ。打碎キニ三錢

肥皂子 九個打碎

猪胰一副

土茯苓 磁鋒ヲ以

テ。皮ヲ刮去リ。木棒ヲ以テ。打碎テ四兩

河水六碗ヲ用テ。沙銚ノ内ニ煎ジ。三碗ニ至テ。每日空心ニ午飯後晚飯前各温メテ。一碗ヲ服ス。鹽醬醋茶雞魚鵝鴨蝦蛋鮮物ヲ忌。葷ナル時ハ止。土茯苓煨猪肉ニ宜シ。素ナル時ハ止。白菜及豆腐ニ宜シ。他物皆忌トコロアリ。土茯苓ノ煎湯ヲ以テ。茶ニ代ベシ。更ニ妙ナリ

○醫書ニ載スルトコロ。乾霍亂ハ即チ烏沙脹ノ別名ナリ。人多ク識ズ。但北方ニハ此ヲ患ル者少シ。獨南方ノ婦女及莊村農人略風寒ニ染トキハ。則必沙ヲ刮

一タビ刮テ即愈。其應响ノ如シ。遂ニ慣病トナル。此亦
風土ノ習俗竟ニ醫藥ノ捷徑トナル。凡ソ老嫗乳媪是
其手段ヲナス。糞湯一盂ヲ用。或ハ白水ニ香油數匙
ヲ入モ亦可ナリ。蘇ヲ以テコレヲ蘸ス。刮ル所ノ處ハ乃
胸脊兩旁ノ彎。膝ノ彎。肩膂七處。現ハル所ノ色ニ紫
紅黃白ノ分。飢飽寒熱ノ別アリ。紫紅ヲ重トス。黃白ヲ
輕トトス。若シ黑色ニ係バ憂ニ重シ。必ス黑血ヲ刺去テ
而後ニ可ナリ。人四肢力ナキガ若キハ。胸腹痛疼ス
寒熱迷悶スル者ハ。此即沙ノ來ルナリ。速ニ刮ルベシ。
遲キ時ハ。脹煞ノ説アリ。余モ亦其故ヲ解セス。其經
驗ヲ詢バ。口ニ依テ筆ヲ運シ述テ以テ人ヲ曉ス。不

倭ガ妄誕ニアラス

○鼓脹ハ即單腹脹ナリ。始而止於單。是腹脹日久シ
ク治セハルトキハ。四肢浮腫。然レ疝症ヲ具ニスルニ
ニツアリ。一ハ濕熱ノタメニ感セララル。一ハ虛寒ノタメニ
致サル。但シ虛寒ノ致ストコロハ。金櫃腎氣丸ヲ服スル
ヲ妙トスルニ。過タルハナシ。濕熱ニ感セララル。ガ如キハ。
雞屎白ヲ用テ。沉香ノ色ニ炒テ研篩シ。細ニ粉ニシ
テ。一升磁瓶ノ内ニ盛テ。好皮酒一觔ニ浸シ。麩ヲ用テ。
口ヲ封ジ。三炷香ヲ煮テ。定清シ。意ニ隨テ。頃ニ温メテ
飲ベシ。或ハ眞黃ノ牛肉一觔ヲ用テ。河水ヲ以テ煨シ。
極メテ爛カシ。皮硝一兩ヲ加ヘ。意隨ニ食フベシ。二三

日其腫即消ス。至テ重キ者ハ再ビ一筋ヲ食フトキ。則全ク愈。百日ノ内酸醜ヲ食フ一ナカレ。兼テ冷麩食葷腥油膩粘硬ノ物ヲ忌ベシ

○增附驗方

○膈食方 白キ鳳仙花ノ子三合ヲ取テ。黃色ニ炒テ粉トナシ。毎服三錢好酒ニテ送下ス

○膈氣神驗方 壁虎二條ヲ取リ。雌一ツ雄一ツ先小キ竹筒二箇ヲ脩ヘテ眞麻油ヲ内置キ。壁虎ヲ入レ浸ス一宿シテ。古キ瓦ノ上ニ在テ。慢火ニテ炙リ脆シ。未ヲ取リ一錢ゴトニ麝香三分ヲ加ヘテ勻和。毎服只一分二厘ヲ用テ。三次ニ服シ下スベシ。一次ハ五

厘。二次ハ四厘。三次ハ三厘。燒酒ニテ送下セハ。即關ヲ開。先稀粥ヲ進メ。二五日ノ後。方ニ飯ヲ吃スベシ。初起ル者ハ。一服ニシテ愈。久シキ者ハ。二服ニシテ。全ク愈ルナリ

○赤痢方 黃連。細陳茶。生姜各等分ニシテ。水煎シ服スベシ

○瘧疾方 當歸三錢。陳皮三錢。知母五錢。柴胡三錢。日ニ臨テ。河水一鍾ヲ用テ。一鍾ニ煎ジ。露ニ一宿打セテ。早晨ニ空心ニ温メ服ス。朝東ヲ須テ。渣ヲ再煎シ服ス。若隔日ノ瘧ナラバ。人參三分ヲ加フベシ

○小兒頭上肥瘡 松香。血丹等分研粉ニシ。猪板油

ヲ用テ調へ青皮ヲ將テ捲好コレヲ燃一盤ニ下シ用其滴リ下油ヲ盛テ搽レバ立トコロニ効アリ

○乳癰方 鮮蒲公引連根ヲ取テ搗テ汁ヲ取リ酒ニテ服ス渣ヲ患ル處ニ敷レバ即愈

○赤眼方 川黃連三分黃耆六分黃芩三分當歸六分防風六分胆凡三分甘草三分陰陽水各一鍾ヲ取テ水ヲ隔テ煎シ半鍾ニ至テ白棉紙ヲ以テ上ニ搽ベシ紙ノ上ノ水ヲ取テ眼ヲ淨レハ即愈

○小兒天泡瘡 蚕豆壳ノ焼灰ヲ將テ上ニ塗レハ即愈ルナリ

○絞腸痧腹中脹痛ハ生黃豆ヲ取テ嚼ベシ豆ノ腥氣

ヲ覺サレバ即是ナリ此症古廟古橋ノ邊ノ石灰ヲ取テ研末シ三錢極メテ細ニシ河水ト井水ト各一碗ヲ取テ攪タテ冷服スレバ即愈

○急喉風方 蜒蜉ヲ取テ瓶ノ内ニ藏メ烏梅ノ肉ヲ加ヘテコレヲ押バ化シテ水トナル患ル時ニ遇バ水ヲ取テ喉ノ間ニ少許ヲ滴レバ即愈如現ニ水ヲ貯ユルナクンバ即蜒蜉一條ヲ取リ烏梅一箇ヲ將テ核ヲ去テ蜒蜉ヲ包三内ニ在テ縛好シ含テ口ノ内ニ在バ氷水喉ノ間ニ流レ入レバ即愈若止喉ノ間疼

痛ハ山豆根ヲ用テ研細ニ粉ニシ喉ノ内ニ吹キ入レバ即止

ハ即止

○痔瘡大便下血ヲ治ス。槐樹上ノ木耳ヲ用テ。末トナシ。米飲ニ一錢ヲ調ヘ。日ニ二服。又痔漏ヲ治ス。蜣螂ヲ用テ。多少ヲ論セス。焙リ乾シ。末トナシ。先、白礬水ヲ用テ。洗テ貼。又槐花炒枳殼糞ヲ去各一兩ヲ用テ。末トナシ。醋糊ヲ用テ。丸トナシ。梧子ノ大ノ如シ。每服二十丸。米飲湯ニテ。空心ニ食前ニ下ス。又熏洗藥。鳳眼草赤皮ノ葱根ニ味ヲ用テ。搗キ麤シ。漿水ヲ用テ。洗シ過シ。盆内ニ坐シ。熱氣ヲシテ。痔ヲ熏シム。但手ヲ通シ洗フベシ。此ノ如クスル一二次ニ過スシテ愈。

○脫肛ヲ治スルニハ。鼈頭一枚ヲ用テ。燒キ。烟盡テ末トナシ。肛門ノ上ニ付。就テ舊麻鞋底ヲ將テ。按シ入レバ。

即チ出ズ。又蝸牛ノ殻ヲ用テ。土ヲ去リ。研テ細末トナシ。羊脂ヲ以テ。鎔カシ。化シ開キ。調ヘテ。患ル處ニ付テ。送り入レバ。即チ愈。

○赤白痢疾ヲ治スルニハ。葱一把ヲ碎キ。切り。米ニ和シ。粥ニ煮テ。空心ニ食ベシ。或ハ生薑ヲ用テ。切り碎キ。好茶ニ和シ。一ニ碗コレヲ呷。若熱痢ニハ皮ヲ留メ。冷痢ニハ皮ヲ去ル。大ニ妙ナリ。或ハ薤白ヲ用テ。醋ノ中ニ於テ。煮熟セシメ。熱ニ乗ジテ。飽マデ食ヘバ。即チ止。又腸滑久痢ヲ治ス。神妙比ナシ。酸石榴ヲ以テ。劈テ二片ニ破リ。炭ニテ燒キ。烟ヲ盡サシメ。急ニ取り出シ。白灰ト作シメス。碗ヲ用テ。地上ニ蓋ヒ。一宿シ。末トナシ。酸石榴一片ヲ以

テ。水一盞ヲ用テ。湯二煎ジテ。服用ニ一錢モ亦洩瀉ヲ治ス。
荆下腹痛肚皮熱シテ。手ヲ近クベカラズンバ。生薑ヲ用
テ。切碎キ。粟米ノ大ノ如クシ。茶葉等分ニ煎ジ服ス。或ハ
車前子微炒テ末トナシ。毎服ニ一錢空心ニ熱米飲ニ調ヘ
下スモ。亦妙ナリ。又或ハ荆ヲ治スルニ罌粟ノ殻ヲ以テ。糠
蒂ヲ去リ淨シテ。十兩分テ二分トナシ。一分ヲ醋ニテ
炒リ。一分ハ生ニテ用。一分ハ蜜ニテ炙リ。研テ細末ト
ナシ。毎服ニ一錢。紅荆ニハ生地黃茶湯ニテ下ス。白荆ニハ
烏梅甘草湯ニテ下ス。或ハ陳米湯ヲ用テ下スモ。亦効
アリ。或ハ又罌粟花未久開カサル時。外兩片青葉アリテ。
花ヲ包ム。花開テ即地ニ落收メ取テ。陰乾ニシ。赤白痢

ヲ患ヘテ。死ニ垂トスル者。研テ細末トナシ。米飲ニテ。調
ヘ下ス。一錢スレハ。立トコロニ効アリ。
○下部濕瘡ヲ生シ。熱痒シテ痛ニ。寒熱大小便澁リ。
食モ減ジ。身面微腫ルヲ治スルニハ。馬蔴苧四兩ヲ用
テ研リ爛カシ。青黛二兩ヲ入レ。再研リ勻ヘ。上ニ付ヘシ
又或ハ紅椒口ヲ開ク者。十一粒連根ノ葱白七莖ヲ用
テ。同ク水ニ煮。洗ヒ淨シ絹衣ヲ用テ。扞ヒ乾セ。ハ即愈
或ハ陰痒汗出テ疼痛ヲ治スルニハ。生大豆ヲ用テ嚼ミ
碎キ。一日ニ三四次。上ニ付ベシ。又腎ノ臟風癢疥ヲ發
スルヲ治スルニハ。紅川椒。目ヲ去テ。水ニ浸ス。一斗。生
杏仁ヲ和シ研リ爛カシ。兩手ノ掌ニ抹シ。外腎ヲ拵ヘハ

極メテ効アリ

○紫白癩風ヲ治スルニハ。朮菜根ヲ用テ。白礬 五倍子。無名異ト同ク醋ニ和シ搗キ碎キ。先テ芎麻ヲ以テ刮熱シ。藥ヲ以テ擦ル。一三四次スレバ。根ヲ絶奇妙ナリ

○赤白癩風ヲ治スルニハ。先生薑ヲ用テ。切リ開キ上ニ置テ。擦テ紅色ナラシメ。次ニ海螵蛸三箇ヲ用テ。搗爛カシ硫黄一兩ヲ入レ。好醋ヲ用テ煎ジテ。泥ノ如シテ。上ニ敷ル。一三五次スレバ。即愈

○咳嗽久シク患ヘ連嗽四五十聲スル者ヲ治ス。生薑ニ水半合。蜜一匙ヲ用テ。煎熱シテ。温服スル。一三服ニシテ立トコロニ妙アリ

○年深日久キ咳。唾膿血。勞嗽喘急晝夜眠コナフ。諸

藥効アラサル者ヲ治ス。人參 蘆ヲ去 罌粟殼 子穰ヲ去

テ。蜜炙四兩 五味子。阿膠 燻炒リ珠ト成シ 桔梗。麥門冬

心ヲ去 甘草 炙 烏梅 核ヲ去 以上各二錢 右以咀シテ。每

服二錢。水一鍾。生薑五片ヲ用テ。煎ジテ七分ニ至テ。滓

ヲ去リ。食後臥ニ臨ンテ。温服ス。立トコロニ効アリ

○精澁ヲ治スルニハ。蝦蟆衣草ノ搗汁ヲ用テ。服スレバ。

甚タ妙ナリ。或ハ韭菜子二兩ヲ用テ。炒テ細末トナシ。

食前ニ酒ニテ下ス。一錢スルモ亦可ナリ。

○年壯氣盛ニ。或ハ久シク。獨リ居。精溢レ。夢ニ洩ヲ

治スルニハ。紫蘇子一升ヲ用テ。炒テ末トナシ。每服酒

ニ方寸匙ヲ調ヘ。日ニ進ハバ一。兩服ニシテ。効アリ

○諸ノ淋病小便赤ク澁リ。疼痛ヲ治スルニハ。三葉酸漿草ヲ用テ。洗淨メ搗汁一盞攪勻ヘ空心ニ服スレバ立ドコロニ通ス妙ナリ

○石淋ヲ治スルニハ。蟻蛄七箇。鹽二兩同ク新シキ瓦ノ上ニ鋪テ。火ヲ以テ焙リ乾シ。研テ末トナシ。温酒ニ調ヘ下ス。一錢スレバ即チ愈

○五淋ヲ治スルニハ。多年ノ木梳ヲ焼テ。性ヲ存シ。空心ニ冷水ヲ用テ。調下ス。男ニハ男ノ梳ヲ用。女ニハ女ノ梳ヲ用ベシ。又白礬ヲ用テ細末トナシ。填テ臍ノ中ニ在。滴ルニ。井水ヲ以テス。通ズル時ハ即チ去ル

○淋病疼シテ忍ラレズ。及ビ砂石淋ヲ治スルニハ。大蘿蔔ヲ以テ。切テ一指ノ厚トナシテ。四五片好蜜ヲ用テ淹ス。一少時鐵錘ノ上ニ安ジ。慢火ニテ炙リ乾シ。又蘸シ。又炙リ。一ニ兩ノ蜜ヲ取り盡シ。翻覆シテ炙リ。香熟ナラシメ。焦スベカラズ。冷ルヲ候テ細ニ嚼。鹽湯ヲ以テ送り下ス

○冷淋ヲ治スルニハ。諸藥ヲ服シテ。効アラサル者ハ四君子湯ヲ用テ。内ニ澤瀉木通猪苓ヲ加ヘ。連ニ進ル。一ニ服。又免絲子ヲ以テ。研リ極テ細ニシ。雞翎管ヲ用テ。小便ノ孔ノ内ニ吹キ入ルレバ。極メテ奇妙ナリ
○夜小便多キヲ治スルニハ。純糯米ヲ用テ。蒸シ糕ニシ

一片臥ニ臨テ炙リ軟カニ熱セシメコレヲ啖フ仍温酒ヲ以テ下ス酒ヲ飲スンバ湯ニテ下ス多ク啖テ愈佳ナリ行坐良久ク心下空ヲ待テ便睡ル一夜十餘行ノ者當夜ニ即止

○睡中遺尿ヲ治スルニハ燕窠中ノ草ヲ用テ焼テ末トナシ水ニテ飲ヘシ妙ナリ或ハ白紙一張ヲ用テ席ノ下ニ鋪上ニ遺尿スルヲ待テ日ニ曬シ乾シ焼テ性ヲ存シ酒ニ調ヘ服スベシ或ハ雞胫脛一具竝ニ腸ヲ用テ洗ヒ淨シ焼キ灰ニシ男ハ雌女ハ雄末トナシ酒ニ調ヘ服スベシ妙ナリ或ハ小豆葉ノ搗汁ヲ用テ空心ニ温メ服スル一小盞スヘシ

○酒渣鼻ヲ療スルニハ杏仁ヲ爛カシ研リ雞子清ニ調夜塗テ曉ニ至テ酒ニテ洗ヒ去レバ最効アリ或ハ又白鹽ヲ用テ常ニ擦ルヲ奇妙トス

○猫或ハ鼠ニ咬レタルヲ治スル奇方山椒ヲ浸シタル水ヲ用テ葶草ノ末ヲ調ヘ付ヘシ或ハ薄荷ノ汁ヲ用テ塗ベシ▲鼠ニハ猫ノ毛ノ焼灰麝香少許ヲ用テ唾津ニ調ヘ付レバ痛ミ止癒即愈

增補廣類願體俚諺鈔卷八尾

增補廣類願體俚諺鈔卷九

○腋氣ヲ治スルニハ。蜜陀僧一兩。砒硝五錢ヲ用テ。右細末トナシ。自己ノ小優ヲ用テ。熱ニ乘ジテ洗ヒ。後熱蒸餅一箇ヲ以テ。擘テ二片トナシ。急ニ藥末ニ二三錢ヲ糝。熱ク兩腋ノ下ニ挾ミ。畧睡ル。一少時シテ。冷シ待テ。コレヲ棄。重キ者ハ。數次ニ過スシテ。根ヲ絶ツ。

○又一方先。自己上截身ニ着ル衣服ヲ將テ。穢氣ヲ洗ヒ去レバ。太抵藥効アラスト云フナシ。若舊衣洗濯シ盡サズニハ。穢氣ヲシテ傳ヘ深シメン。深ク憫ム。此ヲ患ル者ハ。隱秘シテ。敢テ治ヲ醫ニ求ズ。醫者安ソ敢テ治シ人ニ施サン。如此ナル時ハ。門閭ヲ傷敗ス。良ニ歎

クベキカナ。白礬枯一兩ヲ用。一方ニ輕粉一錢ヲ加フ。右細末トシ。勻ヘシメ。夜半ノ後ニ遇ゴトニ。小僂ヲ以テ洗ヒ畢テ。藥一二錢ヲ將テ。自己ノ唾津ヲ用テ調ヘ。患ル處ニ抹ス。瘡ルヲ以テ度トス。或ハ帛袋ヲ以テ盛り。兩ノ腋ノ下ニ帶ルモ亦可ナリ。

○小兒ノ夜啼ヲ治スルニハ。燈草ノ燒灰ヲ用テ。乳ノ上ニ付ケ與ヘ喫セシム。燈花尤妙ナリ。又當歸ノ末ヲ用テ。乳ニ調ヘテ。吮シムルモ奇ナリ。又道ノ真中ニ當ルトコロノ土竈ノ中心ノ土。右ニ種ヲ末トナシ。新汲水ニ少許ヲ調ヘテ。飲モ大ニ効アリ。

○小兒ノ拘哭止サルヲ治ズ。綿絹帶ヲ以テ。手足ヲ縛

リ訖テ。三姓ノ婦人ヲ用テ。淨ク鹽槽ヲ掃ヒ。小兒ヲ其中ニ臥サシメ。旁ノ人他婦ヲシテ。知テ看セシメズ。一時ヲ俟トキハ。拘哭自ラ止

○小兒寸白ノ虫ヲ治スルニハ。酸石榴ノ東ヘ引ル根二兩。糯米三十粒ヲ用テ。水一碗煎ジテ。空心ニ服スレバ。須臾ニ虫ヲ瀉下シテ。神効アリ。又使君子一兩ヲ用テ。皮ヲ去リ。陳皮厚朴各五錢半。薑製。右細末トナシ。煉蜜ニ丸シテ。皂子ノ大ノ如シ。二歳ノ兒ニハ一丸。二歳以下ハ半丸。米湯ニテ化シ下ス。油膩甜物ヲ忌。一方ニ一歳ゴドニ使君子一箇ヲ用フ。半ハ生。半ハ熟。歳ヲ照シテ服食シテ効アリ。

○小兒頭上ノ瘡。及ビ浸淫瘡並ニ急痛瘡ヲ治スルニハ
芝麻ヲ用テ。生ニテ嚼塗ヘン。又一方垣透草ノ葉莖ノ
燒灰ヲ以テ末トシテ。油ヲ以テ輕粉ヲ調ヘ付ルモ妙ナ
リ。又雞卵黃ヲ用テ。煮熟シ炒テ油ヲシテ。出サシメ。
油ヲ以テ輕粉ヲ調ヘ付レバ。妙ナリ。或ハ卵殼ノ燒灰ヲ
以テ。末トナシ。臘月ノ豬脂ニ調ヘ付レバ。亦妙ナリ

○小兒黃土ヲ喫シ治スルニハ。乾黃土ヲ用テ。研リ細ニ
シ。濃黃連ヲ煎ジ搜テ餅トナシテ。服スベシ。又好シテ泥
土ヲ喫ニハ。男婦小兒ノ分ナク。黃連。寒水石。甘草。黃
芩。陳皮。茯苓。白朮等分ヲ用テ。右咬咀シ。每服五錢。小
兒ニハ一二錢。水ヲ用テ。煎服シテ愈

○小兒口瘡ヲ治スルニハ。萹荑葉ヲ搗テ。醋ニ調ヘ兩ノ
脚心ニ貼レハ。一夜ニシテ即愈。又ハ黃連細辛等分ヲ
用テ。細末トナシ。口ノ内ニ塗レバ。神効アリ

○小兒ノ甜瘡多ク面部兩耳ノ前ニ生ズルヲ治スルニ
一法アリ。母ノ口中ヲシテ。白米ヲ嚼テ膏トナシ。臥ニ臨
テ塗ル。一三五度ニ過ズシテ愈。又ハ杏仁一百粒ヲ用
テ。燒灰ニシ。膩粉一分ヲ入レ。同ク研リ勻ヘ細ニシ。生清
油ヲ以テ調ヘ塗ル。或ハ肥皂ヲ以テ。燒テ性ヲ存シ。末
トナシ。膩粉ト同ク麻油ニ調ヘ付ルモ効アリ

○小兒ノ眉煉頭瘡ヲ治スルニハ。小麥ヲ用テ。多少ニ拘
ラス。燒テ黑色ナラシメ。性ヲ存シ。末トナシ。小油ヲ以テ

調へ付べし。又ハ緋針ヲ用テ刺テ血ヲ出シ。一タビ刺テ
愈ス。バ再ビ刺シ。三タビ刺ストキハ則愈。又ハ胡桃數
十箇ヲ用テ。皮ヲ和シ。燈上ニ焼過シ。性ヲ存シ。碗ヲ用
テ蓋ヒ。火毒ヲ出シ。研リ末シ。膩粉五錢ヲ入レ勻ヘシメ
生油ヲ以テ調へ塗ル。仍先瘡ノ上ナル髮ヲ剃去リ塗
レバ。只一二度ニシテ瘡

○小兒ノ火丹背ノ上ヨリ起ル者ヲ治スルニハ。慎火草
ヲ用テ。苦酒ニ和シ搗テ。コレヲ塗ル。赤腫五體ニ遊行シ
五色常ナシ。心ニ至ル時ハ。即死ス。慎火草ヲ用テ。汁ヲ
搗テ上ニ付べシ。或ハ又針ヲ用テ紅ナル處ヲ刺シ。惡血
ヲ出シ。或ハ寒水石ヲ用テ末トナシ。油ニ調へ付レバ甚

効ヲ得ルナリ

○小兒ノ胭脂火丹ヲ治スルニハ。草麻子ヲ用テ。皮ヲ去
研リ爛カシ。刀ヲ磨水ヲ以テ。同ク調へ。紅ナル處ニ于テ
周圍ヨリ之ヲ圈ス。乾ヲ候テ。再ビ處ニ隨テ。圈シテ塗ル
○小兒ノ丹毒ヲ治スルニハ。竈中。鍋ノ底ニ對スル焦土ヲ
用テ。研リ細ニシ。新汲水ヲ以テ調へ塗ル。乾ケバ即易
テ。甚効アリ。或ハ又芒硝ヲ用テ。熱湯ノ中ニ投ジ。濃汁
ヲ取テ。コレヲ掃ベシ。或ハ又亂髮ノ燒灰ヲ以テ。伏龍肝ノ
末ト同ク香油ヲ用テ。調へ付べシ。或ハ紅藍花ノ末ヲ用テ。
醋ニ調へ付べシ。或ハ又米粉ヲ以テ。炒テ。黑色ナラシメ。
研リ細ニシ。唾ニ和ヘテ付べシ。或ハ又牛膝甘草ヲ以テ。等

分ニ咬咀シ。毎用一兩水一盞煎ジテ。五分ニ至テ滓ヲ去リ
伏龍肝ノ末ヲ調ヘテ付レバ。大ニ効アリ。

○小兒痘瘡出テ透バ。腹痛甚シク。或ハ黑靨ノ者ヲ治ス
ルニハ。蟬殼二十五箇ヲ用テ。翅足ヲ去リ。洗ヒ淨メ。末ト
ナシ。毎服一錢。熱水ニ調ヘ下ス。腹痛立トコロニ止テ瘡
出透ル。乳母モ亦一錢ヲ服スベシ。或ハ又乾糖毬ヲ用
テ細末トシ。湯ニ點ジ服スレバ立トコロニ見ヘ出透シテ
紅活ス。荔枝殼ノ煎湯ニテ。服スルモ亦可ナリ。

○天行痘瘡ヲ治ス。血ヲ活シ。毒ヲ解ス。未ダ發熱セザ
ル時。預先之ヲ服スベシ。赤小豆。黑豆。菜豆各一升。甘
草半兩ヲ用テ。右淘リ淨シ。水ニ煮。豆熟シテ。逐日空

心ニ汁ヲ服シ。豆ヲ食フ。已ニ染トキハ。輕ク解シ。未ダ染
スニバ服之。スルヲ七日ニシテ發セズ。

○凡ソ小兒初テ生レ下バ。甘草。黃連。朱蜜ノ法ヲ用テ。
後益母草ニ大握ヲ用テ。水ニ碗ヲ以テ。湯ニ煎ジ。兒ヲ
洗フベシ。痘瘡ヲ生セズ。試ルニ驗アリ。

○小兒痘瘡ヲ出スミジト欲セバ。黑驢ノ乳半鍾ヲ將テ。
兒ニ與ヘテ吃セシム。時常ニ與ヘテ吃セシムレバ。變ニ妙
ナリ。此方累ニ經驗アリ。

○小兒痘瘡陷入シテ發セズ。黑色ニシテ。氣絶ナントス
ルヲ治スルニハ。此ヲ服スレバ。漸ク蘇ヘリ。紅潤ナラシム。穿
山甲ヲ用テ。湯ニテ洗ヒ淨シ。炒テ焦黃ナラシメテ。末

トナシ。毎服半錢。紫蘇ノ煎湯ニ酒少許ヲ入レ服スベシ

○又或ハ胡桃本草卷十六一箇ヲ用テ。燒テ性ヲ存シ。乾臘脂カタクベニ二錢ヲ以テ末トシ。胡荽コニシヲ用テ。酒ヲ煎シ。調ヘ下ス。一錢

○又或ハ穿山甲ヲ湯ニテ洗ヒ淨シ。炒テ末トナシ。半錢ヲ用テ。麝香少許ヲ入レ。木香湯ニ調ヘ下ス。効アリ

○小兒痘瘡初メテ出テ。尤壯忽然トシテ。倒靨黑陷シ。心中煩燥シ。氣喘ギ。妄語鬼神ヲ見ルガ如ク。急ニ室ク治スベシ。然ズンバ。毒氣臟ニ入テ。必ズ死ス。人ノ牙齒ヲ用テ。燒テ性ヲ存シ。末トナシ。毎箇一服トナシ。酒蜜ニ調ヘ下ス。甚ダ妙ナリ

○小兒初メテ發熱スル時ヲ治スルニハ。胡荽四兩ヲ

用テ。細ニ切り。磁器ノ内ニ放。酒三鍾ヲ以テ。煎沸シ。胡荽ノ上ニ沃ギ。優チ物ヲ以テ。コレニ蓋ヒ。氣ヲ透シムルナカレ。温ヲ待テ。一一口ヲ啣シテ。兒ノ項ノ下ヨリ。偏體ニ噴ヘシ。頭面ニ噴。一ナカレ。其瘡澤潤ツルホヒ紅活コウカクシテ。黒陷ヲ致サス。能穢氣シナヒキヲ辟

○小兒痘瘡眼ニ入ルヲ治ス。癩甚クシテ。眼睛ヲ傷シ。一ヲ恐ル。浮萍草ヲ用テ。陰乾ニシテ。末トシ。每服三錢。兒ノ大小ニ隨テ。羶羊肝半箇ヲ以テ。蓋ノ内ニ入レ。杖ヲ以テ刺碎キ。爛カシ。水半合ヲ投ジ。攪テ汁ヲ取り。調ヘ下ス。食後ニ服スベシ。輕キ者ハ。一服ニシテ瘡。已ニ目ヲ傷ル者ハ。十服ニシテ瘡。甚ダ奇妙ナリ

○痘瘡目ニ入テ翳ヲ成スヲ治スルニハ。活ル鱈魚ヲ用テ。針ニテ其血ヲ刺磁器ニ盛テ。頻ニ翳上ニ點スレバ自ラ愈神効アリ

○小兒痘瘡眼ニ入り。或ハ病後ニ翳障ヲ生セバ。蟬ノ殼ヲ用テ。洗ヒ淨シ。土ヲ去リ。白菊花各等分末トナシ。毎服二錢水一盞蜜少計ヲ入レテ煎ジ。乳食後ニ兒ノ大小ヲ量テ與レバ。屢驗アリ

○小兒痘瘡爬搔ニテ瘡トナリ。膿血淋漓ヲ治スルニハ。多年ノ蓋屋爛草。或ハ蓋塔草ヲ用テ。多少ニ拘ラス。晒シ乾シテ末トナシ。貼一特ナク。若シ渾身瘡破レ。膿水絶ズ。粘テ衣服ニ貼。坐臥シ難クンバ。多ク屋草灰ヲ用テ。

席上ニ糝シ。兒ヲシテ。坐臥セシムベシ。少クシテ。即乾ク。貼テ。甚々妙ナリ

○痘疔ヲ治スルニハ。珍珠三五粒。另ニ研。豌豆四十九粒。頭髮一握各灰ニ燒。性ヲ存シ。同ジク細末トナシ。濕熱脂ニ調ヘ膏トナシ。先。簪ノ尖ヲ以テ。疔ノ口ヲ開キ。藥ヲ將テ點ジテ疔ノ内ニ入レバ。即時ニ大小瘡俱ニ紅白ノ色ニ變ズ。効アラズト云フナシ

○小兒ノ痘瘡ヲ治ス。發セント欲メ。未ダ發セスバ。便チ服之ベシ。此藥毒ヲ以テ。毒ヲ攻。縦ヒ瘡出ルトモ。亦タ稀少ナリ。決シテ惡證ナシ。冬月ニ於テ。人猫猪犬ノ糞ヲ取テ。各等分高キ處ノ黄土ノ窖ニ埋。三。五日シテ

取り出し乾クヲ待テ却テ砂鍋ヲ用テ盛り蓋シテ
鹽泥ニ固濟シ晒シ乾シ臘月八日ニ於テ煨テ通紅ナ
ラシメ取り出し碗ヲ以テ地上ニ合セ一宿シテ火毒
ヲ出シ末トシ麝香少計ヲ入レ毎用一次蜜ヲ以テ調
へ温湯ニ化シ下ス或ハ少計ヲ舌ノ上ニ挑ケ乳ヲ用
テコレヲ嚙シム此方捷ク効アリ多クハ秘ス病家シテ
之ヲ知シムベカラズ

○痘瘡已ニ發シテ起脹ス膿ナキ者ヲ治スルニハ綠
瓜ヲ用テ皮ヲ連子焼テ性ヲ存シ末トシ百沸湯ニ調
へ下ス一兩錢極妙ナリ

○小兒牙齒生ゼサルヲ治スルニハ雄鼠ノ糞二十一粒

兩頭尖ル者ヲ用テ毎日一粒ヅ齒齦ノ上ニ搯二十
一粒ニ至テ當ニ齒ヲ生ズベシ或ハ又黑豆二十一粒ヲ
以テ牛糞ヲ用火ノ内ニ焼キ煙ヲ盡サシメ細ニ研テ麝
香少許ヲ入レ同ク研リ勻ヘ針ヲ用テ齒ヲ生ゼサル處
ヲ挑ケ血出テ藥末ヲ將テ上ニ搯風ヲ見ルヲ得ル
一ナカレ醋ヲ忌多年生ゼサル者用テモ亦妙ナリ

○小兒陰囊忽腫ヲ治ス多クハ地上ニ坐スルニ因ニテ
カ風温ノ爲或ハ虫蟻ニ咬着ルガ故ナリ蟬殼半兩
ヲ用テ水一碗湯ニ煎シ腫處ヲ洗ヘバ其腫癢自ヲ消
ス止スンバ再ヒ温メ洗フベシ

○婦人血山ノ崩カ如下ヲ治スルニハ木耳一兩ヲ用ユ

半兩ハ生半兩ハ炒テ細末トナシ空心ニ米飲ニ調ヘ下ス。只一次トナシテ服シテ効アリ

○偏頭痛ヲ治スル絶妙ノ方。葦蕤ヲ用テ末トナシ。偏頭痛ヲ患ル者ヲシテ口ニ水ヲ含マシメ左邊疼バ左ノ鼻ヲシテ吸シムル。右邊疼バ右ノ鼻ヲシテ吸シムル。一字スレバ即チ大ニ妙ナリ。又草麻子一兩ヲ用テ皮ヲ去リ研爛カシ痛處ニ貼モ妙ナリ

○頭風偏正頭痛及ヒ冒寒痛ミヲナス者ヲ治スルニハ
甘草 炙 各一兩
白芷 各一兩
薄荷 八兩
川芎 荊芥 各四兩
羌活 藁本 各二兩
防風 二兩半
香附炒 細辛 各一兩半
已上十味細ニ粉トナシ

每服二錢食後ニ茶清ニテ調ヘ下ス

○卒ニ心痛スルヲ治スルニハ橘皮ヲ用テ白ヲ去リ炙テ少許煎ジテ飲メバ奇ナリ

○急心痛熱痛ヲ治スルニハ竈ノ中心鍬底ニ對ル處ノ土ヲ用テ水ニ煮服ス。若シ冷テ痛マバ酒ヲ以テ服スレバ亦顛狂シテ人ヲ識サルヲ治ズ

○男子陰腫核ノ大サ升ノ如クニシテ人治スルコト能ズンバ馬鞭草ヲ以テ搗爛カシ塗ベシ妙ナリ

○小腸疝氣ノ痛ニヲ治スルニハ香附子炒毛ヲ去リ茴香鹽炒各等分細ニ粉ニシ。每服二錢空心ニ熱酒ヲ以テ飲メバ立ドコロニ愈極妙ナリ

○婦人ノ死胎ヲ下スニハ。麝香半錢。另ニ研リ。官桂ノ末二錢。和シ勻ヘ。一服トナシテ。温酒ニ調ヘ下セバ。須臾ニシテ。手ヲ以テ推下スガ如シ。若未タ効アラスンバ。再ビ服スレバ立トコロニ驗アリ

○子死テ胎下ラス胞破レテ生レサルヲ治スルニ。此一方累ニ効アツテ。人ヲ治スルノ幾萬數ト云フヲ知ズ。鬼白ヲ用テ。多少ニ搗ラス。黃色ナル者。毛ヲ去リ研テ末トナシ細ニシテ粉ノ如クシ。羅ヲ用ヒズ。十指ヲ以テコレヲ攪。每服二錢。無灰酒一盞ヲ用テ。同ク煎ジテ。八分ニ至テ。通口ニ服スレバ。立トコロニ生ルノ神ノ如シ

○難産ニシテ胞衣出ズ。及ビ兒腹中ニ死シ。絶セントス

ル者ヲ治スルニハ。半夏。白斂各一兩ヲ用テ末トナシ。酒ニテ服スルノ一錢若。難産ニハ即チ一服。横生ニハ二服。倒生ニハ三服。兒已ニ死スル者ニハ。四服ニシテ。大ニ効アル勝テ言ベカラズ

○死胎ヲ下スニハ。雞卵黃一枚ヲ用テ。薑ノ汁一合ト同シク調ヘ服スベシ。或ハ本夫ノ尿ヲ取テ。煎沸シテ飲。仍テ烏キ牛ノ尿ヲ以テ。母ノ腹ノ上ニ塗レバ。立トコロニ出テ効アリ

○産後腹脹痛テ忍ラレサルヲ治スルニハ。水ニテ鼠粘根ヲ煮テ。飲トナシ。一服ニシテ愈

○婦人室女月信通セサルヲ治ス。大黃ヲ用テ。酒ニ浸

シ乾シ。一斤末トナシ。醋一_レ碗ヲ以テ。慢火ニ熬テ膏トナシ。彈子ノ大サノ如ク丸シ。每服一丸空心ニ熱酒ニ化シ下セバ。最モ妙ナリ

○婦人血氣行ラズ。上氣心ヲ衝ニハ。絲瓜ノ兒一箇ヲ用テ。燒キ灰ニシ。空心ニ酒ニ調ヘ服スベシ

○婦人月水通セサルヲ治スルニハ。雄鼠ノ尿ヲ用テ。燒灰ニシ。性ヲ存シ。一錢細カニ末トシ。空心ニ熱酒ニ調ヘ下セバ妙ナリ

○婦人血崩止ガルヲ治スルニハ。槐花一兩ヲ用テ。棕花ノ燒キ灰五錢水ニ煎ジ。鹽少許ヲ入レ。空心ニ服ス。或ハ烏梅湯ヲ以テ下スベシ。或ハ又白匾豆ノ花ヲ用テ

焙リ乾シ末トス。紫ナル者ハ用ヒズ。炒米ヲ飲ニ煮テ炒鹽少許ヲ入レ。空心ニ數服スレバ。即チ効アリ。或ハ又黃芩ヲ用テ。多少ニ拗ラス。末トナシ。每服一_二錢空心ニ秤錘ヲ用テ燒キ紅レ。酒ニ淬キ下セバ即チ止

○婦人赤白帶下ヲ治スルニハ。酸石榴五枚ヲ用テ。皮ヲ連子汁ヲ搗。每服半錢空心ニ下スベシ。或ハ又香附子一兩。白芍藥二兩。乾薑五錢ヲ用テ。二味同ク炒テ。黃色ニシ。末トシ。空心ニ米湯ニ調ヘ下ス効アリ。或ハ又好酒ヲ用テ。艾葉ト同ク多少ニ拗ラス。雞卵一箇ヲ煮テ熟シテ。空心ニ只雞卵ヲ食ベシ

○婦人六十二種ノ風及ビ腹中血氣刺痛ムヲ治スル

二ハ。紅花一兩。酒二盞ヲ用テ。煎ジテ。一盞ニ至テ。頓ニ服スベシ。甚妙ナリ

○婦人ノ血風腦ヲ攻。旋暈地ニ倒レテ。人事ヲ知ラガ
ルヲ治スルニハ。嫩蒼耳草ヲ用テ。多少ニ陰乾ニシ。末
トナシ。熱酒ニ調ヘ服スル。一錢スレバ。甚タ効アリ

○婦人臟燥悲傷シ。哭セント欲シ。鬼神ニ附ル。カ如ク
ナル者ヲ治スルニハ。小麥一升。甘草三兩。大棗五兩ヲ用
テ。每服一兩。水二盞。煎ジテ。一盞ニ至テ。服スベシ

○婦人自ラ哭シ自ラ笑ヲ治スルニハ。紅棗ヲ用テ。燒
テ性ヲ存シ。水飲ニ調ヘ下セバ。甚タ効アリ

○乳癰爛レテ。心ヲ見ス者ヲ治スルニハ。貓兒腹ノ下ノ

毛ヲ用テ。鉗鍋内ニ煨テ性ヲ存シ。末トシ。乾摻。或ハ清
油ニ調ヘ。輕粉少許ヲ入レテ付レバ。妙ナリ。或ハ又皂
莢ノ刺ヲ用テ。燒灰ニシ。海蛤粉ニ和シ。末トナシ。熱酒
ニ下ス。搽散スルモ亦可ナリ

○乳ノ上纒ニ硬ク腫。一ヲ覺ヘ癩ミヲ。ナスヲ治スル
ニハ。葱ヲ以テ熨スベシ。或ハ又牛膝ヲ用テ。水ニ入レ
煎ジテ膏藥ノ如クシ。布段ヲ以テ。攤ケ貼レバ。立ドコ
ロニ効アル。一言ニ盡シ難シ

○乳癰已ニ成テ。穿ツ。一ヲ得カル者ヲ治スルニハ。黃蜡
麥顆ノ大サノ如キ者ヲ用テ。一ニ顆ヲ吞バ。即穿。一顆
ゴトニ。即一眼ヲ穿ク甚タ効アリ

○婦人ノ癖塊ヲ治スルニハ。醋ニテ大黃ノ末ヲ煎ジ服ス。生ナル者甚効アリ。或ハ又小使ヲ用テ。コレヲ服ス。毎日温メ服スル。一盞。十日ニ至テ。血片下テ即瘥。

○孕婦心腹絞痛ムヲ治スルニハ。棗ノ子十四ヲ用ヒテ。燒焦シテ末トナシ。童便ニ調ヘテ服スレバ効アリ。或ハ又鹽一合ヲ用テ。燒キ赤シ。三撮ヲ取テ。熱酒ニ調ヘテ用ユレバ。甚効アリ。或ハ又生地黃一斤ヲ用テ。搗テ汁ヲ取り。酒半升ヲ入レ。同ク煎ジ。半ヲ減シ服之。或ハ艾葉ヲ用テ。拳ノ大ノ如ク炒リ。黃ニシテ水ヲ以テ汁ヲ煮テ服スレバ大ニ効アリ。

○無名腫毒方 當歸 八錢 天花粉 八錢 黃芪 八錢 生苴

草五錢 水一碗 酒一碗ニテ煎ジ服スレバ。立トコロニ愈如退ス。ンバ。再ビ服セヨ。

○刀傷止血方 天花粉 二兩 江黃 一兩 白芷 一兩 赤芍

藥 一兩 研末シ。上ニ敷。立トコロニ血ヲ止テ疼ズ。

○湯火燙方 平時老黃瓜ヲ收ル。多小ニ拘ラス。厚實ヲ覓テ。磁瓶ニコレヲ貯ヘ。暗濕ノ處ニ藏メハ。自ラ爛レテ水トナル。此水ヲ將テ。湯火ニ傷ケル處ニ塗レバ。立トコロニ痛ヲ止。泡ヲ起サバルヘシ。此余幼時烈火ノ中ニ墜入テ。半體皆傷ク。種々療スルニ効アラス。此方ヲ得テ愈。厚禮ヲ以テ酬フ。乃此方ヲ傳フ。今特ニコノ方ヲ諸人ニ公ニ傳ヘテ。以テ危急ナルヲ救フ。且

費ルトコロ限リ有テ。利益窮リナシ

○汗斑方 蜜陀僧硫黃各一錢ヲ粉トナシ。醋ニ調ヘ
薑ニテ擦レバ。立トコロニ消ス

○諸毒圍藥方 乳香。沒藥。麝香各三分。蜒蟒二條搗爛
カシ。患ル處ニ敷レバ即消ス

○頰ニテモ咽ニテモ腫タルニ妙方。巴豆ヲ能毒ヲ取
テ。絹ニ包テ。痛方ノ鼻ニ入。置ハ急ニ腫止ナリ

○虫喰齒ノ妙方 天南星ヲ粉ニシテ。大根ノ絞汁ニ
テ一滴延テ痛方ノ耳へ一滴入ル。即座ニ痛息若兩
方痛時ハ。兩方ノ耳へ入ナリ

○心痛諸藥不効ヲ治スルニハ。塩 一盃酒 一盃水 一盃

已上三盃ヲ一盃ニ煎ジ。一度ニ可與妙ナリ。萬ノ虫ニモ
奇妙ナリ可秘ス

○婦人ノ乳ヲタラス妙方。蜂ノ巢ヲ黒焼ニシテ。食ノ
取湯ニテ可與

○氣カヲ強スル妙方 赤鱗 廿 葱ノ白根手一疋ニシ
テ。一把雀 一羽 右ニ種黒焼ニシテ。糊ニテ麻子ノ大ニ

シ。酒ニテモ湯ニテモ不斷可用第一ノ腎藥ナリ
○走痔疣痔ニ妙方 肉桂 五分 山歸來 三分五厘 當歸 三

分五厘 其艸 二分五厘 煎用

○疝氣ニテ何程腹痛テモ。即時ニ愈妙方ナリ。三稜 二
兩二分 青皮 同 莪朮 同 干姜 一兩二分 良香 同 胡升 同 木

香同縮砂同丁子二分陳皮同茴香一两二分右煎用ユ急用ニハ振出シ用七疝活命湯ト号ス

○癰ノ大妙藥 五八草 黑燒一錢 大蟹同鹿茸 黑燒七分

分沉香 黑燒二錢 右合セテ酒茶碗一盃ニタテ、飲ナリ

同破タルニハ。赤螺 黑燒 黃柏。犬山椒葉 小豆粉ニソ

穿タル處ニ付ルナリ

○瘡下妙方 人參 川芎 沉香 丁香 木黃 黃連 黃芩

木香 香白芷 其艸 右粉ニシテ。一文目六分ニ巴豆六分加

麻子ノ大ニ丸ジ。二十粒粥ニテ飲ヘシ。二度下ナリ。自然

下過ハ。冷タル粥ニテ飲ハ留ルナリ。但巴豆ノ皮ヲ去リ

紙ニ包丸竹ニテ押油ノ紙ニ付ヲ三度程包替テ押ナ

リ。亦飲汁酒ニテ用ルナラハ。醉程ニ用。醉ノ内ハ枕ヲセズ。トクト寐入テ可頭ノ重者ハ酒ニテ用

○瘡藥但顯藥 鉛一錢 尤明朱 一錢 水銀 一錢 沉香 一錢

鋼炭 二分 艾 七分 成程モミテ。右細末シテ。コヨリ三寸ニ

シテ。一日ニ一寸ヅト。二度ニ三寸顯ナリ。顯時口ニ水ヲ

ク、ミテ。紙帳ノ内ニテ顯ナリ

右ノ藥顯時血大優ニ下バ。瘡瘻ルナリ。若虚症

ナラハ。七分ヅト顯ナリ。實症ニハ。一日ニ。一寸ヅト、

三度ニ。三寸顯ナリ。コヨリ。三本顯テモ。一本顯テモ。

大優ニ血下バ。藥ヲ引。即瘡能瘥。右ノ藥ニテ。口

中破痛齒等浮不食セバ。味噌汁少宛貝殼ニス

クヒ用ナリ。七八日モ味増汁斗飲居テ少モ不
苦也。口中破痛齒浮痛時ノ藥 山歸來 火甘草
少如常煎ジ。少ツ、切々用ニ大秘方ナリ

○唐瘡内藥奇方 山歸來 四十五分 但生黃色黑燒三
色ニシテ。人參 一分 牛膝 一分 酒ニ三日浸ス 當歸 一分 吳
茱萸 五分 酒ニ三日浸ス 茯苓 一分 其艸 一分 已上細末シ
テ飲汁山歸來 十分 半分 生。半分 炒。右十分ヲ一匙ニ
シテ。水天目ニ九盃入レ六分ニ煎ジテ。一番ニ水五盃入
レ二盃ニ煎ジ。以上八盃一日ニ用ユ是ヲ飲汁ニシテ。右ノ
粉藥ヲ一度ニ一分宛用。若一日ニ八盃迄飲兼ハ翌日
一テ延テ用亦瘡ニ依テ數服用テ吉。但其人他病ア

ラハ。其病ニ相應ノ藥ヲ一日ニ五分ツ、加用。唐瘡崩
瘡。便毒莖瘡癰疔打身ニ用。神効奇妙ナリ

○同付藥妙方 丹 百目 黑胡麻油 一斤ニテ練合ス 右萬
膿潰腐入久シク不愈物ニ付ル妙ナリ。右ノ内藥ヲ第一
ニ用テ。此付藥ヲ塗然サレバ崩處愈テモ。内ニ滯ラハ骨
疼トナツテ悪
○打傷ケルニ妙ヲ得タル事アリ。或男子口論シテ腕ヲ
傷ラレ皮少繫ルヲ某生小鮓ヲ多摺粉盆ニ入。生ナ
カラ摺セ傷ニ付上ヲ布ニテ包細キ破竹ニテ挟ミ。其
上ヲ結日々ニ一度取變ヌレバ。血脉通ジ初ノ如ナレリ
○巴豆ヲ吞シテ療ス 或童子藥店ニ遊戯シテ。誤テ

巴豆ヲ服シ。瀉甚ク喉辛キト甚シテ苦痛言ニ述難シ
良醫秘術ヲ盡セ凡其功更ニナシ。余愚意ヲ用テ急ニ
巴豆ヲ黒焼ニシ細末ニシテ。粥ヲ弱ニ能煮サセテ。右ノ黒
焼ヲ用タレバ暫アツテ喉ノ苦頓ニ止。二三日ノ間瀉
モ平愈セリ

○魚ヲ釣針ヲ誤テ吞ル童子アリ 彼童子友ニ誘引セ
ラレ。水邊へ魚ヲ釣ニ行トテ。途中ニテ針ヲ口中ニ嚙ナ
ガノ物語シ。戯テ誤テ吞リ。是子親ニ折檻セラレシヲ
恐糸ヲ引ル故。喉大ニ腫塞リ苦メリ。良藥種々醫案ヲ
ナセ凡藥カ叶カタク。手ヲ空シテ茫然タリ。時余又愚意
ヲ用テ板ケリ。筆ノ軸細ヲ四五分宛ニ切。彼釣糸ニ一

ハ繫ギ。凡ソ五六寸モ長クシテ。病人ノ腹ヲ押へ仰テ臥
シメ。右ノ軸ヲシメ突ケレバ。易ク抜タリ。誠ニ醫ハ意也
ト。古人ノ云ルモ宜哉。已上十二方愚年來切ヲ得タル
ヲ增益ス

○喉痞 俄ニ發リ痞ラバ。酒ニ塩ヲ加へ。口中ニク、ミ
少シ宛飲ハ不敗シテ。腫次第ニ減頓ニ瘥奇々妙々
言語ヲ絶ス。秘スル一ナク傳フ

增補廣類願體俚諺鈔卷九終

京橋五輪御東新町東入

京橋五輪御東新町東入

京橋五輪御東新町東入

享保十龍集乙巳子孟春吉奠

京都五條橋通東洞院東_江入町

書林 岡本半七

壽梓

江戸日本橋南貳丁目

同 小川彦九郎

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

