



ヤ 3
968
2



門 3
號 968
卷

文政十一年夏季新鐫

榛齋宇田川先生著

二篇

新訂 增補 和蘭藥鏡

風雲堂藏板



新訂增補和蘭藥鏡標目

卷四

遠志

遠志驅水散

遠志驅水酒

遠志解凝煎

清肺遠志煎

遠志昆コ設セ爾ル弗フ

水揚梅

著鐵鎮痙丸

著鐵解凝丸

著蒸餾油

連錢草

清肺和胸飲

豁痰潤肺飲

洞庭藍

清肺定嗽飲

曾訂和蘭藥鏡

卷四

標目

風雲堂藏

五十四年二月廿一日

乙切草 淨汚清肺飲

乙切草油

金花草

茜草

茜根煎

經閉。茜根經驗說

自第一至第十九

附 經閉。用薩毘那經驗說

自第一至第五

龍茅草

山蘿蔔

草零陵香

芸香

芸香水

苦薏

新訂增補和蘭藥鏡標目

卷五

大黃

掃腸桂黃飲

葯黃消英散

定痛消毒飲

解凝黃醃丸

荒黃驅水丸

解凝葯醃丸

加羅薑黃散

加羅荷黃丸

加羅疏肝丸

消酸解毒飲

大黃浸劑

黃霸健胃散

大黃越幾斯劑

大黃舍利別

大黃丁幾劑

土木香

應謨救喘丸

土木香越幾斯劑

土木香丁幾劑

壯神菖橙飲

土木香舍利別

菖蒲

菖蒲浸劑

菖蒲蒸餾油

白芥子 薑芥健胃丸 芥子泥

半夏 半夏健胃散 半夏黃石散

蜀羊泉 排毒羊泉湯 同越幾斯劑

羊泉硫荷飲
安質羊泉丸

山牛蒡 牛蒡排毒煎

金盞花

董菜 董菜舍利別

蘆根 排毒蘆根煎 蘆根越幾斯劑

石長生

白芷

菴活

新訂增補和蘭藥鏡標目

卷六

幾那

試効括套 幾那煎 服量

間歇熱

間歇熱。幾那經驗說

發作前用幾那說 經驗自第一至第七

苦味健胃飲 健黃丁幾劑

發作後用幾那說 經驗自第八至第十一

發作前後用幾那說 經驗自第十二至第十四

發作前後間用幾那說

間歇往來諸症

鎮痙經驗說 自第一至第八

赤痢 失血

焮腫眼 蛇蟲

酸敗液 痘瘡

瘰癧 肺瘍

潰瘍 壞疽

卷六 癌瘡

新訂增補和蘭藥鏡卷四

榛齋先生譯述 男 宇田川 榕 榕菴校補

遠志

ホレイガラセ子ガ 羅 七子ガ 蘭 ○按ニ藥舖者ナリ○此一種羅甸名ホレイガラセ子ガト呼之ト名クル者アリ性功大抵遠志ト同シ

○榕按ニ嘗テ和蘭本草ニ就テ「セ子ガ」ノ形狀氣味ヲ考ルニ唐遠志ニ髣髴タリ近來洋船ノ「セ子

ガ」ヲ得テ其氣味形質ヲ徴シ始テ遠志ニ確當スルヲ得タリ 江戸藥舖大坂屋四郎兵衛清雅云志ト呼ブ尋常遠志是ナリ其二ハ肉遠志ト呼ブ是唐遠志ノ心ノ無味ノ處ヲ去ル者ニ用ニ便

曾訂和蘭藥鏡

卷四

風雲堂藏

利ナリ然_レ在昔年ヨリ取ク_レ禁ス其三八朝鮮
 遠志ナリ朝鮮ヨリ舶來ス唐遠志ニ比スレバ太
 クノ硬シ此即_チ遠志ノ大葉ノ者ナルベシ其
 四ハ和産遠志ナリ是ハ藥舗ニ出ル_レマナシ
 試効 根ヲ藥用トス但其中心ハ木様硬固ニノ味ナ
 ク又効用ナシ是ヲ去リ其表ノ疏脆淡黄ノ肉ヲ用
 ベシ是ニ灰色ノ粗皮被_レフ其味初_ニ微酸ヲ帶ビ後辛
 熱侵蝕ノ刺戟シ微苦ヲ帶ブ著キ香臭ナシ○衝動
 疏解ノ粘液ヲ驅泄シ汗ヲ發シ小便ヲ利シ虚症_ノ嗽
 衝ノ凝血ヲ疏解ス但_レ過服スレバ吐シ或_チ瀉下ス○
 此藥水脉ヲ衝動ノヨク小便ヲ利シ汗ヲ發ス故ニ
 水腫ニ殊効アリ此根一弓ニ水一斤ヲ加_テ煮_テ半_ヲ

減シ半時毎ニ三匙宛服ス又左ノ二方水腫ニ峻効
 アリ

遠志驅水散

- 遠志 半錢
- 海葱 四瓦
- 孕礬酒石 一錢
- 杜松實油 十滴

右件三味各別細末ノ調和シ油ヲ研合シ分テ四服
 トシ二時毎ニ一服宛用フ

遠志驅水酒

遠志 細判 二弓
 右硝子壘ニ内葡萄酒一比ヲ加_テ浸_ス三日。漚_テ滓ヲ

去リ一時毎ニ一匙宛服ス○北亞墨利加洲ニハ常ニ遠志ヲ採リ貯テライテルスランガ一種毒及蝮蛇ノ咬傷毒ヲ解スル奇藥トス其咬傷ヲ被レバ患者全身ノ血忽々凝固シ發熱脉數呼吸不利促迫欬ノ痰唾ニ凝血ヲ交ル等宛モ肺焮衝胸脇焮衝ノ症ノ如クニノ死ヲ免ル者殆ト希ナリ然レニ此藥ヲ與テ吐下發汗スルニ至レバ速ニ其毒ヲ驅泄シ凝血ヲ疏解ノ愈ザル者ナシ即チ此根ノ細末一ノヨリ半錢マデ一服トシ數服ス或水煎シ一時半毎ニ三匙宛服メ諸症全治スルニ至ル或是ヲ嚼テ其汁ヲ服シ或

其創ニ外敷ス○此藥ハ右ノ如ク凝血ヲ疏解ノ胸脇焮衝ニ用テ一種ノ解凝藥トシ其凝血ヲ疏解ノ大効アルヲ發明シ死ニ瀕キ幾多ノ患者ヲ救活セリ然レモ斯如キ辛熱衝動ノ藥ハ總テ壯實多血ノ焮衝病ニハ害アリ唯患者虛憊シ諸管纖維ノ運營弛弱怠慢ナルニ因テ焮衝ノ諸症淹滯ノ治セザル者ニ應効アリ即煎劑トシ用テ驗多シ假令バ後方ノ如シ

遠志解凝煎

遠志 劉

三弓

水

三北

右煮減ノ三分、一トシ一時半每^{コト}三匙宛服ス。但此劑辛熱ニシテ患者ニ害アルベキ症ハ遠志一弓水二比ヲ加、煮減ノ三分、一トシ與^レベシ。或細末^トシ對症ノ劑ニ加、丸藥トシ用^レモ良。○或云、胸脇焮衝等ニ此藥ヲ用^レバ能、痰ヲ咯^カシメ胸中ヲ疏潤シ其諸症ヲ緩解ス。又雲端急、膠痰壅盛ノ呼吸不利、促迫苦悶スル症ヲ治スト。但此藥ハ胸肺ノ汚液ヲ驅除シ粘痰ヲ疏解シ凝血ヲ稀釋スル故ニ右ノ諸症ニ優効アルコト固^{モト}ヨリ論ナシト雖モ血液焮衝ノ稠厚トナリ或

焮衝ノ膿様ノ質トナル者ハ此藥適應セズ。凡此藥ヲ久服スル患者ニ刺絡ヲ施セバ其血厚膜ヲ被^レヘバナリ。焮衝^ノ厚膜ヲ被^レハ血ノ○或云此藥辛熱衝動ノ性力アル故ニ肺焮衝、胸脇焮衝等ニハ他ノ解凝藥及^テ清涼下劑ヲ加用^テテ多ク効ヲ得。○肺焮衝後、勞欬トナリ或吐血後其血肺ニ殘留^テテ勞欬トナリ焮衝ノ症ナキ者此藥ヲ用^レバ小便多ク利ノ汗減シ吐痰増進ノ輕快ヲ致ス者多シ。或云此藥勞欬ニ大効ヲ稱スレ^レ肺ニ膿瘍アリテ焮衝ヲ兼ル症ハ必ず害アリ。○粘痰多キ勞欬、焮衝ノ諸症ナキ者ハ

此藥ニ依蘭苔ヲ加用テ効多シ○或云勞欬様ノ症
 ニ此藥ヲ用テ悉ク良効ヲ得ルニ非ズ勞欬ニ効功ナキニ非ズ
 ト雖モ熱多ク嗽衝ヲ帶ビ脉強盈ナル症ニハ適應セズ故ニ此症殊ニ審察ヲ加用ルヲ專要トス原註
 唯痰唾ニ膿様物ヲ雜甚夕膠粘ナルガ爲ニ略出シ
 易カラス且食欲ヲ失症ハ左ノ煎劑或遠志昆設爾
 弗ヲ依蘭苔和胸劑出共ニ次ニ加用テ多ク良驗ヲ得タリ

清肺遠志煎

遠志判 二弓

甘草判 六錢

右遠志ニ水一比半ヲ加煮ルヲ八分時ニシ甘草ヲ
 加浸ス一十六分時瀝テ滓ヲ去リ聽用ス

遠志昆設爾弗

遠志細末 一錢半

甘草舍利別 一弓

右調和シ一時半或二時毎ニ一錢宛服ス是ヲ服メ
 吐瀉多尿等ヲ發スルヲナシ

甘草蘭苔飲

是依蘭苔和胸劑ナリ

方名依蘭苔ノ條ニ出ツ

卷二十七ノ二十四葉

○遠志ハ解凝ノ殊効アリテ能痰ヲ豁ノ略出セシ
 ム故ニ粘痰多キ胸肺病ノ嗽衝ナキ症ニ良効ヲ奏
 シ又傷冷毒ノ咽喉嗽腫ニハ此藥ノ泡劑ニ民埜列
 利精ヲ加服ノ殊効アリ○冒寒傷冷毒ノ嗽衝熱解

散スレ_レ其_レ他諸症淹滯ノ治セザル者或遷延性ノ傷冷毒痛。痛風。脚痛風等ニ是ヲ用_レバ其解凝ノ効ニ由テ發汗利尿痰唾等ヨリ病毒ヲ排泄ノ治ス○赤斑熱。痘瘡。麻疹等夥ク發見スレ_レ其脉虛弱ニメ元運力充張セズ。動スレ_レバ潜伏内攻ノ危篤トナルベキ症ニ此藥ヲ水煎シ用_レバ能_レ其鬱毒ヲ宜發メ諸竅ニ排泄ス○服量。末ハ半刀ヨリ一刀マデ日三四次或一時毎ニ用_レフ煎劑ハ此根一多ニ水十弓或一比ヲ加_レ煮テ半ヲ減シ滓ヲ去リ桂露等香竈ノ飲液ニ一匙宛加_レ服ノ一晝夜ニ一劑ヲ盡_ス。是ニ由テ

吐瀉等ノ眩暈ナシ然_レ其味ヲ惡ム者ハ此劑ニ水二比ヲ增加ヘ煮テ用_レベシ。或_レ其症ニ隨ヒ幾那ヲ加_レ用_レベシ通例煎劑。尤_モ効アリ或細末トシ蜜ヲ加_レテ煉膏トシ一二刀宛用_レフ或對症ノ煉膏ニ加_レ用ルモ良依福括 僕叔淑

水楊梅 ダイコンサウ俗稱 カレイヲヘ イルラタ羅 ナゲルコロイト蘭

試効 根ヲ藥用トス。辛温芳香收瀝。氣味丁香ノ如シ。其收瀝質ニ亞_ア的兒_レ樣油及苦味鹽ヲ含_リ○神經。心胃ヲ温壯强健シ稍發汗利尿ノ効アリテ壯神ノ一

良藥トス○痙攣ノ運動ヲ鎮メ諸管纖維ノ弛虛緩弱ニ因ル諸症ニ良効ヲ奏シ風氣ヲ驅リ疝痛ヲ治ス○強壯スル効力ヲ以テ神經熱ニ効多シ又腐敗熱ニ用ヒ或間歇熱ノ良藥トシ多ク治驗ヲ稱ス總テ幾那ノ的當スル諸病其他發歇往來定期アル諸症ニ殊効アリ○經久下利及赤痢ノ虛症ヲ治シ婦人崩漏白帶下嘔血等失血過多ヲ止ム○瘰癧毒諸症失苟兒陪苦及大ニ潰爛セル膿瘍等ニ試効多シ○服量細末ハ半錢ヨリ一錢ニ至ル或丸藥煉藥ニ加用ヒ或此根一弓ヲ燒酒八弓ニ浸メ藥氣ヲ出シ

一匙宛服スル日三四次或此根一弓ニ沸湯八弓ヲ加泡劑トシ服ス或此根一弓半ヨリ一弓許ヲ水十六弓ニ煮テ半ヲ減シ滓ヲ去半時毎ニ一匙宛服ス此藥多ハ揮發強壯劑ニ加用テ良効ヲ奏ス

依叔 叔福

薯

「ハゴロモサウ」メドキノコギリサウ俗稱「ミル」レホリウム羅「テウイセンドブライド」蘭

試効 莖葉花共ニ藥用トス稍香氣アリ温煖強壯ニシ惡液ヲ淨刷ス○鎮痙止痛ノ一良藥トス故ニ痙攣ノ運動ヨリ發スル諸症心腹痛風氣痞滿疝痛產後腹痛及經閉ヨリ發スル痙攣諸症ニ殊効ヲ奏ス○

腹部諸藏ノ壅塞ヲ開達シ其壅塞ヨリ發スル瘕瘕
 諸症及_レ結石壅塞ヨリ發スル瘕瘕ヲ治ス○脾病依
 剝_ホ昆_シ垤_デ兒_ル神志鬱憂病等ノ瘕瘕諸症ハ此藥極_テ効
 驗アリ○肺藏虛弱ヨリ發スル遷延ノ欬嗽喘急ニ
 良驗ヲ稱ス但_レ嗽衝ヲ兼ル症ハ害アリ○此藥收瀰
 ノ効アル故ニ諸失血及_レ諸竅ノ脫泄ヲ止ム○婦人
 處女孕婦産婦ノ崩漏ヲ止ルニ多ク用フ是ニ腹内
 諸藏ノ壅塞ヲ兼子或_レ子宮衝逆様ノ瘕瘕諸症ヲ兼
 ル者ハ殊ニ的當トス○處女月經調順セズ或_レ過多
 或_レ稀少ノ症ハ此藥ニ加_カ密_ニ列_レ默_ニ栗_ニ薩_ニ捲_ニ垤_ニ兒_ニ等_ニヲ加_カ

用_テ適應ス○吐血ノ症體稟薄弱或_レ各部虚損シ或_レ
 神經攣急ヨリ發シ或_レ痔血月經壅滯ヨリ發スル者
 ハ皆此藥的効アリ嘔血下血赤痢等亦是ニ同シ○
 打撲壓傷等ノ外因ヨリ發スル吐血亦良驗アリ殊
 亞_ア兒_ル尼_ニ加_カヲ加_カ用_レレバ脉管外ニ泛溢セル血ヲ管中
 ニ喻收_メ其傷消散ス○痔血過多ニ用_テ亦良驗ア
 リ或_レ盧會及_レ解凝鹽類ノ下劑吉利詞_キ兒_ニ等_ニヲ過用
 ノ痔血大ニ脫泄スルヲ治ス痔血過泄メ止_メサレバ
 患者漸ク虚衰シ終ニ萎黃病水腫トナリ治シ難キ
 ニ至ル○白帶下漏精淋疾ヲ治ス○下利屢發メ止_メ

不宿疾ノ如クナル症ニ此藥驗多シ○著越幾斯劑
トシ製法蒲公英越幾用テ前說ノ諸病ニ良効ヲ稱
ス。殊ニ痙攣ノ諸症ヲ兼ル病ハ鎮痙強壯藥ヲ加
テ尤驗アリタトヘ假令バ後方ノ如シ

著鐵鎮痙丸

著越幾斯劑 四錢

阿魏 一錢

格碌屈私末爾扶斯名 四月

鹿角鹽 二月

右各別細末シ調和ノ三匁ヲ一丸トシ一時毎ニ二
丸宛服ス○脾病神思鬱憂病。痙急内藏壅塞。蟲症ヲ
兼ル等ハ左ノ丸藥奇効アリ

著鐵解凝丸

阿魏 三錢

撒兒末爾扶斯名

盧會

著越幾斯劑 各一錢

右各別細末ノ調和シ六匁ヲ一丸トシ。十丸宛服ス
ル一日二次又諸蟲ヲ殺シ驅泄ス。諸蟲症ニ用テ峻
効アリ○此藥水煎泡劑散劑トシ用テ皆良○衄血
斷出血ヲ止メ或斷ノ痙腫及潰瘍ヲ治シ或齒痛ヲ
止ルニ水煎若ハ泡劑トシ含漱シ或末トシ患處ニ
摻メ良○外敷ノ諸創傷潰瘍ヲ愈シ出血ヲ止ム汚
穢腐爛ノ瘡瘍惡厲ノ創傷潰爛甚キ症或寒熱壞疽

等ハ對症ノ藥草ニ加^{ハシ}蒸^ス湯劑トシ或^ハ毳布トシ貼^メ殊ニ良

著蒸餾油 此油殊ニ花ニ多シ。製法薄荷油ト同シ

此油數滴ニ沙糖及^ヒ酒石英少許ヲ研和シ服^メ痔血過多ヲ止ルニ捷効アリ

連錢草

ガキトヲシ俗稱「ヘデラテル」
レストリ「アルドヘイル」
蘭

試効 莖葉共ニ藥用トス。温煖開達強壯ニ稍收瀦シ
創瘍ヲ愈シ。殊ニ粘稠惡液ヲ淨刷ス。亞兒^ル如^カ利^ナ鹽^ア膠固ノ粘液ヲ淨刷ス。性
功大抵 洞庭藍ノ如シ。○内藏壅塞ヲ疏解シ。肺腎

等ノ汚液ヲ祛ク。○冒寒^ノ欬嗽。痰^ノ欬濕喘等ノ肺病ヲ治ス。○勞^ノ欬樣ノ胸痛。欬嗽肺傷勞^ノ欬ニ殊効ヲ稱シ。肺瘍ニ用^テ敗液ヲ除キ創瘍ヲ愈シ治ス。和胸藥草ニ加^シ泡劑或^ハ煎劑トシ或^ハ細末トシ用^ヒ或^ハ一味泡劑トシ沙糖若^シハ白蜜ヲ和シ甘美トシ與^フ。○乾^ノ欬勞嗽ニ此藥ヲ葡萄酒ニ浸シ長服ノ驗アリ。黥^シ失^シ刺^ラ癩^ゴ及^ヒ洞庭藍ヲ加^テ殊ニ良。○熱病及^ヒ勞瘵樣ノ患者。血中酷厲毒アリテ肺ヲ侵刺シ欬嗽荏苒トメ休マズ或^ハ肺瘍ノ欬嗽呼吸不利等ハ後方ヲ良トス。是^レ拔^ル爾撒謨樣ノ性効アリテ創瘍ヲ愈シ。内熱ヲ涼解シ汚

液ヲ清刷シ且大小便ヲ通利ノ殊効ヲ奏ス

清肺和胸飲

連錢草 二握 甘草 剉 二寸

右大麥煎ノ沸湯八比ヲ加、浸下一時半ニノ滓ヲ去、次ノ藥ヲ加フ

白蜜 六寸 消石 六錢

右攪和シ日常飲料トス。是ヲ服ノ下利スル者ハ消石ヲ去ル○久欬痰血及肺瘍等ニ左ノ方亦効多シ

豁痰潤肺飲

連錢草 洞庭藍

龍牙草 乙切草 各等分

右調勻シ泡劑トシ日常飲料トス○小兒虛羸勞瘦、偃僂等ハ先、輕キ下劑ヲ與ヘ胃腸ヲ淨刷ノ後此藥一味細末トシ半錢ヨリ二刀許、毎朝空心ニ用テ亦良効ヲ稱ス○痛風脚痛腎痛等ニ是ヲ煎劑或泡劑トシ多服ノ其惡液ヲ排除シ治ス○赤痢ニ効多シ下利下血吐血等亦良○肝脾等ノ壅塞ヲ疏解シ黃疸ヲ治スルニ水煎シ服メ効アリ

洞庭藍 江戸花戸稱、ハマトラノヲ俗稱、ハロニカ羅、エレンブレイス蘭

試効葉ヲ藥用トス。微苦收瀋シ茶味ヲ帶ブ。然レ凡香氣ナシ。○淨刷。清血。發汗。利尿。止痛ノ性功アリ。○胸肺汚液ヲ淨刷シ。弛弱ヲ強壯シ。創ヲ愈ス。對症ノ劑ニ加。泡劑或水煎シ服ス。○欬嗽喘急。肺傷乾效。吐血肺瘍ヲ療ス。○欬嗽喘息吐血勞效等ノ初發ニ左ノ方甚ダ驗アリ

清肺定嗽飲

- 洞庭藍 二握
- 連錢草 一握
- 依蘭苔 各半握
- 點失刺薺 名
- 蕁麻葉 各半握
- 土木香 四錢

甘草

右件到。調和シ一撮宛取テ泡劑トシ一二碗宛服スル。一日兩三次。○痛風。傷冷毒ノ諸症及頭痛等ニ泡劑トシ服ノ血液ノ衝動ヲ抑制シ頭ヲ清爽シ鬱毒ヲ排除ス。○内藏壅塞。脾病黃疸等ニ良効ヲ奏シ惡液病。疥癬等ヲ治ス。是皆血中ノ惡液ヲ排除スルニ因ル。○内外汚穢。潰瘍創傷ヲ淨刷シ治ス。○乾葉ヲ水煎或泡劑トシ或散劑トシ服シ或細末ニ舍利別。若ハ蜜ヲ和シ煉膏トシ或蒸餾ノ露水ヲ取り或舍利別トシ服ノ前說ノ諸症ヲ治ス。

乙切草 俗稱「イツヘリコム」羅「シントヤシスコロイド」蘭

試効 花穂ヲ用フ温煖疏解シ^バ爾撒謨^ル様ノ油ヲ含^ム收斂ノ創ヲ愈シ凝血ヲ散ス○酷厲液ヲ緩解シ和胸ノ良藥トス。欬嗽聲嘎。肺傷勞欬ヲ治シ。吐血。下血等諸脫泄ヲ療ス。葡萄酒ニ浸シ服メ殊ニ良○勞瘵様ノ欬嗽及肺瘍ニ後方間良効アリ

淨汚清肺飲

乙切草 穂

山蘿蔔

各一握

點失刺薺 チウシラゴ

甘草

一弓

右泡劑トシ適意ニ飲服ス○内藏壅塞。神思鬱憂病。依^イ剥^ボ昆^{コン}埵^デ兒^レ。子宮衝逆等ヲ解散シ又是^レヨリ發スル精神錯亂ヲ治ス○小兒搐搦ニ花ノ末十匁ヨリ十五匁マデ毎日兩次。乳汁等ニテ用ヒ治驗多シ○胃腸ノ蠅蟲ヲ殺ス此藥水煎メ服シ或搗爛メ腹部ニ貼ス○乳汁凝固ヲ稀釋シ。婦人乳房結核ヲ消ス○利尿ノ効アリ故ニ間^マ黃疸水腫ニ殊効アリ○花穂ヲ細末トシ一錢ヲ服ス。或一握ヲ取り沸湯ニ泡出シ或水煎シ或麥酒或葡萄酒ニ煮テ服ス

乙切草油 製法 花穂ヲ採陰乾メ製ス其法加^カ密^ミ列^レ煎

油名ト同シ。此油血紅色ナリ。**試効**外敷ノ秀偉ノ愈創藥トス。技爾撒謨様ノ効アリテ創傷潰瘍ヲ愈シ膿ヲ排ヒ肉ヲ生シ。又凝血ヲ散シ打撲傷殊ニ神經傷。肢節顫振ヲ治シ或痛風脚痛等ニ擦テ痛ヲ止ム。
依物
叔叔

金花草

又秋ノキリンサウ共ニ花名ソリダゴ
ヒルガアウレア羅キユルデンルーデ蘭

試効葉温煖開達。微收瀘ス。○愈創ノ殊効ヲ稱ス。内
 外創傷潰瘍瘻瘡並ニ斷ノ腐壞咽喉口中潰爛等ヲ
 淨刷シ愈スニ用フ。○吐血下血赤痢下利ヲ止ム。○

利尿ノ効アリ。小便閉ヲ通シ。腎膀胱ノ結石ヲ碎キ。
 腎痛石淋ヲ療ス。○肝脾ノ壅塞ヲ疏解ス。○水煎泡
 劑或細末トシ服ス。
叔叔
伍

茜草

アカ子和名 リッピア ティン
キトリッ ハ 羅 メ カ ラ プ 蘭

試効根ヲ藥用トス又赤色ノ染料トス。○性温。味帶
 苦。收瀘。解凝。利尿ノ効アリ。故ニ肝脾腎。子宮ヲ淨刷
 シ脾病。黃疸水腫。諸腺腫ニ用テ一種ノ疏解開達ノ
 良藥トス。肝脾壅塞ノ諸症ニ此藥水煎或泡劑トシ
 用テ治驗ヲ稱ス。○打撲損傷及内部創傷ニ用テ凝

血ヲ散シ痛ヲ止メ捷効ヲ奏ス。水煎シ或葡萄酒若
 ハ麥酒ニ浸シ或燒酒ニ浸シテシキ丁幾劑トシ用フ○或
 云。此根ヲ内服スレバ小便及婦人乳汁赤色トナリ
 終ニ諸骨亦赤色トナル。是ヲ以テ諸骨病ニ用テ奇
 効アリ或云是ヲ久服スレバ諸骨軟柔○小兒佝僂
 病ニ此根ヲ試用レテ四年。總テ殊効ヲ得タリ即テ後方
 經驗ノ良劑トス

茜根煎

茜根 二錢

橙皮 乾者 十片

茴香 搗碎者 十五片

右細剉ニ磁罐ニ内水六升ヲ加、煮減メ二升トシ。冷
 定メ上清ヲ取、硝子壘ニ收メ一日ノ服量トス。小兒
 諸骨漸柔軟痿弱ノ舉動シ難ク或諸骨既ニ彎屈ス
 ト雖他ノ惡症ナキ者ハ是ヲ用テ回復ス。宜此煎劑
 ニ蜜ヲ適意ニ加與ヘ且乳母モ亦服セシムベシ。若
 大便祕閉或下利腹脹等ノ患アル片ハ各其對症ノ
 藥ヲ加ベシ但此劑數月連服セザレバ良効ナシ羅
 ○經閉茜根經驗說 茜根ハ經閉ニ峻効アル
 藥トス。數是ヲ試用ルニ性効尤平穩ニ他ノ通經
 藥ノ如キ攻撃驅泄ノ害ナシ即其質驗說ヲ左ニ舉

第一 一婦人十八歲。經閉二個月。發熱。惡心。腹部風氣痞脹。腕脚疼。顫振。脉八十八動。脉動說因幾那條註ス脉力平常。異ナラズ。此症先吐劑ヲ與。吐セシメテ胃ヲ淨掃シ。茜根末半錢宛用。一日四次。連用六日。二月經來リ止ザル。二日

第二 一婦人三十四歲。經閉七個月。子宮衝逆ノ諸症ヲ發シ。又時々神思憂悶ノ症ヲ患テ精神錯亂ヲ兼。因テ孕鹼酒石ヲ用ヒ。次ニ阿魏ノ丸藥ヲ與ル。都テ十八日ニノ顯功ナシ。乃茜根末二刀宛用ル。日三次。連服三日。二月經來ル。四日。是ヨリ諸症漸

退キ爾後月經調順ナリ

第三 一婦人二十三歲。寒氣ニ冒觸メ經閉ヲ患。一既ニ五年。其症頭痛。惡心。胃部痞滿。拘痛。渴アリ。肋中疼。肢體懈惰。白帶下。大便秘結。不寐。稍勞動スレバ呼吸短促ス。脉七十動ニノ弱。此症先吐劑ヲ與。テ胃ヲ淨掃シ。茜根末半錢宛用。一日四次。次ニ一錢宛用フ。是ニ由テ脉進マズ。渴増サズ。連用十日。二月經來ル。四日。翌月亦月經前月ヨリ多シ

第四 一婦人二十二歲。寒氣ニ冒感メ經閉ヲ患ル。二個月。頭痛。惡心。胸腹痛。欬嗽。脚冷ヲ兼ヌ。此症先吐

曾了口商卷四 卷四 風雲堂

劑ヲ用ヒ次ニ通經ノ數方ヲ投スレモ皆効ナシ。終ニ茜根未ヲ與ル_レ日四次。連用十四日ニ_レ月經來ラズ。然_レモ諸症盡ク解散スル故ニ患者服藥ヲ厭_ハヒ治療ヲ休ム

第五 一婦人二十一歳。二年以來月經甚_ク稀_ク。二個月以來經閉シ。頭痛惡心。頭眩暈。噫氣。胃中酸敗液ノ症ヲ兼子渴アリ。因テ先_ニ吐劑ヲ與テ吐セシメ。次ニ幾那及撒兒末爾扶斯_名ヲ用ル_レ日數日ニ_レ患症荏苒。是ニ於テ茜根未ヲ與ル_レ日四日ニ_レ諸症解散ス。然_レモ月經通セズ

第六 一婦人二十六歳。經閉一年許。胃中疼_ク。是ヲ按_ハバ増劇シ。效甚_ク又吐血スル_レ日二十日許。脉八十動。頗ルカアリ。因テ先_ニ刺絡ヲ施シ。胃部ニ吸角ヲ貼シ。次テ答末林度ヲ用ヒ調治八日許ニ_レ茜根未半錢宛用_レ日四次。漸ク加テ一錢ニ至リ諸症漸ク退キ。是ヲ連服スル_レ日九日ニ_レ子宮ノ部疼_ク。頭痛ヲ發ス。翌日月經來リ二日連綿ス

第七 一婦人三十六歳。經閉ヲ患_レ日四個月。小腹痛脹。嘔噦。大便秘結。子宮衝逆ノ症ヲ兼子。脉百動。因テ阿魏ヲ與ル_レ日數日ニ_レ効ヲ得ズ。是ニ於テ茜根未半

錢宛用_レ一日三次連服三日ニ_レ月經來ル

第八一婦人三十一歲。產後月經ナク二個月許ノ後。劇キ熱病ニ羅_リ頭痛惡心。胃部痞硬。背及左肋劇痛。シ夜中脚痛浮腫。白帶下。肢體顫振。脉百六動。因テ茜根。末半錢宛與_レ一日四次。漸ク加_テ一錢ニ至リ。連用七日許ニ_レ右乳房刺痛ニ堪_ズ。因テ此劑ヲ休_メ刺絡ヲ施ス_レ五回。十日許ヲ經テ再ビ右ノ劑ヲ用ヒ連用十日許ニ_レ每次月經前ニ患_ル諸症發見ス。然_レ此時劇キ嘔吐ヲ發_メ藥劑ヲ服ス_ル能_ハサル故ニ此劑ヲ休_ム十六日。經閉一_ニ年。胃中寒_ク長_ク...

第九一婦人二十八歲。經閉三個月。頭痛惡心。冷汗。脚

ニ水腫ヲ發_シ。背腕疼ヲ兼_テ子。脉力平常ノ如クニ_レ百四動。薩毘那_名末ヲ用_レ十日ニ_レ効ナシ。次茜根末一錢宛用_レ一日四次亦効ナシ。又甘汞。鐵屑ノ丸劑及健質亞那越幾斯劑等ヲ用_レ數日。總テ寸効ナシ。第十一婦人十八歲。經閉五個月。頭痛。耳鳴。テ聽_ヘ難ク。子宮部疼_ミ。脉八十四動。乃刺絡ノ瀉血ス_ル九_ノ許。其血焮衝ノ候。血凝固_メ湧_ル云_ハアリ。次ニ茜根末半錢宛用_レ一日四次。其後二月宛與_ル一日五日ニ_レ月經來_レリ

第十一 一婦人二十三歲。熱病後。月經延滯二週許。是
 二茜根末一錢宛用ル。日四次。連服十四日。ニノ効
 ナシ

第十二 一婦人二十一歲。體稟多血。經閉一年許。惡心
 胃痛。痞脹。食進マズ。脊椎疼之。右踝腫起。シ肢體勞倦
 ス。是ニ刺絡ヲ施シ其血。焮衝ノ候アリ。次ニ吐劑ヲ
 與ヘ吐セシムル。一回。次ニ茜根末一錢宛用。日
 四次。但時々嘔氣ヲ發メ服シ易カラズ。然レ是ヲ用
 一五日ニノ月經來ル

第十三 一婦人十九歲。經閉二月餘。且傷冷毒樣ノ遊

走痛ヲ發シ發汗甚ダシ。脉九十六動。是ニ刺絡ヲ施
 ス。一兩次。其血質平常ト異ナラズ。乃茜根末半錢宛
 與。日四次。其後一錢宛用。又其疼甚キ部ニ芫菁
 發泡膏ヲ貼シ右ノ劑ヲ用。十四日ニノ月經來ル

第十四 一婦人三十六歲。經閉三年ニノ其間暫ク熱
 病ニ罹レ。凡今既ニ回復ス。乃茜根末一錢宛與。日
 四次。連用八日ニノ月經來ル

第十五 一婦人十八歲。經閉六個月。邇來搐掣ヲ發ス
 ル。日兩三次。又子宮衝逆ノ症ヲ兼ヌ。因テ亞的兒
 ヲ取り四茶匙宛用。日四次。即搐掣並ニ子宮衝逆

曾丁口身真竟

卷四

風雲堂藏

ノ諸症解散ス。因テ茜根末二刀宛用_レ了日_二四次。翌日一錢ヲ一服トシ四服ヲ患者ニ與_テ四次ニ用_了了ヲ示ス。然_レニ患者誤テ是ヲ一頓ニ服ス。然_レニ眩暈ノ候ナク。其次日。月經來ル

第十六 一婦人二十二歳。經閉一月半許。從前熱病ニ罹_カリ脉百動。乃茜根末一錢宛用_了了日_二四次。連服十四日ニ_メ仍月經ヲ見ズ。故ニ後服ヲ止ム

第十七 一婦人二十五歳。六箇月中月經一回來リ。且_ツ炊腫眼ヲ患フ。因テ刺絡スル_了了日_二兩次ニ_メ茜根末二刀宛與_了了日_二四次。續用十日ニ_メ月經來ル

第十八 一婦人産後。其兒ヲ乳養スル_了了日_二三年。其夏乳養ヲ絶_ト雖_モ仍_{ナホ}月經來ラズ_メ季冬ニ至ル。因テ茜根末半錢宛用_了了日_二四次。其後一錢宛用_了了日_二八日ニ_メ月經來ル

第十九 一婦人二十一歳。經閉四個月。爾來毎月吐血スル_了了日_二數日。因テ刺絡ヲ施シ綠礬精及消石劑ヲ用_了了日_二八日。次ニ茜根末半錢宛用_了了日_二三次。其後一錢宛與_了了日_二四次。續用十四日ニ_メ月經來。爾後吐血止ム
○右經驗說ヲ觀レバ患者十九人ニ_メ此藥ノ効ヲ得ル者十三人。其餘モ亦他ノ患症アルガ爲ニ全功

ヲ奏セザルガ如シ即第四第五ハ經閉治セザレハ
 其患症悉ク治スル故ニ此藥ヲ止ム第八ハ此藥ヲ
 吐スル故ニ功ヲ成_ス不能ハズ第九ハ水腫ニ因テ通
 經藥ノ功ヲ得ズ第十一ハ熱病ニ因テ藥効ヲ妨ク
第十六亦既ニ熱病ヲ患ヒ脉仍數ニ宛モ勞瘵熱
 ノ如シ故ニ右ノ三症ハ先其當時ノ病全治スルニ
 非レバ通經藥モ効ヲ奏スル不能ハズ然レ唯是ヲ
 右ノ患者ニ歷試シ其症ニ隨ヒ當否アルコトヲ曉了
 セシメン爲ノニ○又右經驗說ヲ考ルニ經閉ノ年
 月久キ者及病性險重ナルガ如キ症ハ却テ其藥効

切實ニノ治シ易キガ如シ即第一第十三ハ經閉二
 個月第七第十九ハ四個月第十ハ五個月第十五第
 十七ハ六個月第二ハ七個月第六第十二ハ一年第
 十四ハ三年第三ハ五年就中第六第十九ハ吐血ノ
 症アリ然_ルニ其効驗ナキ症第十一ハ二週第十六ハ
 一月半第四第五第八ハ二個月第九ハ三個月經閉
 ス○患婦ノ體稟ニ隨テ焮衝性ト粘液性ノ病アリ
 凡焮衝性ノ症ハ酷厲ナル通經藥ハ大害アリ薩
 類故ニ通經藥ハ病性ヲ辨識ノ用ニ非レバ効ナシ那
 然_ルニ茜根ハ病性ニ拘ラズ投メ効アリ即第六第十

〔二〕第十七 第十九 ハ皆焮衝性ノ甚者ナリ故ニ刺絡ノ功アリ 〔第二〕 〔第三〕 〔第七〕 〔第十四〕 〔第十五〕 ハ焮衝性ト相反對ノ粘液性ノ症ナリ。然レ皆茜根ヲ用テ全功ヲ得タリ其他不治ノ症 〔第八〕 ハ焮衝性ノ病ニ屬ス 〔第四〕 〔第五〕 〔第九〕 ハ毫モ焮衝性ノ候ナシ其餘ハ皆右兩性ノ中間ニ屬スル症トス凡レ經閉ハ焮衝ナキ者多シ ○茜根ハ焮衝ヲ兼ル症ニ用レレ是ヲ増劇セズ。脈ノ數勢ヲ進起セズ。曾テ焮腫眼ヲ兼ル經閉二人ニ是ヲ試用ニ毫モ其焮衝ヲ増加スルコトナシ ○ 〔第六〕 〔第十九〕 ノ如キ失血アル症ハ熱性酷厲ノ通經



藥薩那ノ類

ハ的當セズ。然レ是ニ茜根ヲ與レハ吐血止ニ並ニ發熱渴等ノ症減ノ月經通ス。或レ經閉治セザル者モ兼症退テ必モ患者ニ損害ナシ。即チ 〔第四〕 〔第五〕 ノ症ノ如シ。故ニ此藥ハ焮衝ヲ増サズ減セズノ効ヲ爲スト知ベシ ○或云。茜根ハ收瀉ノ性能アルニ由テ通經ノ殊効ヲ致ス。猶鐵劑ノ如シト。然レ此說著實ナラズ。此藥ハ唯刺戟衝動ト收瀉トノ兩効ヲ兼ル者ナリ。試ニ茜根浸劑ニ撒兒末サールマール扶斯ヲ加ルニ黑色ヲ見ス。コトナシ是甚ギ收瀉ノ質ナキ候ナリ ○此藥。焮衝ヲ兼ル諸症ニ用テ妨害ナシ故

ニ強壯スル効ナキト明白ナリ。然ルニ**第五**ノ症ノ如キ幾那ヲ用テ効ナク茜根ヲ與テ諸症解散スルハ是強壯藥ノ如シ。是ヲ考究スルニ茜根ハ脉管質ニ効ヲ爲サズ。又通泄ノ諸器ニ一ニ變化ヲ爲サズ。唯神經質ト諸液質ニ其効ヲ致シ。殊ニ子宮神經ヲ衝動ノ月經ヲ通スル一種ノ奇藥トス。是猶吐藥ハ胃ヲ刺戟シ下劑ハ腸ヲ衝動シ利尿藥ハ腎ニ侵入スル等。各部一處ニ限リテ殊効ヲ見ス者ノ如シ。若然ラズノ全軀諸器一般平等ノ効力ヲ致スハ右ノ**第六****第十九**ノ症ニ用テ必ズ肺胃ノ諸管ヲ刺戟

シ逾其吐血ヲ増發スベキナリ。然ハ體中他ノ諸部ニ効力ヲ爲_スト甚緩慢ニノ獨リ子宮ニ雄偉ノ變化ヲ致シ駿速ノ排除ヲ爲ス_ト殊ニ奇異ナリトス。○處女未ダ月經ヲ見ズノ久ク經閉スル者ハ間險症アリ。是或生涯月經ナキ者アリ或天賦ニ因テ子宮腔等通經ノ道路。生合閉塞シ或子宮ノ形體常資ニ違或體中諸器患害アルヨリ來_レト數屍體ヲ剖解ノ見聞スレバナリ。○通例細末半錢宛日三次。二日用次ニ二夕宛日三次與へ。兩三日連用ノ効ナキ片ハ一錢宛日四次用ベシ。是ニ由テ胃中ニ重滯セズ。泡

劑煎劑ニ比スレバ簡便トス○此藥的當スレバ大抵服後第三日ヨリ第十二日マデノ間ニ月經通ズ。是ヨリ遲延スル者稀ナリ○薩毘那^{ササビナ}モ亦專ラ子宮ヲ衝動スル通經ノ峻藥ナレ^レ苮根ニ比スレバ性味酷烈ニシテ大ニ刺戟シ。過用スレバ崩血ヲ發シ孕婦ハ墮胎ス。然^レ苮半錢ヲ一次ニ用^レバ妨害ナクノ經閉ニ捷効アリ。但^シ甚ダ刺戟衝動ノ血ヲ驅逐シ功ヲ成ス故ニ苮根ノ性功ト同ジカラズ。因テ其經驗說ヲ左ニ舉テ參攷ヲ資ク

第一 一婦人二十二歲。經閉二個月。肢體顛振及子宮

衝逆ノ症ヲ兼ヌ。因テ刺絡ヲ施シ吐劑ヲ與ヘ。次ニ芸香末ヲ用^テ衝逆快治ス。然^レ月經來ル^ルナシ。因テ縛股法ヲ施シ。股動脈ヲ壓止スル^ル半時許^{縛股帶ニ}ヲ施シ脚ニ循行スル動脈ノ血ヲ阻遏^ノ是ヲ子宮動脈ニ循行セシムルナリ。是ニ由テ眩暈。呼吸促迫。背及子宮ノ部。攣急疼痛ノ煩懣シ。脈百三十動許。次ニ薩毘那^{ササビナ}末半錢宛用^テ一日^ニ兩次。續用四日ニ^テ月經來リ二日連絲タリ

第二 一婦人二十三歲。經閉六個月。頭痛。腹部風氣痞脹。食消化シ難ク。且^テ酸敗液ノ症ヲ兼子。脈六十八動ニ^テ弱。先^ニ吐劑ヲ用^ヒ次ニ鐵屑ト健質亞那^{ケンシツアナ}越^エ

幾斯劑ノ丸藥ヲ用ル_レ十日ニモ効ナシ。因テ薩毘那未_ナ一_ナ月宛與_レ一日_ニ兩次。續服三日ニモ月經來ル

第三一婦人十五歲。未ダ月經ヲ見ズト雖モ經閉ノ諸症アルヲ以テ是ニ鐵劑。縛股法前ニ出ツ自餘通經諸藥ヲ投スレ_レ尺寸効ナシ。因テ薩毘那未_ナ半錢宛用_レ一日_ニ兩次。續服八日ニモ効功ナク。唯每次腹痛ヲ發スルノミ

第四一婦人三十一歲。經閉八個月。惡心。嘔噦。胃痛ヲ兼子。脉八十二動。乃_ナ縛股法ヲ施_メ服ノ上部及_テ子宮部脹痛シ背疼ム。因テ薩毘那未_ナ一_ナ月宛日_ニ兩次。次ニ

半錢宛日_ニ兩次用_レ五日。少腹痛甚_クノ嘗テ通經前ニ發セル痛ノ如シ然_レ尺月經來ラズ。因テ數回刺絡ヲ施_メ竟ニ全功ヲ得タリ

第五一婦人二十五歲。經閉六個月。乃_ナ縛股法ヲ施ス_レ兩次。即_チ子宮部。攣痛ヲ覺ル_レ嘗テ通經前ニ患ル痛ノ如シ。又頭痛。惡心。呼吸不利ス。因テ薩毘那未_ナ一_ナ月宛用_レ一日_ニ兩次。漸ク加テ一錢宛與_レ八日ニモ月經來ル。○右ノ試說ヲ以テ觀レバ薩毘那未_ナハ通經ノ峻藥タル_レ知ベシ但_シ第三ノ症ハ子宮等ノ常資ニ違フ者タルカ。諸方法ヲ施セ_レ尺毫モ効驗ナシ。凡

此藥ハ甚々多血ノ症ニハ的當セズ故ニ第四ノ症ハ刺絡ノ功ヲ得茜根モ亦獨リ子宮ヲ衝動ノ通經ノ捷効ヲ奏スト雖モ各其性効ノ殊異ナルヲ屢試ノ審ニ察スベシ

依羅貨伍

龍芽草

ギンミヅヒキ俗稱 アグリ
モニア羅 アグリモニイ蘭

試効葉ヲ用フ收瀋愈創淨刷排膿ノ効アリ○血中ノ敗汚惡液ヲ清掃シ腐壞ヲ攘除ス○痰効勞嗽吐血下血下利肝崩白帶下經久淋疾小便頻數等ニ驗多シ○咽喉口中膿瘍潰爛ニ漱藥トシ膿ヲ排ヒ痛

ヲ止メ良驗ヲ稱ス○洗藥トシ汚穢ノ潰瘍創傷ヲ乾愈ス○肝脾壅塞ヲ疏解シ脾病ノ諸症ヲ治ス○水煎或泡劑トシ用フ

叔淑伍

山蘿蔔

マツムシサウ俗稱 スカビヲ
サ羅 スキルフトコロイド蘭

試効莖葉花匠ニ用フ○汚液ヲ淨刷シ血中ノ惡液ヲ排泄シ粘稠ヲ稀釋ス○清血淨刷愈創解凝發汗ノ効アリ○内部ノ膿腫潰瘍ヲ療シ膿穢敗液ヲ小便ヨリ排除ス○欬嗽胸脇痛肺瘍勞效等ニ用テ能胸肺ノ痰ヲ豁ノ咯出セシメ咽喉膿瘍ヲ淨除シ愈

スニ用フ。胸病ニハ水煎シ蜜ヲ攪和シ服ノ良○疥癬。白禿瘡。小胞汗齧。瘙痒及腐穢潰爛ノ膿瘍等一切皮膚病ヲ治ス○水煎或泡劑トシ内服シ或洗藥トシ外用ス 叔 叔 伍

草零陵香

キハギ花戸名 メリロテス羅

メリホリウム メリロト蘭

試効花穂ヲ用フ○香竄ニノ開達。緩和。止痛。疏解。驅風ノ効アリ○加密列等ヲ加ヘ水煎シ用テ心腹痛。疝痛。内部。焮衝痛。赤痢痛。腎痛ヲ緩解ス○傷冷毒痛ニ是ヲ内服シ或外敷ノ良効ヲ稱ス○接骨木花 カ

密列等ヲ加ヘ泡劑或水煎シ。若ハ吉利詞。參兒。蒸湯藥。琶布等トシ外用ノ疝腹痛ヲ和消シ。寒熱壞疽ノ生肉ト死肌ヲ分離セシメ或焮腫眼。胸脇痛。腫瘍等ヲ消散シ疼痛ヲ止ム 叔 伍 叔 伍

芸香

ベンルダ花戸名 ルータガラヘ ヲレンス羅 クインルイト蘭

試効葉ヲ藥用トス○香竄質ヲ以テ健胃。利尿。通經ノ偉効ヲ稱ス○神經病。癩症。昏睡。小兒搐搦。蟲症。子宮衝逆痛。頭痛。疝痛。神思憂悶病等ニ殊効ヲ稱シ風氣痞滯ヲ驅散ス○泡劑トシ或露水ヲ取り眼洗藥

トノ視力乏弱ヲ復シ淚眵漏泄スル症ニ大効ヲ稱
 ス○虚弱ノ肺焮衝ハ芸香ニ加密列薄荷ヲ加ヘ煮
 テ琶布トシ燒酒少許ヲ加テ胸ニ貼シ尚危險ノ症
 アル者ハ龍腦ヲ加施ノ超羣ノ効ヲ稱ス是皮神經
 ニ竄透ノ衝動シ疏散ノ功ヲ爲スニ因ル故ニ此症
 ニハ大ナル發泡膏ヲ胸ニ貼ノ尤良トス

芸香水

製法主治
 名ニ出ツ

前説ノ諸病ニ良驗アリ此露水ハ
 精氣淡薄ナル故ニ芸香ノ生葉ヲ數回加蒸餾スベ
 シ是ニ由テ醇厚トナル否ラザレハ殊効ナシ或
 其症ニ隨ヒ苗香水薄荷水等ヲ以テ是ニ代用ノ可ナ

リ
 依
 叔
 伍

苦意

アギク又センボンキク俗稱
 アパルテニウム羅ムドコロイド蘭

試効花穂ヲ用フ○温煖開達シ竄透刺戟ス纖維弛
 緩ノ粘液壅鬱セル諸病即處女病萎黃病粘液腫等
 ノ諸症ニ良驗ヲ稱ス○纖維弛弱粘液質ノ經閉ヲ
 驅泄シ産後腹痛ヲ除キ惡露ヲ下ス○或云體中粘
 液壅鬱多眠ノ經閉ニ加密列ヲ用テ効ナキ者苦意
 ヲ加ヘ泡劑トシ與テ捷効ヲ得ル多シ○小便ヲ
 利シ水腫ヲ療ス泡劑或水煎シ用フ○結石腎痛等

ノ壅塞ヲ疏解ス○此藥温煖ノ功アル故ニ總テ炊
衝性ノ病ニハ害アリ○蒸湯劑。琶布等ニ製シ外敷
ノ諸寒腫或乳房結腫ヲ消シ又偏頭痛ヲ治ス
叔依 叔依

新訂增補和蘭藥鏡卷四終

新訂增補和蘭藥鏡卷五

榛齋先生譯述 男 宇田川 榕 榕菴校補

大黃 「ラバルバル」又「ウム」羅 「ラバルベル」蘭

撰品 上品ハ其質充實ノ乾輕外面深黃雜腹蘭色裏
淡黃或白黃色ニメ黃赤ノ紋理及白斑アリ。嚼テ粘
著セズ響ヲ爲シ。黒斑ナク蛀刺ナシ或正中眼ヲ穿
者アリ藥舖コレヲ魯西亞大黃ト稱ス姦商動スレ
ハ土大黃羊蹄根ヲ雜敗ク然レ是ヲ橫斷スレバ車
輻紋アルヲ以テ知ベシ眞品必車輻紋ナシ○大黃ハ支那及支

那ニ屬ル韃靼地方ニ産ス。其他是ヲ産スル處ナシ
〔試効〕大黃ノ質ニ麩ゴムト華爾斯ハルアリ。麩ゴム質尤多シ。
又香竄揮發ノ質ト收瀝ノ質アリテ相混合ス。香竄
揮發質ハ刺戟衝動ノ瀉下シ。收瀝質ハ收固強健ノ
効ヲ爲ス。○胃腸鬱滯ノ粘穢汚物。敗液粘液留飲。膽
液質惡液ヲ疏滌シ日常瀉下ノ要藥トス。○胃腸ノ
諸管纖維縱緩セルヲ強壯シ小便ヲ疏通ス。是ヲ服
スレバ其色小便ニ浸洩ノ黃赤ナルヲ以テ知レベシ
但胃腸ノ感觸甚キ人は是ヲ服スレバ痞氣腹痛惡心
嘔噦ヲ發ス。○凡、病毒鬱滯セル諸症ハ大黃闕ベカ

ラガル要藥トス。假令タトハ下利赤痢飧泄。胃腸熱。間歇
熱。黃疸。脾病。依利昆垓兒イホコシゲル。處女病。白帶下。疝痛。胃腸酸
敗液。小兒遷延熱。腸間膜ニ膠粘液壅滯ノ腹滿スル
等ノ如シ。○瀉下ノ効ヲ取ルハ左ノ方服レ易クメ
捷効アリ

掃腸桂黃飲

大黃剉 二錢

桂精 一弓

沸湯 五弓

右罐ニ入。蓋閉シ浸ス。六時ニノ漉過シ桂精ヲ攪
和シ二三匙宛數服ス。○左ノ方亦良。殊ニ熱症及水

腫様ノ症ニ尤^モ効アリ

葯黃消英散

大黃

葯刺巴

消石 精製者

酒石英

各等分

右細末トシ調和ノ散劑トシ一刃ヨリ二刃マデ服

○惡厲ノ痢疾初發下劑ヲ與テ治セズ漸ク血ヲ交
へ下シ患者逾^レ憊困スル症ハ後方奇効アリ

定痛消毒膏

大黃 細末 十^分

的里亞加 半錢

右和調シ適宜ニ舍利別^セ名^ヲ加^テ煉膏トシ一次ニ

服ス其症ニ隨ヒ一晝夜ニ四五次モ與フベシ此劑
的里亞加^カヲ以テ腸ノ劇盛ナル運動ヲ靜止ノ其攣
急絞痛ヲ緩解シ大黃ヲ以テ鬱滯ノ粘穢汚物ヲ導
泄シ且^レ酸敗ノ侵蝕毒ヲ驅逐ノ腸ノ淤衝ヲ防ナリ
○胃腸ノ病毒鬱滯ヲ驅除スルニ後方^モ亦良

蝟蛄消黃散

大黃

芒消

蝟蛄石 或^ハ雞卵殼 各等分

右散劑トシ一刃ヨリ半錢マデ服ス此劑或^ハ噫氣吞
酸嘈雜惡心痞悶ヲ治シ或^ハ間歇熱^ヲ替留熱ノ初發ニ

用テ胃腸ヲ清掃シ熱毒ヲ驅除ス。或、風氣痞滯ノ諸症ハ橙皮末少許ヲ加、尤効アリ。疝痛ニハ甘消石精。舍電阿芙蓉液（各）二十滴マデ加テ速効アリ。淋疾ハ此散劑毎日三四次與テ尿道、焮熱減シ其膿漸ク清稀トナル片ハ此散劑ニ拔爾撒謨格洋霍三四滴宛加、毎日四次用レバ治ス。其膿盡ク消スレハ尚稀液出テ荏苒タル症ハ右ノ拔爾撒謨十滴許宛飲液ニ點服シ仍治セザル者ハ十五滴若ハ二十滴モ用テ全治スベシ。但時々右散劑ヲ兼用ノ大便ヲ通利スベシ。○大黃ハ腸ヲ收固シ強壯スル性効ヲ兼ル故

ニ是ヲ服シ瀉下ノ後。大便澁滯ノ快利セズ。或居恒大便閉ヲ患ル人。常ニ大黃ヲ服スレバ是ニ慣テ通利セズ。久服スルニ隨ヒ逾便閉ヲ患フ。此症ハ患者ノ體稟ニ隨ヒ旃那葉。盧會等ヲ用ヒ。或大黃ニ白石鹼ヲ加用レバ能通利ス。此劑凡遷延諸病ノ大便閉ヲ患テ解凝劑ヲ處スベキ症ニ甚ダ適應ス。又腹内諸藏ニ粘稠液及膠粘汚物壅塞ノ發スル諸症ニ極テ驗アリ。又右ノ諸病ニ於テ患者刺戟ノ藥劑ニ堪フベキ症ハ左ノ數方皆的効アリ

藥鹼錠

「ガポヤラピヌス」
「セーブハンヤラ」
「バ蘭」

藥刺巴ヤラバ華爾斯ハルス或藥刺巴バ細末

白石鹼名 各二弓

燒酒 二十度者分量適宜 溶化スルヲ度トス

右二味ニ燒酒ヲ加ヘ煖處ニ置テ溶化シ文火ニ上セ水氣ヲ蒸散メ熬乾シ丸藥トナル可ニ至リ。十日許宛服スル一日三次

解凝藥鹼丸

大黃 石鹼 各一錢半

藥鹼錠 前出 半錢

右研和シ三氏ヲ一丸トシ銀箔ヲ衣トシ三丸宛用一日三次。但瀉下ノ多少ニ隨テ加減ス

解凝黃鹼丸

大黃 石鹼 各一錢半

藥刺巴 半錢

右研末調和シ三氏ヲ一丸トシ三丸宛用一日三次
○水腫ノ停水ヲ驅逐スルニ後方捷功多シ

芫黃驅水丸

大黃越エキス幾斯劑後出 芫菁

甘草 各半刀

右細末ノ調和シ一氏ヲ一丸トシ二丸宛服スル一日兩次
○肝藏虛衰ニ因テ膽液ノ分利虧損シ大便

閉。食消化セザル等ノ症アルハ左ノ方殊効アリ

加羅疏肝丸

大黃 十匁

乾姜 三匁

加羅蔑兒カロメール 三匁或四匁

右細末トシ調勻ノ丸藥トシ一服トス。七日ニ一服用フ○蟲症或腸中粘液留飲。膽液鬱壅セル諸症ニ後方超羣ノ下劑トス

加羅姜黃散

大黃 六錢

乾姜 半錢

加羅蔑兒カロメール 或甘草 一錢

右散劑トシ每服半錢○後方亦良驗アリ

加羅荷黃丸

大黃 二錢

薄荷丁幾劑名 十滴

加羅蔑兒カロメール 半錢

右調和シ蜜少許加テ三十丸トシ。毎日三丸。或三日毎ニ三丸宛服ス○大黃ハ霸王鹽ヲ加テヨク疏解開達シ大便閉ヲ治ス。又體質虚弱。胃腸强健ヲ要スル症ニ用テ一種ノ健胃劑トスタトハ假令ハ後方ノ如シ

黃霸健胃散

大黃 五匁

霸王鹽 六匁

薄荷 少許

右散劑一服トシ用テ日ニ二三次○小兒酸敗液ノ諸症或大便閉ヲ兼子其他小兒諸病ニ後方甚驗アリ

消酸解毒飲

大黃 十五匁

麻^マ屈^グ涅^ネ失^シ亞^ア 一匁

益智 十匁

白罌粟舍利別 一錢

蒸餾水 二匁

右先^シ三味細末トシ餘藥ヲ攪和シ毎日一茶匙宛與^ル一日四五次○傷冷毒失^シ苟^ケ兒^ル陪^ボ苦^ク等ヨリ發スル齩齒痛ハ大黃ヲ嚼^ク合^セテ其痛ヲ祛キ斷^テ固^ム

服量 細末ハ一月ヨリ一錢ニ至ル桂末或肉豆蔻末ヲ加^ヘテ良○一歳ノ小兒ハ四匁ヨリ十匁ヲ與^フ十歳マデハ十五匁ヨリ一月マデ用^フ○水煎泡劑浸劑ハ大黃二三錢マデ水八匁ヲ加^ヘ製^ス

大黃浸劑 散劑丸藥ヲ嫌^フ者ハ此劑ヲ用^テ良

製法 大黃 一匁 沸湯 十六匁

右蓋閉シ浸ス^テ十二時瀝^テ滓^ヲ去^リ聽^用ス

大黃丁幾劑 瀉下ノ良劑トス虚冷ノ症殊ニ佳服量一錢許適宜ノ飲液ニ點服ス

製法 大黃 一錢 燒酒 十五度者 八匁

右浸ス_一六日。滓ヲ去リ固封シ貯フ_固

又法 大黃_剉 四錢 酒石鹽_{或剉篤亞斯} 一錢

桂露 六_弓 燒酒 一_弓

右浸ス_一六日。滓ヲ去リ固封シ貯フ_固

又法 此方燒酒ヲ用_上六故ニ 水製_丁幾劑ト名_ク 大黃 四_弓 剉篤亞斯 一_弓

蒸餾水 八_弓

右硝子壘ニ内蓋閉シ爐邊ニ置テ浸_一四日。滓ヲ去リ固封シ貯フ_固 大人ハ一二匙。小兒ハ一茶匙死與_フ

又法 是温煖瀉下ノ良劑トス。疝痛。痞氣鬱滯。腹

脹等ヲ治ス 大黃 十錢 益智 三錢

大熱燒酒 十五度者 十_弓

右硝子壘ニ内固封シ浸_一六日。滓ヲ去リ貯へ。一錢ヨリ一_弓マデ水等分ニ加_一用_フ○胃腸虚弱。運化弛慢ニノ風氣痞滯。食消化シ難キ症ハ幾那。乾姜。加_カ密列_レヲ加_一浸_シ用_テ尤_モ良○嘈雜懊惱。胸中燒_カ如_ク或酸水ヲ吐_シ心腹刺痛スル症ハ礬蓬鹽晶ヲ加_一用_テ速効アリ

又法 胃虚ノ諸症。飲食消化シ難ク或_一下利疝痛

等ニ甚ダ驗アリ頑固ノ間歇熱遷延熱等ハ幾
那ヲ兼用シ其効力ヲ輔助スベシ

大黃 二弓 健質亞那 四錢

攝爾扁答 或、纈草 燒酒 十五度者 二匕

右硝子壘ニ内浸ノ藥氣ヲ出シ滓ヲ去リ固封シ貯
一匙宛數用フ 依

又法 脾病依剥昆垓兒子宮衝逆ノ諸症ニ用テ

大便壅滯ヲ通利ス○小兒冒寒傷冷毒ニ因テ
頸ニ發スル腺腫ヲ消散ス○凝體纖維ノ弛虛
緩弱ニノ粘稠液腸間膜腺ニ壅塞シ腹滿スル

等ニ大効アリ大人ハ一二匙宛用フ。小兒ハ三
十滴ヨリ六十滴ニ至ル

大黃 二弓 乾葡萄 一弓

拘櫟皮 甘草 各四錢

益智 二錢 葡萄酒 二匕

右五味到合和シ浸ス_レ四日。滓ヲ去リ後藥ヲ加フ

土木香越幾斯劑 四錢

沙糖 三弓

右攪合ノ溶化シ固封シ貯フ 依

大黃越幾斯劑 此劑瀉下シ且強壯スル功アリ故

幾那煎ヲ用ル症ニメ大便閉ヲ患ル者ニ適應
 ス。殊ニ散劑煎劑ヲ嫌フ人ニ用フ。但_レ瀉下スル
 ニハ是ヲ丸藥トシ或_レ散劑トシ或_レ飲液ニ溶化
 シ用テ尤_モ良_ク服量一二刃ヨリ一錢ニ至ル強壯
 藥トスルニハ十氏ヨリ二十氏ニ至ル

製法

大黃剉

一匕

沸湯

十六匕

右蓋閉シ浸ス_レ十二時。瀝テ上清ヲ取り其滓ニ沸
 湯八匕ヲ加ヘ浸ス_レ十二時。瀝テ上清ヲ取り前ノ
 液ト合シ熬乾メ錠ト爲ス

大黃舍利別

製法主治
名ニ出ツ

緩下ノ良劑ニメ大便閉ニ用

フ小兒ハ甘味ニメ服シ易シ一卵匙宛與フベシ○
 大黃ハ服量少許ニメ瀉下ナキ程ニ用_レレバ一種ノ
 解凝藥トナリテ効驗甚ダ多シ凡_レ諸管纖維ノ弛屈
 縱緩ノ粘液壅塞シ發スル黃疸。脾病。依_イ剥_ホ昆_コ堙_テ兒_ル粘
 液腫。鼓脹等ニ用_レレバ此藥ノ衝動疏解ノ効力ヲ以
 テ其弛緩セル諸管更ニ運動ヲ増發シ其壅滯セル
 惡液ヲ推盪メ驅除スルナリ然_レニ纖維ノ強硬牽張
 ノ既ニ硬結腫トナル者ハ治シ難シ○大黃ハ收瀉
 ノ胃腸ノ纖維ヲ強壯スル故ニ腸ノ運化弛弱怠慢
 ノ諸症ニ用_レテ効アリ但_レ是ヲ強壯劑ト爲スニハ服

量甚少許用、ベシ○腸ノ虚弱ヨリ發スル下利赤痢ニ此藥少許宛用テ良驗アリ假令バ後方ノ如シ

蕪謨乙黃散

大黃剉 一錢半

乙百葛格安那末 半錢

右沸湯三勺ヲ加テ泡出シ。漚テ滓ヲ去、後藥ヲ加フ

亞刺比亞蕪謨 一錢

過爾託亞舍利別包 三錢

右調和シ半時毎ニ一匙宛服ス○大黃炮炒スレバ瀉下ノ効減メ收固強壯ノ功多シ。故ニ病毒汚物ヲ疏滌ノ後、下利止マズ。或腸虚弱ニメ下利スル症ニ與テ腸ヲ強壯シ良驗ヲ稱ス。又赤痢、白帶下等ニ効多

シ。此症後方殊効アリ

薄荷雙黃散

大黃

炮大黃

各半錢

薄荷油

三滴

右研末ノ散劑一服トシ。飲液ニテ送下ス。其症ニ隨阿芙蓉或阿芙蓉液少許ヲ加テ良○凡、纖維弛弱ノ愈難キ潰瘍ニ大黃末ヲ摻メ排膿生肉ノ功ヲ稱ス

依福叔
伍華

土木香

オホグルマ 俗稱 藥舖ニ官園木香ト呼
ベレニウハ 羅 アラ ンツ ウダ ルトル

試効 根ヲ藥用トス性温苦味。香氣アリ健胃ノ良藥トス或云肺胃ニ効アル藥トス又蒸氣ヲ發シ小便ヲ利シ粘液ヲ稀釋シ汚穢惡液ヲ分利ノ排泄ス○胃虛烹釀ノ匱乏ヲ復シ。風氣痞滯ノ諸症。疝痛腰痛ヲ治シ。脾病依剥イボ昆垤コンデ兒ニヲ療シ。經閉ヲ通シ。蟲ヲ殺ス○効嗽痰喘等ノ嗽衝ナキ胸病ヲ治ス○肺ノ粘痰ヲ淨刷ス。故ニ傷冷毒ヨリ發スル痰効喘急等ニ良。但患者虛弱粘液質ニシテ粘痰。肺ニ壅積スル症ニ尤驗アリ。此症ハ安質アテモ沒モ扭ニ劑ニ湧ハ痰ハ或龍腦リウノウヲ加ヘ或ハ其症ニ隨ヒ亞鉛華アテモ鎮ニ痙ニ或阿芙蓉アハフクヲ加用テ殊効アリ○効嗽胃

中ノ粘液鬱滯ヲ兼ル症ハ此藥ニ芒消或硃砂少許加用テ多ク驗アリ○喘急ノ症。肺ニ膠痰壅塞スルハ此根ノ越幾斯劑エキスヲ安質アテモ沒モ扭ニ酒ニ名ニ溶化シ用テ大効アリ或左ノ丸藥モ亦良

護謨救喘丸

土木香エキス越幾斯劑エキス 甘草膏

硫黃華 各一錢 菖蒲根 半錢

護謨ゴム安沒アテモ尼亞ニア亞幾アキ 名 二錢

右研和シ二瓜ヲ一丸トシ甘草末ヲ衣トス。時々八丸或十九丸宛服ス胸脇嗽衝。肺嗽衝ノ初發ニ此劑ヲ

與レバ其刺戟ニ堪、ズノ害アリ。然レ乍斬ク日ヲ經テ
 虛憊ノ諸症ヲ見、スニ至テハ此劑ノ痰ヲ豁シ惡液
 ヲ分排スル効力ニ因テ偉効アリ○傷冷熱ニ因テ
 痰效ヲ發シ連綿ノ治セザル症亦此劑ニテ多ク治
 ス○纖維諸管弛緩ノ血中粘液過多壅滯ヨリ來ル
 經閉ニ此根甚ダ驗アリ○此藥ハ血液ヲ淨除シ且
 利尿ノ効アリテ水腫ヲ治ス。但シ諸管纖維緩弱ニ
 粘液壅滯ヨリ發スル虛症ノ水腫ニ多ク的當ス○
 水銀吐涎法ヲ施ノ水銀體中ニ滯著シ。各處ニ凝聚
 ノ惡症ヲ發スル者ハ此根ヲ以テ一種ノ解毒藥ト

ス。其方此根二匁ニ茴香或云茴香根四錢ヲ加ヘ葡萄酒
 或、水二比ニ煮テ三分一ヲ減シ滓ヲ去リ數日服ス
 レバ水銀漸次ニ諸竅ヨリ排泄ノ諸惡症解散ス○
 服量細末トシ一二匁宛服ス。或、對症ノ劑ニ加ヘ水
 煎泡劑トシ或、水、葡萄酒、麥酒等ニ浸シ用フ

土木香越幾斯劑

製法名健質亞那
越幾斯劑ト同シ

前ニ舉ル諸病ニ

用テ良効ヲ稱ス。服量一錢ヨリ五錢マデ對症ノ劑

加、用フ

土木香丁幾劑

製法名健質亞那
丁幾劑ト同シ

竄透衝動ノ藥ヲ與

ベキ諸病ハ此劑尤効アリ

土木香舍利別 製法大黃舍 此劑殊ニ前舉ノ胸肺諸
症ニ用フ又甘味アル故ニ小兒服シ易シ 利別ト同シ 製法大黃舍 此劑殊ニ前舉ノ胸肺諸 症ニ用フ又甘味アル故ニ小兒服シ易シ 利別ト同シ 製法大黃舍

菖蒲

石菖泥菖同効 アコロリス又「カルミ」ス。
アロマチカ羅 エルリケンデリス蘭

試効根ヲ藥用トス○香竄衝動シ温煖強壯ニス殊ニ
健胃驅風ノ偉効アリ○諸遷延病ノ患者精力罷弱
胃虚ノ諸症飲食消化シ難ク痞氣腹痛頭眩ヲ治シ
虵蟲ヲ殺ス○内藏虚弱ヨリ發スル風氣痞滿疝痛
等ノ諸症ハ此根ヲ藥酒ニ加服シ或糖薑土木香根
等ヲ加煉膏トシ與ヘ健胃ノ効ヲ以テ良驗ヲ奏ス
ナガヒク シヤカクニク ナガヒク シヤカクニク

○此藥ハ劇病緩病共ニ虚弱ニ屬スル諸症ヲ治ス
ル故ニ傷冷毒痛痛風及膽液腐敗ヲ兼ル熱病等ノ
精力虚罷セル症ニ効アリ○凡熱病ノ患者虚憊ノ
熾熱甚キ症即傷冷毒熱胃腸熱等ノ虚憊ヲ兼ル症
ニ用テ効多シ○諸替留熱往來熱ニ虚憊ノ諸症ヲ
發シ若ハ血液溶解腐敗ノ候ヲ見ス片ハ必ス壯神
衝動劑防腐劑並ニ此藥ヲ的當トス○肺熾衝ノ患
者虚罷ノ傳染熱ノ如ク膽液腐敗ノ諸症ヲ兼ル者
ハ此藥ヲ用テ殊効アリ其症ニ隨ヒ阿芙蓉龍腦亞
的兒等ヲ兼用ノ驗多シ○或云間歇熱ノ患者精力

虚乏ノ病毒ヲ排除スルヲ能ハズ且虚罷ノ症ヲ見
ス者ハ此藥効アルヲ幾那ニ勝リ或幾那ノ功ナキ
症モ是ヲ用テ治スルヲアリ又頑固ノ三日熱ハ此
藥ニ阿芙蓉龍腦ヲ加用テ大効ヲ得ルヲアリ然
間歇熱ノ炊衝ヲ夾ム症ハ此藥害アリ宜ク刺絡下
劑等ヲ施メ治スベシ○失苟兒陪苦ハ此根末二刀
ヲ一服トシ日六服或八服宛用ヒ專良性ノ蔬菜類
ヲ食料トシ與ニ由テ全功ヲ得ルヲ甚多シ○此藥
ハ肝脾壅塞疼痛ヲ疏散シ虚弱ノ經閉ヲ通シ又經
久ノ潰瘍腐骨疽等ニ用テ驗アリ○服量細末ハ半

錢ヨリ一錢マデ舍利別或葡萄酒ニ和シ一服トス
或其症ニ隨ヒ龍腦阿芙蓉ヲ加用フ○浸劑トシ或
泡劑トシ或丁幾劑越幾斯劑蒸餾油トシ用テ右ノ
諸病ニ良驗ヲ稱ス

菖蒲浸劑

製法

菖蒲根 剉一ヲ或
ニヲ 水一匕

右硝子壘ニ内浸メ藥氣ヲ出シ滓ヲ去リ六時或十
二時ニ服ス○或此藥ニ揮發衝動藥ヲ加テ殊ニ峻
効ヲ稱ス假令バ後方ノ如シ

壯神菖橙飲

菖蒲根 一弓半

右水適宜ニ加煮テ滓ヲ去リ十八弓ヲ取後藥ヲ加

橙皮舍利別名 一弓半

龍腦漿 龍腦一二瓜ヲ亞刺比亞護漿
適宜ニ研和スル者 十二瓜

舍電阿芙蓉液名 十八滴

右和勻シ半時毎下ニ一小茶碗ヲ服シ十二時ニ一劑
ヲ用フ

菖蒲丁幾劑

製法 菖蒲根 一弓 燒酒 八弓

右硝子壘ニ内浸ス下八日。滓ヲ去リ固封シ貯ヘ六

十滴ヨリ百滴マデ適宜ノ飲液ニ點服ス

菖蒲越幾斯劑 製法 健質亞那越幾斯劑名 ト同シ此

劑ニ菖蒲蒸餾油ヲ合和シ用テ峻効アリ

菖蒲蒸餾油 製法 薄荷油名 條。蒸餾油製法括套ニ記

ス如シ右諸製劑ニ此油數滴ヲ加用テ尤モ効アリ

○異地ニ旅行ノ水毒ヲ解シ腹痛下利等ヲ防グニ

菖蒲根ヲ水ニ浸シ服メ効アリ若水清潔ナラザル

片ハ此根ヲ其水ニ投シ醋少許加靜定メ其上清ヲ

取り用ベシ依福叔伍

白芥子 シナピ^ルモス^ルト又モスタ^ルト^ル蘭

〔試効〕温煖衝動開達シ。粘液ヲ稀釋シ。小便ヲ利シ。月經ヲ通ス。○胃ヲ健運シ。飲食ヲ進メ。消化ヲ扶ク。○胃腸ノ運化。怠慢虛衰セルヲ醒起健運シ。大便ヲ順利ス。○粘液腫。萎黃病。處女病ニ用テ。胃腸ヲ開利シ。粘液ヲ分排シ。良驗ヲ稱ス。○痲不遂及昏睡病ニ内服シ。衝動健運ノ粘液ヲ排泄シ。卒仆ニ噎藥トシ。施メ省復セシメ。舌痲言語蹇澁ニ含漱劑トシ。殊効アリ。○神思鬱憂病。脾病ニ用テ。良驗ヲ奏ス。○諸痰。及喘息ヲ治シ。殊ニ胃欬ニ効多シ。○水腫ニ用テ。粘

稠液ヲ疏解シ。小便ヲ利シ。汗ヲ發ス。○胃腸虛衰ノ諸液健輸消化セザルヨリ。水腫若ハ黃疸ヲ發スル者多シ。此症ハ健胃解凝ノ劑ニ白芥子ヲ加用テ。的當トス。左ノ方尤効多シ

芥薑健胃丸

健質亞那

乾姜

鐵屑 極細末 四錢

金硫黃 各十五瓦

右各細末ノ合和シ。亞爾鮮越幾斯劑^{或野艾蒿葉穗ヲ取り製ス其}

白芥子 各一錢

盧會 各半錢

鹿角鹽

法名蒲公英越幾斯劑ト同シヲ適宜ニ加テ捏和シ二氏ヲ一丸トシ朝夕十丸或十二丸宛服ス○春ノ間歇熱ハ白茶子ヲ用テ効多シ秋發頑固ノ間歇熱ハ幾那ヲ加驅熱ノ効ヲ扶ルニ非レバ功驗著實ナラズ○刺戟衝動ヲ要セザル症ハ此子ヲ搗碎クナクノ胃虛ノ諸症ニ毎日數匙ヲ服ノ功アリ然レ通例此子ヲ搗碎キ散劑泡劑或煎劑ニ加服ノ良胃腸ノ感觸鈍ニノ粘液多ク刺戟衝動スベキ症ハ是ニ由テ其功速ナリ○失苟兒シケウ陪苦ボイクニ用テ酸敗液ヲ消シ海鹽ノ酷厲毒ヲ抑制ス○咽喉腫ニ漱藥トシヨク其腫ヲ消

散ス○外敷ノ腫瘍ヲ消シ膿ヲ熟ス

芥子泥 製法主治 名ニ出ツ麻痺不遂或腕股痛ニ貼ノ其毒ヲ

外泄シ或痛風毒内攻ノ諸症及熱病ノ發狂譫妄ハ腓及蹠ニ貼ノ頭腦潛攻病毒ヲ下部ニ引降シ煩躁ヲ靜止ス或頑癬類總テ惡厲ノ皮膚病ニ貼ノ能酷厲毒ヲ皮表ニ引泄シ捷効ヲ奏ス 依物

半夏

アリウムトリホリウムテ リブアラゲヘカルフスフー上蘭
榕按ニアリウムハ林娜ス人第二十經第七緯ニ收ル一宗類ニ其屬スル所ノ種類二十二名ヲ舉

此言本草類聚 卷五 十八 風雲堂藏

グ。後進ノ名哲又是ニ六種ヲ加テ二十八名トス。其第一種ハ南星。第四種ハ半夏三葉アリ。第六種ハ青芋サトイモ。第十種ハムサシアブ三。第十二種ハ藥用ノ本種ニモ莖ニ蛇皮斑アリ。斑杖莖ノ如クニノ葉。斑杖ト異ナリ。和産未詳ナラズ。第十五種ハ海芋。第十七種ハサゼンサウナリ。右件所舉數種中ミヤ半夏ノ効最本種ニ近シ。因テ今是ヲ掲テ本條トス。
試効 乾根ヲ藥用トス或云莖葉亦効アリ。生根ハ苛發ニノ口舌ヲ刺戟ス。是其粘液中ニ精微ノ酷厲液ヲ含カ故ナリ。但此根。水煎泡劑或燒酒。葡萄酒等ニ浸スト雖モ

其効力ヲ含ル精微刺戟ノ質ハ融解シ難シ。故ニ其渣ヲ去テ上清液ノニ用レバ効微ナシ。然レバ乾根ヲ細末トシ蜜或砂糖。舍利別等ニ研合シ或對症ノ煉膏。乳劑其他粘滑ノ劑ニ攪和シ其刺戟ノ味ヲ包攝シ用ルヲ佳トス。○疏解。稀釋。利尿。發汗ノ効アリ。胃中粘稠敗汚ノ惡液ヲ驅除シ。食機虧損。其他胃腸ノ粘液壅滯。汚液鬱積ノ諸症ヲ治ス。○胸中粘痰壅塞。欬嗽痰喘其他頑固ノ胸病ニ良効アリ。○痰欬喘息ニ此根細末ニ砂糖ヲ研和ノ服シ或乾葡萄ト蜜ヲ和シ水ヲ加。煮テ攪混シ服ノヨク粘痰ヲ疏豁ノ略

增訂口類藥鏡 卷五 風雲堂藏

出シ治ス○肺癆勞效ニ是ヲ乳汁ニ煮テ用レバ吐
 膿ヲ進メ肺ヲ淨刷ス○痛風傷冷毒痛其他潛結沈
 滯ノ諸痛ヲ治ス○内藏壅塞ヲ開達シ月經ヲ通シ
 粘液病。萎黃病。處女病。黃疸。水腫。間歇熱。依剥イボ昆コン埵デル兒。
 神思鬱憂病。失苟兒シケウル陪ポイク苦ニ良驗ヲ稱ス○胃ノ病患
 ヲリ發スル遷延頑固ノ頭痛ニ此藥甚ダ驗アリ。此
 症ハ舌苔アリ殊ニ古本ニ多シ。後方尤良効アリ

半夏健胃散

半夏 二錢

菖蒲根

地榆

桂 各一錢

剥ボツ篤ト亞ア斯ス 一一刀
 右散劑トシ硝子壘ニ固封シ貯ヘ十十瓦ヨリ一錢マ
 デ飲液ニ點服スル一日三四次○間歇熱ハ左ノ方
 良驗多シ

半夏黃石散

半夏

孕礬酒石

大黃

五五瓦

或霸王鹽 各十十瓦

右散劑トシ一服トス。熱ナキ時。每半時。一服宛用フ
 ○服量細末トシ五五瓦ヨリ十二十二瓦或半錢マデ適宜
 ノ飲液ニ和シ用一日數次或云燒酒ニ和シ服メ發

汗ス○此藥外敷ノ腫瘍ヲ消散シ或膿熟シ潰瘍ノ膿ヲ排ヒ腐穢ヲ淨除ス即此末ヲ摻シ或水ニ溶シ洗藥トス又面部汚斑小皰赤疹ヲ消シ肌膚ヲ美澤ニス剥^{ハツ}鴛^ト亞^ア斯^ス少許ヲ加へ或酒石液^名一二滴ヲ加テ殊ニ良或此根ヲ極細末トシ蕃薇露ニ溶ノ粧顔水トス^依^叔

蜀羊泉

^ロヨドリゼウゴ^{俗稱} ^テタルカマラ^羅
^ロツテルスト^又アルフス^{ランカ}蘭

試効蔓^ノヲ藥用トス春秋ニ採テ氣味尤厚シ味苦微甘生乾共ニ用フ生鮮ノ者ヲ一頓ニ過服スレバ惡

心嘔吐ヲ起シ或頭眩暈顫動痙攣ノ諸症ヲ發シ或眼焮腫狂躁言語蹇澁麻痺搖掣ヲ發ス多血及諸脉強硬牽張ノ人焮衝性ノ諸症ハ總テ害アリ○温煖解凝稀釋發汗利尿通經微瀉ノ効アリ又酷厲毒ヲ皮表ニ驅發スル峻力アルニ由テ排毒淨穢清血ノ一要藥トス○發汗利尿微瀉ノ効ニ因テ肝脾壅塞ヲ疏解シ黃疸水腫ニ峻効アリ○稀釋發汗ノ効ニ因テ冒寒ヨリ發スル胸病欬嗽喘急及胸膈等ニ殊効アリ和胸煎劑ニ加用フ○肺焮衝胸脇焮衝等ノ初發ハ此藥ヲ與テ害アリ焮衝漸ク退キ病毒自

痰唾及小便等ヨリ排泄スル時。是ヲ用テ偉効ヲ奏ス。但傷冷毒熱ニ於テ肺ノ諸症ヲ發シ虛憊ノ候ヲ見ス者ハ初ヨリ此藥ヲ用テ的當ス。○此藥能產後惡露ヲ通ス。○痛風傷冷毒痛脚痛。歷節痛。或腺腫癰癢或疥癬類。經久頑固ノ皮膚病ハ是ヲ用テ其毒ヲ疏解排泄ノ大効ヲ奏ス。此藥毎日一弓ヲ取り沸湯十二弓ニ泡出メ服シ。漸ク其量ヲ加テ惡心ヲ發スルニ至ベシ。是皆粘液壅塞ヲ疏解稀釋シ汗ヲ發シ酷厲液ヲ皮表ニ宣發スルニ因ル。○或黴毒諸症ニ是ヲ多量久服メ治驗ヲ稱ス。是專ラ黴毒ヲ療スル

藥ニ非レト總テ鬱毒惡液ヲ驅逐シ且發汗利尿ノ効力ニ因テ其皮表ニ發見セル黴毒及疥癬ヲ兼ル等ハ此藥ヲ投メ卓偉ノ治驗ヲ致スナリ。○黴毒ノ白帶下ハ土茯苓等ノ黴毒劑ニ此藥ヲ加水煎シ用テ殊効アリ。但黴毒ナキ白帶下モ亦惡性頑固ノ症多シ。是皮表ニ宣越スベキ酷厲ノ瘡毒内鬱セル症多キ故ニ此藥ヲ與テ其毒ヲ驅除メ殊効ヲ取ナリ。○經久頑滯ノ淋疾水銃藥ヲ尿道ニ施セト治サル症ニ此藥ヲ多服メ諸液ノ分利排泄ヲ進輸シ治スル者多シ。○痔痛ハ出血ノ有無ヲ論セズ此藥ノ細

末ニ硫黃ヲ加、用テ其毒ヲ排泄ノ驗多シ。殊ニ痛風毒。傷冷毒等ノ酷厲液ヲ兼子或、疝痛。淋疾等ヲ夾ム症ハ尤良。○服量。乾莖ハ一二錢用テ瞑眩セズ。生莖ハ半錢ヲ取、水十六ろニ煮テ半ヲ減シ分テ六服トシ。毎日ノ服量トス。或、嫩莖、梢ヲ取り煎服シ。或、葉ノ絞汁ヲ服ノ瀉下藥トス。或、根亦用テ開達清血ノ効ヲ稱ス。○凡、此藥ヲ用、ベキ諸病ニ後方効多シ。

排毒羊泉湯

蜀羊泉 四錢

右磁罐ニ内、水二比ヲ加、蓋閉シ文火ニ煮テ半ヲ減

シ滓ヲ去リ其液半盞ニ乳汁少許加、一時毎ニ服ス

蜀羊泉越幾斯劑

蔓ヲ採リ製ス其法固健 質亞那越幾斯劑ト同シ前說諸病

ニ用テ良。或、對症ノ劑ニ加、用フ。但、煎熬シ製スルニ由テ効力減シ瞑眩セズ。故ニ他藥ニ合和スルニハ一二錢モ用、ベシ。通例五匁ヨリ十匁マデ芳香ノ露水ニ溶化シ日ニ數次用フ。○前說ノ諸病ヲ治シ且、痰ヲ豁ノ略易カラシムルニ左ノ方甚ダ驗アリ

羊泉硫荷飲

蜀羊泉越幾斯劑 一ろ半 金硫黃 五匁

薄荷水 六ろ 過爾託亞舍利別 一ろ

右研和シ用ニ臨テヨク振蕩シ一時毎ニ一匙宛與
○或丸藥トシ右ノ症ニ用モ良即後方ノ如シ

安質羊泉丸

蜀羊泉 細末

蜀羊泉越幾斯劑

安質沒扭謨 細末 各半錢

右研和シ二日ヲ一丸トシ十五丸ヨリ三十丸マデ
服スル日三四次 ○蜀羊泉ノ實ヲ取搗絞テ汁ヲ
取雨水ヲ等分ニ和シ眼ニ點メ眼ノ斑翳ヲ消シ或
婦人面部ニ擦テ肌膚ヲ美澤ニシ汚斑小胞ヲ祛ク
○蜀羊泉ノ葉ヲ取り琶布トシ乳房腫或打撲腫ニ

貼メ腫痛ヲ消散ス

依福 叔福

山牛蒡

又^バグマ^ボク^チ俗稱 ○普山藤林氏是ヲ充ツ

○榕椏ニ山牛蒡ハ牛蒡ノ一種ニメ花葉亦是ニ

類ス商陸ノヤマゴバウト異ナリ民間此葉ヲ採

テ發火ヲ製ス

試効 根ヲ藥用トス輕疏ニメ水棉様味微辛ニメ甘

ヲ帶ブ香氣微ナリ ○汗ヲ發シ小便ヲ利シ血液ヲ

稀釋シ血中惡液ヲ排泄ス ○冒寒傷冷毒痛痛風脚

痛並ニ徽毒諸症頑癬瘡瘍類頑滯ノ皮膚病總テ發

汗ノ惡液ヲ驅泄シ治スベキ諸病ニ効アルコト朴窟
福烏篤名土茯苓等ノ如シ。水煎シ多服ノ害ナク起
熱ノ妨ナシ○右ノ諸病ニ多ク後方ヲ用フ

牛蒡排毒煎

山牛蒡根

二弓

舍利別

一弓

右山牛蒡根ニ水一比半ヲ加、煮テ一比ヲ取、滓ヲ去
舍利別ヲ攪和シ服ス。或此根ヲ土茯苓、杜松木等ニ
加、水煎シ多服スルモ良○此根ニ土木香、乾葡萄ヲ
加、水煎シ適宜ニ蜜ヲ攪和シ、嗽ニ用テ効アリ○
山牛蒡子モ亦驅發利水ノ効ヲ稱ス福叔華

金盞花

カレンヂウラ羅

ゴウドブルム蘭

試効花及葉ヲ用フ○輕キ發汗藥トシ汗ヲ發シ小
便ヲ利シ疏解開達ノ冒寒傷冷ノ酷厲液ヲ驅發シ。
嗽頭痛、傷冷毒痛等ヲ解散ス○風疹、癢、赤皰等
ヲ排泄シ。疫毒惡氣ヲ驅散ス○水煎或泡劑トシ服
ス○喘急ニ乾花ノ末一錢。適宜ニ沙糖ヲ和シ服メ
良効ヲ稱ス○花ノ露水ヲ焮腫眼ノ洗藥トシ施メ
焮赤腫痛ヲ消散ス依

堇菜

スミレ和名 ヒヨラオドラタ^レ羅
空ルリケンデヒヨルチイ^レ蘭

○榕按ニ長葉圓葉アリ花色亦種々アリ香氣アルヲ擇ミ用ベシ銷鍊術ノ諸物質ヲ試ル此花ノ舍利別ハ其最深碧色ナルヲ用ベシ

試効花葉共ニ藥用トス。或云葉ハ微吐下 ○酷厲液

ヲ緩和シ滋潤清爽シ汚液ヲ淨刷ス○冒寒傷冷毒痛。咽喉焮痛。咳嗽喘息。胸脇痛等ヲ清解ス○痙攣ノ運動ヲ降鎮シ頭目ヲ清利シ頭痛不寐搖掣ヲ治ス

○末トシ砂糖或白蜜ニ研和シ服シ或泡劑トシ用

製法主治
堇菜舍利別 名ニ出ツ前説ノ諸症ニ尤効ヲ稱シ又

粘液。膽液。過多ノ諸症及。攣急痛。效。嗽。喘。急ヲ治ス。咽
喉口中ノ焮痛潰爛ハ。漱藥トシ。緩和止痛淨汚ノ殊
効ヲ稱ス 叔 淑 物

蘆根

ヨシノ子俗稱 チリチキム。レペン^ス又ガ^ラ
ミヌス又カラメン。カニヌム^レ羅 ホンド^スか
ラス又カラスタル^ル蘭

生根ハ白色。乾ケバ黄色ヲ帶ブ香臭ナシ味甘ヲ帶
乾ケバ味淡。砂糖様ノ質アリ。生根ヲ越^キ幾^キ劑トシ
是ヲ知^レベシ。舊根ハ輕虛硬脆枯敗ノ藥用ニ堪ヘズ。
宜ク新生柔潤重實ナルヲ分採ルベシ

試効 清涼。淨汚。清血。開達。利尿ノ効ヲ稱シ。酷厲液ヲ
 和解シ。粘稠液ヲ稀釋シ。微收斂シ。凝結ヲ疏解ス。○
 解凝ノ良藥トス。内藏壅塞塊腫ヲ疏解ス。○肝脾腎
 膀胱等ノ壅塞ヲ開通ス。○肝壅塞結腫。黃疸。脾病。依
 剝昆垚兒ニ尤モ驗アリ。又膽液ノ凝石ヲ溶解ス。故ニ
 發歇アル黃疸ニ殊効アリ。○内藏壅塞ヲ兼ル羸瘦
 病ニ用テ。津潤滋養シ。酷厲液ヲ緩和ス。但、下利アル
 症ハ適應セズ。○粘液壅塞セル頑固ノ諸病ハ此根
 ヲ越幾斯劑トシ。日五六ヲ宛用テ良。○此根解凝ノ
 効アルヲ以テ。稍衝動ス。然レ、熱病毒ノ刺戟衝動ヲ

抑制シ。脉管纖維ノ充張力ヲ減損スベキ諸症。及、熱
 病ノ稍燉衝ニ傾ク症ニ甚ダ効アリ。故ニ胃腸虛罷
 ノ下利シ易キ等ノ症ハ的當セズ。○間歇熱ニ用テ
 粘液ヲ稀釋シ。壅塞ヲ疏開シ。小便ヲ利シ。病毒ヲ驅
 散ス。○間歇熱等ノ内藏壅塞ヲ兼テ險重ノ症アル
 ニ用テ尤良。○胸肺咽喉ノ諸症ニ用テ緩和。疏解。清
 涼ノ良効ヲ稱ス。○遷延病ノ酷厲毒アリテ刺戟ス
 ル症。假令バ痛風。流走痛。傷冷痛。及、頑滯ノ瘡腫。疥癬
 類或、粘稠液壅塞ヨリ發スル黃疸等ハ此根ヲ煎劑
 ニ加、長服ノ殊効アリ。假令バ後方ノ如シ

排毒蘆根煎

蘆根

山牛蒡根

各六弓

右水適宜ニ加煮テ藥汁六十弓ヲ取り後藥ヲ加フ

接骨木傑列レシレ名 三弓 孕礬酒石 或レ霸王鹽 四錢

右攪和シ適意ニ飲服ス。大便閉アル者ハ瀉下藥ヲ

加ベシ。○此根。通例水煎シ服ス。大抵其症ニ隨ヒ四

錢ヨリ二弓マデ水適宜ニ加煎服ス或對症ノ煎劑

ニ加服ス或越幾斯劑トシ四錢ヨリ一弓マデ用フ。

頑滯ノ病ハ其量ヲ加へ數週若ハ數月續服スベシ

蘆根越幾斯劑生根ヲ採リ製ス其法名健質亞那越

幾斯劑ト同シ。○海邊ニ採ル者ハ潮

水ヲ含テ鹹キ故ニヨク洗淨ノ製スベシ 或春月生

但潮氣ナキ原野山地ニ採ル尤佳トス

根一坵ヲ取り搗絞レバ白汁五弓出ツ是ヲ煎熬ノ

蜜ノ稠ト爲ス此即軟越幾斯劑ナリ或乾根ヲ以テ

製ス乾根ニテ製スレ 製 依 製

石長生

ハコ子グサ俗稱 アヂアンタムベダタム 又カピルリヘ子リス羅アロウンハイイル蘭

試効葉ヲ藥用トス。○和胸豁痰ノ一藥トス。酷厲液

ヲ緩和ノ發汗シ。微尿管ヲ收瀦メ粘液ヲ分利シ痰

ヲ疏豁メ略易カラシメ。冒寒欬嗽。喘滿。咽喉痛。傷冷

毒痛。胸痛ヲ緩解シ或胸膿ヲ排除スル等胸肺諸症

ニ良効ヲ稱ス○或云此草汁ニ石鹼質アルヲ以テ
 内藏ニ凝聚セル膠粘液ヲ疏釋シ酷厲液ヲ淨刷ノ
 咯痰及小便ニ排泄シ壅塞ヲ開通ス故ニ内藏硬結
 肝脾腸間膜ノ壅塞脾病依剥昆垓兒神思鬱憂病ヲ
 治ス○子宮衝逆心動悸搖掣ニ此藥ヲ細末トシ稀
 麥酒ニテ送下シ効アリ○此藥泡劑トシ砂糖少許
 加テ服シ或對症ノ劑ニ加煎服シ或此葉一握ニ水
 四比加徐々ニ煮テ終ニ甘草少許加火ヲ下シ滓ヲ
 去リ適宜ニ服用ス○舍利別トシ用テ殊ニ和胸ノ
 良驗アリ製法名ニ出○海州骨碎補鐵脚鳳尾草又
 リバシキジノヲシシガラオニシダガ

ルノセウガ等性功
 大抵石長生ト同シ
 依叔 依僕

白芷 アンゲリカ 羅 エンゲルウルトル 蘭

試効根ヲ藥用トス葉及子亦効アリ華爾斯質ノ液
 多クノ香氣アリ○香竄揮發衝動ノ寒粘液ノ壅塞
 ヲ開達シ揮發強壯劑ノ的當スル諸症ニ用テ温煖
 強壯開達ノ要藥トス○蒸氣及汗ヲ發シ胃ヲ健運
 シ風氣ヲ驅散シ小便及月經ヲ通ス○風疝胃痛腸
 痛子宮病經閉ニ良効アリ○和胸劑ニ加テ稀痰ヲ
 化シ粘液ヲ疏シ欬嗽ヲ治ス○露水ヲ取り製法薄荷水

ト同 布片ニ浸シ傷冷毒痛脚痛ニ貼メ疼ヲ緩解ス
眼洗藥トノ曇暗翳膜ヲ消ス○葉ヲ取リ蒸湯劑ト
ノ諸寒腫ヲ消散ス 依叔 依叔

羌活

イムペラトリアオストル
ム 「イムペラトリアオストル」
「ム」

○按ニ羌活ハ漢産或官園出ル者ヲ用ベシ藥舖
尋常和産ノ品ハ別種ニ用ルニ堪ヘズ
試効根ヲ用フ。華爾斯及油多シ或云龍腦様ノ鹽ヲ含リ○温煖
強壯ノ藥トス。効用大抵白芷ノ如シ凡寒粘液壅塞
ノ諸病總テ揮發衝動藥ノ適應スル症ニ良驗ヲ稱

ス○蒸氣及汗ヲ發シ粘液ヲ釋キ諸排泄ノ脉管ヲ
開達シ。冒寒欬嗽寒粘液性ノ水腫三日熱ヲ治ス○
粘液性ノ痒不遂ニ用テ粘液ヲ排泄ス○胃虚冷ノ
諸症痞氣鬱蓄疝痛ヲ治ス○粘液性ノ經閉ハ此藥
ヲ對症ノ劑ニ加用テ殊効ヲ稱ス○服量細末ハ二
乃至一服トス。或水煎「イムペラトリアオストル」丁幾劑トシ用フ○傷冷毒
ノ齒痛ニ水煎ノ漱藥トシ良○蒸湯劑或布トシ
施メ硬腫ヲ消散ス 依叔 依叔

新訂增補和蘭藥鏡卷五終

增訂和蘭藥鏡 卷六

三十一

風濕痿痺

増訂和蘭藥鏡 卷六
三十一
風濕痿痺

新訂増補和蘭藥鏡卷六

榛齋先生譯述 男 宇田川 榕菴校補

幾那 ○コルテクス・ペルヒアニ羅

○幾那ノ產地形狀種類主治圖ニ載ス唯此編其遺漏セル試効及經驗說ヲ舉グ

試効括套 幾那收瀋衝動ノ諸器脉管ヲ強壯シ血液ヲ稠厚シ腐敗ヲ遏メ諸脫泄ヲ止メ虚憊ヲ回復ス然レ一切焮衝病多血壯實ノ熱病胃腸汚物鬱滯ヲル症ニ用レバ其焮熱稠厚ノ血液ヲ逾稠厚ニシ牽張セル脉管ヲ益強硬ニシ血ノ運行ヲ更ニ強盛ニ

增訂和蘭藥鏡 卷六 風濕痿痺

シ。病毒ノ排泄ヲ壅遏スル故ニ大害アリ○此藥ハ、
 總テ虚憊ノ諸病ニ奇効ヲ奏スレモ未ダ虚極危劇
 ノ諸症ヲ發セズ。胃腸ノ運營仍此藥ヲ消化ノ健輸
 スベキ精力アル者ニ非バ功ヲ成^{ハタラキ}了能^スズト知^レベシ
 ○大約此藥ノ良効アル病ハ神經熱。腐敗熱。腐敗性
 咽喉潰瘍。諸脫泄失血。瘰癧腺腫。壞疽。虚症。炊衝。痙攣
 搐掣。感觸過甚。諸症。處女病。蟲症。發作定期アル諸症
 ナリ○幾那ハ散劑トシ用^テ尤^モ効アリ。但^シ患者其味
 ヲ惡ム者ハ薄荷水或^ハ甘草泡劑ニ加^ハ或^ハ蜜沙糖等ニ
 調和シ。其他適宜ノ飲液ニ和シ與^ヘ。或^ハ細末一弓ヲ

沸湯若^ハ冷水或^ハ葡萄酒。六弓ニ浸シ重湯ニテ藥氣
 ヲ出シ滓ヲ去^リ用^フ或^ハ水煎^ユ越^キ幾^ス斯^ス劑^トシ用^フ。
 丁幾劑ハ幾那ニ含^ル華爾斯^スヨク溶解スル故ニ効
 多^シ方^ハ後^ノ神經熱ノ條ニ出^ス。○泡劑^ハ沸湯若^ハ冷
 閉^ス泡^ハ煎劑ニ比^スレバ其精微質蒸散セズ但^シ水
 煎^後方^ノ如^クスレバ其精微質蒸散スルナシ

幾那煎

幾那 搗碎者 一弓

蒸餾水 三十弓

右磁罐ニ内^レヨク蓋閉シ煮^テ十密^ニ扭^ト篤^ト條^ニ註^ス。滓ヲ
 去^リ靜定ノ上清ヲ取り服ス○幾那ヲ服^ノ胃中ニ

重滯シ心下痞滿。食進マザル等ノ症ヲ發スル者ハ其劑一服ニ乾薑末二三匁加ヘ或桂末五匁許加用ヘシ○幾那ハ瀉下ノ効ナシト雖モ體稟感觸シ易キ人ハ動スレバ胃腸ヲ觸動メ下利スルコトアリ。此症ハ香竄揮發ノ藥。若ハ阿芙蓉ヲ用テ治スベシ或云。幾那ヲ服メ下利シ若ハ嘔吐スル者ハ其劑一服ニ阿芙蓉液三四滴宛加用レバ其症止ム

服量 通例諸病ニ用ル服量 間歇熱服量 別ニ次ニ出 散劑ハ一匁ヨリ一錢ニ至ル。煎劑ハ一匁ヲ水八匁ニ煮テ滓ヲ去リ半時毎ニ一匙宛服ス。冷浸劑ハ二匁マデ取テ

水若ハ葡萄酒六匁ニ浸シ漚テ滓ヲ去リ服ス 簡

間歇熱 日發熱。間日熱。三日熱ハ幾那ヲ經驗ノ奇藥

トス然レ其病毒惡液ヲ驅除セズノ用レバ治スレ
 凡再發シ其熱頑滯ノ解シ難ク或神思沈重。胸脇苦
 滿。心下困重。腹肚痞脹。便秘。子宮衝逆。痙攣搐掣。遷延
 内伏熱。黃疸。水腫等ヲ發ス是幾那ニテ血液ヲ稠厚
 ニシ諸腺細管ヲ強固シ熱毒沸騰ノ銳勢ヲ抑遏メ
 其發動ヲ制服スル故ニ其毒鬱勃メ再ビ沸騰シ或
 潛伏内攻メ諸部ヲ損害スレバナリ然レ胃腸及血
 中ノ汚液ヲ淨除メ幾那ヲ用レバ罷弊弛弱ノ脉管

ヲ收固ノ血液ヲ稠厚トナス故ニ微邪殘毒アレハ
 發動セズ是ニ來ノ生氣ノ運行旺盛ノ其剩汚ヲ諸
 竅ニ驅逐ノ治ス○患者眼中黃色ヲ帶胸脇苦滿拘
 痛心下痞鞭或按テ疼食ヲ惡之或惡心嘔噦口中苦
 舌苔アリテ燥キ頭痛スル等ハ胃中熱毒鬱滯ノ候
 ニノ吐劑ヲ的當トス大便壅滯腹肚拘攣痞鞭腸鳴
 腰痛等ノ症アルハ腸中鬱滯アル候ニノ下劑ヲ的
 當トス小便濃赤ニノ短少汗亦少キハ病毒凝結ノ
 未_レ疏解セザル候トス清涼疏解稀釋ノ劑ヲ用_{ベシ}
 斯ノ如ク療法ヲ施メ大抵發作七八回ニノ治セズ

或患者罷勞ノ病勢險重ニ進ニ或發作ノ諸症劇盛
 ニノ長ク醒解シ難キハ皆法ノ如ク幾那ヲ用保護
 温煖ニノ蒸氣ヲ發スレバ治ス○患者脾病及腹内
 諸器壅塞塊結シ或多血ニノ瘀血諸部ニ凝聚シ或
 痔血月經壅滯スル者ハ先刺絡ヲ施シ或下劑ヲ用
 或對症ノ解凝劑苦味解凝鹽霸王鹽孕礬或大黃ニ
 刺_{ボツ}篤_ト亞_ア斯_ス若ハ酒石葉ヲ加用_テ其壅塞凝結ヲ疏解
 ノ後幾那ヲ用_{ベシ}以上諸藥皆固幾那ノ條患
者資稟及間歇熱ノ下ニ出○畢
 竟此熱病ハ自然良能ヲ以テ體中ニ潛蟄セル病毒
 ヲ汗小便痰唾等ヨリ驅逐シ除ガ爲ニ發スル故ニ

其數回ノ發作ハ即_チ病毒ヲ除_クノ一療法ノ如_クシ早ク
 是ヲ遏止スル_{コト}勿_レ○或_ハ吐下劑ヲ須_メズノ幾_ト那_ラ
 用_ル症アリ。是ハ初_メ發作ノ熱烈ク。脉動齊_クハズ。顔色
 萎_シ痺_シ。大_ニ煩悶ノ數_ク昏眩冷汗出_テ或_ハ胃疼甚_ク或_ハ發
 作中昏睡シ或_ハ吐下休_ズ或_ハ大便ニ血ヲ交_ヘ或_ハ大_ニ
 發汗スレ_ハ熱解セズ或_ハ大_ニ熱ノ發汗スレ_ハ惡寒休_ム
 ザル者ハ大_ニ危篤トス。速_ニ幾_ト那_ヲ用_{ベシ}。否_ラザ
 レバ次ノ發作ニ死シ或_ハ四五發中ニ斃_ル○或_ハ患者
 疲勞甚_ク或_ハ老人。虛人。孕婦ノ如_キハ病毒盡_ク除_クマ
 デ疏滌スレ_バ其疲勞ニ堪_ザル故ニ幾_ト那_ヲ用_テ治

スベシ○此熱頑滯ノ治セズ患者虛羸ノ水腫ヲ兼_テ
 或_ハ其熱治ノ後。水腫ヲ發スル者亦幾_ト那_ヲ用_テ殊_ニ効
 アリ○此熱病。幾_ト那_ヲ用_テ發作休_テ後。下劑ヲ投_メ多_ク
 瀉下スレ_バ其熱再發ス。其故ハ數回ノ發作ニテ病
 毒自_ラ汗。小便等ヨリ解散シ又吐下清解ノ劑ニテ
 漸_ニ減スレ_ハ其熱仍_ホ發作スル者ハ諸管血液充張健
 運セズノ些_シ少_シノ邪毒ト雖_モ制服スル_{コト}能_ハズ且_ツ
 從_テ前發歇往來ノ運動舊_シ滲_シ因循ノ餘勢ヲ挽回スル
 能_ハザルナリ。故ニ幾_ト那_ヲ用_テ精力健旺充足ス
 ル_{コト}能_ハズ。其熱熄_ル然_レニ

下劑ヲ投ノ其健旺ノ順機ヲ推折スレバ餘邪復虚
 = 乘ノ滾動シ其熱再發ス此症淹滯セル間日熱及
 三日熱ニ多シ或云此病幾那ヲ用治ノ後速ニ下劑
 ヲ與レバ幾那ニテ稠厚ニナリタル血液復稀釋ノ
 沸騰シ其熱再發ス○胃腸病毒鬱滯アル者ハ其症
 = 隨ヒ吐劑或下劑ヲ用テ淨掃スルヲ勿論ナレ
 長ク疏滌スレバ胃腸虚憊ノ消化ノ機力ヲ失ヒ飲
 食重滯ノ復敗液粘穢ヲ生シ是ニ幾那ヲ用レバ消
 化セズノ停滞シ逾虚憊ノ險重ヲ致ナリ是ヲ以テ
 間歇熱其他諸病ニ於テモ胃腸消化ノ健力ナキ症

ハ幾那ヲ用テ害アリ故ニ先苦味健胃揮發香竄ノ
 藥ヲ與テ其消化ノ力ヲ復スベシ假令バ葛爾儒健
 質亞那珊篤里亞爾鮮等ノ越幾斯劑ヲ薄荷水ニ溶
 用ヒ其症復スルニ至テ幾那ヲ用ベシ初ハ幾那ノ
 末ヲ薄荷水其他香竄ノ露水ニ加用ヒ或攝爾扁答
 顯草等香竄揮發ノ藥ヲ加用テ殊効アリ○患者舌
 苔心下苦滿痞靱等ノ症アルニ因テ吐劑ヲ與ヘ或
 數日下劑ヲ用テ胃腸虚憊シ是ニ由テ荏苒トメ治
 セザル者多シ此症ハ右ノ如ク消化ノ力ヲ復メ幾
 那ヲ用ニ非レバ治シ難シ殊ニ頑固ノ間歇熱ハ長

下劑ヲ用テ胃腸ニ汚滯ナシト雖モ全身虛衰シ特ニ胃罷弊スル片ハ幾那ヲ用レ其消化セズノ効驗ナク終ニ水腫或、羸瘦病トナリテ危險ニ至ル者アリ紐○凡、秋ノ間歇熱治セズノ暫留熱トナルハ胃腸熱ノ性ヲ夾ム故ニ甚、解シ難シ。此症既ニ吐下劑ヲ用テ胃腸ヲ淨掃スレ其熱仍頑固ニ退ガレ者ハ幾那ヲ用テ良効アリ。斯如キ險重ノ症ハ幾那散劑的當セズ。浸劑若、ハ煎劑トシ揮發防腐ノ衝動藥ヲ加。殊ニ龍腦ヲ加テ尤効アリ。或、龍腦ヲ亞刺比亞アゴム護漿名ニ研和シ幾那煎ニ加レハ能混和ス。燒

酒ニ研和スル者ハ煎劑ニ融化シ難シ○間歇熱ニ微毒ノ諸症。或、疥癬ヲ兼ル者ハ幾那末ニ甘汞ヲ研和シ用テ効アリ○服量。間歇熱ハ幾那半時毎ゴトニ一錢宛用フ。患者ヨク其量ニ堪ル間ハ効アリ。是ニ堪、サル者ハ効ナシ○幾那ヲ服スルト三日ニ胃腸ニ壅滯ノ諸症ヲ發スル者ハ吐劑。下劑。或、加羅蔑兒カハシヲ加ル下劑ヲ與胃腸ヲ淨刷ノ後。幾那ヲ用テ的効アリ○間歇熱ニ幾那ヲ用テ治スレ其再發スルト多キ故ニ治後仍ホ服量ヲ減メ數日用ベシ函物布羅協斷首西底利

間歇熱幾那經驗說 古今醫家間歇熱ニ幾那ヲ用テ
 奇効ヲ稱スレ_レ是ヲ用_ル的當ノ時限ヲ辨セザレバ
 服量多_クノ功少_ク或大害ヲ致シヨク其時ニ的當ス
 レバ服量少_クノ捷効ヲ奏シ毫モ害ヲ貽_スナシ故
 其時限ヲ知_ルテ緊要ナリ但_シ是ニ三等アリ即_チ其熱ノ
 發作前發作後及_テ發作後ヨリ次ノ發作前マデノ間
 ナリ發作中ハ用_テナシ大害アレバナリ右三等時
 限ニ用_テテ功害各異_ル經驗說ヲ左ニ舉テ考證ニ備
 ○發作前幾那ヲ用_ル說
 先哲幾那ノ細末二錢ヲ取發作ノ一時前ニ用_テテ治

驗ヲ稱ス然_レ此數是ヲ試用ニ或嘔吐煩悶シ或熱勢
 險重ニ進_ミ或變_テ替留熱トナリ或一旦治スレ_レ
 再發スル等ニテ動輒_バ頑固危篤ノ病トナル者ア
 リ舍電發謨斯微_ハ向_ニ共_ニモ既_ニ是ヲ講明セリ○其
 害アル所以數件アリ其一ハ凡熱病ノ初發及惡寒
 中ハ全軀ノ脉管纖維悉ク痙攣樣ノ運動ヲ發_シノ擧
 急牽縮シ胃及其傍圍諸器ニ於テ殊ニ甚シ故ニ稍
 重キ間歇熱ハ發作ノ初惡心嘔噦心下苦悶嘔吐等
 ノ症アルヲ以テ知_ルベシ是ニ由テ胃中ノ物消化セ
 ズ又是ヲ腸ニ傳送スル_テ能ハズ故ニ其服スル藥

モ消化セズノ停滯ス○其二ハ右ノ如ク諸脉管牽縮スル故ニ血液凝泣ノ行ラズ。諸液ノ分利排泄殆ト廢止ス故ニ口舌乾燥煩渴引飲等ヲ發シ胃中ノ津液殊ニ減耗ス胃ノ裏面ノ諸腺牽縮ノ然レニ幾那ノ末ヲ服スレバ是ヲ溶化スベキ津液ナキ故ニ血中ニ運輸セズノ其効力ヲ百體ニ布化スルヲ能ハズ故ニ發作中頑然トノ胃中ニ鬱滯シ。逾其熱及攣急ヲ増發メ發汗ヲ阻遏ス。胃ノ感觸甚キ人ハ其症殊ニ劇盛ナリ○其三ハ發作前ニ幾那ヲ服スレバ吐スル者アリ。即次ニ舉レ經驗說ノ

第二 第五 第十四

ノ如シ。是胃中ニ重滯メ大ニ其攣急ヲ増發スルト宛モ發作中ニ是ヲ與ルカ如クナレバナリ發作後。是ヲ服スレバ曾テ嘔吐スル者ヲ見ズ。乃其經驗說ヲ左ニ舉テ考據トス

第一 一婦人二十三歳重複間日熱ヲ患ルト既ニ一月。五月三日是ヲ診シ先吐劑ヲ與テ吐スルト一回。次ニ苦味健胃飲次ニヲ與ヘ同六日夜發作ノ一時半前ニ幾那末一錢ヲ與ヘ半時ヲ經テ又一錢ヲ與フ。然レ其熱發作ス翌日モ亦前法ノ如ク一錢宛ニ服用フ。然レ其發作ス但前夜ニ比スレバ差輕シ。其翌

夜モ前法ノ如ク用、レ此發作劇ク且、胸脇痛ヲ發ス、
 故ニ幾那ヲ休ム。一錢 健胃飲 健質亞那 四錢 橙
水ヲ加、浸ス、一夜、滓ヲ去リ、硝子壘ニ入、固封シ貯
ハ、一匙宛與フ、此劑諸病ニ用
ヒテ健胃驅風ノ殊効ヲ稱ス

第二 一男子二十一歳、重複ノ間日熱ヲ患、一三週、五
 月十七日はヲ診シ、刺絡ヲ施、一一回吐劑ヲ用、一二
 回。次テ健黃丁テ幾劑次ニ用ヒ、同、二十日發作ノ三
 時半前ヨリ半時毎ニ幾那末一錢宛與ルニ第三服
 至テ盡ク其末ヲ吐ス。故ニ其量ヲ減シ半時毎ニ
 半錢宛用、然レ、第四服後、發作ス。但、前日ニ比スレバ

差輕シ 健黃丁 幾劑 大黃 二錢 健質亞那 四錢 攝
爾扁答一錢 銳烈燒酒 二北 右調勻シ浸
一七日、滓ヲ去、硝子壘ニ入、固封シ貯、一匙宛飲液ニ
加、用、此劑胃腸ヲ健運シ、粘液汚物ノ鬱滯ヲ疏滌ス

第三 一婦人二十歳、間日熱ヲ患、一三週、五月十八日
 是ヲ診シ、先、吐劑ヲ與ヘ、次ニ苦味健胃飲前ニ用、
 六月朔日發作ノ二時半前ヨリ半時毎ニ幾那末一錢
 宛用、レテ四服ニ至ル。然レ、其熱發作ス。同、三日發作ノ
 三時半前ヨリ半時毎ニ其末一錢宛用、レテ六服ニ至ル。
 然レ、其熱發作シ同、五日モ亦發作セリ

第四 一男子三十歳、日發熱ヲ患、一七日、二月十二日
 是ヲ診シ、先、吐劑、及、下劑ヲ用、レテ胃腸ヲ淨掃シ、同、十

六日發作ノ三時前ヨリ半時毎ニ幾那末一錢宛用
一四服。然レ其熱發作ス。但前日ニ比スレバ差輕シ

第五 一男子二十一歳。日發熱ヲ患レ三週。三月二十

二日はヲ診シ先吐劑及下劑ヲ與テ胃腸ヲ疏滌シ

四月朔日。發作ノ二時半前ヨリ半時毎ニ幾那末一

錢宛用ル一四服。然レ其熱發作シ少間シテ嘔吐ス。

但翌日ハ發作セズ。同三日劇ク發作ス故ニ爾後其

時ニ拘ラズ其熱盡醒ル時數幾那ヲ用テ全治セリ

第六 一男子二十五歳。日發熱ヲ患フ。十一月二十三

日はヲ診シ。發作ノ二時前ヨリ半時毎ニ幾那末一

錢宛用フ。然レ其熱發作シ翌日モ亦發ス。但前日ニ

比スレバ差輕シ。故ニ其後數是ヲ用テ終ニ治ス

第七 一男子三十六歳。初間日熱ヲ患テ日發熱トナ

ル。正月二十三日是ヲ診シ。發作ノ二時前ヨリ半時

毎ニ幾那末一錢宛用一四服。然レ其發作ス。其翌日ハ

發熱輕クノ惡寒ナシ。因テ其後數幾那ヲ用テ終ニ

全功ヲ收ム

○發作後幾那ヲ用ル說

幾那ハ元來速効アル藥ニ非ズ。時日ヲ經テ漸功ヲ
成者ナリ。其故ハ是ヲ服ノ胃液ト混和シ徐ニ溶

化ノ血中ニ運輸シ百體ノ筋脉諸管ニ周布巡灌シ
 漸ク融液浸潤ノ効功ヲ成セバナリ又其收瀦ノ効
 カヲ以テ諸筋及一切凝體諸器ノ弛虛衰頹ヲ強健
 スト雖モ其首功ハ專ラ神經質ニ竄透貫徹ノ全身脉
 管質ノ運動ト觸知トヲ資補強健ニスト知ベシ○故
 是ヲ用ヒテ大抵七八時ヲ經ザレバ其發作ヲ遏止ス
 ルヲ能ハズ其十分功ヲ成スニハ十五時若ハ二十時ニ
 至レベシ○通例幾那末四錢ヲ取發作後直ニ用ヒ或
 其發汗ノ終ニ用ヒ或間日アル熱ハ發作ノ二十時前ニ
 用レバ能驅熱ノ功ヲ成ス是其醒解ノ長キ間ニ幾

那ノ効力ヲ遲發スレバナリ然ズモ發作前半時ヨ
 リ二時ノ間ニ用レバ服量多シト雖モ功少キヲ前
 ノ經驗說ノ如シ故ニ幾那ヲ用ニハ次ノ發作ニ遠
 ホド逾功多ト知ベシ是經驗說ノ第五第六第七ノ
 症ハ是ヲ發作前ニ用ヒテ効ナク次ノ發作ヲ遏止ス
 ルガ如シ或發作ヨリ次ノ發作マデノ間ニ用ヒ片ハ
 多クハ即日ノ熱ヲ解セズメ次ノ發作ヲ遏止スル
 ヲ以テ知レベシ是間歇熱ノミナラズ凡幾那ノ功ア
 ル諸病ハ是ヲ用ヒテ兩三日ヲ經ルニ非レバ其功ヲ
 見スヲナシ神經熱腐敗熱寒壞疽胃虛飲食消化シ

難キ症 重訂内科撰要第二章 出ツ等ニ是ヲ用ルガ如シ即_ナ 發作後ニ用ル經驗說ヲ左ニ舉グ

第八 一男子二十五歲。間日熱ヲ患_レ。十四日。六月六日。是ヲ診シ。苦味健胃飲 前ニ 出ツニ 梅那葉ヲ加倍シ用_レ。十四日。五更ニ發作シ。八日。午中刻發汗シ。殆_ト醒解スル頃。幾那末一錢ヲ用ヒ。是ヨリ半時 毎ニ一錢宛用_テ四服ニ至ル。其後少_シモ發作セズ全治セリ

第九 一男子十九歲。間日熱ヲ患_レ。二週。六月十二日。是ヲ診シ。吐劑ヲ與ヘ。次ニ苦味健胃飲ニ梅那葉ヲ

加用ヒ。同十七日發作後。速ニ幾那末二錢ヲ與ヘ。一時ヲ經テ又二錢ヲ用フ。同十九日微惡寒スルノ_ニ。爾_ノ後再發セズ

第十一 一婦人三十六歲。間日熱ヲ患_レ。三週。二月二十七日。是ヲ診シ。吐劑ヲ與_テ吐スル_レ二回。次ニ下劑ヲ用_レ一回。三月八日發作後。半時 毎ニ幾那末一錢宛用_レ四服。同十日。些_シモ發作ノ候ナシ。爾_ノ後尚再發ヲ防_クカ爲_メニ幾那ヲ與_テ健康ニ復ス

第十二 一婦人十六歲。日發熱ヲ患_レ。三月二十三日。是ヲ診シ。吐劑ヲ與ヘ吐スル_レ一回。次ニ大黃劑ヲ

用テ瀉下シ。四月二日發作後。發汗止ムニ至テ速ニ
幾那末一錢宛。半時毎ニ用テ四服。翌日惡寒ナク唯
微熱アルノ之同。四日胸脇痛ヲ發ス。因テ刺絡ノ其
痛消散シ爾後其熱再發セズ回復ス

○發作前後幾那ヲ用ル説

發作後。幾那ヲ用レバ峻効アルト右試説ノ如シ然
レ或云。其發作前ニ幾那ヲ用テ効ナキ患者ハ發作
後。是ヲ用ト雖モ亦同ク効ナカルベシ。或發作後幾
那ヲ用テ効アル症ハ發作前ニ是ヲ與ト雖モ亦同
効アルベシト。斯ノ如ク疑議スル片ハ一人ノ患者

ニノ右兩件ノ治法ヲ施スニ非レバ是ヲ明決シ難
シ乃此疑惑ヲ氷釋センガ爲ニ又其一二ノ試説ヲ
左ニ擧テ考據トス

第十二 一男子三十六歲。間日熱及日發熱ヲ患。二
月餘。十一月二十六日。發作ノ二時前ヨリ半時毎ニ
幾那末一錢宛用テ四服ニ至ル。然レ其熱發作ス。因
テ翌日發作後。發汗終テ幾那末一錢宛半時毎ニ用
テ三服。是ニ由テ其熱再發セズ平復ス

第十三 一男子二十五歲。日發熱及間日熱ヲ患。五
週。五月十一日是ヲ診シ。同十九日發作ノ一時半前

ニ幾那末二錢ヲ與ヘ。半時後又二錢ヲ用フ。然レ其熱發作ス。但以前ニ比スレバ差輕シ。同、二十一日劇ク發作ス。故ニ同、二十三日。發作ノ一時半前ヨリ四分時毎ニ幾那末二錢宛用テ四服ニ至ル。然レ其熱發作ス。因テ暫ク幾那ヲ休メ。同、二十九日發作後。發汗終ル頃。幾那末二錢宛四分時毎ニ用テ四服ニ至。是ヨリ其熱發作セズ回復ス。○此症ハ發作前ニ幾那四錢ヲ服シ又一ヲ服メ効ナシ。故ニ數日幾那ヲ休。其熱ヲ發作セシム。然ラズノ直ニ發作後幾那ヲ用テ發作歇キハ其發作前ニ用タル幾那ノ功

ナリト思シテ恐レバナリ **第十二**ノ症モ是ニ同

第十四 一婦人十六歲。頑固ノ日發熱ヲ患フ。三月十日是ヲ診シ。吐劑及下劑ヲ與テ胃腸ヲ淨掃シ。同、十五日發作後。幾那末一錢半宛。半時毎ニ用テ四服。翌日其熱輕ク發作ス。故ニ又幾那ヲ用テ前日ノ如クス。然レ翌日仍輕ク發熱ス。因テ數日幾那ヲ休メ。同、二十五日發作ノ二時前ヨリ半時毎ニ幾那末一錢宛用テ三服ニ至ル。然レ其熱發作ス。同、二十七日亦發作前ニ幾那末二錢宛用テ三服。然レ發作ノ盡ク其幾那ヲ吐ス。是ニ因テ同、二十八日。發作後。幾那末

此言青... 十四 屋宇堂藏

一錢宛半時每ニ與テ六服ニ至ル。是ニ因テ其熱發作セズ。然レ其後數日仍微熱アル故ニ幾那ニ攝爾扁答ヲ加用テ全治セリ。此症ハ初發作後幾那ヲ用テ二日。次ニ發作前ニ用テ二日ニメ効ナシ。因テ暫ク幾那ヲ休メ。復發作後。是ヲ用テ發作休ム。然レ此症甚ダ頑固ニメ微熱尚暫留スル故ニ攝爾扁答ノ加功ニ因テ終ニ全功ヲ收ルナリ。

○發作前後ノ間。幾那ヲ用ル說
發作後ヨリ次ノ發作マデノ中間ニ幾那ヲ用テ古來醫家普通ノ善法トス。然レ其効大抵發作前ニ用

ルト發作後ニ用ルトノ中間ニ在ト知ベシ。發作後。用ルニ比スレバ發作ニ近キ故ニ幾那十分ニ消化シ難ク。胃中ニ重滯ノ其効力ヲ逞發スルヲ能ハズ。故ニ多クハ即日ノ熱ヲ制伏セズメ次ノ發作ヲ遏止スルナリ。

間歇往來諸症凡熱病ノ毒體中ニ潛伏メ發スル病多クハ時日ヲ定テ發シ或初欠伸ノ頭目鬱重或微惡寒シ終ニ發汗メ解シ發作ノ時通スル小便溼アリテ洩器ニ沈ムヲ粉ノ如シ。或熱退キ減スルヲ多クメ幾ト間歇アル如キ症。或微惡寒アリテ發熱シ

時日ヲ定テ發シ荏苒トシテ治セザル症ハ皆幾那良効アリ○一婦人隔日ニ眼焮赤劇痛ス一患者眼焮痛時ヲ定テ發ス皆幾那ヲ用テ治ス○一小兒隔日ニ劇キ衄血ヲ發ス一患者隔日ニ劇キ乾欬ヲ發シ昏睡ノ發汗シ解ス一患者隔日ニ右脇疼痛ス皆幾那ヲ用テ治ス○毎日時ヲ定テ發スル齒痛其他斯ノ如キ諸症下劑ヲ用テ治セザル者或毎年同シ時候ニ發スル病ハ皆幾那ヲ用テ治驗多シ（布物）
鎮痙經驗說幾那ハ鎮痙ノ一藥トス痙攣搖掣ノ諸病ニ試用セル經驗說ヲ左ニ記ス

第一一男子十八歲驚駭ニ因テ癩ヲ發シ淹滯ノ治セザルヲ八年又二年以前ヨリ癡駭ノ症ヲ兼（チソチ）毎ニ睡中ニ發シ傍人其頭ヲ擡グ漸ク起坐セシムレバ間醒解ス然レ患者是ヲ知ラナシ此症幾那ヲ用テ一月許ニ劇症大ニ減シ爾後唯罕ニ輕ク發動スルノミ

第二一男子二十一歲癩ヲ患テ二年幾那ニ纈草ヲ加用ルヲ十日ニテ諸症大ニ輕快ヲ得タリ

第三一婦人二十四歲五月以前勞動ノ體大ニ熱シ又遷ニ冷氣ヲ被リ爾後上腹兩側疼ミ其後腹筋數

牽引ノ呃逆ヲ發シ。又下顎掣動ス。諸症發止。時アリ。又發作中ハ脉駛數ニノ算^カヘ難シ。稍神思ヲ擾動スレバ乍チ發作ス。但シ月經調順ナリ。此症麝香十^ツ瓦宛用^レ一日三次或加^テ十五^ツ瓦宛用^レ一日六日。然^レ尺寸効ナク脉狀及肢體ノ冷暖必^シモ變動ナシ。又子宮衝逆ヲ兼發ス。因^テ幾那ニ益智及撒兒末爾扶斯^各少許ヲ加^テ散劑トシ用^レ三週ニメ全愈セリ

第四 一婦人十八歳熱病ヲ患^テ後子宮衝逆ヲ發シ淹滯ノ治セザル^ト數週終ニ幾那ヲ服メ回復ス

第五 一婦人二十四歳生稟壯實四年以前左肋ヲ打

撲^シ以來其部疼痛脇下苦滿困重腹内風氣痞脹及子宮衝逆ヲ兼子腹内癥塊アリ。又三月以來欬嗽心下疼痞氣脹悶殊ニ甚^シ。月經ノ多少遲速定ラズ。又七日以來頭痛及劇キ呃逆ヲ發シ心脇下疼殊ニ甚^シシク呃逆休時ト雖モ其疼止^ラナシ脉初ハ差數ナ^レ尺其後平常ヨリハ遲緩ナリ此症先^ニ呃逆ヲ治セ^ンガ爲ニ麝香龍腦阿魏阿芙蓉纈草等ヲ内服セシメ揮發精^的里亞加鎮痛膏等ヲ外敷シ七週ヲ經^レ尺寸効ナシ。次^テ幾那ヲ用^レ五日亦微効ヲ得ズ終ニ刺絡ノ瀉血スル^ト九^ツ其血質平常ノ如シ是ニ

由テ呃逆止之諸症寛解シ五六日ヲ經テ回復ス

第六一男子十八歳舞蹈病

癩狂ノ一種重訂内科撰要癩癲拵拵篇第四百十

三章ヲ患レテ既ニ三週乃チ續草根末半錢或一錢宛用

七日四次五日連用ノ拵拵ノ諸症寛解シ步履穩靜

言語分明飲食嚥下亦平常ノ如シ但睡中拵拵休ガ

ルニ因テ仍是ヲ用レテ數日拵拵筋惕睵動等大抵減

スレト全治セズ終ニ幾那ヲ用テ平復ス

第七一女子十五歳冒寒及驚駭ニ因テ舞蹈病ニ罹

ルヲ既ニ十四日續草根末一錢宛用レテ日四次四日

連服ノ効ナシ終ニ幾那ヲ用テ全治セリ

第八一少年十四歳卒然トノ昏睡シ肢體僵直些モ

轉側屈伸スルコ能ハズ時々醒解スレト復發シ治

セザルコ數週乃チ續草根末二刀宛用ルレテ日四次六

日ヲ經テ又發シ前ノ發作ニ比スレバ甚ダ癩ニ似

タリ因テ幾那ヲ用レテ數週諸症大抵回復セリ

○凡癩癲拵拵ノ諸症ノニニテ他病ヲ兼子ザル者

ハ幾那偉効アリ但シ火モ熾衝ヲ兼ル症ハ甚タ害ア

リ右八種ノ症ハ些モ熾衝ヲ兼ザル者ナリ○或ハ

傷骨傷打撲傷等ニテ癩ヲ發スル者ハ即チ神經損傷

ナリ即破傷風此症ハ幾那ニ阿芙蓉ヲ加用ヒ或幾那一

味用テ効アリ或阿芙蓉ヲ用テ増劇スル症幾那ニ
テ治スル者多シ或幾那ノ煎汁ヲ吉利詞參兒トシ
施スモ亦驗アリ依

赤痢惡性ノ痢疾。病毒酷烈ニ血液速ニ腐敗シ終

ニ腸壞疽トナリ虚脱ノ危劇ノ惡症ヲ發シ死スル

者多シ。此症ハ揮發壯神劑後ノ神經熱ニ幾那ヲ加

用テ腐敗熱ノ如シ且阿芙蓉劑ヲ兼用メ治スベシ

失血諸失血過多。患者虚脱シ必モ焮衝ノ候ナク或

血液腐敗崩壞ヨリ發スル症ハ幾那峻効アリ○刃

傷出血多ク患者昏冒或搗掣等ノ危症ヲ發シ或一

旦出血止、在時、迸出シ或潰瘍ノ水綿様肉ヨリ出

血スル者ハ幾那ヲ内服外用ノ殊効アリ布底

焮腫眼頑固經久ノ焮腫眼ハ幾那ヲ内服外敷ノ大

効アルヲ先哲ノ經驗說多シ布

蛇蟲幾那ハ殺蟲ノ良驗アリ一小兒六歲蟲症ヲ患

ヒ幾那ヲ與テ夥ク蛇蟲ヲ下シ治ス一女子十六歲

危篤ノ蟲症ヲ患ヒ諸藥驗ナシ終ニ幾那ヲ葡萄酒

ニ浸シ用ニ夥ク蛇蟲ヲ吐下メ愈ユ一女兒九歲蛇

蟲ニテ劇ク癩ヲ發シ諸藥効ナシ。幾那末一ヲ水銀

四錢ヲ蜜ニ研和シ每服一小刀尖宛數用テ治ス協

酸敗液酸敗液幾那ハ酸敗液ヲ消ノ腐敗ヲ止ム凡腐敗セ
 ル者ヲ幾那浸劑ニ淹ヒタセバ臭穢ヲ消スルモ一ハ制
 酸ノ効ニ因ル故ニ酸敗液ヨリ發スル經久胃腸ノ
 諸症ニ殊効アリ底

痘瘡痘見點スレ底起脹セズ或陷塌シ或灰白色或
 灌膿ノ黃熟セズ或黯黑ニメ惡臭アリ或根脚青色
 ノ斑アルハ皆惡性ニメ險痘トス幾那奇効多シ惡
 痘流行ノ時稟賦薄弱ノ小兒ハ預是ヲ用ヒ或見點
 起脹遲慢ノ症ハ始終是ヲ用テ惡症ヲ防グベシ○
 灌膿ノ腐敗甚ク膿熱劇キ症ハ幾那ニ綠礬精ヲ加

用テ大効アリ○見點ノ熱解セズ痘速ニ赭色或血
 色或黑色トナリ痘頂平陷界地赤色蒼色ノ線縷若
 ハ斑ヲ現シ痘中ノ液酷厲ニメ傍圍ニ侵蝕シ或諸
 竅失血ヲ發シ痘ノ臭氣甚メ汗大小便共ニ屍臭ノ
 如キハ皆腐敗熱ヲ兼ル者ニメ其毒内攻シ危篤ニ
 至者多シ治法亦腐敗熱ト同シ○痘ノ暈圍紅色微
 ナルハ虛痘トス幾那ヲ饒多ニ用ベシ○小兒幾那
 ヲ煉フ者ハ是ヲ細末トシ砂糖若ハ乳汁或舍利別
 ニ研和シ橙汁ヲ加用ヒ或幾那ノ濃煎汁ニ橙汁ト
 砂糖ヲ加テ煉膏ノ如クニ用ベシ○幾那ハ痘瘡麻

疹ノ餘毒ヲ解スル一良藥トス○險痘治ノ後勞瘵ノ如ク效ノ膿様ノ痰ヲ咯ク症ハ幾那牛乳ヲ與ヘ輕キ下劑ヲ兼用スベシ。總テ痘後ノ勞瘵ハ此二品尤効アリ。但牛乳ハ毎日多ク用ベシ○麻疹腐敗熱ヲ兼レバ壯熱ノ大ニ煩悶昏眩譫語其他劇症ヲ發シ疹色淡白或紫蒼黑等ヲ見シ或ハ血色斑ヲ發シ忽チ消散内攻シ或ハ肺癆衝ノ酷厲液崩壞ノ忽チ失血ヲ發シ敗物ヲ下利ス其治法腐敗熱ト同然レ治スル者罕ナリ羅物

瘰癧瘰癧性ノ酷厲毒ヨリ頸領耳下腺唇等ニ腫瘍潰瘍ヲ生シ其毒血液ニ浸染メ壞液ノ諸症ヲ發シ患者虛憊スル片ハ幾那良効アリ。先哲瘰癧ニ用テ治驗ヲ稱スルハ皆此症ナリ

肺癆痰ニ膿ヲ交テ夥ク咯キ患者精力虛損シ。食後發熱シ食盡ク消化スルマデハ熱退カズ或ハ熱少クノ汗多ク小便澄清。或ハ熱退テ小便ニ膿ヲ交ヘ通スル者ハ其發汗中ニ肺癆ノ膿自ラ血中ニ混メ小便ニ通スルナリ斯ノ如キ症ハ幾那ヲ用テ精力ヲ強壯シ膿ヲ排テ其腐敗熱ヲ治スベシ或ハ幾那ニ麗春花若ハ和胸劑ヲ加テ煎服シ或ハ幾那煎ニ麗春花玫瑰花黥失刺蘘等ヲ加テ泡出シ温服ノ良効アリ但膿ヲ吐クナク及凝體纖維強硬乾燥スル者或ハ少モ炊衝ノ候アル者ハ幾那害アリ斷

潰瘍 内部或外部ノ潰瘍或外傷潰爛シ患者精力虚損ノ其膿ヲ排泄スルヲ能ハズ内鬱ノ諸惡症ヲ發シ或、其膿自ラ血中ニ濫流ノ膿熱腐敗ヲ發シ或、膿樣ノ汚物ヲ下利スル症ハ速ニ幾那ヲ用テ膿ヲ排ヒ其熱ヲ解スベシ○腫瘍及外傷凡ニ炊腫シ將ニ濃潰セント欲スル症ハ幾那害アリ○凡潰瘍ノ腐爛甚クノ患者虚損シ精力充張セズノ愈難キ症ハ幾那ヲ的當トス是ヲ用レハ弛軟ノ敗肉收固ノ臭穢消シ良膿ヲ醸ス○大ナル外傷腐爛ノ惡性ノ潰瘍トナリ患者虚損ノ血液腐敗スルハ瘡口ヨリ

稀キ敗血滲漏ス。體中惡液多キ者ハ其腐敗殊ニ甚シ斯ノ如キ症ハ速ニ幾那ヲ用テ腐敗ヲ除キ精力ヲ補充ノ治スベシ○瘡口淡白ニノ臭穢ノ稀膿滲出シ脉虚弱ナル症ハ熱甚ク舌燥クト雖モ幾那効アリ脉強數ニノ壯熱アル者ハ或、刺絡ヲ施シ或、酸收劑ニ消石ヲ加テ用ヒ幾那ヲ兼用スベシ○外傷潰瘍共ニ血液稀薄纖維弛緩ニノ水腫ヲ兼ル者ハ甚ダ危險トス幾那良驗アリ○外敷ニハ此細末ヲ患處ニ搽シ或、ゴッ布ト爲シ貼シ或、煎劑若ハ浸劑トノ蒸湯シ瘻瘡ハ水鏡ニテ注入シ或、水棉ニ蘸ヒキノ貼

シ咽喉口中ノ潰瘍ハ漱劑トシ斷舌等ノ潰瘍ハ幾
 那未ヲ玫瑰蜜ニ和シ塗テ皆良驗アリ布斯
 壞疽此病ハ内外所在ニ拘ラズ幾那ヲ内服外敷ス
 ルヨリ効アルハナシ。幾那細末一弓分テ十二服ト
 シ一時ニ一服宛用ヒ生肉ト腐肉ト分レテ善膿ヲ
 成スニ至ルベシ或腐肉消スレハ膿稀クメ夥ク漏
 泄シ患者虚憊スル症ハ其服量ヲ増シ膿減メ白色
 稠厚トナルマデ用ベシ老人虚人は患テ大ニ潰
 爛スル者ハ腐肉除クト雖モ終ニ死スレバナリ○
 壞疽枯燥セズ稀汁出ル症ハ幾那良驗アリ。乾テ濕

汁ナキ者ハ効ナシ此症ハ血液凝固ノ宛モ詰ノ如
 ク諸管纖維モ燥テ牽縮スル故ニ幾那ヲ用テ逾凝
 固スレバナリ故ニ熱壞疽ノ焮衝性ノ症ニハ大害
 アリ但脈弱ニノ虚脱甚キ者ニハ症ニ隨ヒ用ル
 アリ○惡性ノ潰瘍及外傷大ニ腐爛ノ壞疽トナリ
 或出血ヲ兼子或焮衝ナク唯腐敗熱ヲ發スル者ハ
 幾那ヲ用テ治スベシ○壞疽ノ性アル咽喉腫ハ幾
 那ノ煎劑或浸劑ヲ漱藥トメ尤効アリ布協
 癌瘡幾那ハ癌瘡ノ臭穢潰爛メ熱壞疽様ノ症ニ先
 哲甚ダ効驗ヲ稱ス是ヲ歷試スルニ唯腐敗甚キ潰

爛癌ノ臭氣烈ク稀汁出テ劇痛焚クカ如キ症ハ幾
那ヲ内服外敷ノ漸ク劇痛退キ出血止ニ潰爛減ノ
淨潔トナリ善膿ヲ成ス者多シ然レ其自性ノ酷厲
毒ヲ變化メ是ヲ全愈スルヲ能ハズ

布

新訂増補和蘭藥鏡卷六終

林氏



GENEALOGY

