



新訂
增補
和蘭藥鏡

卷十



ヤ 3
968
5



門 3
號 968
卷 5

文政三十年仲夏新鑄

榛齋宇田川先生著

四篇

新訂

和蘭藥鏡

增補

風雲堂藏版

青藜閣發兌

去
前
田
實
氏
印

新訂增補和蘭藥鏡標目

卷十

幾那

神經熱虬蟲合併篇第五

虬擾動症治 驅蟲乳劑

虬潛蟄症治 幾那驅蟲飲 驅蟲蒸溺方

神經熱兼虬蟲治例 攝絲纈草飲 驅蟲琶布

緩和吉利詞爹兒 收斂亞的兒飲

羯布羅驅蟲膏 麝香鎮瘕散 龍鹼溺方

亞鉛驅蟲散 龍腦揮發膏 鎮瘕吉利詞爹兒

增訂和蘭藥鏡

卷十

標目

風雲堂藏

全體焮衝合併病原

全體焮衝合併症候

全體焮衝合併治法

各部焮衝合併病原

各部實症焮衝病原

各部實症焮衝症治

各部虛症焮衝病原

各部虛症焮衝症候

各部虛症焮衝治法

各部假症焮衝症治

刺絡 防焮衝劑

三種區別

肺焮衝 腦焮衝

新訂增補和蘭藥鏡卷十

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕 榕菴校補

幾那^五

神經熱蚘蟲合併篇第五

神經熱ニ蚘蟲ヲ兼レバ專ラ神經熱ヲ療スル強壯劑ノミ用テ治スルヲ能ハズ○蚘ハ能ク痙攣ノ諸症ヲ誘發シ且、既ニ發セル痙攣諸症ヲノ逾増長淹滯セシム。故ニ先、蚘ヲ治セザレバ本病モ治シ難シ○蚘ヲ療スルニ二般ノ別アリ一ハ蚘ノ擾動刺戟ヲ

治シ一ハ其潛蟄靜伏ヲ治ス。是ヲ察スル一一大要務トス

蠅擾動症治

蠅擾動ノ刺戟スレバ必ズ腹部劇症ヲ發シ。身體各部ニ連及ノ痙攣ノ諸症ヲ見シ患者甚ダ感動シ易シ此症ハ驅蟲劑ヲ禁ス。是ヲ用レバ蠅逾擾動ノ大ニ刺戟シ患者其劇症ニ堪ズ故ニ鎮痙劑及乳汁油類ヲ與テ最良トス。是ニ由テ一ハ蠅自ラ罷勞シ刺戟セスノ遂ニ死ス。一ハ感觸ノ敏銳ナル胃腸ノ裏面ニ蠅ノ口嘴吸貼メ刺戟シ劇症ヲ發スル者。今其藥液遍ク胃腸ノ裏面ニ塗布スルニ

因テ蠅嘴直ニ抵觸吸貼セス刺戟ノ感動微ナシ。是ヲ以テ數乳汁ヲ内服セシメ又是ニ鎮痙藥ヲ加テ煮テ腹部ヲ蒸湯シ又乳汁油沙糖ヲ調和メ吉利詞參兒トシ施スベシ或左ノ乳劑ヲ内服メ奇効アリ

驅蟲乳劑

甘扁桃油 或阿利襪油或亞
麻油 一弓
亞刺比亞薺謨漿 適宜
水 六弓

右調和シ左ノ品ヲ加フ

乳劑 本篇卷十四清涼子
條ニ出シ一弓

菲阿斯失亞密越幾斯劑

八氏

右研合シ一時毎ニ二匙宛與フ或亞鉛カルキ加爾幾補或番木鱉越エキス幾斯劑ヲ加テ殊ニ良此二品殺蟲ノ奇効アリ○蛇蟲頑固ニシテ危劇ノ症ヲ發スル者ハ草麻油ヲ内服セシメテ多ク殊効ヲ得タリ○水銀ヲ水煎メ其水ヲ内服スレバ胃腸ヲ刺戟セズノ能蛇ヲ罷勞セシムル一良藥トス但尋常ノ水銀ハ鉛類ノ諸礦質ヲ染汚セル故ニ精製メ用ベシ或云純粹水銀ハ煎煮スレバ水ニ融和セザル故ニ殺蟲ノ性効些モ其湯ニ出ナシ唯水銀ニ雜ル鉛質其煎汁ニ

溶和スル故ニ患者ニ害アリト又云水銀煎汁殺蟲ノ効アルハ水銀ノ外面ニ染汚セル汞質ノ渣カルク灰カ溶和スレバナリト然レバ水ヲ以テ水銀ヲ煎煮スレバ水銀其水質ヲ剖解メ水中ニ含ル多少ノ酸質ヲ吸收シ水銀ト酸質汞抱合メ渣灰ト爲ル試ニ純粹水銀ヲ硝子壘ニ入水少許ヲ加暫ク振掉スレバ忽渣灰生スルヲ以テ知レシ既ニ渣灰トナレバ能煎煮スル所ノ水ニ溶化ス故ニ水銀ノ煎汁絶テ効ナシト言ベカラズ

蛇潛蟄症治

蛇ノ擾動刺戟及痙攣ノ諸症甚シカ

ラズノ感觸少ナキ症ハ直チニ驅蟲ノ峻劑ヲ用テ蛇ヲ
 驅除スベシ。每常殊効ヲ得ル藥品、攝絲施那（名）
 傑（補）脛弗魯伊皮（補）ヲ用テ殺蟲ノ奇効アリ。云品
 甘汞等ナリ。又後方多ク治驗ヲ得タリ。

幾那驅蟲飲

幾那末 一匁

攝絲施那 四錢

傑脛弗魯伊皮 一錢

右水十二匁ヲ以テ煮減ノハ多トシ後藥ヲ加フ

額草根末 二錢 橙皮舍利別 一匁

右先額草根末ヲ攪和シ渣ヲ去リ舍利別ヲ和シ一

時ニ二匙宛服ス。○此症油類ヲ吉利詞參兒トシ施
 ノ殊効アリ。或左ノ蒸湯法每常奇効ヲ得タリ。

驅蟲蒸湯方

答那攝黥謨葉（補）

亞爾鮮

薄荷

加密列

各一握

右乳汁ニ煮テ日常腹部ヲ蒸湯シ冷レバ更換ス。小
 兒服藥ヲ嫌フキハ此劑ヲ施メ危劇ノ諸症ヲ治シ
 蛇ヲ驅泄スルヲ甚多シ。或非阿斯失亞密油石腦油
 牛膽答那攝黥謨油ヲ適宜ニ合和メ擦藥トシ常ニ
 腹部ニ擦ルモ亦効同シ。○右ノ諸劑ヲ施ス際ニ強

壯劑ヲ兼用ノ本病神經熱ヲ治スルノ肝要ナリ

神經熱兼吐蟲治例 一名哲頑固危險ノ蟲病ニ驅

蟲劑ト壯神劑ヲ合シ用テ良驗アル一考按ヲ舉テ

治例ヲ示ス

○一女兒六歳。六月十五日是ヲ診ニ水瀉數劇ノ疲
勞スルノ既ニ八日。臍ヲ繞テ腹痛シ口味甚苦舌上
稠苔アリ食ヲ嫌ヒ唯酸物ヲ好ミ殊ニ醋ヲ嗜ム額
疼甚ク精神錯亂時謔語シ發熱熾盛手掌殊ニ甚ク
精力逾虚憊シ脉細數ナリ此兒以前蟲症ヲ患フ。因
テ先吐劑ヲ與テ吐セシメ。次テ左ノ殺蟲劑ヲ與フ

攝絲纈草飲

攝セ絲シ施シ那ナ末未 三錢 纈草根 末 一錢

右水六勺ヲ以テ先攝セ絲シ纈シヲ煮終ニ纈草根ヲ加煮テ
滓ヲ去リ後藥ヲ加フ

硃沙 二刀 舍利別 六錢

甘消石精石 二十滴

右合和シ一時每ニ一匙宛與フ○又琵琶布ヲ作テ腹
部ニ貼ス

驅蟲琵琶布

接骨木花

加密列 各四勺

亞爾鮮アルゼンチン

菲阿斯失亞密葉フィアスシミアミエ

各三錢

右乳汁ニ煮テ琶布トス○又次ノ吉利詞爹兒ヲ施

緩和吉利詞爹兒

麗春花

加密列 各二錢

葵根 一錢半

右水六勺ニ煮減ノ三勺半トシ滓ヲ去リ漿粉精製上好粉小麥粉ヲ云二錢亞麻油三勺ヲ加施ス又夜中吐劑ヲ與テ多ク粘液及膽液ヲ吐スルヲ兩次爾後頭痛止ニ口中苦味消シ脉稍盈揚シ數ニノ百五六動大虵一條下リ譫語セズ安眠シ熱亦減ス○

十六日脉百十二動許舌白苔アリ口味復苦ク甚ダ酸物ヲ好ム大便水瀉シ時臍邊絞痛ス乃前ノ吉利詞爹兒劑ニ纈草末ニ刀ヲ加施ス夜中虵一條通ス口中苦味除ク然レ腹痛休マズ脉數ニノ小熱勢大ニ減ス又後方ヲ兼用ス

收斂亞的兒飲

收斂亞的兒名 九滴 舍利別

蒸餾水 各二錢

右調和シ六十滴宛一盞ノ水ニ攪和シ時々與フ○十七日十八日諸症同前大便始テ固リ腹痛全ク止

然_レ夜中復腹滿急痛時_ニ效嗽鼻中痒熱增發脉疾數
ナリ因_テ前ノ攝_セ絲纒草飲ニ幾那二錢ヲ加與へ左
ノ軟膏ヲ作_リテ腹部ニ塗擦ス

羯布羅驅蟲膏

過爾托亞膏

或_レ越沒里膏

羯布羅油

二錢

石腦油

一錢

右研合ス○十九日小腹痛減シ頭痛再發シ大便復
水瀉シ患者甚ダ憊勞シ呼吸不利時_ニ效シ鼻中痒シ
脉百十動絶_テ食ヲ欲セズ因_テ前ノ攝_セ絲纒草飲ニ
答那攝_セ黠謨葉二錢番木鱉越_セ幾斯劑八分ヲ加用ヒ

又左ノ乳劑ヲ内服セシメ且_レ是_ヲ吉利詞爹兒トシ
施ス夜中安眠ス

汞乳驅蟲飲

水銀 純粹者 一_ヲ

乳汁 適宜

右水銀ヲ磁鍋ニ入_レ水一_比ヲ加蓋閉シ煮_ル七八分時
上清ヲ取り適宜乳汁ヲ攪和シ其半分ヲ内服シ其
餘ヲ吉利詞爹兒トス○二十日時_ニ抽掣ノ兩手牽
縮シ嗜眠ス_レ夜安眠セズ全軀ノ病患皆頭中ニ在
か如シ小腹痛休_ト雖モ臍邊甚ダ膜脹シ按_テ感觸
ニ堪_ス又蛻一條大便ニ雜リ通ス脉細數ニノ緊夜

中頭ノ諸患緩解メ睡眠ス然レ在時々抽掣シ大便又水瀉ス方劑同前○二十一日諸症同前但頭中ノ患苦全ク失カ如シ乃チ前ノ攝絛纈草飲ノ攝絛ノ量ヲ増シ幾那四錢ヲ加與ヘ又前ノ驅蟲毳布ニ答那攝黠謨二錢ヲ加施ス○二十二日水瀉止ニ熱竝ニ腹脹減ス乃チ後方ヲ與フ

亞鉛驅蟲散

亞鉛華 一匁

沙糖 半匁

右研和シ分テ五服トシ毎朝毎夜一服宛用フ○二十三日諸症輕快脚ノ抽掣頭中患苦盡ク退キ始テ

食ヲ欲ス脉九十八動又虵一條通ス方劑同前○二十四日諸症復劇發シ脉疾數ニノ緊是調護ノ宜ヲ失ヒ藥劑ヲ怠リ且虵ノ擾動ニ因ル其故ハ每ニ虵通スル以前ハ諸症増劇シ既ニ通スレバ寛解スレハナリ二十五日二十六日腹部復膜脹シ按テ疼甚ク數水瀉スレ在虵下ラズ熱勢劇ク肌膚燥熱燻カ如ク唇澹白舌燥キ栗殼色舌ヲ出スニ甚ク困難脉細數搏度齊ハズ手指抽掣ス因テ後方ヲ與フ

麝香鎮痙散

麝香 二匁

亞鉛華 一匁半

沙糖 半刀

右研和シ分テ六服トシ朝夕一服宛與フ又芥子泥
 ヲ腓ニ貼ス自餘藥劑同前夜中昏睡熱増發脉細弱
 時譫語シ下利休マズ○二十七日昏睡醒解ス然レ
 熱仍甚ク脉百二三十動腹部感觸甚シ午後熱稍減
 シ肌膚乾燥夜中熱増發嗜眠時々抽掣煩擾譫語ス
 夜半後安眠ノ譫妄下利休ム大抵朝夕熱及諸症増
 發ス○二十八日諸症同前夜分昏睡甚ク眼開カズ
 耳聴エ難ク總テ知覺微ナリ因テ芥子泥ヲ腓ニ貼
 シ芫菁膏ヲ兩肩間ニ貼シ羯布羅精ヲ温湯ニ和シ

肢體ヲ蒸湯シ又後方ヲ以テ腹部ニ擦ス

龍腦揮發膏

硃砂揮發膏 三錢 龍腦油 一錢

舍電阿芙蓉液 半錢

右研和ス又左ノ劑ヲ吉利詞爹兒トシ施ス

鎮痙吉利詞爹兒

加密列 四錢

右水九弓ニ煮減ノ五弓トシ後藥ヲ加フ

顯草根 末 二錢 亞兒尼加根 末 一錢

右煮ルノ少時滓ヲ去リ後藥ヲ加フ

龍腦

四片

舍電阿芙蓉液

十滴

右研和シ是レヲ施ノ後又舍電阿芙蓉液八滴ヲ增加シ施ス少間シ昏睡醒解シ人事ヲ省ス然レ凡レ全軀感シ動シ易ク腹部殊ニ甚ク屢掣引シ時々譫語脉細數搏度齊ハス○二十九日熱減シ精神醒復ノ能レ傍人ヲ知ル然レ凡レ腹脹シ稍動搖スレバ腹痛シ肌膚燥キ大便通ゼサル一二日脉小弱百五動許乃前ノ攝絲纈草飲加幾那劑ニ氏埤列利精四錢舍電阿芙蓉液八滴ヲ增加シ與ヘ且麝香鎮痙散カ布羅精蒸溺法ヲ吉利詞共持重シ施シ又午時ニ硃砂ト醋ト

合和ノ頭部ヲ冷漏ス患者復昏睡譫語手指抽掣交發シ口ノ邊圍ニ小飽ヲ發シ潰破疼痛ス吉利詞共持重シ施シ又午時ニ硃砂ト醋トヲ施ノ大便一行通シ腹脹差減ス然レ凡レ寒熱往來肌膚燥涸夜中脉甚ダ虛軟搏度齊ハス時々欬嗽及喘鳴ス因テ又芥子泥ヲ腓ニ貼シ芫菁膏ヲ臂ニ貼ス芥子泥ノ刺戟ニ由テ夜半前些モ睡ラズ煩ノ感動甚故芥子泥ヲ去ル熱勢甚ノ熯カ如シ然レ凡レ昏睡減シ喘鳴休ム脉數小ニノ緊夜半復嗜眠ス○晦日早旦搐掣煩燥床中ニ跳起シ唇脞動肌膚唇舌燥キ眼中曇暗感觸甚ノ些モ肢體ニ觸ルヲ惡シ呼吸大

テ喘鳴ス因テ勉テ藥劑ヲ多服セシメ且列印設酒
 ヲ兼用ス夜分又冷湯法ヲ施シ先菁膏ヲ左臂ニ貼
 ス然レ煩躁劇ク呼吸短促暮中ニ展轉ノ瞬間モ安
 卧セズ但脉勢稍盈揚ス因テ舍電阿芙蓉液八滴ヲ
 葡萄酒少許ニ加頻服セシメ又前ノ麝香鎮痙散ノ
 麝香ヲ加テ三氏トシ沙糖ヲ二氏ニメ一服トシ朝
 夕一服宛與フ夜中大便二行通シ腹脹及感動減ス
 ○七月朔日朝患者安眠シ全身蒸氣ヲ發ノ津潤シ
 酸臭甚シ舌燥キ熱減ノ微惡寒シ肢體ノ甚キ感動
 減シ語聲連續ノ能事理ヲ辨識シ口邊ノ小泡消散

シ脉軟弱ナレ氏甚細小ナラズ百六動ヨリ百十動
 許晝間屢水瀉ス因テ揮發衝動藥ニ幾那一錢龍腦
 一氏ヲ加吉利詞參兒トシ施ス其他方劑及葡萄酒
 モ用フ夜中熱甚ク昏睡及痙攣諸症ヲ兼發シ寒熱
 交發作ス○二日肢節顫振搐掣劇ク殊ニ呃逆甚メ
 汗アリ夜中稍睡眠ス方劑同前○三日昏睡及驚悸
 跳惕交發ノ休ズ但熱劇シカラズ肌膚潤ヒ脉百二
 十動方劑同前又冷湯法ヲ腹部ニ施シ且蒸湯法ヲ
 施シ前法ノ如シ夜中復大熱腹脹ノ下利ス乃醋ヲ
 吉利詞參兒トシ又後方ヲ作テ腹部ヲ蒸湯ス

龍齎湯方

羯布羅精

龍齎擦方

卷八ニ出、各四弓

右合和ス夜中大便二行通シ腹脹及感觸熱勢昏睡
 共ニ減ス。但口中ノ一處被膜剥脱シ胃管感觸甚ノ
 藥汁ヲ嚥下スレバ攣縮ス。方劑同前夜分昏睡セズ
 精神輕爽ナリ。但耳聾ノ大聲聴ズ熱解ノ總體温煖。
 脉稍緩乃前ノ麝香鎮痙散一服ヲ與フ○五日朝熱
 減シ脉數減スルヲ十五動大便秘シ腹脹ス。因テ醋
 ヲ吉利詞キリス參兒テイルトシ施ス夜中聲カレ煩カレ。時ニ大息シ
 腹脹甚クメ下利ス○六日七日終日腹脹ス。乃前方

三福田山田圖

ヲ用ヒ又草麻油半匙宛與フ毎日兩次。又酪餘酪ヲ
 用夜中不寐煩カレ。○八日腹脹甚シ乃前カレ吉利詞
 參兒テイルヲ施ス夜中安靜ナリ○九日朝腹脹甚シ。因テ
 前カレノ吉利詞參兒テイルヲ施ス。諸症同前○十日腹部感觸
 甚シ。脉百動許熱甚シカラズ。皮膚乾燥ス方劑同前。
 夜中平便ニ死虻ヲ雜ヘ通スルヲ三次○十一日脉
 小弱ニシテ微數。是ヨリ十四日マデ大抵諸症同前唯
 精力虛憊スルノニ十五日ヨリ熱ノ發作及痙攣ノ
 諸症漸ク休カレ。脉百動許乃滋養培補ノ爲ニ沙列布
 ヲ肉羹汁ニ加煮テ與ヘ草麻油ヲ持重シ用フ二十

七日ニ至テ日ニ快愈ニ向ヒ食漸ク進ニ精力復シ
熱再發セズ唯脉數ナルノ之。次テ逾、滋養ノ飲食ヲ
與フ。藥劑ハ幾那。攝^セ絲^シ施^シ那。沙^サ列^レ布^ブ。纈^セ草^ソ根^ン。民^ミ埜^デ列^レ利^リ
精^シ草^ソ麻^マ油^ユヲ用^ヒテ竟ニ瀕死危極ノ病全愈シ停藥ヲ
告^グ

神經熱、焮衝熱、合併篇第六

神經熱ニ焮衝熱ヲ合併スル症ハ其焮衝ヲ治スル
ニ各部、瀉血法吸角若ハ蟻針法ニ或、全身瀉血法澤尺
等ニ刺絡ノ瀉ヲ施シ、神經熱ヲ治スル強壯劑ニ防
血スルヲ云

焮衝藥ヲ加用ヲ防焮衝藥ヲ加ルハ強壯劑ノ是
ニ一般ノ別アリ熱性衝動ヲ抑制スルナリ一ハ全體ノ焮衝ナリ、一ハ各部ノ
焮衝ナリ

全體焮衝、合併病原

此症ハ患者神經熱ヲ發スベ
キ虚弱ノ體質ニ焮衝質若、ハ多血質ヲ兼併スルナ
リ。或云、神經熱ト焮衝病トハ病性虛實全ク相反
ス、是ヲ以テ二病合併ノ說ハ大ニ實理ニ乖ケリ。其
合併ト云ハ必ず虛焮衝虛症、焮衝ニ後ニ出ツ
非ズ。故ニ治法亦神經熱ニ從ヒ專ラ揮發強壯劑ヲ
用、ベシ別ニ焮衝ノ治法ヲ施スベカラズト此說ヲ

推究スルニ凡、全身諸器ハ人々稟賦ニ隨ヒ各強弱
 ヲ異ニス假令バ神經ハ虚弱ナレハ尿管ヲ組織セ
 ル筋纖維ハ強實ニシテ燃衝質ナルガ如シ故ニ神經
 虚弱ナルニ因テ神經熱ヲ發スレハ尿管燃衝質ナ
 ル故ニ燃衝ヲ發メ此合併病トナルナリ是ヲ以テ
 或、全軀同時ニ病邪ヲ受レハ諸器ノ病性各異ナル
 一假令バ熱病ニ於テ此器ハ運行大過ナレハ彼器
 ハ運行不及ニ係リ或、麻痺ニ罹ルガ如シ然ル所以
 ヲ研究スルニ全軀諸器ハ各他ニ交渉セザル自家
 ノ運営アル故ニ其常調ヲ變スルニ至テハ亦其自

家ノ運営ニ隨テ各自殊異ナル患狀ヲ現シ其病ヲ
 受ルモ此器ハ彼ニ比スレバ早速。彼器ハ此ニ比ス
 レハ過甚ナルヲアリ。假令バ神經熱ニ各部一處ノ
 燃衝ヲ兼ルガ如キモ神經熱ノ病性ハ運行不及ニ
 ノ燃衝ノ病性ハ運行大過ナルガ如シ。是ニ由テ神
 經熱ニモ亦刺絡ヲ要スル者アリ或、一人ノ體ニシテ
 同時ニ燃衝。壞疽。括閉筋ノ麻痺不遂。搐掣等ヲ兼發
 スル者アルヲ數々歴驗セリ○是ヲ以テ此合併病ハ
 彼此相反對スル諸症アル故ニ療法モ亦是ニ應メ
 或、清涼降鎮減損ノ方法ヲ施シ或、揮發衝動強壯ノ

劑ヲ用ルナリ凡兼併ナキ熱病ハ病性一途ニシテ諸器ノ強弱相及セル症候ナキ故ニ亦一般ノ療法ヲ以テ治ス然レニ合併病ニ於テハ全體ヲ以テ論スルヲナク各部諸器ニ就テ病性ヲ尋索スレバ其發スル所ノ症候自ラ明白ニシテ眩惑スルヲ無ルベシ○顔面盈赤壯實ナルガ如クニシテ其神經質甚ダ脆弱ナル者アリ或筋力甚ダ強健ニシテ一時程ヲ步行シ些モ疲勞セザル人天稟神經脆弱ニシテ感動甚シク居恒神思鬱憂病ニ罹リ若ハ癩癩等ノ重キ神經病ヲ患ル者アリ或平素逸居ノ勞動セズ甚ダ神思ヲ

困苦シ若ハ放肆遊蕩酒色節慎ナキ等ニテ大ニ神經質ヲ虛損シ或滋味膏粱ニ飽テ多血盈滿凝積シ血絡細管其多量ノ血ヲ攝行健輸スルニ任ズ各部位ニ壅滯シ欸衝ヲ發スル者アリ○凡神經ハ自性固有ノ一個ノ機能ヲ具ルヲ猶心藏及動脈ニ一個自性ノ機能ヲ具ルカ如シ是ニ由テ神經ノ機能ト心藏血脈ニ係ル諸筋ノ機能ト同シカラズ故ニ神經ト血脈諸筋ト一般ノ病ヲ受ルト雖モ其感動ヲ異ニシ又其連及交通スルヲモ各自分別アリ是ヲ以テ動脈病ヲ受ズノ神經獨リ病ニ罹ルヲアリ假

令ハ各部ノ神經。大ニ麻痺スト雖モ其部ノ動脈、温
 煖營養等。異狀ナク平日ノ如キ者アリ。是レ動脈ノ機
 能其病ヲ被ラザル者ナリ。○神經熱ニ焮衝ヲ合併
 スル者。兩個ノ因アリ。一ハ神經虛弱ニノ平常通泄
 スベキ血ノ閉止スルニ因ル。一ハ壯實多血ニノ神
 經熱ヲ傳染スルニ因ル。○其多血ニメ甚ク焮衝シ易
 キ人。神經熱ノ傳染毒ヲ被レバ其刺戟ニ由テ初起
 直ニ全身ニ焮衝ヲ發ス。然レ病性亡幾變ノ神經熱
 トナリ。若ハ神經熱ト焮衝病ト合併ス。或神經熱ト
 雖モ甚ク熱性ノ藥劑ヲ過用スレバ此合併病トナ

ル者了身ノ熱ヲ察ス。其熱ヲ變換スルニ由テ初起トナリ。

全體焮衝合併症候 又神經熱ニ全身焮衝ヲ合併ス

レバ尋常神經熱ニ比スレバ脈盈充メ強。然レ切按

ノ收縮ニ易シ。此脈數日暫留ス。神經熱ノ症ハ變化

ノ合併ナシト雖モ一二時斯ノ如キ脈ヲ現ス。日ア

リ。故ニ此脈暫留スルニ非レバ焮衝合併ノ病トセ

不又脈ト諸症ト共ニ増進ス。即脈勢逾盈強ナルニ

隨ヒ熱勢逾増加シ。呼吸不利短促。謔妄其他頭腦ノ

諸症逾劇盛ナリ。是ニ及メ兼併ナキ純粹ノ神經熱

ハ脈勢盈充スルニ隨ヒ熱勢呼吸不利謔妄等逾減

除シ。脈勢虛耗ノ小弱ナルニ隨ヒ右ノ諸症逾増劇

ス。就中脉ト呼吸ト相反スルカ若ハ相應スルカヲ
 察スベシ是ハ神經熱ニ焮衝ヲ兼ル_レト逾_ク多ケレバ
 脉疾數ナルニ隨テ呼吸逾_ク短促ス其焮衝ヲ兼ル_レト
 逾_ク少ケレバ脉疾數ナルニ隨ヒ呼吸逾_ク短促セズ或
 遲緩ニ_レノ大息スル者アリ神經熱ハ脉逾_ク疾數ナルニ隨ヒ血ノ動脈ニ運行スル_レト
スル_レト逾_ク些少ニ_レ遲緩ナリ故ニ血ノ肺ニ運行ス
ル_レト遲緩ニ_レ呼吸亦短促セズ此說後ノ各部虛症
 出_ル參考スベシ餘ニ又尋常神經熱ニ比スレバ必ズ渴
 甚_クシ總テ熱性衝動ノ劑ヲ與_レレバ諸症増劇シ殊ニ
 呼吸短促譫妄甚_クシ又止ニ說所ノ病前ノ諸因ト患
 者ノ體稟トヲ察メ病性ヲ鑒識スル_レト肝要ナリ○

神經熱ノ諸症ハ殊ニ轉變シ易キ故ニ審診細察ノ
 能_ク其本然ノ病性ヲ認メ得ベシタトハ假令_ハ始テ其脉ヲ
 診_フニ頗ル強實ニ_レ焮衝病ノ如キモ一時許_リ經
 テ再_テ診ヘバ甚ダ小弱ナル者アルガ如シ真ノ焮衝
 ヲ兼併セル症ハ強實ノ脉狀時日ヲ經_レレバ變スル
 トナシ故ニ再三診察セザレバ病性ヲ決定シ難シ
 全體焮衝合併治法 此症ハ瀉血法及防焮衝劑ヲ
 施_メノ脉管質ノ焮衝ヲ減除シ且微衝動ノ効アル強
 壯劑ヲ兼用_シノ神經質ノ虛憊ヲ資補スベシ
 刺絡 右ノ症候ヲ考索_シノ全身焮衝合併ノ症タル

「ヲ診シ得バ慎重ノ先試ニ刺絡ノ四弓許ノ血ヲ
瀉シ。患者輕快ヲ覺エ。脉較著ニ沈小トナラズ。瀉血中
數トナルヲ診シ脉力沈弱細小ニ疾疾其瀉出ノ血稠
厚ニ速ニ凝結シ。若ハ血ノ外面薄膜ヲ被フハ必
焮衝ノ徵トス。是ニ及ノ瀉血後諸症増進シ。脉力沈
垂スルハ假ニ焮衝ノ諸症ヲ現ス者ニ真ノ焮衝
合併病ニ非ズト知レベシ。○刺絡ハ壯實多血ノ焮衝
ニハ甚緊要ナレ。凡間其外候ニ眩惑ノ神經虛憊ノ
本病ヲ省察セズ大害ヲ致ス。アル故ニ仔細ニ戒
慎ノ必多量ノ瀉血ヲ禁スベシ。疑似不決ノ症ハ刺

絡セザルヲ害鮮シトス。是ニ代ニ吸角若ハ蟬針法
ヲ以テ瀉血スルヲ切實トス。殊ニ吸角ハ細絡ノ血
ヲ吸泄スル故ニ刺絡ノ大血脉ノ瀉血ニ比スレバ
心藏及神經ノ機力ヲ減損スルヲ鮮シ。○痔血壅滯
等ヨリ發スル症ハ其部ニ蟬針法ヲ施メ尤効アリ
○神經熱ノ初發焮衝ノ諸症甚キ者ハ刺絡ノ間速
効ヲ得ル。アレ凡患者精力未ダ甚ダ虛憊セズ且
多血ニノ瘀血。腦肺ノ如キ要地ニ壅積ノ焮衝ヲ萌
發シ刺絡ニ非レバ速ニ救ベキ術ナキ者ニ是ヲ施
スベシ。故ニ脉強實。顔面盈赤等。一二多血ノ症ヲ見

スト雖モ遽ニ實症トシ妄ニ刺絡スルヲ勿レ斯ノ如キ症ハ大抵角法蟻針法ヲ施メ良効アリ

防焮衝劑 此劑ハ即チ焮衝ヲ防制スル中和鹽植酸

其藥品前ノ胃腸熱合併篇及少量ノ韃爾答越默室

第四瀉劑用法ノ註ニ出ツ等ヲ熱性ナラザル

安質沒扭酒ヲ用フ解凝ノ効ヲ以テ壯神藥ニ加用フ假令ハ纈草根遠志槲寄生等ノ泡

劑亞鉛華氏埤列利精ノ如シ又白芥子ヲ脚湯ニ加

施シ芥子泥ヲ貼ス○焮衝漸減スルニ隨ヒ強壯劑

ニ轉シ殊ニ幾那等ノ保固強壯藥ヲ用ベシ然レモ葡

萄酒其他熱性衝動ノ壯神藥ハ必害アリ唯瀉劑刺

絡等ヲ過用ノ精力大ニ脱缺セル症ニ用ベシ此

病初起焮衝ノ諸症ヲ見スニ因テ涼解攻瀉ノ劑ヲ

過用シ患者卒ニ虛憊スルヲアル故ニ預是ヲ省察

スルヲ肝要ナリ近來流行セル神經熱ノ病性多ク

焮衝ヲ兼ル故ニ防焮衝法尤モ効アレモ毎常必適應

スルニ非ズ宜ク神經虛憊ニ注意ノ本病ノ治法ヲ

遺忘スルヲ勿ルベシ焮衝性ノ病ト雖モ固ヨリ純

一ノ焮衝ニ非ズノ神經熱ノ兼症タル故ニ是ヲ過

用スレバ腦及神經質麻痺シ若ハ腐敗熱トナリ遂

ニ強壯劑的當ノ症トナリ易シ或素ヨリ焮衝性ノ

病モ極テ惡厲ニシテ諸症劇盛ナレバ腐敗熱ヲ兼ル
 故ニ終ニ壯神衝動ノ峻劑ヲ與ベキ症トナル。然レバ
 防焮衝法ヲ過用セズ殊ニ刺絡ヲ戒慎シ是ニ代ヘテ
 加羅^カ兒^ロヲ用テ焮衝ノ凝血ヲ疏散スルヲ尤モ佳ト
 ス。○凡、神經熱ニ焮衝ヲ兼ル症ハ元來神經其病毒
 ト抗抵ノ罷弊シ發スル故ニ防焮衝劑モ專ラ焮衝
 熱ヲ療スル如キ峻劑ヲ用テ勿レ唯其毒ノ神經質
 ニ著^{ツク}ラ^ホ脉管質ヨリ居多^{ホキ}ヲ標準トシ療スベシ。○凡、
 疫毒ハ皮表ニ蒸散スルヲ最良トス故ニ饒多ニ蒸
 氣ヲ宣發スルハ防焮衝法ノ一大要トス。初發熱
 性ノ發

汗劑ヲ用テ發汗スルヲ謂フニ非ズ唯病中始終是ニ
 清解ノ蒸發劑ヲ用テ蒸氣ヲ宣發スルナリ。是ニ
 因テ其全身ニ彌漫ノ刺戟スル病毒並ニ外襲ノ傳
 洩氣ヲ蒸發驅散シ且、病毒ノ刺戟ヨリ生スル痙攣
 ノ運動ヲ減除シ腐敗液ノ鬱聚スルヲ排泄ス。又專
 防焮衝劑ヲ施セバ脉管ノ充張力ヲ減損スルヲ已
 甚^シキ故ニ每ニ防焮衝劑ニ蒸發劑^{蒸氣發}ヲ加^ノ用テ
 偉効アリ。其劑ハ即、硃砂^シ民^ミ埵^ト列^レ利^リ精^シ安^シ質^シ沒^シ扭^シ劑^シ
 及^レ扭^シ酒^シ鞣^シ爾^シ答^シ植^シ酸^シ類^シ枸^シ櫟^シ汁^シ橙^シノ如^シ但^シ強^シ壯^シ劑^シヲ
 越^シ默^シ蜜^シ等^シヲ云^シ。用ル症ハ焮衝ノ増發ヲ恐ルト雖モ消石ヲ加テ勿
 レ。○然レハ發汗過多ナレバ病性ヲノ大ニ惡性ナラ

シム。唯腠理融和宣通ノ人目ノ見ルベカラザル蒸
氣ノ發越スルハ即、皮腠ノ常調ヲ得ル所ニシテ甚カ
利益アリ。故ニ肌膚温潤和柔ニシテ宛モ天鵝絨ニ觸
ル如クナルハ能、病毒分利ノ排泄スト知レベシ蒸氣
過泄ノ發汗淋漓シ或、常ニ自汗漏泄ノ止ザルガ如
キハ大ニ元運力ヲ耗損ノ傳染毒ヲ増息シ。其害宛
皮膚燥硬ニシテ乾革ノ如キ者ト同一一般ナリト知ル
ベシ。發汗過多ナレバ血中ノ稀液亡脱シ血液稠厚
ヨリ排泄スル熱勢轉増シ且、元運力虚脱ノ疫毒ヲ蒸氣
ト同シ故、初起發汗劑ヲ與、皮膚閉塞ノ乾燥スル症
病ト同シ。斷云、往古醫學未、詳明ナラザル時ハ醫家熱
病ノ初發必ズ發汗劑ヲ與、邪毒ヲ驅散セシトス。今

時モ仍舊套ニ執迷セル者アリ是、大ニ錯誤トス。凡
熱病ノ機カニ因テ其毒已ニ化熱スルニ至レバ自然良
能ノ者アレ固ヨリ初起發汗ノ解スベキ輕淺ノ病
ニ非ズ。初發ハ病毒未ダ化熱セザルノ故ニ發汗ニ因
テ徒ニ津潤滋養ノ稀液ヲ七脱スルノ故ニ發汗ニ其毒
毫モ排泄シ除セズ。病血質轉稠厚トナリ脈管滯塞ノ病
勢増進シ爾後病毒化熱スルニ至リ脈管滯塞ノ病
スル故ニ其毒ヲ烹熟シ包攝誘導ノ至レ津液乾燥ノ病
ク且、病性甚タ惡厲ナラザル者モ皆是ガ爲ニ救ハレ
ザルニ至ル。然レニ醫家仍、以爲初起發汗スレハ病性
固ヨリ惡厲ニシテ醫家仍、以爲初起發汗スレハ病性
ニ非ズ。唯初起發汗ノ過ヨリ治スベキ者ハ冒寒傷冷皮
膚乾燥ハ即、腠理ノ閉塞ナル故ニ内熱ヲ増發シ。病
毒内鬱ノ神經感動ノ諸症ヲ誘起シ血ヲ腦肺等ニ
衝逆ス。○病室ノ熱蒸氣ヲ排散ノ清涼ニ保護スレ

ハ蒸氣ヲ開達スル最良法ニシテ能ク皮膚焮衝ノ刺戟
 ヲ消散ノ蒸發ノ機力ヲ獎起ス○脈軟弱沈細皮膚
 黧澹微冷ニシテ神經ノ諸症逾増長スルハ是ヲ元
 運力ノ沈垂ヲ提揚シ神經ノ罷弱ヲ資輔スベキ症
 トス防焮衝法固ヨリ害アリ○凡シ虛憊ノ症ハ神經
 質甚ダ沈垂スル故ニ適宜ノ時節ニ壯神衝動劑ヲ
 用テ良功アレバ疫熱ハ其藥力ニテ脈管質ヲ挑撥
 衝動シ焮衝ヲ増發スル故ニ預メ其藥性ノ強弱及
 服量ヲ考定ノ其宜ニ適セシメ又其血質ヲ熱沸ス
 ル一甚シカラザルガ爲ニ清涼劑即防焮衝劑ヲ加テ脈

管ノ充張力ヲ減損シ其熱ヲ抑制スベシ假令ハ龍
 腦ニ消石ヲ加與ルカ如シ是ニ由テ壯神衝動劑ノ
 瞑眩ナシ○神經虛憊甚ク若ハ腐敗ノ症ヲ見ス片
 ハ純補活揚ノ峻劑ニ揮發性ノ蒸發劑前ツヲ兼用
 ノ的當ス然レバ幾那ハ收固性ニシテ揮發性ニ非ル故
 ニ流行神經熱ノ疫毒ヲ揮發蒸散スル時節病毒漸
ク化熱
ノ小便及蒸氣ヨリ
發散スル時節ヲ云ニ是ヲ用レバ其排泄ヲ妨ク病
 毒大抵分排ノ後專ラ虛憊ヲ挽回スベキ症ハ是ヲ
 用テ的當ス但シ亞兒尼加根ニ幾那ヲ加用レバ能ク揮
 發シ且保固強壯スル効アリ

各部焮衝合併病原

神經熱ニ各部一處ノ焮衝ヲ發スル者ハ全身焮衝合併ニ比スレバ甚ダ多シ凡肢體外部ニ於テ焮熱腫痛ヲ發スレバ則一看ノ直ニ焮衝タルヲ知ト雖モ内部ニ是ヲ發スレバ能其徵候ヲ細察スルニ非レバ辨知シ難シ。假令バ肺焮衝ノ如キハ纔ニ呼氣ノ熱スルヲ驗スルノニ疼痛アルモ亦焮衝ノ候トシ難シ。焮衝ニ非ズト雖モ疼痛ヲ發シ又腦肺及腹内諸藏ニ於テ些モ疼痛ナクノ大ニ焮衝ヲ發スル者アレバナリ。故ニ先其病因ト症狀ヲ參診メ察スベシ

○内部各處ノ焮衝ニ三種ノ別アリ其一ハ實症。其二ハ虛症。其三ハ假症ナリ。此三種ニ因テ病性ヲ區別シ治法ヲ考定ス其虛實ノ二症ハ病因全相反ス。實症ハ血脉ノ機力大過強盛ヨリ發シ。虛症ハ血脉ノ機力虧損虛乏ヨリ發ス然レ血液其部ニ堆積ノ焮熱腫痛シ以テ焮衝ヲ發スルニ至テハ一ナリ。故ニ症候ニ於テハ異ナルヲナシ。然レハ先ニ症狀ニ就テ焮衝ヲ察シ。病因ト比較ノ其虛實ヲ鑒識スルヲ要務トス

各部實症焮衝病原

各部實症焮衝ハ患者ノ體稟

焮衝質アルニ因リ。或、病毒アリテ患部ヲ刺戟スル
 ニ因ル。但、病毒直ニ其部ニ在テ刺戟スル症アリ。或、
 他部ノ毒。患部ニ連及ノ刺戟シ。焮衝ヲ發スル症ア
 リ。○全身焮衝質ニ非ズト雖モ一部ヲ刺戟スル毒
 アレバ能、一部ノ焮衝ヲ發ス。故ニ全身ノ神經質。虚
 衰セル者ト雖モ亦能、實症ノ焮衝ヲ發ス。又各部資
 稟ノ元運力ニ強弱アリ。其感動ニモ多少アルニ因
 テ其部ノ焮衝モ亦虚實アリ。○神經熱ニ葡萄酒若
 ハ熱性ノ飲液ヲ過用ノ各部ノ焮衝ヲ發シ。或、時令
 ノ寒氣ヲ肺ニ感ノ肺焮衝ヲ發シ。或、平常通泄スル

血ノ閉滯若ハ時、刺絡スル入其期ヲ怠リ。或、嘗テ
 屢、焮衝様ノ症ヲ患ヘ。毎、^{イ、モ}次刺絡ノ治スルガ如キ人
 ニ發スルハ皆實症、焮衝タルヲ知ルニ足ル是、患者
 ノ體稟ニ就テ病原ヲ考索スル者ナリ

各部實症焮衝症治

各部實症、焮衝合併ノ候ハ内

部各處ニ於テ焮衝ノ諸症 腦焮衝ハ頭痛譫妄劇ク、
肺焮衝ハ欬嗽呼吸不利、
促迫、胸脇焮衝ハ胸肋刺痛ノ欬スル等、
他諸藏ノ焮衝、各焮熱疼痛ヲ發ノ其器ノ官能ヲ失フ症アリ
 焮熱疼痛等ノ瘀血湊積ノ候ヲ見、^シ以上各部其熱
 全身ニ増發シ殊ニ患部ニ甚シノ血湊積、
 額熱シ、眼焮赤、頭及頸ノ動脈搏動甚ク、又右ノ諸症ニ

副、テ更ニ一種ノ強脈ヲ見、スナリ然レモ皆必シモ盈實ナルニ非ズニ係ル症尚疑似不決ノ症ハ葡萄酒其他揮發強壯劑ヲ與、レバ病勢忽増長シ殊ニ頭腦ノ諸症劇發ス。是皆多血焮衝ノ候ナリ○治法ハ防焮衝劑及瀉血法ヲ施、ノ其血ノ堆積凝聚セルヲ疏散シ脈管過盛ノ運動ヲ減損スベシ。其標的ハ鍼針法若ハ吸角ヲ患部ニ施シ。凝血ヲ瀉スレバ全身ノ精力虛耗セズノ最良トス。或瀉血法モ施シ難キ者ハ加羅蔑兒カローノルヲ與、ベシ能、焮衝ノ凝血ヲ疏解スル衝動藥トス○又發泡膏及芥子泥ヲ貼、ノ患部ノ刺戟毒

ヲ他部ニ迎導、ノ甚、驗アリ○然レモ此熱病ハ強壯劑ヲ兼用、ノ虛憊セル神經質ヲ資輔スベシ但、血ノ運行ヲ増進セズ。熱性ナラザル藥ヲ佳トス即、纈草根。亞兒尼加花。遠志等ニ硝砂少許ヲ加兼用スベシ○神經熱ニ焮衝熱若ハ胃腸熱ヲ兼併セル者ニ妄ニ揮發衝動劑及阿芙蓉ヲ與、テ腐敗熱トナル者多シ。故ニ先哲。神經熱ノ焮衝合併ノ症ニ熱劑ヲ與、テ害アルヲヲ歷驗シ防焮衝法及瀉血法ノ効アルヲ講明セリ○胃腸熱。病毒ノ刺戟。腦及胸部ノ諸器ニ連及、ノ腦焮衝。肺焮衝。胸脇焮衝ノ諸症ヲ見、ス者

多シ。此症ハ吐下劑ヲ的當トス。草醫動輒ヤモスバ此症ノ
謔妄及胸脇痛ニ刺絡ノ危篤ニ至ル者少カラズ

肺焮衝 實症ノ焮衝ハ胸及頭ニ發スルヲ最多シ。

肺焮衝ハ輕蔑スベカラズ更ニ戒慎ヲ加ベシ。殊ニ
以前是ヲ患ル者或既ニ勞效ノ候アルガ如キハ最

危險トス。速ニ肺瘍勞瘵トナレバナリ。○總テ内部

焮衝ハ脉ヲ以テ診決シ難シ。肺及胃腸ノ如キ神經

多キ部ノ焮衝ハ脉沈小ニ搏度齊ハズ。大ニ虛脫

セル者ノ如シ尋常焮衝ハ脉強是眞ノ虛脫ニ非ズ肺

焮衝ハ全身運行ノ血。肺ニ於テ阻遏シ壅滯ノ動脈

ニ充灌セザレバナリ腸及腹内諸藏ノ焮衝ハ其神

經痙攣ノ運動ヲ發スル故ニ動脈管亦攣急ノ其血

管中ニ循行シ難キニ因ル故ニ謔妄ノ如キ腦焮衝

ノ症モ脉ニテ決シ難シ。○神經熱ニ肺焮衝様ノ症

ヲ兼ル者ハ初發是ヲ虛症ノ焮衝トシ揮發衝動劑

鎮痙劑ヲ用テ假症ノ焮衝共ニ後ニ出ツノ如クシ。畢竟是

ヲ神經熱ノ傍症トシ療スルヲ切實トス。是ニ由テ

逾險重トナル片ハ始テ實症焮衝トシ療スベシ。○

肺焮衝ハ蟻針法ヲ胸ニ施シ血ヲ瀉ノ偉効アリ。曾

テ神經熱ニ肺焮衝ヲ兼テ既ニ危篤ニ至ル症二人

ヲ診ス。俱ニ腕ニ刺絡ノ大効ヲ得タリ。就中一人ハ
 醫家專ラ神經熱ニ注意ノ焮衝ヲ顧ミズ。多ク揮發
 衝動劑ヲ連進ノ焮衝日増劇ス。予是ヲ診フニ脉強
 盈ニシテ尚一回ノ刺絡ニ堪ベキ症ナリ。因テ刺絡ス
 レバ患者既ニ呼吸不利八日ニ至ル者。忽快利寛解
 セリ。是ニ於テ遠志纈草根等ヲ與テ終ニ全功ヲ收
 ム斯ノ如キ症ハ刺絡後胸ノ患苦ヲ覺ル部ニ發泡
 膏ヲ貼シ且碯砂羯布羅膏名碯砂揮發膏ニ羯布及
 舍電阿芙蓉液ヲ擦ノ捷効アリ。○瘵瘵様ノ喘息呼
 吸不利短息甚キ症ハ接骨木花ヒ非阿斯失亞密失鳩シキツ

答等ヲ乳汁ニ加煮テ緩和蒸湯劑トシ胸部ニ施シ。
 又接骨木花ヲ沸湯ニ浸シ醋少許加テ其蒸氣ヲ嗅
 引シ。遠志纈草根アルニカ亞兒尼加ニカ金硫黃ミンデレリ民埜列利精等ヲ
 内服セシムベシ

腦焮衝

凡熱病ニ譫語狂妄等。腦ノ諸症ヲ發スル
 者刺絡ノ間効アルハ是實症ノ腦焮衝ナリ。然レ其
 劇キ譫妄連綿ノ歇ヤザル症ノ屍ヲ剖觀スルニ腦及
 脊髓ニ毫モ焮衝ノ徵ナキ者多シ。又險重ノ頭創ニ
 精神錯亂譫語等ノ腦焮衝ノ症ヲ發セル者ノ屍ヲ
 剖觀スルニ腦ニ毫モ焮衝ノ候ナキ者アリ。○胃腸

ノ病毒汚物。延テ頭腦ヲ刺戟シ。腦焮衝ノ症ヲ發スル者アリ。此症、胃腸ヲ淨掃スルニ非レバ治セズ。故ニ神經熱中一部ノ焮衝ヲ發スル毎ニ胃腸病毒ノ有無ヲ察スルヲ肝要トス。右ノ症ハ吐劑下劑。吉利詞^{キリス}參^ラ兒^ル等其症ニ隨ヒ施メ治スベシ。又先哲ノ經驗說ヲ考ルニ熱病ノ譫妄ヲ兼ル症ニ刺絡ノ譫妄^ヲ增劇シ或刺絡後直ニ劇キ譫語ヲ發スル者アリ。是ニ吐劑若ハ下劑ヲ與テ譫妄^ヲ忽^テ休^ムニ諸症解散スル者少^クカラズ是胃腸毒ノ刺戟腦ニ連及スル症ニノ腦焮衝ニ非ズ即^チ胃腸熱ノ病毒壅鬱ノ症ナリ。然^レハ神

經熱ノ譫妄ハ腐敗毒。胃腸熱。膽液熱ヨリ來^ル症多ク或^チ神經熱ノ一傍症トシ。妄^リニ刺絡ノ危險ヲ致^スナク先^ニ假焮衝トシ療スルヲ切實トス。○實症ノ腦焮衝ハ胸焮衝ニ比スレバ少^クシ且^ニ神經熱ニ於テハ腦焮衝ノ如キ劇キ譫妄狂躁ヲ發スル者モ多^クハ實症ニ非ズノ大抵腦ノ痙攣ヨリ起ル所ノ假症、焮衝ナリ。○然^レハ神經熱ニ於テ實症ノ腦焮衝絶^テナキニ非ズ。其候譫妄劇盛ニノ動輒^ヤハ狂躁シ譫語ト嗜眠ト更替^カ發止シ或^チ時々昏睡シ或^チ自^ラ手ヲ以テ頭ヲ打^チ額熱シ顔面憤盈焮赤或^チ膨腫シ眼中焮熱ノ赤絡ヲ

見、シ眼光慌暴異常。頭及、頭ノ動脈浮起ノ劇ク暴動
 ス又葡萄酒。龍腦。阿芙蓉等ノ揮發衝動藥ヲ與、レバ
 譫妄較著ニ増劇ス。○實症、腦焮衝兼併ノ治法ハ顛
 顛耳後項窩等ニ蟻針法ハ口若、ハ十口許モ施シ或
 同數、吸角ヲ施メ瀉血シ次ニ頭髮ヲ剃、全頭ニ冰冷
 湯法水ヲ囊ニ盛リ貼スヲ施シ項窩ニ大ナル發泡膏ヲ貼シ。
 腓ニ芥子泥ヲ貼シ。又刺戟性ノ藥ヲ吉利詞キリス爹兒テールト
 シ施、ヘシ内服劑ハ甚ダ熱性ナラザル壯神劑。鎮痙
 劑ヲ用、ベシ是ニ因テ其症仍休ホザル片ハ頭上ニ大
 ナル發泡膏ヲ貼シ釀膿セシムベシ。○此焮衝動ヤモシ輒

ハ變メ壞疽トナリ或、患部罷弊ノ虛症トナル故ニ
 初發ハ防焮衝法。効アレ、既ニ時日ヲ經、片ハ害ア
 リ。總テ神經熱ノ方法ヲ施シ且、阿芙蓉劑ヲ與、テ尤
 効アリ或云此症水銀劑奇効アリ。○實症、焮衝ハ初、防焮衝法ヲ
 施メ効アル症モ其後復、諸症増劇メ荏苒タル者ア
 リ。是、必、實症變メ虛症トナル者ナリ能、是ヲ察メ速
 ニ防焮衝法ヲ轉メ峻性ノ揮發強壯劑ヲ用、且、龍腦
 ヲ用、テ大効アリ。蓋、龍腦ノ防焮衝ニ峻効ヲ稱スル
 所以ハ唯虛症ノ焮衝ヲ治スルノミ。實症ノ焮衝ニ
 ハ固ホヨリ効ナシ。故ニ實症變メ虛症トナル者或、刺

絡過度ニテ虚症トナル者ニ峻効アリ○腦焮衝肺
 焮衝等ノ實症ニメ吸角。蟻針法ニテ瀉血シ其後變
 ノ虚症トナル者ハ阿芙蓉。麝香。等亦大効アリ故ニ
 未瀉血セズメ阿芙蓉。麝香類ヲ用ルト既ニ瀉血メ
 是ヲ用ザルト其害宛モ同一ナリト知ベシ唯患部
 ノ運營罷弱ナルニ因テ焮衝留連淹滯ノ解散スル
 一能ハザル症ニ阿芙蓉。麝香類ヲ用テ速ニ其壅滯
 ヲ解散シ治スルニ闕ベカラザル要藥トス

各部虚症焮衝病原

虚症ノ焮衝ハ素ヨリ虚症者
 アリ或實症變ノ虚症トナル者アリ○素ヨリ虚症

ノ者ハ熱病ニ因テ全身虚憊セルヨリ發ス。此症殊
 ニ神經熱腐敗熱ニ多シ。或各部一處大ニ虚憊ノ發
 スル者アリ○其實症變ノ虚症トナル者ハ初實症
 焮衝ノ刺戟ニ因テ患部ノ元運力大ニ罷弊シ遂ニ
 全ク虚症トナリ或初焮衝ノ刺戟劇盛ナルヲ速ニ
 防制セズメ縱ニ增長セシムルニ因リ或攻瀉ノ方
 法ヲ過用スルニ因リ或元來其部ノ元運力甚壯實
 ナラザル等ニテ精力速ニ虚憊メ患部ノ血脉ニ凝
 聚セル血液ヲ疏解驅散スル一能ザルニ因ル或實
 症ノ焮衝暫時誓留シ未ダ顯著劇盛ニ至ラズメ速

虚症ニ變スル者アリ。是暫時、焮衝ノ刺戟ニテ其部
速ニ虚衰スレバナリ。故ニ虚症ノ焮衝ハ多ク實症
ヨリ變ス。是殊ニ神經熱ノ固有ノ症トス

各部虚症焮衝症候 虚症各部焮衝モ亦血ノ患部

ニ堆積ノ焮熱疼痛等ヲ發スルヲ實症、焮衝ノ如シ。
故ニ腦ニ在テハ譫妄ヲ發シ。胸ニ在テハ肺焮衝胸
脇焮衝ヲ發シ。肝脾胃腸等モ亦各自焮衝ヲ發ス。
然レハ虚焮衝ハ脉小弱ニノ收縮シ易ク。患者罷勞殊
ニ甚シ。又脉ト諸症ト相反ス。即、虚症ハ脉力漸生ノ
盈充スルニ隨ヒ諸症逾寛解ス。脉小弱ナルニ隨ヒ

諸症逾増劇ス。是脉ト諸症ト相反スル者ナリ。實症ハ脉
勢強盈ナルニ隨ヒ諸症逾増進ス。就中脉ト呼吸ト
相反ス。即、虚症ハ脉甚疾數ナレハ呼吸却テ緩徐ナ
リ。實症ハ脉駛數ナルニ隨ヒ呼吸逾短促不利ス。是
ト呼吸ト相應ス。虚症ノ脉疾數ナルハ脉管ノ機力
強盛増進メ然レニ非ズ。唯其機力ノ虚憊セル者ナリ。
又脉甚數ナルハ腐敗熱ノ一徵トシ。又瀕死ノ前兆
トシ。虚脱ノ極テ甚キ者トス。其故ハ心藏罷勞甚ニ
因テ心室能牽縮メ盡ク其血ヲ動脈ニ搾出スルコ
能ハズ。其牽縮スル毎ニ多少血必心室ニ殘留故ニ

次テ來ル血驟ク心室ニ盈滿ノ存^キニ牽縮ノ機ヲ促ス
 ナリ。然レ心藏其血ヲ一頓ニ搾出スル^レ能ハザル
 故ニ勉強テ存^キリニ數牽縮シ稍クニ驅逐メ^{ワカ}纒ニ其
 壅塞ヲ免ルナリ。然レハ其血ヲ動脈ニ驅逐スル^レ甚
 些少ナル故ニ其脉數ナルホド逾血ノ運行遲緩ナ
 リ。○焮衝ノ虛實ハ藥ヲ服ノ後發スル諸症ニ由テ
 逾著實トス。即熱性強壯劑ヲ與ルニ焮衝增長セズ
 ノ減シ。寒涼劑ヲ與ルニ其症增劇スルハ虛症トス。
 是ニ反スルハ實症トス。

各部虛症焮衝治法 虛焮衝ノ治法ハ毫モ思^ヒテ焮

衝ニ存セス通例焮衝ト言ハ唯是ヲ神經熱ノ一險
 症ニノ患部ノ虛衰極テ甚ク殆ト死壤シ壞疽トナ
 ラントスル症トシ療スベシ。是故ニ最峻性ノ揮發
 衝動劑。其他強壯劑ヲ常量ニ倍シ用テ患處ノ元力
 ヲ揮活提揚ノ其焮衝ノ壅塞ヲ疏散セシムベシ。○
 其藥ハ幾那ニ葡萄酒。龍腦。麝香。阿芙蓉。攝爾扁答亞
 兒尼加等ヲ饒多ニ加用ベシ。○凡内部ノ焮衝ハ芥
 子泥。芫菁膏ヲ貼メ峻効アリ。腹内焮衝ハ刺戟甚^シキ
 擦藥。蒸湯劑。冷湯法ヲ外敷シ。又揮發強壯劑ノ吉利
 詞^ス參兒^ルヲ施シ。且香竈強壯ノ藥ヲ蒸湯劑トシ施メ

大効アリ○右ノ如ク揮發衝動ノ峻劑ヲ施メ患部ノ元運カ回復シ。焮衝漸減除スルキハ其劑ノ量ヲ減スベシ。否ラザレバ患部ノ精力滋生スルニ隨ヒ初ニ的効アル峻劑ノ刺戟ニ過テ害アレバナリ

各部假症焮衝症治 此症ハ内部各處ノ神經大ニ病毒ノ刺戟ヲ受テ痙攣ノ運動ヲ發シ。假ニ焮衝ノ如キ諸症ヲ現スナリ。故ニ其部ノ脉管些モ焮衝ナク。血液ノ凝聚堆積ヲ爲メナシ。然ハ是焮衝ニ非ズ。痙攣ノ一症トス其症ノ相似タルヲ以テ是ヲ假焮衝ト曰フ固ヨリ内部ニ在故ニ患處焮熱腫痛等

ヲ見ス。トナシ○其症胸中ニ發スレバ劇キ胸脇痛。呼吸不利。攣急様ノ乾欬ヲ發シ。或大ニ苦悶ノ呼吸壅塞セントス是肺焮衝或胸脇焮衝ニ類似セル症腹中ニ發スレバ劇キ腹痛。一處ニ住留メ轉移セズ。且嘔吐シ或腸閉塞ス。其疼劇キ者ハ醫家誤テ胃腸肝等ノ焮衝トス頭部ニ在テハ劇キ頭痛。謔語狂妄ヲ發スル。宛モ腦焮衝ノ如シ○右諸症甚。各部焮衝ニ類スル故ニ草醫動輒バ症狀ニ炫耀メ刺絡ヲ施シ痙攣愈甚。ノ諸症危劇ニ至救レザル者アリ。故ニ先其症ニ就テ痙攣病性タルヲ診決スベシ○其候脉小ニノ攣縮

シ。搏度齊ハズ。肢節熱セズ。却テ微冷シ。冷汗膺ヲ濡
 シ。或、惡寒シ。小便清稀ニメ水ノ如ク。若ハ勞責急迫
 ノ疼アリ。患者小心危懼ノ安セズ。或、呃逆呻吟大息。
 顫振筋惕肉瞤。咽喉縮窄。等瘧瘵ノ諸症ヲ兼。就中確
 徵トスベキハ患部些^スモ焮熱セズ。血液聚滿堆積ノ
 候ナシ。假令ハ呼吸不利劇クメ肺焮衝ノ如ト雖モ
 氣息熱セザルト平人ノ如シ。是、肺焮衝ニ非ル明徵
 トス。或、譫妄狂躁スルト腦焮衝ノ如ト雖モ額冷テ
 顔面赤色ナク眼中焮熱ナシ右諸候ニテ仍^ナ診決シ
 難キ症ハ戒慎ノ熱性揮發衝動劑ヲ與テ試^ムベシ。是

ヲ與テ患者忽^チ輕快ヲ得ルハ果メ假焮衝ニ瘧
 瘵ノ運動ヨリ發スル症トス。○治法ハ唯鎮瘧劑ヲ
 與フベシ其藥ハ 阿芙蓉 非^ヒ阿斯失亞密 纈草
 麝香等ナリ。精力殊ニ虛憊セル症ハ葡萄酒^ア亞的兒
 ノ如キ揮發壯神ノ峻藥ヲ加^フベシ。又鎮瘧ノ効アル
 軟膏。蒸溺劑。殊ニ發泡膏ヲ患部ニ施^スベシ。但胸痛。腹
 痛ニハ直^チニ其部ニ施シ。劇キ譫語ハ項窩ニ施ス等
 ナリ。又鎮瘧ノ効アル藥ヲ吉利詞^キ爹兒^ス。或、浴湯トシ
 施メ良効アリ。○或、病毒直^チニ患部ニ在テ刺戟メ此
 症ヲ發スルカ或、他部ノ毒。患部ニ施及メ刺戟シ此

痙攣ノ運動ヲ發スルカヲ考索スルヲ肝要ナリ若
 其毒ノ刺戟ヲ發スル顯徴アル片ハ其毒ヲ驅除ス
 ル藥劑ヲ兼用スルニ非バ治スベカラズ假令胃ニ
 汚物アリテ刺戟シ假焮衝ヲ發スル者ハ吐劑ヲ與
 テ一吐スレバ即治ス其毒胸部心下ニ在ル片ハ吐劑
 殊ニ捷効アリ若其毒腸ニ在テ發スル者ハ吉利詞
 參兒^テヲ施シ導泄ノ治スベシ○傷冷毒ノ刺戟ニ因
 テ此假焮衝ヲ發スル者多シ此症ハ發汗劑其他傷
 冷毒ヲ排泄スル劑ヲ鎮痙劑ニ加用テ治スベシ

新訂增補和蘭藥鏡卷十終



