

新訂
增補
和蘭藥鏡

卷十



ヤ 3

968

7



968

新訂增補和蘭藥鏡標目

卷十二

幾那

神經熱流行病性各異篇第八

流行疫症治

千五百六十六年	千七百六十八年	千八百零六年	千八百零七年	千八百零八年	千八百零九年	千八百一十年	千八百一十一年	千八百一十二年	千八百一十三年
同七十年	同七十一年	同七十二年	同七十三年	同七十四年	同七十五年	同七十六年	同七十七年	同七十八年	同七十九年

清涼氣

冷濕法

增訂和蘭藥鏡

卷十二

標目

風雲堂藏

大正五年二月口日
前田 氏



神經熱治例篇第九

二則

蓬硫酒石散

蓬黃纈草飲

雙聖湧吐飲

壯運纈草飲

纈草吉利詞參兒

壯神纈攝飲

幾攝壯神飲

龍腦爽神散

芙蓉催睡飲

爽涼大麥飲

鎮痙誘吐散

鎮痙加纈煎

爽神鎮痙飲

防腐蒸溺方

卷十二壯神丁幾劑

鎮痙排毒散

新訂增補和蘭藥鏡卷十二

藤齋先生譯述

男

宇田川

榕

榕菴校補

幾那 七

神經熱。流行病性各異篇第八

神經熱ハ沿門闔戸一般感染スル疫熱ナレ流行
スル毎ニ病性一樣ナラズ或焮衝熱。胃腸熱。腐敗熱。
惡性發斑熱。等合併ノ症多キ故ニ歷世先哲ノ諸說
亦異同アリ。今其經驗說ニ據テ古今流行疫ノ首症
ヲ歷舉シ。當年ノ病性ニ隨ヒ寒熱補瀉各異ノ療法

ヲ施メ的効アル說ヲ左ニ略引ス

○和蘭紀元千五百六十六年本朝永祿九年饑饉徭役連年

休ズ衆人困厄勞碌饑飽節ナクノ一種ノ疫即神流

行シ皆腐敗性ノ發斑熱ニ血液溶崩ノ漏汗ヲ兼

初發惡寒戰慄シ次テ壯熱焚ガ如ク或腹痛ヲ發シ

精力速_ニ虛脱シ是惡性熱ノ候多頭腦ノ諸症ヲ發シ殊頭痛

劇ク精神昏憤譫語或黙々嗜眠或狂躁ノ終ニ昏睡シ

顔面黧澹陷削舌燥黑連絲不寐聲音振搖或下利腐

敗性ノ咽喉腫ヲ發シ或種々發斑大小形色一様ナ

ラス全身ニ彌蔓スレテ諸症寛解セズ或肢節瘡瘡

力發ス或膽液質ノ下利ヲ發メ病毒分利シ或耳腺

腫起メ聾シ終ニ膿潰シ治ル者アリ○千六百八十

八年本朝元祿元年亦同様ノ疫熱流行シ其首症大抵前說

ノ如ク初起ヨリ精力甚疲勞シ烈キ頭痛頭眩眩冒

次テ精神錯狂譫語昏睡或發斑ス草醫動輒ハ發汗

劑及熱性揮發衝動劑ヲ投メ大害ヲ致シ死ル者多

治法右兩回ノ熱病大抵清涼酸收劑醋接骨木傑列

乙名等ヲ用或消石精若ハ硫黃精ヲ水ニ滴シ酸美

ト爲用或蜚蝨石ニ消石龍腦ヲ研和シ用テ皆良驗

ヲ得リ多血焮衝症ハ初發刺絡メ大効ヲ得者アリ

○千六百年本朝慶長五年以來。崩汗疫屢流行ス。病性極テ惡厲ニ初起ヨリ汗大漏泄シ劇症ハ兩三日ニ斃ル治法專壯神強壯ノ峻劑ヲ饒多ニ用テ其暴脱ヲ防護シ救活セリ。然レ此症死スル者甚ダ居多
 ○千七百四十年以後十年間本朝元文五年ヨリ寬延三年ニ至一種天行疫流行ス。大抵前説症ノ如ク千五百六十年千六百八十八年患者精力大ニ虚脱シ殊手臂振搖ス。初起惡心ヲ發シ精神甚々沈重ノ時昏憤シ。譫語狂躁或筋惕抽掣多發斑ス。脉數ニ搏度齊ハズ。然レ此細弱ナラズ。皮膚口舌燥キ病勢增長スレバ熱劇盛ニ溶崩ノ下利

ヲ發シ終脉細弱沈微ニ多ハ第七日ヨリ第十四日中ニ斃ル治法先病室ヲ清掃メ鬱蒸セル傳染不潔ノ惡氣ヲ除。初發吐劑ヲ與テ鬱蓄セル腐敗毒ヲ滌刷ノ皆大功アリ。是ニ由テ病勢過半潰散セリ。或再吐ヲ要スル症アリ肺嗽衝ヲ兼者ハ刺絡ノ効アリ頭痛烈ク譫語甚キ症ハ蟻針法ヲ顯顯ニ施メ瀉血ス。但脉力沈垂虚弱ナル者ハ瀉血法大害アリ内服劑ハ蝟蝟石。消石ニ龍腦少許ヲ加散劑トシ用。脉及精力虚憊沈垂スルニ隨ヒ的テ里リ亞ア加カ及鹿角鹽精ヲ保護強壯シ昆コ荅タ刺ラ越エ爾ル發ハ攝セ爾ル扁ヘ荅ト幾那葡萄酒精蒸氣ヲ發ス

等ヲ用_レ發泡膏ヲ貼_メ皆良驗アリ或右ノ如キ熱性
 衝動劑。葡萄酒等ヲ誤用シ或刺絡ノ謔妄ヲ發シ若
 ハ増劇セル者アリ○又一種疫熱流行ス。大抵前症
 ト同_ク患者大ニ虛憊シ神思昏憤頭痛ナキ者アレ
 昏憤ナキ者ナ
 シ多_クハ初發ヨリ精神錯亂謔妄狂躁シ呼吸不利促
 迫煩悶。壯熱燠ガ如ク。舌燥キ頸及腋下疫腫ヲ生ス。
 其毒烈キ症ハ病勢速ニ増劇シ或第三日ニメ死ス
 ル者アリ治法此流行疫。諸藥効ナク唯吐劑ニテ救
 活セリ。即韃爾答越タタル默窒チ三ハ多ク水ヲ加テ溶シ
 一二匙宛與テ吐スルニ至ル。是ヲ此病ノ奇藥ノ如

シ用_テ死スル者鮮シ。是ニ由テ皆吐劑或症ニ隨ヒ
 下劑ヲ與_テ胃腸ヲ淨掃シ次ニ酸收劑及ミシ民堙レ列利
 精ヲ用_レ又龍腦ヲ與_テ尤効アリ但刺絡セズメ發泡
 膏ヲ貼ス終ニ幾那攝爾扁答等ヲ與_テ全功ヲ收ム
 ○千七百七十年。同七十一年。本朝明和七
 年同八年惡厲ノ發
 斑熱流行ス。其首症。發斑謔語。昏睡シ血液溶崩ノ脫
 泄漏汗大小ヲ兼又治法初發吐劑及緩下劑ヲ用_テ
 便失禁等植酸礦
 酸前出ヲ用_テ其熱ヲ治
 病毒ヲ清掃シ。次ニ酸收劑植酸礦
 酸前出ヲ用_テ其熱ヲ治
 シ。其危險ニメ精力虛脫ノ症ハ幾那劑ヲ與_テ効ヲ
 得タリ。但刺絡ハ皆害アリ按此病腐敗
 熱ニ屬ス

○千七百八十二年本朝天流行熱疫毒暴烈ニメ舉國速ニ傳染ス。初起傷冷毒ノ諸症ヲ兼子其毒深ク内藏ニ侵入シ患者速ニ虚脱シ。熱勢劇盛ニメ或、焮衝熱ヲ兼子或、嗽呼吸不利甚、ノ肺焮衝ヲ兼子或、神經感觸ノ諸症甚ク。或、胃腸熱ヲ兼併セリ。治法揮發壯神劑ヲ標準トシ防焮衝劑清涼方ヲ兼用シ。焮衝甚キ者ハ瀉血法ヲ施シ或、下劑ヲ兼用メ皆良驗ヲ得リ。

○千八百年ヨリ同四年本朝寛政十二年ヨリ文化元年ニ至ルマデ赤斑熱流行ス甚ク惡性ニメ一般傳染シ皆頭腦及神經ニ侵襲スルト甚ク劇症ヲ發ス。治法大抵揮發衝

動強壯ノ峻劑ヲ施メ多ク救活セリ。

○千八百三年本朝享和三年一種ノ疫熱流行ス其症初發惡寒發熱頭痛烈ク視聽ノ感觸已甚ハナクシモ晴明物響ニ堪ス小便稠濁下利ヲ兼子肢節顫振筋惕攣動謔妄或、嘔吐呃逆ヲ發シ。遂ニ血液溶崩メ自汗淋漓或、大便血ヲ交テ黑色或、衄血ヲ發シ舌燥黑ニメ中央微赤。兩邊殊ニ燥硬。又精神昏憤全觸知ヲ失ヒ脉細數煩躁。痙攣運動。風氣腹滿或、壞疽ヲ生シ或、小便卒ニ清澄ニメ水ノ如ク是ヲ死兆トス大抵第五日ヨリ第十一日中ニ死ス右ノ諸症ヲ考究スルニ一ハ病毒頭腦

及神經ヲ侵襲ノ發ス。即神經熱ナリ。一ハ病毒。尿管
 質ヲ侵襲ノ發ス。即腐敗熱ナリ。治法其多ク神經熱
 ニ係ル症ハ頭項ニ角法ヲ施シ。芥子泥ヲ蹠ニ貼シ。
 礦酸綠礬精。硫磺精等的里亞加精ヲ與レバ大抵其增長ヲ
 遏止ス。病勢增長スルハ龍腦麝香ヲ用。且龍腦醋
 水冷湯法ヲ以テ全身ヲ打湯メ効アリ。但酸醋發
 泡膏。阿芙蓉ハ此病ニ應セズ皆害アリ。病勢漸衰ハ
 唯神經感動ノ症甚キ者ハ幾那煎ヲ用テ自ラ治ス
 其腐敗熱ニ係ル症多者ハ初發吐劑大効アリ。次ニ
 幾那ニ阿芙蓉。攝爾扁答。白芷。大黃。葡萄酒等ヲ加用

テ効アリ。刺絡ハ總テ害アリ。唯病室ヲ清潔シ。爽涼
 氣ヲ開通スルヲ緊要トス。右神經熱ニ係ル諸症
 多者ノ屍ヲ剖觀スルニ腦中黑血聚滿シ。腐敗熱ノ
 症多者ハ胸腹諸藏殊胃腸ニ黑血多ク滯留セリ。
 ○千八百六年。同七年本朝文化三年。同四年惡厲ノ神經熱流
 行ス。其症初發ヨリ精力極テ罷勞シ。肢體顫振。精神
 昏憤。謔語。昏睡。筋惕及痙攣ノ運動ヲ發シ。脉細數。熱
 勢過盛ナラズ動輒ヤモスバ温煖平日ノ如シ。又初發ヨリ
 下利メ休是血液溶崩。下利ニ此流行熱ノ病性トス其他漸次ニ血液
 溶崩ノ危症。壞疽等ヲ發シ。大抵第八日ヨリ第十四

日ニ死ス。但シ發斑アル者少ク。焮衝ノ候ナク唯精力
 虚憊ノ腐敗溶崩ニ傾ク此病性トス腐敗性 神經熱治法初
 發審察戒慎メ揮發衝動劑ノ緩性ナル者ヲ用、即民
 垓列利精、顯草根、稀泡劑及阿芙蓉液少許宛與ヘ浴
 湯ヲ施メ多、回復セリ其既ニ增長セル者ハ最峻ノ
 揮發衝動劑ヲ用、酸收劑綠礬精等ヲ云ハ下利ヲ増故ニ用
 不、但阿芙蓉ハ卓偉ノ効アリ能、精力虚垂ヲ發揚シ
 危劇ノ諸症ヲ挽回スル丁甚多シ然、レ劇キ下利、昏
 睡、脉疾數ナル症ハ阿芙蓉、葡萄酒等自餘、揮發衝動
 劑ノ過用ヲ戒メ甚、緩劑トシ用、頭ノ諸症多ク及、レ必

壯多血ノ者ト雖モ刺絡ヲ施メ害アリ。但、肺焮衝ヲ
 兼ル症ハ刺絡ノ速効ヲ得者アリ或、葡萄酒一二盞
 ヲ與、レハ譫語、下利、昏睡、筋惕等ノ症忽、寛解シ。脉ノ
 細數減シ。精神錯亂靜止メ爽快ヲ得ル者アリ
 ○近年ノ流行疫千八百十二年、同十三年ノ神經熱ヲ云本朝文化九年、同十年亦
 大抵前症ノ如シ其症、初起惡寒戰慄シ次テ發熱替
 留、大ニ罷勞シ食進、ス又總テ三件ノ症ヲ發ス其一
 ハ精神昏憤、頭眩暈ナリ其二ハ肢體顛振ノ定持
 シ難シ其三ハ脚痿弱ノ步履シ難シ是ニ次テ諸症
 増劇シ殊ニ頭痛劇ク、頭中困重壓迫、嗜眠睡中煩擾

謔語等ノ頭腦ノ諸症甚シ脉數若ハ緩ニノ搏度齊
 ハズ或虛軟細小或頗盈張スレモ強實ナラズ皮膚
 乾燥熱勢時ニ増發ノ燥ガ如ク或温煖平日ノ如シ
 或面部盈赤眼光異常時鮮朗或曇黯眼陷凹視神乏
 弱病增長スレバ小便渾赤嫩熱シ或赭麥酒ノ如ク
 ニノ稠塗ヲ生ス但小便卒ニ澄清ニノ水ノ如ク上
 面浮翳ヲ現スハ死候トス危篤ニ至バ呃逆昏睡謔
 妄大小便失禁胃管麻痺ノ嚙下ヲ妨グ舌痲ノ言
 能_ス右_右數_數症_症ハ殊_殊ニ此_此病_病患者大抵第四日ヨリ第十
 八日中ニ昏睡以死ス○或胃腸熱肺嫩衝ノ諸症ヲ

兼子或惡性發斑熱ヲ兼ル者甚多シ或衄血ヲ發メ
 諸症寛解スル者アリ○此熱病ハ溶崩下利筋惕搐
 掣様ノ症稀ナリ是ヲ以テ前説ノ流行熱ト分別ス
 前ノ千八百_{前ノ千八百}六年同七年_{六年同七年}治法_{治法}神經熱ハ即流行傳染疫ニノ或胃
 腸熱腐敗熱ヲ兼ル故ニ吐下劑若ハ防腐劑ヲ兼用
 シ嫩衝ヲ兼レバ各部瀉血法ヲ施スノニニテ刺絡
 ヲ禁シ大抵揮發衝動劑保固強壯劑ヲ主トシ用ル
 ヲ常法トス即前説ノ流行熱ハ葡萄酒及揮發衝動
 劑ヲ與レバ頭腦ノ患症速ニ減シ脉亦緩ヲ帶ヒ寒
 涼攻瀉ノ劑ヲ投スレバ諸症忽増進スルガ如シ然

ニ近年ノ流行疫ハ熱性衝動壯神ノ諸劑。葡萄酒等
ヲ與^レレバ諸症忽増劇ス。清凉方法。疏滌瀉下劑ヲ與^レ
レバ劇症減シ殊ニ頭腦ノ諸患輕快ヲ致シ刺絡亦
効ヲ得タリ。或初發吐劑ヲ與^テテ大効ヲ得ル者アリ
然所以ヲ考究スルニ當時流行ノ疫毒各異ナルニ
由テ或神經質ヲ侵襲スル^ト少クメ大ニ脈管質ヲ
損害シ或專^ラ神經質ヲ侵掠ノ脈管質ヲ毀傷スル^ト
少キ等ニテ各自病性ヲ異ニス。又衆人一般體力旺
盛強健ノ時アリ。或虛缺脫力ノ罷弱ノ時アリ。人類
モ亦然リ。其旺盛ノ時ハ^ニ炊衝性ノ病多ク。虛罷ノ

時ハ^ニ神經熱多シ。諸病皆然リ。又地方ノ高卑時令ノ
燥濕ニ由テ病性ヲ異ニス。即卑濕ニハ^ニ神經熱腐敗
熱多ク。高燥ニハ^ニ炊衝病多シ。或神經感動甚キ人或
凶厄失意等大ニ神思ヲ勞傷スル者疫毒ニ感スレ
バ^ニ神經熱トナリ。少壯多血ノ人ニ感スレバ^ニ炊衝ヲ
發シ諸症亦劇盛ナリ。是ヲ以テ疫熱ハ一定ノ治法
ナシ。唯其毒神經ニ感襲スル^ト居多キ故ニ^ニ神經熱
ト稱スルノニ。然レバ^ニ每常新發ノ流行病トシ始テ其
病性ニ蹤跡ノ方法ヲ考定シ寒熱補瀉其症ニ應メ
變易シ必常套ニ拘ラズ。同病ト雖モ一軌轍ニ據ラズ

ノ的効ヲ得ル。多年歷驗明試スル所ナリ。○或、病
 毒種々兼併ノ多少ニ由テ病性症狀ヲ異ニシ又其
 感染ノ淺深ニ由テ病勢輕重アリ輕症ハ醫藥ヲ假
 ラズノ自愈ユ或、傳染鮮少ノ者ハ熱病ヲ發スルニ
 至ラズ唯身體虛憊ノ遷延神經病トナル者アリ。○或、
 神經熱ニ惡性發斑熱ヲ兼諸症極テ劇盛ナレ其
 毒頭腦ニ襲入セズ死ニ至ラマテ精神些モ錯誤ナキ
 者アリ。○凡、病院ハ狹隘鬱閉ノ室ニ衆人雜沓羣居
 シ日夜腐敗ノ蒸氣ヲ氣息及皮膚ニ吸收スル故ニ
 熱病皆惡厲ノ腐敗熱トナリ血液溶崩ノ脫世腐敗

交血ノ下利。其他失血壞疽等ヲ生メ臭穢ニ堪ズ多
 死ス。然レ病室ヲ淨潔シ羣居ヲ禁シ常ニ新鮮氣ヲ
 開通スレバ熱病皆善性ニメ焮衝様ノ神經熱トナ
 ル者多シ。○右所說ノ如ク近年流行ノ神經熱ハ總
 テ熱性揮發衝動劑ヲ與レバ病勢増劇メ多害アリ
 殊ニ險重ノ症。初發ニ是ヲ用レバ頭ノ諸症ヲ増進
 シ血ヲメ頭腦ニ聚滿セシメ熱ヲ増發ス或、些少ノ
 龍腦。阿芙蓉。纈草等ヲ用。或、葡萄酒ニ多水ヲ加與レ
 其病勢轉劇ク頭ノ諸症殊甚シ。凡、血ノ運行ヲ減損
 シ。防焮劑皮表ノ壅塞ヲ宣通スル劑清涼ノヲ用レバ
蒸發劑

熱減シ血ノ頭腦ニ攻衝スル症漸靜止シ腠理通暢
蒸氣開達スルハ殊 日大便通ノ大抵全功ヲ奏セ
此病ニ緊要トス 日大便通ノ大抵全功ヲ奏セ
 リ其藥劑ハ硃砂安質沒扭酒民埜列利精及醋 答末
 林度ノ如シ又初發鹽酸劑殊ニ良効ヲ得タリ即海
 鹽精ニ多水ヲ加稀クシ用ルガ如シ消石ハ血液運
 行ヲ減損スルヲ甚キ故ニ用ス
 〇頭腦肺肝脾等各
 部焮衝ノ症アレハ瀉血法ヲ施シ難ク揮發衝動劑
 モ亦害アル症ハ是ニ代テ加羅蔑兒ヲ多量ニ用テ
 患部ノ凝血ヲ疏解シ大効ヲ得タリ
 〇此熱病大抵
 初起ヨリ六七日ヲ經テ熱勢減セズ頭腦ノ諸患逾

増進シ精力虛憊轉加ル症ハ右ノ方法ヲ用ル際更
 ニ細察戒慎ノ壯神劑ヲ用ベシ即龍腦ニ消石若ハ
 硃砂ヲ研和ノ散劑トシ一匁若ハ半匁ヲ一服トシ
 一時若ハ一時半毎ニ纈草泡劑ニテ送下ス此龍腦
 劑ニ由テ譫語狂妄ノ症靜止シ肌膚和柔ノ能蒸氣
 ヲ宣發ス
 〇右ノ壯神劑ヲ與テ寸効ナク脉虛細精
 力甚缺脱シ昏睡譫妄顫振増加シ或痙攣ノ運動ヲ
 發スル者ハ阿芙蓉劑速効アリ大抵十二時中ニ惡
 症消散ス既刺絡若ハ攻瀉ノ劑ヲ施シ諸管纖維弛
 緩セル者並多ク清涼劑ヲ施ス者ハ殊効アリ但過

用スレバ害アリ。假令ハ舍電阿芙蓉液ヲ取り大抵
 一時半毎ニ二滴若ハ三滴宛與ヘ。一兩日用テ適應
 ス。長服スレバ却テ害アリ○亞兒尼加根攝爾扁答
 ハ每常此熱病ニ大功ヲ奏ス。亞兒尼加ハ殊疫熱ニ
 特效ノ藥トス○元運力大ニ虛憊シ。病毒神經ヲ侵
 襲スルヲ甚ク。皮膚乾燥休ス。動輒ハ肢體各部冷ル
 一アル症ハ麝香ヲ一兩次用ベシ。能ク皮膚ヲ宜開シ
 膝理開通ノ津潤ア神經質ヲ和調シ此症ニ確當メ
 ル症ハ麝香効ナシ○下利アレハ劇シカラス。病勢
 無比ノ殊効ヲ奏ス○下利アレハ劇シカラス。病勢
 是レカ爲ニ增長セサル者ハ是ヲ閉止スルヲ勿レ。若

阿芙蓉劑ヲ與テ還ニ遏止スレハ腹部諸藏ニ激衝
 様ノ諸症ヲ發シ或ハ瘀血。頭腦ニ攻升シ或ハ呃逆。風氣
 腹脹及熱勢増發等。危篤ノ症ヲ萌生ス○或ハ胃腸熱
 ヲ兼テ自下利ヲ發シ其毒排泄スルハ佳兆トス。其
 下利少キ者ハ下劑ヲ與テ是ヲ助クベシ○下利水
 瀉若ハ失禁ノ脉細弱。精力沈垂。虛憊スル者ハ速ニ
 其下利ヲ閉止スベシ此症ハ漿粉前出ニ阿芙蓉液
 十滴若ハ十五滴ヲ加吉利詞爹兒トシ施メ捷効ア
 リ○十年以前流行ノ神經熱ハ刺絡及防激衝劑大
 害アリテ揮發衝動強壯劑皆偉効アリ。是ニ及メ近

年流行ノ神經熱ハ刺絡防熾衝劑共ニ多良功アリ
凡少壯多血ノ人劇キ頭痛或精神昏憤譫妄顔面眼
中焮赤頸動脈頭部動脈ノ搏動甚ク或胸腹諸藏焮
衝ノ候アル者ハ初發一兩日若ハ第七日中ニ刺絡
ノ捷効ヲ得タリ殊ニ飽煖優給ニ多血壯實ノ患
者ハ是ニ由テ死ヲ救フ多シ大抵初次刺絡ノ劇キ
煩躁精神昏憤頰ニ寬解シ再發セス或微譫語スル
ノ_レ若再煩悶スレバ再刺絡シ或既ニ第十二日ニ
至ル者及農夫脚力ノ如キハ第十四日ニ是ヲ施シ
譫語連縣既ニ八日ヲ經ル者モ治スルヲアリ○然

凡刺絡ハ每常必効ヲ得ルニ非ズ或患者虛憊シ若
ハ神經感動甚キ症ハ多ク瀉血ノ死スル者アリ凡
當年流行ノ疫毒及各國住地ノ病性ニ因テ其應否
亦一様ナラズ故ニ其疑似不決ノ症ハ刺絡ヲ輟テ
各部瀉血法ヲ施メ切實トス○肺及胸脇ノ焮衝ハ
既ニ數日ヲ經ル者モ饒多ニ刺絡ノ良功アリ腦焮
衝様ノ症ハ刺絡ノ害多シ動輒ハ譫妄等增長シ或
麻痺及血液溶崩ヲ萌生ス故ニ若血ノ頭腦ニ攻升
セル症アル片ハ顛顛耳後頸項ニ蟬針法若ハ角法
ヲ施スベシ始終多ク施スト雖モ損害ナシ又芥子

泥ヲ腓。躑ニ貼スレバ能、頭腦ノ病毒ヲ引降シ其諸
症ヲ寛解ス。○發泡膏_モ亦頸項等ニ貼シ化膿ノ良驗
甚多シ

清凉氣

凡、疫熱ハ新鮮清凉氣ヲ患者ノ室ニ迎引
シ。又其卧榻衣衾ヲ淨潔ニスルヲ最好緊要事ニシ
疫毒ヲ驅散スルニ極テ大効アル一療法トス。殊ニ
近年流行ノ症ハ患者ノ保護温煖ナレバ病勢逾増
長シ保護清凉ナレバ病毒_{ソチ}消解シ每常内服劑ヲ
用スノ治スル者甚多シ。總テ爽凉、新鮮氣ヲ通暢ノ
病室ノ腐敗氣ヲ攘掃スル_キハ其効功藥劑ノ比ス

ベキニ非ルヲ古今、名哲歷試ノ確證セル所ナリ。○
寒冷氣ハ其効防焮衝ニ非ズ。挑起撥揚ヲ爲ニ非ズ
ノ能、疫毒ヲ消尅ス。凡、疫熱ハ凝流體ノ熱蒸沸騰ヲ
病トス寒冷氣ハ能、其熱蒸ヲ抑遏ノ内熱ヲ消シ疫
毒沸騰ノ銳勢ヲ摧制シ一ハ皮膚ノ熱蒸ヲ凉解ス
ルヲ以テ腠理ト肺ニ壅鬱セル病毒ヲ排泄セシム。
殊ニ冷湯法良功アリ又一ハ日夜患者ノ氣息ヨリ
吐出セル腐敗ノ疫氣病室ニ熏蒸スルヲ宛モ密雲
稠霧ノ如ク患者ヲ圍繞シ。日新轉増ノ神經ヲ侵掠
シ血液ヲ沸騰スルヲ猶礮炭ノ毒烟中ニ在_ルカ如シ

此毒烟ニ中レバ卒^レ什^レ暈故ニ新鮮氣ヲ迎引シ毒蒸
倒シ次テ^レ痲不遂ニ罹ル^ル者爽涼氣ヲ得テ忽^レ蘇活スルガ如シ然^レバ先^レ其鬱敗
氣ヲ排遣ノ大効アル^ル宛モ毒烟ニ觸テ暈倒スル
者爽涼氣ヲ得テ忽^レ蘇活スルガ如シ然^レバ先^レ其鬱敗
氣ヲ除クニ非レバ峻効アル内服藥モ應驗ヲ得^ル
能ハズ○腐敗性ノ惡瘴ハ清涼氣ヲ病室ニ迎引^ノ
其鬱敗ノ毒氣ヲ排遣スレバ瞬間ニ其惡症ヲ挽回
スル一療法トシ是ニ由テ大効ヲ得ル者甚^ク多シ
冷湯法 冷湯法ハ此神經熱ニ大効ヲ得タリ但是
ニ三法アリ○其一ハ各部湯法ナリ是ハ冷水若ハ
雪氷ヲ取テ患部ニ打湯ス^ル喻ハ患症頭ニ在^ルカ如^キハ

是ヲ頭部ニ施シ腹部諸藏ノ激衝及^レ痞氣腹脹等ハ
是ヲ腹部ニ施スガ如シ腐敗溶崩ノ下利ヲ兼症モ
亦捷効アリ^ル冷水ハ布片ニ浸シ雪氷ハ○其二ハ冷
水若ハ醋ニ水ヲ加^テ稀クシ全身皮上ヲ洗湯スルナ
リ凡^レ熱病皮膚乾燥ノ症並ニ粘汗若ハ稀汗アル症
ニ是ヲ施セバ皮膚ヲ衝動ノ蒸氣ヲ挑發シ腠理ノ
病毒分利ヲ進起シ^ル皮膚ノ病毒ヲ分利スルハ熱以
テ壯熱ヲ解散シ病勢ヲ減除ス但^レ病毒分利ノ微汗
及^レ蒸氣融發スル症ハ冷湯法ヲ禁ス○其三ハ冷水
ヲ患者ノ身體ニ滴注スルナリ是尤^モ奇効アル一法

トス。凡、熱病ノ初發。患者少壯強實。皮膚燥熱スル者ニ施メ効驗快捷ナリ。然レ在寒冷最劇キ故ニ過用スレバ害アリ。壯實ノ人ト雖モ甚多血ニ表部ノ血脉大ニ盈脹セル者ニ是ヲ施セバ其血還ニ内藏ニ及流内攻シ。殊ニ腦中ノ血脉腫脹ノ管外ニ泛溢シ。患者昏睡卒倒ス。或、老人小兒虛人。神經感動シ易キ人。肢體甚、虛羸ノ者。各部殊ニ罷弱セル者。肌膚津潤アル者ニ是ヲ施セバ暴烈ナル寒氣ノ刺戟ニ由テ虛憊ノ精カヲ劫奪シ。卒ニ温煖氣ヲ撲滅メ腦髓麻痺シ昏睡卒倒メ死ス。○千七百二十九年本朝元祿十四年

惡厲、疫熱流行スル一、九個月。皆清涼氣並冷湯法ヲ施シ或、水ヲ以テ總身ニ摩濕スルノニテ内服藥ヲ用ス危劇瀕死ノ症ヲ救フ甚ダ多シ此流行病ハ多ク激衝性ニ屬スレバナリ。○前說ノ千八百七年ノ神經熱ハ温浴湯及温湯法温湯ニテ蒸濕スルヲ云總テ良効アリ殊ニ汗アル症及患者虛憊ノ病毒ヲ抗拒スベキ精カナキ者ニ驗多シ此症總テ冷然レ在病ノ初發湯法害アリ及、皮膚燥熱スル症ハ温湯法害アリ但、温湯法ヲ施ス時。頭ニ冷湯法ヲ施メ甚ダ良

神經熱治例篇第九

神經熱ノ治例二則ヲ舉グ。一ハ患症甚ダ變化シ易ク。一ハ極テ頑固險重ナリ

○一男子二十歳資稟虚弱。十月初旬熱病ニ罹リ。食進マズ且嘔下ヲ妨グ。患者從來屢咽喉腫ヲ患フ。但今回ハ過酒ノ風寒ニ感シ其症殊險重ナリ。一醫吐劑ヲ與夥ク粘液及膽液ヲ吐ス。然レ諸症增長シ億勞更甚シ。吐後兩三日ヲ經テ是ヲ診ニ罷勞及咽喉腫日増劇シ。頭鈍痛少間モ休マズ。亞滿埜兒腺^{咽ノ腺}腫脹シ口中斷舌遍ク粘液被ヒ。目眩ノ淚ヲ流ス。但

大便時々通利シ少腹心下脹滿セズ小便淡稀ニノ近ナシ。脉大小堅軟時變メ定ラズ然レ頰盈充シ大抵數ニメ九十動ヨリ九十五動許。時々譫語ス夜中煩燥甚メ多ク譫語必間モ休マズ乃神經失常ノ運動ヲ防制シ劇症ヲ除キ蒸氣ヲ發センカ爲ニ纈草濃泡劑ニ忽弗滿鎮痛液ト硃砂少許ヲ加テ與。芫菁膏ヲ項窩ニ貼シ。又硃砂ヲ屋施蔑兒ニ研和シ含漱藥トス。是ニ由テ脉稍調和シ蒸氣漸發泄シ譫妄減ス。然レ咽喉ノ症逾增長シ甚ク嘔下ヲ苦シ大ニ艱苦スルニ非バ言フ能ハズ。口中ヲ診ニ遍ク齶口瘡ヲ生シ涎

唾流溢ス。因テ頰ニ芫菁膏ヲ項窩ニ貼メ。化膿セシメ。内服劑ノ礪砂ヲ去テ用。又幾那泡劑ニ民埜列利精ヲ加テ兼用シ。蓬砂ヲ玫瑰蜜ニ研和シ口中ノ塗藥トス。是ヲ用テ二日。諸症大ニ寛解シ不日ニ全愈スベキカ。如シ然ニ其夜大ニ煩悶シ毫モ眠テ能ハズ。肌膚搔痒ニ堪エス。且數日以前ヨリ陰囊小胞ヲ發メ。焮熱シ皮膚剥脫セル者。今其焮痛ニ堪エズ。其煩悶。皮膚搔痒ハ發斑ノ前兆タルベキヲ察ス。翌日果メ白色ノ粟疹ヲ發シ殊ニ胸及四肢ニ多シ然レ諸症尚輕快ヲ得ズ。唯煩悶及咽喉ノ症微減スルノミ。又知覺

感觸甚。遲鈍トナリ。脉更ニ數ニメ堅。乃前方ノ服量ヲ倍シ攝爾扁答ヲ加用ヒ。又芫菁膏ヲ貼シ。陰囊ハ越没里膏名ニ菲阿斯失亞密名越幾斯劑名痛止ヲ加貼ス。○翌日粟疹起脹シ邊圍赤色ヲ帶。患者爽快ヲ覺ユ。唯脉小ニメ堅。搏度齊ハズ。謔妄除カズ。小便中雲翳生シ。必間ニメ消散ス。乃前方連進二日。粟疹自消シ。患者復煩躁ノ展轉シ。眼光慌暴。夜中謔語甚ク。脉逾堅ニメ次序ナシ。因テ速ニ芥子泥ヲ腓ニ貼シ。數温湯ヲ與。又内服藥ノ量ヲ倍シ用テ十二時ニメ皮上白斑ヲ生シ長二三寸濶五分ヨリ一寸許。漸起脹メ水

充^テ肌膚微冷。黯澹色。額冷汗沾^ヒ。脉細數。呼吸短促。患者恍惚トノ醒覺セズ。是ニ於テ壯神揮發ノ峻劑。闕ベカラザル症トシ幾那。濃煎劑ニ攝爾扁答泡劑ヲ合シ龍腦及民埵列利精ヲ加^ヘテ頻ニ與。又纈草煎汁ヲ吉利詞爹兒トシ。芫菁膏ヲ貼^メノ化膿セシメ。又屢芥子泥ヲ貼ス。其白斑暫留二日ニノ夜中盡消散ス。翌朝患者鼾睡シ。脉浮虛散漫シ。少間^ニ大發汗シ。小便數通シ。雲翳ヲ現シ。少頃ニノ器底ニ沈ム。患者醒寤スレ^レ。尚煩悶休^マズ。夜中稍安靜。時謔語ス。○翌日諸症輕快。呼吸寬利。蒸氣發泄。脉次序アリ。精神快爽。

ナリ。然^レ。疔效嗽止^マズ。夜中殊劇ク。大ニ困苦ノ僅^ニ痰ヲ吐ス。但^シ。效メ疼ナク。胸肺焮衝ノ候ナク。耳聾ス。乃^チ幾那。沙列布。金硫黃。及民埵列利精ヲ内服セシメ。胸ニ芫菁膏ヲ貼ス。是ニ由テ諸症漸回復シ。十月末ニ至テ患者病牀ヲ出^ツ。然^レ。疔效嗽仍止^ガル^{コト}。數週。因テ依蘭苔。遠志。蜀羊泉。硫黃。乳汁ヲ用^ヒ。發泡膏ヲ貼^メ。連日化膿セシメ。竟ニ全愈セリ。
○一婦人三十歲。體稟多血ニノ膽液過多。十一月八日。月經多來リ。偶寒邪ニ感シ。月經一日^ニ止^ム。同十日。肢節倦重。頭痛。眩暈。食進^マズ。大便通セズ。脉數ニメ次

增訂和蘭藥鏡 卷十二 十八 十九 風雲堂藏

序ナク稍盈脹シ肌膚乾燥ス一醫左ノ散劑ヲ與フ

蓬硫酒石散

純精酒石 名 四錢 蓬砂 一錢

金硫黃 六分 甘草 三錢

右調勻メ散劑トシ一時毎ニ一茶匙ヲ取り加密列ノ泡湯ヲ以テ送下ス又温湯ニ食鹽ヲ和シ脚ヲ浴ス翌日稍月經來ル方劑同前○十三日始テ神經熱ノ病性ヲ見シ脉緊細ニメ攣縮搏度齊ハズ精力大ニ虛憊シ舌白苔大便稀溏小便淡稀月經復止時々振掉ス乃後方ヲ處ス中末條六ノ附言ハ散劑

蓬黃纈草飲

纈草根 末 三錢

右沸湯六匁ニ浸テ四分時滓ヲ去リ後藥ヲ加フ

蓬砂 一錢 韃爾答越默室 一匁

大黃丁幾劑 名 舍利別 各四錢

右調和シ半時毎ニ一匙ヲ與フ○翌日大便溏セス脉甚ダ小ナラズ渴アリ喜テ吐セント欲ス○十五日後方ノ吐劑ヲ與フ

雙聖湧吐飲

乙百葛格安那 末 十五分

增訂和蘭藥鏡 卷十二 風雲堂藏

增訂和蘭藥鏡 卷十二 二八 風雲堂藏

韃爾答越默室 二氏

右水三勺ニ溶和シ。海葱蜜四錢ヲ攪和シ。八分時毎
ニ一匙宛服ス。註尋常ノ水ハ清潔ナラズ。故ニ韃爾
答越默室ノ他礦性ノ中和鹽類ヲ溶
和スルニハ必ズ蒸餾水ヲ用ベシ。尋常井水ハ諸種
ノ鹽氣ヲ含ミ或炭酸如爾幾苦土收斂基硫氣
等ヲ含ム故ニ右ノ諸藥殊ニ升是ニ由テ粘液及膽
液ヲ吐スルヲ三次爾後脉小ニメ數搏度齊ハズ頭
目鬱重小便淡稀大便水瀉ス。乃後方ヲ與フ

壯運額草飲

額草根 末 三錢 白芷 末 二錢

右水六勺ニ煮テ渣ヲ去リ後藥ヲ加フ

氏垓列利精 一勺 番水鼈越幾斯劑 六

亞刺比亞蘆謨漿 四錢 舍利別 一勺

右調和シ半時毎ニ一匙宛與フ。○十七日。下利止。舌
兩邊黯色苔アリ中央苔ナク潤アリ。肌膚和柔。脉緊
細ニノ攣縮搏度齊ハズ。甚數ナラズ九十動許。腹軟
頭目困重耳聰ナラズ。虛憊甚シ。午後兩顴赤色。時謔
語微直視シ或眼光慌暴。乃前劑ヲ用。室中清爽氣ヲ
迎納ノ鬱蒸氣ヲ散ス。夜中熱増發ス然レ舌及皮膚
稍潤フ。大便通セズ。○十八日。月經必ク來リ眼光慌
暴。小便水ノ如ク。舌潤アリ栗殼色苔ヲ帶。夜中脉次

增訂和蘭藥鏡 卷十二 風雲堂藏

序ナシ但昨ニ比スレバ盈實シ夜半後脉細數皮膚
及舌燥キ復譫語甚ク且腹痛ヲ發シ大便失禁ス因
テ芥子泥ヲ兩腓ニ貼シ左ノ吉利詞爹兒ヲ施ス

額草吉利詞爹兒

額草根

加密列 各二錢

菲阿斯失阿密草 一錢

右水煎シ施ス○翌日諸症同前但脉細數皮膚口舌
乾燥粟殼色稠苔アリ水瀉一行腹痛止ズ少腹軟ニ
ノ痞脹シ渴ナシ乃芥子泥ヲ兩臂ニ貼シ後方ヲ與

壯神額攝飲

額草根 末 一弓 攝爾扁答 一錢

右水六弓ヲ以テ煮テ滓ヲ去リ後藥ヲ加フ

龍腦 十瓜亞刺比亞護漿

民埕列利精 一弓 安質没扭酒 三十滴

舍利別 一弓

右調和シ半時毎ニ一匙宛與又時々屋施蔑兒一茶
匙宛與テ口舌乾燥ヲ潤シ前ノ額草吉利斯爹兒ヲ
施ス○二十日脉稍和ノ盈揚シ百動許舌潤ヒ腠理
宣通シ小便赭濁ニノ逆ナシ大便通セズ呼吸短促
不利シ時效ノ痰ナシ頭甚困重夜中脉疾數ニノ次

增訂口齒藥鏡 卷十二 二十二

序ナシ乃前方ニ忽弗滿鎮痛液ヲ加與ヘ。又上好ノ
列印設酒一匙宛半時毎ニ與羯布羅精ヲ以數肢體
ヲ蒸湯シ。又亞兒尼加。纈草根ノ煎汁ヲ吉利詞爹兒
トシ施シ。芥子泥ヲ貼ス。○翌日患者眼ヲ閉恍惚ト
ノ辨識ナク肢體懈弛。頽然トノ倦卧シ時脚ヲ牀外
ニ擲テ。眼中矇矓。舌頭潤テ苔ナク脉昨ニ比スレバ
盈揚ス夜中大小便失禁。呼吸短促。謔語ス方劑同前。
又芥子泥ヲ兩臂ニ貼シ。列印設酒ノ量ヲ增。羯布羅
精及吉利詞爹兒ヲ施シ前日ノ如シ午後諸症稍寬
解ス。又乙百葛格安那半瓦宛半時毎ニ服セシム夜

分脉復細小。虛憊益甚ク。大便水瀉ス是服スル所ノ
然乃後方ヲ作リ與フ金硫黃ニ因テ

幾攝壯神飲

幾那 末 一弓
攝爾 扁答 末
亞兒尼加 根 末 各二錢
白芷 末

右水六弓ニ煮。滓ヲ去リ後藥ヲ加フ

忽弗滿鎮痛液 八十滴

安質沒扭酒 三十滴 舍利別 一弓

右調和シ半時毎ニ二匙宛與フ又四分時毎ニ列印
設酒半盞宛用フ○翌日諸症同前精神差輕快。面赤

增訂口齒藥鏡 卷十二 風雲堂藏

耳聾シ大便失禁。夜中嗜眠謔語ス乃後方ヲ與フ

幾芷壯神飲

幾那 未一弓

白芷 未各三錢

攝爾扁答 未
亞兒尼加 未 一錢

右上好列印設酒六弓ヲ加浸シ渣ヲ去後藥ヲ加フ

民埵列利精 一弓

忽弗滿鎮痛液 六十滴

安質沒扭酒 四十滴

舍利別 一弓

右攪和シ半時毎ニ二匙宛與フ又後方ヲ用フ

龍腦爽神散

龍腦 一瓦

乙百葛格安那 半瓦

沙糖 一瓦

右合和ノ散劑トシ分テ八服トシ一時毎ニ一服宛與フ○二十三日。二十四日。精神稍輕爽ニメ辨識アリ。脉甚小數ナラス大抵八十動許。差盈揚シ軟ニメ次序アリ。仍耳聾。舌苔粟殼色ニメ潤ヒ。振搖セズ。肌膚柔潤。面部蒸氣ヲ發シ欬嗽胸痛ナク。呼吸短促セズ。時々大息シ。小便稠濁。雲翳懸留シ。下利止ム夜中時々謔語シ或煩躁ス。眼中矇眊。眩暈シ。内服藥ヲ吐スルヲ一回。其貼セル芥子泥ノ疼ニ堪ス。是ヲ去ル。又呃逆ヲ發スルヲ二三次。或嘔氣アリテ服藥ヲ

惡ム大便一行通ス方劑同前唯幾那ヲ加倍シ用フ
 ○翌朝譫語シ上瞼外皆ニ牽引ス脉昨ニ比スレバ
 小數ニノ堅古頭苔ナク潤フ然レ挺出スルヲ能ハ
 ス大小便失禁夜半以後煩躁甚クノ藥ヲ服セス因
 テ前ノ諸方ヲ持重シ又後方ヲ兼用ス

芙蓉催睡飲

舍電阿芙蓉液

二十滴

水

半錢

右攪和シ一時毎ニ二十滴宛葡萄酒ニ點服ス又前
 ノ吉利詞參兒ニ幾那ヲ加施ス○患者午後ヨリ夜
 ニ至頻ニ嗜眠シ時々眼半開テ睡リ大息シ兩便失

禁ス方劑同前更芫菁膏ヲ項窩ニ貼メ發泡腫痛ス
 ○二十六日精神輕爽能事理ヲ辨知シ耳聾治シ大
 便通セズ脉稍小軟ニノ次序アリ呼吸利シ時々大
 息シ舌兩側粟殼色潤アリ夜中譫語セズ○二十七
 日諸症同前夜中微譫語ス脉強弱齊ス然レ急數ナ
 ラズ呼吸利ス或時ニ煩悶甚シ薦骨褥瘡生シ小便
 赭色稠濁雲翳及塗渣アリ○二十八日眼瞼復上牽
 ス夜半前蒸氣發シ爾後睡眠ス其他諸症藥劑同前
 ○翌日脉數ニノ次序ナク大小齊ス呼吸不利大息
 ス皮膚及舌乾燥苔粟殼色大便微溏小便塗ナシ乃

前幾那劑ニ水楊梅根ヲ加テ効力ヲ峻ニシ又龍腦
 ヲ阿芙蓉液ニ加一時毎ニ四滴宛與前列印設酒鷄
 布羅精ノ蒸湯法吉利詞爹兒ヲ持重シ施ス夜中脉
 小軟ニノ稍次序ヲ得大抵八十動呼吸快利脚ノ肌
 膚和柔頭腹兩臂蒸氣發ス夜半後煩ノ時謔語ス乃
 芥子泥ヲ貼スル二三時許○晦日患者精神沉重面
 赤眼神乏弱粘液被ヒ脉軟弱大小齊々九十動許呼
 吸不利ノ大息シ肌膚和柔舌苔粟殼色ニノ厚微燥
 テ粘液被フ昨以來大便通セズ兩日吉利詞爹兒腸
 内ニ留ル小便赭色稠濁雲翳アリ方劑同前但前幾

那劑ニ遠志二錢ヲ加テ與又時々左大麥煎ヲ兼用

爽涼大麥飲

綠礬精 半錢

舍利別 一弓

右攪和シ二匙ヲ取テ大麥煎一小茶碗ニ和シ與又
 芫菁膏ヲ胸ニ貼ス夜中煩躁シ發汗ス夜半後汗止
 謔語シ曉ニ至テ省覺ス○十二月朔日脉昨ニ比ス
 レバ稍盈揚シ數減軟ニノ次序アリ皮膚及舌苔潤
 アリ呼吸不利シ大便失禁ス芫菁膏大ニ發泡ス患
 者肉羹汁ニ蒸餅ヲ煮テ喫ス夜中嗜眠脉小ニノ微
 數呼吸利シ頭臂腹部蒸氣ヲ發ス○二日脉細小次

增訂和蘭藥鏡 卷十二 二十六

序ナク呼吸短促時大息ス皮膚及舌潤ヒ苔甚シ吉
利詞爹兒ヲ施シ硬屎少許通ス其他諸症方劑同前
○三日精神沉重ス然レ辨識アリ。脉甚小ニ疾數
呼吸不利大息シ。皮膚燥。舌苔赭色ニ甚厚ク且振
搖ス。口中粘液被ヒ心下苦滿惡心シ。大便通セズ。小
便稠濁ニ微赤色ノ塗多シ右ノ如ク峻効アル方
法ヲ用テ呼吸仍不利スル故ニ左ノ吐劑ヲ與フ

鎮痙誘吐散

乙百葛格安那末 一月 葛私多儂謨 四瓦

右研和ノ一頓ニ服セシメ。次ノ飲劑ヲ用フ

鎮痙加額煎

加密列 續草根 各二錢

右泡劑トシ飲料トス是ニ因テ午後粘液ヲ吐シ呼
吸稍利ス。但嗜眠ノ睡レ能ス。乃吐劑ヲ休前諸方ヲ
用。又幾那丁幾劑四十滴宛一時毎ニ與。○四日嗜眠
醒覺ス。然レ精神鬱重シ。兩手顫振惕動ス。此症甚
ハ麝香二瓦宛一時毎ニ與フ。脉小ニノ八十動許或
時甚數ニノ次序ナシ。呼吸不利大息耳稍聾シ。皮膚
及舌乾燥シ。赭色稠苔アリ大便通セズ小便同前乃
復光菁膏ヲ胸ニ貼シ。芥子泥ヲ兩蹠ニ貼ス方劑同

曾訂和蘭藥鏡 卷十二 二十六

前。但午後筋惕動甚。故麝香二瓦。宛一時。每二
 用。夜中嗜眠。微謔語。○五日耳聽難。脉小。稍
 數。次序ナシ。時大息。仍筋惕。故又後方ヲ兼用ス。

爽神鎮瘧飲

鹿瓊漿

製法。臭氣銳烈ノ鹿角精ヲ適宜ニ取リ。硝
 子。曰ニ入。是ニ結芒酸性ノ琥珀鹽ヲ
 少許宛加ヘテ。些モ沸。滓セザルニ至。能研和
 ノ濃過シ渣ヲ去。硝子壘ニ入。固封シ貯フ

忽弗滿鎮痛液

幾那丁幾劑 各三勺

舍電阿芙蓉液

半錢

右調和シ一時。每九十滴宛與。○六日患者倦目シ
 神思沈垂。顏面黧澹。脉小ニ微數。呼吸不利。大息ス。

然。正顫振筋惕。休乃前ノ鎮瘧飲ヲ一時。每ニ増加ヘテ
 竟ニ百二十滴ニ至リ。龍腦爽神散前ヲ與ル。每ニ華
 尼利莢六瓦ヲ加用。又爽涼大麥飲ノ綠礬精ノ量ヲ
 増加シ。其他内外方劑モ持重シ用フ。午後患者半睡
 シ。半眼ヲ開キ。脉小ニ百動許。呼吸不利。皮膚乾燥
 筋惕咬牙。舌苔尚厚ク。大便通セズ。夜ニ入テ醒覺シ。
 脉小ニノ次序アリ。大抵八十動。皮膚及舌潤ヒ。咳嗽
 シ。夜中稍睡眠ス。方劑同前。華尼利ノ量ヲ増テ十二
 瓦ニ至リ。○七日面部瘦削。眼球陷凹。耳冷。額皺ヲ生シ。
 嗜眠ノ睡ラズ。又搐掣ヲ發ス。然レ辨知アリ。耳聾シ。

脉甚小ナレ_レ_レ次序アリ。九十動許。呼吸稍利_シ。效ノ粘痰ヲ咯_キ。共ニ嘔氣ヲ發ス。皮膚及舌乾燥シ苔甚_シ。大便閉四日方劑同前。又如密列。纈草。石鹼ヲ以テ吉利詞_テ參兒_ヲ製シ施ス。午後患者直視。搗掣甚_ク。脉細數ニノ按知シ難シ。皮膚燥キ。小便稠濁ニノ塗ナク。斷ニ鶯口瘡ヲ生ス。然_レ_レ咽喉口中ハ發セズ。吉利詞參兒_ヲ施_テ大便一行通ス。乃龍腦爽神散ニ華尼利十五_分宛加_テ一時每ニ與_ル。又蓬砂ヲ煉膏トシ鶯口瘡ニ擦ス。其他方劑同前。夜中發熱。面赤。倦卧ス。脉甚小ニノ微數。次序アリ。稍睡眠ス。○八日精神稍輕爽。

ニノ對晤辨知ス。脉小ナレ_レ_レ甚數ナラズ。次序アリ。呼吸利ス。然_レ_レ仍_ホ欬嗽休_ズ。皮膚乾_ク。和柔シ。舌苔消_ノ潤ヒ。鶯口瘡殆_ト消散ス。午後復煩躁ノ時_ハ牀外ニ展轉ス。然_レ_レ呼吸不利セズ。皮膚及舌潤ヒ稍白苔アリ。脉小ニノ微數。大便通セズ。小便赭濁ニノ塗ナシ。夜中大ニ發汗シ。稍睡眠_シ時_ニ謔語ス。脉午後ニ比スレバ稍盈實シ。次序アリ。九十動許。胸發泡。創口ヲ_モ仍愈サ_ラシム。方劑同前。○九日大便一行通ス。面赤。神思爽輕。脉昨ニ比スレバ稍盈實シ。軟ニノ數ナラズ。次序アリ。呼吸利シ。蒸氣ヲ發ス。夜中嗜眠ノ

睡ラズ。但、譫語セズ。方劑同前。○十日。舌頭潤テ苔ナシ。又大ニ發汗ス。故ニ爽神鎮瘧飲ノ鹿瓊漿ヲ去リ。幾那丁幾劑ヲ增加ス。大便通セズ。午後嗜眠。面部赤色ヲ帶。顔面。胸。兩臂ニ豆大ノ瘡胞ヲ生シ。肛門ニ大ナル水胞ヲ發ス。夜中睡眠シ。寛快ノ狀アリ。耳能聽エ。昭言辨知。平日ノ如シ。方劑同前。○十一日。脉小ニシテ微數。呼吸快利。欬ノ痰ヲ咯。舌頭苔ナク。舌本ニ向テ赭色ノ苔アリ。大便通セズ。面部蒸氣ヲ發シ。皮膚和柔。兩臂ノ胞稍起脹シ。右臂赤色ノ粟疹ヲ發シ。夜中安眠ス。○十二日。患者知覺全。平復シ。脉微數ニシテ盈

實シ。其胞多ハ化膿シ。次テ乾固ス。或、化膿セズ。消散スル者アリ。芫菁膏ヲ貼スル部能、發泡シ。且、乾愈セサラシム。但、犬ニ褥瘡ヲ生ス。乃、雞子白ニ羯布羅精ヲ和シ貼ス。患者肉羹汁少許並、可喜一二盞ヲ喫シ。味佳美ヲ覺ユ。方劑同前。但、華尼利ヲ去テ用ス。○十三日。諸症同前。乃、滋養ノ羹汁ヲ與。又、欬嗽ヲ治スルカ爲、前ノ幾那飲劑ニ金硫黃十五瓦ヲ加用。夜中安眠ス。○十四日。十五日。脉頗盈實シ。次序アリ。皮膚及、舌潤苔消ス。其胞仍彼此ニ在テ化膿ス。小便稠濁ナラズ。尚、雲翳ヲ現ス。大便通セズ。患者稍食ヲ欲

シ。褥瘡膿脹ス。○十六日褥瘡ノ疼甚、ノ睡、_レ能ズ。脉
小ニノ數。呼吸稍短促ス。然、_レ效嗽減ス。小便拘、_レ色
ニノ稠濁。褥瘡潰爛。深殆、_レ一寸許。其底黑、_レ被フ。然
_レ邊ニ、_レ焮衝、_レ候ナシ。因テ後方ヲ作テ瘡上ヲ蒸湯ス

防腐蒸湯方

楊皮

芸香

各四錢

蘇格爾需謨葉

菲阿斯失亞密草

二錢

右判水三十二、_レ煮テ患部ヲ蒸湯シ。緩和愈創ノ
膏藥ヲ貼、_レ其潰爛ヲ愈合ス。○十七日褥瘡痛ニ因
テ睡眠ヲ妨グ。瘡底黑、_レ加殆、_レ剥脫セントス。瘡胞盡

消散シ夜中安眠ス。○十八日脉小ニノ數ナラズ。次
序アリ呼吸快利シ。效減シ皮膚及舌潤テ苔去。食ヲ
欲シ小便褐色溷濁。大便固シ。○十九日神思爽快。眠
食逾復ス。因テ前ノ諸方ヲ休、_レテ左ノニ方ヲ與フ

壯神丁幾劑

幾那丁幾劑

四錢

纈草丁幾劑

忽弗滿鎮痛液

各二錢

右調和シ一時、_レ每ニ百五十滴宛服ス

鎮瘰排毒散

挖歇爾私發汗散

十五瓦

甘草末 十五瓦

右調和ノ散劑トシ分テ六服トシ毎夜一服宛與フ
 ○廿日ヨリ正月朔日マデ諸患日快愈シ脉力盈充
 始テ牀中ニ起坐ス唯效嗽脉數ノ二症退サルノニ
 ○二日患者神思爽了ナラズ惡心シ吐スル一兩
 次食ヲ欲セズ口中頻ニ淡水湧溢シ舌白苔生ス乃
 乙百葛格安那ヲ用吐スル一四次爾後神思爽快食
 進ニ脉小ナレ圧數ナラズ乃前ノ丁幾劑ヲ與ヘ別
 ニ揚皮ノ浸劑ヲ服セシメ正月十六日ニ至テ竟ニ
 全治ヲ告テ停藥ヲ許ス

新訂增補和蘭藥鏡卷十二終



○榛齋宇田川先生著述發行書目

和蘭内景醫範提綱 全三冊

同 内景銅版圖 箱入 全一帖

增補和蘭藥鏡 每篇以三冊為第一帙 全十八冊

遠西醫方名物考 同上 全三十六冊

同 補遺 同上 全九冊

理學入門植學啓原 宇田川榕庵先生著 全二冊
米色圖入

書賈 青藜閣 須原屋 八

江戸淺草茅町二丁目

