



新訂 和蘭藥鏡
增補

卷十三

ヤ 3
968
8



968
卷

文政三十年仲夏新鐫

榛齋宇田川先生著

五篇

新訂

和蘭藥鏡

增補

風雲堂藏版

青藜閣發兌

文政三十年二月廿日
前田實氏

新訂增補和蘭藥鏡標目

卷十三

楊皮

壯神楊皮煎

過爾託亞楊皮煎

七葉樹皮

經驗說 六則

榲皮

榲實 榲耳

榆皮

榆皮排毒煎

瑞香

瑞香發汗煎
瑞香排毒煎

瑞香解毒煎

經驗說 七則

瑞香消毒煎
解疑瑞香煎

瑞香實

寄生

增訂和蘭藥鏡

卷十三

標目

風雲堂藏

胡桃

桂桃驅蟲飲

胡桃綠實越エキス幾斯劑

胡桃實綠皮

胡桃排毒煎

胡桃枝皮

胡桃仁

胡桃油

甘草

甘草舍利別

番木鱉

番木鱉消毒飲

番木鱉丁イシキ幾劑

番木鱉越エキス幾斯劑

藤黃

採修 撰品

藤葱驅水丸

加羅藤葱丸

護ム葱ム醜丸

藤英驅水膏

新訂增補和蘭藥鏡卷十三

榛齋先生譯述

男

宇田川

榕

榕菴校補

楊皮

「カハヤナギ」又「子コヤナギ」俗稱
「ザリクス」羅「ワイルゲン」ボム蘭

試効性收瀦血液稀涼ヲ稠厚シ諸脫泄ヲ止ム。間歇熱。下利。赤痢。白帶下。月經過多崩漏。吐血下血等。虛憊ノ症ヲ治ス。○水煎メ蒸溺劑トシ焮腫眼ヲ治シ頭ノ浸淫瘡。白癩瘡。白屑風。汚穢潰爛。惡瘡ヲ淨刷乾愈ス。○花絮外敷メ創傷出血ヲ止ム。物叔
○按ニ和蘭近來楊皮ヲ以テ幾那ニ代用メ治驗

ヲ稱ス予馬底依華等ノ書ニ就テ其說ヲ檢得テ
 始テ同好ニ告共ニ是ヲ試用ルニ大約其所說ノ
 如シ故ニ其衆說ヲ左ニ略舉メ考據ニ備フ爾云
ニ代用メ効驗ヲ得ル藥ハ楊皮七葉
樹皮榲皮水楊梅根菖蒲根等ナリ
 晚近ノ名醫楊皮ヲ以テ幾那ニ代用シ治驗ヲ稱ス。
 博學精練ノ名醫斯觀涅ト子人揚皮ノ苦味アルヲ擇ミ
 散劑トシ熱病ニ用テ當時ノ患者五十人許ヲ治ス
 又高明ノ内科百可寧ベコニン及ギ近來揚皮ヲ用テ血液腐
 敗ノ諸病ヲ治シ虛衰ヲ挽回シ幾多ノ熱病ニ大効
 ヲ得。當時ノ患者二十人許皆回復セリ大學師傑ゲ蘊ン

私ハ伏兒ホ斯ル甸ト亦是ヲ熱病ニ用テ多シ治驗ヲ得タ
 リ○楊皮及其花絮收潘ノ効ヲ稱シ和蘭ニ於テ第
 謨ハ斯ト觀ト涅ト名始テ楊皮ヲ幾那ニ代用シ其後斯觀涅
 瓦祿カ收シ斯ス群須キ斯ス華爾ハ列レ兒ト勃圖ボ會ト斯ト人共名皆親ク質
 驗メ殊効ヲ稱ス○楊皮ハ拔爾撒謨性ノ苦味アリ
 然レ幹皮老枝皮ハ收潘ノ効多シ嫩枝皮ハ拔爾撒
 謨様ノ苦味質多シ故ニ四五月頃嫩枝皮ヲ採用シテ
 尤良モ按ニ嫩枝皮ノ苦味○楊皮ハ効力幾那ニ比スレ
 バ劣レ代用メ驗多シ訶倫カ人云揚皮ヲ幾那ニ代用
 ノ効アレレ幾那ノ如キ香竈質ナクノ竈透少キ故

ニ劇險危篤ノ症ハ楊皮一味ニ委テ効力切實ナラズ。又幾那ニ比スレバ收瀋ノ効多ク味亦佳ナラズ。且熱病ニハ服量幾那ヨリ多カラザレバ効ナキ故ニ毎ニ多服ノ胃腸ノ諸症ヲ發シ或長服ノ飲食消_ルヲ妨ル者アリ。故ニ是ヲ對症ノ香竈揮發劑若ハ壯神健胃ノ藥ニ加用レバ服易クノ胃ヲ妨ゲズ。假令バ桂。纈草根。山奈。菖蒲根。水楊梅根。亞的兒ノ如シ
 ○伏兒的連名云數揚皮ヲ試用ルニ幾那ニ比スレバ驅熱ノ効劣ルト雖モ血液腐敗ヲ遏ニ峻効アリ。傳洩赤痢。腐敗熱。紫斑熱。惡性。痘疹等ニ用テ精力虛

憊ヲ強健シ腐敗ノ酷厲毒ヲ除治スル經驗甚多シ
 ○服量散劑ハ一刃ヨリ一錢ニ至ル。水煎ハ四錢ヨリ一弓マデ水八弓ニ煮テ半ヲ減シ香竈藥ヲ加服ス
 ○熱病虛憊ノ症ハ揮發壯神劑ヲ加用テ良効アリ假令バ後方ノ如シ

壯神揚皮煎

揚皮 一弓半

菖蒲根 四錢

右水一斗ニ煮テ半ヲ減シ滓ヲ去冷定ノ後藥ヲ加

橙皮舍利別 一弓 揮發香竈精名 一錢半

忽布滿鎮痛液名 半錢

右調勻シ半時毎ニ一小茶椀ヲ服ス○肺藏特ニ虛弱ニノ感觸甚キヨリ欬嗽喘急促等ヲ發スル者撒兒末爾扶斯ヲ加テ殊効アリ假令バ後方ノ如シ

遏爾託亞楊皮煎

楊皮 一弓

右水二比ニ煮テ半ヲ減シ滓ヲ去リ後藥ヲ加フ

遏爾託亞舍利別一弓

撒兒末爾扶斯十二弓

右攪和シ一時毎ニ一小茶椀ヲ服ス右ノ症楊皮ニ依蘭苔ヲ加煎服ノ亦良驗アリ○潰破癌ハ楊皮煎

ニテ蒸湯ノ諸惡性ヲ抑遏シ臭穢ヲ祛キ增劇セザラシム○水癌ノ骨ヲ腐蝕スル症ハ是ヲ以テ蒸湯ノ其腐蝕ヲ遏ム水癌ハ卷ニノ十一葉ニ出ツ○潰瘍ノ纖維弛弱ニノ腐壞スル症ハ是ヲ内服外敷ノ治ス○寒壞疽熱壞疽ノ腐蝕ヲ止又一切穿蝕潰爛臭穢ノ瘡瘍幾那ヲ施ス症ニ甚驗アリ○惡厲潰瘍及破腮ハ楊皮四弓水二比煮テ半ヲ減シ蒸湯シ或楊皮越幾斯劑製法同越幾斯劑ト同ヲ玫瑰蜜ニ研和シ塗藥トノ尤良殊惡性熱ノ患者肢體破腮ヲ生メ焮痛ヲ堪ズ若ハ潰爛スルニ塗テ捷効アリ○焮腫眼ハ楊皮四錢水四

弓煮テ半ヲ減シ滓ヲ去、燒酒或阿芙蓉液一錢ヲ攪和シ温メ眼ニ點メ殊効アリ 依馬圍 福國

七葉樹皮

トチノキ俗稱 ヒツボカस्ताヌ 羅 ロスカスタニイ 又 ウイルデカस्ताニイ 蘭

近世幾那ノ經驗甚多ク稱譽日盛ニ價貴ク且姦商偽品ヲ販ク故是ヲ遠ク異邦ニ求メズ近ク自國於テ幾那ト同効ノ藥ヲ得テ日常饒多ニ施用セン
トヲ糞ヒ性味幾那ニ髣髴タル樹皮類ヲ採テ試ニ微スルト多年偶先哲七葉樹皮ヲ幾那ニ代用ノ治驗ヲ得ル說ヲ檢得シ數是ヲ試用テ殊効ヲ得タリ因

テ今其試說並經驗ノ患症ヲ左ニ略舉ス

○春月七葉樹ノ葉未敷行セザル時其枝過ダ老セズ過ダ細嫩ナラザル者ヲ伐リ皮ヲ剥取テ裏面ノ白色木様ノ處ヲ去日乾スレバ自筒卷シ形狀並收瀋苦味殆ト幾那ノ如シ唯微辛味アルノニ且是ヲ貯テ性味十年餘モ損敗セズ但細末ハ一年ヲ經スノ蛙敗スル故毎用新ニ研末スベシ○新芽及花萼モ皮ノ功カアリ○皮細末一弓ヲ取テ硝子ノ列篤兒多ニ内沙火ニテ蒸餾スレバ初淡水出ヅ漸火ヲ增バ臭油其水ニ浮ム其水及油各四錢アリ其列篤

兒多ニ殘炭ヲ燒テ灰ト爲シ水ヲ加灰汁トシ上清
 ヲ取テ熬乾スレバ固性、亞兒加利鹽半錢出ツ○皮
 末四錢ヲ取り亞爾箇兒ハ弓ニ浸テ四分時其上清
 黄色ヲ帶フ。數時ヲ經レバ黄金色トナリ味甚苦シ
 ○皮末ヲ稀キ綠礬精ニ加レバ黄色トナリ其酸味
 殆ト消ス。是制酸ノ効アル徴トス○皮末ヲ牛肉ニ
 摻ケ貯レバ腐敗セズ。既ニ敗蝕セル肉ハ臭氣消メ
 鮮肉ノ如シ○皮ヲ水ニ浸シ藥氣ヲ出シ是ニ膽液
 若ハ稠血ヲ加貯レバ腐敗セズ其血些モ溶解セズ。
 是腐敗ヲ遏ル徴トス○右試說ヲ以テ觀レバ此皮

効力幾那ト殆ト同様タルヲ知ルベシ

經驗說是ヲ以テ幾那ニ代用シ間歇熱其他諸病ニ
 治驗ヲ得テ總テ楊皮ノ如シ。服量製劑亦同シ。然レ
 楊皮ニ比スレバ胃ニ觸ルヲ必ク。飲食消化ヲ妨ス。
 但幾那ニ比スレバ服量多カラザレバ効ナシ
 ○一婦人間歇熱ヲ患ヒ發作スレバ頭痛懊悶ノ膽
 液ヲ吐。渴甚ク。殆ト昏慣ス。此皮二錢ヲ取り亞爾鮮
 水四弓ニ浸メ藥氣ヲ出シ。發作後。是ヲ用半時ヲ經
 テ芳香健胃ノ飲劑ヲ與フ。是ニ由テ胃ノ諸症ヲ發
 セズ。翌朝及其夜。前法ノ如ク用テ三劑ニメ治ス

○一匠工。間日熱ヲ患フ。下劑ヲ與テ胃腸ヲ清刷シ此皮末半錢宛用_レ一日三次。翌日其熱稍減ス。然_レ正每服腹痛ヲ發スル故_ニ是ヲ休メ。此皮二弓。酒石鹽一錢。水一斗半ヲ以テ煮テ一斗ト爲シ滓ヲ去。毎日二茶椀宛用。是_ニ由テ腹痛セズ六日ヲ經_レ正再發セズ

○一匠家。三日熱ニ罹_リ。右ノ煎劑ヲ用_レ毎日二茶椀。然_レ正其熱減セズ。因テ二茶椀宛用_レ一日三次。或四次。其熱漸次ニ減シ十日ニ全愈ス。是多服セザレバ熱毒ヲ制服スルニ足ザルナリ。○其他經驗二十餘人アレ_正大抵右所說ノ如キ故_ニ斯_ニ贅セズ。但

其中。治セザル者一兩人アレ_正此藥毫モ害アラズ。幾那ヲ用_レ正十ノ一二ハ効ナキ_レ惟_ニ足ラズ。若_シ是ヲ用_テ大便秘スル者ハ輕_ク下劑ヲ與_{ベシ}○此皮。疼痛及_レ往來熱等ニ効アル_レ亦幾那ノ如シ。一少年。吐糞病ヲ患_レ腹痛極_テ劇シ此皮末ニ舍_セ電_イ阿芙蓉液ヲ加_ル與_テ其疹消散セリ

○一婦人二十一歳體稟膽液過多。偶忿怒ノ後。經閉シ漸_ク羸瘦。日晡潮熱。盜汗多ク。小便上面青色ヲ帶_ヒ且_レ白色微赤ノ塗アリ。肢體瘦削日甚_シ乃_チ此皮ヲ水煎シ毎日午後ヨリ黄昏マデ二茶椀用_ト。又初更マ

テ一茶碗用ヒ。大黃浸劑條出三錢。酒石葉液一錢攪和シ。每朝四十五滴宛用テ兩次。又稀大麥煎若ハ水ニ枸櫞汁ヲ加適意ノ酸味ト爲シ飲料トス。爾後三週ヲ經テ月經通シ諸症漸輕差ヲ得テ回復セリ

○胸脇焮衝及肺焮衝ハ初發饒多ニ刺絡シ。緩和劑ノ煎湯ニ橙汁ヲ加テ適意ノ酸味ト爲シ用ヒ或是ニ海葱蜜少許ヲ加用テ痰唾ヲ咯シメ其後此皮ノ煎劑ヲ前法ノ如ク用テ多ク治驗ヲ得タリ

○一男子左腕ヲ打撲シ焮痛甚シ此皮ノ煎劑ニ石灰水ヲ加患部ヲ蒸湯ノ腫痛速ニ消散ス

○一婦人肺ノ創ヲ誤治メ惡性ノ潰瘍トナリ諸藥驗ナシ終ニ此皮ノ煎汁ヲ以テ蒸湯ノ腐穢除キ好肉生メ乾愈セリ○此樹ノ實ヲ採リ炒テ粗末シ一弓半マテ取り。水六椀ニ煮テ半ヲ減シ凡諸管纖維ノ弛虛縱緩ヨリ發スル諸失血其他劇キ脫泄ニ朝夕一椀宛用テ良驗アリ福賢

榲皮

ハハソノ又カシハ和名「ケル」
キスロビル羅「イケ」蘭

試効皮收瀋乾燥ノ効アリ收瀋ノ効殊ニ在リ内服ノ諸失血下血崩漏下利赤痢白帶下等虛症ノ諸脫泄ヲ止

○頑固ノ間歇熱ニ此皮ヲ以テ幾那ニ代水煎若ハ
 泡劑トシ服量亦幾那ノ如用テ多ク治驗ヲ得タリ
 ○收瀋ノ峻藥的當ノ諸症ニ外敷ノ殊効アリ。即諸
 出血ヲ止ルニ此末ヲ摻シ。或齒痛ヲ止メ。斷ノ腐壞ヲ
 除キ懸壅垂ノ弛腫ヲ消スル等ニ水煎ノ含漱劑ト
 シ良驗アリ○脱肛及子宮腔ノ下墜突出ハ此煎湯
 ニテ蒸湯シ若ハ水銃ニテ注入シ或腰湯トシ効ア
 リ○潰瘍創傷ヲ淨刷ノ腐壞ヲ遏メ。又纖維弛虛ノ
 好肉生セス或腐蝕ノ愈難キ等ニ是ヲ以テ幾那ニ
 代用シ水煎ノ蒸湯シ偉効ヲ奏ス○胃腸等ノ内藏

弛虛衰弱セル諸症ハ此末ニ燒酒ヲ濕シ其部ニ外
 敷ノ亦効アリ
柎實内服ノ衝動強壯ノ良藥トス。瘰癧毒諸腺ニ壅
 塞シ瘰癧結腫ヲ生ノ肢體羸瘦スル症及小兒此症
 ヲ患ル者ハ柎實ノ皮ヲ去リ炒焦ノ末トシ一匙ヲ
 取テ沸湯ハ弓ニ浸シ。一日ニ服ノ多ク治驗ヲ稱ス
 或沙糖ヲ加甘美トシ用フ叔福 叔依
柎耳ハバソタケ俗稱「ボレテウスイグナリウス羅
 エイケンスワム蘭」○是ハ柎ノミナラズ蒲那
 榆梓等ノ樹栴其質柔ニ革ノ如シ外面ノ硬被ヲ
 皆通シ用フ
 去リ槌ニテ打テ軟ニシ貯フ○創傷ノ剝キ出血動

脉傷。肢節截斷等ノ創口迸血止ガルニ貼ノ捷効アリ。其法此皮ノ小片ヲ取テ創中ノ出血セル血脉ニ緊貼シ。次ニ其差大ナル片碎ヲ蓋貼シ。次ニ最大ナル片碎ヲ蓋貼メ適宜創口ニ填充セシメ縛帶ヲ施スナリ。或云劇キ出血ハ水棉ヲ取テ熔解セル蠟ニ投メ浸シ絞テ創ニ貼スレバ止血ノ効尤捷ナリ。○衄血ハ榭耳ヲ適宜ニ截テ條ト爲シ鼻孔ニ挿テ即効アリ。○初生兒ノ誤テ臍帶ヲ牽離ス等ニテ出血止ス諸藥効ナクメ死スル者アリ。此症ニ榭耳ノ一片ヲ創口ニ當テ牢著ノ蓋膏ヲ貼シ縛帶ヲ施セバ其血速ニ止ム。依叔 叔福

榆皮

ユルミカムペストリス
イペンボム又ガルムボム蘭

春月此樹ノ細枝ヲ採リ外粗皮ヲ去リ裏皮ヲ用フ

但甚ダ細嫩ノ梢枝ハ効ナシ。藥舖清雅云。舶來アリ。榆白皮ト呼ブ。白皮ニ

非ズ。外皮モアリ又和産アリ

試効 皮收瀋シ愈創發汗ノ良藥トス。疥癬及乾癬甚久ヲ經ガル症。其他皮膚病ニ大効ヲ稱ス。或極テ頑惡險重ノ疥癬。水銀劑及吐涎法ヲ施セテ治セザル症ニ後方峻効ヲ稱ス。

榆皮排毒煎

榆皮 八弓

水 四升

右煮テ半ヲ減シ滓ヲ去朝夕八弓宛數日連服ス但
 慢火ニテ久煮^レ勿^レ甚ダ稠粘トナレバナリ○列
 乙^イ孫^シ人^人云。乾癬。頑癬。疥瘡。惡厲。頭瘡。癩瘡^雁等。經久頑
 固ノ皮膚病。對症ノ藥劑ヲ用^テ驗ナク。終ニ水銀吐
 涎法ヲ施^ノ治セザル症ニ此藥ヲ試用^テ治驗ヲ得
 ル者。勝^テ算ヘ難シ。予是ヲ用^ルニ加味ノ品ナク此皮
 四弓ヲ取り。水四升ヲ以テ煮テ半ヲ減シ與^フ但^レ是
 ヲ用^テテ多クハ大便秘閉スル故^ニ時々緩下劑ヲ兼用
 ス。濃煎スレバ藥汁稠粘ニシ味惡シ。右ノ如ク煎ス

レバ服シ易シ唯稍收瀟味アルノ^ニ。是ヲ越^キ幾^キ斯^ス劑
 ニ製スレバ殊ニ收瀟ス○是ヲ用^テテ良効アル症ハ
 初^ニ其瘡増發シ長服スルニ隨^ヒ漸ク乾愈ス。此藥速
 効ナキ故ニ功ナシト^シ廢棄スル者アレ^レ凡^レ十分長
 服スレバ効驗必ズ切實ナリ但其毒殊^ニ深キ者ハ一
 旦治スレ^レ凡^レ再發ヲ防^グ爲^スニ春秋ハ數日此煎劑ヲ
 用^テテ盡ク其毒ヲ淨除スベシ 依 貨

瑞香

ガニシバリ^コセウノキ^ナツボ^ツ花^ノ名^ヲ曰^ク
 フ子^ヲメ^レア^メセ^レハ^ハ羅^ハフ^ルボ^ハ蘭^ノ

形狀 高二三尺ノ灌木ニシテ數枝ヲ分^ク葉ハ花後^ニ生^シ

狹長ニノ末尖。冬月凋落セズ。春月筒様四瓣ノ赤花
 ヲ開キ或白花アリ三花宛攢生シ枝梢長穂ヲ爲シ芬香
 ナリ。花後圓實ヲ結ブ初、綠黄色。熟スレバ殷紅。終ニ
 乾皺黑色トナル。肉ニ汁多シ肉ハ毒ナシ裏一圓核アリ
 嚼食ヘバ味不佳辛辣。口舌咽喉ヲ侵刺ノ焚カ如ク
 大ニ燥渴シ劇水瀉シ若ハ吐シ胃腸熾衝ヲ發ス。○
 樹皮ハ薄ク柔韌帶赤色或云帶白色外皮褐色或云帶赭色香
 氣ナシ性酷厲ニノ味辛辣口舌咽喉ヲ刺戟ス
 ○榕按ニ瑞香ハ「ダ」子。テイメレ「ア」ノ一種ナリ
 瑞香ハ實ヲ結バザル故是ニ確當セズ瑞香ノ一種花戸ニ「オ」ニシバ

リト呼ブ者。花淡黄ナレ。皮實及皮ノ性味一般ナ
 リ。故ニ瑞香ヲ總稱トシ花戸ノ名ヲ揭テ藥用ノ
 本種ニ充ツ。白瑞香亦此類ナリ。蘭山啓蒙云。甲州
 ニテ「オ」ニシバリト呼ブ者アリ。花戸ニ誤テ胡椒
 ノ木ト呼ブ。葉ハ瑞香ニ似テ薄ク色淡シ。春四瓣
 ノ黄花ヲ開キ。後圓實ヲ結ブ。夏月熟メ色赤シ。故
 越後ニテ「ナ」ツボウズト呼ブ。又云花戸「コ」セウノ
 木ト云アリ。小木ニメ葉ハ瑞香葉ニ異ナラズ。春
 枝梢ニ四瓣ノ白花ヲ開ク形亦瑞香花ニ同シ。後
 圓實ヲ結ブ。熟メ赤シ味辛クメ毒アリ。食スレバ

半日許煩悶ス是白瑞香ナリ

試効皮ヲ藥用トス。幹。大枝及根ヲ剥取乾シ用フ。細枝皮ハ氣味薄ク効力弱シ性酷厲侵蝕シ過用スレバ吐下シ胃腸焮衝ヲ發ス。○水煎内服ノ汗ヲ發シ小便ヲ利シ徽毒ノ骨疼潰瘍及痛風ニ徽毒ヲ兼ル症。夜分増發スル骨疼。或骨腫。腐骨疽等ニ大効アリ。○服量半錢ヲ取水六比ニ煮。減メ四比トシ初半分ヲ一日ニ服シ漸ク其量ヲ加用フ。若瞑眩ノ症アル片ハ醋等ノ酸收ノ品ヲ與レバ治ス。○右ノ諸症ニ後方良驗アリ

瑞香發汗煎

瑞香皮

甘草剉

各二錢

右水十六弓ヲ以テ先瑞香皮ヲ煮テ一匕ト爲シ。甘草ヲ加火ヲ下シ瀝テ滓ヲ去リ。一小茶椀宛服スル。一日四次。○此皮ニ薩爾沙根補山牛蒡根。甘草等ヲ加テ煎劑トシ用テ惡厲潰瘍。頑固瘡瘍。其他右ノ皮膚病及徽毒諸症。痛風等ニ偉効アリ。次ノ二方共ニ良驗ヲ稱ス

瑞香解毒煎

瑞香皮

蜀羊泉莖

各一錢半

山牛蒡根 二三

右劉調勻シ水四十ヲニ煮テ半ヲ減シ滓ヲ去服ス

瑞香排毒煎

羊蹄根 山牛蒡根 各一ヲ

瑞香皮 甘草 各四錢

右劉調勻シ水三升ニ煮テ半ヲ減シ滓ヲ去リ服ス

○瑞香根ノ煎劑解凝ノ奇効アリテ微毒諸症殊ニ骨腫様ノ硬腫ニ治驗甚ダ多シ此症水銀劑ヲ以テ消散シ難シ然レ骨質腫起セル者ハ殆ト是ヲ疏散スル藥劑ナク其骨腐蝕ノ碎片トナリ除去ルニ非

レハ治セス但骨膜ノ盈息腫脹スル硬腫其他斯ノ如キ類ノ腫ハ此藥大効アリ骨膜腫ハ微毒ヲ夾ム者殊ニ多シ或微毒諸惡症治ノ後遺滯セル壅塞硬腫ハ此藥ノ解凝ノ峻効ヲ以テ治スル者甚ダ多シ左ニ其治例七則ヲ略舉ス

第一一婦人十八歳未月經ヲ見ズ五月初旬微毒ニテ咽喉腫痛シ右側ノ過滿^ア埴^マ兒^レ懸壅垂^ルノ左右^ニ兩側ノ腺ナリ^リ焮腫ノ潰爛シ小便淋痛肛門ノ邊圍ニ無花果腫ヲ生ス其形無花果ニ似^ク乃^チ白降汞ヲ用^ヒテ輕吐涎シ八月中旬ニ至テ諸症漸解散ス唯咽喉焮腫初ヨリ依然ト

ノ減セズ。因テ左ノ劑ヲ與フ

瑞香消毒煎

瑞香根剉 二錢

水 三升

右煮減ノ二升トシ一茶碗宛數飲服ス九月初旬ニ至テ其腫殆ト消シ數日ヲ經テ全愈ス是咽喉ノ腺腫ニノ水銀劑ニテ治セザル者ナリ

第二一男子二十三歲淋疾下疳咽喉腐爛辜丸腫等ヲ患ヒ醫療ヲ加治ノ後一年許ヲ經テ前症再發ノ愈サルヲ既六週乃白降汞ヲ用テ五週ニノ諸症解散シ唯辜丸腫在再トノ消セズ。因テ左ノ方ヲ與フ

解凝瑞香煎

瑞香根

甘草 各一兩

水 十五升

右先瑞香根ニ水ヲ加磁罐ニ入蓋閉セズ文火ニテ煮減ノ十升ト爲シ甘草ヲ加瀉ノ滓ヲ去リ半升宛服スルヲ日四次是ニ因テ患者嘔氣ナク飲食消化ヲ妨ルヲナシ。若瑞香根ノ量ヲ增加レバ辛味ニ堪ズノ嘔氣ヲ發ス患者是ヲ用テ三週ニノ辜丸腫全治セリ○右經驗ヲ以テ觀レバ此根ハ水銀劑ノ功ナキ黴毒腺腫ヲ疏散スル特效アルヲ顯然タリ。然

ハ徽毒ニ非ズト雖モ幾多ノ壅塞結腫ノ諸藥効ナク水銀劑ヲ用テ疏解セザル症ニ此藥ヲ與テ解凝ノ効ヲ徵セント欲シ尚是ヲ試用テ治驗ヲ得ルル必カラズ。即左ニ其一二ノ治例ヲ略舉ス

第三 一男子三十九歳。髓痛ヲ患ヒ治ノ後。二週ヲ經テ胸ノ右邊ニ硬腫ヲ生ズ。因テ解凝瑞香煎出前ヲ用テ一日ニ比。小便多ク通利スレ。汗ナク大便秘シ且嘔氣甚クノ食ヲ妨ク。然レ此劑ヲ與テ四日ニシテ其腫過半減シ八日ニ盡ク消散ス

第四 一婦人四十一歳。喉頭ノ甲狀軟骨喉結下ニ一腫

ヲ生シ漸增長シ七十日ヲ經テ卵大トナリ。是ヲ按テ移動シ。脈狀變セズ月壹平常ノ如シ。但呼吸ヲ妨ゲ食進マズ睡寐少シ。乃解凝瑞香煎ヲ與ヘ又其煎汁ニ小麥粉ヲ加テ琶布ト爲シ腫上ニ貼ス是ヲ施ス。二日許ニシテ其腫半ヲ減ス。其後患者羈旅ニ由テ此劑ヲ休ム

第五 一婦人十九歳。頸ノ右側。差後部ニ一腫瘍ヲ生シ是ヲ按テ移動シ疼ナク漸盈長ノ高ニ二拇指橫徑長六拇指橫徑。潤三拇指橫徑ニ至。一既ニ一年。其他患症ナシ。但其腫腺ニ屬スルカ若ハ筋肉ニ屬スル

カ的知シ難シト雖モ多クハ筋肉ニ著テ生スルカ
 如シ。因テ意ラク此症服藥ハ捷効ヲ得難シ。徑ニ截
 斷シ除クベシト然レテ瑞香根ノ効ヲ試ンカ爲ニ其
 煎劑及琵琶布ヲ施ス。前説ノ如シ又其煎汁ヲ蒸漏
 藥トシ施ス。十四日ニシテ其腫較著ニ減メ皺縮シ
 爾後其劑ヲ連服スル。三月餘其腫逾減メ粟大ニ
 至リ其他些モ患症ナシ。因テ患婦大抵治セリトシ
 此劑ヲ休ム

第六一男子二十八歳。右ノ耳腺耳下ノ皮裏ニ在ル腺ナリ唾管是ヨリ一腫瘍ヲ生スル。既ニ半年。其後二月ヲ經テ又

左ノ耳腺ニ一腫瘍ヲ發ス。右腫長二拇指横徑。潤一
 拇指横徑。左腫長一拇指半横徑。潤一拇指横徑。是ヲ
 按テ移動シ俱ニ疼アリ。津唾大ニ減ス。然レテ嚥下ヲ
 妨ゲズ。脉平常ノ如シ。乃解凝瑞香煎ヲ用。前法ノ
 如シ。患者嘔氣ヲ發ス。是ヲ用。二十日ニシテ右腫
 收縮シ。又二十日餘ニシテ其腫半ヲ減ス。但レ左腫ハ仍
 依然タリ。故ニ患者服藥ヲ厭ヒ。此劑ヲ休ム

第七一男子。右ノ耳腺硬腫ヲ發ス。乃下劑ヲ用。後
 解凝瑞香煎ヲ用。レバ輕下利シ。且發汗シ。十日許ニ
 メ其腫消散セリ。○右ノ經驗説ヲ以テ觀レバ此藥

凡腺腫其他頑固ノ硬腫ヲ疏解ノ從前効驗著實ナル諸藥及水銀劑モ功ナキ症ヲ治スル一實ニ卓異ノ解凝藥トス。後來逾是ヲ歷試シ効用ヲ推廣スル片ハ尚幾多頑固淹滯ノ諸症ヲ治スベシ。且此藥ハ腫瘍ノ增長盈息スルヲ抑遏減殺スル効力アリ故是ヲ用テ其腫過半減スル一速ナレ其後ハ効力緩慢ナル者アリ是ヲ以テ新發ノ腫ハ此藥ノ効力殊彰著ナリ。○此藥ハ一種ノ酷厲毒アル故ニ是ヲ服ノ嘔氣ヲ發シ或瀉下シ若ハ發汗ス。即其酷厲毒ノ刺戟衝動ニ因テ細管纖維ノ運動ヲ增進驅逐シ

其壅塞硬結ヲ疏解スルナリ。
 ○瑞香皮ヲ外敷メ侵蝕シ發泡化膿メ酷厲ノ洩_乙ヲ流泄ス故是ヲ打膿法_名トシ施メ惡液ヲ排泄シ尋常打膿法ノ効アル經久頑固ノ頭痛眼疾耳聾久效腰體痛股胯痛腕臂痛脚痛及痛風等ノ遷延病ニ秀偉ノ功ヲ稱ス。是ヲ施ス部位ハ項窩顛顛臂脛其他尋常打膿法ノ部ト同シ。_{是ヲ施メ効アル諸病及部位名打膿法ノ條ニ舉}參考ス生鮮皮ハ効力峻捷ナリ。_{或云是ヲ醋乾皮ヲ}施スニハ醋若ハ水ニ浸ス一五六時ニ取出シ截テ二三分許ノ方形ト爲シ貼メ粘固硬膏ヲ益貼ス

大抵六時若ハ十二時中ニ發泡ノ潰爛シ一兩日中
 ハ殊ニ酷厲液夥ク漏泄ス但、毎日一次若、ハ兩次此
 皮ヲ更換ノ貼シ數日施メ長ク惡液ヲ排泄セシム
 ベシ。或、數處一齊ニ是ヲ施シ或、胸部ニ貼メ些モ害
 ナシ○資稟感觸甚鈍ナル人ハ是ヲ貼メ潰爛シ難
 ク乾愈シ易シ。此症ハ先、芫菁膏ヲ貼シ發泡メ後此
 皮ヲ貼スベシ或、潰爛スレバ惡液漏泄少クメ速乾
 其貼スル皮濕潤ヲ失者ハ大麥煎其他適宜ノ飲液
 ヲ多ク與、血液ヲ津潤シ釀膿軟化ノ膏藥ヲ貼メ膿
 ヲ成シムベシ○此皮ヲ貼メ厚痂ヲ生シ膿ヲ釀セ

ス惡液漏泄セザル者ハ其痂ヲ截去リ拔實栗格膜
 膏名其他化膿ノ軟膏ヲ貼メ膿ヲ釀スベシ○其惡
 液漏泄過多及、酷厲ニ傍邊ノ皮膚ニ浸淫シ赤爛
 腫痛ニ堪ザル者アリ。此症ハ此細枝ノ嫩皮ヲ貼シ
 或、是ヲ貼メ數、更換セズ或、其部ノ傍圍ヲ冷水ニテ
 數、洗淨シ羯布羅膏ヲ擦テ治スベシ○經久ノ嫩腫
 眼ニ此根皮ヲ耳後ニ貼シ發泡メ汚液ヲ排泄シ多
 ク治ス○肺ニ酷厲液アリテ刺戟シ咳嗽經久治セ
 ガル者、此皮ヲ臂ニ貼シ化膿セシメテ良驗アリ○
 或、此皮ヲ貼メ其液ヲ血中ニ吸收シ發熱頭痛シ或、

感觸甚人ハ粟胞ヲ發ノ搔痒ニ堪ザルアリ此症
 ハ速此皮ヲ去清凉下劑ヲ用テ治スベシ。或云右ノ
 如キ患害アル故ニ尋常打膿法ヲ施メ尤切實トス
 瑞香實味辛辣ノ酷厲毒甚シ是ヲ用レハ劇水瀉ス
 故水腫ノ停水ヲ下スニ用者アレハ動輒ハ胃腸厥
 衝ヲ發スル故ニ其効切實ナラズ
福依依福

寄生

ヤドリキ俗稱 ヒスキス羅
マレシタケシ蘭

諸樹ノ寄生皆用ベシ殊多ク擗寄生ヲ藥用トス。榛
 樺。栗。菩提樹ノ寄生亦多ク用フ幹枝葉共ニ採陰乾

シ貯フ。香氣ナシ微不佳ノ味アリ括云寄生効力
 試効 神經ヲ強壯スル効アリテ麻痺毒ヲ兼ヌ。故ニ
 一種ノ神經藥ニシテ鎮痙ノ良効ヲ奏シ汗ヲ發シ蟲
 ヲ殺シ痲。痙攣搐掣ノ諸症。頭眩暈等ノ神經病ヲ
 治シ痲不遂ニ亦間驗アリ。續草根。橙葉。阿芙蓉。麝香
 等ノ壯神衝動藥ヲ加。或阿魏ヲ加。鎮痙ノ効ヲ扶テ
 殊驗アリ。○痙攣搐掣ノ運動アル症ハ雙鸞菊越幾
 斯劑。亞鉛華。硃砂礬補等ヲ加用テ偉効アリ。○數發
 作往來ノ間歇アル痙攣搐掣ノ諸症子官衝逆依剥
 時々發動スル輕キ痲症ニ多ク治驗ヲ稱ス。但劇盛

險重ノ痢疾ニハ峻効ナシ○搗掣様ノ運動時日ヲ定テ發スル症ハ幾那ヲ加テ的効アリ○凡諸管纖維ノ弛虚緩弱ヨリ發スル諸病諸液脱泄過多ノ症ニ良驗アリ○服量細末ハ一時半毎ニ半錢ヲ用フ。泡劑浸劑ハ此藥一弓ニ水六弓ヲ加製ス。或水煎シ用フ或云未トシ三時毎ニ二弓ヨリ一錢マデ然レ用テ痢及ヒ痙攣ノ諸症ニ間効ヲ得タリ長服スルニ非レバ効ナシ

○此樹實ハ味辛苦大ニ瀉下ノ胃腸燥衝ヲ發ス。但外敷ノ腫瘍ヲ膿熟スル効アリ

依叔 叔括

胡桃

イググラニスレギア羅
オックルノト蘭

試効未熟綠實殺蟲ノ偉効アリ。是ヲ越幾斯劑トシ一味用テ瀉下シ虻蟲ヲ剿絶ノ驅泄ス。小兒ハ茶匙ニ二三抄宛與大人ハ其量ヲ増ス。或後方ヲ用フ

桂桃驅蟲飲

胡桃綠實越幾斯劑 二錢

桂水 四錢

右調勻ノ溶化ス。二三歳ノ小兒ハ二十滴ヨリ三十滴マデ用フ。或云二三歳ノ兒ハ五十滴宛毎日用ヒ六日若ハ八日ヲ經テ下劑ニ水銀劑ヲ加用フ甘汞等

胡桃綠實越幾斯劑 **製法** 未熟綠實ヲ採リ桶ニ入

沸湯ヲ加、搗テ其汁ヲ取、鍋ニ内、文火ニテ煎蒸ノ稠
厚ノ越幾斯劑ト爲シ貯フ。味酸ヲ帶テ收瀋ス

○鷲口瘡、口中瘡、胞潰爛、咽喉焮腫等ヲ消散スルニ
未熟綠實ヲ水煎シ若ハ越幾斯劑傑列乙等ニ製シ
漱劑トシ良驗ヲ稱ス

胡桃實綠皮 微毒種々頑滯ノ諸症ニ實綠皮ヲ用テ
的實ノ捷効ヲ稱ス。假令ハ後方ノ如シ

胡桃排毒煎

胡桃實綠皮 一弓 沸湯 一北



右磁器ニ入、蓋閉シ浸テ三時。又煮テ八分時。滓ヲ去

此量ヲ毎日、服量トス。若シ其綠皮ナキ時ハ此皮ノ越
幾斯劑製法綠實越幾斯劑ト同ニ水ヲ加、稀シ用、ベシ微毒潰瘍

ハ此綠皮ノ煎劑ニテ蒸湯ノ治ス

胡桃核皮 外皮ノ裏面ニ被皮ニ 苦味香氣アリ、虛寒風氣痞

滯、疝腹痛、痙攣運動ヨリ起ル腹攣痛等ニ殊効アリ。
是ヲ燒酒ニ浸用ヒ或末トシ半錢宛用フ但焮衝性

ノ熱症ハ害アリ

胡桃仁 甘美無毒。温煖滋養ノ効アリ。但過食スレバ
重滯ノ消化シ難シ膽液過多ノ人ハ殊ニ害アリ

胡桃油 新鮮ノ仁ヲ搾取ル。製法甘扁桃油名ト同シ
味甘美。飲食ニ調和シ乳酪ニ代用ス。内服ノ緩和滋
養ニ且驅蟲ノ効アリ性功甘扁桃油。阿利襪油ノ如
シ。○外敷ノ緩和シ諸疼痛攣急ヲ鎮メ腫瘍ヲ消散
シ毛髮ヲ生ノ脱落ヲ防護ス。○角膜ノ白斑ニ此油
ヲ點ノ能消散ス。此油稍澁敗スト雖モ此症ニハ害
ナシ依叔 淑羅

甘草

グレイセイリサ羅
ストホウト蘭

試効 甘味ノ粘液ヲ含下甚多キ故ニ酷厲液ヲ甘和

包攝シ刺戟疼痛ヲ鎮止シ攣急ヲ緩解シ燥涸ヲ滋
潤シ彊硬ヲ縱弛スルニ超羣ノ効ヲ稱ス。○冒寒傷
冷毒ノ酷厲液。肺氣管ヲ侵刺ノ攣急シ且滑液津潤
ヲ失テ乾欬喘息聲啞咽喉痛。胸脇痛等ヲ發スルニ
是ヲ用テ効多シ故ニ冒寒ノ諸症ニ多ク用フ。○凡
酷厲毒神經ヲ侵刺毀傷ノ疼痛スルヲ和撫甘解ス
ル一良藥トス故ニ胃腸腎膀胱尿道ノ欬衝痛。其他
内部諸欬衝ヲ寬解ス。○肺欬衝ハ初發此藥ニ葵根。
麗春花ヲ加用ヒ其欬衝漸ク退ニ隨ヒ茴香。加密列。
接骨木花等ヲ加用終虛憊ノ症ヲ見スニ至テ亞兒

尼^ニ加^カヲ加、衝動健運ノ治スベシ。○麻疹及諸熱病様ノ症ニ乾效ヲ發シ患苦ニ堪ザル者ハ適宜ノ緩和劑ニ甘草ヲ加用テ適應ス。○酷厲毒ノ刺戟ノ發スル尿道諸病。劇キ小便淋瀝頻數。及黴毒淋。腎痛石淋。小便血ヲ交ル症ヲ治ス。○酷厲毒ヨリ發スル遷延性ノ疼痛假令バ痛風傷冷毒痛。黴毒痛。及諸皮膚病ノ刺戟毒。瘡瘍ノ痛痒甚キヲ寛解ス。○經久傷冷毒痛ニ茴香排毒散亦効多シ。方。後茴香條ニ出○淹滯セル赤痢下利。其他斯如キ胃腸病ハ其壅滯セル病毒ヲ滌除ノ後對症ノ藥劑ニ多ク甘草ヲ加用テ其剝脫セ

ル滑液ヲ滋生シ枯燥ヲ津潤シ孿急ヲ緩解ノ治スベシ。○緩和滋潤劑ヲ用ル症ハ甘草ニ大麻子。亞麻子。罌粟毬。蘆根等ヲ加。或甘草膏。度祿布名ニ製シ用テ尤良。○煎劑ハ甘草一弓ニ水二比半ヲ加煎服ス濃煎スレバ胃ニ重滯ノ嘔氣ヲ生シ服シ難シ。多ハ他藥ヲ加用フ但其劑ヲ煎了リテ甘草ヲ加火ヲ下スベシ否サレバ味佳ナラズ。又過用スレバ胃ヲ緩弛スルヲ甚メ消化ノ機力衰廢シ粘液留飲ヲ生メ食欲ヲ減ス。○是ヲ舍利別トシ用ルモ亦良。

甘草舍利別

製法甘草汁ヲ取リ甘草膏名ノ如シ

適宜ニ沙糖ヲ加煎熬ノ舍利別ノ稠ト爲ス主治甘
草膏ノ如シ 福依伍 叔淑

番木鱉

マチン 俗稱 ストレ井クノス
ヌキス ホミカ 羅カラシクノ蘭

是ハ「ストレ井クノス」コト云、樹ニ生ス此
樹錫蘭島セイロン 印度、麻辣拔爾マラバール 印度西南、哥魯漫得爾コロマンデル 印度東南
海濱等、印度地方ニ自生シ甚ダ高大ニ幹圍一丈
二尺許、其實圓ク杏ノ如シ熟スレバ美黃色硬皮被
ヒ裏ニ柔白ノ穰アリ是ニ八個許ノ核仁アリ此即
番木鱉ナリ扁圓淡灰色柔毛アリ裏堅剛ニノ角ノ

如ク味苦シ

試効 大毒アリ一二錢服スレハ死ス 禽獸亦一二乃同シ

服スレハ冷汗頭眩暈顫振昏冒搐掣等ヲ發ス○
然レ此少服スレバ催睡麻痺鎮痙ノ効ヲ奏ス或云
其効阿芙蓉ノ如シ然レ阿芙蓉ヲ是ニ比スレバ起
熱乾燥ノ性多シ○粘液質ノ人寒粘液壅滯シ諸管
纖維縱緩弛虛膽液虛乏ノ衝動排泄ノ機力ヲ失ヒ
粘液留飲鬱蓄セル等ノ虚弱ノ諸症ニ多ク治驗ア
リ○此藥近來頑固ノ間歇熱ヲ治スル一奇藥トス
然レ切實無危ノ功ヲ確證シ難シ但幾那ヲ用テ驗

ナキ症ハ幾那劑ニ此越幾斯劑ヲ兼用ノ効多シ○
扶歇蘭度名其他醫家ノ經驗ニ是ヲ赤痢ニ用テ殊
効ヲ稱ス後方尤驗アリ

番木鱉消毒飲

番木鱉越幾斯劑 十匁

接骨木水名 六匁 亞刺比亞護漿名

過爾託亞舍利別名 各一匁

右調和シ一時毎ニ二匙宛服ス○或此藥ヲ丁幾劑
トシ前說ノ諸病ニ用テ良驗ヲ稱ス

番木鱉丁幾劑

製法

番木鱉

細末 一匁

燒酒再餾者四匁

右調和シ浸メ藥氣ヲ出シ漚メ渣ヲ去リ聽用ス此
劑五滴ヨリ漸ク加テ百滴ニ至ル。瞑眩ノ症アレバ
其量ヲ減ス

番木鱉越幾斯劑製法。健質亞那越幾斯劑名ト同シ

服量細末トシ二三匁ヨリ五六匁ニ至ル。其質甚ダ

堅硬ナル故ニ鑿屑若ハ刮テ粗末ト爲ス者多シ是
ヲ用レバ胃腸ニ懸留メ消化セズ危篤ノ諸症ヲ發
ス。扶歇蘭度名是ヲ十匁宛日三次用テ記スト雖
モ甚タ過量トス殊ニ粗末ヲ用レバ害アリ。故是ヲ

用_ルニハ刮_ラス炙_ルヲナク極細末トシ若_ハ越_キ幾_キ斯劑トシ粘滑緩和ノ諸品或_ハ亞_テ的兒_ル阿芙蓉等ヲ和_シ用_ベシ 華_依叔_依伍

藤黃

「ギウム」ニ「ギウツタ」又「ギウツタ」ガムバ羅「ギウツ」テゴム蘭

採修是ハ印度地方ニ産スル一種ノ樹ヲ鑽刻ノ出_ル脂液ヲ曝乾ノ凝固スル者ナリ其樹花生セントスル時幹皮ヲ鑽刻スレバ乳様ノ液滲出シ稠厚ニ_テ列_レ竝_レ底_ナ如_シ或_ハ火氣ヲ以テ其滲出ヲ助_ト云_{其樹ヲ}カ_ムボ_ギア_又カ_ムバ_ギア_ト名_ク或_ハゴ_ツタ_ピリ_カル_カカ_リゴ_ムキ_ツタ_ボム_ギウ_ツテ_ゴム_ボ

名_ム等_ノ○其樹三種アリ一種ハ喬木ニノ幹巨ク圍_ハ八尺ヨリ一丈二尺許大約二人合抱スベシ其材帶_白色皮微赤裏面黃色粗皮黑色ヲ帶フ稍頂_大枝繁_茂シ廣ク敷_行ノ傘狀ヲ爲_ス葉橢圓本末尖リ厚硬_ニノ枝條ニ對生シ面黯綠背淡綠ニノ筋脉隴起シ短柄アリ味酸澁ナリ花及萼四瓣黃赤色香氣ナシ鬚蕊淡白色蕊頭黃色一心蕊ヲ圍ム花謝ノ圓實ヲ結_フ大_及形_橙ノ如クノ稜起瘡癩多シ_條理_{八九}初_綠後黃熟スレバ白色ヲ帶_フ頂ニ小突起アリ味酸_{中心}八室アリ各一仁ヲ收_ム稍長ク扁ク大指節ノ

如シ青黑色。生乾共ニ食フベシ。此樹錫蘭島及麻刺
拔爾ニ産ス。○一種ハ其樹前種ノ如クニメ葉圓ク
肥厚。實ノ形及大梅李ノ如ク肉粘滑甘美食ベシ。中
心四個ノ小仁アリ。此樹ヲカンナゴウカト名ク。錫
蘭島ニ産ス。○一種ハ其樹中等ニメ甚大ナラズ大
抵前種ノ如シ。暹羅及錫蘭島ニ産ス。其枝葉ヲ破碎
メ黄汁ヲ取り暴乾メ藤黄ヲ製ス。此樹ヲキツタア
ヘラヘラト名ク。○亞墨利加洲ノ墨是可加兒涅島
等亦是ヲ産ス。凡皆下品ニメ藥用ニ勝ス。或龍骨
木脂汁ヲ以テ偽製スル者アリ。

○榕按ニ藥舖ニ盤樣辨天印ノ二品アリ。辨天印
多ハ上品ナリ。竹筒ニ入乾ス者ナリ。蛇ノ蟠屈セ
ル如シ。是漢人所謂竹管黄ナリ。盤樣ハ多シ。塵雜
下品ナリ。江戸藥舖說藥只亭 四郎齋盤樣大塊ノ者ハ外
面。竹籠紋アリ。碎ハ全塊。色一様ナラズ。眞黄色。處
帶紅色。處光彩多キ。處帶黑色。處アリ。是其製煉ノ時
小鍋ニテ煎熬シ集テ一大塊ヲ成者ナルベシ。猶
黒糖ヲ小鍋ニ煮。三次ニ一大桶ニ納ル故一桶。黒
糖色ノ濃淡。質ノ美惡必ス三等ヲ分カ如シ。

撰品 藤黄其質護謨華爾斯ナリ。上品ハ大塊ヲ成シ

硬固ニノ破碎シ易ク。能キ淨潔光澤アリテ透亮
 ナラズ雜腹蘭色。然レ水ニ溶セバ美黄色トナル。香
 臭ナシ嚼メバ粘稠ニノ初味ナク。後漸辛ク口中乾
 燥ス。水ヨリハ燒酒ニ能ク溶化メ清澄ナリ。水ニハ溶
 解スレバ溷濁ス。剝篤亞斯等ノ亞兒加利鹽ヲ水ニ
 溶シテ此藥ヲ加レバ能ク溶化ス火氣ニテハ溶化セ
 ズ。但火ニ投スレバ焚燒ス。○下品ハ汚物沙石ヲ雜
 或斑點アリ或透明ノ小碎片ヲ爲ス者ハ皆藥用ト
 セズ多ク畫料トス

〔試効〕烈ク瀉下シ停水ヲ大小便ニ驅逐スル峻藥ト

ス又能粘液ヲ疏解ス。故ニ水腫。粘液腫等ニ用テ停
 水ヲ蕩滌スルニ駄効アリ。但患人粘液質ニノ血液
 運行緩慢ナル者。膠粘液ヲ疏解メ滌除スベキ症ニ
 的當ス。感觸シ易ク且焮衝性ノ症ハ害アリ。○服量
 二匁ヨリ六七匁マデ一服トス。八匁ヨリ多ク用ル
 稀ナリ。過用スレバ烈ク吐瀉メ腹痛スル故ニ少
 許宛數用ルヲ佳トス。○諸蟲ヲ驅泄スル峻藥トス。
 殊ニ條蟲ノ奇藥トス。他ノ下劑ヲ用テ功ナキ症ニ
 間大効ヲ奏ス。健質亞那越幾斯劑ニ加丸藥トシ用
 テ尤良。○藤黃ニ亞兒加利鹽剝篤亞ヲ加用レバ瀉

下ノ効減ノ利水ノ効多シ故ニ是ヲ水腫ニ用テ甚
驗アリ水腫ニ左ノ數方峻効アリ

藤葱驅水丸

藤黃 海葱 各一匁

白石鹼 三錢

右細末トシ研合シ三匁ヲ一丸トシ甘草末ヲ衣ト
シ五丸宛用一日四次但瞑眩ノ多少ニ隨ヒ加減ス

加羅藤葱丸

水腫及胸水腹水肢節腫ヲ治ス
藤黃 末 一匁 加羅蔑兒 十匁

藤黃 末 一匁 加羅蔑兒 十匁
藤黃 末 一匁 加羅蔑兒 十匁

次出ツ 二錢

右研和ノ三十六丸トシ三丸宛用一日三次口中腫
痛スル片ハ劑中ノ加羅蔑兒ヲ去ル

藤葱酸丸

小便ヲ利シ水腫ヲ治シ又能痰ヲ
咯出ス故ニ遷延効嗽痰喘壅盛等膠粘液過多
ノ諸症ニ奇効アリ

藤葱 末 各二錢

白石鹼 四錢 茴香油 八滴 一方去茴香
油加乾姜一錢

右研和シ二匁ヲ一丸トシ朝夕十丸宛服ス

藤英驅水膏

患者壯實水腫腹滿ノ症ニ用テ蓄
水ヲ驅泄スル峻効劑トス

藤黃末 一弓半 酒石英末 一弓

乾薑末 四錢 舍利別 適宜

右合和ノ煉膏ト爲シ早朝半錢ヲ服ス

華利依 淑福叔

新訂增補和蘭藥鏡卷十三終



