



新訂
和蘭藥鏡

卷十五

ヤ 3
968
10



968
10

新訂增補和蘭藥鏡標目

卷十五

蒲公英

蒲蘆解凝飲

蒲公英苗香飲

蒲公英薄荷飲

蒲鸞排毒丸

蒲蘆排毒飲

蒲公英越幾斯劑

白屈菜

白屈菜越幾斯劑

屈鹼解凝丸

紫堇

紫堇解凝丸

白屈海葱飲

苦味健胃酒

紫黃解凝丸

增訂和蘭藥鏡

卷十五

標目

風雲堂藏

五車二月廿日寄
止前田突氏贈

本草綱目卷之五 紫堇 舍利 利 紫堇 舍利 利

紫堇越幾斯劑

紫堇舍利別

濱瞿麥

瞿麥解凝飲

黃石瞿麥飲

濱瞿麥越幾斯劑

土茯苓

薩苓排毒煎

沙列布

沙列布潤燥飲

沙列布吉利詞參兒

綿馬

蘇永驅蟲膏

綿馬驅蟲膏

黃豆

曼陀羅花

曼陀羅花越幾斯劑

曼陀羅花丁幾劑

煙草

煙草解凝飲
煙草驅水飲

煙草越幾斯劑

新訂增補和蘭藥鏡卷十五

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕 榕菴校補

蒲公英

「タンホホ」俗稱「タラキ」
「キハシ」蘭

此草。乳様ノ汁ヲ含ミ殊ニ根ニ多シ其質蘊謨華爾斯
ニノ味苦微鹹甘ヲ帶ブ此藥ノ効力專ラ此汁ニ在リ
故ニ生鮮ノ根莖葉及其搾汁ヲ取り藥用トス。乾根ハ
其汁耗散スル故ニ効力鮮シ。秋冬莖葉萌發セザル時
ハ其汁專ラ根ニ在レ故ニ是ヲ取越幾斯劑トシ貯用ヒ或
生根ヲ細判ニ沸湯ニ浸シ藥氣濃出テ茶湯ノ如ク

增訂和蘭藥鏡

卷十五

風雲堂藏

ナルヲ用。或春夏莖葉繁茂ノ時ハ生草ヲ搗其汁ヲ
 搾取リ頸長硝子壘ニ充シメ其上ニ油ヲ注内固封
 シ貯レバ速ニ腐敗セズ。是ヲ用時其油ヲ注去リ其
 汁ヲ取り服ス。

試効 解凝ノ一良藥トス石鹼樣質アリテ凝結ヲ疏
 解シ小便ヲ利ス。○粘稠凝痰ノ血液。膽液粘液等ヲ
 溶解稀釋ノ分利シ諸藏ノ壅塞ヲ疏解ス。○此藥稍
 苦味ヲ帶テ健胃ノ効ヲ兼ヌ故ニ飲食消化ヲ扶ケ腹
 内諸藏脉管ヲ健運シ血液ヲ稀釋ノ諸竅ノ分利排
 泄ヲ進ム。○血液稠厚ニノ焮衝ニ傾クヲ稀釋ス。故

血質及諸管纖維ノ運管ヲ減損スベキ諸症ニ的當
 ス。○焮熱諸症及間歇熱ハ此根ヲ泡劑トシ若ハ蘆
 根。山牛蒡根等ヲ加用テ効アリ。焮衝性ノ春月間歇
 熱ハ大抵斯如キ劑ニテ其蘊毒ヲ疏解シ小便ニ排
 泄スレバ回復ス。熱病ノ餘毒ヨリ發スル諸症モ此
 越幾斯劑ヲ用テ其毒ヲ疏解スレバ治ス。○健胃解
 凝ノ効ニ因テ腹内諸藏ノ壅塞ヨリ發スル熱病及
 遷延諸病ヲ治ス。○神思鬱憂病ヲ治シ殊ニ膽液過多
 ノ熱症ニ良。○精神錯亂ノ症。腹部諸藏壅塞ヨリ發
 スル者多シ若其壅塞ノ疏解スベキ症ハ此藥ヲ用

テ其凝結ヲ疏散ノ治スル者多シ○肝脾等ノ壅塞
硬腫ヲ疏散シ黄疽水腫小便閉ヲ治スルニ此藥ヲ
對症ノ解凝劑ニ加水煎シ用テ甚驗アリ○肝壅塞
硬腫ハ此藥ニ酸模葉或酢葉ヲ加水煎シ滓ヲ去雞子
黃ヲ適宜ニ攪和シ數週若ハ一月許用テ効多シ或
酒石英ヲ加用モ良黄疽及腹水初發ニ斯如キ劑ヲ
用テ効アリ粘液壅滯ヨリ發スル症ハ殊適應ス但
頑固險重ノ壅塞及膽液ノ結石牢著ノ發スル黄疽
ハ右ノ劑ニテ治難シ○凡胸腹諸藏經久ノ壅塞ア
リテ未頑硬腫トナラズ腐壞ノ候ナキ者此藥ヲ解

凝清血ノ劑ニ加長服ノ治ス假令バ後方ノ如シ

蒲蘆解凝飲

蘆根 二弓 瀕瞿麥根 三弓

洋芹根 茴香根 各二弓半

右沸湯ヲ加テ泡出シ其液三十弓ヲ取後藥ヲ加フ

接骨木傑列 四弓

蒲公英越幾斯劑 二弓

酒石葉四錢

右調和シ一時若ハ一時半毎ニ一小茶椀ヲ服ス或
其症ニ隨ヒ後方ヲ與ベシ

蒲公茴香飲

蒲公英越幾斯劑 一匁

孕礬酒石 四錢 茴香水 八匁

右研和シ一時毎ニ一匙宛服ス

蒲公薄荷飲

蒲公英越幾斯劑 二匁

薄荷水 六匁 白蜜 去沫者 一匁

右溶和シ一時半毎ニ一茶匙ヲ服ス○頑固ノ痛風
遷延傷冷毒痛。粘液質ノ間歇熱等ノ焮衝ナキ者ハ
左ノ方ヲ連進シ發汗ノ良驗多シ

蒲鸞排毒丸

蒲公英越幾斯劑 一錢半

雙鸞菊越幾斯劑 半錢

山牛蒡根 末 適宜

右捏和ノ六十九トシ朝夕一丸宛用フ○經久胃痛
幾多解凝劑ノ効ナキ症。此生根ヲ細剉シ泡劑トシ
用テ間速効アリ○此藥ハ諸腺ノ分泌殊皮膜ト腎
ノ分利ヲ進輸ス。故荏苒淹滯ノ瘡瘍ヲ驅逐シ小便
ヲ利ノ其毒ヲ排除ス是ヲ以テ清血ノ一良藥トシ
排毒淨汚ノ飲劑ニ加用テ殊効アリ假令後方如シ

蒲蘆排毒飲

蒲公英根

杜松木

失格列乙根

或洋蒿苗根
ヲ代用ス

蘆根

各四弓

接骨木花

茴香

洋芹子

杜松實

各四錢

右水適宜ニ加浸ノ能藥氣ヲ出シ其液百弓ヲ取り
一茶碗宛温服ス○服量生汁及越幾斯劑ハ日一弓
ヨリ一弓半ニ至ル煎劑ハ根一弓ヲ水六弓ニ煎服
ス○生根搗爛シ腺ノ硬腫ニ貼ノ消散ス其汁ヲ眼

ノ角膜星翳ニ點ノ消散ス（福）（依）（叔）（伍）

蒲公英越幾斯劑 製法名ニ出

白屈菜

セリドニキムマイトス（羅）「スチン」
ケンドゴウ（空）又「オゲンカ（ラール）蘭

○榕按ニ和名「クサノワウ」ト呼ブ原野ニ多シ是
尋常品ナリ一種大葉大花ノ者アリ花戸ニ「クサ
ヤマブキ」又山吹草ト呼ブ性効同シ共ニ藥用ニ
供スベシ

試効根莖葉共ニ藥用トス是ニ黄色汁アリ味苦辛
臭氣アリ根汁殊ニ黧黃粘稠ナリ此草乾セバ其苦

辛味咸シ解凝利尿ノ殊効アリ故ニ欸衝ナキ水腫。腹水。荏苒タル黃疸ヲ治ス。○水腫ニ用テ肝ノ壅塞ヲ疏解シ小便ヲ利ス乾根ハ二錢生根ハ五六錢用。○肝脾壅塞硬腫及萎黃病。處女病等。多ク治驗アリ。○或微毒ニ特効アル藥トシ是ヲ水銀ノ代用藥ノ如クス。根及莖葉ヲ乾シ用。或、其越幾斯劑モ亦用フ。○服量細末ハ半錢ヨリ一錢マデ一服トス水煎シ或、水。葡萄酒等ニ浸シ用フ生根ハ一弓ヲ葡萄酒十六弓若ハ二十弓ニ浸シ用フ

白屈菜越幾斯劑

製法名失越幾斯劑ト同

此根及莖葉ノ

生絞汁ハ其質。石鹼様ニノ甚。刺戟シ殆ト侵蝕ノ瀉下ス。或云瀉下ノ効藤黃ノ如シ是ヲ以テ解凝ノ一良藥トシ黃疸等ニ大効ヲ稱ス。故ニ其生汁ヲ越幾斯劑トシ對症ノ劑ニ加用ルヲ多シ。○腹内諸藏ノ壅塞及粘痰多キ肺ノ諸症ハ此越幾斯劑ニマデ一服トシ用テ偉効アリ。○内藏壅塞ヲ疏解スル効ニ因テ間歇熱及其毒壅鬱ノ發スル水腫。黃疸。其他前說諸病ヲ治ス。此劑五匁ヨリ十匁許宛苦味解凝ノ越幾斯劑。蒲公英。亞爾鮮健質。亞那。紫堇等ノ越幾斯劑ヲ云ニ加丸藥トシ用テ良。右諸病ニ左ノ解凝劑亦治驗多シ

屈鹼解凝丸

白屈菜越幾斯劑 石鹼 勿搦祭亞者 或白石鹼

薺謨安沒尼亞幾 各一錢

右研和シニ氏ヲ一丸トシ朝夕十五丸宛服ス

白屈海葱飲

白屈菜越幾斯劑 自一錢 至二錢

默栗薩水 四勺 海葱蜜 一勺

右研和シニ匙宛用一日四次○角膜曇暗星障翳膜ニ此生絞汁或此越幾斯劑ヲ水ニ溶シ點メ消散ス但是ヲ點メ疼ヲ覺ル者ハ蜜若ハ沙糖ヲ研和シ施

ベシ○眼焮腫潰瘍等ニ此生絞汁ヲ薔薇露若ハ乳汁ニ和シ點メ治ス○疣贅息肉等ニ數生汁ヲ擦テ消散シ或軟化侵蝕ノ除ク汚穢潰瘍惡厲侵蝕瘡ニ是ヲ洗藥トシ或_依布トシ貼メ淨除シ治ス_叔

紫堇 _ヤア_アケ_アケ_アマン_アヘ_アケ_アル_アフ_アル_アマ_アリ

試効 莖葉ヲ藥用トス味苦不佳ノ氣アリ且石鹼様ニメ清凉性ノ汁ヲ含メリ是ヲ以テ凝結ヲ疏解シ稠粘ヲ稀釋ノ内藏壅塞ノ諸病ヲ治スル蒲公英ノ如シ○此藥ノ鹽氣及苦味質ヲ以テ胃ヲ健運シ

蒸氣及汗ヲ發シ小便ヲ利シ微瀉下シ腐敗ヲ遏メ
 粘液膽液等ヲ分利導泄ス。故ニ失格列乙^名及蒲公
 英主治ノ諸病ヲ治シ秀偉ノ清血藥トス。○開歇熱
 ニ用テ能ク熱毒ヲ排泄シ萎黃病。粘液腫。黃疸。脾病。依
 剝昆垚兒。神思鬱憂病。痛風。脚痛風。失苟兒陪苦等ニ
 用ヒ解凝ノ殊効ヲ以テ病毒惡液ヲ諸竅ニ排除シ
 治ス。○胸脇欬衝熱ノ門脉壅塞ヲ兼ル者ハ此藥尤
 効アリ。○黃疸ニ於テ膠粘液殊ニ多ク胃腸ニ壅滯
 シ大便秘閉。腹中困重ヲ覺ル等ノ症ハ此藥ニ下劑
 ヲ加用テ峻効アリ假令バ左ノ二方ノ如シ

紫堇解凝丸

紫堇越幾斯劑 三錢

葛爾儒越幾斯劑^名 大黃 各半錢

右合和シ二匁ヲ一丸トシ桂末ヲ衣トシ朝夕十五丸宛用フ

紫黃解凝飲

紫堇越幾斯劑 三錢

大黃丁幾劑 苦味健胃酒 製法次

酒石葉液^名 各一匁 實亞格日温^名 六錢

右合和シ時々一匙宛用フ

苦味健胃酒

エルクシルヒスセラ
レホッフマンニシ

製法

橙皮 新鮮者

葛爾儒越幾斯劑

珊篤里越幾斯劑

健質亞那越幾斯劑

幾那越幾斯劑

沒藥越幾斯劑 各二錢

葡萄酒 二比

右橙皮ヲ葡萄酒ニ浸テ二日絞

テ滓ヲ去次諸越幾斯劑ヲ加溶和ス

試効 胃ヲ健運シ飲食消化ヲ扶汗ヲ發シ胃腸

粘液留飲酸敗液ヲ排除シ蛇蟲ヲ殺シ食ヲ進

メ心下妨悶苦滿風氣痞滯疝痛萎黃病脾病依

剥昆垚兒等ヲ療シ一切胃虛諸症ニ尤良

○腹内諸藏壅塞ヲ開達スルニ後方殊効アリ

牛膽紫堇丸

牛膽

紫堇越幾斯劑

藥刺巴末

各二錢

右調勻シ二尺ヲ一丸トシ十丸宛服スルヲ日三次

○結石腎痛石淋等此藥ニ大黃石鹼ヲ加用テ殊効

アリ○凡頑滯皮膚病瘡瘍皰疹焮赤瘙痒等ハ總テ

此藥良驗アリ即生草ハ絞汁ヲ取朝夕二三宛服シ

乾草ハ水煎泡劑若ハ散劑トシ用フ越幾斯劑亦良

或蜀羊泉及安質沒扭劑ヲ加テ殊捷効アリ

紫堇越幾斯劑

製法主治名ニ出ツ

紫堇舍利別

製法覆盆舍利別

ト同生草ニ水ヲ加搗絞テ汁

ヲ取り依叔福淑

濱瞿麥 花戸

ガホナリア羅セアコロイドド蘭

○榕按ニ此草海邊ニ生ス江戸花戸ニ多シハマナデシコト呼ブ。形狀瞿麥ニ似テ葉厚潤。花小サク白色或紫色アリ

試効 乾根ヲ藥用トス或葉ヲ用フ味微苦生根微辛粘滑ニノ石鹼様質アリ水ヲ加テ搗碎キ或水煎スレバ

泡沫アリテ石鹼汁ノ如シ但亞兒加利鹽ノ質ナシ
○解凝ノ一良藥トス微衝動シ發汗利尿通經ノ効ヲ稱ス○蒸氣壅遏ヲ開發シ諸液分利ノ阻滯ヲ驅逐シ粘液ヲ稀釋シ惡液ヲ淨刷ス○此藥ハ遷延病劇病共ニ壯實衝性ナラズ。虛憊脫力甚シカラザル症ニ適應ス○腹内諸藏ノ壅塞ヲ疏解ス。故ニ是ヨリ發スル諸病。即黃疸。粘液留飲病。神思鬱憂病。依剥ポ昆コン堙デ兒ル。經閉ヲ治ス○肝及肺ノ諸病ニ効アル藥トス。肝厥衝及肺厥衝ニ刺絡下劑等ヲ施シ劇盛ノ症退キ漸ク虛症ニ傾ク者。是ヲ用テ的効アリ○肝

嗽衝ノ下利シ易ノ解凝鹽類中和用難キ症ニ的當
 ス○效嗽粘痰多キ喘急ヲ治ス○胸脇痛肺嗽衝ノ
 初發ヨリ虛罷ノ惡性ノ候アリ若ハ膽液質粘液質
 等ニ傷冷毒ヲ兼ル者ハ此藥殊驗アリ○經久瘡
 瘍頑癬浸淫瘡皰疹類ノ鬱毒ヲ排除シ治ス○右ノ
 諸症ニ左ノ二方治驗多シ

瞿麥解凝飲

濱瞿麥根 二匁

過爾託亞舍利別 一匁

右先濱瞿麥根ニ水四比ヲ加煮テ滓ヲ去二比ヲ取
 舍利別ヲ攪和シ一時毎ニ一椀ヲ服ス

黃石瞿麥飲

濱瞿麥越幾斯劑 四錢

大黃浸劑 大黃 條出

加密列水 四匁

右調和シ半時毎ニ一匙ヲ服ス○此藥水煎シ用或
 越幾斯劑トシ用フ

濱瞿麥越幾斯劑

製法蒲公英越幾斯劑同シ

依叔 福伍

土茯苓

シロダイキスシナラ
シナウルトル蘭

試効 皮黯赭色。裏淡赤色。生根ハ粘液ヲ含ミ味甘ヲ
 帶フ。乾ケバ其質粉樣ニシテ氣味淡薄ナリ故酷厲毒
 ヲ緩和スル効尤モ多ク且汗ヲ發シ小便ヲ利シ。薩爾
 沙根 朴窟福烏篤 薩撒弗刺斯 山牛蒡根等ヲ加水煎
 シ用テ排毒清血ノ効ヲ稱シ。微毒。冒寒傷冷毒ノ肢
 節痛。歷節遊走痛。脚痛風。惡厲頑癬。乾癬類。或經久汚
 穢。潰瘍。瘦瘡。或瘡毒。水腫。或小兒瘡毒。潛滯ノ肢節痛。
 拘攣。羸瘦スル等ヲ治ス。殊微毒諸症。水銀劑ニ右ノ
 如キ排毒劑ノ煎湯ヲ兼用シ。毎日五六椀宛服ノ汗
 ヲ發シ小便ヲ利シ其毒ヲ排除スベシ。假令バ後方

人如シ

薩爾沙根煎

薩爾沙根 補 二弓

土茯苓 一弓

朴窟福烏篤 四錢

甘草 六錢

右件剉水八斗ニ浸テ六時ニノ煮減メ三分一ニ至

左ノ藥ヲ加フ

薩撒弗刺斯 剉 三錢

右攪合シ火ヲ下暫蓋閉ノ冷ニ至リ毛布ニテ漚シ
 服ス。○此藥ハ微毒。血液中心ニ泛漫ノ未諸骨ニ潛結
 セザル症ニ効アリ。○朴窟福烏篤 瑞香皮等ノ辛辣

酷厲質ヲ抑制スルニ多、此藥ヲ加水煎シ用フ。○服量此藥一弓若ハ一弓半ニ水五六升ヲ加、煮減ノ三分、一トシ服ス。但此藥性功緩弱ナル故、多服セザレバ驗ナク、或他ノ排毒劑ニ加、用テ良。依叔伍

沙列布蘭

是「オルシス・マスキ」ラ、羅ト名、クル草ノ球根ナリ。百兒西亞州國名都兒格都兒格等ニ出。此一種和蘭等。歐羅巴諸國ニ産シ其根沙列布ト同効ナリ故、近來是ヲ代用ス。羅甸名「オルシス・モリ」ヲ、マスキ、ラ、ヘイ、和蘭名「スタンデルコロイ」

此草又「キツル」レケンスコロイド其根大小一ナラズ。大ナルハ胡桃ノ如ク。小ナルハ豌豆ノ如シ多、ハ圓、或微長卵圓、或扁桃狀ヲ爲シ褐色。堅硬。微透亮ニノ角ノ如シ。氣味淡泊。生根ハ膠粘。乾バ堅硬ナリ。然レ粉末トナリ易シ。其末ヲ水及沸湯ニ攪和スレバ、盡、溶化ノ膠漿トナル。○是ヲ採レハ、此草子熟シ莖葉枯ル時ヲ佳トス。新根ハ舊根ニ附テ鮮白粘潤。舊根ハ赭色ニシテ枯燥ス。是ハ藥用トセズ。其新根ヲ採、水ニ投メ土ヲ洗淨シ外粗皮ヲ刮去メ沸湯ニ浸シ或云煮下四分時ニシテ乾セ。取出メ布片ニテ拭、乾シ數顆ヲ連、透亮トナル

テ綿絲ニ串キ風乾ス。即チ白色微透亮トナル。但シ日ヲ
經ルニ隨自ラ褐色トナル。右ノ如ク修製セザレバ
雨濕ノ時候。黴ヲ生ノ變敗ス

○榕按ニ舶來、沙列布大零餘子ノ如ク形圓或微長
堅硬。褐色ニノ微透亮。羊角ノ如シ。氣味淡泊粘潤
多キ。譯說ノ如シ。其和蘭等ニ産スル者ハ即チ和産
ノ「サギサウ」類ナリ尋常「サギサウ」ノ球根ヲ採リ
試ニ粘氣アレニ發味多ク淡泊ナラス。其一種ツ
ハメオモトト云草ノ球根。形狀氣味沙列布ノ如
甚粘滑ナリ。沙列布ニ充用ベシ。是下野日光山赤

20

沼原一名戰場ニ自生多シ。高三尺許葉ハ水仙葉ニ
似テ短潤柔滑。四五葉叢生シ葉中莖ヲ抽ク。莖亦
小葉アリ暑中莖頭三四寸許ノ穂ヲ生シ淡紫花
ヲ開、五瓣環拱シ黃葯ヲ抱ク。別ニ一舌アリテ三
ニ分ル。又一尾アリテ垂ル。長一寸許亦淡紫色。根
ニ珠アリ數個連續ノ櫛比ス外皮褐色裏白色粘
滑ナリ○一種白花ノ者アリ莖葉前種ニ似テ舌
三分セズ。尾長四五分。穂疎ニノ稠密ナラザルヲ
異トス按ニ白及、麥門冬等種類異ナレ
異トス性効略似タリ代用スベシ

試効 滋養緩和ノ一良藥トス。血液ヲ滋生シ精力脱

缺ヲ培補シ。稀涼酷厲液ヲ包攝ノ和解シ。攣急疼痛
 ヲ緩弛ス。○經久羸瘦虛損。勞瘵様ノ症ニ効アリ。乳
 汁ニ和シ用テ尤良。○乾效。肺傷。勞嗽等ノ肺病ニ因
 テ形肉削脱瘦瘵スル症ハ是ヲ砂糖乳汁等ニ加甘
 美ト爲シ用テ殊滋補ノ効ヲ稱ス。○吐血勞效。及膀胱
 潰瘍。婦人崩漏白帶下等。血液稀涼酷厲ヨリ起ル
 症ヲ治ス。○勞效様ノ諸病ニ後方屢殊効ヲ得タリ

沙列布潤燥飲

沙列布漿 次ニ出ツ 二弓
 白罌粟舍利列 一弓半
 大麥煎 十二弓

右調和シ一時毎ニ一小茶椀宛微温ニ服ス
 ○水様液ノ酷厲毒ヲ緩和制服ノ膽液毒ノ下利。腹
 痛ヲ治ス。○赤痢下血下利。腸ノ裏面剥脱セル症ニ
 用テ粘津滑液ヲ生シ攣急腹痛ヲ寛解シ虚脱ヲ回
 復ス。○下利劇且頑固ニノ歇ズ及痛利赤痢等ハ左
 ノ吉利詞爹兒ヲ施メ治驗多シ

沙列布吉利詞爹兒

沙列布末 一弓
 水 五弓
 右水適宜加煮テ渣ヲ去。乳汁三弓ヲ加吉利詞爹
 兒トス是ヲ施メ攣急腹痛等ノ兼症緩解セザル者

ハ鯨膠。亞刺比亞。護。ヲ適宜ニ取。温湯若ハ乳汁。或
加密列泡劑ニ溶化シ服ノ速ニ治ス。若其疼劇ノ下
利休ザル者ハ後方ヲ與ベシ

罌漿鎮痛飲

白罌粟舍利別

亞刺比亞護漿

阿利襪油

各二勺

舍電阿芙蓉液

十五滴

右調和シ八分時毎ニ一匙宛服ノ下利攣痛等減ス
ルニ至ル

服法 滋補榮養ノ効ヲ取ニハ此根一錢ヨリ二錢マ
テ水若ハ乳汁ニ煮テ服ス。勞瘵様ノ症ニ尤良。是ニ

香竄藥ヲ加レバ消化ニ易シ○此根一錢ヲ水ハ勺
ニ煮テ粘汁ト爲ス是ヲ沙列布漿ト名ク能酷厲毒
ヲ緩和ス。腸剥脫。膀胱潰瘍等ニ尤良○或此末半錢
若ハ一錢宛沸湯ニ攪セ用テ日ニ兩次或此末一勺ヲ
水ニ溶シ適宜ニ沙糖ヲ和シ服シ。若ハ是ヲ煮テ舍
利別ノ如シ服ス○或此末四錢許ヲ乳汁ニ攪セ服
シ或是ニ沙糖ヲ和シ煮テ八分時。即好美ノ膠漿ト
ナル。是ニ薔薇露。橙皮水等ヲ加。香氣ヲ添。服ス○或
此末ニ水ハ倍ヲ加。慢火ニ上。攪セ熟煮シ。毛篩ニ透
過スレバ冷テ凝固シ美好ノ傑列トナル。是ヲ一

時若ハ一時半每ニ半匙或一匙宛服ス○柿液トシ服スルニハ此末若ハ右ノ傑列ヒヲ水。酒。泡劑。煎湯等ニ攪和シ與フ

依福叔 華淑僕

綿馬

オニワラビ 俗稱 トレイボガムヒリ キスマスロ バレンマンチケン蘭

是葳蕤ノ類ナリ一根數葉叢生シ高一尺若ハ一尺半許葳蕤類ヲ是ニ比スレバ硬固滑澤鋸齒アリ端末尖ラズ葉柄毛茸多下葉ハ短ク濶大ナリ葉背ニ六七個ノ小星アリ是花實ナリ根塊節狀ニ錯綜シ鱗屑様粗糙栗殼色味淡ニ粘滑收瀉微苦ヲ帶ブ

○榕按ニ莖毛黑色ナルヲクマワラビト云其褐色ナルヲオニワラビト云共ニ一種ナリ葉長一尺許濶三寸許一莖二十七八許ノ小葉排生ノ一葉ヲ爲シ小葉亦十四五許ノ細葉排列シ鋸齒アリ林娜リナ私人ス此類ヲ分テ七十七種トス其充當スベキ者ヲ略舉スレバ左ノ如シ

第十五種「ホクボガムヒリ」カレ羅サルノセウカ

第二十六種「ホクボガムヒリ」シホルム骨碎補

第五十三種「ホクボガムヒリ」キスマス綿馬

第五十四種「ホクボガムヒリ」ナ

第六十七種。ホレボクム。バロメス。

金毛狗脊

試効 根ヲ藥用トス新根ヲ用フ。黑色ナルハ陳久ニ
 ノ効ナシ。○殺蟲ノ峻藥トス。虻蟲ヲ殺シ殊_ニ條蟲ヲ
 驅泄スルニ奇効ヲ稱ス。是ヲ用ニハ前日食ヲ斷_ル或
 少許食シ。汚物敗液鬱滯ノ候アル者ハ先吐劑若ハ
 下劑ヲ投メ胃腸ヲ淨掃シ壯實ノ人ハ翌朝空心此
 根ノ細末三錢ヲ取桂水等香竄露水ニテ送下ス。是
 ヲ服メ嘔氣アル者ハ拘櫟皮ヲ嚼ミ或桂水ニテ含
 漱シ咽喉ヲ潤スベシ。若吐スル者ハ其末ヲ適意ノ
 糖料等ニ和メ服シ且飲液ヲ減スベシ。虛人小兒等
 サタツク

ハ服量ヲ減メ一錢ヨリ二錢ニ至ル。服後一時許ヲ
 經テ嘔吐ノ候ナキ者ハ左ノ下劑ヲ與ベシ

蘇永驅蟲膏

蘇甘_{スカム}沒_モ扭_ト謨_ハ 各十二匁

加羅_カ蔑_ロ兒_メ 各十二匁

藤黃_{トウワウ} 末 五匁

接骨_{セツボネ}木_キ傑_ダ列_レ乙_イ 適宜

右調和ノ煉膏トシ強人ハ一服トス。虛人小兒ハ服
 量ヲ減ス。是ヲ服メ後速ニ茶湯二椀許與且蟲下レ
 バ時々茶湯ヲ與患者ヲノ靜坐セシムベシ。或右煉
 膏ヲ用テ瀉下セズ蟲亦下ラザル片ハ諳_{セン}厄_ダ利_リ斯_ス瀉
 利鹽_{リシ} 四錢若ハ一匁ヲ與ベシ。右ノ如クメ効ナキ

片ハ三日ヲ經テ再前法ノ如ク施シ。仍驗ナキ者及患者是ニ堪ベキ片ハ一週毎ニ右ノ療法ヲ施メ蟲下ルニ至ベシ然レ仍的効ナキ者ハ後方ヲ與ベシ

綿馬驅蟲膏

綿馬根 未ニ多

過爾託亞舍利別 適宜

右調和ノ煉膏トシ一時毎ニ一卵匙宛服ス數日連服シ且水銀劑等甘黍ヲ加ル下劑ヲ一週毎ニ用レハ條蟲必ズ瀉下ス○孕婦ハ此治法ヲ禁ス其殺蟲劑峻下劑共ニ崩血ヲ誘起メ墮胎スレバナリ○右ノ殺蟲劑能月經ヲ通ス故經閉ニ大効アリ○乳汁少

キ乳婦ハ右ノ劑ヲ與テ能乳汁ヲ増ス但服量ヲ減シ與ベシ假令ハ十氏ヨリ十五氏マデ一服トシ日數次用フ○此根通例服量一錢ヨリ二錢ニ至ル○内藏壅塞脾病依剥昆垚兒神思鬱憂病痛風等ニ良驗ヲ稱ス此根末トシ一錢許宛用ヒ水煎ハ二三錢マデ用フ○經閉ヲ通シ死胎ヲ下ス水煎シ服ス○小便ヲ利シ水腫ヲ治ス根一握ヲ水二十多ニ浸シ服ス○痔腫痛ニ此根ニ水ヲ加搗テ粘汁ヲ取患處ニ貼メ効多シ

依福淑

黃豆

ダイヅス^イ又^ミソマ^メ俗稱^{ドリ}
コスウレン^ス羅^ハヤ^ボン^蘭

試効 莢ヲ藥用トス。毛ヲ去、細末トシ舍利別等ヲ和

ノ煉膏トシ毎日一弓マデ服メ、蛇蟲ヲ殺シ驅泄ス。

又時々下劑ヲ兼用ノ良。虛人小兒ハ服量ヲ減スベ

シ依叔

曼陀羅花

テウセン^アサガ^ホ俗稱^{スタラモ}
ヲウ^ラ羅^{トル}ア^ルア^ル又^{トル}ン^ルア^ル蘭

試効 葉ヲ越幾斯劑トシ或子仁ヲ丁幾劑トシ用フ

是酷烈ノ麻痺毒ヲ含ミ過用スレバ精神錯亂狂躁

眼盲頑麻不遂知覺運動ヲ失昏睡ノ死ス○然レ庄服

量些少用レバ鎮瘳止痛催睡ノ一藥トシ超羣ノ効

ヲ稱シ發狂癲癇神思憂悶錯狂等ノ精神感動失常

ノ諸病或頑滯ノ痛風傷冷毒痛其他經久沈痼ノ瘳

擊擣掣諸症ニ間奇効ヲ得レ諸名哲ノ經驗說多シ

○產後發狂諸藥効ナキ症此藥ヲ用テ効多シ○右

所說ノ如ク神經諸病ニ効驗ヲ稱スレレ先哲是ヲ

用テ効ナク或害アル諸說亦少カラズ或云癩ノ患

者ニ此劑初少許宛與漸久其量ヲ加用ニ頭眩暈

眼昏暗思慮錯誤咽喉胃管焮熱煩悶等ヲ發スレレ

癩症毫モ解散セズ○或云一女子發狂ノ劇擣掣ヲ

兼又。此劑ヲ投ノ寸効ナシ。又一女子十四歳發狂ス。此劑日二氏或三氏宛用終ニ六氏ヨリ八氏宛用テ治ス。然レ又一女子ノ發狂ニ此劑前法ノ如ク用テ微功ヲ得ズ。○或云。此劑ヲ發狂ノ患者五人ニ試用ルニ二人ハ驗アリ三人ハ効ナシ。又狂婦二人ニ試用ルニ一人ハ治シ一人ハ効ナシ。○或云。癩狂。神思憂悶病等ニ此劑一味或寄生等治癩藥ヲ加試用ル患者從來四十六人全治ヲ得ズ。但諸症漸減シ輕差ヲ得ル者アレ。凡其中七人ハ病勢險重ニ進ミ三人ハ死ス。○右ノ諸說ヲ觀レバ此藥殆ト驗ナク或功害相

半スト謂ベシ。然レ是患者體稟薄弱ニ毒藥ニ耐ス却テ害ヲ致シ或病毒深重牢固ノ藥力是ヲ制服スルヲ能サルニ因リ知ベシ。若能患者ノ體稟ト病毒ノ輕重ヲ察シ是ヲ用キハ効ナシト云ベカラズ。先哲治驗ヲ得ル諸說亦多シ。左ニ其一ニヲ援引ス。○一少年發狂ノ癩ヲ兼又此劑初半氏宛與漸加テ一氏宛用リ日三次ニ全治セリ。又一少年癩ヲ患フ此劑ヲ用リ前法ノ如クニ諸症減スルヲ過半。○或云。狂。癩。舞蹈病及搖掣諸症ニ此劑ヲ試用リ十三人。其中八人全治シ五人ハ諸症大ニ寬解セリ。又云。

搗掣ノ症ニ此劑ヲ與テ全愈セル者四人ヲ見タリ
○發狂此劑ヲ用全治ノ再發セザル者三人又産後
發狂諸藥功ナキ者。是ヲ用テ治スルヲ多シ凡發狂
此劑ヲ用項窩ニ打膿法ヲ施ノ大効ヲ得者多シ又
神思憂悶病及發狂ハ此劑ヲ用テ効ヲ取テ殊多シ。
子宮衝逆病ノ阿芙蓉劑ニ堪テ能ザル症亦是ヲ與
テ屢良驗ヲ得タリ○或云此藥ハ狂癩神思憂悶錯
亂及癱瘓搗掣ノ諸病ヲ減除シ若ハ全治スルヲ先
哲ノ歷驗多シ是ヲ考究スルニ此藥ノ麻痺毒ヲ以
テ神經ノ感觸知覺ヲ減損シ催眠鎮痙ノ功ヲ致ス

ノミナラズ一種ノ稀釋解凝ノ峻効アリテ大ニ血
液ヲ稀釋ノ壅塞ヲ疏通シ全軀ノ分利排泄ヲ進起
ノ諸竅ヨリ驅發ス。是ヲ服スレバ汗小便涎唾等發
泄スルヲ以テ知レベシ。又一婦人經閉四年餘。此劑ヲ
用テ即通ス。然レバ凡狂癩癱瘓搗掣等。神經非常ノ感
動ニ係諸患ハ病毒瘀血凝固壅塞ノ腦神經ヲ侵襲
シ發スル故其効驗アルヲ準推メ知レベシ○此越幾
斯劑ハ每用戒慎ヲ加服量一匁ヨリ漸ク加テ五六匁
宛與且龍腦ヲ加丸藥トシ用テ尤良或初一匁ヨリ
漸次緩慢ニ其量ヲ加服メ患者瞳子散大濶開スル

片ハ其量ヲ如_レ丁勿_レ否_ラサレバ危症ヲ發ス是神經
 既ニ觸知ヲ失フ候ナレバナリ或、瞳子散大頭旋昏
 憤麻痺等惡症ヲ見、スト雖モ病勢減セズ少_シモ輕快
 ヲ得ザル者ハ速ニ此藥ヲ休_ムベシ是其毒ノ妨害ヲ
 現、スノミニノ毫モ裨益ナケレバナリ

曼陀羅花越幾斯劑

製法失鳩答越幾斯劑同

○菲阿斯失亞密越幾斯劑補亦右諸病ニ峻効アリ
 但、曼陀羅花越幾斯劑名莨菪越幾斯劑名ハ麻痺ノ効
 カ殊_ニ甚_シ○曼陀羅花實ノ仁及膜ハ麻痺毒殊_ニ峻_ナ
 リ。是ヲ丁幾劑トシ用_ヒテ鎮痛催睡麻痺ノ峻効ヲ奏

シ起熱ノ害ナク通利閉塞ノ患ナクノ阿芙蓉劑ニ
 勝_リ。此劑經久頑固ノ神經病。神思ノ感觸失常諸
 病前說ノ患症ニ用_ヒテ大効ヲ稱ス。此劑初、六滴ヲ用_ヒ
 毎日漸次ニ加、テ二十滴ニ至リ患者眼眩ノ候ヲ現、
 ス片ハ速ニ後服ヲ止_ム或云此劑二十滴ヲ與_テ切
 實ナル催睡藥トス。發狂。神思憂悶錯狂等ハ殊ニ此
 麻痺毒ヲ以_テ能、其病勢ヲ制服ス

曼陀羅花丁幾劑

製法 曼陀羅花仁極細末 葡萄酒 八勺

燒酒 一勺

右硝子壘ニ内、煖處ニ置テ泡釀スルヲ二日。漉テ渣ヲ去、固封シ貯フ。此劑虛症ノ炊腫眼ニ點ノ殊効ヲ稱ス。○此仁ヲ末トシ服スレバ初、神思欣怡シ醉狂ノ歌舞喜笑シ終ニ昏冒沈睡シ醒後些モ醉中ノ情態ヲ知覺スルヲナシ。○曼陀羅花、毒ニ中ル者ハ醋若ハ乳汁或油類阿利穢油等ヲ服スレバ即解ス。但此毒ヲ服ノ時ヲ經ザル者ハ吐劑ヲ最良トス。
叔伍叔 依福

煙草

「ニコチン」
 羅 夕バコ諸國通稱

試効 葉ヲ藥用トス是熱性刺戟ノ吐下藥トス。且麻

痺毒アルコト曼陀羅花。龍葵類ノ如クニ稍緩ナリ。又解凝利尿ノ性功アリ。其効力皆是ニ含ル油ニ在リ。○是ヲ水煎シ過服スレバ吐シ且瀉下ス。少許服スレバ小便ヲ利ス。○麻痺鎮痛ノ効アリテ瀉下スル故ニ惡液壅滯ノ發スル疝腹痛ノ阿芙蓉ヲ用難キ症ニ甚適應ス。○水腫及炊衝ナキ粘液腎痛ニ用テ小便ヲ利シ偉効ヲ奏ス。○解凝麻痺ノ効力アルニ因テ粘液性ノ喘急及疫效等ニ間良驗アリ。然レ總テ炊衝性ノ症ハ此藥大害アリ。粘液質ニノ神經感觸鈍ナル患者ニ適應ス。○右ノ如キ遷延諸病ニ是

ヲ浸劑トシ用テ尤良。即後方ノ如シ

煙草解凝飲

煙草葉 一弓 沸湯 一北

右浸ス下半時。瀝テ滓ヲ去。後藥ヲ加フ

燒酒 再餽者 二弓

右調和シ二十滴ヨリ漸加テ六十滴マデ水或酒ニ

點服スル。日兩次。小便ヲ利シ水腫ヲ治スルニ

左ノ方殊効ヲ稱ス

煙草驅水飲

煙草葉 一弓 水 六弓

右浸ノ藥氣ヲ出シ後藥ヲ加フ

燒酒 再餽者 一弓

忽弗滿鎮痛液 一錢

右調和シ一時半。每二十滴宛飲液ニ點服ス。但其

症ニ應ノ増減スベシ。○卒厥ノ甦復シ難キ症。煙草

ノ濃泡劑ヲ吉利詞參兒トシ施メ間捷効アリ。○頑

固ノ大便閉及腸狼僂屈ノ緊張ノ大便閉塞スル症

ニ煙草浸劑ヲ吉利詞參兒トメ効多シ。但嫩衝ヲ兼

ル症ハ害アリ。○頑癬乾癬。搔痒甚キ瘡疥類。惡厲頭

瘡。臭穢潰瘍等ハ煙草濃泡劑。浸劑ヲ洗藥トメ痛痒

ヲ消シ蟲ヲ殺シ淨刷乾愈ス。○吉利詞參兒及洗藥

ト為スニハ煙草四錢ヲ沸湯六寸ニ浸シ用ヘシ○
 煙銃大觀氏著ス所ノ要術知新ヲ以テ煙草ノ煙ヲ
 肛門ヨリ薰入メ頑固ノ大便閉ヲ通シ腸癰ハク屈ノ
 便閉ヲ療シ。擲急ヨリ發スル疝腹痛等ヲ解散シ。或
 溺死ニ施メ間蘇復ス救依
 煙草越幾斯劑 製法失鳩越キ幾斯劑 同ト同シ

新訂增補和蘭藥鏡卷十五終



○榛齋宇田川先生著述發行書目

和蘭内景醫範提綱 全三冊

同 内景銅版圖 箱入 全一帖

增補和蘭藥鏡 每篇以三冊為第一帙 全十八冊

遠西醫方名物考 同上 全三十六冊

同 補遺 同上 全九冊

理學入門植學啓原 宇田川榕庵先生著 全二冊
米色圖入

書賈 青藜閣 須原屋伊八

江戸淺草茅町二丁目

