

KODAK  
LICENSED PRODUCT

MI

Y

U

KODAK Gray Scale



病理略論

滿斯啟見篤氏授

下

ヤ 3  
1361  
2





凡人身ノ生活保續ノ爲ニ須吏モ缺ク可ラサル  
 最貴最要ノ體器ニ三種アリ  
 其一心臟是ナリ此レ即チ人身中血液ノ出納ヲ主  
 引シ兼テ陳氣ヲ驅出スル器ナリ  
 其二肺臟是ナリ此レ即チ其囊籥ニ由テ新氣ヲ吸  
 引シ兼テ陳氣ヲ驅出スル器ナリ  
 其三右ノ兩器ヲ主宰スル者ニ即チ腦脊髓及神  
 經是ナリ蓋シ假令心肺ニノ器アリト雖モ若シ此  
 主宰ノ權ナカレバ決テ其機關ヲ起スル能ハス

病理各論

卷之下

醫學史





故ニ此三器ハ俱ニ生活ノ際須臾モ相離レ相缺ク  
 可ラサル者ニシテ若シ其一ヲ傷フ寸ハ隨テ必ス性  
 命ヲ失ハサルヲ得ス故ニ此器ヲ指メ生活器ト曰  
 ヒ此機能ヲ存ノ生活機能ト曰フ而メ若シ此三器  
 中ノ一器孰カ其機能ヲ絶寸ハ隨テ他ノ二器モ亦  
 直チニ其官能ヲ廢止セサルヲ得ス例之肺ノ機能  
 止ム寸ハ直チニ心臟ノ官能及ヒ神經ノ作用モ亦  
 隨テ廢スルカ如シ蓋シ此三器中孰カ先ツ其機能  
 ヲ正絶ス其正絶テ死亡ノ症候亦自ラ一様ナラス  
 即チ今次ニ於テ肺ノ機能先ツ廢止スルト心ノ機

能先ツ歇絶スルトニ由テ其症候ハ異ナル所以ヲ  
 説クヘシ  
 凡ソ心臟ノ機能常ニ完全ナランニハ第一ニ其収  
 縮機ノ強盛ナル而已ナラス亦血液ノ量隨テ充分  
 ナランコトヲ要ス又肺臟ノ官能ニ於テ第一ニ其吸  
 入スル大氣ノ量多ク胸腔ノ開闔強健ニシテ大氣ノ  
 出納ニ適センコトヲ要ス就中肺ノ橐籥ハ實ニ神經  
 ノ作用ニ由テ成ル者ナレハ若シ此作用止ム  
 寸ハ隨テ呼吸ノ機能亦直チニ廢止セサルヲ得ス  
 又心臟ノ開闔ハ本此神經ノ作用ニ而已關カラサ

レハ假令神經トノ連屬ヲ斷ツモ尚未タ暫時ハ其機能ヲ止メサル者アリ故ニ急劇ノ神經症ニ由テ速力ニ呼吸ノ歇止スル者モ亦能ク人爲ノ橐籥ヲ以テ再ヒ之ヲ蘊息セシムルヲ得ヘシ畢竟之レ心臟ノ収縮機ハ未タ全ク歇止セサレハテリ然レモ若シ頓ニ之ヲ神經中樞ヨリ斷ツ寸ハ心臟ノ機能亦隨テ直チニ止サルヲ得ス例之猶ホ刎首ニ於テ之ヲ見ルカ如シ

其一心臟ノ機能過止ノ死スルノ状態凡ソ疾病ニ於テ心臟ノ機能先ツ歇止メ死スルノ

状ニ二般アリ其一ハ血液ノ匱乏ニ由ル者是ナリ例之動脈系ニ劇シキ損傷ヲ被リ過多ノ失血ニ由テ心臟ノ収縮其常ヲ失ヒ以テ遂ニ此機能ヲ全ク廢スルカ如シ乃チ此等ノ乏血症ニ死スル者ヲ剖觀スルニ心臟大ニ収縮シ悉ク其血ヲ動脈幹ニ射出スルヲ以テ亦一滴モ心房中ニ殘ルヲナシ或ハ又此患者ヲ救フニ若シ夫ノ移血法ヲ速カニ施スカ如キハコレニ由テ再ヒ其収縮機ヲ發メ蘊生セシムヘキ者宜シク此兩件ニ依テ其乏血ヨリ起ルヲ確徵スヘシ即チ此症ハ顔面及口唇俱ニ蒼白

二變シ全身淋漓トノ冷汗ヲ流シ瞳孔散大及眩暈  
 ヲ發シ脈細小ニノ徐且不倫トナリ速ニ全身ノ知  
 覺ヲ失フニ至ル是類ハ産後崩漏ノ症ニ於テ屢々  
 實驗スル所ナリ其他又此症ニハ時トノ惡心吐逆  
 欠伸及痙攣搐搦等ノ神經症ヲ兼發スルコトアリ然  
 レモ亦是必見ノ症ニハアラス其二ハ衰弱ニ由ル  
 者是ナリ例之中毒症ノ漸々壞症ニ陥リ衰弱ヲ起  
 ノ之カ爲ニ心ノ機能ヲ歇絶スルカ如シ是等ノ病  
 屍ヲ解視スルニ心臟膨脹ノ血液房中ニ充滿ス是  
 即チ心臟収縮機ノ足サルニ由ル者ニメ又前症ト

異ナル所ナリ此症候ハ脈數ニメ小且軟神思ノ情  
 態依然トノ變セス或ハ時トノ只耳官ノ最モ過敏  
 ト成ル者アリ即チ腹膜焮衝虎根痢或ハ脱疽等ニ  
 テ死スル者ハ皆是類ニ屬ス此ノ如キ乏血若クハ  
 衰弱ノ二症ニ由リ心臟ノ機能歇止メ死スル者ヲ  
 シンコーヘ無カノ義ナリ一云フ就中第一症即チ其乏  
 血ニ由テ死スル者ハ先ツ心臟ノ機能絶止シ次テ  
 腦ノ官能廢止スル者ナリ故ニ此等ノ患者ハ頭部  
 ヲ低クメ仰卧セシムル寸ハ血液ノ腦内注流ヲ助  
 ケテ右ノ諸症ヲ稍減去スルニ足ル者亦以テ乏血

ノ證據ト爲スヘシ都テ乏血ノ症ヲ療スルニ其靜  
 息安卧ヲ要スルハ全ク之カ爲ナリ第二症即チ其  
 衰弱ニ依ル者ハ先ツ神經ノ作用休止シ次テ心臟  
 麻痺ヲ起シ以テ其機能ヲ廢止スルナリ例之雷擊  
 或ハ驚愕等ニ由テ不意ニ死スル者ノ如キ此等ノ  
 屍體ヲ剖觀スルニ心臟充分ニ膨脹メ房内ニ許多  
 ノ血液ヲ含ムヲ見ル是レ全ク神經ノ感動劇シキ  
 ニ由テ頓ニ心臟ノ麻痺ヲ生スルヲ明カナリ或ハ  
 又右ノ二症ニ偏セス其合併ニ由テ死ヲ致ス者ア  
 リ之ヲ虛脱ト名ツク例之勞瘵病或ハ飢餓ニ由テ

死スル者ノ如シ第一ニ腦ノ機能疲弊ノ一ハ乏血  
 ニ由リ一ハ衰弱ニ由テ死スル者ナリ以上舉ル所  
 ハ心臟ノ機能廢スルニ由テ直チニ血液ノ循環ヲ  
 歇止スルカ爲ニ死スル者ヲ論ス

其二肺臟ノ機能歇止ノ死スルノ狀態

此症ニ二種アリ第一種ハ氣道ヲ壅閉メ大氣ノ肺  
 中ニ入ルヲ妨クル者是ナリ第二種ハ胸部ノ諸筋  
 麻痺メ胸腔ヲ開張セシムルヲ能ハサル者是ナリ  
 是概子腦病ニ繼發スル所ノ症ナリ  
 第一種ノ症ヲ窒息アシスフエト名ツク是症ハ即チ

口鼻ヲ閉鎖スルニ由ル者ニ夕例之手中ヲ以テ口  
 鼻ヲ蔽塞シ或ハ泥沼中ニ跌顛シ或ハ水中ニ没溺  
 シ或ハ大氣中ニ他ノ氣類ヲ混ノ呼吸ヲ妨クル等  
 ニ由テ然ルカ如シ即チ是水素ノ過多ト成ルカ如シ  
ムルト雖モ亦呼吸ヲ久シク保タシムルヲ能ハス或ハ又内外ノ呼吸器逼  
 壓ニ由テ發スルヲアリ即チ其内ヨリ逼壓スル者  
 ハ例之肉塊或ハ骨片ノ類ヲ嚥下シ誤テ其氣管内  
 ニ梗塞シ以テ呼吸スルヲ能ハス其外ヨリスル者  
 ハ例之頸ヲ縊縛メ死スルカ如シ又胸腔ヲ強ク壓  
 縮スルニ由テ發スルヲアリ即チ家屋傾覆シ或ハ

霖雨ノ候陂塘崩壞スル等ニ因テ肢體ヲ壓托セラ  
 レ或ハ泥濘中ニ倒没メ胸腔ヲ壓縮シ以テ呼吸ヲ  
 妨クルカ如シ其他又牙關緊急或ハ肋間對神經若  
 クハ横膈膜神經ノ麻痺ニ罹リ或ハ之ヲ切斷スル  
 寸又ハ劍傷若クハ瘻瘡ニ由テ胸腔ニ孔ヲ穿ツ等  
 ニ由テ其然ルカ如シ若シ右ノ諸因中孰レカ其一  
 患ニ罹ル寸ハ吸氣筋即チ大甚シク緊張収縮シ以  
 テ肺ヲ開張セシメント欲シ終ニ眩暈ヲ發メ人事  
 ヲ省セス全身ノ諸筋盡ク弛解シ處々ノ括約筋放  
 開メ兩便失禁スルニ至ル但シ是時心ノ鼓動ハ微

存ノ尚未夕絶ヘス次テ顔面浮腫ヲ生ス而ノ其顔  
面初メハ赤色ナレ氏後ニハ蒼白ニ變シ全身ノ靜  
脈悉ク怒張シ眼球突出シ終ニ心臟ノ縮張全ク廢  
スルニ至テ死ス此等ノ屍ヲ剖驗スルニ心ノ左房  
ハ全ク空虛ト成テ全身ノ血液悉ク紫黑色ニ變シ  
以テ其水分大ニ減却スルヲ見ル是レ即チ肺ノ囊  
籛廢止ノ酸素ヲ引クヲ能ハサルニ由テ全身ノ血  
液復其鮮活稀渙スルヲ能ハサルカ爲ナリ故ニ此  
死ノ原因ハ全ク肺ノ妨碍ニ在リ例之泥濘中ニ埋  
マル者ヲ起メ新鮮ノ大氣ヲ肺中ニ吹キ入ル寸ハ

再ヒ蘊生セシムルヲ得ルカ如シ又此症ノ頓發  
スル者ハ聲門ノ患アルニ由ル例之聲門水腫或ハ  
其食物硬塞等ニ於ルカ如シ又此症ノ慢性ナル者  
ハ肺及胸膜ノ病アルニ係ル例之胸膜炊衝ニ於テ  
夥多ノ滲出物ヲ生シ是ニ由テ漸ク肺ヲ逼壓スル  
カ如シ  
第三種ノ症ヲ昏睡ト名ク此症ハ概チ腦病ニ  
繼發スル者ナリ即チ多量ノ阿芙蓉ヲ服シ或ハ過  
量ノ酒ヲ飲ムニ由テ頭腦ノ疾患ヲ發シ次テ肺ノ  
麻痺ヲ生スルカ如シ此症ハ又全身麻痺ノ外來ノ



刺戟ヲ感スルヲ能ハス呼吸漸ク緩徐トナリ以テ  
 昏睡歟息ス是時不隨意ノ諸筋ハ暫ク其用ヲ保續  
 スレモ亦肺ノ酸素ヲ引クヲ不全ナルカ爲ニ終ニ  
 前條述ル所ノ諸症ヲ發メ死ス故ニ第一種ノ症ハ  
 初メ先ツ舍密的ノ變化ヲ起シ次ニ麻痺ヲ發メ死  
 スルモ第二種ノ症ハ先ツ麻痺ヲ起シ次ニ舍密的  
 變化ヲ發メ死スル者トス然レモ亦之ヲ剖驗スル  
 ニ所見ノ徵候一モ異ナルヲナシ蓋シ是レ等ノ患  
 者ニ於テハ其呼吸未タ絶サル間ニ於テ若シ其腦  
 患ヲ驅除スレハ亦能ク之ヲ救フヲ得ヘシ例之

酒癖ノ如キハ其原因全ク腦ニアリ故ニ其腦患去  
 テ已ニ醒覺スル寸ハ隨テ諸症亦消散ス若シ又其  
 腦患未タ退サル際ニ於テ已ニ呼吸ノ歇止スルカ  
 如キハ宜ク人工橐籥法ヲ以テ可及的呼吸ヲ保タ  
 シムヘシ右ニ舉ルニ種ノ症ハ通常諸般ノ急性病  
 ニ於テ發スル者多シ其他總テ腦病ニ死スル者ハ  
 昏睡ヲ以テ終リ胸病ニ死スル者ハ窒息ヲ以テ終  
 リ腹部ノ諸病ニ死スル者ハ「インコトペ」ヲ以テ  
 終ル者多シ或ハ又右ノ三症ヲ併發シ其唯ニ症ノ  
 ミノ爲ニ非ヌル死スル者屢アリ然レモ亦必竟屍體

ヲ割觀スルニ必ス其孰レカ一症ノ偏勝スルヲ見  
ルナリ審ニ言ヘハ則チ其徵候ニ據レハ昏睡症ノ  
室息症ヨリモ勝ツコトアリ或ハ此二症ヨリモ「シイ  
ンコー」症ニ偏スルコトアリ此ノ如キハ衆醫ノ治  
則各異ナラサルヲ得ス例之一醫ハ之ヲ昏睡症ト  
者做ノ專ラ衝動劑ヲ投シ一醫ハ之ヲ「シインコー  
」症ト者做ノ強壯劑ヲ主用シ又一醫ハ之ヲ室息  
症ト者做ノ專ラ其治則ヲ行フカ如シ又同シ流行  
性ノ病ト雖モ其時世ノ變革ニ從テ一様ナラサレ  
ハ之ニ隨テ治法モ亦一定概率ス可ラス例之虎狼

痢病ノ如シ是レ往時流行セシ寸ハ概チ昏睡症以  
以テ死スル者多シト雖モ晚近ニ至テハ又室息症  
ニ由ル者多シ故ニ晚近ノ虎狼痢治法ニハ務メテ  
此室息症ヲ防クヲ主トシ往昔ハ專ラ昏睡症ヲ治  
スルノ法ヲ施セリ此ニ由テ觀レハ晚近ノ人往昔  
ノ虎狼痢治法ヲ見テ猥ニ之ヲ誹謗スルハ甚々  
非ナリ若シ當時ニ於テ晚近ノ治法ヲ處セシカ如  
キハ恐クハ却テ大ナル害ヲ生セシ者ナラシカ如  
シ疾病ノ原因ハ醫中ニ詳シク論ズルハ一疾ニ  
凡ソ百般疾病ノ原因又大別メ二種トス即チ一ハ

素因一ハ誘因是ナリ此他尚ホ別ニ近因ト稱スル者アレモ本此因ハ體中一部ノ病ト成ルヘキ景況ヲ指メ謂フ所ナレハ全ク病ヲ起スノ因ニ非ス故ニ顯著ナル病状ニハ此近因ヲ以テ直チニ病名ト做ス者ナリ例之骨貌列屈及ヒ肺焮衝等ノ唱アルカ如シ即チ此症ハ骨ノ破壊スル模様及ヒ肺ノ焮衝ニ罹ル景況ヲ名クル者ニメ畢竟唯骨病及ヒ肺患ヲ斥メ云ナリ近ク之ヲ譬レハ猶ホ葺工ノ屋上ヨリ失脚顛墜メ骨ヲ破ルカ如シ是即チ葺工ノ屋上ニ登ルハ其職ニメ之ヲ素因トス其屋上ヨリ顛

墜スルハ之ヲ誘因トス而メ其骨ヲ破壊スル景況ハ之ヲ近因トスルカ如シ然レモ近因ノ顯然ナラザル者ニハ唯其症候ヲ舉テ之ヲ病名トス即チ嘔吐吐血間歇熱及麻痺等ニ於ルカ如シ例之猶胃中ニ腫瘍若クハ癌腫ヲ生シ腦中ニ漏血腫瘍若クハ瘰癧肉等ヲ發セシメ之カ爲ニ其吐血麻痺等ヲ發スル者ニメ全ク其近因ノ不明ナルカ故ニ只症候ヲ舉テ唱ルノミナリ也

病源論 卷之十 十

先天即子遺傳ト後天トニ分ツ例之瘰癧質ノ人ハ僅カ  
寒冒ヲ患ルモ忽チ肺嗽衝ニ罹リ易ク又生來虛弱  
ナル人偶家外ニ出レハ寒氣ニ侵サレ以テ感冒症  
ヲ病ムカ如シ即チ此瘰癧質ト虚弱質トハ其素因  
ニメ感冒ト冷氣トハ之ヲ誘因トス其他亦彼此ノ  
原因ニ由テ殊ニ疾病ヲ感受セシメ易キ所ノ體質  
アリ別ニ之ヲ素質ト名ツク而メ此素質ヲ生スル  
者ハ即チ素因ナリ故ニ素因ハ概子各人ノ職業ニ  
アリ例之兵卒或ハ打綿工ノ如シ即チ兵卒ノ常ニ  
粗食ヲ爲シ或ハ屢々飢餓ニ遇ヒ或ハ風雨寒冷ヲ

冒觸シ又打綿工ノ作業ニ由テ常ニ細塵ヲ肺中ニ  
引クカ如キ即チ之ヲ素質トス或ハ又時トノ其素  
因ト誘因トヲ辨シ難キナリ例之猶健康ナル人  
ノ寒氣ニ觸レテ感冒症ヲ患ルカ如シ然レハ此辨  
別ハ今日ノ療則ニ於テ太夕緊要ナル所ナリ故ニ  
若シ其顯然タル素因アル者ニハ常ニ可及的其誘  
因ヲ防禦スルコトヲ務ムルヲ要ス例之バ瘰癧腫ノ  
素因アル者ハ常ニ攝生ヲ嚴ニメ可及的寒氣ニ冒  
觸セシメス以テ其誘因ヲ防ク寸ハ幸ニメ其病ヲ  
免ルヘシ又之レニ反メ顯著ナル誘因アル寸ハ務

ノテ其素因ヲ防ンコトヲ要ス例之虎狼痢ノ流行スル時ニ當テハ常ニ腸胃ヲ踈滌シ體質強壯ナラシムル寸ハ自能ク此病ニ罹ルヘキ素因ヲ除キテ其傳染ヲ防クニ足ルヘシ或ハ又疾病ノ性情ニ由テ全ク其原因ノ探索ス可ラサル者アリ是亦知スンハアラス其他器械的及ヒ舍密的ノ原因ハ皆外科ニ係ルヲ以テ今爰ニ載セス唯其一ニ内科ニ關カ

第一零圍氣ノ感應

即チ寒暖乾濕壓力張力ノ差  
異電氣ノ多寡混合ノ模様及  
ヒ光輝是ナリ

ル者ヲ左ニ於テ論ス

第二榮養ノ感應 殊ニ飲食ノ節度ヲ失フ者

第三攝生及職業ノ感應

第四精神肢體ノ運動及其休息ノ感應

第五遺傳及生來不具ノ感應是ナリ

凡ソ今日人ノ生活スルヤ以上舉ル所ノ諸種ノ感應ニ關係セサルハナシ故ニ又偶人ノ疾病ニ罹ルヤ其原因何レノ感應ヨリ起ルヤ否ヲ診決スルハ甚タ難シトス蓋シ此原因ヲ辨別センニハ世上一般ノ例ニ據テハ甚タ確實ナラス唯其一地方ニ限リ衆人群居ノ各同一ノ感應ヲ受ル者ニ於テ之ヲ

検査セハ亦以テ確定ノ説ヲ得ヘシ例之猶小船中  
若クハ軍隊ノ如キ同一ノ攝生ニ係ル者ニ就テ之  
ヲ検査セハ宜シク之ニ由テ何的ノ原因ハ何的ノ  
病ヲ生スト云フヲ知ルヘシ第一此原因ヲ探索  
ノ確知スル寸ハ忽チ疾病ノ本源ヲ斷テ其發起ヲ  
防クニ足ル者喻ヘハ今此ニ嬰兒ノ刀ヲ玩フ寸傍  
人驚惕ノ速ニ之ヲ奪フカ如キハ亦以テ其害ヲ避  
ルニ足ルカ如シ都テ原因防禦ノ法ハ醫術ノ最モ  
大ニ關係スル所ニメ醫士ノ常ニ此學ヲ勤ムヘキ  
ハ勿論又之ヲ官ヨリ制メ其法ヲ立スンハアラス

例之今支那ニ虎狼痢流行ノ時ハ必ス日本政府ヨ  
リ支那船ノ入港ヲ禁シ以テ其流行傳播ヲ防クカ  
如シ故ニ疾病ノ原因ヲ知ルハ特リ醫人ノ必要ナ  
ル而已ナラス若シ衆人普ク之ヲ熟知メ常ニ其攝  
生ニ注意戒慎ヲ加ル寸ハ其益甚ク偉ナリトス西  
洋ニ於テハ諸般ノ流行病盛ナル寸ハ其病ノ原因  
證據及ヒ豫防法等ヲ榜標ニ條記メ之ヲ市中村落  
ニ掲ケ以テ一般國民ニ諭示ス是レ亦所謂ル政事  
醫學ノ一端ニ屬ス又右ニ於テ數種ノ原因ヲ條舉  
スト雖氏爰ニハ唯一大氣ノ特異ナル感應ニ就テ

其寒暖及不潔ヲ論シ次ニ第四遺傳ノ原因ヲ略説シ以テ學者ノ豫知豫聞ニ供ス其餘ハ後ノ各病論中ニ於テ詳カニ説ント欲ス

第一大氣ノ感應

寒暖ハ氣候ノ著シク更換スル者ニメ例之熱帶地方ノ人寒帶地方ニ徙ル寸ハ著シキ寒熱ノ變ヲ覺ルカ如シ蓋シ此寒熱ヲ防禦スルニハ就中避熱ノ策ハ易クメ防寒ノ術ハ甚々難シ何トナレハ熱ヲ避クルニハ唯裸體トナリテ水中ニ投スレハ一時之ヲ凌クニ足ルヘシ是レ賤卑ノ人ト雖モ尚ホ容

易ニ得ル所ナリ又寒ヲ防クニハ必ス衣褥ヲ重襲シ火爐ヲ擁シ肉食ヲ用ル等ノコヲ要ス即チ此ノ如キハ亦富貴ノ人ニ非レハ能ハサル所ナリ但シ人身ノ生活ハ驗温表ノ沸騰點以上二百五十度ニ至ル迄ハ暫ク其熱ニ堪ヘ得ル者ナリ例之火輪船ノ火室ハ百四十度ヨリ下ラス然ルニ其火ヲ焚ク者常ニ健全ニ害ナキカ如シ又燒餅室ハ尚コレヨリモ熱度甚シト雖モ亦能ク其中ヲ人ノ通過スルカ如シ然レモ此熱度ノ准ニ寒氣ノ劇シキ寸ハ却テ其生活ヲ保ツコト能ハス

凡ソ一般劇シキ温度ニ於テハ人身ノ諸官能殊ニ呼吸排泄機共ニ甚シク旺盛シ脈動亦隨テ數ニ變ス又植物ハ温暖ニ由テ速ニ生長繁茂スル者ニメ即チ暖國ニハ此生長繁茂早ク假令寒國タリ凡之ヲ花窖中ニ置テ培養スレハ亦能ク然リトス蓋シ人身タリ凡尚ホ此理ヲ同フスル者ニメ熱國ノ人ハ其發生長育寒國ノ人ヨリモ速カナリ即チ暖國ニ於テハ女子十四五歳ニメ胎孕産育シ寒國ニ於テハ十六七歳ニ非レハ子ヲ生育スルヲナシ又人身ノ動體官能ハ劇シキ温度ニ遇ヘハ反テ遲徐ト

成ルナリ故ニ寒帶地方ノ人ニ比スレハ熱帶地方ノ人ハ常ニ精神及ヒ肢體俱ニ倦怠ヲ覺ヘテ其人多クハ懈怠ナルヲ性トス抑人ハ此ノ如ク寒熱俱ニ能ク之ヲ堪ヘ得ルト雖凡亦コレカ爲ニ各異固有ノ病ヲ患ヘサルヲ得ス即チ例之熱國ニ於テハ皮膚ノ分泌常ニ盛ナルヲ以テ概チ皮膚病ヲ患ヒ易ク又連日ノ炎熱ニ由テ膽液ノ分泌旺盛シ血液常ニ肝臟ニ逼流スルヲ以テ概チ肝臟衝ニ罹リ易シ然レ凡日本ノ如キ寒熱中和ノ國即チ日本ハ寒國ニメ唯夏時ノミ炎熱ヲ生ニ於テハ假令膽液ノ分泌旺盛スル



毛亦肝厥衝ヲ發スルニ至ラス唯其寒熱時トモ甚  
 タ不整ナルカ爲ニ腸ノ聖京屈ヲ患フル者多シ凡  
 テ寒冒ハ冬ヨリモ夏ニ於テ罹リ易シ何トナレハ  
 夏ハ纔カ温度ノ四五度モ降ル寸ハ著シク之ヲ身  
 ニ覺ユレモ亦冬ニ於テハ決メ否ラサルヲ以テ十  
 リ又熱國ニ於テ炎日ノ刺衝ニ中リテ頓カニ危險  
 ノ症ヲ發スルコトアリ之ヲ中熱卒中ト謂フ是症ハ  
 昏睡ニ由テ死スルモノアレモ概子皆シインコー  
 ペニ由テ甚シキハ三瞥睨間ニ死スル者トス即チ  
 此昏睡トシインコーペトノ差異ハ此病ノ治療ニ

於テ最モ必要ナル所ニ即チ其瀉血法ハ必ス害  
 アリテ強壯法ノ効ヲ奏スルヲ以テ愈此症ノシイ  
 シコトベ症多キヲ知ルヘシ寒冷ノ効用ハ全ク  
 温熱ト相反メ寒冷ハ猶前條ニ説クカ如ク動物植  
 物ノ機能ヲ抑壓シ又嚴寒ハ皮膚及ヒ毛髮ヲ収縮  
 シ血液ヲ流通不利ナルヲ以テ皮膚ヲ蒼白色ニ變  
 ス其他極嚴ノ寒冷ハ皮膚ニ點々粟粒ヲ生ス之ヲ  
 鳥肌ト曰フ又耳鼻等ノ如キ突起セリ部ハ其収縮  
 甚シク殊ニ陰莖ニ於テ最モ然リトス其他又生殖  
 機能ノ發生ヲ大ニ遲滯セシムル者猶ホ前ニ説カ

如ク然リ寒冷ハ大氣ノ動靜ニ關ル者ナレハ假令  
 暖國タリ凡風烈ケレハ寒甚シク又寒國タリ凡風  
 靜ナレハ其嚴寒ニモ堪ヘ易ク若シ寒風劇ケレハ  
 凍沍殊ニ甚シクノ耳鼻及ヒ手足ノ指等ハコレカ  
 爲ニ壞疽ヲ發スルコトアリ尚其嚴寒日ヲ瀰ル寸ハ  
 遂ニ凍死スルニ至ル其症タルヤ初メヨリ嗜眠ヲ  
 起シ漸ク昏睡ニ陷テ死スル者アリ或ハ五官ノ感  
 應遲鈍トナリ精神錯亂猶狂人ノ如キニ至リ終ニ  
 死スルモノアリ又寒冷ハ其身ニ感スル時間ノ短  
 キカ或ハ肢體ノ運動ヲ成ス寸カ又ハ暖カニ衣服

ヲ重ヌル寸ハ却テ全身ノ興奮機ヲ催進スルモノ  
 ナリ寒冷ハ疾病ノ原因ト成ルコトアリ例之寒氣ヲ  
 胃觸ノ感冒或ハ僕麻質私ヲ患ルカ如シ蓋シ人ノ  
 寒氣ニ觸レテ感冒スルヤ其時機最モ瞬息ノ間ニ  
 アリ例之身體ノ衰弱脱汗後寒暖俄カニ變スル候  
 或ハ奔走後卒カニ水中ニ投スル等ノ時ハ概子此  
 害ニ罹リ易シ然レ凡唯此景況ノミニ他ノ原因  
 加ハラサル寸ハ復必スシモ害ヲ受ル者ニアラス  
 例之魯西亞ニ於テハ百度以上ノ蒸氣室中ニ居テ  
 後直チニ冷水浴ヲナス者モ格別ノ害ナク又夫ノ

船中ノ水夫等夏日炎熱ノ時卒カニ水中ニ投スル  
モ亦同シク然ルカ如シ蓋シ其害ナキ所以ハ本人  
身ニハ所謂ル固有ノ體温アリテ常ニ氣候ノ變換  
ニ拘ハラサレハ假令一時寒冷ノ爲ニ表面ノ温素  
ヲ奪ハレテ其身ニ寒ヲ覺ユルモ亦内部ヨリ漸ク  
此體温ヲ發生ノ之ヲ復スレハナリ又之ニ反メ外  
氣ノ温度攝氏驗温表ノ三十七度半ヨリ以上ナル  
寸ハ其體温益增加メ呼吸ヲ困難ナラシム故ニ寒  
冷ノ感應ハ本身體ノ模様ニ關係メ即チ其體温ヲ  
奪ハル、多少ニ由ルナリ例之唯室内ニ安座セシ

人ハ自ラ寒氣ヲ患フルモ亦外ヨリ來ル人ハ温暖  
ヲ覺ユルカ如シ即チ人ノ攝生ニ於テモ安逸ハ常  
ニ害アリテ力作勞動ハ甚タ益アルトヲ知ルヘシ  
又第扶斯及痘瘡等ノ患者ヲ冷水ニテ洗浴スルハ  
其熱ノ爲ニ増加スル所ノ體温ヲ除キ去リテ平均  
ナラシメンカ爲メニ是レ治療ニ於テ甚タ緊要  
トス故ニ是法ヲ施ス寸ハ患者モ亦必ス其爽快ヲ  
覺ユルヲ常トス然レモ若シ人身ノ已ニ熱メ其體  
温ノ將ニ減セントスル時ハ寒冷甚タ害アリトス  
例之衰弱若クハ脱汗後ノ患者俄カニ冷水ヲ引飲

人之爲ニ死ヲ招クコトアリ若シ是類ノ患者ニ遇フ  
 寸ハ先ツ外ヨリ徐々ニ温暖ヲ與フヘシ其法則チ  
 毳布若クハ温石ヲ胃脘ニ貼シ内服ニハ多量ノ阿  
 芙蓉液ヲ與フルニ宜シ又例之人ノ偶風雨ヲ冒シ  
 行ク寸其衣服甚シク潤フト雖モ行歩スル際ハ聊  
 カ害ナシ然レモ若シ其家ニ歸ルヤ速ニ潤衣ヲ脱  
 ノ他ノ乾衣ニ換フルニ非サレハ必ス寒冒ヲ患フ  
 ルカ如シ即チ之ニ由テ其體温ヲ減却スル模様ハ  
 都テ寒冒ノ原因トナルコトヲ知ルヘシ故ニ例之勞  
 カ飢餓下痢交媾睡眠徹夜醒起苦心及病後等ハ全

身ノ血液循環ヲ遲滯シ體温亦自ラ減却スルヲ以  
 テ皆之カ原因ト成ルナリ凡テ老人及小兒ニ於テ  
 ハ最モ此寒冒ニ罹リ易シ其故何トナレハ肢體ノ  
 運動常ニ少ナクメ皮膚ノ弛縱スルカ爲ナリ又寒  
 冷ノ人身ニ害アル所以ハ唯温度ノ減少ニノミ拘  
 ハラス又其沍寒瀰日ノ長短大氣ノ動靜及其乾潤  
 等ニ係ル者ニメ例之氣候ノ温氣ニ變ナキモ風烈  
 シク或ハ靄霧ノ深キ日ハ殊ニ寒冒ノ害ヲ爲シ易  
 キカ如シ又都テ寒冷ノ害ヲ避ルニハ可及的皮膚  
 ノ知覺ヲ遲鈍ナラシメシヲ要ス故ニ心思ノ努力

七情ノ感動癲狂花風病等ノ神經諸病及習慣等ハ  
 皆此知覺ヲノ遲鈍ナラシムル者トス即チ此習慣  
 ヲ得シニハ毎日冷水浴ヲ用ユルヲ佳トス然レニ  
 亦之ヲ施スニハ最モ注意セシヲ要ス乃チ西洋ニ  
 於テモ動モスレハ虚弱ノ小兒ヲノ毎日嚴寒ニ冒  
 觸セシムル等ニシテ屢之ヲ誤ルヲアリ故ニ冷水  
 浴ヲ施スニハ熱ト其利害ヲ察スルニ非サレハ決  
 ヲ施ス可ラス例之浴後全身ニ温熱ヲ發スルモノ  
 ハ極メテ効ヲ奏スルノ徵ナリ宜シク續テ施スヘ  
 シ若シ又浴後惡寒戰慄ヲ發シ或ハ頭痛眩暈等ヲ

發スル者ハ必ス害アルノ兆ナリ決メ再ヒ施スヘ  
 カラス若シ強テ之ヲ用ユルカ如キハ必ス大患ヲ  
 生スヘシ四時寒暖ノ更換ニ隨テ感スヘキ病ヲ論  
 スルニ凡ソ夏時ハ下利等ノ如キ腹部ノ病多ク冬  
 時ハ咳嗽等ノ如キ胸部ノ病多シ又概メ之ヲ視ル  
 ニ其腹部ノ病ヨリ胸部ノ疾ヲ危篤トス故ニ死亡  
 ハ夏ヨリモ冬ニ多シ殊ニ老人ニ於テハ最モ然リ  
 トス即チ寒威ノ劇烈ナル年ハ必ス老人ノ死亡多  
 キヲ知ルヘシ其他又冬時ニ於テ腦内漏血即チ卒  
 中症ノ多キヲ見ル蓋シ此因理ニ二般アリ一ハ互

寒ノ劇烈ナルカ爲ニ血液内臓及頭腦ニ逼流シ以テ腦内ノ血管破裂スルニ由リ一ハ自然呼吸氣ノ多キカ爲ニ全身ノ血液循環其常ヲ妨ケラル、ニ由ル者ナリ其他四時氣候ノ交錯ハ常ニ諸病ノ經過ニ關係ノ例之熱病ノ如キ是レ寒暑俱ニ發スル所ノ病ナレト亦暑中ニハ必ス腹部ノ症ヲ合併シ冬ニハ概子呼吸器ノ症ヲ兼スルカ如シ大氣ノ不潔都テ大氣中ノ諸瓦斯及傳染毒等ハ姑ク其論ヲ閣メ唯諸病ノ原因トナルヘキ大氣ノ不潔ノミヲ説ントス例之繁華ノ都府ニ於テハ其



人煙稠密ニメ大氣ノ不潔ナルカ爲ニ之ヲ田舎ニ較フレハ其人民常ニ疾病多クメ且長壽ヲ保テ難シ故ニ若シ市中ノ衰弱患者等荏苒快復ヲ得難キ者ハ惟之ヲ田舎ニ徙メ其開豁清涼ノ大氣ヲ吸浴セシムルノ外復他ノ術ナキナリ其他大氣ノ不潔ハ常ニ諸病ヲ惡性ニ變スル而已ニメ唯腺病ノ外ハ別ニ一定ノ原因ト成ル者ニアラス其餘大氣ノ性質及感應ハ下ノ各論中ニ於テ詳カニ之ヲ論スヘシ故ニ復此ニ載セス

第四遺傳

遺傳ハ先天ヨリ父母ノ體質ヲ稟賦メ生來其病  
ヲ受傳フヘキ性アルヲ謂フナリ例之父母ノ伊屈  
篤ニテ死スル者ハ其子亦必ス此病ヲ患フルカ如  
シ都テ疾病ノ素因ト感受性トハ自ラ異ナル所ナ  
レハ此區別最モ醫事ニ於テ肝要トス即チ病ノ感  
受性ハ各人皆之ヲ具フルモ亦其素因ハ各人悉ク  
之ヲ具フル者ニアラス例之今二人アリテ一人ハ  
伊屈篤ノ素因ヲ有シ一人ハ之ヲ有セス而メ俱ニ  
伊屈篤ノ病者ニ親接スル寸ハ假令其攝生ヲ同フ  
スルモ素因アル者ハ之ヲ感受シ素因ナキ者ハ之

ヲ感受スルヲナシ又遺傳ノ素質ニ強弱ノ二般ア  
リテ同シ素因ヲ有スルモ亦之ヲ受感シ易キト感  
受シ難キ者アリ即チ此傳屍病ノ種類ハ腺病伊屈  
篤勞瘵及顛狂等是ナリ又人ニ由テハ唯遺傳ノ素  
因ノミナラス都テ感受性ノ少ナキ者アリ例之大  
食多飲及寒熱等ニ於テ衆人ニ優レテ能ク之ニ堪  
ヘ得ル者アルカ如シ都テ人ノ氣象體質及容貌ニ  
至ル迄其父母ニ肖似スルモノ猶病ノ遺傳ニ於テ  
モ同シク然ル者ナリ或ハ又顔面容貌ノ類似ハ攝  
生ノ同キニ由ルト云フノ説アレハ是甚タ非ナリ

例之六指ノ人六指ノ子ヲ生ムコトナシ又遺傳ノ素質其子ニ受スメ其孫ニ至リ始メテ之ヲ受ルコトアリ又後天不具ハ決メ遺傳スルコトナシ例之火傷ノ爲ニ手足ノ不具ト成リシ者亦決メ手足不具ノ子ヲ産ムコトナキカ如シ

疾病ノ證候シンプトローマ

疾病ノ證候ハ即チ患者自ラ其痛苦ヲ覺ヘ醫士外ヨリ其模様ヲ察シ以テ疾病ノ本性ヲ鑒識スヘキ者ヲ謂フナリ凡ソ疾病ヲ鑒識スルニハ三様ノ目的アリ第一ハ病ノ性質及所在ヲ知ルニアリ之ヲ

診則ト云フ第二ハ病ノ經過及轉歸ヲ察スルニアリ之ヲ豫後ト云フ第三ハ病ノ症ニ隨テ治療ノ法則ヲ立ルニアリ之ヲ治法ト云フ百般ノ疾病若シ之ヲ診定セサル寸ハ決メ其治ヲ施スコト能ハス故ニ先ツ診則ヲ行ヒ次テ其治法ヲ施スニ至ルヘシ或ハ時トメハ假令病性ノ顯然ナラサルモ亦醫藥ヲ投セサルヲ得サルコトアリ右等ノ時モ可及的仔細ニ診定メ後藥ヲ與ンコトヲ務ムヘシ然レモ若シ其萬一已ヲ得サル寸ハ假令病性及其所在ノ未タ分明ナラサルモ宜シク古來傳ル所ノ奏功藥或ハ



師家ヨリ授ル所ノ法及書中ニ確載セル所ノ方ニ  
 棟テ亦夕之ヲ試用スヘシ例之胃ノ聖京屈ニ重炭  
 酸曹達ヲ用ユルカ如キモ亦此理ナリ重炭酸曹達  
効アル者ホク其其已ニ病性及所在ヲ辨識シ得ル  
理ヲ確定セスノ後ハ確乎トメ治法ヲ處スルハ勿論ナレモ若シ  
 又之ヲ辨識シ得サル寸ハ決メ藥ヲ用テ病ヲ試ム  
 可ラス若シ然ルカ如キハ動モスレハ病ノ轉歸ヲ  
 誤リテ益之ヲ危險ニ陥ラシメ却テニ衆人ノ侮ヲ  
 受ルヲアリ是甚々醫學ニ於テ害アル所トス故ニ  
 疾病ノ鑒識ハ極メテ醫事ノ緊要ナル所ナリ然レ

氏方今ニ至リテハ醫學益闡ケテ種々ノ器械方法  
 ヲ發明シ以テ古來不明ノ病症ヲモ亦之ヲ顯カニ  
 知ルヲ得タリ例之顯微鏡的及舍密的試驗打驗法  
 聽檢法其他檢耳鏡檢喉鏡等ヲ用テ種々不審ノ病  
 症ヲ診決スルカ如シ畢竟皆醫學ノ開化ニ由ル所  
 ナリ  
 第二豫後ハ甚々患者ノ信不信ヲ將來スルニ關係  
 セリ蓋シ醫ノ信ヲ取ルト否ラサルトハ治療ノ爲  
 ニ甚々緊要ナル所ニメ若シ其經過醫士ノ豫メ言  
 フ所ノ如クナラサレハ自然其信ヲ失フニ至ル果

メ信ヲ失フ寸ハ既ニ無用ノ人ニ屬ス然レモ亦其  
經過及轉皈ヲ重ク言フ寸ハ患者忽キ心氣ヲ沮喪  
メ之カ爲ニ命期ヲ促スコトアリ或ハ之ヲ忌テ治ヲ  
他醫ニ轉シ以テ遂ニ賣藥者流ノ手ニ死スルコトア  
リ但シ已ニ前條ニ於テ診則豫後及治法ノ三個條  
ヲ舉ルト雖モ亦諸病ニ於テ悉ク之ヲ確定スルハ  
醫士ノ甚タ難キ所トス然レモ時トメハ唯輕些ノ  
證候ヲ以テ此三箇ノ目的ヲ達スルニ足ルコトアリ  
例之纜カ舌苔ヲ見テ胃ノ聖京屈タルヲ診定シ隨  
テ直キニ其治方ヲ處スルカ如シ又痘瘡ノ如キハ

各箇ノ證候ニ由テ三箇ノ目的ヲ達スル者ナリ即  
チ其瘡ノ形色ヲ以テ痘瘡タルコトヲ知り其數ノ多  
少疎密ニ由テ經過ノ安危ヲ察シ脈ノ性情ニ據テ  
其治方ヲ處スルカ如シ故ニ痘ノ形色ハ其病性ヲ  
顯ハス者ニノ即チ之ヲ痘瘡ノ症トス脈ノ性情ハ  
之ニ據テ痘ノ虛實及其他ノ景況ヲ窺フヘキ者ナ  
レハ痘瘡治法ノ指南針トモ謂フヘシ又病ノ症候  
ト徵候トハ自ラ異ナル者ニノ徵候ハ只諸症ヲ比  
較シ之ニ由テ得ル所ナリ例之蠶躄ノ腫脹ハ是一  
個ノ病症ナリ之ヲ他ノ諸症ト比較シ其便毒タル

ナ又動脈瘤タルヲ確知スヘキハ即チ徵候ナリ  
故ニ症候ハ諸人ノ知ルヘキ所ニシテ徵候ハ醫士ニ  
アラサレハ知ル可ラサル者ナリ又時トシテ諸症  
ヲ合メ一ノ徵候ヲ得ルコトアリ例之此ニ咳嗽ノ一  
患者アリ之ニ打檢法ヲ施セハ鈍濁ノ音ヲ發シ又  
聽檢法ヲ用フレハ肺ノ橐籥音ヲ徵セス且稀薄透  
明ナル痰沫ヲ咯出スルハ是全ク胸膜焮衝ノ徵ナ  
リ又諸症中唯其一症ノミヲ以テ豫後ヲ爲スニ足  
ルコトアリ例之右ノ症等ニ於テ過量ノ咯痰劇甚ノ  
衰弱及不眠等ニ據テ豫メ本病ノ凶兆ヲトスルカ

如キ是ナリ其他又病ノ證候ニハ所謂ル固有症トバ  
ニスモアリ是諸般ノ病ニ於テ本病ニ固有セル必  
見ノ症ナリ例之便毒ノ腫脹胸膜焮衝ノ鈍音ノ如  
キ是ナリ然レモ亦唯此固有ノ症ノミ顯ハスコトハ  
極テ稀ニシテ通常必ス他ノ諸症ト合併シ來ル者ア  
リ例之便毒ニハ必ス疼痛焮熱等ヲ兼テ胸膜焮衝  
ニハ必ス疼痛咳嗽等ヲ併發スルカ如キ以テ見ル  
ヘシ  
病ノ證候ハ又之ヲ本症ト交感症即チ傍症トニ區別ス  
本症ハ其直チニ患部ニ起ル者ニシテ例之指頭ノ焮

衝ニ於テ其部ニ疼痛赤色ヲ發スルカ如シ交感症  
ハ其延テ遠隔ノ部ニ發スル者ニ例之此指痛ノ  
爲ニ全身熱ヲ發シ腋下腺ノ腫脹ヲ起スカ如キ是  
ナリ  
又症候ヲ分テ之ヲ聞知症チオブセクト見知症セソク  
フチトノ二種ニ分ツ即チ甲症ハ唯患者ノミ知覺  
スヘキ症ニ例之頭痛眩暈等ノ如キ是ナリ是必  
ス患者ニ聞テ知ル所ノ症ナレハ斯ク名ツクルナ  
リ又乙症ハ赤色腫脹及打音等ノ如ク醫ノ外ヨリ  
察スヘキ者ヲ謂ナリ故ニ之ヲ見知症ト曰フ就中

甲症ハ動モスレハ患者ニ欺カル、トアレハ強子  
之ヲ敢テ信ス可ラス例之猶ホ顛狂人異邦人啞者  
聾者小兒及酒癖人等ノ如キハ孰レモ其痛苦ヲ自  
ラ訴フルコト能ハサルヲ以テ診則ノ甚タ困難ナル  
ヲ常トス  
其他病ノ症候ヲ分テ三種トス其一ヲ病的ノ感覺  
トス即チ聞知症ニ屬ス其二ヲ官能ノ病的障<sub>ト</sub>碍ト  
シ其三ヲ組織造構ノ病的變常トス此二種ハ所謂  
ル見知症ニ屬ス第一種ノ諸症中其特異ナル者ヲ  
疼痛トス

病理解論  
卷之十  
醫學校書版  
三十七

甲疼痛ハ本之ニ依テ其焮衝ト否ラサルトヲ確徵  
 スヘキ一箇ノ症ニメ其部位ト組織トノ各異ナ  
 ニ隨テ性情一樣ナラス例之刺痛穿痛焮痛淺痛深  
 痛及鼓痛等ノ名ヲ異ニスルカ如シ就中其外ヨリ  
 抑壓メ痛ム者ハコレ本來ノ疼痛ニアラス宜シク  
 之ヲ知覺銳敏ト看做スヘシ又一部ニ痛アル寸延  
 テ他ノ遠隔ノ部ニ疼ヲ起スコアリ之ヲ交感痛ト  
 曰フ例之指頭ノ焮衝ニ於テ腋下ニ痛ヲ發スルカ  
 如シ又疼痛ノ感覺ハ各人及各土ニ隨テ自ラ強弱  
 ノ差ヒナキヲ得ス例之英才敏智ノ人婦人及小兒

ハ概子知覺ノ銳敏ナルヲ以テ疼痛必ス劇シク又  
 田夫野人及開豁ノ地ニ於テハ概子疼痛甚シカラ  
 サルカ如シ又痛ハ患者精神ノ方嚮ニ係ル者ニメ  
 例之只管其患ニノ心ヲ注ク寸ハ痛甚シク又他  
 事ニ意ヲ轉スル寸ハ却テ堪易キ者トス  
 乙痒癢ハ即チ疼痛ノ類症ニメ其皮膚及外竅<sub>耳鼻</sub>  
 ノ門等<sub>及肛</sub>内ニ起ル者ヲ痒癢ト名ツケ其内部例之咽喉  
 中等ニ發スル者ヲ癢痛ト名ツク此症ハ常ニ患者  
 ラメ甚々攪擾セシムル者トス  
 丙眩暈ハ腦ニ起ル所ノ所謂ル聞知症ニメ又全身

ノ衰弱或ハ胃病ノ交感ヨリ發スルヲ多シ  
 丁昏冒ハ大患ニ於テ精神ノ錯亂ヨリ起ル者多シ  
 戊壓重窘迫ハ例之大小便ノ秘閉シ咳嗽ノ頻劇ナ  
 ル寸此感應ヲ覺ユルカ如キ是ナリ其他感應ノ症  
 ニハ食欲ノ増減食味ノ缺損渴ノ増減及異嗜等ノ  
 症アリ就中甲乙丙ノ三症ハ感覺症ノ最モ主タル  
 者トス其他ハ爰ニ略ス  
 諸般官能ノ病的障礙ハ之ヲ病的感覺ニ比スレハ  
 最モ緊要ナル所トス蓋シ腦髓脊髓神經心臟血管  
 呼吸器及消食器ノ官能ヲ指メ生活官能ト謂フ悉

ク皆其源ハ腦脊神經ノ作用ニ由テ成ラサル者ナ  
 シ又思慮行爲及五官ノ作用ヲ斥メ動物官能ト謂  
 フ之レ亦腦及神經ノ作用及主宰ニ由ル所トス今  
 五官ノ作用ニ就テ之ヲ論スルニ例之猶ホ皮膚ノ  
 麻痺ノ如キ其初メ一紙ヲ隔テ、管ツルカ如キヨ  
 リ其全ク知覺ヲ失フニ至ル迄之ヲ神經知覺ノ障  
 碍トス又眼官ノ如キハ其視力之弱及其明ヲ喪ナ  
 ヒ或ハ其異形ノ物ヲ眼前ニ見ルカ如キ皆之ヲ視  
 官ノ障礙トス又耳官ニ於テハ聽力之弱及聾聵等  
 之ヲ耳官ノ妨碍トス其他又夫ノ第扶斯熟等ニ於

テ併發スル耳官過敏ノ症ハ常ニ病ノ惡兆トス又  
 所謂ル蟬鳴風鳴濤鳴等ノ症ハコレ恐ラクハ血管  
 ノ障礙ニ係ル者ナランカ又病ノ爲ニ精神ノ思力  
 ニ障礙ヲ受ルコトアリ例之思慮ノ聯續ヲ失フテ言  
 語ノ次第ヲ亂スカ如キ是ナリ又精神ノ辨知力ヲ  
 錯亂スルコトアリ例之現ニ晴天ヲ指テ雨天ト曰ヒ  
 白キヲ見テ黒キト曰フカ如シ就中思力ノ妨碍ハ  
 獨發スルコトアリ兼發スルコトアリ例之諸種ノ誓留  
 熱ニハ多少必ス是症ヲ兼ヌルカ如シ又飲食停滯  
 ノ症等ニ此症ヲ發ノ甚タ危險ノ状ヲ顯ハスモ亦

其吐瀉ニ由テ速カニ復常スルコトアリ總テ此思力  
 及辨知力ノ變常ハ殆ント謔語ニ近キ者トス故ニ  
 此變常益増劇セハ終ニ謔語ト成ルナリ謔語ハ概  
 子夜間ニ發スル者多シ是晝間ハ患者其心ヲ他ニ  
 轉慰スルヲ以テナリ其他運動モ亦種々ノ變常ヲ  
 受ルコトアリ例之痙攣ニ由テ之ヲ旺盛シ衰弱麻痺  
 ニ於テハ之ヲ減却スルカ如シ其他震慄ノ如キモ  
 亦是レ運動ノ變ニ屬ス  
 呼吸器ノ變常ハ其一ヲ呼吸困難トス是レ種々ノ  
 原因ヨリ起ル所ニメ例之疼痛ノ爲ニ發スルコトア

リ即チ呼吸諸筋ノ痠麻質私ニ罹ル寸發スルカ如シ或ハ肺ノ氣胞中ニ諸液ノ鬱滯スルカ爲ニ吸氣其中ニ入ルヲ能ハサルヲ以テ此困難ヲ起スアリ或ハ又神經ノ劇シキ感動ニ因テ然ルアリ例之猶ホ夫ノ「アスト」症ニ於ルカ如シ都テ呼吸困難ノ症ヲ患フル人ハ常ニ仰臥スルヲ難シ其二ヲ咳嗽トス是即チ呼吸諸筋ノ劇シキ痙攣ニノ其吸氣ヲ爲ス寸聲門ノ閉塞スルニ由テ起ル所ナリ又呼氣ト共ニ粘稠ノ液ヲ咯出ス之ヲ痰沫トス咳嗽ニ種々ノ別アリ即チ此種ノ異ナルニ依テ諸病ヲ

診決スヘシ例之此種ノ咳嗽ニ由テ百日咳タルヲ知リ他種ノ咳嗽ニ由テ肺焮衝及肺勞タルヲ察スルカ如シ其餘此ノ如ク咳嗽著シカラサルモ亦能ク之ニ由テ病症ヲ診決スヘキ者多シ乃チ往古未夕打檢法及聽檢法等ノ發明ナキ以前ハ大率此咳嗽ヲ以テ胸部ノ諸病ヲ診定セシ者ナリ其三ヲ噴嚏トス是亦咳嗽ト同シク呼吸諸筋ノ痙攣ヨリ起ル所ナリ是症モ亦擲發スル者アリ他病ニ併發スル者アリ以上舉ル所ノ呼吸困難咳嗽及噴嚏ノ三症ハ呼吸器諸症ノ殊ニ重キ者ナレハ右ニ其



大略ヲ載リ其他噎氣吃逆等ノ症ハ此ニ其論ヲ省  
ク  
行血器ノ變常ニ於ル打撿法及聽撿法ハ後ノ心臟  
病論中ニ於テ審カニ之ヲ辨スヘシ但シ此變常ノ  
特異ナル者ハ脈症是ナリ即チ此脈症ヲ分テ遲數  
齊不齊虛實大小強弱及硬軟等ノ數種トス其一遲  
數脈ヲ知ルニハ先ツ豫ノ病ナキ人ノ脈度ヲ知ラ  
スハアラズ即チ通例大人ノ脈度ハ大約一晷呢  
間ニ七十動ヨリ七十五動ニ至ルヲ常トス病態ニ  
於テハ八九十動ヨリ百動以上ニ至ルヲ屢アリ遲

脈ハ六十動以内ニ減シ甚キハ二十五動マテ減ス  
ルヲアリ就中小兒ノ脈ハ大人ヨリ數ニメ老人ノ  
脈ハ又其遲ナルヲ常トス其二脈動ニ齊アリ不齊  
アリ即チ動脈ノ搏動全キ寸ハ之ヲ齊脈トス其之  
ニ反スル者ヲ間歇脈ト云フ凡ソ此間歇脈ハ心臟  
病胃病等ノ危篤ナル患者ニ於テ常ニ多ク見ル所  
トス其三脈症一虛アリ實アリ虛ハ小ニノ實ハ大  
ナリ即チ其指頭ニ觸ル、所ノ脈巾廣キ者ヲ實脈  
ト云ヒ又之ニ反スル者ヲ虛脈ト云フ就中其糸ノ  
如クニノ漸ク指頭ニ應スル者ヲ細脈ト云フ其四

脈ニ強弱アリ堅軟アリ即乎指頭ニテ抑壓スレハ  
 尚ホ絶サル者ヲ強硬脈ト云ヒ其容易ニ絶ユル者  
 ヲ軟弱脈ト云フ硬脈ニハ大ナルアリ小ナルアリ  
 軟脈モ亦然リ例之尋常ノ焮衝症ニ於ルカ如キハ  
 其脈硬ニシ且大ナリ然ル寸ハ速ニ瀉血法ヲ施ス  
 ヘシ又内臟焮衝例之胃焮衝ニ於ルカ如キハ其脈  
 硬ニシ小ナリ是亦瀉血法ヲ以テ適當トス都テ硬  
 脈ハ瀉血ニ適應ノ症ト看做スヘシ然レハ或ハ心  
 臟病等ニ於テ瀉血ヲ行フ寸ハ甚々害アルナリ  
 故ニ亦一概率由スヘカラス其他軟大ノ脈ハ第扶

斯熱ニ多ク軟小ノ脈ハ乏血症ニ固有スル者ナリ  
 消食器ノ變常ハ後ノ各論下ニ於テ審カニ論スヘ  
 シ其他温度色澤及患部周圍ノ變常アレハ此ニ其  
 大略ヲ附説スヘシ其一温度ノ變常ハ所謂ル聞知  
 症ニメ患者自ラ覺ユル所ナリ此温度ノ變常ハ唯  
 一ニノ病ヲ除ク外ハ概子諸病ニ於テ知リ難キ所  
 トス宜シク驗温表ノ升降ニ徴メ之ヲ察スヘシ其  
 二色澤ノ變常ニハ種々異様アリテ即チ熱病ニハ  
 顔面赤色ヲ發シ乏血病ニハ全身蒼白色ヲ成シ勞  
 瘵熱ニハ白頰ニ紅暈ヲ潮シ黄疸ニハ全身黄色ヲ

發シ心臟病ニハ全身若クハ局所ニ青色ヲ見ハシ  
其餘種々ノ皮膚病ニハ種々ノ色ヲ發スルカ如シ  
其三患部周圍ノ變常ハ水腫及肝臟病等ニ於テ見  
ルカ如シ都テ其周圍ノ變ハ常ニ危險ナラス例之  
飲食消化ノ不良ナル症ニ於ルカ如シ又肺勞ノ如  
キハ周圍ノ減少ヲ以テ常ニ危險ノ症候トス其他  
舌上ノ變化即チ舌苔ハ常ニ診則ニ於テ注意セス  
ンハアラス舌苔ハ古來先哲ノ論定セシ如ク唯之  
ニ由テ胃病ヲ徵スルノミナラス口中粘膜ノ病ヲ  
モ亦能ク察スヘキ者トス以上舉ル溫度色澤及周

圍ノ變常ハ殊ニ醫士ノ常ニ注意セスニハアラサ  
ル所トス是皆醫士ノ五官ニ由テ外ヨリ察スヘキ  
者ナレハ決メ患者ノ爲ニ欺カル、トナシ都テ是  
等ノ變常ヲ検査スルヲ以テ之ヲ原生的検査ト曰  
ヒ其他小便及膽汁等ヲ検査スルヲ以テ之ヲ含密  
的検査ト曰フ

病理略論卷下終



東京醫學校分版

東京淺草茅町二丁目

須原屋伊八

馬喰町二丁目

島村屋利助

發兌

同

