



明
冊 72
卷 2止



保嬰新書卷之下目錄

小兒病總論

嬰兒黃膽

驚口瘡

麻疹

假疹

猩紅熱

百日咳

哥羅布

胃嫩衝

漢醫所謂
馬脾風



保嬰新書卷之下目錄

保嬰新書卷之下目錄

加兒羅阿俗云

感冒鼻加答兒

喉頭焮衝

氣管枝焮衝氣管枝

肺焮衝

肋膜焮衝

勞瘵

保嬰新書目錄終

保嬰新書卷之下

白耳義

設兒沕私著

大日本 陸軍軍醫監從五位石川良信閱
東京 高松凌雲譯

小兒病總論

凡ノ嬰兒ノ疾病ヲ考究スルニ豫メ先ツ其病症
ト年齒ニ隨テ其發シ来ル所ノ病ノ順序ヲ知ル
ト最モ必用ナリ

嬰兒ハ天稟強壯ニシテ體格ノ結構モ亦十全ナル者ト雖其薄弱ノ年齢ニ方リテハ種々ノ疾病ニ罹リ易シ既ニ病ニ罹レバ則チ種々ノ變症ヲ起ス者ナリ而シテ其病因ハ外感ヲ最モ多シトス故ニ外ヨリ病ヲ受ル者トシテ常ニ之ヲ忘ルベカラズ就中乳母ノ乳汁ノ變質或ハ常習ノ變換暑寒ノ感觸等ノ如キ萬事ニ注意セザレバ不意ニ疾病ヲ發スルコトアリ
 乳母并ニ看守ニハ常ニ注意スベキ事情ヲ懇諭シテ怠ラシムベカラズ若シ誤リテ嬰兒ヲ失墜

シ或ハ其頭部ヲ撲ツ等ノコトアレバ輒チ病ノ原因トナリテ健全ノ兒ヲ惱マヌニ至ル又小兒ハ甚タ流行病傳染病ニ感染シ易キ者ナルガ故ニ疾病流行スル所ハ務メテ之ヲ避ケザルベカラズ
 嬰兒一年未滿ニシテ疾病ニ罹リ漸々衰弱疲勞シテ遂ニ斃ルニ至ル者枚擧スルニ違アラズ
 今爰ニ嬰兒ノ衛生ノ方法ヲ以テ多少ノ疾病ヲ防キ又其病ノ已ニ發スルニ方リテハ注意ト治療ヲ盡シ其病因ヲ驅除シ以テ大ニ夭折ノ數ヲ

減ズルハ皆此衛生法ニ基カザルハナシ
國家開化ニ進ムニ隨テ人民天ノ秘密ヲ窺ヒ文
學詳明ヲ得テ生命保續ノ蘊奧ヲ悟リ以テ夭折
ヲ免ルニ至レリ

今爰ニ小兒病治療法ノ大略ヲ示スト雖モ醫ニ
依賴セズシテ猥リニ自己ニ治療ヲ施ス勿レ
縱令其病症ハ同症同因ナリト雖モ患兒ノ稟賦
ニ隨テ治療ハ較異ナル者ナリ故ニ俗家ハ常ニ
此說諭ヲ忘レズシテ健全法ト疾病ノ發端トニ
注意シ危難ヲ防ギ以テ病ノ増進ヲ停ムルヲ

旨トスベキノミ
次ニ舉ル所ノ如ク每兒何レモ同病ヲ患ルナ
ク又變化ナキ病ヲ患ルナシ乃チ左ノ順序ノ
如キモ必ず一定スルナキ者ニシテ一兒ハ此
病ニ罹リ他兒ハ彼ノ病ヲ患ルナリ然レモ大
概其順序アリ故ニ其順序次第ヲ舉ルナ左件ノ
如シ

嬰兒黃膽

出生後一二日ヲ經テ嬰兒ノ皮膚青黃色トナル
之ヲ嬰兒黃膽ト名ク而シテ其色二三日ヲ經テ

自然ニ消散スルヲ往々之アリ然レ其色荏苒
 トシテ次第ニ濃黄トナリ舌及ビ眼球モ同ジク
 青黄色ニ變ジ終ニ肌熱ヲ發シ胃ニ感動ヲ起シ
 臍ノ右邊ニ微痛ヲ覺ヘ嘔氣嘔吐大便秘結小便
 減少等ノ諸症ヲ發スル者アリ然ル時ハ麥糠微
 温浴或ハ亞麻仁末又ハ蜀葵根末ノ緩和温琶布
 及ビ緩和灌腸ヲ行フベシ
 分娩後ハ日々醫ノ來診ヲ請フヲ必用ナリ故ニ
 其時期中ニ嬰兒黄膽ヲ發シテ直ニ醫ノ診斷ヲ
 請ヒ以テ治療ヲ施セバ必ズ危篤ニ至ルノ患ヒ

ナカルベシ

産婦ハ分娩後數日臥床ヲ離ルヲナク常ニ注意
 スベシ殊ニ分娩後第九日ニ方リテ子宮ニ一種
 固有ノ感動ヲ起シ危難ノ症ヲ發スルヲアリ故
 ニ本復ニ至ル迄ハ日々醫ノ診察ヲ請フヲ母子
 俱ニ寢モ要務ナリ
 一婦ハ分娩後第九日ヲ經テ快復ニ趣キ一婦ハ
 第九日ノ後荏苒トシテ快復ニ赴カザル者アリ
 故ニ健全法ヲ守リテ醫ノ説諭ニ隨フベシ若シ
 生母健全ナラザレバ則チ嬰兒モ亦健康ヲ得ル

一難シトス

驚口瘡

驚口瘡ハ一種ノ喉衝ニシテ口中齒齦舌等ニ發
 ス又稀ニハ咽頭粘液膜ヲ傳ハリ食道胃小腸及
 ビ大腸迄ニ發スルコトアリ
 驚口瘡ノ初起ハ舌尖及ビ舌縁腫脹シ或ハ小泡
 ヲ發シテ舌上赤色トナリ口中乾燥シテ熱ヲ生
 ズ然ル時ハ吸乳スルコト困難トナリ乳頭ヲ其口
 ヨリ離セバ刺痛ヲ起ス故ニ叫泣ス次ニ舌縁舌
 上舌下及ビ舌帶ノ兩側等ニ白色ノ火斑ヲ顯シ

其斑速カニ蔓延スレバ其色恰モ凝固セル牛乳
 ノ一層ヲ舌上ニ覆フガ如シ其白斑或ハ唇ノ兩

端及ビ唇外後部ハ上脣懸様垂頰ノ内面及ビ腮
 ノ接際ニ蔓延ス

通常驚口瘡ハ小兒ニ發スル者ニシテ食欲止マ
 其脈疾數ニシテ大渴惡心嘔吐ヲ起シ大便青色

トナル此徵候悉ク備ル者ハ甚タ重症ナリ病兒
 ハ羸瘦シ顔面ニ皸皸ヲ生シ眼目縮小シ聲音廢

止シ其脈殆ト絶ハザル縷ノ如ク四肢厥冷ス
 驚口瘡ハ不良ノ乳汁及ビ吸乳器ノ不潔或ハ腐

敗シ易キ食物ヲ與フル等ヨリ發スル者ナリ又
 往々急性病或ハ慢性病ニ併發シ或ハ乳母ノ攝
 生不良或ハ多病ノ乳母又ハ居室中ノ空氣新陳
 代謝セズシテ敗氣トナリ或ハ住所卑濕等ノ如
 キハ皆此病ノ原因トナルナリ
 上説ノ如キ發疹ヲ知納活上ニ生ズルヲ視バ其
 疹未ダ白色ニ變ゼザル前ニ直ニ醫ノ診斷ヲ請
 フベシ其治療法ハ蜀葵根煎或ハ亞麻仁煎汁ヲ
 筆ニ浸シテ口中ヲ洗フ毎日常數回若シ患兒既
 ニ食餌ヲ喫シ得ル者ニハ之ヲ禁ジテ獨リ乳汁

ヲ飲マシムベシ但平常ノ半量ニ過ダベカラズ
 次ニ粘滑劑ノ灌腸及ビ麥糠煎汁ノ全身浴ヲ施
 スベシ通常驚口瘡ハ一度發シテ消散シ更ニ再
 ビ發シ十日乃至十五日ヲ經テ快復スルモノナ
 リ
 驚口瘡ハ初期ニ恰好ノ治療ヲ施サバ病勢
 漸次ニ蔓延シ胃ニ傳ヘ腸ニ沿フテ肛門ノ周圍
 赤色トナリ終ニハ臀皮剥脱スルニ至ルモノナ
 リ
 若シ一兒驚口瘡ニ罹レバ直ニ其居室ヲ別ニシ

保嬰新書 卷之十 六 高林氏藏版

必ス他児ト同室ニ置クモ莫レ

驚口瘡ハ痘瘡ノ如ク感染スル者ニ非スト雖

氏疥癬頭瘡等ノ如キ皮膚病ト同ク蕃殖スル

者ナリ故ニ直ニ之ニ觸レバ則チ傳染ス劇児

珊氏ハ乳母ノ乳ヨリ傳遞シテ他児之ヲ感受

スルヲ證明セリ

武首氏ハ錦葵蜀葵亜麻仁ノ浸劑ヲ驚口瘡ノ特

功藥ト稱シテ專ラ之ヲ賞用ス

麻疹

麻疹ハ流行傳染性ノ小児病ニシテ防禦シ難キ

者ナリ偶幼稚ノ時之ヲ免ル、ト雖氏成長ノ後

必ズ之ニ感ズ

麻疹流行ノ時ニ方リテハ父母常ニ小児ニ注意

スベシ然ラザレバ既ニ感ズト雖モ數日間發疹

セザルヲアリ故ニ其未發ノ者ハ其證候分明ナ

ラザルガ故ニ惑ヲ抱キテ醫ノ診斷ヲ請ハズコ

レガ為ニ重症ニ至ラシムル者アリ

麻疹ノ初期ハ通常惡寒發熱顔面豐大眼瞼腫脹

シ眼球ニ赤色ヲ潮シ流淚噴嚏鼻涕流出稀ニハ

衄血搐搦譫語ヲ發シ或ハ數日間呼吸障碍シ咳

ハナシ

嗽ヲ發スル者ナリ
 以上ノ徵候ヲ具フル時ハ未ダ發疹セザル前ニ
 速カニ醫ノ診斷ヲ請フベシ、醫ハ其疾病ヲ診定
 シ其症ノ緩急輕重ニ隨テ治療法モ亦自ラ差異
 アレバナリ
 佛國ノ拔倫氏美羅兒氏ノ實驗ニ據レバ此病ハ
 生齒前ニ比スレバ生齒後ヲ最モ多シトス此兩
 氏積年巴里ノ小兒病院ニ在リテ實驗セシニ大
 概小兒出生後八九ヶ月ニシテ此病ニ罹ル而シ
 テ常ニ春秋二季ニ多シト云フ

麻疹ハ通常徵候アリテ後第三日ニ發スル者ナ
 リ然レド其發疹第五日第六日ニ至リテ漸ク發
 スル者ハ重症タルヲ知ルベシ
 最初ハ蚤刺ノ如キ赤色ノ小斑先ツ額ニ發シ次
 ニ顔面ニ顯ル其小疹蔓延シテ稍隆起シ指頭ヲ
 テテ皮上ヲ摸試スレハ小大不同ノ小疹皮下ニ
 散布スルヲ覺フ
 其次ハ頸ニ顯ル然レド其之ヲ發セザル所ノ間
 隙ノ皮色ハ平常ニ異ナルヲナシ又胸部軀幹四肢
 等ニ發スルノ期ハ大概顔面發疹ノ翌日ナリ

故ニ消散モ亦此順次ニ准ズ
 其發疹十分ナレバ未ダ消散ノ期ニ至ラズト雖
 モ眼ノ赤色及ビ流淚共ニ減少シ脈度モ亦減ズ
 然レモ咳嗽ハ依然トシテ止マサル者ナリ
 劇症ノ麻疹ハ發疹後八日間ハ持續シテ消散ス
 ルトナシ若シ十分ニ見點セザレバ猶數日間消
 散セサル者ナリ
 大概顔面ノ發疹ハ第六日ニ至リテ消散シ體軀
 ニハ赤色ノ斑ヲ殘シテ第七日乃至第九日第十
 日ニ消散ス其期ニ方リテ疹上ニ粉狀ノ小鱗屑
 散セサル者ナリ

ヲ生シテ瘡痒ニ堪ヘ難シ然レモ熱氣解散シテ
 精神モ始テ爽快ニ復ス然ル時ハ一層患兒ニ注
 意シテ猥ニ外氣ニ觸レシムルトナク且寒冷ノ
 室中ニ移スト勿レ然ラザレバ危難ノ繼發病ヲ
 發スルトアリ
 麻疹ノ經過中ハ床褥ヲ離レシムルトヲ禁ス洒
 掃ノ時ハ注意シテ冷風ヲ防ギ上圍ニ臨バ裸足
 ヲ以テ床板ヲ踏マシメズ褥衣ヲ換ル時ハ鞋ク
 温メテ著セシメ脚湯及ビ灌腸ヲ施スト莫レ若
 シ灌腸ヲ施シ下痢ヲ来タセバ發疹速カニ消散

スルノ恐レアリ故ニ介者能ク其理ヲ知ラザル
 ベカラズ麻疹ハ容易ニ内陷スル者ニシテ若シ
 速カニ消散スレバ腹水若クハ更ニ全身水腫等
 ノ危難ノ症ヲ發スル者ナリ
 咳嗽ハ多クハ發疹ノ消散ト共ニ止ムヲ常トス
 然レモ發疹期ニ障碍アレバ其咳嗽半月或ハ一
 月乃至二月間モ荏苒トシテ止マザル者ナリ
 既ニ乳ヲ離ル、兒殊ニ年齒皆嫁ニ近キ者ハ常
 ニ乳兒ヨリモ其症重シ然レモ嬰兒モ生齒ノ期
 ニ當ルカ或ハ哥羅布百日咳、痘瘡、肋膜炊衝或ハ

腮、肺、腹部等ノ炊衝ト併發スレハ則チ必ズ重症
 ナリ

初生兒ニハ哺乳ヲ禁ジ既ニ乳ヲ離ル、兒ニハ
 食餌ヲ換ユル等ノ如キ總テ飲食攝生ニ關係セ
 ル大切ノ療養法ハ醫ニ依頼セザルベカラズ
 上説ニ由テ之ヲ觀レバ麻疹ノ前徵發疹ノ進期、
 退期、落屑期、及ビ快復期共ニ最モ注意セザルベ
 カラザル一昭々タリ
 大凡病室ヲ温和ニ保チ患兒ニ熱氣アルノ間ハ
 食禁ヲ嚴ニシ菩提樹花、或ハ堇菜花、或ハ蜀葵花

ノ浸液ヲ與ヘ猶病室ト同温度ノ微温湯ニ覆盆
子舍利別一匙ヲ加ヘテ飲マシメ且患兒ノ眼目
ニ日光及ビ火焰ノ觸ルヲ避ケシメ萬事ニ注
意スベシ

假疹

假疹ハ麻疹ニ比スレバ其症常ニ輕ク四季共ニ
之アリト雖モ殊ニ秋季ヲ多シトス而シテ麻疹
ニ類似スレバ其斑大ニシテ定形ナシ其斑ト斑
トノ間廣ク離レテ其間ノ皮色ハ平常ニ異ル
ナク、楯圓或ハ輪狀ノ赤斑ニ六條乃至八條ノ
經

線アリ稀ニハ一個ノ赤環狀ヲ顯ハス者アリ然
レ其正中ノ皮色ハ尚常ヲ變ズルヲナシ

假疹ハ年齢ニ係ラズシテ發スル者ナリト雖モ
殊ニ小兒ニ多シ此病ヲ發スル前ニハ屢腹痛ヲ
起スヲアリ而シテ發疹ハ通例頸顔面下肢ニ
ニ發スル者ニシテ見點中ハ微痒アリテ二十四
時乃至四十八時ヲ經過スレバ未ダ曾テ三日ヲ
越ユル者ナシ然レバ迅速ニ消散スレバ内部ノ
焮衝ニ轉ズルヲアリ故ニ仔細ニ注意スベシ
假疹ハ數日之ニ感ズル者アリ而シテ此症ハ麻

疹ニ類似スル故ニ稀ニハ誤認シテ輕症ノ麻疹ト混同スルコアリ
飲食攝生、治療法及ビ其他總テノ注意俱ニ麻疹ニ同ジ

猩紅熱

猩紅熱ハ麻疹及ビ假疹トハ較異ナル者ト雖モ其攝生療法ノ如キハ大略異ナルコトナシ此病ハ一種ノ傳染病ニシテミヤスマノ媒ヲ以テ蔓延スル者ナレバ小兒羣集ノ地方ニテ一兒此病ヲ受レバ速カニ百兒ニ傳播ス故ニ小學校ノ如キ

小兒彌湊ノ地ニテ一兒此病ニ罹ル者アレバ速カニ之ヲ別室ニ移シ必ス健康ノ兒ト同室ニ置クコト莫レ

若シ一家ニ數兒アリテ一兒先ヅ此病ニ罹ル時其室ヲ別タザルモ亦一理アル者トス其故如何トナレバ一兒ニ此病ヲ發スレバ縱令之ヲ別室ニ離居スト雖モ時日ヲ經テ必ズ他兒ニ傳染セザルヲ得ズ故ニ室ヲ別タズシテ數兒一時ニ感深スル時ハ其看護モ亦多ク時日ヲ費ヤサミレバナリ然レモ小學校ノ如キニ至テハ數百兒一

時ニ之ニ感ズレバ看病攝生及ヒ治療モ満足シ
 誰ハザル者ナリ
 猩紅熱ハ小兒ノ疾病ナリト雖モ大人ニモ亦偶
 感染スルアリ若シ之ニ感ズレバ必ス小兒ヨ
 リハ重キ者トス
 猩紅熱ハ必ズ再度感受スル者ニ非ズ此病ヲ誘
 發スル大氣ハ麻疹ヲ誘導スル大氣ト異ナリ多
 クハ立冬中ノ氣候俄ニ溫度ヲ變換スル時季ニ
 方リテ發顯スル者ナリ此病ノ普通ノ徵候ハ惡
 寒頭痛身體衰弱不食嘔吐煩悶稀ニハ謔語搐搦

等ナリ且其脈頻數ニシテ大渴アリ而シテ病發
 前ニハ通常咽痛ヲ發スルヲ以テ嚥下困難ナル
 者ナリ
 右ニ擧ゲシ所ノ諸徵候ヲ備フル時ハ速カニ醫
 ヲ招キテ診斷ヲ乞フベシ其醫ノ來ルヲ待ツノ
 時間モ空ク手ヲ束ルヲナク麻疹療法ノ如ク殊
 ニ注意シテ頸圍ニ軟和ナル毛布ヲ纏ヒ咽痛ヲ
 和ラゲ居室ノ溫度ニ注意シテ以テ外氣ノ透過
 ヲ防キ患兒ノ衣服及ヒ被褥ハ交換スベカラズ
 又灌腸脚湯下劑ヲ禁ズ如何トナレバ猩紅熱モ

亦猶麻疹ノ如クニシテ内陷シ易キ者ナレハナ
 リ
 飲料ニハ微温湯ニ白糖ヲ加ヘテ飲マシノ或ハ
 護謨舍利別覆盆子舍利別又董菜花甘艸ノ浸劑
 ヲ服用セシムベシ總テ飲食攝生ハ最モ嚴ナル
 ヲ要ス
 徵候己ニ備ハルノ後通例ハ二三日ヲ經テ發疹
 ス茲ニ於テ肌熱劇烈ニシテ且瘙痒ヲ兼テ咽喉
 痛ハ仍荏苒トシテ止ムコトナシ
 發斑ハ麻疹ヨリ大ニシテ紅赤色ナリ稀ニハ葡

萄酒ノ底滓ヲ全身ニ塗抹スルカ如キ色ヲ顯
 スコアリ其斑上ヲ指額ニテ輕ク按スレバ其色
 消散スレ氏其指ヲ舉グレバ直ニ再復ス
 熱勢劇烈皮膚乾燥シテ灼クガ如ク顔面及ビ眼
 瞼共ニ腫脹ス而シテ不食大渴及ビ脈亢盛疾數
 ハ猶持長シテ止マズ
 此發疹ハ通常第五日ニ方リテ病勢始メテ退歩
 ニ就キ第七日ニ至リテ消散スル者ナリ顔面及
 ビ頸部ヨリ剥脱スル所ノ表皮ハ麥糠狀ノ小鱗
 屑トナリ四肢及ビ軀幹ノ表皮ハ著シキ薄片ト

ナリテ脱落ス其落痴稀ニハ數月間持續スル
 アリ
 此病單純ナル者ハ危難ニ陥ルナシト雖氏屢
 重症ノ併發病ヲ兼發シ易キ者ナリ故ニ醫ノ診
 斷ヲ乞ヒテ以テ分利ヲ扶ルヲ喫緊至要ナリ
 麻疹ト猩紅熱トハ最モ注意スベキ疾病ニシテ
 其發病後經過中殊ニ快復期ニ至リテモ看議ヲ
 誤ル時ハ水腫病ヲ繼發スルヲ最モ多シ
 患兒ニ數枚ノ衾ヲ重襲シ或ハ熱湯或ハ衝動性
 ノ飲液ヲ飲マシムル時ハ皮膚ノ嫩衝著シク増

劇シ加之腸胃ニ刺衝ヲ起シテ病ノ分利ヲ障
 スル者ナリ
 麻疹及ビ猩紅熱ニ罹レル小兒ハ全快ノ後二週
 間ハ外出ヲ禁ズベシ二週間ヲ經テ外出スル時
 モ必ズ溫暖ノ日ヲ撰ムベシ其他總テ醫ノ許可
 ラ受ケテ處置スベシ
 百日咳
 百日咳ハ痙攣性ノ劇咳ナリ其咳嗽ニ間歇アリ
 テ速ニ疲勞性ノ室咳ニ變ジ短クシテ殆ン
 ト窒息セント欲スルニ至ル

百日咳ハ小兒ノ病ニシテ殊ニ出生ヨリ第二期
 生齒ニ至ル迄ノ間ニ多シ而シテ麻疹猩紅熱痘
 瘡後ニ繼發スルヲ往々之アリ蓋シ此等ノ疾病
 ヨリ繼發シ来リ其原因ハ輕症ナラスト雖正更
 他ノ合併症ナキ時ハ危難ナカルベシ然レ正
 稀ニハ併發病ヲ發スルヲアリ
 其咳嗽ニ發歇アリテ其發作ノ時間ハ駭恐スベ
 キ室咳ヲ發ス然レ正間歇ノ時間ハ患兒ノ景况
 平常ニ異ナル所ナシ是ヲ以テ父母ハ其病症ヲ
 輕忽ニシテ注意ヲ怠リ不圖患兒ヲ危篤ニ陥ラ

シムルヲ往々之アリ故ニ病ノ初期ニ方リテ速
 カニ整ノ診察ヲ請フベシ
 室咳數發スルニ至レバ患兒ハ驚駭ノ聲ヲ發シ
 テ手ノ達スル所ノ物ヲ把握シ頭ヲ仰ギテ後ニ
 反曲シ頻リニ手腕ヲ動搖シ顔兒小瘦其色紫赤
 ニシテ苦悶ノ状態ヲ顯シ眼ニ涙液充滿シテ血
 線ヲ帶フ稀ニハ衄血咯血或ハ血液混合ノ鼻涕
 ヲ流出スルヲアリ又飲食後ニ室咳ヲ發スレバ
 嘔吐ヲ起シ或ハ二便ヲ遺失スルヲアリ
 論抜兒篤氏曰ク其咳嗽夜間數發スル間ハ病症

増進ノ期ナリ之ニ反シテ日中數發スル時ハ病勢減退スルノ徵ナリト
 咳嗽間歇ノ時間久シケレバ其發作後ハ速カニ爽快ヲ覺ヘ續テ遊戯ニ紛レテ苦惱ヲ忘ル然レ
 氏其發作頻數ナル時ハ發熱及ビ鬱憂ヲ兼ル者アリ
 百日咳ハ加答兒ノ咳嗽ト自ラ其證候ヲ異ニシテ其區別判然タル者ナリ然レ氏其本症ヲ發セザル初期ハ通常ノ冒寒ニ異ル所ナシ
 常ニ小兒ノ容兒ニ注意シ殊ニ夜間咳嗽ヲ發ス

ル時ハ醫ノ診斷ヲ乞ハザルベカラズ又百日咳ハ他ノ病ヲ合併スルコトアリ故ニ豫メ注意セザレハ意外ニ後悔スルコトアリ其他咳嗽ヲ發スル所ノ小兒ニ與フル飲劑ハ緩和ノ物品ナレバ總テ害ヲナスコトナシ
 百日咳ノ輕重ハ多クハ大氣ノ作用ニ關係スル者ニシテ殊ニ春秋ノ雨天或ハ冷日ニ感ズルコト多シ然レ氏稀ニハ炎暑或ハ酷暑中ニモ亦之ヲ發スルコトアリ
 通常此病ハ流行性ニ屬シ一郡一都或ハ一村落

保嬰新書 卷之十 十七 高松氏藏版

ニ波ハキウ及オシオヨギススル者ナリ或人ハ此病ノ傳デ染セン性セイナラザルコヲ主張ス然レハ一家中或ハ小學校中ニ於テ一兒此症ニ罹レバ直チニ之ヲ別室ニ移サバレバ速スイヤカニ他兒ニ感カン染ゼンスル者ナリ
 百日咳ノ經過ハ一定ナキ者ニシテ二三週或ハ數月間經久スルコトアリ故ニ其初期速カニ攝生ヲ嚴ゲンニシテ藥効ヲ得ルニアラザレバ輕症ト雖モトシテ氏數月ニ亘ルコトアリ
 總テ治療ハ醫ニ依賴シテ快復ヲ待ツベシ故ニ爰ニハ只注意ト療治法ノ大略ヲ示スノミ

此病ノ初期ニハ錦葵蜀葵或ハ甘草ノ浸劑ヲ内服セシメ又ハ護謨舍利別或ハ石長生舍利別一匙イツサンヲ一盞ノ水ニ和シ與ヘ外用ニハ朝夕脚湯ヲ施シ亜麻仁末ノ琶布ヲ胃部ニ貼スレバ病苦ヲ緩解スル者ナリ初生兒ニハ乳母ノ飲食攝生ヲ嚴ゲンニシテ其良性ノ乳ヲ少量宛飲マシムルコトヲ專務トスベシ若シ患兒既ニ乳ヲ離レテ食物ヲ食ヒ得ル者ハ淡薄ノ肉羹汁ニビスコタン出前牛乳及ビ白糖ヲ加味シテ食料トナスベシ
 上説ノ如キ併發病ノ豫防法ハ殊ニ寒冷ト濕氣

ヲ避ケ以テ健全法ニ注意スベシ其他室内ノ空
氣ヲ新鮮ニシ病衣ヲ屢交換スベシ若シ患者ヨ
リ蒸發スル所ノミアスマ室中ニ充滿スレバ自
ラ其氣ヲ吸入シ又衣服中ニ其氣ヲ含ム時ハ更
ニ大害ヲ醸ス者ナリ
室中ノ洒掃ニ際シテ患兒ヲ他室ニ移シ衣服及
ビ褥ニハ塩酸加兒基ヲ散布シテ數枚ヲ整へ置
クヘシ斯ノ如ク注意シテ温室中ニ保護スレバ
其快復ヲ扶クルガ故ニ危害ヲ免ル、者ナリ

哥羅布 漢醫所謂
馬脾風

哥羅布ハ恐ルベキ小兒ノ一大厄病ナリ往古ハ
此病ヲ知ル人曾テ無カリシニ一千七百四十七
年始テ世ニ流行セシ時伊答利亞ノ醫生俄敏氏
ナル者其病症ヲ仔細ニ論セリ
哥羅布ハ通常北國地方ノ疾病ニシテ蘇格蘭度
及ヒ日內府_{地名}ニテハ風土病ニ屬シ其他ノ地方
ニテハ流行病トナル其原因ハ大氣ノ作用ニ關
係スル_{ハヤリヤヒ}ト最モ多シトス
此病ハ獨リ小兒ヲ襲フ者ナリト雖_ト大人モ亦
全ク免ル、ト能ハザル_トアリ_{ウツイ}字内ニ高名ナル

保嬰新書 卷之十 十九 高松大藏版

合衆國ノ大統領華盛頓ハ六十八歳ニテ此病ニ罹リ為ニ一千七百九十九年十二月十四日ニ遠逝シ其後和蘭王路易蒲拿拔兒篤ノ嫡子モ亦一千八百七年ニ此病ヲ以テ逝去セリ
哥羅布ハ氣管頭ヨリ氣管第一枝ニ至ル迄ノ氣道内粘膜ノ全部嫩衝ナリ其進行甚タ急劇ニシテ必ズ氣管内ニ義膜ヲ生ズル者ナリ
佛國ノ醫的阿獨兒實百兒氏哥羅布ノ小兒ニ最モ多キ所以ヲ解剖的及ビ病理的ニ就テ數様ニ論述セリ乃チ氣管及ビ會厭ノ狭小ナルト氣管

粘膜炎ノ知覺鋭敏ナルト氣管内粘痰ヲ鬱積スルト小兒ハ粘痰ヲ容易ニ咯出シ能ハザル者血液循環ノ迅速ナルト此年齡ニ在テハ血液循環速疾勢ノ進行モ皮膚ノ排泄ト肺及ビ氣管ノ粘液排泄ト互ニ相交換シ其一部ノ排泄減少スレバ則チ他部ノ排泄必ズ増進スルト或ハ薄衣或ハ發汗スル時ニ方リテ俄ニ寒冷ニ觸レテ皮膚ノ閉塞ヲ致ス等ノ如キ者皆此病ノ原因ナリトス此解剖的病理的ノ外哥羅布ヲ誘發スル所ノ特別ノ原因ハ俄カニ變更スル所ノ氣候ヲ第一ト

ス故ニ居室ノ兩側ヲ開放シ風ノ透過スル所ニ
 搖籃ヲ置キ殊ニ其搖籃内ニ睡眠ヲ催シ微汗ス
 ル時ニ方リテ俄ニ風ニ觸ルニ由テ數之ヲ發
 ス加之年齢前ノ嬰兒一歳未滿ノ小兒ハ此病ニ
 フト云ニモ亦不意ニ發スルコトアリ
 哥羅布ハ滿一歳ヨリ七八歳迄ノ小兒ニ發スル
 一最モ通常トス又女兒ヨリモ男兒ニ多シ且數
 再渡感ズル者ナリ
 此病稀ニハ傳染性ナルコトアリ然ル時ハ患兒ヲ
 速カニ別室ニ移シ他兒ヲ近クベカラズ又肺加

答兒ヨリ哥羅布ヲ繼發スルコトアリ
 此病ヲ發スルノ徵候左ノ如シ
 本症ヲ發スル前ニハ加答兒一種ノ咳嗽噴嚏眼
 目流淚鼻涕流出惡寒發熱精神恍惚不眠食欲ナ
 クシテ頻リニ冷水ヲ欲ス
 此徵候一日或ハ二三日荏苒トシテ經過シ黄昏
 或ハ午後十二時ヨリ午前二時迄ニ發スルヲ常
 トス病既ニ其本症ヲ發スレバ直ニ患兒ハ呼吸
 困難ニシテ苦悶ヲ起シ一回耳ニ入レバ復誤認
 スベカラザル一種ノ咳嗽ヲ發ス是即チ哥羅布

保嬰新書 卷之十 高松氏藏

咳ナリ其咳音ハ雞聲或ハ羊聲ニ鬚鬚タリ
患兒猝ニ煩躁ヲ發シ其脈不整ニシテ屢結代ス
ルヲアリ顔面赤色ニシテ稍腫脹シ聲音嘶啞シ
言語聽クベカラズ氣管頭疼痛シテ物アルガ
如キヲ覺フ故ニ患兒ハ頻リニ両手ヲ頸圍ニ致
シテ恰モ喉頭ヲ梗塞スル障礙物ヲ除キ去ラン
ト欲スル者ノ如シ
其經過ハ一定ナシト雖氏然レ氏總テ發病後直
ニ治療ヲ施サバレバ常ニ危篤ニ陷ル者ナリ故
ニ父母及ビ乳母ハ常ニ注意セザルベカラズ殊

ニ氣候俄ニ變換スル時ハ此症ニ感ジ易キ者ナ
リ若シ其徵候アリト思フ時ハ速カニ醫ノ診察
ヲ乞フベシ然レモ若シ寒郷僻邑ニシテ醫家ニ
遠隔シ速カニ診察ヲ乞フコトヲ得ズ空シク醫ノ
延著ヲ待チテ時刻ヲ移セバ輒チ病勢暫時ニ増
進スル者ナレバ醫ノ來ル前ニ家貯ノ吐劑ヲ與
ヘ一二回ノ吐ヲ取ルベシ其兒強壯ナレバ年齡
ト體質ニ隨テ刺絡ヲ施スコトアリ若シ其症劇烈
ニシテ窒咳モ亦甚ダシケレバ頸ノ前面即チ氣
道上ニ水蛭五六條ヲ放チテ血ヲ吸ハシメ水蛭

保嬰新書 卷之十 高松氏藏

落離スレバ直ニ其痕跡ニ亞麻仁末ノ緩和琶布
ヲ貼スベシ哥羅布ハ常ニ便秘スル者ナレバ阿
利襪油ト蜂蜜ノ合劑一二匙ヲ與ヘ麦糠水ノ灌
腸ヲ施スベシ
專ラ飲食攝生ニ注意シテ一室中ニ安臥セシメ
若シ渴スル時ハ縱令嚥下困難ナリト雖氏臥室
ト同温ノ護謨漿ヲ飲マシメ以テ咽喉ヲ滋潤ス
ベシ
哥羅布ノ經過ハ通例發病後三四日乃至五六日
ニシテ七日ヲ出ル者ハ甚ダ稀ナリ而シテ最モ

高松山片

危難ニ進ムノ時間ハ三十六時乃至四十八時間
ニアリテ其症甚ク速カニ變化タル者ナリ
快復後ト雖氏注意セサレバ速カニ再發スル
アリ故ニ快復後ハ列氏十度乃至十二度華氏五
十度乃至五
十九度ノ室中ニ在テ冬ハ八日乃至十日夏ハ
五六日必ズ室外ニ出デシムベカラズ而シテ醫
ノ許可ヲ得バ衣服ヲ十分ニ着セシメ頸圍ニ毛
布ヲ纏ヒ外氣ノ感觸ヲ防ギ以テ快晴ノ時日ヲ
撰ニ注意シテ家外ニ伴フベシ
乳ハ少許宛飲マシメ少量ノ護謨漿ヲ頻次ニ與

高松山片

仁聖新書 卷之十 高木以庵片

フベシ若シ其兒既ニ乳養ニアラザレバ淡薄ノ肉羹汁ヲ與ヘ其齡六歳乃至八歳ナレバ雌雞ノ白肉少許ヲ與ヘテ佳ナリ

胃嫩衝

胃ハ飲食消化ニ於テ窠モ貴重ノ器ナリ小兒ハ此器ノ病ニ罹リ易シ故ニ父母タル者ハ常ニ注意ヲ怠ルベカラズ若シ胃中ニ疾患アル時ハ縱令死ニ至ラザルモ成育スルヲ遲慢ナル者ナリ蓋シ胃ノ疾病數種アリト雖氏胃嫩衝ニ罹ル者常ニ最モ多シ

體格ニ關係スル一箇ノ素因ノ外別ニ胃嫩衝ヲ發スル數種ノ原因アリ就中熱湯ノ嚥下乳汁肉羹汁ノ過飲或ハ飢渴或ハ飲食不消化氣候ノ變化及ビ下劑ノ過服等總テ之カ原因トナル者ナリ
嬰兒食欲ヲ失テ渴アリ脈頻數ニシテ皮膚ニ熱アリ舌端赤色ニシテ舌根ニ粘液布著シ肚腹膨脹稀ニハ嘔氣ヲ催シ且青色ノ物ヲ吐出スル者ハ即チ胃嫩衝ナリ然ル時ハ醫ノ診斷ヲ請フコト片時モ怠ルベカラズ

示嬰新書 卷之十 高木以庵片

小兒ノ胃焮衝ハ大概飲食不消化ヨリ發スル者
 寂モ多シ然ルニ其不消化ニ注意セズ醫ノ診察
 ヲ請ハザルヨリ遂ニ屢胃焮衝ニ腦病ヲ併發シ
 來ルヲアリ小兒ノ胃焮衝中ニ眠ヲ嗜ミテ殆ド
 昏睡状ヲナシ稀ニハ痙攣搐搦等ヲ發スル者ハ
 即チ腦病ヲ合併スルノ徵候ナリ
 胃焮衝ノ寂モ難症ハ其焮衝腸管ニ下リテ腹部
 焮衝トナル者即チ腸焮衝ノ併發ナリ
 胃焮衝ノ徵候アルヲ視バ直ニ乳養ヲ止メパナ
 ードモ亦喰マシメズ以テ其病勢ヲ挫キ且併發

病ヲ制スルト第一トス然レドモ患兒ハ尚未
 ダ痛痒寒熱ヲ訴フルト能ハザル故ニ診察ニ注
 意シテ常ニ劇劑ハ用キルベカラズ
 僻邑ニ在テ醫家ニ遠ク俄ニ診斷ヲ請フト能ハ
 ガル時ハ徒ラニ醫ヲ來ルヲ待テ其時刻ヲ移サ
 ズ速カニ亞麻仁末ノ緩和毬布ヲ腹部ニ貼シ次
 ニ麥糠或ハ葵根煎汁ノ灌腸ヲ施シ哥喜或ハ護
 謨漿ニ白糖ヲ加ヘ微温ヲ得テ一二小匙ヲ飲マ
 シムベシ脚湯ハ六分時乃至八分時間微温湯ヲ
 以テ之ヲ施シ終レハ直ニ緩和毬布ヲ足躰ヨリ

保嬰新書 卷之十 高松氏藏

膝下迄貼スル一宛モ長靴ヲ穿タル如クニ被包
スベシ此療法ニ因テ其疼痛ヲ鎮靜スルヲ太ダ
多シ然レモ芥子泥ヲ貼スルニ因テ却テ激衝ヲ
増進スルヲ往々之アリ故ニ醫ノ指揮ニ據ルニ
非ザレバ粗忽ニ之ヲ施スベカラズ
胃激衝ハ合併症アルニ非ザレバ右ノ療法ニ因
テ嘔吐ヲ鎮靜スルノミナラズ其本病ヲ快復シ
以テ繼發病ヲ防グニ足ルヲ往々之アリ
下痢水瀉ハ通常腹部激衝ノ徵候ナリ粘液下痢
洵乙下痢ハ數種ノ原因ヨリ來ル者ニシテ乳母

ノ乳汁ヨリ起因スル一窠モ多シ其乳性ハ縱令
良質ナリト雖氏過量ニシテ胃中ニ停滯シ消化
セザレバ其因トナリ或ハ俄カニ乳養ヲ止メテ
食物ニ轉ジ或ハ冷水ニ浴シ或ハ寒冷ニ感シ或
ハ帶紐ノ緊縛ニ由テ腸ノ蠕動機ヲ障碍シ又或
ハ生齒期ニ方リテ屢下痢ヲ發スル者ナリ
下痢數行ニ至レバ其尿青色トナリ猶持久スレ
バ藍色ニ變ズ然ル時ハ既ニ重症タルヲ知ル
ベシ故ニ小兒一度下痢スル時ハ直ニ注意シテ
青便下痢ヲ防ガザルベカラズ其療法ハ嘔吐治

保嬰新書 卷之十 二六六 高松氏藏

療ノ如ク食禁攝生ヲ嚴ニシ護謨漿ヲ内服セシ
 ノ澱粉液ノ灌腸ヲ行ヒ腹部ニ緩和布ヲ施ス
 等ハ其病勢ヲ緩解スルノ一良法ニシテ醫ノ来
 ルヲ待ツ間ノ療法ナリ其病症ヲ區別シテ全治
 ヲ得ルノ療法ハ固ヨリ醫ニ依頼セザルベカラ
 ズ

赤痢ハ大腸焮衝結腸ニシテ小兒ニ最モ多キ重
 症ノ病ナリ
 小兒ノ赤痢モ大人ノ赤痢ノ如ク急性アリ慢性
 アリ其急性ナル者ハ速カニ頭痛稀ニハ嘔吐疝

痛裡急後重等ニ苦惱シ頻リニ便氣ヲ催スト雖
 其量太夕少ク其色白クシテ恰モ半熟ノ卵白
 ノ如シ而シテ屢血ヲ混交スルヲアリ熾熱大渴
 腹部灼ガ如シ此徵候通例三日間持續シテ後重
 症ニ陥ル者アリ或ハ快方ニ赴ク者アリ
 此危急ノ徵候ヲ備フル時ハ速ニ醫ヲ迎ヘテ其
 診断ヲ請フヲ片時モ怠ル可カラズ其醫ヲ招ク
 ノ時間モ猶注意シテ食養攝生ヲ專ラニシ下痢
 療法ノ如ク粘滑劑ヲ與ヘ腹部ニ緩和布ヲ貼
 シ澱粉液ノ灌腸ヲ行ヒテ安臥セシムヘシ

流行性ノ赤痢ハ殊ニ寒濕ノ氣候及ビ濕地ニ多クシテ後ニハ傳染性ニ變スル者ナリ然ルモハ廁ヲ別ニセザレバ直ニ他ノ兒ニ感染ス宜シク注意シテ其傳染ヲ防クベシ

加兒羅阿 謂世俗ニ所

加兒羅阿ヲ別チテ二種トナス病理學ニ由レバ慢性腸焮衝腸間膜萎縮腸間膜魚脊推焮衝等ノ如キ數種ノ名稱アリ此病ハ腸間膜腺ノ閉塞ヲ兼ル腹部焮衝ト腸間膜腺ノ結核性變質トノ二種ニシテ一箇ノ小兒

病ナリ然レモ稀ニハ大人モ亦此症ニ罹ルニア

巴里小兒病院教頭劇兒珊氏ノ實驗ニ據レバ女

兒百人中ニ腸間膜結核ニ係ル者七八名男兒百

名中ニ五六人ナリ加兒羅阿ハ慢性腸胃焮衝ノ原因ト同一ニシテ

腹部ニ焮衝ヲ發スル原因ヨリ来リ或ハ慢性腸焮衝經久スルノ後ニ繼發ス又卑濕ノ住居或ハ

寒冷ノ居室飲食不消化或ハ躰質及ビ消化器ニ不適ノ滋養品牛乳濃羹汁ヲ食スルヨリ此病ヲ

發スル者アリ
 佛國ノ醫學博士魯首氏、珊尊氏、兒乃亞兒氏、皆曰
 ク此病ノ原因ハ穀末製ノ食餌及ビ腺病質ノ乳
 母殊ニ勞瘵質ノ乳母ノ哺乳或ハ乳母虛弱ニシ
 テ乳汁乏シク且其乳中ニ沕乙状ノ液ヲ多量ニ
 含ム者ヲ飲マシムルヨリ成ルト
 爰ニ三博士ノ内外病理新書ニ説ク所ニ據レバ
 加兒羅阿ニ必ス發スル所ノ徵候ニ就テ最モ注
 意スベキ者左件ノ如シ
 諸先哲ノ著述セシ加兒羅阿ノ説ニ據レバ大

概此病ニ固有ノ徵候ト慢性腸嫩衝ニ屬スル
 所ノ徵候トヲ混同セリ蓋シ加兒羅阿ニ最モ
 固有ノ症ハ肚腹膨脹腹部ノ感觸銳敏粘液嘔
 吐惡嗅アル物ヲ下痢シ其色黯色ニシテ粘土
 ノ如ク稀ニハ秘結ト下痢ト交換スルヲアリ
 食欲缺乏或ハ飲食スレ氏飽クヲ知ラズ食
 後ニハ不快ヲ覺ヘ其脈時々亢盛シテ夜中殊
 ニ甚タシ皮膚乾燥シテ顔面及ビ四肢削瘦ス
 然レ氏此徵候ハ通常腸ノ粘液膜慢性嫩衝ニ
 モ亦之アルヲ明カナリ

醫學新書 卷之十 二十九 高松氏藏版

然レバ則チ加兒羅阿ノ徵候ハ何ヲ以テ其確
 証トナス乎若シ腸間膜結核ノ外他ニ其名ヲ
 與フルニ非ザレバ劇兒珊氏ノ謂ヒシ如ク其
 肚腹ヲ按察スルニ非ザレバ其病症ヲ知ル
 能ハザルナリ
 肚腹膨脹、下肢削瘦、消食器ノ障碍等ハ腸間膜
 腺閉塞ト腸焮衝及ビ腸間膜結核ニハ普通ノ
 証ナリ是ヲ一目瞭然ニ區別セント欲シ動モ
 スレバ其此彼ヲ謬ルコトアリ然レド丁寧深切
 ニ診斷シテ以テ前後ニ注意セバ能ク病ノ何

レニ在ルコトヲ知ルヲ得ベシ例之バ其徵候ニ
 肌熱及ビ皮膚乾燥シ頻リニ飲液ヲ欲シ腹部
 ノ一點ニ鈍痛アリ粘液或ハ青黄色ノ下痢顔
 面羸瘦、脈亢盛等ノ如キ諸証ハ總テ飲食後ニ
 増進シ殊ニ刺衝性ノ飲食ヲ喫スル後著シキ
 者ハ腸ノ粘液膜焮衝タルコト自ラ明白ナリ
 上症ト相反シテ其徵候ヲ呈スコトナク患兒腺
 病質或ハ勞瘵質ニ屬シ其皮膚蒼白色ニシテ
 滋潤シ飲食不消化ノ時ノミ下痢ヲ起シ飲食
 ノ性ニ係リテ著ク病ニ感動ヲ起サズル者ハ

腸間膜結核即チ加兒羅阿タル一判然タリ
俄ニ哺乳ヲ止メ他ノ飲食ニ轉ジ或ハ衝動藥
下劑等服用後或ハ刺衝性ノ飲食ヨリ發スル
時ハ多クハ腸激衝ナリ

天稟虛弱或ハ勞瘵質ノ乳母ノ乳汁或ハ穀粉
製ノ飲食ヲ過用シ或ハ居處卑濕或ハ日光不
透ノ居室等ヨリ起因スル者ハ腸間膜結核ナ
リ

上ニ舉シ如ク加兒羅阿ハ大概衣食住ノ不良ヨ
リ起ル者ナレバ常ニ健全法ニ注意ノ之ニ從フ

一能ハザル所ノ貧家ノ小兒ハ此病ニ罹ル一常
ニ多シ

二三歳ノ小兒數人ヲ治療シテ之ヲ歴驗スルニ
大概貧家ノ兒ナリ其病因ハ慢性下痢ノ衰憊ヲ
殘シ數月ヲ經テ變ジテ加兒羅阿ト成ル者最モ

多キニ居ル
卑濕ノ地方ニシテ居室暗ク或ハ日光ノ透入宜
キヲ得ズ或ハ不消化ノ飲食及ビ飲食ニ定度ナ

キ等ヨリ自然顔兒衰耗シ蒼白色トナリ恰モ老
人ノ如ク顔ニ皺ヲ生ジテ漸々重症ニ赴ク者ナ

後學新書 卷之十一 高松出版

リ 皮膚乾燥シテ其色泥ノ如ク又鼻孔内ニ紅色ヲ
現シ日暮ニ向テ發熱シ夜中ハ夥シク發汗シ腹
部ハ常ニ膨脹シ是ヲ按ズレバ腸間膜腺閉塞ノ
部ハ著シク指頭ニ應ジ食後ノ水瀉ハ宛モ粘土
ノ如シ小便濇少濁濁ニシテ塗滓アリ斯ノ如キ
者ハ即チ加兒羅阿ノ症状ナリ
治療ハ清朗ノ日中患兒ヲ伴ヒ數時間日光中ニ
緩歩セシムベシ大氣ト太陽温ハ此病症ニ大ニ
功驗アル者ナリ又襪ヲ屢交換シ毛布ノ襦袢ヲ

用キテ皮膚ヲ刺衝シ又數柔軟ナル刷毛或ハ毛
布ヲ以テ四肢及ビ脊推上ヲ摩擦スベシ
熱依然トシテ退カザレハ食禁ヲ嚴ニシ腹部ニ
緩和帛布ヲ貼スル一日ニ三四回澱粉湯ト油質合
劑ノ灌腸ヲ日々二三回宛施スベシ
頑固ノ下痢ニハ肛門ノ周圍ニ水蛭一條ヲ放ツ
ベシ然レハ患兒ノ衰弱甚ダシキ時ハ多量ニ出
血スレバ慢性ニ變ズルノ恐レアリ注意スベシ
飲料ニハ薏以仁煎汁ニ白糖舍利別ヲ加ヘ適宜
ノ甘味トナシテ與ヘ又其飲液ト覆盆子舍利別

録 嬰 新 書 卷 之 十 一 高 松 出 版

腦感冒ト稱スル者ハ大人ニ於テハ常ニ輕症ニ
 屬スト雖氏小兒ニ在テハ往々危篤ニ陷ルニア
 リ初生兒ニ在テハ殊ニ然リ
 稀ニハ鼻上赤色トナリテ腫脹シ鼻孔ヨリ濃厚
 ノ涕泗或ハ膿汁流出シ鼻孔内ニ痂ヲ結ビテ空
 氣ノ出入ヲ過ノ大ニ呼吸ヲ障碍スル者ナリ故
 ニ呼吸スル時ハ必ズ口ヲ開テ其用ヲナス哺乳
 スル時ハ辛ジテ一二吸ヲナシ直チニ乳房ヲ離
 シテ大息ス是鼻孔閉止スルガ故ニ鼻ヨリ呼吸
 スルヲ能ハサルヲ以テナリ其顔面赤色トナリ

テ劇吐ヲ發シ養餌ハ匙ヲ以テ口中ニ注ギ入ル
 ハキノミ此病ハ嬰兒ニ最モ重クシテ年齒ヲ長
 スルニ隨テ次第ニ輕キ者ナリ
 感冒ヲ治スルニ最モ輕便ナル療法ハ蜀葵根煎
 汁或ハ其浸劑ヲ鼻孔内ニ注入スベシ是ヲ注入
 スルニハ錫製或ハ硝子ノ小水銃ヲ用キルベシ
 病症ノ輕重ニ隨テ食禁モ亦緩嚴アルベシ故ニ
 其攝生ハ常ニ醫ノ指揮ヲ請ケザルベカラス然
 レ氏若シ患兒僻邑ニ在リテ醫ノ診斷ヲ請ント
 欲スレ氏醫家ニ數里ヲ隔テ不便ナル時ハ患兒

保嬰新書 卷之十 高松氏藏板

ノ手足ヲ毛布ニテ朝夕摩擦シ激温湯ニ少許ノ
塩ヲ溶シテ朝夕脚湯ヲ施シ又菫菜花及ヒ錦葵
葉ノ黄劑ヲ用キテ効アリ
室温ハ晝夜共ニ間斷ナク温和ナラシメ菩提樹
花菫菜花甘艸ノ浸劑ヲ飲マシム足部ニ緩和
布ヲ貼スベシ患見ヲ室外ニ出スヲ禁ミ寒冷
濕氣及ビ隙風ヲ防キ以テ前ニ擧シ所ノ諸症全
ク退キ去リテ快復ニ至ル迄ハ暫クモ其注意ヲ
怠ルベカラズ

喉頭焮衝

急性喉頭焮衝トハ氣管口ノ粘液膜ニ發スル急
性焮衝ヲ曰フ喉頭トハ咽ノ前ノ上部ニシテ舌
ト氣管ノ根ノ所ヲ言フナリ
喉頭ニ容布スル所ノ粘液膜ハ聲音ヲ發スル貴
要ノ器械ニシテ絶エズ大氣ト相觸ル、處ナリ
故ニ喉頭焮衝ノ原因ハ寒冷ノ大氣ニ感スルヨ
リ發スルノ最モ多シ
世人ノ能ク知レル如ク一部ノ發汗減少スレバ
他部ハ之ニ反シテ必ス増進ス其増減機能ノ關
係ハ皮膚ト粘液膜トノ間ニアリト謂フハ醫家

保嬰新書 卷之十 高松氏藏板

ノ説ナリ
夏日ハ皮膚ヨリ發汗スルコト太ク多クシテ肺ノ
排泄至テ火シ冬日ハ全ク之ト相反シテ皮膚ノ
發汗減少シテ肺ノ排泄太過ナル者ナリ故ニ蒸
氣閉塞スレハ肺ノ排泄ヲ増スヲ著シ此理ヲ以
テ觀レバ輒キ雨濕暴風等ノ日ハ必ス小兒ヲ圍
中或ハ田野ニ伴フコト勿レ既ニ上説ノ如ク當歲
ノ嬰兒ハ自身必用ノ體温ヲ保チ能ハサル者ナ
ルガ故ニ不意ニ危篤ノ病ニ陥ルコトアリ
急性喉頭焮衝ハ老幼男女ノ差別ナク感受スル

者ナレハ殊ニ小兒ニ多シ而シテ女兒ヨリモ男
兒ニ多シ
其原因ハ冷氣濕氣暴風足部濡濕泣叫ノ持久冷
水浴透風早晚夕時ノ散步草野ノ露座或ハ身體
ノ熱スルニ方リテ俄ニ冷水ヲ飲マシムル等ナ
リ故ニ生母ハ勿論乳母モ保兒モ常ニ此ニ注意
シテ其原因ヲ避ルコトヲ怠ルベカラズ
喉頭焮衝ハ不意ニ發スルコト稀ニシテ大概感冒
ヨリ繼發スルコト多シ
徵候ハ呼吸一一種ノ障碍アリテ泣聲自ラ變ス

嗽衝更ニ増劇スレバ泣聲益變ジテ殺音終ニ全
ク啞止ス而シテ咳嗽スル毎ニ疼痛増劇シテ僅
カニ喉頭ニ觸ルレバ其痛ニ堪ヘズ又吸氣ニモ
痛ヲ發シテ劇咳ヲ起シ咽喉乾燥シテ大渴アリ
脈頻數ニシテ飢熱灼クガ如シ顔面紅色ニシテ
精神恍惚タリ
其証候已ニ具ハル時ハ多量ニ乳ヲ與フルヲ
忌ム宜シク小許宛數度ニ飲マシムベシ然レモ
燕下毎ニ疼痛ヲ發シテ其嗽衝増劇スル時ハ直
ニ哺乳ヲ止メテ醫ノ診察ヲ待ツベシ又乳母ハ

其食餌攝生共ニ醫ノ指揮ヲ嚴ニ守ラザルベカ
ラズ
頸ニ緩和琶布ヲ貼シテ頸ノ兩側ニ細小ノ水蛭
各一條ヲ放ツベシ其水蛭ノ大小ハ患兒ノ體質
ト年齡ニ隨テ斟酌シ以テ出血ノ分量ニ注意ス
ベシ
患兒ノ帶ヲ緊シク結フテ勿レ若シ不注意ニテ
緊縛スレバ其壓迫ノ為ニ更ニ併發証ヲ發スル
一往々之アリ
水蛭ノ痕跡ト兩足ニ緩和琶布ヲ貼シ若シ患兒

便秘スレバ亞麻仁、葵根或ハ麥糠煎汁ノ灌腸ヲ施シ、兼テ阿列襪油一匙ヲ飲マシメ、食塩ヲ溶化シテ脚湯ヲ行フベシ
右ノ方法ヲ以テ尚大便通ゼザレバ更ニ微温湯ノ灌腸ヲ行ヒ内服ニハ護謨舍利別、亞兒答舍利別、又ハ覆盆子舍利別、適宜ヲ加味シタル微温湯ヲ與ヘ、温室内ニ保護シ務メテ啼泣セシムルヲ勿レ
病症漸々消散シテ快復期ニ至ルト雖氏猶透風ニ注意シテ醫ノ診斷ヲ請ヒ全ク再發ノ恐れナ

シト云フノ許可ヲ得テ後始メテ散歩ニ伴フベシ

氣管枝焮衝氣管枝加答兒

氣管枝焮衝ハ氣管枝粘液膜ノ焮衝ナリ、其輕症ヲ風邪ト呼ビ重症ヲ肺加答兒ト名ク
乳兒ハ冢モ氣管枝焮衝ニ罹リ易キ者ナリ、其原因ハ全軀ノ寒冷、濡濕或ハ足部、肩、胸、等ノ如キ一部ノ寒濕其他大畧喉頭焮衝ノ原因ニ同ジ
其注意法ハ速カニ醫ノ診斷ヲ請ヒ寒冷ヲ防ギテ專ラ傍症ヲ避ルルヲ務ムベシ

急性氣管枝嗽衝ハ其証同一ナラザルコトアリ故ニ治療モ亦随テ同ジカラザレバ豫メ治療法ヲ一定スルコト能ハザル者ナリ
氣管枝ノ一部嗽衝ハ通常輕症ニシテ二三日ヲ經レバ快復ス然レド其劇症ニ至リテハ大ニ異同アリ故ニ此疾患ニ罹レバ專ラ健全學ニ注意シテ患兒ヲ温暖ノ室中ニ保護シ平常ヨリモ温カナル衣服ヲ着セ以テ冷氣ヲ避ケシムベシ
内服ニハ蜀葵花浸、堇菜花浸、無花菓煎等ノ如キ緩和粘滑劑ヲ居室ト同ジ温度トナシテ與ヘ禁

食ハ病症ノ輕重ニ随テ斟酌スベシ
脚湯ヲ施ス朝夕ニシテ脚湯後ハ直チニ亞麻仁末ノ緩和琶布厚サ大凡半圓銀許ヲ兩足ニ貼シ煎テ物部ニモ貼スベシ
此療法實ニ簡易ノ良法ナリト雖モ看護者常ニ注意セザレハ稀ニハ却テ危害ヲ招クコトアリ慎マザルベカラズ脚湯及ビ琶布ハ容易ナル者ナレバ婦女子ハ注意ナク速了シテ何時モ斯ノ如キ者ト為シ大人同様ニ思ヒ湯盤ノ位置浴湯ノ温度及ヒ時間ヲ謬ル時ハ病ヲ治セザルコトナ

ラズ却テ危篤ニ導クノ數々之アル者ナリ
 一千八百四十六年ニ比律悉ノ白耳義ノ豪商ノ小
 児齡ニ歳一日雨天ニ遊歩シテ感冒ヲ發セシ後
 急性氣管枝焮衝ヲ患ヒシ時余之ヲ診視シテ列
 氏十二度乃至十五度華氏五十九度乃至至
 二安臥セシメ哺乳ヲ禁ジ朝夕脚湯ヲ命ジ大便
 不通ナルニ由テ麥糠煎液ニ阿列襪油蜂蜜各一
 匙ヲ加ヘテ灌腸ヲ施シ薏苡仁煎液ニ護謨舍利
 別ヲ加味シテ飲劑トナシ而シテ后亞麻仁末布
 布ヲ胸ト足部ニ貼スベシト云ノ爾時看護ノ婦

人曰ク琶布ノ貼用ハ屢主家ニ施シテ熱煉スル
 所ナリ故ニ君ノ手ヲ勞スルナク賤妾自ラ製
 シテ貼スベシト是ヲ以テ余ハ其婦人ニ托シ患
 児ノ安静ナルヲ見テ午後五時其家ヲ辭シ去ル
 然ルニ翌朝午前第二時ニ方リテ一僕惚惚來リ
 テ余ニ告テ曰ク患児呼吸塞迫シテ危篤甚シ速
 カニ來診ヲ乞フト余則チ其僕ト俱ニ其家ニ到
 リ速カニ病室ニ入レバ則チ室中ノ温暖ナルヲ
 恰モ竈ノ如シ其温度三十度以上華氏九十九十
 リ患児ヲ看レバ大衾三枚ノ重キニ壓セラレ胸

孫嬰新書
 四十一
 馬公大藏版

部ニ重サ百三十匁余ノ毳布ヲ貼シ兩足ニハ手
 巾ニ亞麻仁末毳布ヲ厚ク包ミ膝下迄被包シ其
 上ヲ大ナル紐ヲ以テ結縛セリ其危險ナルヲ實
 ニ驚クニ堪タリ
 余速カニ其戸ヲ開キ室温ヲ減シ毳布ヲ換ヘテ
 輕クシ不用ノ衾被ヲ去リ患兒ヲ隣室ニ移シ以
 テ看護婦ノ不注意ヨリ起リシ危篤ナル諸症ヲ
 消除セリ
 其後一時間ヲ經テ睡眠ヲ催シ午前第八時迄熟
 睡シ而シテ更ニ一週間ニシテ漸ク快復セシ

アリ
 總テ此病ハ快復期ニ至レバ其再發ヲ防グベシ
 殊ニ急性ヨリ慢性ニ變ズルノ恐レアリ最モ注
 意スベシ又病ノ初期ニ必ズ鑿ノ診斷ヲ請フ
 ヲ怠ル可カラズ然ラザレバ輕症モ遂ニ重症ニ
 陥ルル數之アル者ナリ

肺焮衝
 肺焮衝ハ肺ノ實質焮衝ニシテ患者ノ年齢ニ由
 リテ病狀較異ル者ナリ故ニ老幼壯年ノ人ニ隨
 テ種々ノ病症ヲ顯ス

肺焮衝ノ發起ハ皆普通性ニシテ其初期中ニ數
 種ノ景況ヲ顯シ其最モ單純ナル者ハ急性焮衝
 ナリ此證普通ノ焮衝病性ニシテ經過ニモ必ス
 時期アル者トス
 一歳未滿ノ小兒此病ニ罹ルノ數アリ殊ニ出生
 後數日ヲ經ザル嬰兒ニ多シ而シテ女兒ヨリモ
 男兒ニ多ク夏時ヨリモ冬季ヲ多シトス
 乳兒ノ肺焮衝ハ常ニ單純氣管枝加答兒ノ如ク
 ニシテ鬱閉ト衰弱トヲ顯シ乳房ヲ與フレ其急
 ニ吸乳スルノナク些細ノ事故ニモ泣キ續テ發

熱シ咳嗽頻リニ發シテ呼吸著シク亢進ス是徵
 候二十四時乃至四十八時持續シテ消除スルカ
 或ハ荏苒トシテ増劇セザル者ハ肺焮衝ニ非ズ
 シテ加答兒ナリ然レ其徵候ヲ具ヘ病症増劇
 スル時ハ速カニ醫ニ依頼シテ肺焮衝ノ治療ヲ
 施スノ片時モ怠ルノ莫レ
 肺焮衝ニ罹レバ神志安穩ナラズ屢驚動シテ百
 事樂マズ食欲存スレバ乳房ニ附クノ難シ嘔吐
 ナク下痢ナク其皮膚初期ニハ平常ノ温度ニシ
 テ不整間歇熱様ノ熾熱ヲ發シ脈ハ其熱度ト共

ニ允進スル者ナリ
 咳嗽頻リニ發シ稀ニハ室咳トナリ呼吸疾數ニ
 シテ鼻孔ノ張縮殊ニ著シ此徵候アリテ後呼吸
 困難トナリテ遲慢ス熱ハ依然トシテ消散セズ
 煩悶ヲ發スレバ痰液ヲ流出スルナク顔面蒼
 白色ニシテ尋テ鉛色トナリ是ニ觸レバ冷カナ
 リ容兒ハ著シク變ジ腫孔散大シ終ニ窒息シテ
 斃ル
 碩學ノ小兒科貌首氏曰ク肺嗽衝ニ類似スル所
 ノ徵候ヲ備フル時ハ菩提樹花ト甘草ノ浸劑或

ハ堇菜花ト錦葵花ノ浸劑等ニ護謨舍利別或ハ
 亞兒答舍利別ヲ加ヘ適宜ノ甘味トナシ内服セ
 シムルヲ良トス
 病室ヲ温和ニシ衣服ヲ以テ患兒ヲ覆ヒ外氣ノ
 刺戟ヲ防ギ禁食ヲ嚴ニシ勉メテ膝上ニ眠ラシ
 ムベシ胸ノ前部ト兩足ニ亞麻仁末ノ琶布ヲ一
 日ニ三四回交換シテ貼スベシ
 大便不通ナレバ緩和灌腸ヲ施シ哺乳ヲ禁ジ前
 ノ浸劑ヲ與フベシ室温ハ列氏十五度華氏六十
 五ニシテ其室中ニ沸湯ヲ盛リタル鉢ヲ置キ其

沸湯中ニ錦葵葉三四握ヲ投シテ攪和シ以テ蒸
 氣ヲ發揮セシムレバ寢モ良効アリ
 患兒搖籃内ニ安臥スルヲ得レバ却テ膝上ニ
 眠ラシムルヨリ静ニシテ安眠ヲ得ル者ナリ
 肺焮衝ノ原因ハ大概感冒ナリ輕症ノ加答兒ト
 雖氏注意セザレバ肺焮衝ヲ繼發スルヲ往々之
 アリ故ニ加答兒ノ初期速カニ醫家ニ伴ヒテ其
 診察ヲ請ヒ以テ速カニ快復セシムベシ

肋膜焮衝

肋膜焮衝ハ急性アリ慢性アリ然レ氏今爰ニ獨

リ急性ノミヲ論ジテ慢性ハ措テ論ゼズ如何ト
 ナレバ慢性病ノ豫防法ハ醫ノ要務ニシテ常人
 ニ必用ナラザレバナリ余ガ示ス所ノ健全法ハ
 總テ急性病ノ初期ニ於テ其病勢ヲ挫キテ以テ
 快復ヲ助クルヲ目的トス故ニ父母ハ常ニ此小
 冊子ヲ熟讀スベシ若シ小兒疾病ニ罹レバ其徵
 候ヲ醫ニ報告シ醫ハ之ヲ考究シテ病勢ノ増劇
 ヲ止メ以テ急性ノ期ニ全治ノ療法ヲ施スベシ
 然レ氏若シ病症消除セズシテ慢性ニ趣ク時ハ
 更ニ一層注意セザルベカラス

小兒ノ肋膜焮衝ニ主性客性ノ二症アリ其主性ハ真ノ肋膜焮衝ニシテ一本病ナリ其客性ハ肺焮衝ノ第二期病ニシテ親首氏ノ説ニ據レバ此症多クハ輕症ニ屬シテ肋膜ノ損傷太夕以ク貴要ノ部ヲ損害スルヲ稀ナリト云ヘリ

天幸ニシテ一年未滿ノ嬰兒ニハ主性肋膜焮衝最モ稀ナリ而シテ小兒ノ肋膜焮衝ハ大概胸ノ偏側ニノミ發スル者ナリ其徵候ハ食欲ヲ失ヒ衰弱著シク咳嗽發熱ス而シテ胸ノ一部ニ觸レバ劇痛ヲ覺ヘ必ズ泣聲ヲ發ス咳嗽ハ漸々頻發

シテ終ニ微咳トナリ屢咳困難ニシテ祛痰止ミ呼吸疾數ニシテ呼吸氣多ク次ニ吸氣ヲ一頓ニナシ顔息ハ筋ノ收縮ニ由テ著シク變シ顔面蒼白色ニシテ活機ナク鼻孔ヲ屢縮張スルモノナリ

肋膜焮衝ノ原因ハ肺焮衝ト大略同因ニシテ男女ノ性ニ關スルヲナク冬ハ夏ヨリ多シ而シテ天稟虛弱ノ小兒或ハ攝生不良或ハ久ク仰臥セシメ或ハ貧家ノ小兒又ハ人民群集シテ敗氣滿ソル室中ニ寢食スル小兒等ニ寢モ多シ

客性肋膜焮衝ハ數アル者ナリ然レ此症ハ通
 常急性肺焮衝或ハ肺結核ヨリ繼發スル者ナリ
 故ニ肺焮衝ノ條ニ舉シ如ク其併發ト繼發トヲ
 防グニハ醫ニ依頼セザルベカラズ
 主性肋膜焮衝ノ療法ハ肺焮衝ト略異ナルヲナ
 キ者ニシテ專ラ健全法ニ注意シ患兒ヲ温室内
 ニ安臥セシメ勉テ寒冷ヲ避ケ食禁ヲ嚴ニシ緩
 和粘稠ノ飲液ヲ與ヘ亞麻仁末ノ大芭布ヲ胸部
 ニ貼シ若シ大便通ゼザレバ緩和灌腸ヲ行フヘ
 シ

患兒渴スル時ハ注意シテ緩和粘滑ノ微温液ヲ
 數々飲マシメ室温ハ晝夜共ニ同等ニシテ昇降
 ナカラシメ又誤テ冷氣ニ觸レテ俄ニ發汗ヲ
 止スレバ危篤ニ陥ルヲ屢アリ寢モ注意セサル
 ベカラズ

勞瘵

病ノ名稱ノミヲ以テ人ヲ驚怖セシムル者ハ勞
 瘵ニ若ク者ハナシ實ニ其名ヲ聞カシムレバ患
 者ハ俄ニ苦惱疲勞等ノ恐ルベキ顯症ヲ發起ス
 ルヲ覺フル者ナリ醫ハ其病質ノ異ナルニ隨テ

其名ヲ區別ス即チ肺結核、肺結石、顆粒狀、癌腫等
是ナリ
今爰ニ其病症ノ異同ヲ一々擧ゲテ以テ仔細ニ
之ヲ説明スヲ要セズ只勞瘵ハ總テ肺ノ損傷
ニシテ其損傷ノ漸々増進シテ終ニ膿ヲ醸ス者
ナリト云フヲ知ラシムルノミ
佛國ノ醫學博士刺越涅屈氏ノ說ニ據レハ肺中
ニ結核ヲ生ジテ發スル所ノ病ヲ勞瘵ト云フ實
ニ此恐ルベキ病ハ大概結核ヨリ繼發スル者ナ
リ

勞瘵ノ原因ハ巨細ニ定メ難シト雖其歸スル
所ハ寒冷、住所下濕或ハ室中ノ空氣不通及ヒ飲
食不良、滋養不足、運動ノ怠リ或ハ氣管枝ノ刺戟
物等ナリ
此書ハ父母ノ手ヲ片時モ放ツベカラザル者ニ
シテ其中ニ最モ注意スベキ病ノ原因ハ勞瘵ノ
遺傳ナリ
小兒ハ屢々父母ノ遺毒ヲ直ニ其身ニ受ル者ニシ
テ其遺傳中ニ於テ勞瘵最モ多シ故ニ若シ父母
ノ中何レニカ其病アレバ其兒ハ遺傳ノ勞瘵ヲ

免ル、一能ハズ然レモ醫學進拔スルニ隨テ治
療日々ニ開クルヲ以テ能ク其遺傳ヲ豫防シテ
其病原ヲ挫キ此難病モ亦猶之ヲ治スルヲ得
ベキニ至レリ
勞瘵ハ出生後必ス直ニ之ヲ防クヲ怠ルベカ
ラズ若シ父母ノ内勞瘵質ニシテ狹兒出產スレ
ハ速カニ遺毒ノ消除法ニ注意セザルベカラズ
醫ノ療法ト健全學ノ精巧ニ依リテハ遺傳ノ道
路ヲ斷絶シ以テ其遺毒ヲ消除シ體質ヲ健全ニ
補育スルヲ得ベシ

乳母ハ多血質ヲ撰ムベシ其肌層ノ色、白カラズ
黒カラズ體格強壯ニシテ所謂十全健康ナル者
ヲ貴ム且乳母ノ父母モ亦健全ナルヲ要ス是レ
則チ乳母ヲ撰ムノ法ナリ若シ其一族肺疾ニ罹
ル人アレバ其乳母モ必ス其質アル者ナリ然ル
時ハ嬰兒ニ肺疾ノ遺傳ヲナスノ恐レアリ故ニ
其血統ニ至ル迄注目セザルベカラズ
住居ヲ高燥ノ地方ニ移シ日光ヲ受ケ大氣ノ新
陳代謝ニ注意シ毛布ノ襦袢ヲ著セシムベシ其
兒乳ヲ離ル、ノ後ハ嵩少クシテ養分多キ食物

ヲ真^アハ務^ツメテ肺^イヲ安^ア静^シニシ肺^イニ交^カ感^カスベキ障^ハ
 碍^ヲ避^キケ適^イ宜^キノ運^ウ動^ドヲナシ劇^ゲ動^ドヲ戒^イシメ喜^キ怒^ノ
 哀^イ樂^レヲ遠^トル等^ハハ勞^ラ瘵^サ遺^イ傳^ン毒^{トク}ヲ消^シ除^ススルニ寂^サ第^ニ
 一^ノ良^シ法^ナリ
 父^ノ母^ノ愚^ク痴^ク文^ヲ旨^クニシテ此^ノ肝^ヲ要^スナル教^ニ遵^フハズ或^ハ
 ハ健全^ノ法^ヲ知^ラズ或^ハ生^ノ母^ノ寵^ヲ愛^スニ溺^レテ肺^ノ疾^ヲ
 ヲ患^フフルモ尚^モ自^ラ乳^ヲ以^テ其^ノ兒^ヲ養^フヒ又^ハ乳^ノ母^ノ
 ノ鑿^カ定^シ疎^ク漏^ルニシテ勞^ヲ瘵^ヲ質^ノ乳^ヲ真^{フル}等^ノ如^キ
 キハ恐^ラクハ其^ノ兒^ノ一^年ニ滿^タズシテ斃^ルベシ故^ニ
 ニ此^ノ書^ヲ熟^ク讀^ミ注^意シテ其^ノ疾^ノ病^ヲ防^グ禦^スル時^ハ

必^ス其^ノ裨^ヲ益^スアルベシ
 斯^ノ如^ク其^ノ功^績ヲ得^ル時^ハ則^チ天^ノ愉^ク快^{ナル}保^嬰
 法^ノ美^シ事^ト言^ハザルベカラズ今^ヤ醫^ノ學^ノ進^歩
 スルニ隨^テ治^療ノ方^法益^ク精^巧ヲ極^ム能^ク茲^ニ
 注^意スレバ既^ニ發^起セシ肺^ノ結^核モ亦^チ全^ク治^スル
 ニ至^ル
 醫^ノ事^ノ歷^史ヲ見^ルニ大^人ノ勞^瘵モ亦^チ此^ノ療^法ニ依^リ
 リテ全^ク治^スル者^{アリ}故^ニ小^兒ニ在^テハ猶^ホ容^易
 ナリトス如何^トナレバ則^チ小^兒ハ肺^ノ結^核ヲ患^フ
 ルト雖^モ其^ノ病^元ヨリ日^々數^ヲ經^ルテ淺^シ故^ニ發^ス

病後直ニ之ヲ防クヲ得ヘシ且五情ノ感觸ヲ
 煽動スベキ障得物少キヲ以テ勞瘵ノ増劇モ亦
 大人ノ如ク速カナラザルヲ以テナリ
 方今胸部ヲ診斷スルニ搖診尺診打診聽診ノ諸
 法アリ
 搖診ハ胸部ヲ搖動シテ直ニ耳ヲ胸膛ニ接シテ
 以テ胸腔中ノ滲出物波動ノ有無等ヲ鑑定スル
 ノ法ナリ
 尺診ハ胸膛兩側ノ廣狹ヲ尺度スルノ術ナリ然
 レ氏此診候ハ往々其比較ヲ誤ルヲアリ如何ト

ナレバ則チ其患者健康ノ時ニ當リテ嘗テ其左
 右ヲ尺度セシトアルニアラザレバ天稟其左右
 ノ寸尺差異アル者アレバナリ
 打診ハ一定ノ術ニシテ患者ノ胸上ニ薄布ヲ覆
 ヒテ三指ヲ置キ其指上ヲ他ノ指頭ヲ以テ敲キ
 或ハ象牙ノ薄片ヲ胸上ニ置キ之ヲ槌ニテ打チ
 以テ胸部清濁ノ聲音ヲ察スルノ法ナリ
 聽診ハ佛國ノ碩學刺越涅屈氏發明ノ聽筒器ヲ
 取テ患者ノ胸膛ニ接シ或ハ直ニ耳ヲ接シテ以
 テ胸内ノ呼吸及ビ血液循環ノ聲響ヲ聽キ併テ

肺心ノ作用ヲ察スルノ術ナリ蓋シ其作用ヲ能ク辨別スルニハ豫メ先ヅ健康ノ胸響ヲ知リ而シテ胸病ニ罹ル者ノ胸響ヲ聽ク時ハ其響著シク異ナル者ナリ

以上ニ注意スレバ容易ニ勞瘵タルヲ知ル然ル時ハ其病症未タ増進セザル前ニ速カニ醫ニ診斷ヲ請ヒ以テ治療ヲ施スベシ輕症ノ加答見ヨリ漸々勞瘵ノ素因トナル人アリ或ハ肺焮衝肋膜焮衝ノ如キ重症ノ原因アレハ勞瘵ノ素因トナラザル人アリ

素因ハ勞瘵質ト唱フル所ノ人ニアリテ殊ニ著キ天稟ノ勞瘵質ハ其齡十歳以内ニ發スル者ナリ

是故ニ齡十歳ニ至ル迄ハ此健全法ニ注目スベキ年限中ナルヲ忘ルベカラズ次ニミーサン氏ノ説ヲ擧ゲテ以テ小兒ノ父母タル者ニ忠告ス

ミーサン氏曰ク勞瘵ニ罹ル小兒ハ顔面浮腫其色蒼白口唇及ビ鼻稍厚久皮色不潔ニシテ泥ノ如ク或ハ白蟻ノ如シ頬ハ白色ニシテ稍紅色ヲ

帶ビ其紅色上ヲ指頭ヲ以テ輕ク抑セバ其色下
 チ蒼白色ニ變ス毛髮黃色顔面及ビ頸圍ノ靜脈
 ハ皮下ニ著シク見ルベシ腹部膨脹四肢瘦小シ
 テ顔面豐大トナリ而シテ患苦ヲ訴ルトナシト
 雖モ漸々羸瘦ス其寢モ輕症ニ在テハ屢衄血ヲ
 發シテ治スルトアリ又甚ク加答兒ニ感ジ易ク
 腺腫殊ニ頸腺閉塞スルト徃々之アリ
 何病ニ限ラズ小兒患ル時若シ治療ヲ怠リ或ハ
 治療ヲ加フト雖モ全治ニ至ラザレバ勞瘵ニ變
 ズルトアリ又麻疹猩紅熱痘瘡百日咳等ノ如ク

全軀及ビ肺ニ關係スル病後ハ寢モ勞瘵ニ轉ジ
 易キ者ナリ
 前ニ舉シ如ク天稟肺勞質ノ小兒ハ劇動及ビ精
 神ヲ勞スベキ作業ヲ慎ミ總テ精神ヲ安靜ニ養
 ヒ適宜ノ運動ヲナサシメ以テ身體ヲ清潔ニ保
 ツベシ
 香竈氣發ノ飲料ヲ禁ジ殊ニ煙草ハ縱令患者嫌
 惡スルトナシト雖モ病室内ニ於テ決テ熏煙ス
 ルト莫レ
 治療ハ患者ノ天稟ト病症ノ輕重ト原因ニ注目

シテ施ス者ナレバ豫メ一定シ難シ故ニ小兒ノ
 父母ハ常ニ注意シ若シ此病ノ徵候アルヤ否ヤ
 ノ疑ヒアル時ハ速カニ醫家ニ至リ以テ其原因
 ヲ詳カニ訴ヘ診察ヲ請フテ最モ緊要ナリ

保嬰新書卷之下 終



第五 遊歩之圖

五十三 高松氏藏版

第六
椅子ニ倚リ
遊之圖



第七
歩行初之圖



第八
坐シテ遊之圖



版權免許 明治九年十一月十六日

東京第五大區二小區
向柳原町二丁目三十五番地

譯者魚出版人 静岡縣士族 高松凌雲

第一大區十二小區
馬喰町二丁目五番地

發兌書林 島村利助

