


蘭 和

窮理外科則

七火傷部凍瘡部
 篇胼胝部癩部
 卷之下

ヤ 4
 1427
 3



74
1427
3

窮理外科則卷之下

目次

火傷部

第一章

火傷ヲ論ス

第二章

火傷ノ輕重火度ノ昂低ニ因リテ論ス

第三章

死液火ニ觸テ變化スルヲ論ス

第四章

生液火ニ觸テ變化スルヲ論ス

第五章

治法ヲ論ス

第六章

問答篇

凍瘡部

号里卜斗リ余二二



91-1893

第一章

凍瘡ヲ論ス

第二章

寒ノ性ヲ論ス

第三章

凍瘡ノ輕重ヲ論ス

第四章

輕證ヲ論ス

第五章

重證ヲ論ス

第六章

問答篇

胼胝部

第一章

胼胝ヲ論ス

第二章

原因ヲ論ス

第三章

治法ヲ論ス

癭部

第一章

癭ヲ論ス

第二章

癭ノ證候ヲ論ス

第三章

癭ノ區別ヲ論ス

第四章

善證ヲ論ス

第五章

惡證ヲ論ス

第六章

輕證ノ治法ヲ論ス

第七章

頑癭狀ノ者ノ治法ヲ論ス

第八章

癭ノ深キ者ヲ論ス

第九章

癭ノ窄キ者ヲ論ス

第十章

癩ノ骨疽ヲ兼ル證ヲ論ス

第十一章

内藥ヲ論ス

第十二章

問答篇

窮理外科則卷之下目次終



窮理外科則卷之下

第七篇

遠西改曆一千七百六十二年鏤行

遠西 和蘭

窮理大醫學

育漢涅斯趨爾德兒著

以羅甸詞

憲埏烈吉格爾父

譯以和蘭詞

大日本

丹後

處士

新宮涼庭碩

重譯

陸奥

菅 玄龍以貞

門人

日向

甲斐文貞國幹輯錄

尾張

永田良遠有定

火傷部

第一章 火傷ヲ論ス

火傷也者湯火熱物ノ身體ニ觸テ烙傷スルノ謂也

第二章 火傷ノ輕重火度ノ昂低ニ因ルヲ論ス

蓋シ初度ノ火ヲ以テ試ニ屍ヲ烙スレバ忽^チ其部強縮痿皴
 ス是津液火ノ為ニ奪ヒ去ラル、カ故ニ細脉纖維條離折シ
 テ其部摧碎シ易キニ至ル其理朽木ニ等シ然ルニ初度ノ
 火ニ烙セラレタル者ノ如キハ脂肪或滋潤ノ液劑ヲ其部
 ニ灌キ浸スキハ漸ク再平ニ復ス○第二度ノ火ニテ如前
 試ルニ其部頓ニ剛強メ緊縮ス故ニ之ヲ復スルノ治方
 モ前ノ者ヨリハ一等難シトス○第三度ノ火ヲ以テ試ル
 片ハ其部ノ剛強緊縮俱ニ以前ノ者ヨリハ劇^クメ脉絡管ニ
 波閉スル而已ナラズ忽^チ破裂スルニ至ル○第四度ノ火ニ

テ試ル片ハ直^チニ其部ノ脉絡纖維炭燼ノ如クニ至ル

第三章 死液火ニ觸テ變化スルヲ論ス

凡ソ液ノ屍ニ在者火ニ觸テ凝固スル者與不凝固者二種
 アリ水液脂肪ノ如^キハ火度ノ低キ者ニ觸レバ唯溶解シテ
 其性不變火度ノ最昂者ヲ以テスル片ハ直^チニ敗壞スト雖^モ
 凝固セズ所謂不凝固液是也鹵液ノ如^キハ火ニ觸レバ必^ズ凝
 固スル者ニ其凝^ルノ多少ハ火度ノ昂低ニ隨フ是ヲ以
 テ再之ヲ烱解スル^ルノ難易モ亦其凝固ノ微甚ニ隨フ而
 ノ此液最昂度ノ火ニ觸レバ帝ニ凝固スルノミナラス火
 力透徹シ壞滅メ炭燼ニ至ル者也

譯者曰凡為醫者須
 注心意於是等事件

第四章 生液火ニ觸テ變化スルヲ論ス

凡ソ火ノ生體ニ觸ル、モ亦前説ノ如ク津液ノ變化並ニ
證狀ヲ發スルヲモ屍ニ異ナルヲナシ然レモ生體ニ於ル
ト屍ニ於ルト少異アリ宜明察不然則其治ヲ處スルニ於
テ謬誤ヲ取テ少カラス

第五章 治法ヲ論ス

蓋シ初度ノ火ニテ烙傷スレバ則其部頃ニ焮痛ヲ發ス宜
第一第二ノ柔和劑又滋潤滑澤スル所ノ方ヲ撰ニ用ベシ
第一滋潤軟膏

- 牛酪無塩者 四錢
- 硫黃花錢 一
- 雞子黃箇 一
- 撲彪本 歷夜軟膏 二錢

右混和供用

第二方

- 牛酪無塩者 二百八十錢
- 草零陵香
- 董々菜各四錢
- 香烈者
- 芸香

右煮至水氣盡以供用

第二度ノ火ニテ烙傷スル者ハ諸證前ノ者ヨリ一等劇メ
層ニ紫色ヲ發シ隨テ水泡スル者也此證ニ於テモ亦速ニ
前方ヲ撰用メ其焮痛ヲ潤澤メ鎮止スベシ然ルニ水泡ス
ル者ハ必之ヲ破リ層ヲ剥去テ莫ルヘシ若既ニ層剥脫シ
タル者ハ柔和劑方出干爛傷部若クハ滑澤軟膏ヲ撰ニ貼スベシ

第一滑澤軟膏

蒔蘿油

野菊油

薔薇油

各四

撲彫歷夜膏

沈甫歷吉數膏

豚脂

雞脂

黃蠟

各八

右調勻塗棉布以貼于患上

若夫銳藥ニテ烙傷シ皮内ニ黑色ノ物入タル片ハ速ニ第

一止腐洗劑

方出于骨部

第一柔溶水

出于胸創部

ノ類ニテ洗去スベ

シ其全不可除去者ハ患上ニ其大ト齊キ発胞膏ヲ處メ拔

去ベシ其餘ノ治法ハ前ニ異ナルヲナシ然レ凡銳藥ニテ

受タル火傷ハ殊ニ劇痛ヲ発シ易シ故ニ滋潤軟膏或呼涼

泥ヲ處スベシ

呼涼泥

白罌粟花

撮六

萍蓬花

撮一

薔薇露

適宜

右搗爛而為泥以敷于患上

第三度ノ火ニテ烙傷スル者ハ必遂ニ敗腫ニ變シ臭水滴

リテ甚痛ニ或ハ其肉強縮スル也如此證ニハ速ニ前ノ藥

劑ヲ處メ而後其腐敗ノ部ヲ柔ナル踈刷劑ヲ以スベシ乃

止腐洗劑方出于骨部愈割軟膏生新軟膏ノ類ヲ撰用フベシ

生新軟膏

蜂蜜

十六

馬芥汁

三十

右煮狀至如濃蜜加大麥粉適宜

第四度ノ火ニテ傷ヲ受ル片ハ必層脾摧碎シ直ニ脉絡破
裂メ出血スル也但其血凝固メ不出者ハ瞬時ニ瘡痂ヲ生
ズ凡ノ如此證ハ其痂上ニ上章ノ蒸劑ヲ處スベシ若シ治療
ヲ懈タル片ハ痂益厚ナリ愈テ後必癩痕ヲ餘ス者也故ニ
先其初ニ蒸劑ヲ處シ二日許ヲ經テ其痂ニ劈痕ヲナシ愈
創軟膏烱解蒸劑出干骨部等ヲ撰處スベシ
烱痂軟膏

馬兜鈴

菖蒲

白芷各四

的里亞加二

薔薇

蜜適

右混和供用

第六章 問答篇

問曰收斂劑若クハ辛辣劑若クハ冷物ノ類ハ火烙ノ焮熱
疼痛ヲ鎮止スルノ切アリヤ

答曰火烙ノ焮痛ヲ鎮止スルニ墨水譯者曰彼國製墨法
與本朝支那不同或

収斂ノ軟膏ヲ用ルコトアリ然レ凡此等ハ脉絡ノ纖維ヲ
メ剛カラシメ諸液ヲ凝スヲ以テ宜シカラストス假令
此劑ヲ貼メ其輕者ハ稍快ヲ見ルコト有ト雖其重者ニ於
テハ全ク當レリトセズ又綠石鹼或ハ温熱劑ヲ貼スル
コトアリ是等ハ焮痛増劇メ目前ニ害アリト雖而レ凡冷
物ヨリハ良トス何者冷物ハ凝固シタル液ヲメ愈凝固

セシメ再^レ焯解スベキ者ヲメ至^レ使不可^レ焯解也世醫動モ
スレバ此患ニ樟腦燒酎若クハ底力面油ノ類ヲ以ス予
未嘗會^ニ其意也

凍瘡部

第一章 凍瘡ヲ論ス

身體寒氣ニ觸^レテ命ノ運動遲^レ滋^レシ諸液自^ラ凝固シテ発スル
瘡ヲ凍瘡ト名ク

第二章 寒ノ性ヲ論ス

凡^レノ血液ハ嚴寒ニ觸^レレバ凝固ス甚シケレバ氷芒ヲ結テ
脉絡破裂スルニ至ル者也都テ水液脂肪等ノ液ノ凝剛シ

タルハ僅^クノ暖氣ニテ再^レ溶解セシムベシ○鹵液血液ノ類
ハ一度凍凝スレバ再^レ平ニ復^レヒズ○若^ク急ニ之ヲ裂火ニテ
温ムルハ直^ニ其性ヲ失ヒ脉絡全ク破裂スルニ至ル

第三章 凍瘡ノ輕重ヲ論ス

凍瘡ハ二種ニ區別ス一日輕寒ニ觸^レテ発スル者二日嚴寒
ニ觸^レテ発スル者也是其寒度ノ高低ニ因テ生質ヲ凍凝ス
ルヲモ微甚ノ別アリト知ベシ

第四章 輕證ヲ論ス

是ハ手足ニ発メ必シモ皆^ニ感觸メ発スル者ニアラ
ズ都テ身體ノ外氣ニ觸^レル部慢爾トメ一箇ノ腫核ヲ生ジ

少シク温ムレバ其腫痒氣ヲ発シ續テ寒氣ニ觸ル、片ハ
竟ニ疼痛シテ其初紅色ナル者モ赤色ニ變スル者也總テ
此患ハ温散劑ヲ撰用メ防クベシ

第一防凍膏

唵木^モ丘^ニ押郭^ク樹膠^{代桃膠或}沙^サ憂^カ伯夜^ハ丘^ニ無樹膠^{代阿刺}

^{也無}松香^{各十}乳香^六也

右為膏供用 譯者曰沒藥乳香蘭菌自用者其品佳唐舶來鬻者其品下切亦劣

第二方

篤耨香 菖蒲根 櫟寄生^大 王乳香^{各八}

安息香 乳香^{如德垂} 刺乎^ラ沓^ク尼^ニ無^{各三十}

右混和供用

又神經創脂^{出于}吸酸泥^{方出于}或導潤軟膏ヲ貼シ冬寒ニ

先ダソテ豫メ其部ヲ被包スベシ

導潤軟膏

煙草汁^{二十} 白蠟^{新者十} 列識納批書^{十二}

篤耨香^八 樞油^適

右相和供用

此患ハ寒氣留連スルニ會ハ關節腫起シ試ニ之ヲ按スル
ニ熱セズ之ヲ温ムレバ即疼痛スル者也皮膚剝脫ノ汚穢
ニナリ蒼色ニ變シ敗潰シ延纏不洽夏ニ至ル者アリ乃如

此腫瘍ハ前ノ諸劑ヲ被覆シ温暖ニスル疎刷水止腐洗劑
ニテ洗淨シ而シテ其外寒ヲ防ク為ニ閉瘡膏神經創脂方俱
出于
部等ヲ撰用ベシ

滌垢水

牡牛膽

蜂蜜

各四
錢

白葡萄酒

大麥水

各八
錢

右混和供用

若レ此患嚴寒日月ヲ積ニ尚且患部衰弊シ上ノ諸方ニテ不
治片ハ温劑ヲ處ノ其命ヲ挑ムベシ其方焯解蒸出于
骨部挑命
蒸及挑命餅ヲ撰用ベシ

挑命蒸

薄郭斯婆年大豆
種類

簾得呢由模

炭粉

塩各三十
四錢

茵陳

臭香

胡蒜

芸香

各粉
八錢

蜂窠

醋

各適
宜

右混和温蒸患上

挑命餅

臭香

茵陳

蓬草

藿香

蕭葶

莫而香

飛加

芸香

各葉
半握

清水

適
宜

右煮爛如粥而加礪砂四錢葶藶粉二十四錢芸香油十六
錢相和臨用再加礪砂精樟腦精各一錢温置于患上

蘓生蒸

臭香

艾

沙立逸

類 蕪種

杉

煙草

萬年

縷各葉半握

草零陵香

接骨木花

金盞花各八

右以適宜水或醋煮爛如粥取三百八十四錢而加海塩礪砂各十六錢的里亞加精十六錢温置于患處

第五章 重證ヲ論ス

凡ノ嚴寒ニ感メ凍痺スル者ハ必速ニ不可温其部也何者其部ヲ温ムレバ速ニ碎壞スレバ也須ク先々又ハ寒水ヲ以テ麻擦シテ其部ニ知覺ヲ誘引スベシ若寒氣透徹スルト不甚深唯久ク寒ニ觸タル如ハ其部ニ變ヲ見ルト無メ平ニ復スル者也若腐敗僅ニ殘ル者ハ其瘡痂ヲ前章ニ隨

滌除スベシ都テ上ノ治法ハ假令ヒ關節全ク死痺スト雖其部ヲ切斷スルニ至ラサル者ハ必宜用ベシ又嚴寒ニテ全身凍痺スル者モ其勢故ニ復スベキヲ見バ止腐癩汗劑方出于骨部搗氣飲等ノ温煖劑ヲ内服セシムベシ是再良液ヲ生メ敗液ヲ驅ランカ為メ也

搗氣飲

的里亞加二

大蒜蜂蜜十六

杜松子精四

蜂蜜適

右混和每半時服一ヒ

第六章 問答篇

問曰人皆一般ニ凍瘡ヲ患ヒザルハ其理何ゾヤ

答曰是ハ小兒女子ニ多メ殊ニ男子ニ於テ稀也此患ニ感
シ易キ人ハ稍風寒ノ起ルニ會ヘバ忽チ此患ニ羅ル者也
又此患ニ感シ難キ者ハ假令ヒ嚴寒酒ヲ凝スニ至ルト
雖必感セズ由之觀之其因全ク嚴寒アラズノ其人ノ性
質ニ差等アルベシ何者總テ此患ノ発スル所以ヲ考ル
ニ寒ナル者ハ氣中ノ水氣霜芒ニ變シ皮膚層ニ浸觸ス於
是乎命ノ妙用之ガ為ニ障遏セラレテ此患ヲ発スル
章々タリ此ヲ以テ治法ハ温化劑ヲ處スルヲ法トス
問曰此患頓ニ温ムル片ハ何ヲ以テ痒氣ヲ発スルヤ
答曰是必患處ニ凝固シタル諸液温煖ヲ得テ初テ渙解シ

曾ラ萎縮シタル脉絡隨テ膨脹シ凝液初テ流レ觸ル
ニ當テ痒觸ヲ為_ス知ルベシ故ニ其部ヲ頓ニ強ク温ム
ル片ハ翹ニ腫氣疼痛ヲ発スル而已ナラズ動モスレバ
其部死スル者也是ヲ以テ凍部ハ頓ニ温ムベカラス
脱脂部

第一章 脱脂ヲ論ス

若クハ乳若クハ肛若クハ唇ノ類乾燥メ破裂スル者ハ其
因ノ内外ヲ論セズ皆是ヲ脱脂ト稱ス 此患在骨者
論列于骨部

第二章 原因ヲ論ス

此因ハ全ク脂肪ノ減損ヨリ発スト知ルベシ癩毒或癩疾

或乾癢或水ニ浸ス等ニ発スルヲ以テ其義了々乎タリ○
寒氣若クハ燥氣ニ觸ル、片ハ膚臍乾燥ノ滑澤ヲ失フ此
時ニ當テ其部ヲ屈伸動揺スル片ハ破裂又此患ヲ発ス

第三章 治法ヲ論ス

内因ヨリ発スル者ハ不除其因則治セズ然レニ脂肪減損
シ或津液不給シタル者或寒氣燥氣ニ觸レ或久ク水ニ浸
シテヨリ発スルハ須ク先其部ヲ滌垢水方出于潤澤水ニ
テ洗ヒ潤澤丸ヲ内服セシムベシ尚滑澤軟膏方出于火傷部第二
第三柔和軟膏ヲ貼シ而後愈膏ヲ貼スベシ

潤澤水

巴且杏煎汁 白砂糖四錢 蔷薇露十六錢

右混和供用

潤澤丸

製蜈蚣二錢 発汗ツナ 的莫モ 无ム 一錢 篤穉香通宜

右為丸每服三分日五服

愈膏方

松香三十錢 雞子黄八錢

右相和加黄蠟十六錢切草油三錢供用

若クハ乾癢若クハ癩毒ヨリ発スル者ハ殺蟲水ニテ洗ヒ
然メ殺蟲軟膏ヲ貼スベシ

殺蟲水

勿^レ而^レ刺^レ墨^レ留^レ數^ス

製藥水^宜適

右供用

殺蟲軟膏

雞子白^{一箇攪之}為^一泡沫^者

猛^{六厘}汞^{六毛}

樟^{八厘}腦

右混和供用

若^レ乳頭^{右ノ患ヲ発スル者ハ}乳母^{ニ於テハ}吸酸軟膏^{方出}

^傷部^或柔^和軟膏^{ヲ貼スベシ}見^{之ヲ吸ト}雖^{害ナシ}

癩部

第一章 癩ヲ論ス

癩者管形ノ頑肉ニメ久ク愈着セザル老瘍ノ一種也而メ其内ニ惡膿苛液ヲ醸シ常ニ瘡外ニ漏ス者也

第二章 癩ノ證候ヲ論ス

蓋シ癩ハ其孔一ナル者アリ或ハ兔穴ノ如ニ許多アル者アリ醫宜ク先柔撓ナル搜具或灌射術ノ類ヲ以テ術ヲ盡シ其孔ノ終ル處在ヲ知ルベシ

第三章 癩ノ區別ヲ論ス

前術ニ由テ一ニ其曲直正斜ヲ知リニニ其窠穴ノ多少ヲ知リ三ニ其底ノ鞣滑ナル片ハ癩ノ骨膜ニ終ルヲ知リ四ニ其底剛兼ナル片ハ既ニ其骨ニ徹スルヲ知リ五ニ其底

癰ニメ不痛キハ其肉ニ終ルヲ知リ六ニ漏泄スル所ノ惡液過多ニメ其量癰形ト不可比隼者ハ癰窠別ニ伏メ有テヲ知リ七ニ其底不甚鞭メ唯痛甚ク之ニ觸ルレバ筋惕スル者ハ其神經或腱ニ終ルヲ知ルベシ而メ癰瘍ハ雞子白ノ如キ鹵液流出スル者也

第四章 善證ヲ論ス

癰甚歲月ヲ經スメ其底肉ニ終リ不出血且、不頑鞭其人強健ニメ其部術ヲ處スベキ者ハ良證ニメ易治者ナリ

第五章 惡證ヲ論ス

苛液ヲ出シ頑肉ヲ生メ腱神經或骨ニ徹透シ或直腸或腔

内ヨリ起テ外部ニ不徹不可處治術メ之ニ觸ルレバ疼痛甚ク臭氣不可迎者ハ惡證ニメ難治トス

第六章 輕證ノ治法ヲ論ス

蓋シ癰ノ善證ナル者ハ唯瘍ノ治療ト異ナシ唯其所以異者ハ内ニ挿ム劑ノ三故ニ癰ハ速ニ愈着劑ヲ貼シ或灌射スルヲ肝要トス故ニ止腐諸劑方俱出于風骨疽部並ニ愈創軟膏出于創部生新劑ヲ撰用ベシ

第一生新水

石灰水

四十
八錢

篤耨香

四錢

雞子黃

一筒

薔薇蜜

十二錢

右攪勻以水銃射入于癰內日兩三次

第二生新水

製定粉

薑黃

乳汁各一

石榴汁

薔薇煎

汁各十

蜂蜜四

右同上

第一愈肉軟膏

樟腦軟膏四

定粉

金蜜陀

各半

沒藥

五

乳香

品上

鰾膠

石榴皮

各半

薔薇油

適

右調勻點棉布貼于患上或為搽劑

然ルニ若癩ニ粘液或汚液纏ヒ着片ハ疎刷水微蝕水方俱

部創等ヲ用ヒ而後愈肉スベシ

第一淨癩水

蜂蜜十六

石鹼

勿搗碎

右以水適宜相得以供用

第二淨癩水

石灰煎汁

新者佳六

甘汞

一

右混和供用

除陳軟膏

膽礬

煨者

悅缺

鼻職

押箇

無軟膏

適宜

右混和供用

譯者曰此等諸劑欲其柔則宜加薔薇蜜也

搽系ハ須ク其愈ルニ隨テ漸次ニ細クスベシ

第七章 頑肉状ノ者ノ治法ヲ論ス

若_レ癩愈着_シ難_キ者ハ不可不明_ニ其因也蓋_シ脉絡ノ片膜癩
間ニ厠_マルヤ又粘液癩肉ニ溜滯スルヤ又惡液瘡口ニ滯
メ頑肉ヲ生スルヤ宜ク其因ヲ診定メ其頑肉ナルヲ知ラ
ハ一舉ニ切去ヲ武断ノ見トス否ヲサル者ニハ淨癩水微
蝕水_{出_于創部}ノ諸蝕劑ヲ撰ミ用フベシ

除陳散

履匣用墨

百四十
四錢

信石

生硫黃

各三十
二錢

食塩

十

四
錢 醋 適
宜

右於土器内煨煉焉以供用汚物已除則處可以生新劑

第八章

癩ノ深_キ者ヲ論ス

若_レ癩甚深者ハ疎刷水

出_于創部

淨癩水

出_于前章

止腐水

出_于骨病部

諸劑ヲ撰テ孔内ヲ洗ヒ而メ其孔ノ大小ニ應メ止腐膏鍼

出_于骨病部

止腐挿糸ヲ癩痕ニ至ルマデ挿ニ置_フベシ

止腐挿糸方

玉乳香

乳香

赤土

各等
分

右混和供用

第九章 癩ノ窄_キ者ヲ論ス

若_レ癩口甚窄クメ治療ヲ處シ難_キ者ハ〇一ニ堅ク捻リタ
ル吸膿挿糸_{出_于膿瘍部}ヲ其孔ニ銜挿スベシ〇二ニ如此證容

易ニ不可治メ其部ヲ切割ベキヲ診定セバ瘻底ニ至ル
マテ切開クベシ若シ瘻外部ニ貫通シタル者ハ切痔瀉刀
ヲ以テ切割ベシ其術先痔孔ヨリ瀉刀ノ尖ヲ腸内ニ貫キ
食指ヲ肛内ニ入テ其瀉刀ノ貫キ出タル尖ヲ摘取テ一舉
ニ引テ切割キ瘻肛一ナラシムベシ而シテ第六章ニ說所ノ
愈肉劑ヲ處スルヲ肝要トス○三ニ若シ鐵ヲ忌ミ或ハ一舉
ニ不可切割者ハ須ク撓ムベキ鉛鍼ニ蠟糸ヲ貫キ瘻口ヨ
リ入レ肛内ニ貫キ至ラシメ食指ヲ肛内ニ入テ鍼ヲ摘取引
出シ鍼ヲ去リ糸ノ兩緒ヲ取テ之ヲ結び其糸ヲ漸々緊急
シテ瘻肛ヲメ一ナラシムベシ但糸自ラ脱落スルニ至ラ

シメ而後上ニ舉ル劑ニテ其創ヲ治愈スベシ

第十章 瘻ノ骨疽ヲ兼ル證ヲ論ス

若シ瘻骨ニ徹メ骨既ニ腐レタル片ハ骨病部ニ說所ノ診法
ヲ以テ知ルベシ然ル片ハ瘻ノ治術ニ先ダツテ必其骨疽
ヲ治スベシ治法見于骨病部否ラサル片ハ瘻一旦愈ルト雖必再
發スレバ也如此證ニ於テハ第八章ニ說所ノ挿糸ヲ銜挿
シ而メ止腐散方出于骨病部及乾散ヲ撰用ベシ

乾散

白膽礬

礬石

撮

血石

撮

定粉

分五

右各末相得以振于患上

第十一章 内藥ヲ論ス

蓋シ癯ハ惡液身體ニアルヲ以テ必止腐煎方出于骨部驅膿飲
愈創出于骨部驅膿丸ノ類ヲ撰用ノ其治愈ノカヲ輔ケ五疳丸
ヲ處ノ時々微瀉ヲ取ベシ汞劑為良矣

驅膿飲

火焰菜葉

龍牙草葉

蒲公英葉各三撮

白罌粟

子

蒔蘿子

各八錢

甘草

一錢半

清水適宜

右煮去滓取三百二十錢每半時服八錢

五疳丸

藟藟二分五厘

牽牛子一錢

甘汞三分

右調和為十二丸臨卧服一丸

第十二章 問答篇

問曰癯瘍ハ殊ニ關節肛門淚點等ニ發ス其理何ゾヤ

答曰蓋シ此部ハ自ラ虚隙有テ恒ニ謝液ヲメ流通セシム
ル處ナルカ故ニ動モスレバ其液便チ空隙ニ流入テ腐
敗シ漸ク其部ヲ潰觸メ時日ヲ經テ癯ヲ發スル所以也

窮理外科則卷之下終

之與理相得可以見已題曰竊理外科則者因不
証也嗟乎我邦自今而後外科之道始具矣
歟文化十三丙子七月

長崎興善街

未承幹忠助撰



[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

究理外科則

腫瘍編

嗣出

同

骨病編

同

血瘤及痔編

同

眼耳鼻口編

文化十四年丁丑正月

北村四郎兵衛

同 庄助

