



遠西名醫
扶歌蘭度

察病龜鑑

下

ヤ 4
1432
3



1432
3



遠西名醫 扶歌蘭度 察病龜鑑卷之下

遠西李漏生 名國 國政參議侍醫兼

別爾列印 名都 大學校教頭扶歌蘭度 著

和蘭 哈傑滿 譯

因州 青木坦浩齋重譯

第四消化機 篇中化穀ニ連系ス
ル諸官能ヲ開列ス

消化機ハ活體至要ノ樞機ニメ其用。血行。呼吸ノ
兩機ニ次ク。故ニ之ヲ查照スル亦。施治ニ最切
トス。此一機ヲ推究スレハ下ノ數項自ラ分明ナ
リ。一則化穀諸器ノ健否。及ヒ補充本源ノ景況ヲ



知ル。二則舉身ノ健否ヲ候フ。此器ヤ許多ノ神經
輻湊ノ全身諸器ト連結スル故ナリ。三則諸液ノ
良惡ヲ知ル是レ消化器ハ又活體緊要ノ淨刷器
及ヒ泌別器ノ所在ナルヲ以テナリ。凡ソ消化機
ノ健良ハ全身強壯多力ニメ固形體。流動質ノ疾
病ト爲ルヘキ外寇ニ感スル下歎ク。心身常ニ活
潑ニメ病ト能ク自ラ治シ易ク且ツ長壽ノ基礎
タリ。而メ當ニ知ルヘシ消化強健ノ人ハ病ト急
性ナリ易ク之ニ反スル者ハ慢性病ヲ受ケ易キ
ナリ

○嚥下 嚥下不利ハ咽喉燄衝。嚥下ニ方テ痙攣。

麻痺。體質違常。恐水病。唯ク液質ノ者ノ三等ノ徴ナ

○食欲 食思虧損ハ難化有害ノ物。胃中ニ存ス

ルカ若クハ熱病ニ因ル下最モ多シ但シ儂麻質

私熱。癆瘵熱ハ此例ニ非ス。按ニ此疾ハ終始著ク

キ故或ハ知覺機ノ變態ニ原キ。處ニ於ルカ如シ或

ハ胃ノ罷弊若クハ胃ノ器體ニ關ル疾病ニ因テ

食欲減スルナリ又貪食善機異嗜ノ者ナリ其貪

食ニ就テ因由多端ナリ。一則胃質及ヒ血質其滋

補ヲ失フニ由ル乃チ食後忽地ニ吐下スル者。慢性ノ嘔吐下利ニ罹ル者。及ヒ癆瘵病。瘦削病ニ於ルカ如シ。二則物アリテ腸胃ノ神經ヲ刺戟スルニ由ル乃チ蛇虫。苛厲液。病毒轉移ノ類ナリ。三則胃神經ノ覺機病的ノ亢盛ヲ做スニ原ク乃チ神經病時ニ處女病。癲狂及ヒ妊婦ノ異嗜ニ於ル如シ。又異嗜ハ自然良能ノ妙機ニメ數裨益アルアリ。診家施治ノ際タ互ク注意スヘキ處トス。蓋シ土質ヲ好ムハ胃中酸液アルニ由ル。鹽質ヲ嗜ムハ粘液多キ候。酸物ヲ欲スルハ腐敗ノ候。膏腴

ヲ貪ルハ罷弊ニ由テ滋養ヲ要スル徵ナリ。
 ○渴 渴ハ口中ノ乾燥蒸發氣ノ虧缺ニメ内部ニ熱アルニ由ル故ニ熱及ヒ焮衝ノ候ナリ。或ハ痙攣ニ基ク乃チ哥兒都箇烏埴ニ於ル如シ。或ハ苛酷液ノ胃中若クハ血中ニ在ルニ由ル。或ハ血質ノ水分匱乏ニ由レリ。蓋シ熱病ニ在テ引飲飽クナキハ血質焮衝。極ニ屈ル候ナリ。
 ○惡心嘔吐 吐ハ胃府。搐掣様ノ苦患ニメ之ヲ發スル所以。諸般アリ。一則異常ノ刺戟物。胃中ニ在ルニ由ル。二則胃ノ感應機。亢盛ニ由ル。蓋シ此

二般ノ差別ヲ辨了スルニ舌。苔ヲ帶ビ及ヒ吐出スル物。汚穢ナレハ有害ノ刺戟胃中ニ在ルヨリ来ル者トス。若シ飲食スル所ノ者其質ノ良否ニ因ラス直チニ吐出スルハ胃ノ感應力。病的ノ亢盛ヲ做スカ若クハ胃府炊衝ニ嬰ル者トス。三則他部ノ刺戟ヲ交感スルニ由ル乃チ肝炊衝。腸炊衝。大便結積。膽石。腎石。頭腦打僕。腦水是レナリ。四則胃府或ハ其近傍ニ在ル内臓。器體ノ失常ニ由ル倘シ胃中汚物ノ候ナク早晨惡心嘔吐スルハ結石腎中ニ潜伏スルニ由ルナリ多シ。婦人ニ在テ

ハ妊始ノ候ナリ

○風氣腹滿。嘔氣及ヒ轉矢氣ハ招害物。第一道中ニ鬱滯泡釀ノ許多ノ風氣ヲ生スルニ由ル。中ニ就テ嘔氣ハ胃中。轉矢氣ハ腸中ニ在ルニ由ル。又常ニ之ヲ發シ易キハ腸胃ノ罷弊。彈力少キ候ナリ。腹滿ハ熱病ニ在テハ常ニ凶候ニノ腐敗物大ニ鬱滯ノ大虚衰ヲ兼ルニ由ル。腹肚大ニ緊満ノ疼ニヲ兼ルハ内臓炊衝ナリ。小兒ノ腹滿ハ蛔蟲ノ候ナリ。

○大便。大便検査ハ診家ノ要務ニメ徴知スル

所口鮮カラス。一則腸内胎ム所ノ物質ヲ知リ。二則腸及ヒ腸ト連結セル諸臟ノ病況ヲ察シ。三則血中ヨリ腸内ニ泌別スル所ノ液質ヲ知リ。隨テ亦夕全體諸液ノ變狀ヲ推定ス。四則實那蜜設即チ交感對衡ニ關ル疾苦ヲ察ス。蓋シ腹内疾病ニ在テハ大便檢査頗ル緊要。腸胃汚物ノ証ニハ特ニ然リトス。何者疎滌劑ノ用捨ハ便狀ノ良否ヲ睹テ決スヘキ故ナリ。凡ソ大便點檢ノ法タル互ク硬軟。色相。臭氣。及ヒ通利ノ難易ニ留思スヘシ。上圍ノ度數。居恆ヨリ益スアリ減スルアリ其益

ス者ハ一則有害異常ノ刺戟物腸内ニ在ルニ由ル。乃チ蛔蟲ノ類是レナリ。二則腸膜ニ在ル刺戟ニ原ク乃チ潰瘍。病毒轉徙是レナリ。三則腸ノ感應機實性。或ハ虛性ニ亢盛スルニ由ル。四則有害ノ刺戟ヲ腸内ニ轉輸スルニ根ス。乃チ膿液及ヒ病毒排除是レナリ。五則交感對衡ノ刺戟ニ本ク乃チ皮膚蒸發ノ抑遏ヨリ發スル下利是レナリ。六則腸管及ヒ全體ノ虛極ニ由ル。乃チ溶滿下利是レナリ。其減スル者ハ一則腸内固有ノ刺戟。缺乏即チ膽液寡少ニ由ル。二則感應機ノ虧損。彈力

ノ罷弊ニ原ク。三則痙性ノ攣縮。四則腸液匱乏或
ハ不飲。五則液ヲ他部ニ導洩スルニ由ル。劇キ發
汗ノ如キ是レナリ。六則器體ノ變常障礙ニ由ル
蓋シ乳兒ノ綠便ハ酸液ノ徵トス凡ソ便色ノ黯
赤ハ膽液過多。灰白ハ膽液虧缺ノ徵ナリ。圖ニ上
リテ疼ミヲ覺ルハ酷厲ノ刺戟。腸内ニ在ル乎或
ハ腸ノ覺力亢盛スルニ由ル。又利急絞澀スルハ
痔疾或ハ痢病トス

○大便失禁 夢裡記セス錯テ糞ヲ泄スアリ。狂
妄。人事ヲ省セス斯ニ迨フアリ。如水ノ便意ハス

射出スルアリト雖皆ナ配慮スルヲ要セス今標
示スル者ハ麻痺ヨリ來ル所ノ失禁ヲ云フ宜ク
混同スルヲナカルヘシ熱病ニ於テ此症ヲ發ス
ルハ大危篤ノ候ナリ

第五分泌排泄 篇中分泌排泄ニ關
諸機能ヲ開列ス

○蒸氣及ヒ發汗 皮膚蒸發ノ景況ニ由テ次ノ數
目ヲ候フ凡ソ表圍ニ輸送スル勢ヒ愈強ク分利
愈瓦斯狀ナルハ一則生力強健。二則血行順正。三
則血液及ヒ諸液質ノ善良。四則病毒排除ノ機轉
順良ノ候ナリ何者發汗ハ病毒排除ノ要領ニ

設令ヒ其他ノ諸排除機。振起スルモ皮膚蒸發ノ
充進ヲ兼ルニ非サレハ未タ嘗テ排除ヲ完フス
ルヲ有ラサレハナリ蓋シ醫家蒸氣ト汗ヲ混同
スルヲ勿レ蒸氣ハ瓦斯狀ニメ目之ヲ睹ルヘカ
ラス日夜連綿ノ間斷ナク而メ人身瞬時モ缺ヘ
カラサル者ヲ云フ。汗ハ滴々タル液狀ノ分泌ニ
ノ唯、一ニノ變故ヨリ来ル者ヲ云フ然レハ甲者
居恆不斷ノ常機。乙者臨時新發分析性ノ變機十
リ況ヤ汗ハ時トメ疾ノ副証タルヲアルヤ。夫
レ皮膚軟和ニメ腠理壅塞セズ蒸氣徐徐ニ發ス

ルハ瓦斯狀ノ蒸發機轉。妨碍ナキ候ニメ百病特
ニ熱病ニ在テ一大良徵トス是レ毫モ痙攣ヲ夾
マス血行亦夕障碍ナク分利機順良ナルヲ瞭然
タレハナリ。倘シ肌膚粗糙乾燥ノ猶ヲ皮革ニ觸
ル、カ如キ者ハ全ク之ニ反ス蓋シ發汗ニ二種
アリ一則自然良能。病毒排除ノ為ニ起ス者二則
病ノ証候ト爲ツテ副加スル者是レナリ之ヲ看
別スルヲ諸疾病特ニ熱病ニ於テ最モ要故タリ
其病毒排除ノ汗又數個アリ一則病初直チニ發
セズ熱ノ分利期乃チ第七日第十四日ニ至テ發

スル者は是ナリ但シ純性感冒熱及ヒ僕麻質斯熱
 ハ此例ニ非ス二則舉身ニ發スル者は是ナリ倘シ
 頭胸腹ノ一處ニ發スルハ血液其部ニ鬱積スル
 カ或ハ其部炊衝ニ罹ル候ナリ三則津々流出シ
 氣烟ヲ帶ル者四則溫暖ナル者は是ナリ若シ夫レ
 冷汗ハ虛極必死ノ候ナリ五則頓發頓止セス連
 綿持續スル者六則汗ニ因テ病狀寛解スル者熱
 病ニ於テハ脉狀從テ鎮靖スル者は是レナリ所謂
 ル病ニ副証タル發汗ハ病初速ニ起リ淋々トノ
 多キニ過キ而ノ病ヒ毫モ寛解セサル者ヲ云フ

一則罷弊セル皮膚ニ向テ血液ヲ輸送スルナリ甚

夕強キニ由ル或ハ衣食毛褥閉戸等ニ因テ身體

之ア保護溫暖ニ過ルヨリ來ルナリ二則腸胃汚物三則全身ノ大虛或ハ腐敗ニ

傾ニトスル候ナリ凡テ此ノ如キ汗ハ粟疹若ク

ハ紫斑ノ續發スルヲ常トス汗酸臭ヲ帶ルハ乃

チ粟疹ノ前鋒ナリ惡臭ヲ夾ムハ腐敗熱朝汗ハ

癆瘵熱淋漓トメ止マサルハ衰弱ノ候ナリ

○小便 小便ハ診家最要ノ標的以テ血液ノ調

和活體舍密力ノ景況ヲ徵知スヘシ何者諸分泌

機中血行ニ關係スルナリ小便ヨリ親キハナキ故

ナリ乃チ溺中。所喫ノ飲食及ヒ乳糜ヲ混スルカ
如キ其血行ニ關涉スルヲ親密ナル所以ナリ故
ニ小便ハ醫家ノ一大經心ヲ要スル者ニメ古人
モ留意セル處トス而ルニ方今ノ醫輩斯ニ怠ル
一何ソ其レ甚キ。凡ソ病的ノ溺狀ヲ看別セシニ
ハ必ス先ツ健全無恙ノ溺狀ヲ知ルヘシ。夫レ平
全ノ小便ハ藁色ニメ敗臭ナラサル一異臭氣ヲ
具ヘ其質透亮ナリ然レモ次ニ開載スル者ハ能
ク溺質變換ヲ致ス者トス故ニ醫家斯ニ留意セ
サルヲ得ス。一則強弱乃チ強壯ノ人ハ溺色黯赤

ニメ臭氣高シ。虛弱家ハ色灰白ニメ泡沫ヲ帶ヒ
澱渣少シ。二則氣候乃チ夏ハ溺量少ク色黯赤。冬
ハ量多ク色灰白ナリ。三則産業。運轉動作ヲ事ト
スル者ハ溺量少ク色黯赤。座業ノ者ハ量多ク色
灰白ナリ。四則男女。婦人ハ灰色ニメ沈渣多シ而
メ男子ハ然ラス。五則飲食及ヒ消化。乃チ引飲多
ケレハ溺量多ク且ツ灰白。大黃。鬱金ハ濃黄ナラ
シメ。亞斯百兒矢斯譯未ハ臭氣ヲ増ス又化穀ノ間
ハ乳糜。溺中ニ混メ。溷濁ナリ。故ニ食後十四小時
ヲ經テ漏ス所ノ溺ハ稀澄ニメ證スルニ足ラサ

レ凡六小時ノ後チ漏ス溺ハ粘濁ニメ之ヲ證ス
ルニ足ル次ニ病的小便ヲ檢査センニハ洩後冷
屢ニ靜定スル一ニ小時ヨリ短カルヘカラス又
切ニ寒暖暴卒ノ變換ヲ禁ス以下疾病ノ小便ニ
就テ徵知スル所ノ諸狀ヲ開載ス

○其一。體中ノ固形質。液質及ヒ含蜜力ノ景況特
ニ炊衝ノ有無ヲ候フ。夫レ溺色。赤クメ脈。數十ル
ハ熱ノ確徵ニメ内熱及ヒ炊衝ヲ證ス。加之病ヒ
ノ本性炊衝ニ屬スルカ將タ痙攣ニ屬スルカ髣
髴判然タラサル者亦タ能ク溺狀ニ由テ之ヲ辨

了ス。又溺狀溷濁稠厚ニメ塗渣ヲ帶ヒ且ツ血ヲ
混スルカ如キハ血液腐敗ニ傾ク候。故ニ稠厚且
ツ黑色ヲ帶ルハ腐敗ノ極度若クハ炊衝轉メ壞
疽ニ陷ル候ナリ。溺面ニ油點ヲ浮タルハ癆瘵病
ノ溶渙。極ニ届ル候ナリ兼テ又溺狀ニ由テ血中
ニ混スル異質ヲ知ル。夫レ溺色撒布蘭黃ヲ做ス
ハ膽液ヲ混スル者ニメ膽石ノ徵ナリ。白布白紙
ヲ溺中ニ浸メ黃色ニ染ルハ黄疸ノ徵。綠色ノ溺
ハ膽液腐敗或ハ内部ノ腫瘍。膿潰ニ至ル候ナリ
○其二。體内自然良能ノ病毒排除機ヲ候フ。夫レ

小便ハ熱病ニ在テ診家至要ノ標的ナリ。熱病經
 過ノ間ニ三等ノ時限アリ曰ク初發。此期ニ於テ
 ハ未夕曾テ分利ノ機轉。現レス。曰ク半成。此期ハ
 分利ノ營為。將ニ始ラントスル勢ト溺中ニ見ル。
 曰ク成熟。此期ハ分利ノ機轉全ク成リ病毒排除
 ノ候。溺中ニ顯然タリ其レ此三期ハ熱毒分利ノ
 小便ニ三等ヲ分ツ基本ナリ蓋シ溺色ノ赤白ヲ
 論セズ唯其質。清朗透徹ニメ終始變セザル者或
 ハ病初ヨリ溷濁濃厚ニメ膠水若クハ幾那煎冷
 液ノ如キ狀ヲ帶ヒ而メ終始變セザル者
神經熱 腸胃熱

ニ於テ屢
 視ル處 俱ニ初發期ノ小便ナリ又從前清澄ナ
 リシ者稍々始テ溷濁或ハ微翳ヲ生ス此狀時ト
 メ病ノ第四日第十一日ニ始テ起リ更ニ復々消
 除スルナリ然レモ皆十半成期ノ小便ニメ第
 七日第十四日ニ至リ應ニ分利ノ小便必来ヲ跋
 望スヘシ。或ハ小便尚ヲ透亮ナレモ薄翳ノ上面
 ニ浮ヒ或ハ器底ニ沈シ以テ分利ノ起端即十半
 成期ヲ徵スルアリ中ニ就テ初メ上面ニ浮ヒ漸
 次ニ沈底スル者ハ正ク將來ノ分利完成ヲ期ス
 ルニ足ル倘シ之ニ反メ終始上面ニ浮泳スル者

ハ須ク恐ルヘシ後日ノ分利全カラサルヲ又
之ヲ洩スノ初メ清澄ナル小便更ニ塗渣ヲ結ヒ
或ハ洩スノ始メ濃厚溷濁ナルモ漸次ニ上ヨリ
清澄シ塗渣器底ニ現ル者俱ニ完成分利来至
ノ徴ナリ然レモ此塗渣分利ナリテ分利ナラ
サルアリ之ヲ看別スル亦々診家ノ要幹ナリ夫
レ洩後速ニ塗渣ヲ結ヒ而メ其量多カラス又少
カラズ大抵全溺ノ四分一若クハ六分一ニ居リ
白色或ハ灰白其質輕淡同形ニメ連合メ分裂セ
ス而メ面上少ク隆起スル者ハ必ス分利ノ塗渣

ナリ倘シ之ニ反メ塗渣過多全溺ノ半若クハ三
分ノ二ニ居リ其質濃重ニメ分裂シ色相醜惡ナ
ルハ全ク分利ノ塗渣ニ非ス却テ惡徴ナリ倘シ
塗渣赤色ニメ他色ヲ襍ヘサルハ間歇熱若クハ
僕麻質斯ナリ稠厚溷濁ノ溺中塗渣アリテ白ク
猶ヲ白至土ノ如キハ痛風若クハ石淋ノ候塗渣
黯黒ナルハ腐敗ノ徴ナリ

○其三病ヒ神經性或ハ痙攣性ニ屬スルヲ知
ル夫レ小便透亮水ノ如ク而メ頻數ヲ兼ルハ痙
攣ナリ倘シ小便溷濁灰白ナルハ神經性ナリ熱

病ニ於テ溺狀屢變化スルハ神經熱ノ確證ナリ
○其四。消化機ノ景況ヲ推知ス。夫レ小便濃厚ナ
ルハ腸胃汚物ノ主徵。小兒乳様ノ溺ヲ洩スハ蛔
蟲ノ候ナリ

○其五。他部ノ液分泌ノ増減ヲ候フ。蓋シ發
汗。下利。下劑ハ皆ナ小便ヲ黯色ナラシム。蒸發氣
ノ閉塞ハ小便ヲ水ノ如クシ且ツ其量ヲ増シ甚
キニ到テハ尿管ニ陷ラシム

○其六。腎若クハ膀胱ノ局處病ヲ知ル。乃チ溺質
粘稠ナルハ膀胱感冒。膀胱結石ニ由ル。膿狀ナル

ハ膀胱若クハ攝護腺ノ膿潰ナリ血様ナルハ腎
若クハ膀胱ノ出血ナリ量多ク且ツ水ノ如キハ
尿管ナリ

又舍蜜術ノ検査ヲ做ス。往々之レアリ。藍紙ヲ
溺中ニ浸シ試ムルカ如キハ常用ノ通伎ニメ酸
氣ノ多寡ヲ徵ス

酸氣多キ片藍紙赤色トナル

検査スル。蜜尿病看識ニ頗ル緊要タリ何者此
病ハ他ニ診定スヘキ道ナク漸次ニ枯瘦メ斃ル
、ニ至レハナリ故ニ諸瘦削病ニ遇ヒ其根由。證
シ難キ片ハ溺中糖質ノ吟味ヲ怠ル。勿レ

又利溺ノ情狀ヲ知ル。大便ニ於ル如ク診家重
 切ノ事幹ナリ。蓋シ利溺ニ臨ニ疼痛。寒澀。壅塞ヲ
 兼ルハ痙攣。炊衝若クハ局處病ニ由ル。倘シ熱病
 既ニ衰弱危殆ノ極ニ届リ小便失禁ヲ兼ルハ正
 ク麻痺ノ候。然レ凡夫ノ大便ト同ク患者記セス
 誤テ斯ニ追フ者ハ此ト異ナリ混亂スル。勿レ
 ○津唾及ヒ吐痰。津唾分泌ノ増益。三アリ一則
 唾腺自家ノ刺戟乃チ咽喉炊衝ノ類ナリ。二則腹
 部ノ交感乃チ胃中汚物。蛔蟲其他腹部内臟特ニ
 臍府ノ壅塞ニ於テ最モ昭著ナリ。故ニ頻リニ唾



スルハ依剝昆的兒ノ一徵タリ。三則血液唾腺及
 ヒ上部ニ逼迫スルニ由ル。乃チ卒中素因ヲ具ル
 者或蒸發氣抑遏ヲ兼ル諸病。遷延神經熱及ヒ痘
 瘡ニ於ル涎唾皆十之ニ屬ス。蓋シ津唾虧乏ハ痙
 攣或ハ血質大乾燥ノ徵ナリ。吐痰。咽喉ヲ絞縮シ
 或ハ咳嗽ヲ咯出スル都テ之ヲ痰ト曰フ。一則項
 頸。氣管。肺臟ノ粘液膜。分泌亢盛ニ由ル。二則此諸
 器内ニ膿汁。血液。結核。結石等ノ如キ異物ヲ生ス
 ルニ由ル。蓋シ咯痰。多量ニメ荏苒彌久スルハ粘
 液癆ナリ。甘ク且ツ鹹味ノ敗膿ヲ咯出スルハ肺

瘍ナリ。灰白ニメ微々黒色ヲ帯ルハ結核癆ナリ
黄色ニメ苦味ヲ帯ルハ膽液血中ニ混スル候乃
干肝疾ナリ。凡ソ咯痰ハ肺焮衝ノ全治ニ緊要必
須ノ分利ナリ持ニ痰粘膠ニメ黄色ヲ帯ヒ罕ニ
小血線ヲ交ヘ而メ咯出シ易キハ正ク分利ノ痰
ナリ。診家唾血ト咳血ヲ混同スルト勿レ唾血ハ
唯々口内或ハ喉頭或ハ氣官上部ヨリ出ル血ニ
メ決メ肺臟ニ關ラス

○出血 出血ノ因多端或ハ真ノ多血ニ由リ或
ハ血質ノ沸騰澎脹ニ由リ。或ハ局處ノ積血又ハ

焮衝ニ由リ或ハ一部罷弊メ血液逼迫ヲ防遮ス
ル力ナキニ由リ。或ハ血質ノ溶渙腐敗性ノ疾病
ニ由ル又罕ニ分利ノ出血アリ急性熱ニ在テ最
モ然リ故ニ焮衝熱。腦ノ蓄血。焮衝等ニ於ル衄血
ハ分利ノ妙機ニ出ルト往々之アリ

第六精神及ヒ神經ニ關ル諸感動ヲ開列ス

○譫語 譫語ハ腦ノ疾患ニメ其所由頗ル多シ
故ニ亦徴示スル所少カラス然レモ天稟譫語シ
易ク。感冒ノ微熱ニモ睡中譫語シ。加之健全無恙
ノ日。輒モスレハ睡裡夢語スル人アリ故ニ譫語

ノ因由ヲ洞察セシニハ互ク先ツ患者ノ平素ヲ
問查スヘシ蓋シ病的謔語ハ腦機轉ノ失常ニメ
其因ヲ二般ニ別ツ一則刺戟此証ハ實性ニメ生
力奮揚シ狂躁ヲ兼ス斯ニ又自家ノ刺戟ト交感
刺戟ノ差ヒアリ其自家ノ刺戟ニ由ル者ハ或ハ
血液劇ク腦ニ上騰スル候ニメ熱病ニ在テハ炊
衝ノ極或ハ腦炊衝トス。或ハ病毒轉移又ハ痘瘡
等ノ如キ發疹刺戟ニ由ル其交感刺戟ノ者ハ膽
液鬱滯。蛔蟲等ノ如キ腸胃汚物。麻痺劑ノ中毒是
ナリ二則腦髓衰弱此証ハ謔語沈靜ニメ喃々獨

語シ而メ精神ノ恍惚及ヒ他ノ虚候ヲ兼ス乃チ
神經熱。惡性疫。及ヒ腦炊衝若クハ腦脈破綻メ其
組織間ニ血液又ハ水液瀦溜シ腦髓ヲ壓迫スル
者等是ナリ又此二因ヨリ遷延謔語ヲ起スアリ
若夫依剥昆垤兒。斐斯的里家ニ於ル謔語ハ敢テ
顧慮スルニ足ラス唯々其病ノ一証ノミ蓋シ醫
家。謔語ト狂妄ヲ混同スルト勿レ狂妄ハ謔語持
續メ止マス且ツ他患ヲ夾マス獨發スル者ヲ曰
フ

○睡寐 凡ソ睡寐。安靜ニメ常狀ニ違ハス且ツ

長キニ過サル者ハ百病ノ一良候。病毒分利ヲ誘起シ且ツ完成スルニ最モ輔益アリ。小兒熱性ノ病ヲ得レハ睡眠。平日ヨリ多キヲ常トス。輕意ニ之ヲ認テ腦患ト做スト勿レ况ヤ熱性ノ病ニ嬰ルキハ夫ノ獸畜ノ如ク唯々長睡甘眠スルニ因テ全復スル人アルヲヤ抑又病的睡眠アリ。睡中謔語。搐掣。驚起ヲ兼ル者。或ハ酣睡連綿持續スル者是ナリ中ニ就テ僅微ノ聲響ヲ聞クモ忽チ醒メ復タ忽チ眠ル者之ヲ間醒昏睡ト名ケ。終始全ク醒覺セサル者之ヲ不醒昏睡ト名ク凡ソ此病

的睡眠ハ腦髓大患ヲ得ル候。故ニ惡性疫。腦燉衝ノ徴トス。倘シ熱ノ初起直ニ此証ヲ兼ルハ最惡徴トス。

○不寐。不寐ハ嗜眠ニ比スレハ危殆少シ然レハ熱病此証ヲ兼ルハ神經系統ノ刺戟連綿スル候ナリ。

○厥暈。厥暈ハ全身多血若クハ腦一部ノ鬱血若クハ神經感動ナリ腸胃ノ交感ニ由ルテ亦タ多シ是レ汚物上湧ノ確證タリ。高年ノ徒及ヒ卒中質ノ人ニ在テハ留意スヘキ一証即チ卒中ノ

前鋒十リ

○視瞻 眼ハ全體ノ内情特ニ腦ノ景况ヲ候フ
 ヘキ要地ニメ診家ノ大經心ヲ要スル處十リ。蓋
 シ生癖^{カレツキ}十ラサ^ル斜視ハ常ニ眼神經ノ痙攣十リ
 裡ニ就テ二般ニ別ツ。一則腦髓自家ノ疾病乃チ
 小兒ノ急性腦水ノ初起ニ於ル如シ。二則腸胃刺
 戟ノ交感乃チ胃中汚物特ニ蛔蟲是十リ直視ノ
 一點ニ著目スルハ譫語ノ兆視力頓爾ニ罷弊ス
 ルハ生力ノ虚衰或ハ汚物上湧ノ吐セントスル
 候瞳孔開豁ハ腦髓壓迫ニ由ル故ニ腦炆衝。腦水

ノ主徴十リ。或ハ腸胃刺戟特ニ蛔蟲ノ候。或ハ腹
 臟壅塞或ハ黒内障ニ由ル。瞳孔縮小及ヒ光暉ニ
 對メ覺機敏捷ナルハ俱ニ知覺亢盛ニ由ル。之ニ
 反メ光暉ヲ喜ブハ大虚衰ノ候ニメ熱病ニ在テ
 危篤ノ一証タリ。眼前黒斑ノ漂漾スル狀ヲ覺ル
 者及ヒ失明スル者ハ腦中血液ノ鬱積。或ハ腸胃
 汚物ノ上湧。或ハ生力虚衰。或ハ將ニ昏懵セ^レト
 スル候十リ。重視半視ハ俱ニ痙攣ニメ腹部ノ刺
 戟ニ由ル。多シ又唯々依剝昆的兒ノ副証タル
 一往々之^レアリ。眼球脹滿赤色ニメ光彩アルハ

血液劇々頭上ニ逼迫スル候眼球陷没ハ衰弱ノ候ナリ

○聽官 耳ノ熱病ニ在テ過敏ナルハ神經系統ノ覺機亢盛シ。或ハ腦炊衝ニ嬰ル候ナリ都テ熱病ニ在テハ聽機ノ敏銳ニ過ルヨリ寧口遲鈍ナルヲ良トス耳鳴ハ血液若クハ感冒性ノ沕乙液耳邊ニ聚積スルニ由ル聽機ノ遲鈍及ヒ耳聾ハ熱病ニ於テ良徵トス神經熱ハ特ニ然リ

○嗅官 鼻。嗅氣ヲ失フハ感冒若クハ神經ノ劇キ苦患ニ由ル敗臭ヲ覺ルハ鼻中若クハ上顎ノ

潰瘍或ハ血液瘡敗ニ傾ク候羽毛ヲ燒クカ如キ異臭ヲ嗅クハ痙攣性ノ神經所患ナリ

○味官 飲食味ヒナキハ鼻。香臭ヲ聞サレト同因ナルアリ或ハ粘液ニ由ルアリ又異常ノ味ヲ覺レハ一則口内或ハ咽喉或ハ肺ノ疾患ニノ乃チ肺瘍ノ患者汚敗鹹味ヲ覺ル如シ。二則胃中汚物乃チ苦味ナルハ膽液。粘膠ナルハ粘液。酸キハ酸液胃中ニ鬱滯スルナリ。三則神經ノ疾患乃チ上ノ二因ナク斐斯的里家ニ於ル如シ或ハ妊婦ニ於テ罕ニ之ヲ視ル四則熱病ニ於テ此証ヲ兼

ルハ血液腐敗ニ傾ク候ナリ

○皮膚ノ知覺 皮膚寒熱交代シ或ハ瘡疹ナク
メ癢痒ヲ覺ルハ熱病ニ於テハ將發皮疹或ハ分
利ノ發汗將ニ来ラントスル候其熱病ナラザル
ハ液ノ酷厲ニ由ル皮膚一部ノ麻痺ハ血液留滯
神經患及痙攣ニ由ル罕ニ潜伏通風毒ニ由ル
アリ蓋シ患者自ラ覺ル寒暄ト天氣自然ノ寒暄
ヲ商榷スヘシ何者天氣未タ始ヨリ變換セスト
雖患者皮膚覺機ノ失常ヨリ寒暄ノ變更ヲ覺ル
テレハナリ凡ソ皮膚寒慄ヲ覺ルハ痙攣ニ由

ル然レモ劇易ノ度ニ准メ區分スレハ惡風惡寒
鬪齒僵直ノ差アリ又熱初起ノ惡寒ト其經過間
ノ惡寒ヲ看別スヘシ都テ諸熱其初メ惡寒セ升
ルハナシ故ニ惡寒ニ由テ熱ノ初ヲ證ス初起ノ
惡寒愈々劇ケレハ熱亦愈々強シ故ニ惡寒劇キ
ハ大抵焮衝熱トス或ハ間歇熱ノ初起タリ惡寒
輕微ニメ熱ト番替シ来ルハ感冒儂麻質斯若ク
ハ神經熱ナリ凡ソ急性熱ハ其初メ一次惡寒シ
間歇熱ハ每發作前ニ惡寒スルヲ常トス故ニ急
性熱經過ノ間ニ發スル惡寒ハ豎家常ニ注目ヲ

要スル處ニメ一則間歇熱ト急性熱合併スル候。
 二則局部焮衝萌發ノ候。倘シ既ニ焮衝ニ嬰ル者
 ハ膿潰故ニ肺焮衝ニ在或ハ脫疽ニ轉スル徵十
 リ。三則病毒轉徙。四則皮膚分利排洩ノ前鋒タル
 一罕ニ之アリ。間歇熱ノ惡寒輕微ニメ發熱強劇
 ナルハ將ニ急性熱ニ轉セントスル候。惡寒強ク
 且ツ長ク而メ發熱輕微ナルハ慢性熱ニ傾ク候
 ナリ四肢厥冷ハ血行妨碍ヲ受ルニ由ル故ニ熱
 病ニ在テハ内部局發焮衝ノ候ナリ又痙攣或ハ
 生力罷弊ニ由ル一屢々之アリ

○肌熱 病的肌熱ノ因二種アリ血液運行ノ疾
 速。生力亢盛ト急性熱ノ血液及ヒ器體ノ溶渙即
 子魚生分析熱是レナリ腐敗熱鑿家宜ク之ヲ看
 別スヘシ。夫レ焮衝熱ノ肌熱ハ生力亢盛ニ原ク
 活熱。故ニ強甚ト雖手之ニ觸レテ嫌忌スヘキ所
 ナク久フメ掌温ト異ナラス且ツ脈ト進退ヲ同
 フス故ニ脈愈々強硬ニメカアレハ肌熱愈々劇
 シ腐敗熱ニ於ルヤ分析性溶渙ニ原ク死熱。故ニ
 之ニ觸レハ熱性劇ク燒カ如ク刺カ如ク甚夕嫌
 忌スヘク久フメ熱愈々増加シ放手ノ後モ尚少

察病錄 卷之十
間熱ノ掌裡ニ殘著スルヲ覺ユ且ツ脉ト向背為
ス故ニ肌熱愈々増盛スレハ脉愈々沈微是焮衝
熱ト腐敗熱ノ大ニ異ナル處ナリ身體一部ノ熱
或ハ外ヨリ診知スヘキアリ或ハ唯々患者之ヲ
覺ルアリ俱ニ其部ニ血液鬱積スルカ若クハ焮
衝ニ罹ル候ナリ胃部ニ熱ヲ覺ルハ其部ノ焮衝
ニノ常ニ潛心留意スヘキ証トス彼是游走スル
熱ハ神經ノ變態又月經絶止ノ婦人此証ヲ現ハ
スナリアリ食後掌中熱スルハ癆瘵ナリ倘シ健全
ニメ此証アルハ癆瘵ノ素質ヲ夾ム者トス

○疼痛 疼痛ハ局處ノ疾病ヲ命告スル良能ノ
詞ニメ焮衝或ハ痙攣ナリ故ニ醫家宜ク其何レ
ニ屬スルヤ決定セサルヘカラズ然レモ劇痛持
久スレハ其初メ痙攣ニ屬スルモ遂ニ血液鬱積
スルニ至ル體中疼痛ノ因アルモ患者之ヲ覺ヘ
サレハ不幸ノ一証タリ故ニ病毒轉移ノ候ナク
從前強劇ノ焮衝俄然消止スルハ脫疽ニ陥ル候
トス前頭壓痛ノ眩暈ヲ夾ムハ胃中汚物ニ由ル
後頭壓痛ハ血液鬱積ノ候偏頭痛若クハ頭中一
小部ノ疼ミハ依利昆的兒斐斯的里ニ由ル膠骨

痛ハ痔疾ナリ熱病ニ於テ胃部按メ疼ミアルハ
 常ニ經心スヘキ証ニ胸或ハ腹ノ焮衝ナリ其
 部ノ壓重緊滿ヲ兼ル者ハ特ニ然リ
 ○煩懣 煩懣ハ上腹神經ハ一異感覺ニ疼痛
 ニ比スレハ困苦一層ヲ倍加ス此証一則胃邊ニ
 血液大ニ鬱積スルニ由ル乃チ心。肺。胃。肝及ヒ自
 餘ノ腹臟焮衝或ハ心臟ノ器體病。腹内壅塞等ニ
 於ル如シ。二則有害刺戟性ノ汚物胃中ニ積滯ス
 ルニ由ル乃チ膽液。空氣ノ類是ナリ三則有形物
 肺ノ擴張ヲ妨ルニ由ル乃チ胸水。腹水ノ如シ四

則痙攣ナリ。斐斯的里ノ煩懣ノ如シ此証ハ増進
 ノ堪ヘ難キニ至ル

○筋運動 顫振ハ衰弱或ハ脉管ノ過盈一由ル
 乃チ多血若クハ神經系ノ過敏是ナリ。熱病初起
 ノ顫振ハ神經性ノ的證ナリ痙攣。搐掣ハ其因多
 端。一則神經刺戟乃チ汚物。蛔蟲等ノ腸胃刺戟。痘
 瘡。粟疹ノ發疹刺戟。惡性ノ傳染毒。神經腦髓脊髓
 ヲ侵ス所ノ異常物。及ヒ腱ノ創傷是ナリ。二則脈
 管ノ過盈乃チ頭腦若クハ脊髓ノ血液鬱積。三則
 生力費耗乃チ血液若クハ他液。脫泄後ノ痙攣ノ

最危篤ナルハ之^レカ為ナリ小兒及ヒ斐斯的里家
ハ瑣細ノ因モ痙攣ヲ起シ易シ然レ^レ此甚夕畏
ル、ニ足ラサル者トス^レ凡ソ痙攣。搐掣俱ニ因テ
腸胃ニ取ル^レ多シ今此一証ヲ區別スルニ痙攣
ハ筋纖維ノ牽縮。持長ノ弛緩セサル者ヲ云フ搐
掣ハ牽縮弛緩更代メ替留セサル者ヲ云フ故ニ
疆直ハ痙攣ノ極。癲癇ハ搐掣ノ最夕リ。蓋シ痙攣
搐掣ハ内外ヲ撰ハスメ護ス乃チ心悸。嘔吐。咳嗽。
疝痛。尿閉等ノ如キ許多ノ内患。其他覺機ノ變態
ニ由ル者。亦一般汎ク痙攣ト名ク

○吃逆 吃逆ハ横膈膜輕微ノ痙攣ニ由ル^レ分
明ナリ然レ^レ其因一ナラス殊ニ險易ノ別アリ。
通常胃ノ飽滿ニ由ル者及ヒ小兒ノ感冒ヨリ發
スル者俱ニ深ク意トスルニ足ラス然レ^レ熱病
ニ在テハ腹臟攸衝ノ候。特ニ神經熱ニ在テハ大
危險ノ候ナリ

○麻痺 麻痺ハ元ト運動ニ關ル器具。即チ筋纖
維ノ運轉或ハ虛衰シ或ハ全ク廢止スル者ノ謂
ナリ然レ^レ凡ク神經力。精神力ノ罷憊或ハ廢止
スル者亦通メ麻痺ト名ク乃チ之ヲ統括ノ一般

トス一則神經力。外障ニ因テ妨ラル、者。二則精
 神力虚衰ニ若クハ患害ヲ受ル者是ナリ甲者數
 ヲ勞思スルニ足サルヲアリト雖。乙者危險ノ証
 トス何者覺機ノ本源タル腦髓脊髓ノ疾患若ク
 ハ罷弊ニ原クヲ以テナリ乃チ卒中其證ナリ
 ○昏冒卒中 昏冒卒中俱ニ知覺運動ノ兩機及
 ヒ精神辨識力ノ衰弱或ハ全廢ヨリ来ル者ナリ
 然ラハ何ヲ以テ此ニ証ヲ別ツ曰ク昏冒ハ心臟
 脉管。職トメ妨碍ニ嬰ル故ニ劇易ノ度ニ從ヒ脈
 動。體温俱ニ多少衰微シ甚キニ至テハ全ク絶ル

トアリ。卒中ハ心臟脉管虚衰セス却テ増進スル
 間々之アリ。而メ卒中ハ麻痺ヲ遺シ昏冒ハ然
 ラス是レニ証ヲ看別スル標準タリ故ニ知ル昏
 冒ハ心臟運爲ノ衰憊或ハ瞬間絶止スル者ニメ
 卒中ハ腦髓神經力ノ虚憊或ハ全廢スル者ナル
 一ヲ但シ斐斯的里家、昏冒ハ全ク尋常ノ痙攣
 証ニノ深ク恐ル、ニ足ラス。然レハ熱病ノ初起
 ニ在テハ安カラサル一証ニノ其熱必ス神經性
 タル一ヲトスルニ足ル。又心臟病アル者昏冒ニ
 罹ルハ其病ヒ必ス心ノ器體ニ在ルナリ。又卒中

ハ常ニ最モ危険ニノ腦ノ實質ニ關ル者トス

第七容貌

夫レ容貌ハ現ニ惱ム所ノ疾病ノ徵候タルノニ
ナラス當ニ未發各病ノ素因ヲ推知フヘシ故ニ
次ノ數目ヲ辨說ス

○體格 胸膈廣濶ニノ高ク。四肢體幹ノ對峙宜
キヲ得ル者ハ多力強壯ニノ長ク健康ヲ保ツノ
候身體瘦長且ツ速ニ筭長セル者ハ大抵虛弱之
ニ兼ルニ長頸平胸且ツ翼狀肩ノ者ハ癆瘵質ニ
リ之ニ反メ軀體短豐ナル者ハ強壯質之ニ兼ル

ニ短頸ナル者ハ卒中質ナリ四肢軀幹ノ長短宜
キニ適セサル者ハ血液循環妨碍ヲ受ケ血液鬱
積ニ嬰リ易シ乃チ脚足短キ者。脊梁佝僂スル者
是ナリ奉養ノ虧乏。神志ノ勞動。熱病等ノ所爲ニ
非スメ身體羸瘦スル者ハ或ハ腹内諸臟特ニ消
化器ノ妨碍或ハ出血。多房。蜜尿等ノ如キ病的ノ
脫液ニ由ル肥胖甚キ者ハ大抵肝疾ナリ凡ソ慢
性諸病ハ腹部ノ検査ヲ忽ニスルヲ勿レ倘シ腹
部ノ一處膨脹シ或ハ硬結スルヲ認得セハ則チ
内臟ノ膨脹壅塞。其他内臟器體ノ疾患ヲ徵スヘ

之然レ在診家燥屎ノ結腸ニ滯積スルヲ誤認メ
此証ト做スト勿レ燥屎ハ久ク一處ニ定留セス
又之ヲ按セハ動キ去ルテアリ

○色澤 色青白ナルハ第一道ノ汚物特ニ酸敗
蛔蟲或ハ血液虧耗血質稀淡血行遲慢或ハ虛衰
ノ候ナリ純白ナルハ萎黃病赤色ハ多血若クハ
逆上ナリ頬色臙脂ヲ裝フカ如クハ癆瘵質青黃
ハ腹臙病黃色ハ肝疾黃疸青色ハ蒼身病ナリ青
斑ヲ發スルハ失苟爾陪苦或ハ血液溶渙ナリ高
年ノ徒ニ在テハ血行靜息ノ候故ニ卒中ヲ怖ル

ヘシ色相俄然ニ變換スル者ハ全體ノ變况ト等
ク大危篤ノ候ナリ

○卧狀 患者ノ卧狀愈々平穩ナレハ愈々佳候
卧ノ轉側シ能サルハ麻痺若クハ大虛衰ノ候煩
躁ノ息サルハ一則内部ノ煩悶或ハ疼痛ナリ二
則血中ノ刺戟乃チ發疹毒ノ如シ三則腸胃積滯
ニ因ル四則分利期ニ方テ之ヲ發スルハ分利ノ
候ナリ左右側卧妨ケナク且ツ能ク仰卧スル者
ハ胸腹俱ニ潛伏ノ内臙病ナキ徵トス兼テ頭首
ヲ後ニ弓反シ而ノ呼吸妨ケナキハ殊ニ胸患ナ

察病龜鑑卷之下
キ候トス。左右ノ一徧。側卧シ得サル者ハ大抵相
ト反スル一徧ニ内臓病アルニ由ル。脚ヲ腹内ニ
屈曲スルハ腹痛ノ候。頻リニ衣服ヲ去ント欲シ
或ハ一モ衣食ヲ腹上ニ措キ肯セサルハ譫妄及
ヒ大煩悶ノ候。而ノ褥外ニ出テ去ントスル状ヲ
兼ルハ益々惡徵ナリ。足端ニ向テ俯屈スルハ罷
弊ノ極。撮空。摸床ハ最大危極。設令七萬死ニ一生
ヲ得ル。一アルモ大率瀕死ノ兆ナリ。

附言

舍蜜術ヲ用テ漏泄物ヲ點檢シ。以テ體内疾病ノ

眞狀及ヒ舍蜜機ノ景況ヲ精究スル。一アリ乃チ
小便ヲ分析シ。檢査スルノ類ナリ。又體中越素ノ
来去増減ヲ鑑定スル法アリ。又聽音器ヲ用テ胸
鳴ヲ候フ術アリ。但シ聽音器ヲ用テ胸裡有形ノ
物狀ハ得テ知ルヘシト雖無形ノ景況ヲ知ル
難シ故ニ只々人身究理ニ益アリテ治療ニ益少
シトス。

扶氏察病龜鑑卷之下 畢

三卷一冊
小字
茂

》