



和蘭醫方彙要

一

ヤ 4
1433
1



喝茶皆宜要序

夫山石病不致死大率胃寒居多
 法守寒者何因全与淡之稠今
 以之与淡稠善以之而喉亦氣化
 而之為淡生者一男固法不息為
 府心強物不色穢逆此水教淡者
 之与淡動氣有稀稠乃稠以之通
 以是山留滯留滯另守寒守寒心

。序



或粘或膏或膏或酸粘以凝結者
乃凝凝者乃多熱痛酸則多寒
急稀之他病字之他病宜之濃稀
稠宜宜則口病此病起矣當之之
以百病必之六病實字未講也乃汲
之為時如寒業從未之也乃汲之
而之氣也知子人之業揚之若走于
河可也浮流生技將先可為後濟字

象象投湯不之出予得言也持可
與不揮滋粘持高而之在書本以
應交化理能學其味與書為象
象不粘執鼓錘滋治得書為可
象尔不粘托病治与可直与可生
病可麻其其以元弘能必書為持之
之既持在可之可持利以弘之也
者此下病之要但在其法濃稀稠

之并一才以拖治應必勿失方而後以
是

文化十三年丙子秋九月

吳澂 江子之志



和蘭醫方纂要序

將欲善戰。先料其敵情。之不料。而能
制勝者。未之有也。醫欲善治。先詳
其證因。證之不詳。而能至治者。未之有
也。詳證之法。有寒熱。有虛實。有閑
閑。有寒中之熱。有熱中之寒。虛實

閑閑之中。亦復如之。詳見於初。治乃
可言也。兵家有言。百聞不如一見。漢
人之論治。際皆貴身賤自者耳。至如
和蘭。則不然。其見的確。其說精詳。不
好偽飾。不有浮談。皆據實物而為
言。以明微而為論。自非建諸天地。

質諸鬼神。則不敢筆之書。不敢傳之
人。是世之所普知。固不俟予辯焉。吾
邦昇平日久。衆技日精。昌蘭此學者
繼起。譯本上梓。非不多矣。讀其書。
攷其方。欲驗之事實。則有論而無
方者。有方而無論者。即有論有方。

而方中物品有所不齊來者有製法
不審者於是乎。或者依論於和蘭取
方於漢土。亦出於不得已。故至其對
患人也。雖見其證而不能適其治。
誤復失機。法之取敗是在他。望論
方不並備皆尔。譬之是猶善料敵。

而不能鍊兵。其何以戰哉。予居
恒深慨歎之。輯所茲諸書之方。
採其物品製法。全備可供用者。分
門舉類。諸證說約。曰和蘭醫方
纂要。因學之士。搜論於彼。以詳
其證。求方於是。以處其治。庶幾和

彼知我。百戰不危。歟。文化十三年
丙子秋九月江馬元弘撰



凡例

- 一 斯書搜索所藏諸書。其方全備者。總為四卷。以類分之。各門之始。略載證候。次以看法。後列藥方。
- 一 藏書所引。為僕。先。東。迷。律。佛。剛。佛。浪。各。律。回。斯。篤。律。失。葛。篤。各。蔑。律。麻。篤。娣。斯。離。揭。律。失。吉。的。拔。揭。亞。亞。律。栗。斯。委。律。都。砒。崛。亞。陪。底。吉。拔。律。瞥。的。芬。透。面。篤。到。麻。斯。揭。送。突。失。葛。篤。別。律。媪。拔。等。蔑。姪。力。吉。亞。亞。律。突。揭。活。先。突。突。奴。斯。凡。二。十。種。
- 一 凡病門。做僕。先。之。目。例。至。彼。所。缺。漏。則。掄。括。衆。書。以。類。次。之。
- 一 方中多係製藥者。如其製法。詳載。附錄。

卷之二 凡例

一凡丸散白湯送下雖和蘭書中無之然欲令人便服用故姑
做漢土之例焉耳不用白湯亦無妨
一譯文中恐有難解者余不嫻乎文辭或不得無顛倒錯置之
失姑達其意而已觀者勿以文害意

和蘭醫方纂要卷之一

病門目次

癩 癩

煖媼布的烈璟屈

卒中風 附偏枯

失氣昏冒

健忘

狂

頭痛

解顛

頭腦諸病

頭面瘡

眼目

耳

鼻

口舌齒

鴛口瘡



和蘭醫方纂要卷之一

美濃

大垣

春齡庵江馬元弘

譯

癩癩

夫癩癩之為病也卒倒昏迷不省人事掉頭閉眼直視上竅口
目瞶引咬牙軀軟殆如死人或手足躁擾口吐涎沫叫吼不已
或四肢厥冷十指鈎曲大小便自利或洩精又有婦人發於子
宮者是因子宮生粘液風氣及辛峻液或經閉姪娠而子宮衝
逆夾發癩癩也

癩癩大率自新月至滿月多易發

歷二十五歲之後發癩癩者可知終身不能斷根矣
飲食飽滿則易發癩癩

患間日癩而發癩癩者大率死候也又癩癩發間日癩者不日
可治之兆也

頭眩暈掉或夜間眼視多色者癩癩或頭病之候也

患癩毒石淋虻蟲之人多易發癩癩

孕婦發癩癩則多致墮胎加之發險證遂至危急

處女發癩癩者求嫁則復故

小兒頭瘡為早瘡者必發癩癩

小兒嘔乳驚愕啼叫不止或大便秘結者多發癩癩

小便綠色見青冠綠者癩癩或頭病之候也

小便白色見鉛色冠綠者癩癩或頭眩之候也

冠綠狀詳見于家父所著五液診法

治癩癩卒倒昏迷直視上竅

珍珠 六分六厘 辰砂 珊瑚 各一錢五分

沃君栗曠吉栗 四錢

右搗篩為散白湯送下

又方

芍藥根 十錢 琥珀 麒麟竭 各五錢

辰砂 二錢

右搗篩為散白湯送下

又方

煇硝

鹿角屑 各五錢

辰砂 二錢

右為散每服一錢白湯送下

治癩癩瘡搗頭眩昏目

煇硝錠 四錢

牡蠣 二錢

龍腦 一錢

右為散白湯送下

又方

石礮 二錢

芍藥根 一錢五分

辰砂 一錢

右為散和人乳汁白湯送下日五六次

又方

山慈姑

蚯蚓 各四錢

敗醬根 二錢

右為散以芸香菩提樹花露水飲下

又方

辰砂

洎夫藍 各一錢

珊瑚

珍珠

各五分

右為散白湯點服

又方

山歸來 十錢

敗醬根 五錢

右為散白湯送下

又方

芍藥根

孔雀屎 各八錢

右搗羅為散白湯送下

又方

芍藥根并花葉作舍利別白湯嚥下

又方

取綠蝦蟇肝洗淨陰乾為散白湯送下

治癩癩發狂熱頭眩暈掉

阿片 五分

龍腦 三分

淨夫藍 二分

右為散溫酒點服

又方

三七草根 十六錢

鹿角屑 八錢

枸櫞皮 四錢

右三味以水二百六十四錢煎去滓加阿片二分三厘焰硝

錠二錢攪勻飲服

又方

枸櫞皮細剉三十錢水二百二十四錢煎至百六十錢

布漉去滓以鹿角精十五滴和勻飲下

治癩癩發作有時久不交睫就寢則多夢驚愕頭痛眩暈

阿片

焰硝錠 各二錢

龍腦 五分

葡萄酒

五十二錢若無則以燒酒代之

右調和飲下

治癩癩便秘

辰砂

大黃 各三錢

右搗篩為散糊丸每服十九丸冷水送下

癩癩卒倒不省人事因稟賦虛怯者此方主之

鐵粉 十六錢

丁香

肉豆蔻

良薑

各四錢

右為粗末入壺內以燒酒百六十四錢浸一宿濾過去滓飲服

癰瘤因汚液滿溢頭腦或神機經衰弱者此方主之

吉納吉納我邦無產代以柳木皮効用全同 鐵粉各十錢

右搗篩為散白湯送下

癰瘤兼脾藏閉塞者此方主之

芍藥根 四錢 鹿角屑 二錢 洎夫藍

辰砂 各五分

右為散白湯送下

又方

鹿角屑 五錢 辰砂 二錢

右為散以芍藥根煎汁飲下

癰瘤兼子宮病者此方主之

阿魏一味為粗末以燒酒浸置一宿布漉去滓飲下

癰瘤因癰腫浸淫瘡疥癬之毒內陷侵腦者發泡膏呼膿法又

甘索筆栗麝篤劑主之發泡膏呼膿法見附錄

治癰癩卒倒外用方

龍腦 一錢 阿片 七分 燒酒 二十四錢

右攪勻塗顛顛

又方

焰硝錠 八錢 龍腦 二錢 燒酒 三十二錢

右攪和浸布敷首頸顛顛顛門

又方

薔薇花露水 九十六錢

鉛白砂 一錢

右攪和浸布敷額門顯顯

煖媻布的烈璟屈

煖媻布的烈璟屈也者謂搐搦掣引也其所因酸收液帶辛峻
 味而流注諸部之神機經及細絡支別是以失常度為攣縮為
 弛縱甚則至諸骨筋根亦其機關失常度蓋有身體屈折于前
 面者有反張于後背者又有身直如椽牽引于前後者
 酷烈諸病發咬牙搐搦者可知至危急也
 諸病日夜不得睡者多發搐搦為惡候
 熱病呼吸短促者必發搐搦
 熱病發搐搦者惡兆也又搐搦掣引變成熱病者吉兆也
 漏泄諸證及疼痛不可忍者發搐搦掣引則可知至危急也
 諸失血口自矜引者惡候也

失血過多發搐搦者命在頃刻矣

胃中酷烈毒或子宮諸病或腐壞液諸病必發搐搦引

瘡腫其毒未盡為自瘡者易發搐搦

金創出血發咬牙搐搦者瀕死

小兒蚊蟲腹滿或胃生酸液或齒牙將芽出之時多發搐搦引

引

小兒大便不通過七日者多易發搐搦

小兒大便綠色者發搐搦引之兆也

勞力作強之人小便黑色者發搐搦引之兆也

熱病解散綠尿通利者發搐搦引之兆也

治搐搦引小兒驚搐



芸香 百合根并花 各百錢 水一升

右以蒸露罐取露水飲服

又方

芍藥根 菟菹菜 各三十錢

右作舍利別白湯飲下

又方

菩提樹花 百錢 水一升

右浸置以蒸露罐取露水飲服

又方

芍藥根 六錢 芸香 三錢

右水煎一二沸去滓和辰砂末一錢沃君栗曠吉栗末一錢

五分飲服

搗搦引因汚液酸液者此方主之

鹿角屑

琥珀

芍藥根 各八錢

辰砂 二錢

沃君栗曠吉栗 四錢

右搗篩為散白湯送下

又方

龍腦 為末一錢

鹿角精 二十滴

右和勻以芍藥根煎汁飲下

搗搦引因暴怒者此方主之

焰硝 八錢

辰砂 三錢

右為散冷水送下

搗搦引兼壯熱虬蟲者此方主之

吉納吉納 八錢

敗醬根

錫粉 各六錢

右搗羅為末白湯嚥下

搗搦引顏色赤其脈堅實者此方主之

芸香露滴油

琥珀油 各三分 三厘

肉豆蔻油 一錢

右和勻塗顯顯鼻下及唇吻手掌尤効

卒中風 附偏枯

卒中風之為病也忽然失知識活動之機昏睡不覺四肢厥冷其脈微弱無熱又偏枯者半身不遂口眼喎斜語言蹇澁精神錯亂筋攣掣痛其脈堅實大便多秘

卒中風有初重漸向輕者其證多變成偏枯又有初輕漸加重者其證大率不過十日而死

男子則痔血閉塞婦人則月水留滯者多易發卒中風

卒中風發熱吐出粘痰者良候也

卒中風壯年之人易治年高者難治

卒中風淹纏歷日則變成偏枯

歷四十五歲之後多發卒中風年高者愈劇

黑濁液過多之人手足多毛逆年高必發卒中風

寒粘液過多之人患癰疾則多發卒中風

飲食言語不異常但嗜眠者不日發卒中風之兆也

睡中愕然驚怖如人將捕之者發卒中風或偏枯之兆也

兩脚刺痛覺如鍼刺者發卒中風之兆也

卒中風呼吸安靜者良候也又施刺絡而後呼吸短促者死

卒中風諸證漸退雖畧似快爽然眼不得視者遂至不救也

卒中風腹內膨脹者挾發癰癩之候也

數月早燥或累日雨濕之時必發卒中風

卒中風口流涎沫者死候又呼吸促迫津々冷汗出者死在旦

夕矣

卒中風面色赤且浮絡為滿脹雖為軒睡不至熟其脈堅實者

可知其證因血之滿溢也

卒中風面色灰白昏睡不覺其脈微弱者可知其證因粘液過

多也

卒中風其脈初微小後洪大者命在旦夕矣

卒中風遺尿者死期不遠矣

漩面浮泡沫且近濁沈壺底見鉛色冠緣移動者不日發卒中

風之兆也

漩面見冠緣徐沈壺底者卒中風之候也

治卒中風暈倒不省人事

龍腦 為末一錢

鹿角精 二十滴

○卒中風 偏枯

右調和白湯點服

又方

白芥子 製如食用

薔薇花舍利別 各八錢

生姜公設律弗 自然汁亦可 四錢

右件調和白湯送下

又方

鹿角精 二十滴

泊夫藍 四錢 燒酒浸

右和勻飲下

治卒中風偏枯

芫蕪根 白芥子 各四錢

香橙皮 二錢

右水煎一二沸瀉過去滓飲服

治卒中風偏枯昏睡病

白芷根 良薑 各三錢

芸香 紫蘆葉 各半握

香橙皮 二錢 益智 肉桂 丁香 各一錢

燒酒 二百二十四錢

右件入硝子壺內密封浸置布漉去滓飲服

治卒中風偏枯癱瘓神機經病或子宮病遺精白帶下

琥珀 十六錢 石灰 八錢

右搗羅為散入硝子壺內投燒酒六十四錢固封浸置每時攪轉至赤色為度布漉和酒右鹽末四錢飲下每服自三十滴至五十滴 酒右塩若無則代以硝

卒中風牙關緊急不識人事者先以匕空開其口取食鹽令滿

白則鹽氣自滲透神機經而得醒也

治食後卒然暈倒不省人事

煙草 惣形八錢

右一味水煎去滓和砂糖四錢飲下令吐為佳

卒中風暈倒因汚液者此方主之

大黃 四錢

茴香 三錢

旋柰葉

二錢我邦無產
代品未詳

右水煎一二沸漉過和酒石鹽二錢飲下

卒中風偏枯癱瘓因寒粘液者此方主之

櫻草 惣形八錢

右剉水煎温服

治卒中風外用方

胡桃油 二十滴

丁香油

琥珀油 各十滴

右攪勻塗顛顛項窩脊推又貼發泡膏尤効

又方

杜松木油 十五滴

琥珀油 十滴

石腦油 七滴

右攪勻塗顛顛脊推

又方

篤耨香 四錢

石鹼 二錢

龍腦 為末一錢

右熔化如膏和殺律亞律沒牟亞失精二錢攤綿布貼顛顛

脊推又白湯送下亦可

又方

殺律亞律沒牟亞失 五分

石灰水 四錢

右和勻使藥氣透徹鼻孔

治卒倒牙關緊急水銃方

煙草 綠葉若乾葉八錢

水 九十六錢

右煎取六十四錢以水銃射直腸

又方

紫蘼葉

芸香葉 各半握

水煎漉過取六十四錢

石鹼 二錢

白蜜 十錢

膽八樹油 二十錢

食鹽 五錢

右攪勻以水銃射直腸

卒倒牙關緊急上竄直視者此方主之

將焰硝末鋪足心燒之尤效

治半身不遂麻痺

香橙公設律弗 四錢

薔薇花舍利別 十錢

肉桂露水 三十二錢

右件攪勻飲下

治半身不遂四肢抽掣且強頭腦

焯菜葉 六錢

生姜

良姜

肉桂

香橙皮 各四錢

沃君栗曠吉栗 二錢

右搗篩為散和白蜜慢火煮稀稠得所白湯送下

又方

杜松木 三十二錢

鐵粉 十六錢

良姜

石菖蒲根 各四錢

紫蘼葉

送迭香 各二握

益智 胡荽子 各三錢

右件入壺內投燒酒八百錢固封浸置去滓飲服

治半身不遂口眼喎斜

甘草 茴香 各八錢 香橙皮 四錢

芍藥根 十錢 肉豆蔻 二錢 胡椒 一錢

右為粗末燒酒浸置瀝過去滓飲服

治半身不遂手足無力口眼喎斜且癱瘓

大麥煎汁 二百三十二錢 燒酒 肉桂露水 各百錢

薔薇花露水 六十四錢

右攪勻再以蒸露罐取露水和砂糖少許飲下

治半身不遂四肢顫動頭痛眩暈

芍藥根 孔雀屎 各六錢 鹿角屑 三錢

右為散白湯送下

治偏枯癱瘓失氣昏冒

枸櫞皮 八錢 良姜 芸香 白芷 各三錢

右剉燒酒二百錢浸一宿以蒸露罐取露水和龍腦末二錢

飲服

治半身不遂去腦中汚液

石菖蒲根 荷蒿根 良姜 益智 各四錢

石長生 三錢

右為散和白蜜入鍋內文火徐徐煮稀稠得所白湯飲下

治半身不遂麻木言語蹇澁

白木子杵搗十二錢入磁器內投滾湯三百錢糖灰上置引出藥氣布漉去滓飲下又加砂糖少許亦可

又方

苧蒿根細剉八錢以上好酒六十錢煎至二十四錢漉過飲服

偏枯頭痛眩暈因粘稠液黑濁液者此方主之

紅藍子 六錢

山慈姑 三錢

生姜

肉桂 各一錢五分

甘草 一錢

右水煎漉過和牽牛子末四錢飲服

麻痺半身不遂因寒粘液者此方主之

紫蘓花一味水煎溫服又加肉桂露水等分亦可

半身不遂因辛峻液及粘液閉塞者此方主之

芍藥根 十二錢

鹿角屑

鐵粉 各四錢

石榴皮

琥珀 各二錢

辰砂

珊瑚 各七分

右搗羅為散白湯送下

又方

牽牛子

鬼茉莉根 各二錢

焰硝 一錢

右為末白湯送下

又方

鬼茉莉根

噎福栗醋

琥珀 各四錢

蘆薈 二錢

藿香 一錢

右為末溫酒送下

半身不遂因酸收液及血熱者此方主之

沃君栗曠吉栗 四錢

蜈蚣 一錢

右為散白湯送下

半身不遂頭痛眩暈因頭腦虛弱及胃虛者此方主之

蘆薈 四錢

肉桂 三錢

耳松香

乳香 各二錢

右搗羅為散和砂糖蜜文火徐徐煮作舍利別白湯嚥下
偏枯昏睡病且臨產難分娩者此方主之

沒藥杵搗二十錢入硝子壺內投燒酒二百六十四錢固封
溫處置每時攪轉得所和焰硝末少許飲下

治半身不遂外用方

石腦油

月桂實油 各四錢

右攪和塗患部

又方

煙草 三十二錢

番枙 十六錢

龍腦

阿魏 各四錢

燒酒 三百錢

右納磁器內浸置引出藥氣布漉和殺律亞律沒牟亞失精
二錢塗患處日數回

又方

燒酒 百錢

阿魏 五十錢

良姜

石菖根 各三十錢

番枙 十六錢

篤縹香 八錢

右六味以蒸露罐取露水每時洗濕患部

又方

月桂實油每時塗患部

又方

杜松木油塗患部

又方

燒酒糟隨宜布包入鍋內蒸之乘溫慰蒸患處

又方

石鹼一味和燒酒塗患部又加杜松木油等分亦可

治四肢麻木疼痛歷節痛

蚯蚓精和燒酒每時塗之

又方

班猫十六錢

燒酒百二十四錢

右納壺內浸置石臼內杵爛摩擦患處覺刺痛為佳

又方

龍腦八錢

燒酒百錢

右納硝子壺固封每時攪轉龍腦化為度塗之

治半身不遂或頭痛歷節痛

白芥子製如食用

大蒜杵搗如泥各二錢

醋二十四錢人乳汁亦可

右和勻如膏貼足心

又方

白芥子製如食用

麥餅中心各二錢

右二味和醋貼足心發赤疹疼痛為佳

治半身不遂麻木痿弱浴藥方

月桂木皮

硫黃 各六錢

龍膽

土青木香 各三錢

右四味以石灰水數升煎每夕洗浴之

陰萎無勃起之力者肉桂露滴油或丁香油塗陰莖會陰尤効

失氣昏冒

失氣昏冒之為證也忽然暈倒不識人事面色灰白其脈微小手足厥冷冷汗淋漓殆如死人其因多端或因精力衰憊或因失血過多或因金創出血或因淫欲過度或愕然恐怖或為狐狸妖怪所驚或施刺絡截斷之術或自高墜下等大率易發此證又有婦人發於子宮病者

治失氣昏冒

鹿角精 十滴

龍腦 二分為末

右調和白湯點服

治眩暈旋轉失氣昏冒

胡荽子

良姜

葶菝

生薑 各二錢

迷迭香 一錢

右搗篩為散白湯送下

又方

蘆薈

牽牛子

鐵粉 各四錢

右為末糊丸白湯嚥下

又方

良姜為末白湯送下

治頭痛眩暈失氣

大麥煎汁 二十四錢

枸櫞自然汁

石榴自然汁 各十二錢

右攪和飲服

又方

石榴皮 十二錢

砂糖 六錢

右水煎一二沸濾過飲服

因中毒而失氣昏冒者黑泥灼的里亞加和人乳汁或牛酪白湯送下

因多汗而暈倒者宜灌冷水于面部次用揮發劑

因暴怒驚駭而暈倒者刺絡瀉血為要

因刺絡或服下劑而暈倒者肉桂露水或阿片劑尤效

因斷食而昏倒者使與酒又薰煙草尤良

凡失氣昏冒之證浴腳法為要 浴腳法見附錄

Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like 本、下、二、兩、等。

健忘

健忘者因腦後衰弱或因腦益損傷益有二證其一觸事易遺
忘其二以前所見聞之事今已忘之其三言語顛倒事理無序
殆似癡狀

老人衄血過多或色欲過度或勞心不寐等易發此證

諸病瘥後發健忘者易治

因腦益損傷發健忘者難治須施外術治之

治健忘

土青木香

葶菝

生姜

各四錢

龍膽

丁香 各二錢

右件搗篩為散和白糖白湯送下

又方

牽牛子 二分六厘

諳室瞋闇卜烈室霍 一分

丁子油 五滴

右和勻白湯點服

又方

乳香 五錢

胡枏 二錢

右為散白湯送下

又方

迷迭香 半握

生姜 二錢

龍腦 一錢

燒酒 百錢

右納壺內浸置布漉飲下

狂

狂者精神錯亂無熱飲食如故悲憂啼泣獨語眈人或沈思默々愛閑居暗室或忿怒怨恨欲走出戶外或破衣擲器猛力異常或大音暴響謠歌鼓舞或罵詈叫號不避親疎等證候百端不可舉數矣

凡發狂則其脈堅大與平常異

此證男子則多婦人則少婦人偶發此證則至險重

此證於春秋多易發於夏時三伏則必至險重

此證兼發間日癰者良候也

此證雖淹纏難治然不至死

漩面見綠泡珠者發狂之兆也

漩面見青冠緣者發狂之兆也

漩面見黑冠緣者腦素脆性黑胆汁滿溢之候也

漩面見鉛色冠緣者癩癩或發狂之候也

漩面見微雲浮漾者發狂之候必至危急

細砂浮漩面有光者痴歎之候也又其砂高浮漩面者愈向險

重之兆也

發狂頭痛不止者其尿狀恰如軛歎尿

發狂或怒或恐猛力異常大便祕結者此方主之

蘆薈 噎福栗醋 各八錢

右搗羅為散白湯送下

又方

訶子 大黃 各四錢

梅肉 二錢

右水煎一二沸濾過飲服

又方

焰硝 大黃 各六錢

辰砂 三錢

右為散白湯送下

治發狂頭痛不止

焰硝 辰砂 各二錢

龍腦 一錢

阿片 五分

右為散冷水送下

又方

焰硝十錢為散和冷水飲下又加龍腦末二錢亦可

治狂吐方

綠礬 一錢

葡萄酒 十二錢

右攪勻飲下

頭痛

頭痛有真假二證所謂真證也者因腐敗液黑濁液或粘稠液酸收液等留滯于頭腦或因煩痛熱腫搖掣引或因抑遏蒸發氣或因破傷腦部而發頭痛是也又假證也者因胃病子宮病其他諸藏不和諸液自為不熟輸送之于頭腦以發頭痛是也

頭痛淹久不止時吐青綠汁頭眩耳鳴眼昏手足麻痺者將發卒中風之兆也

頭痛耳鳴者易發卒中風健忘

少壯之人多患頭痛年高者少患之

頭痛發外面者易治又發腦蓋裏面者難治

○頭痛

頭痛徹眼者毒液附着薄腦膜之候也

諸般腐敗液病發頭痛者難治

癩毒發偏頭痛者難治

滿頭劇痛水液或膿血流出於耳口鼻而其痛以漸向輕者不

日復故

南風久吹不歇則多發頭痛

諸般酷烈病頭痛劇盛其痛忽爾退散者變發他證將至危急

之兆也

頭痛太甚淹久不止頃刻不能眠且肌膚冷者惡候也

頭痛太甚淹久不止其痛不移動者必發惡心嘔吐或身體疲

弱或精神迷亂之候也

痘麻瘡後食已頭痛者可知其毒未盡也

為炎夫所照或居濕地或坐燥地或觸污穢氣芳香氣石灰氣

則多發頭痛尋發起險證

頭痛發額上者胃病之兆也又婦人頭痛發腦後者子宮病之

兆也按胃者連八對神機經又子宮者連八膠骨神經之故也

頭痛延纏不止每時發熱其尿白色不熟者尋發搐搦掣引向

死之兆也

小便渾濁粘稠恰如軟獸尿者頭痛之候也

漩面見冠緣者總是毒氣填滿頭中之候也

熱病輕證漩面見太冠緣者頭痛劇盛之候也又熱病重證漩

面見小冠緣者頭痛輕易之候也

漩面見赤冠緣者額上重痛之兆也又見曇色冠緣者腦後重痛之兆也

漩面見白冠緣且粘結者頭痛發於寒凝液之兆也又其冠緣稀薄者寒醒京健之候也

漩面見黃冠緣者頭痛發於膽汁過多之候也
頭痛因腐敗液黑濁液者此方主之

乳香 四錢 蘆薈 二錢 噎福栗醋 二錢

訶子 一錢 薔薇花 茵陳嫩葉 各半握

右搗篩為散白湯送下

又方

山歸來 金剛刺根 各十六錢 甘草 八錢

右判水六百四十錢煎至五百錢去滓溫服

頭痛因酸收液粘稠液者此方主之

鬼茉莉根 肉桂 各四錢

右為散以雞子黃一箇葡萄酒十六錢和勻白湯送下

又方

鬼茉莉根脂 五分 酒石鹽 一錢 焰硝錠 三分三厘

右為散白湯送下

頭痛因血熱者此方主之

大麥煎汁 八錢 焰硝 三錢 水 六錢

右以慢火煮漉過去渣和砂糖八錢醋少許每時飲服

又方

酸模根 八錢

砂糖 四錢

右水煎一二沸瀝過飲服

頭痛眩暈因寒粘液者此方主之

迷迭香 舍利別 十錢

肉桂 為末

丁香 為末

肉豆蔻 為末 各三錢

右攪勻白湯送下

又方

小茴香 鼠尾草 各四錢

右水煎和蜜少許飲服

治頭痛頭瘡歷久不愈之方

琥珀 乳香 蘆薈 嚏福栗醋 各二錢

土青木香 一錢

右為散蜜丸白湯送下

頭痛劇盛不能就寢者此方主之

次君栗 曠吉栗 一錢 龍腦 阿片 各五分

右為散白湯點服

又方

阿片 二錢 泊夫藍 一錢 珊瑚 鮮荅

珍珠 琥珀 各五分

右為散白湯送下

治頭痛眩暈

兒兒尾根一味為散和蜜文火微煮白湯送下

治頭痛因辛液汚液者薰藥方

乳香 琥珀 各四錢

右為粗散撒炭火上以紙蓋之無使烟泄引入鼻孔則濁涕自流出漸向快爽

又傳藥方

薔薇花油 芡枯草油 各三錢 醋 二錢

右和勻傳額上

又方

燒酒隨宜重湯煮和龍腦末少許浸棉布乘溫敷顛顛

治頭痛因血熱者之方

月季花 五十錢 醋 五百十六錢

右入磁器內溫處置引出藥氣布浸縛定頭部

又方

薔薇花露水和龍腦末少許布浸敷額上

又方

醋隨宜煎布浸乘溫蒸額上冷則更換

治頭痛因酸收液者之方

麒麟竭 赤石脂 各四錢 代赭石 一錢

右為末以雞子白二箇和勻作膏貼顛顛

又方

白芥子 製如食用 石鹼 為末 各一錢

龍腦 五分為末 殺律亞律沒牟亞失精 六滴

右攪和作膏貼顛顛

頭痛因粘稠液或頭腦脆怯者施嚏藥為要

解顛

解顛者小兒自初生迄四五歲多患之歷六七歲之後少患之蓋有內外二證所謂內也者謂水液留滯于腦蓋薄膜與腔間也其證頭額皮膜為緊脹腦蓋骨縫為弛緩按之堅勁面部膨腫眼自深陷或昏暗不分遠近呼吸短促身體瘦削其脈微小小便淡白而通利少又外也者謂水液留滯于頭外皮膜間也其證頭外皮為膨滿其腫透亮為黃色以指按之陷塌隨手眼胞腫脹面色灰白黃稀汁自滲泄於頭皮紋理也

解顛因胎中不適宜或臨產難分娩

解顛腹內軟和者惡候也

治解顛內外二證益氣強腦

辰砂 為末二錢 砂糖 四錢 肉桂露水 六十四錢

右攪勻飲下

又方

芍藥根 二錢 琥珀 天靈蓋 各一錢 辰砂 七分

阿片 五分

右為散白湯送下

又方

麝香 三分 砂糖 一錢 肉桂露水 二十四錢

薔薇花露水 十二錢

右攪勻飲下

又方

鬼茉莉根 二錢 辰砂 一錢

右為散白湯送下

又方

海夫藍燒酒浸置飲下

又方

山歸來 金剛刺根 各四錢 杜松木 二錢

右水煎一二沸瀝過去滓和鮮荅末少許飲服

治解顛外用方

小麥粉和龍腦少許布裹納鍋內蒸之乘溫敷顛

又方

燒酒和龍腦末少許每時塗顛

○解顛

又方

洎夫藍

龍腦 各一錢

燒酒 四十八錢

右入壺內浸置每時塗額門

頭腦諸病

強頭腦去粘液驅風氣壯胃氣治眩暈

肉桂 八錢

肉豆蔻 四錢

洎夫藍 二錢

枸櫞皮 一錢

右杵搗投上好酒百三十二錢置溫處引出藥氣飲下

又方

枸櫞皮切為小片投燒酒置溫處杵爛如泥飲下

強頭腦治眩暈助胃氣止吃逆散風氣

良姜 八錢

香橙皮 四錢

肉桂

胡荽子 各二錢

洎夫藍 一錢

右為粗末入壺內投燒酒九十六錢密封置溫處布漉臨服

和膽礬精一二滴飲下

強頭腦壯胃氣溫子宮止惡心嘔吐預防易流產

良姜 肉桂 各四錢 甘松香 藿香 各二錢

薔薇花 半握 肉豆蔻 一錢

右搗篩為散白湯送下

強頭腦壯諸藏散風氣

大麥煎汁八百錢 肉桂 百錢

右入磁器內浸一宿以蒸露罈取露水飲服

強頭腦治眩暈益精氣明眼目

沈香一味為散溫酒送下

強頭腦治神機經病子宮病

益智 石菖根 各四錢 洎夫藍 沒藥 各二錢

右搗羅為散白湯送下

去頭中汚液清朗神氣

石菖根 茺蒿根 良姜 益智 各四錢

石長生 三錢

右為散白湯送下

老人無故難睡或神氣不足精力虛憊者此方主之

益智 丁香 肉桂 良姜 肉豆蔻 各三錢

沈香 白檀 藁芫 生姜 各二錢

甘草 一錢 麝香 五分

右搗篩為散作舍利別白湯送下

治腦漏焮痛不可忍

焰硝 十錢

龍腦 二錢

右為散白湯送下

又方

山歸來

金剛刺根 各五錢

甘州 一錢

右水煎一二沸瀉過飲服

又

貫線呼膿法尤効

治夢魘病

夜間耿耿半睡半覺多夢氣短坐卧不安寧急煩悶之證是也

芍藥根

敗醬根 各四錢

肉桂 二錢

右搗篩為散白湯送下

又方

芍藥根

敗醬根

土青木香 各四錢

沈香

枸櫞皮 各二錢

酒石鹽 一錢

洎夫藍 三分三厘

右為粗末入硝子壺內投燒酒九十六錢固封烈日曝之布漉去滓飲服日六七次

頭面瘡 附禿瘡

小兒患此證者尤多蓋發面部眉間及毛髮部而流出稀水稠膿以至結痂其所因生酸收液于血中以着皮間機栗律隨蒸發氣而自腠理外發也

瘡發毛髮部者難治

瘡勿早癢易發搗搦掣引或水腫

患此證者勿與黎豆蠶豆及芋之類諸般油脂類炙博物峻烈氣物或砂糖製物又酸果最害

治頭面瘡浸活瘡

大麥 香橙皮 石榴皮 各三錢

右水煎兩三沸瀝過飲服

又方

接骨木花 三錢

薔薇花 二錢

大黃 一錢五分

右水煎瀉過飲服

治胎毒頭瘡肌皮鱗起搔痒不可忍

硫黃花 鹿角屑 各十錢

右搗羅為散以蜜和勻白湯送下

又方

苕索筆栗麻篤為末一分

甘草 為末二錢

白蜜 三十錢 水七十錢

右攪勻飲下日五六次每服五錢至十錢

治頭面瘡外用方

綠青 為末

硫黃花 為末各二錢

生姜 為末一錢

牛脂 四錢

右和勻塗瘡上

又方

牛酪 四錢

番瀝青 二錢

明礬 為末

焰硝 為末各一錢

右入砂鍋內慢火煮作膏塗之

又方

乳香 麒麟竭 各二錢

右為散以雞子白二箇和勻塗之

又方

○頭面瘡 疥瘡

猪脂和赤筆烈失筆諾篤少許塗之

又方

蘆葉燒為灰滾湯浸澄清取灰汁來溫洗濕患處

治頭面瘡清頭熱消赤疱

薔薇花 大麥 各六錢

右水煎漉過和醋十錢來溫洗濕患處

又方

接骨木花露水 六十二錢 醋 十錢 鉛白砂 錢

右攪勻重湯煎來溫布浸洗患部

治頭面瘡浸淫瘡酒皸鼻

薔薇花軟膏 二錢 硫黃花 一錢 鉛白砂 五分

右和勻作軟膏貼之

又方

水銀 八錢

右一味以水六十四錢煎減半為度候冷取澄汁洗患處

治秃瘡

取鰻鱧脂塗患部

取雞卵油塗患部

取蜜蜂二十箇入壺內乾為末摻患處又和胡麻油塗之亦可

錦葵葉水煎濾過和雞子黃洗患部

牛旁根細剉以石灰水煮熟杵搗如泥塗患部

消散汗黥

菩提樹花露水和鉛粉少許洗患處

生毛髮

鹿角屑

硫黃花

沒藥 各四錢

大黃

沃君栗曠吉栗 各二錢

右為散白湯送下又和白蜜服亦得又和甘索筆栗蔴篤二

分服尤良

又方

胡桃油每々塗患部

眼目

眼自腫痛有乾有濕腫痛多起於結膜也乾也者謂赤腫火熱
疼痛不甚淚不出唯眼胞着眵糊者濕也者謂熱淚流出焮痛
不可忍赤爛火熱烏睛生白星翳羞明不能開者

昏暗者因粘液過多或搖擗掣引或外傷而瞳人神機經及烏
睛細絡為閉塞為弛縱為強硬也

烏睛生白星翳者不可輕忽矣必至膿潰失明

焮痛不可忍羞明不能開者刺絡瀉血尤為要又發泡膏貼顫
顫尤効

頭痛劇盛其痛忽散隨而為昏暗者多至不治

瞳人散大自發者難治挾發者易治

治眼目焮痛濕爛昏暗及醒_{シキヤン}京_{ケン}律痛_{リョウ}

鵝_カ嶠_カ葳_カ草_カ 江州伊吹山多生之

野菊花

杜松木 茴香 各三錢

右水煎漉過飲服

治眼目焮痛熱腫_{リョウ}

鬼茉莉根_ニ錢 牽牛子_一錢 酒石鹽_五分

右為散和_シ殺_ハ律_レ亞_レ律_レ没_ニ牟_ニ亞_レ失_シ精_ニ二十滴_ヲ以_テ地_ノ錦_ノ苗_ノ露水_ヲ送

下

又方

薔薇花露水_ニ十四錢 蘆薈_ヲ為末_一錢

龍腦_ヲ為末_五分

右攪勻布浸洗眼目

治眼目焮痛羞明不能開

雞子白_一箇 洎_ハ夫_ハ藍_ヲ為末_七分 人乳汁_十六錢

右攪勻點眼中

又方

明礬_ヲ為末_一錢 雞子白_二箇

右二味以_レ七攪轉以_レ生_レ泡_ヲ為_レ度攤布敷眼胞尤_モ効_リ

又方

蘆薈_ヲ為末_二分 洎_ハ夫_ハ藍_ヲ為末_一分 鉛粉_一分

人乳汁_四錢

右攪勻攤布敷眼胞

治眼目腫痛生紅線結膜赤爛烏睛生白星翳者之方

薔薇花露水 三十二錢 白膽礬 烏末五分

右攪勻點眼中

又方

鉛白砂 殺律亞律没牟亞失精 各一分

右二味和水少許點眼中

又方

鵝岬茂草露水 車前草露水 各十六錢

鉛白砂 一錢 亞臘邨藥均 烏末 鉛粉 烏末 各五分

右攪勻每時洗之

眼目腫痛因癩毒者此方主之

薔薇花露水 六十四錢 赤筆烈失筆諾篤 三分三厘

右攪勻點入眼

治眼目昏暗更無所睹瞳子散大驅出頭腦粘液

牽牛子 蘆薈 各一錢

右為散以丁香油三十滴和勻為丸白湯嚥下

又方

鬼茉莉根 牽牛子 各七分 酒石鹽 三分三厘

丁香油 十滴

右和勻白湯送下

又方

山歸來 金剛刺根 各十六錢 紫蘆葉

醫方集要

卷二

○眼目

三十一

迷迭香 各半握

右水煎取百六十四錢以沃君栗曠吉栗末四錢酒石鹽二錢攪勻飲下

治瞳子散大不分細字或翳膜遮障失明

茴香露水 二十四錢 蘆薈 為末二錢

右攪勻點眼

又方

茴香露水 三十二錢 人乳汁 十六錢

右攪勻點眼

又方

鵝岬葳草 十二錢 茴香 六錢 肉豆蔻 二錢

右搗羅為散和砂糖八錢温酒送下

又方

茴香一味為散温酒送下

又方

杜松子一味杵搗酒煮軟硬得宜白湯又温酒送下

又方

益智一味為散温酒送下

治瞳人虛乏昏暗失明

薔薇花露水 三十二錢 阿仙藥 為末二錢

右攪勻點眼

治昏暗除翳膜

白膽礬 三分

雞子白 一箇

右和勻加薔薇花露水車前草露水少許頻々洗之

明眼目強瞳子去惡液

蘆薈 八錢

牽牛子 四錢

生姜

噎福栗醋

大黃 各二錢

訶子

茵陳莖

薑々菜

薔薇花

乳香

茴香

焰硝

各一錢

右為散白湯送下

除赤翳膜

丁香為末和薔薇花露水點眼

散白星翳

茴香露水 十六錢

燒酒 二錢

右攪和洗之又發泡膏貼耳後尤効

又方

茴香一味水煎使其蒸氣透徹眼中

治眵淚流出

鵝嶼茂草露水

薔薇花露水

茴香露水 各八錢

右調和洗之

又方

登休為末

明礬為末各一錢

薔薇花露水

車前草露水 各十二錢

右攪勻洗之

生紅線眵淚流出無痛者用嚏藥大効

眼目為物所刺傷腫痛膿爛者此方主之

薔薇花露水 十二錢

鴉蛄草露水

白蘆菜露水 各八錢

白蜜 去浮沫 四錢

右攪勻洗之

治眼胞腫脹赤爛

接骨木花露水

石灰水 各十六錢

白芷露水

野菊花露水 各八錢

龍腦 為末 二錢

右攪勻布浸敷眼胞

耳

耳痛為火熱鼓動頭痛劇甚大渴引飲者發搐搦掣引遂至危急

聾聵凝結鼓膜則必發耳痛

細蟲生耳內則發耳痛

勞瘵發耳聾耳鳴者瀕死

子宮上衝間有耳聾

咽喉腫痛劇盛者必耳聾

劇發咬牙鼓頰則有其響徹耳而聾

劇盛熱病忽耳聾眼盲者大率死候也

小兒初生聲啞者必耳聾不治

至老極則耳膜硬結恰如骨是以不能聽遠也
 毀傷鼓膜則必耳聾此證忽爾無聾以漸至不聞
 欲徵鼓膜毀傷則先將燈火近耳孔塞鼻口不息令氣至耳則
 其火即滅又薰煙草含其煙不息令至耳則煙即漏出於耳孔
 治耳痛

柳葉自然汁 石榴果自然汁 各四錢

薔薇花油 二錢

右攪和入砂鍋內文火微煎乘溫送入耳中

又方

薔薇花油和醋少許入耳中

又方

取雞子白和人乳汁薔薇花油少許入耳中

又方

雞子黃一箇 牛酪二錢 洵夫藍為末一錢

右和勻塗紙燃條送入耳中

又方

雞卵油和龍腦末少許入耳中

又方

薔薇花油 四錢 阿片一錢

右和勻入耳中

又方

薔薇花油 四錢 雞子白 一箇 龍腦為末 一錢

右和勻入耳中。

治耳痛耳鳴耳聾。

葱一味杵爛絞取汁點入耳中。

治耳痛聾耳膿水淋漓。

大麥煎汁三十二錢 薔薇花蜜 六錢

右攪勻以水銃射耳內若膿臭不可近者沒藥蘆薈大陽煎

十錢和前藥射耳中。

治細蟲生耳內發痛者之方

石鹼 篤耨香 各二錢

右和勻塗紙捻挿入耳孔。

治耳痛耳癰。

苦巴且杏油和龍腦末少許入耳中。

又方

龍腦油塗紙捻條送入耳中又攤布帛貼耳後亦可。

耳痛耳癰因醒京律或撞刺缺破者此方主之。

蘆薈 沒藥 各四錢 洎夫藍 一錢

右為末和燒酒白蜜少許塗紙捻條送入耳中。

又方

牛膽以醃醋和勻文火溶化入耳中。

又方

白蜜 八錢 醋 六錢

俱入沙鍋內徐徐煮浮白沫為度下火和綠青末一錢送入

耳中

治眩暈蟬鳴耳痛

阿片和醋入耳中

又方

膽八樹油 十二錢

罌粟仁 六錢

右入鍋內文火煎布漉去滓送入耳中

又方

琥珀油 十滴

野菊花油 七滴

右和勻塗紙捻條送入耳中

治耳聾蟬鳴

茴香 三十錢

杜松葉 十錢

右二味酒煎使其蒸氣自筒內透徹耳中

又方

薄荷露滴油入耳中又杵搗絞取汁入之亦可

治耳聾耳鳴聒耳

薔薇花 八錢

蚕休 四錢

右水煎濾過以酒二十四錢攪勻以水銃射耳內

又方

錦葵葉煎汁 三十二錢

人乳汁 十六錢

石鹼 一錢

右攪勻以水銃射耳內

治稠膿乾涸塞耳竅不能聽

大麥煎汁 三十二錢

燒酒 十六錢

石鹼 一錢

右攪勻以水銃射耳內

又方

石鹼一味水煎去滓以水銃射耳內

鼻

衄血者鼻中之血脈及細絡為破綻也蓋有因多血滿溢者有因痔血月水閉塞者有因過喫辛熱物者有因勞力作強或打撲缺損者

諸病將發之前有因衄血免危急者

宿病有因衄血復故者

衄血迭出其色鮮紅帶泡沫者從動脈支別而來

惡液過多或年高之人衄血不止者易發失氣昏冒搗搦掣引或徒忘水腫病

因痔血閉塞或經閉發衄血者病毒解散之兆也勿必施止澁劑

鼻痔者軟膜樣之瘰肉生鼻內也其色赤或白或黑或黯色其形有岐分者有挺出者又有垂下食管而窒塞咽喉者腐敗液過多或患癰瘡之人多生鼻痔鼻痔無痛者善有痛者惡

止衄血方

車前草露水 三十二錢

焰硝錠 二錢

阿片 五分

右攪勻飲下又加龍腦末二分亦可

又方

鹿角屑 二錢

諳室瞞閣卜烈室霍 三分三厘

龍腦 阿片 各一分七厘

右為散白湯點服

又方

沃君栗曠吉栗 一錢

洎夫藍 三分三厘

右為散白湯送下

止衄血諸失血

綠青 明礬 各十二錢

水 二百三十二錢

右文火煎漉過去滓和膽礬精二十滴飲服

止衄血失血經行過多

明礬 烏末 二錢 薔薇花舍利別

香橙舍利別 各八錢

右調和白湯送下

又方

明礬 阿仙藥 各四錢

右為散白湯送下

治衄血諸失血眩暈失氣

大麥煎汁 九十六錢 枸椽汁 十六錢

石榴汁 十二錢 肉桂露水 八錢

右件攪勻飲下 焰硝 為末一錢

又方

石榴果作舍利別白湯送下

止衄血

白膽礬和水入鼻中

又方

雞子白 二箇 明礬 為末四錢

右和勻攤棉布貼顛顛

又方

沒藥 六錢 枯礬 三錢

右為散吹入鼻中

又方

赤石脂 三錢 白膽礬 一錢 明礬 七分

綠膽礬 鉛白砂 各三分三厘

右為散吹入鼻中

止衄血失血經行過多

醋或冷水浸布棉敷額上男子則敷陰囊亦可

治鼻痔

石榴果自然汁 三十二錢

砂糖 二十四錢

醋 十六錢

右文火煮作舍利別白湯飲下

又方

梅膠

右一味和薔薇花露水點入鼻中

又方

拔日栗均軟膏六錢加水銀二錢攪轉星不見為度塗綿條

挿入鼻中

又方

杉葉 二錢

薔薇花

石榴花 各一錢

右水煎漉過去滓和綠膽礬末三錢明礬末一錢蘸綿布挿入鼻中

右和勻漱之

又方

薔薇花蜜 十錢

醋 五錢

沒藥 為末

明礬 為末 各三錢

右和勻含漱之

治口內癰腫

車前草露水

石灰水 各二十四錢

甘草筆栗麻篤 一分六厘

右攪勻漱之

治口舌齒齦赤爛痛腫妨吞下

接骨木花水煎濾過和枯礬末一錢焰硝末七分漱之

去口內汚臭

肉桂露水 二十四錢

薔薇花蜜 十二錢

右攪勻含嚥任意

治舌疽腐蝕赤爛

膽八樹油

薔薇花蜜 各四錢

沒藥 為末 二錢

石蜜 二錢

右和勻以雞翎每々塗患處

舌疽初起流涎膏貼首頸令吐濁唾為要

流涎膏見癰瘡門

治舌根不仁言語蹇澁

紫蘆葉并花以煎露罐取露水飲服又益智菟蓀胡枳之類

尤効又肉桂油丁香油和砂糖少時在口內次后嚥下又施

嚏藥為要

治齒齲赤爛痛腫

野菊花

接骨木花

各四錢

右水煎瀝過含漱之

又方

焰硝錠

枯礬

各四錢

水三百十六錢

右攪勻文火徐徐煎減半為度候冷漱之

又方

石榴皮

為末

枯礬

為末各二錢

綠青

為末一錢

白蜜

十六錢

酒

百錢

右入砂鍋內煮減半為度含漱之

又方

燒酒

六十四錢

香橙自然汁

三十二錢

膽礬精

二十滴

右和勻含漱之

又方

香橙自然汁

三十二錢

枯礬

為末二錢

食鹽精

二十滴

右和勻含漱之

又方

沒藥

亞臘

藥均

各二錢

右為散搽患部

又方

沒藥二十錢為粗末入壺內投燒酒九十六錢固封烈日曝之七日布漉和砂糖二十二錢塗之令之

治齒齲腐爛膿潰

綠青 為末

明礬 為末各四錢

蜜 六錢

醋 三錢

又右調和如舍利別每時塗牙縫以濁唾出為佳

又方

明礬 為末四錢

綠膽礬 為末一錢

丁香油 三滴

右調和摩擦齒齲次以紫蘆葉露水漱之

治口舌齒齲焮痛熱腫

薔薇花

車前草

石榴皮 各三錢

右剉以水九十六錢煎至五十六錢為度漉過去滓飲服又

和薔薇花蜜三錢枯礬末二錢令嚥任意

又方

接骨木花露水 三十二錢

薔薇花蜜 八錢

食鹽精 二錢

右調和合漱之

齒痛因熱者此方主之

焰硝 四錢

辰砂 二錢

右為散摩擦齒齲或以冷水每々漱之

又方

車前草露水 九十六錢

枯礬 四錢為末

右調和漱之

又方

蜀葵根一味醋煎瀝過洗口內

又方

煙草子煎汁

尚蒿根煎汁 各十二錢

醋 四錢

明礬 二錢為末

龍腦 一錢為末

阿片 五分

鉛白砂 二分

右攪勻含漱之以涎唾出為佳

齒痛因凝結液者此方主之

地榆根露水 三十二錢

琥珀油 十滴

右攪勻每時飲下

齒痛因惡血者此方主之

龍腦油 十滴

鹿角精 五滴

右和勻塗額門顛顛又使其臭氣透徹鼻孔

又方

酒石鹽 八錢

丁香油

茴香油

肉桂油 各二十滴

肉豆蔻 為末

琥珀 為末

良姜 為末 各五分

右入壺內投燒酒百錢和殺律亞律沒牟亞失三錢固封浸

置一宿以蒸露罐取露水飲服

治齒痛齩齒痛

乳香為散和丁香油塗之且挿入孔內

又方

焰硝二錢 胡椒一錢

右為散入齧齒中

又方

龍腦 阿片 各五分

右為散蜜丸挿入孔內

又方

丁香油 十滴 膽礬精 五滴

右和勻挿入孔內

齒痛因醒^シ京^キ健^ケ毒^ド者此方主之

茴香露水 二十四錢

龍腦油 六滴

阿片 七分

右攪勻每時含之以涎吐出為佳

治牙齒浮動咀嚼頗艱

檳榔子

枯礬

石榴皮 各一錢

阿仙藥

麒麟竭 各五分

右搗篩為散搽齒齦

又方

檳榔子為末酒煮塗齒齦

孕婦或產後發^{スレ}鴛口瘡者不可輕忽^ス矣

治鴛口瘡口內赤爛

山歸來 金剛刺根 各十六錢

右水煎漉過和蜀葵根舍利別十錢飲下

又方

白磁石 二錢 大黃 一錢

右為散和薔薇花舍利別八錢白湯送下

又方

大麥煎汁 三十二錢 肉桂露水 八錢

黑泥灼的里亞加 四錢 焰硝錠 三錢 阿片 一錢

泊夫藍 諳室瞞閣 卜烈室霍 各七分

右攪勻飲服

又方

茵陳莖煎汁 薔薇花露水 各十二錢

大黃 二錢為末

右攪勻飲下

治鴛口瘡舌腫膿爛言語蹇澁及咽喉焮痛

膽礬 二錢 水 四十八錢

右文火煎布漉和薔薇花舍利別葶藶菜舍利別各八錢

噉任意

治鵝口瘡煩躁氣急

紫蘇葉 一握 白蜜 三十二錢 上好酒 百錢

右煎瀉過加枯礬末二錢焰硝錠一錢攪勻含漱之

又方

薔薇花蜜 二十四錢 沒藥末 枯礬末 各三錢

右和勻以雞翎塗患處

治鷲口瘡赤爛腫痛

蜀葵苗 一握 麻人 四錢 食鹽 二錢

右水煎去滓含漱之

又方

薔薇花露水 二十四錢 肉桂露水 十二錢

雞子黃 一箇 焰硝錠 一錢 砂糖 四錢

右攪勻含漱之

又方

大麥 十錢 乾葡萄 六錢 甘草 四錢

麻仁 二錢

右水煎瀉過含嚥任意

又方

萊菔自然汁和砂糖含之

又方

大麥煎汁 六十四錢 薔薇花露水 三十二錢

白蜜 八錢 枯礬 二錢為末 白膽礬 五分

右攪勻含漱之

又方

燒酒 九十六錢 白蜜 三十二錢

紫蘆葉露水 二十二錢 枯礬 四錢為末

右和勻漱之次以冷水每時洗口舌

又方

大麥煎汁 九十六錢 乾葡萄 無花果 各八錢

甘草 六錢

右煎漉過去滓含嚥任意

和蘭鑿方纂要卷之一終



春和樓



明治癸丑年申晚曾閱之云

石峯愛士毅



六

元子

1007

1007
元子

世系表

始



世系表



1007

世系表

世系表

世系表

世系表

