



ヤ 4
1433
3



14
1433
3

和蘭醫方纂要三之上

病門目次

蛇蟲

霍亂 宿食

黃疸

黃胖

肝藏閉結

脾藏閉結

憂鬱病

疝

腸痛

醫方纂要

卷三上

。

Handwritten notes on a yellow slip of paper, possibly a library label or inventory record, with some illegible characters.



91-1947

14
1433
3

カニフル
コードスワール

カロメル

メカ

コウヤコガリ

石鱈

トキ

メカ

ハシリヤナ

み腸移石

サヨ

白檀

サヤ

薄公草

茅根

和蘭醫方纂要三之上

病門目次

蛇蟲

霍亂 宿食

黄疽

黄胖

肝藏閉結

脾藏閉結

憂鬱病

疝

腸痛

和蘭醫方纂要 卷三上



91-1947

腸癰

腸間膜閉病

鼓脹

水腫

泄瀉

赤痢 下血

和蘭醫方纂要三之上 癩痢

美濃 大垣 春齡菴江馬元弘 譯

蛇蟲 直如王蛇之類也

夫蛇之為證也面色灰白眼胞青白鼻痒衄血口唇青色氣息惡臭惡心嘔吐胃痛腹痛腹肚緊滿惡聞食臭或時飢貪食大便或下或秘睡中驚寤又有全身發瘡疹者又有無眩暈昏冒搖擗癩病者又有發寒熱往來身體膨腫或瘦削乾咳咬牙吃逆者蓋圓蟲者巢居于胃中及薄腸焉扁蟲者居于腸中焉細



蟲者居干直腸及肛之裏面焉

蚘證小兒尤多患之壯年之人少患之又不可辨男婦粘液過多或閑坐安逸之人多患之

頭痛連綿不止貪食者腸中生蚘之候也

生扁蟲則多易發惡液病消削病水腫病

直腸肛門發癢痒者直腸生蚘之候也

小兒小便白濁如乳汁者蚘蟲滋生之徵也

蚘之大有自一尺至四五尺者又有自一丈至二丈三丈者

殺蚘蟲治腹肚堅滿

野菊花 三錢 大黃 一錢

右水煎一二沸瀉過飲服

又方

海人草 一錢 甘索筆栗麻篤 一分

右為散白湯點服

又方

牽牛子 一錢 甘索筆栗麻篤 一分

右為散白湯點服

又方

鬼茉莉根 一錢 辰砂 五分

右為散白湯點服

又方

海人草 一錢 珊瑚 三分 三厘

又方

青蒿子 七分 白筆烈失筆踏亞篤 一分七厘

右為散糊丸每服一丸

又方

青蒿子 三分 甘索筆栗篤 一分

右為散糊丸每服一丸

又方

鐵粉 三錢 青蒿子 一錢

右為散每服七分以葡萄酒送下

又方

大黃 一錢 牽牛子 五分 甘索筆栗篤 四厘

右為散和蕃薇花舍利別白湯送下

又方

丁香 十六錢 燒酒 百三十六錢

右件入硝子壺內浸置一夜瀝過去滓飲服

又方

大黃 八錢 蘆薈 六錢 草豆蔻 四錢

燒酒 二百錢

右入壺內浸置去滓飲下

又方

蘆薈 沒藥 茵陳鹽 各一錢

右為散以薄荷露水飲下日五六次

又方

鬱金 三錢 甘索筆栗麻篤 二分

右為散空心白湯點服

又方 虬生胃中薄腸者此方主之

胡蘿蔔根生切為小片空心食之能驅出虬蟲

殺蟲治腹滿癢痛

鐵粉 阿魏 各三錢

右為散白湯送下

又方

沒藥 三錢 石鹼 一錢 拔律殺沒管律匪坑 十滴

右調和為丸白湯化下

又方

大黃 十二錢 海人草 八錢 上好酒 百三十二錢

右入磁器內浸置去滓飲下

又方

茵陳莖 海人草 各八錢 大黃 四錢

甘草 一錢

右剉滾湯浸置布漉去滓飲服

又方

取茵陳油點入臍又塗小腹

又方

甘草 大麥 各八錢 茴香 四錢 無花果 六顆

右水煎漉過取五十錢和蜂蜜二十錢以水鏡射腸中

霍亂 宿食

霍亂者腹痛如切暴吐暴瀉手足厥冷津々汗出其脈微小戰慄鼓頷煩躁苦悶宿食證大率與霍亂無異

隨吐瀉而諸證覺輕者良候也反之心下膨滿冷汗出其脈微小者命在頃刻矣

呼吸促迫無熱無渴其脈沈微者瀕死

治霍亂嘔吐

藿香露水 三十二錢

鹿角屑 一錢五分爲末

大黃 一錢爲末

右攪勻飲下

治霍亂吐瀉腹肚絞痛

藿香露水 四十二錢 肉桂露水 八錢

香橙汁 十六錢 阿片 一錢 燒酒 浸

右攪勻飲下煩渴者加大麥煎汁三十六錢尤良

又方

茵陳莖 良姜 茴香 肉桂 香橙皮 各三錢

右水煎一二沸漉過飲服

又方

茵陳莖 香橙皮 各四錢 大黃 二錢

右水煎一二沸漉過飲服

又方

肉桂露水 大麥煎汁 各二十二錢 阿片 五分

沃若栗 曠吉栗 二錢 爲末 罌粟殼 舍利別 四錢

右和勻飲下

治霍亂宿食吐瀉腹痛心下痞滿口渴引飲

茵陳鹽 一錢 枸橈汁 二十五錢

右和勻飲下

又方

楳棹 一味醋煎加良姜香橙皮末各等分 和勻飲下

又方

酸模根 八錢 楳棹 四錢

右水煎漉過飲服

又方

酸模根

楤梲 各五錢

香橙皮 三錢

右水煎瀉過去滓和肉豆蔻肉桂末各二錢砂糖少許飲下

又方

薔薇花露水

楤梲 舍利別 各十六錢

拘攬 舍利別 八錢

鹿角屑 一錢烏末

右攪勻飲下

治霍亂無痛吐下不止

藿香露水

肉桂露水 各二十四錢

罌粟殼 舍利別 八錢

右攪勻飲下

霍亂吐瀉後腹內無力者此方主之

藿香

肉桂

楤梲 各三錢

砂糖 二錢

右水煎瀉過飲服

治吐瀉後心下痞鞭

龍膽 舍利別 三錢

香橙皮 舍利別 二錢

右和勻溫酒送下每服一錢

黃疸

黃疸者失胆汁所注于十二指腸之常度返流注肝之血脈從是流溢于周身血脈而發黃色也其證心下痞硬當上腹右傍而膨脹煩悶嘔吐惡心噯氣雷鳴不欲飲食舌燥口苦大便秘結偶為通利則其色白或灰白粘稠帶惡臭小便赤黃或黑色浸布則洩黃色也

黃疸全身癢痒或發疹者不可復故之徵也

諸般酷烈病兼黃疸者可知非投下劑則不治矣

諸般酷烈病歷七日而發黃者瀕死

黃疸發於肝藏閉結者必變成水腫惡性熱

黃疸無熱病者惡兆也又熱病發黃者吉兆不可向康復

黃疸連綿延日變成水腫者死期不遠矣

黃疸有變成水腫鼓脹者不治死

老人患黃疸則不治死

妊婦發黃非為分娩則不復故可知惡兆也

黃疸嘔吐不止者惡候也勿妄投吐劑

黃疸小便淡薄如水者尋發水腫之兆也

小便如泊夫藍色者黃疸之候也

小便稠濁浮黃泡浸布則深黃且黃霧沫汚尿壺之旁者發黃

疸無疑矣

黃疸劇熱乾咳咽燥小便黯赤黃帶黑色者可知發於肝藏燥

腫也

治黃疸心下緊滿飲食不進

茵陳 十錢

大黃 四錢

砂糖 二錢

右水煎漉過飲服

又方

茵陳 八錢

薔薇花 三錢

甘松香 一錢

右水煎漉過飲服

又方

白蘆菜

茴香 各六錢

右水煎溫服

又方

茵陳露水 百五十錢

酒石鹽 八錢 烏末

右攪勻飲下

又方

石鹼 八錢

蘆薈 三錢

大黃 二錢

右為散蜜丸白湯化下

又方

硫黃花 四錢為末

薔薇花舍利別 八錢

右攪和白湯送下

又方

硫黃花

砂糖 各八錢

右為散白湯送下

又方

茵陳鹽 二錢

右滾湯點眼茵陳舍利別茵陳酒總為治黃疸之要藥

治黃疸開諸藏閉塞

鐵粉 八錢

鬱金 四錢

右為散白湯送下

又方

大黃十錢燒酒浸置絞去滓和旋柰葉末三錢飲下

治黃疸開肝藏閉塞

蘆薈

乳香 各一錢

沒藥 二錢

酒石鹽 七分

右為散白湯送下

又外用方

茵陳 二握

接骨木 四錢

野葡萄根 八錢

胡蘆巴 十六錢

右件酒煎去滓浸布夾溫罨蒸心下日五六次

黃胖

黃胖之為病頭痛眩暈耳鳴面色痿黃灰白心下痞滿氣息困
難心動脈跳動異常渾身浮腫四肢酸疼爪甲灰白為皴揭太
便或秘或下

治黃胖腹脹氣息困難四肢酸疼

鐵粉 十六錢

鹿角屑 八錢

茵陳鹽 二錢

砂糖 三錢

右為散白湯送下

又方

黑泥灼的里亞加 二錢

琥珀油 五滴

右調和溫酒送下

又方

枸櫞皮

香橙皮

吉納吉納各三錢

右水煎溫服又為散加砂糖二錢白湯送下亦可

又方

胡荽子 四錢

茴香 二錢

良姜

生姜 各一錢

丁香 七分

殺律亞律没牟亞失 三分三厘

砂糖 二錢

右搗篩為散白湯送下

黃胖由惡液者此方主之

杜松木 四十八錢

金剛刺根 二十錢

白檀 八錢

薔薇花

杜松子 各六錢

焰硝 三錢

右件水浸置絞去滓飲服

又方

薔薇花露水

砂糖 各十八錢

白檀 為末

肉桂 各六錢為末

牽牛子 三錢為末

先以薔薇花露水及砂糖入沙鍋內以文火煮次入諸藥攪勻再煮作舍利別白湯送下

熱病瘡後發黃胖者此方主之

噎福栗醋

牽牛子

鬼茉莉根

紅藍子 各四錢

益智 丁香

洎夫藍

沈香 乳香 各二錢

旋奈葉 八錢

右為粗末燒酒浸一宿濾過去滓飲服

肝藏閉結者當上腹右傍而痞悶煩躁氣息困難身體疲倦時
 時發熱肝藏閉結凸起非宦應年而為見于外也
 肝藏閉結兼水腫者瀕死
 小便白色粘濁如油者由肝藏不和而飲食失化熟之兆也
 小便赤色不熟者肝藏衰弱或閉結之候也
 小便蒼天色雜綠色者肝膽不和之候也
 治肝藏閉結去腐敗液
 石鹼
 右一味白湯送下
 又方

肝藏閉結

肝藏閉結者當上腹右傍而痞悶煩躁氣息困難身體疲倦時
 時發熱肝藏閉結凸起非宦應年而為見于外也
 肝藏閉結兼水腫者瀕死
 小便白色粘濁如油者由肝藏不和而飲食失化熟之兆也
 小便赤色不熟者肝藏衰弱或閉結之候也
 小便蒼天色雜綠色者肝膽不和之候也
 治肝藏閉結去腐敗液
 石鹼
 右一味白湯送下
 又方

骨碎補 十六錢

乾葡萄 三錢

右以大麥煎汁九十六錢煎去滓飲服

又方

蘆薈 沒藥 各三錢

乳香 二錢

右為散白湯送下

開肝脾及大機栗律閉塞治水腫腹滿

剛鐵 二十錢

右為末燒至赤色為度加硫黃十錢以鐵篋攪和不停手硫黃自熟變作赤色為度搗羅為散白湯送下

脾藏閉結

脾藏閉結者當上腹左傍肋膜之下而痞悶壅引閉結滿脹面色黯淡失光澤眼膜黃色瞳子昏暗精神鬱重悲悶

脾藏閉結兼水腫者死期不遠矣

食前食後涎唾多出者脾藏閉結之兆也

脾藏閉結發赤痢下血者尋可治之候也然赤痢下血久不止尋發水腫者死期在近矣

脾藏閉結每時驚惕苦惱口吐清水者向康復之徵也

小便白色不熟清澄者脾藏閉結之候也

尿中有砂礫光如水晶者脾藏閉結之候也

治脾藏閉結腹滿壅引

鐵粉 十二錢

沒藥 六錢

砂糖 六錢

右搗篩為散白湯送下

治脾藏閉結腸間膜閉塞及憂鬱病黃疸

鐵銹 六十四錢

右為粗末入壺內投熟葡萄汁或蜜水置暖溫之處每時以鐵篋攪轉至黑色為度布漉文火徐徐煎熬作舍利別每服自七分至一錢五分

治脾藏閉結子宮上衝

野菊花 八錢

茴香 六錢

右水二百錢煎減三分之一為度去滓飲服又以水銃射腸中亦可

脾藏閉結將變成虛勞者此方主之

硫黃花

鐵粉 各八錢

沒藥

甘草 各二錢

右為散白湯送下

脾藏閉結無蛇蟲者此方主之

大黃 一錢

甘索筆栗麻篤 七厘

右為末和白蜜白湯送下

憂鬱病

憂鬱病者，脇腹之右，傍臑急，膨脹，苦惱，雷鳴，頭痛，眩暈，精神鬱重，或悲哀，憂愁，或忿怒，怨恨，每事猜忌，思慮無窮，或遠慮，狐疑，無所決，或夜間多想，不交睫，偶就寢，則雜夢，魘驚，煩悶，苦惱，證候千態，難以一論之。

憂鬱病於春秋必易發，大便多秘結。

憂鬱病衄血，下血，或發瘡疹類，則向康復之徵也。

憂鬱病無赤痢下血者，不日可治之徵也。然發水腫者，死。

北風久吹，不歇，乾燥則易發憂鬱病。

憂鬱病其脈堅實時，發熱惡寒，大便燥結，帶黑色，小便稀薄，帶黃色，有光者，可知有毒之候也。有毒證，勿必用辛熱劑施之。

則多發，炊腫瘡癰腫也。

憂鬱病其脈微弱小便白色不熟者，可知無毒之候也。

憂鬱病卒然言語蹇澁者，黑胆汁滿溢之候也。

小便黑色利黑胆汁者，吉兆也。

小便薄黑且黑塗沈着壺底者，尋發瘡癰腫之兆也。

治憂鬱病去黑胆汁除粘稠液。

鹿角屑 十錢

土青木香 五錢

洎夫藍

辰砂 各一錢

右搗羅為散白湯送下

又方

鹿角屑 土青木香 各二錢

野菊花 八錢

洎夫藍 一錢

右為散白湯又溫酒送下

又方

鐵粉 十錢

香橙舍利別 二十四錢

右和勻白湯送下

又方

鐵粉百錢燒酒二百錢入壺內密封烈日中曝之七日布漉去渣飲下

治憂鬱病脾藏閉結心下痞滿頭眩暈

茴香

良姜

香橙皮 各四錢

焰硝 二錢

右為末白湯送下

又方

沃君栗曠吉栗 二錢

鐵粉 四錢

焰硝 一錢

右為末白湯送下

又方

蘆薈

噎福栗酷

牽牛子 各四錢

右為末白湯送下

又方

蘆根 二十錢

大黃 八錢

右二味水二百錢煎漉過和蜜十二錢飲服

又方

茵陳

龍膽 各六錢

砂糖 四錢

右水煎一二沸漉過飲服

治憂鬱病子宮病大便秘結

接骨木花

三百四十八錢

右水浸一宿漉過去滓和砂糖九十六錢文火煮作舍利別

白湯送下

開鬱行氣利經水殺蚊蟲

蘆薈 九十六錢

細辛

沈香

肉桂

甘松香

乳香 各六錢

白蜜 五百三十六錢

右件為末先以蜜和蘆薈入鍋內徐々煮下火候冷入餘藥調和白湯送下

疝

疝有二因所謂寒與熱也寒也者謂發於粘液風氣酸液虻蟲者也熱也者謂發於辛峻液腐敗液胆汁及焮痛熱腫吞毒者也其為證腹肚膨滿疝痛雷鳴響急噉氣吞酸腰脚攣痛小便淋瀝大便或下或秘

疝痛多兼虻蟲

痛風有變成疝氣者

疝痛有變成關節痛者

疝痛發汗過多者性力虧脫不日發卒中風之兆也

疝痛因胆汁滿溢者聲啞不出

疝痛固結一處不移動以熱者易生內癰

痲痛有變成腸痛鼓脹水腫者

痲痛腹內寧急筋膜抽掣者腸神機經機關失度之候也

痲痛發於舌毒者可知至危篤也

痲痛發於喉痛熱腫者小便赤色為吉兆又稀白為凶兆

治痲痛因粘液風氣而腹內寧痛

茴香露水 九十六錢

丁香油 二十滴

右攪勻飲下

又方

野菊花

接骨木花

藿香

芸香 各十二錢

杜松子 十五錢

月桂皮

肉桂

良姜 各十錢

香橙皮 二十二錢

茴香

胡蘆巴 各八錢

又方

右件燒酒三百五十錢浸一宿以蒸露罐取露水飲服

良姜

蘆薈

肉桂

芸香

茴香 各四錢

胡枴 二錢

右搗篩為散温酒又白湯送下

治痲痛腹痛腰脚寧痛

香橙皮 十六錢

細辛 八錢

良姜

獨活 各六錢

茴香 杜松子

月桂皮 各四錢

右件酒三百六十四錢浸一宿以蒸露罐取露水飲服

又方

罌粟殼

肉桂

生姜

茴香 各三錢

甘草 一錢

右水煎一二沸瀉過飲服

又方

楊柳葉 半握

胡椒 一錢

右酒六十四錢煎至四十八錢為度瀉過溫服

又方

巴且香油

蜀葵根 舍利別 各八錢

阿沒勒 八錢為末

燒酒 三十二錢

右攪勻飲下

治痢痛腸痛腹滿拘急胃虛飲食難化

茵陳

良姜 各四錢

龍膽

香橙皮 各三錢

土青木香

草豆蔻 各二錢

白芷 一錢

右酒煎瀉過飲服

又方

良姜

肉桂

香橙皮

茴香 各三錢

右水煎一二沸瀉過飲服

又方

胡荽子

茴香 各五錢

肉桂

肉豆蔻 各二錢

右搗羅為散溫酒送下

治痢痛腹痛胃虛或嘔或下飲食不化神機經虛之寒熱往來

肉豆蔻

肉桂 各四錢

草豆蔻 二錢

茴香

良姜 各三錢

右酒煎温服

治痢痛嘔吐不止

藿香露水

茴香露水 各三十二錢

燒酒 十六錢

阿片 三分三厘

右攪勻飲下

治痢氣腹痛腎痛子宮衝逆

胡桃核

杜松子

芸香 各四錢

右為散温酒送下

又方

錦葵葉 二握

野菊花 一握

右酒百二十四錢煎漉過去滓飲服

治痢氣腹痛膨脹急太便秘或下

茴香一味酒浸一宿以蒸露罐取露水飲服

又方

茴香 甘草 各四錢

右為散以大麥煎汁六十四錢攪勻飲下

又方

月桂實并葉為散温酒送下

又方

石鹼 二錢 阿片 一錢

右為散糊丸白湯化下

治痢腹痛便秘

肉桂 茴香各五錢 大黃 二錢五分

右為散白湯送下

又方

鬼茉莉根 一錢 酒石鹽 五分 阿片 二分

肉豆蔻 二錢

右為末白湯送下

又方

茴香露水 三十二錢 藿香露水 十六錢

罌粟殼舍利別 八錢 酒石鹽 二錢為末

右攪和飲下

又水鏡方 煎取八十錢 和食鹽二錢 蜜八錢 乘溫以水鏡射腸中

大麥 八錢 蜀葵葉 一握 旋奈葉 四錢

水 百二十錢

右煎取八十錢 和食鹽二錢 蜜八錢 乘溫以水鏡射腸中

治疝氣腹滿水鏡方

野菊花 零陵香 各半握 茴香 十錢

右水煎漉過以水鏡射腸中

腸痛大便下利忽然發熱者瀕死

腸痛由汚液凝滯閉塞者腸中重痛心煩苦惱大便秘結無熱

少嘔

治腸痛腹滿嘔吐吞酸

石菖蒲根

生姜

良姜

肉豆蔻

肉桂 各四錢

右酒煎瀝過飲服

又方

雞糞

香橙皮 各四錢

右為散溫酒送下

又方

西華書局藏

野菊花

茴香 各八錢

右件酒煎去滓飲服

又方

茴香

肉桂

獨活 各四錢

甘草 二錢

右水煎瀝過飲服

又方

孔雀糞陰乾為散加砂糖三分之一白湯送下

又方

銀粉 鐵粉 錫粉 亦可

右一味為散以膽八樹油和勻白湯送下其効不可言

治腸痛因胆汁腐壞者之方

車前草露水

酸模根煎汁各十六錢

阿片 三分

焰硝精 二十滴

香橙皮舍利別 四錢

右攪和飲下

治腸痛水鏡方

燒酒 九十六錢

紫蘇葉露水 六十四錢

阿片 一錢

雞子黃 三箇

右攪勻以水銃射腸中

又方

罌粟殼煎汁 六十四錢

龍腦 一錢

阿片 五分

右攪勻以水銃射腸中

又方

燒酒 人乳汁各十六錢

胡椒 二錢為末

右攪勻以水銃射腸中

又方

阿片 一錢

蜂蜜 六十四錢

右二味以文火煎熬稀稠得所作坐導藥送入肛門

腸癰

腸癰者壯熱口渴腹滿炊痛手不可近其痛固結不移動嘔吐煩悶太便秘結

腹痛如啗如刺腹內火熱鼓動全身煩熱者腸中將生癰之徵也

腸癰小便赤色者良候也又稀薄白色者惡候也

治腸癰

蜀葵根 四錢 蜀葵葉 二握 胡麻人 二錢

右水煎瀉過加焰硝末三錢砂糖二錢和勻飲服

又方

三七草根 十六錢 鹿角屑 八錢 美人蕉花 一握

右水煎漉過加鹿角精十滴肉桂露水十六錢攪勻飲服又
燉痛不可忍者加阿片七分尤良

又方

焰硝八錢為末 大麥煎汁九十六錢

右攪勻飲下

又方

蜀葵根舍利別二十錢 大黃十錢為末

右和勻白湯送下

又水銃方

錦葵葉 莖莖菜各一握

右水煎漉過取八十錢加阿沒勒末八錢龍腦末二分三厘

雞子黃一箇攪勻以水銃射腸中

又方

大麥煎汁九十六錢 錦葵葉煎汁四十八錢

白蜜二十四錢 焰硝四錢為末

右和勻以水銃射腸中

又煎湯方

燒酒八十錢 龍腦二錢為末

右攪和重湯煎來溫布浸蒸膜上

腸間膜閉病

腸間膜閉病者是因腸間膜及乳糜液道之機關失常度為閉塞滯滯也其為證腹肚緊滿四肢如柴腰脚痿弱唯頭為大寒熱往來自汗盜汗大便或秘或下

治腸間膜閉病腹肚緊滿便秘

鐵粉 八錢

焰硝錠 二錢

砂糖 四錢

右為散白湯送下

又方

山歸來

杜松木

茵陳莖

土青木香

各三錢

右水煎瀉過以鐵粉末六錢和勻飲服

又方

香橙皮 地榆 芸香 各四錢 茵陳莖

龍膽 土青木香 各二錢

右剉燒酒浸一宿布漉去滓飲服

治腸間膜閉病腹脹滿痛

胡麻油和砂糖白湯飲下

腸間膜閉病因蛇蟲者此方主之

蒿芎根 茴香 各四錢 大黃二錢

右水煎漉過和甘索筆栗麻篤一分飲下

治腸間膜閉病外用方

取煙草葉敷臍上以滾湯布浸熨蒸其上

又方

謨郭姑奴謨油 九十六錢 黃蠟 四十八錢 松脂

番瀝青 各十六錢 篤癪香 八錢

先將油與蠟入鍋內上火浮沫為度次入餘藥徐徐溶化布

漉冷定作軟膏塗臍上且以煙草葉敷其上以滾湯布浸每

時蒸其上尤效

鼓脹

鼓脹者因風氣填滿腹內及腸中而諸液失流利之度為留滯也其證腹肚膨滿拘急以手打之鳴動且繞臍痛大便或下小便淋瀝

鼓脹放屁則必覺輕安

鼓脹腹皮生光澤者惡候也

鼓脹其脉大率緊數

治鼓脹腹內拘急飲食難化

胡荽子 十二錢

肉豆蔻

砂糖 各三錢

生姜 二錢

右搗羅為散白湯送下

又方

鐵粉 八錢 沒藥 四錢

右為粗末入磁器內投燒酒九十六錢浸置濾過去滓飲服

又方

鬼茉莉根 噎福栗醋 酒石鹽 各四錢

旋奈葉 八錢 茵陳 龍膽 各六錢 接骨木花

枸櫞皮 胡荽子 各三錢 丁香 二錢

右件酒浸一宿濾過去滓飲服

治鼓脹小便不利

蜈蚣 二十四錢 肉豆蔻 八錢 杜松子 四錢

連錢草 二握 燒酒 百錢

右入壺內固封烈日中曝之布漉去滓飲服

治鼓脹太便秘結

大黃 肉桂 砂糖 各六錢

右為散白湯送下

破氣驅風去污液利大便

大黃 八錢 旋奈葉 茴香 胡荽子 各六錢

甘草 土青木香 葡萄 各三錢 洎夫藍 二錢

右拚搗入壺內以燒酒二百二十四錢浸置濾過去滓飲服

治鼓脹以温布敷腹上次塗此藥其方

龍腦 二錢為末 巴且杏油 十二錢

右和勻塗腹上次用此方

茴香露水 三十二錢 大黃 二錢為末 砂糖 三錢

右攪勻飲下

又方

取牛糞又犬糞米糊和勻塗臍上

治鼓脹水鏡方

芸香 野菊花 接骨木花 胡蘆巴

茴香 各四錢

右水煎去滓乘溫以水鏡射腸中

水腫

水腫有二證所謂白與黃也蓋不出於混淆胆汁之多寡白水腫者其腫初起于腹與腰次及手足大便或秘或下腹內無物而痛無以腰痛也黃水腫者全身滿腫咳嗽發熱心下痞滿腹肚膨脹大便閉結小便不利其腫隨身體移動以為增減又有水腫發於子宮者須察經閉妊娠之候也

水腫有四診第一呼吸促迫第二太渴引飲第三小便不利第四發汗微少此四證總為惡兆須慙慙用意水腫於月之上弦增盛復於下弦減却者也下血久不止者必發水腫多濕之歲多患水腫於秋時亦復爾

水腫肌膚為潰爛者不治死

水腫發咳者惡候難治

脾病兼水腫者遂至殞命

劇熱病瘥後發水腫者惡候也

水腫瘥後不日再發者難治

腸諸病及腐壞液病發水腫者死

水腫鼓脹為臍筋膜炊痛者瀕死

水腫缺盆骨及胸前為腫平面者死期在迤矣

水腫壯熱小便通利少其色渾濁者以漸加重之候也

急卒諸病兼發水腫者惡候也

諸失血後必發水腫

水腫延綿難治其人面色赤不異常者良候也又面色青白或
銻色者不過一月而至殞命

水腫自胸腹作波音升咽嗑而如吐尋復下降大便下利者死
期不遠矣

水腫強實之人可強發汗

白水腫其尿白或灰白不化熟恰如水

黃水腫小便赤色且稠塗沉着壺底恰如熱病尿

治白水腫利小便

枸骨木 十六錢燒灰

上好酒 百二十八錢

右入壺內密封置溫處布漉去滓加肉桂露水八錢飲服

又方

肉桂露水 百錢
焰硝 十錢為末
鬼茉莉根 五錢為末

右攪勻飲下

又方

生姜 鬼茉莉根 各二錢
酒石鹽 一錢

右為散燒酒送下

又方

菖蒲根 三錢
杜松子 茴香 各二錢

乳香 一錢
砂糖 三錢

右水煎瀉過飲服

又方

杜松子 水楊梅根 各四錢
良姜 三錢

獨活 焰硝 各二錢
薄荷 二握

右酒浸一宿布漉去滓飲服

治黃水腫利小便

牽牛子 一錢
大黃 二錢
肉桂 生薑 各一錢五分

右件水六十四錢文火煎瀉過去滓和砂糖少許飲下

又方

酒石鹽 一錢
藤黃 五分

右為散以薄荷露水飲下

又方

鬼茉莉根 一錢
藤黃 二分
肉豆蔻 一錢五分

右為末以接骨木花舍利別八錢和勻白湯送下

又方

鬼茉莉根 一錢

藤黃 二分

肉豆蔻 二錢

右為末糊丸白湯化下

治水腫便祕尿閉

鬼茉莉根

大黃 各二錢

生姜

肉桂

牽牛子 各一錢

龍腦 七分

右為散白湯送下

又方

甘遂 一味為末白湯點服

治水腫壯熱大渴引飲

焰硝 一味為末白湯點服

治水腫腹滿大便秘結小便不利口渴引飲

菖蒲根 八錢

大黃 四錢

噎福栗酷

鬼茉莉根 各三錢

丁香 一錢五分

右燒酒浸一宿絞去滓飲服

又方

茴香 四錢

大黃

鬼茉莉根 各二錢

肉豆蔻

肉桂 各一錢

右為散溫酒送下

又方

茵陳 八錢

大黃 三錢

砂糖 二錢

右水煎一二沸瀉過去滓飲服

又方

大黃 四錢

茴香

甘松香

蘿蔔子 各二錢

甘草 一錢

右水煎去滓和薔薇花舍利別十二錢飲下

又方

接骨木花并嫩葉水煎下二沸漉過飲服

又方

鬼茉莉根 一錢為末

藤黃 二分為末

肉桂露水 二十四錢

燒酒 十二錢

右攪勻飲下

又方

茵陳二十二錢燒為灰入磁器內投燒酒百六十四錢攪和

澄置取灰汁布漉飲服

治水腫

鬼茉莉根

菖蒲根 各一錢

酒石鹽 二錢

右為末和白蜜以薔薇花舍利別四錢攪勻白湯送下臨卧

宜用發汗劑其方

阿片 一錢

龍腦 七分

右為散以香橙皮舍利別和勻葡萄酒送下

治水腫發汗方

香橙皮

龍膽

菖蒲根 各三錢

右水煎下二沸以薄荷舍利別和勻飲服

治水腫通小水

杜松子 白芥子 芫蕪根 各四錢

右件酒浸一宿濾過去滓加大黃舍利別二十四錢攪勻飲

下

又方

濱沃沒篤根 良姜 大黃 杜松子 各二錢

肉桂 茵陳 各三錢

右酒浸一宿絞去滓飲服

治水腫喘急

菖蒲根 土青木香 龍膽 各二錢 砂糖 三錢

右水煎去滓加蜀葵根舍利別四錢和勻飲下

又方

濱沃沒篤根 十六錢 醋 百二十四錢

右入壺內密封烈日中曝之引出藥氣布漉去滓臨服加燒

酒或肉桂露水少許飲服

又方

濱沃沒篤根 六錢 蘆薈 益智 各二錢

右為末蜜丸白湯送下

治水腫淹久難治寒熱往來

茵陳 十六錢 龍膽 菖蒲根 獨活 各八錢

月桂皮 四錢 杜松子 十二錢 胡蘿蔔子 六錢

右件酒浸一宿絞去滓飲服

治水腫開肝脾閉塞利蓄水

蘆薈 二十錢

牽牛子 四錢

藤黃 七分

右為散以薔薇花舍利別為丸白湯送下

治水腫汚液病強運行利小便

白芷

水楊梅根 各四錢

薄荷 二握

酒石鹽

旋奈葉 各三錢

右酒浸一宿布漉去滓飲下

又水銃方

人尿

六十四錢

焰硝錠

篤耨香 各二錢

雞子黃 一箇

又右攪勻以水銃射腸中

水腫因粘液者此方主之

茵陳

龍膽 各四錢

杜松子 八錢

大黃 三錢

酒石鹽 二錢

右酒浸一宿漉過飲服

水腫因諸毒內攻者此方主之

車前草

蠶豆 各四錢

右以水百二十八錢煎減半為度布漉去滓加琥珀末二錢

和勻飲服

又方

琥珀油 十滴

沃君栗曠吉栗 三分為末

右和勻以葡萄酒送下又以燒酒或茴香露水服之亦可

又方

琥珀油 十滴

茴香露水 三十二錢

右攪勻飲服

治水腫腹滿

取玲瓏硝石石灰水浸置文火煮浸布來溫蒸腹上又取人尿以水銃射腸中充効

治水腫罨熨劑方

茵陳

薄荷 各一握

薔薇花 二握

肉桂

乳香 各二錢

右為粗末以麥餅中心及葡萄酒少許相合作錠文火炒來熱罨熨患部冷則更換

治陰囊陰莖及足跗腫滿蒸湯方

芸香

茵陳 各一握

接骨木花 半握

明礬 八錢

右水煎去滓浸棉布蒸湯患部

又方

燒酒 九十六錢

香橙自然汁 四十八錢

右攪和文火煮浸布蒸湯患部

泄瀉其色如_ハ泊夫藍浸水或如_ハ鐵銹或如_ハ赤石脂者惡候遂至_レ殞命

酷烈諸病泄瀉綠色或帶_ハ蒜臭者延纏累日遂致_レ不救

患_レ泄瀉則小便通利少

孕婦患_レ泄瀉則易_レ流產

老人泄瀉者甚危

小兒臨_レ齒牙將_レ芽出之時患_レ泄瀉者吉兆也

治泄瀉飲食不化腹滿絞痛

茵陳_二十二錢_一 良姜_二八錢_一 石菖根 香橙皮

枸櫞皮_二各六錢_一 龍膽 肉桂_二各五錢_一

丁香_二二錢_一 燒酒_二三百六十四錢_一

右入磁器內置_レ温處引出_レ藥氣布_レ漉去滓飲服

治諸般泄瀉

大黃 白檀 肉桂_二各二錢_一 訶子_二一錢_一

右為散白湯送下

又方

大黃_二二錢為末_一 鬼茉莉根_二一錢為末_一

肉桂露水_二三十二錢_一 燒酒_二十六錢_一

右攪和飲下

又方

薔薇花舍利別_二六錢_一 肉豆蔻_二二錢為末_一

右攪和飲下

又方

赤石脂 十六錢
肉桂 八錢
亞臘邲藥 均 四錢

葦菴 二錢

右為散白湯送下又加阿片少許亦可

又方

赤石脂 四錢
阿片 一錢

右為散白湯送下

又方

麒麟竭 一兩為散白湯送下

又方

肉豆蔻炒為末以葡萄酒送下

又方

阿仙藥為末白湯點眼

又方

乳香八錢以水二百五十六錢煎至半分為度漉過飲服

泄瀉因酸收液者此方主之

藿香露水 肉桂露水 各二十四錢
阿片 七分

鹿角屑 二錢為末
肉豆蔻 一錢為末

右攪和飲下

又方

沃君栗 曠吉栗 四錢
乳香 二錢
龍腦 一錢

右為散白湯送下

又方

赤石脂

白檀

各四錢

乳香

二錢

砂糖

八錢

右搗羅為末白湯送下

泄瀉因風氣者此方主之

樟枝

二十四錢

水五百十二錢

右煎減半為度布漉去滓加肉桂露水十二錢攪勻飲服日

五六次

腹肚絞痛完穀下利因喫生冷瓜果等物者此方主之

乳香

大黃 各二錢

右為末温酒送下

又方

車前子 十錢

肉桂 三錢

右水煎下二沸瀉過飲服

又方

車前子 三錢

肉豆蔻 二錢

右為散白湯送下又加大黃末一錢亦可

治完穀下利去腸胃酸液

次君栗曠吉栗

肉豆蔻 各四錢

右為末白湯送下

又方

雞卵酒和加肉桂末砂糖等分攪勻飲下

治腸中不化完穀下利

沃君栗曠吉栗 四錢

蘆薈

沒藥 各二錢

洎夫藍 七分

砂糖 四錢

右為散白湯送下

下利頑固證或酸液滿溢腸中或小兒諸病因酸液者此方主

之

石灰 十六錢

亞臘燐藥均 四錢

右以水三百六十四錢煎至二百二十四錢為度瀝過去滓

和肉桂露水十六錢砂糖六錢飲下

治灰白利乳糜利

薔薇花

茴香 各八錢

砂糖 四錢

右水煎下沸瀝過飲服

治小兒腹痛下利

沃君栗曠吉栗

乳香 各三錢

右為末以蜜和勻白湯送下

又方

藿香露水

肉桂露水 各十二錢

乳香 二錢為末

右攪勻飲下

又方

雞卵殼 二錢

鹿角屑 一錢

右為散白湯送下

又傳藥方

藿香露水 八錢

肉豆蔻油 八滴

燒酒 六錢

脾藏閉結無赤痢者良候也然尋發水腫者死候也

赤痢雜黑胆汁身體不安者死候也

赤痢雜片肉者死在旦夕矣

赤痢吃逆呼吸短促者瀕死必發鵝口瘡

赤痢發鵝口瘡者不治死

赤痢吐蛇蟲者死候也

赤痢無發酷烈諸病及痘瘡者遂至殞命

赤痢無發咽喉腫痛者死

赤痢妨飲下者死

赤痢兼腸不仁或寒脫疽者死

赤痢初起舌胎白黃爾後如附黑痢振寒發熱如燒者其證日

以加重遂至危急

赤痢必有尿閉為惡候

悲憂勞心之人患赤痢則難治

赤痢發黃則必止

妊婦患赤痢則致墜胎

用吐涎劑發赤痢腹痛者必死

下血稀薄發壯熱者甚危

下血雜稀膿帶惡臭者腸中生癰之候也

昏瞤不覺下粘血者死候也

下血因吞毒者必發搐搦死在頃刻矣

熱病時疫黑血下利者死

頭創多下血

下血些少者，可知泄出於腸間膜絡也

治赤痢裏急後重膿血兼下

車前草露水 九十六錢 大黃 十錢為末

右攪勻飲下

又方

大黃 三錢 檳榔子 二錢 鹿角屑 一錢

右搗篩為散，以車前草露水送下

又方

檳榔子 十二錢 訶子 六錢 乾葡萄 五錢

右水煎瀘過去滓，加肉桂露水八錢，砂糖四錢，攪勻飲下

又方

大黃 茴香 各十錢 沃君栗 曠吉栗 三錢

右為散，燒酒送下，每服自一錢至二錢

治赤痢血痢膿痢

胭脂草葉 連錢草 各一握 笈枯草 半握

鹿角屑 十二錢

右水煎取百十六錢，加肉桂露水八錢，阿仙藥末六錢，攪勻

飲服

又方

胭脂草 大陽煎 三十二錢 藿香露水

肉桂露水 各八錢

右攪和飲下

胭脂草太陽煎方 胭脂草新鮮者八錢紫苑四錢白苾菜二錢燒酒六十四錢入壺內固封烈日中曝之去滓收貯治赤痢下血腹痛

楤梲 三錢

肉豆蔻

車前子 各二錢

右為散以車前草露水飲下

又方

車前草露水 二十八錢

沃君栗曠吉栗 為末

大黃 為末各二錢

罌粟殼舍利別 八錢

右攪和飲下

又方

赤石脂

肉桂 各八錢

亞臘邨藥均

發休 各四錢

葦菰 一錢

右為末白湯送下又加阿片七分亦可

又方

赤石脂 四錢

阿片 二錢

右為末白湯送下

又方

麒麟竭

大黃 各三錢

右為散白湯送下

又方

車前草露水 三十二錢

薔薇花露水 二十四錢

麒麟竭 為末

赤石脂 各四錢 為末

石榴皮 二錢 為末

右調和飲下

又方

大黃 四錢

石榴皮

上好茶 各三錢

右水煎下二沸漉過飲服

又方

杜松子

肉豆蔻 各四錢

右為末蜜和白湯送下

又方

黑泥灼的里亞加 四錢

汝君栗曠吉栗 二錢

右調和溫酒送下

又方

反鼻 六錢燒為霜

洎夫藍 二錢為末

蜜 三十二錢

右攪勻溫酒送下

又方

明礬 肉豆蔻 各四錢

右為散以車前草露水飲下

又方

梨木皮並葉水煎漉過飲服

又方

車前草露水 二十四錢

薔薇花露水 十二錢

楳梲 為末

石榴皮 各二錢 為末

右攪勻飲下

又方

石榴皮 十錢

麒麟竭

赤石脂 各五錢

右為末以車前草露水飲下

治赤痢下血腸癰及胸膈諸患

膽八樹油 八十二錢

篤耨香

黃蠟 各三十二錢

白檀 六錢為末

先將油與蠟入沙鍋內文火溶化次入篤耨香白檀攪和

火候冷收貯每服自七分至二錢

治下血赤痢

蘆薈

麒麟竭

石榴皮

罌粟殼

各四錢

右為末白湯送下

治赤痢壯熱口渴引飲

大黃

焰硝 各四錢

右為末白湯送下

治赤痢裏急後重水鏡方

芸香煎汁 四十八錢

篤耨香 四錢

雞卵一箇

沒藥 二錢為末

乳香 一錢為末

薔薇花露水 二十四錢

右攪勻以水鏡射直腸

又方

薔薇花 一握

地黃

酸模根 各八錢

罌粟殼 四錢

右件以水百六十四錢煎至百錢為度布漉冷温適宜以水
銃射腸中

又方

大麥煎汁 六十四錢

沒藥 為末

乳香 為末

赤石脂 各二錢 為末

右攪勻以水銃射直腸

又方

人乳汁 八十四錢

篤耨香 八錢

雞卵 二箇

右攪勻以水銃射直腸

治赤痢延纏難治裏急後重脫肛翻花

取篤耨香置炭火上薰肛門大效

又方

煙草 野菊花 各十錢

右水煎蘸布乘温敷蒸肛門

和蘭醫方纂要二之上終

春和樓藏



明治五年申晚春閱

石峯居士毅



