



和蘭醫正方集要

三之下

ヤ 4  
1433  
4



和蘭醫方纂要三之下

病門目次

痔 痔漏 脫肛

便秘

淋 腎痛 石淋

尿血

遺尿

尿閉

子宮衝逆 子宮諸病

經閉

帶下





鬱病為內痔出血則有大益

發狂內痔出血過多者不日復故之候也於發狂熱亦然  
脾病為內痔出血者尋可治之候也

胸脇痛肺藏焮痛外痔出血過多者吉兆也不日向康復

痔漏者肛邊生癰膿血流出膿孔穿臀貫腸不斷漏泄乎稀水  
汚液也

脫肛者直腸之細絡與括約筋為弛縱為麻痺突出肛外也其  
因下利久不止或赤痢後重或便秘努責所致也

治諸痔出血不止

阿仙藥 三十二錢

燒酒 三百二十四錢

右入壺內密封烈日曝之每時轉旋布漉去滓飲下

治諸痔焮痛赤腫

硫黃花 一錢

雞子黃 一箇

野菊花油 二錢

右攪勻塗肛門

又方

蛇脫皮燒為末和牛酪塗之

又方

阿片 一錢

雞子黃 一箇

右和勻塗之又和軟膏貼之亦可

又方

石灰水加龍腦少許蘸綿布蒸患部

又方

白蒺藜和胡麻油杵爛如膏塗之

又方

雞子白一箇 膽八樹油二錢 牡蠣二錢為末

右和勻塗之

又方

雞子白一箇 砂糖一錢 胡麻油四錢

右和勻塗之

又方

雞卵油二錢 篤耨香 硫黃花各一錢

龍腦五分為末

右和勻塗之

又方

葱一握杵爛浸胡麻油文火煮作膏塗之

治痔疾脫肛下血

麒麟竭 珊瑚 赤石脂 明礬各一錢

右為散以薔薇花露水送下

又方

硫黃一錢 琥珀五分

右為末和白蜜白湯送下

治脫肛諸痔

煙草葉八錢杵搗 猪脂四錢 龍腦一錢為末

右和勻貼之

又方

煙草葉三握 水二百錢

右煎布漉來溫蒸肛門

又方

獨活四錢 石榴皮二錢

右二味醋煎洗之

治脫肛子宮突出

楤櫟一味水煎乘溫蒸患部

脫肛因赤痢便秘者此方主之

野菊花 接骨木花 茵陳各一握 茴香八錢

右酒煎加入乳汁三分之一乘溫蒸漏之

又方

月季花十錢 醋三十二錢 水九十六錢

右煎浸布來溫蒸之

又方

乳香 篤耨香 番瀝青各四錢

右件和勻置炭火上薰肛門

又方

松脂為末布片包定浸胡麻油推入直腸又撒炭火上薰肛門亦可

又方

牛酪四錢 硫黃花二錢 龍腦一錢為末

雞子白 一箇

右和勻塗之

去肛門癢痒

車前草露水和明礬末少許洗肛

治痔漏脫肛

鉛粉為末醋浸一宿和膽八樹油少許塗之

又方

馬蹄撒炭火上薰肛門

治痔漏久不愈者之方

拔律殺沒警律匪坑和燒酒塗之

治痔漏膿孔深蝕多腐肉者之方

沒藥 二錢為末

蘆薈 一錢為末

燒酒 七十二錢

右和勻冷温任意以水銃射腸中及膿孔

治痔腫痛汚血填滿者捕水蛭安于肛邊使吸出惡血大效

便秘

便秘者有因多血粘液或醋厲液風氣者或有因腸中乾燥及衰弱者

治便秘因多血粘液醋厲液者之方

牽牛子 鬼茉莉根 各三錢 酒石鹽 二錢

右為末白湯送下

又方

旋柰葉 四錢 茴香 二錢

右水煎一二沸瀝過飲服

又方

旋柰葉 十六錢 鬼茉莉根 骨碎補



茴香 各四錢

右為末以葡萄酒送下

又方

乾葡萄 二十四錢

鬼茉莉根

牽牛子 各六錢

酒石鹽 四錢

右搗羅為末以薔薇花露水飲下

又方

白桃花舍利別 四錢

大黃為末

蘆薈為末各一錢

右調和白湯飲下

又方

胡麻油 二十四錢

焰硝 三錢為末

蜜 十二錢

右攪勻以水銃射腸中

又方

石鹼 十六錢

麥酒 八十錢

右攪勻以水銃射腸中

治便秘因風氣及衰弱者之方

鬼茉莉根 二錢為末

大黃 一錢為末

丁香油 十滴

燒酒 六十四錢

右攪勻飲下

又方

肉桂 茴香 各四錢

大黃 二錢

砂糖 一錢

右為末白湯送下

又方

茴香露水 八十錢 食鹽 十六錢 雞子黃 二箇

右攪和以水銃射腸中

又方

煙草水煎取八十錢和雞卵二箇以水銃射腸中

又方

薔薇花露水 百錢 胡麻油 三十錢 食鹽 十五錢

右攪和以水銃射腸中

治小兒腹滿便秘

旋奈葉 四錢 乾葡萄 三錢 肉豆蔻 二錢

右搗篩為散以溫酒送下

又方

鬼茉莉根 一錢為末 肉豆蔻 七分為末

茴香露水 十二錢 燒酒 六錢

右攪勻飲下

又方

蘆薈 牽牛子 各一錢

右為散糊丸白湯送下

又方

大麥煎汁 十六錢 食鹽 三錢 牛酪 四錢

右和勻以水銃射腸中

又方

鬼茉莉根 一錢為末

茴香露水 二十四錢

右攪勻飲下

淋 腎痛 石淋

淋者自尿道機栗律滴滴不斷流出乎稀水粘液小便澁痛無以痒欲去不去不去復來

○腎痛者腎藏薄膜與神機經為焮熱為疼痛也其痛初起于腰引脇腹及陰處蓋此證有因焮腫者有因石淋者又有婦人因子宮衝逆者

○石淋者血中為土質之物與鹹液相聚雜油與鹽而成也蓋其物生腎銖輸諸膀胱從尿道而出來其石有圓者有扁者有長者有短者有硬者有軟者有滑澤者有糙澁者有枝岐者其色有赤有黑有黃有灰白又取其石為末則恰如赤石脂末之狀也

淋痛久不愈吐下者必自疝而發起

淋痛不可忍者生石之兆也多自疝而發起

勞力作強之人復時多易發淋痛尿血

孕婦淋痛久不愈者必墜胎否者死胎之兆也

腰痛如斷壯熱煩渴惡心嘔吐小便淋瀝熱瀉其色赤且帶惡

臭者腎痛因蚘腫之候也

腰痛不可忍嘔吐惡心股膝麻痺小便澁痛其色帶赤且尿壺

中生粘液及如細毛者腎痛石淋之候也

腎痛因粘液者小便白色多粘濁

腎痛淋痛多自疝而發起

當肋骨股骨而大熱重痛惡心噉氣嘔吐吃逆四肢厥冷惡寒

發熱小便熱瀉者腎藏蚘痛熱腫之候也

腎膀胱之諸患於老人難治

腎痛因子宮衝逆者小便通利過多其色黧淡不熟

腎癰者可知險證也又因子宮衝逆者雖不至危難治

患腎痛石淋憂鬱病發痔血者吉兆也

漩面浮泡沫者腎痛歷久不愈精力衰憊之候也

患石淋者多耳聾在自疝而發者則無有之

患石淋者口舌乾燥引飲過多

石淋腎痛年高者多患之幼弱者少患之

石淋疼痛歷久不愈發熱嘔吐身體消削者可知險證也多兼

尿閉或神機經病遂致不救

石淋四肢厥冷津々冷汗出尿閉涓滴不得者死

腎藏生石其形岐分其實堅硬者險證百出遂至殞命

石淋有罌丸孳縮或鉄破者

石從腎藏而來者其色赤黃

石從膀胱而來者其色灰白

石生膀胱而大者當會陰肛門覺車墜

石淋者其尿清澄而通利少或小便如血且砂石沈着壺底

小便通利過多浮油者石淋或急卒病之兆也

石淋其尿稀薄如水利細砂小石其色赤者不日復故然其尿

稠濁者延綿難治之候也

小便淋瀝火熱莖中腫痛因辛峻液者此方主之

亞臘呷藥均 四錢

甘巴且杏 三錢

砂糖 二錢

右搗羅烏散以太麥煎汁飲下

又方

篤耨香 四錢

大黃 二錢為末

砂糖 四錢

右和勻為丸白湯送下

又方

蜀葵根 八錢

甘草 四錢

麻人 二錢

右三味以大麥煎汁百九十二錢蜜十六錢煮布漉去滓和

焰硝末二錢飲下

又方

膽八樹油

胡麻油 各八錢

砂糖 隨宜

右攪勻飲下

又方

沃君栗曠吉栗

焰硝各三錢

龍腦一錢

右為散白湯送下

小便淋瀝因血熱者此方主之

焰硝 三錢為末

大麥煎汁 三十二錢

右和勻飲下

又方

三七草根

金剛刺根各十六錢

無花果七顆

右水煎漉過取二百二十四錢加連錢草露水二十四錢攪勻飲下

又方

石灰百錢水一外相和文火徐徐煮下火待冷取澄汁以紙濾過加砂糖飲下

膿淋雜血莖中腫痛罽丸孿縮者此方主之

篤耨香 八錢

萍蓬草根 為末

甘草 為末各四錢

右攪和為丸白湯送下

又方

篤耨香 四錢

鹿角屑 三錢為末

萍蓬根 為末

蚤休 為末各二錢

右攪和為丸以太麥煎汁化下

又方

乳香 四錢 阿仙藥 二錢

右為散白湯送下

治膿淋血淋莖中焮痛

薔薇花露水 車前草露水 各三十二錢

鉛白砂 五分

右攪勻以水銃射尿道

又方

大麥煎汁 人乳汁 薔薇花露水 各十六錢

右攪勻以水銃射尿道

又方

鵝岬草露水 十六錢 拔日栗均膏 二錢

雞子白一箇

右和勻以水銃射尿道

治腎痛小水淋瀝及膀胱諸患

蜀葵根 甘草 各十六錢 蜀葵葉 三握

地榆 四錢

右四味水煎去滓加砂糖百錢慢火熬為舍利別白湯送下

又方

荷蒿花 接骨木花 各五錢 杜松子 三錢

右水煎灑過去滓加阿片少許飲下

腎痛因汚液者此方主之

次君栗曠吉栗 三錢 焰硝錠 二錢 泊夫藍 五分

右為散和杜松子油二十滴白湯送下

又方

拔律殺沒醋把乙巴二錢 雞子黃一箇

大麥煎汁 六十四錢 砂糖 四錢

右攪勻飲下

腎痛石淋因粘液者此方主之

杜松子 大麥 各十錢

右水煎漉過去滓加噎福栗醋末六錢攪勻飲服

又方

香橙自然汁 十六錢 肉豆蔻 二錢為末

沃君栗曠吉栗 一錢為末 砂糖 四錢

右調和飲下

又方

亞臘藥均 六錢 砂糖 三錢

右為散白湯送下

又方

拔律殺沒醋把乙巴和砂糖白湯送下

又方

肉豆蔻 二錢 雞卵殼 琥珀 各三錢

石鹼 二錢

右為散白湯又人乳汁送下

治腎痛石淋尿血



蜀葵根 大麥 甘草各八錢 罌粟殼六錢

右水煎去滓以牛酪十六錢和勻飲下

治石淋腎痛膀胱腰痛

篤耨香 四錢 肉豆蔻 為末 砂糖各二錢

右和勻為丸以大麥煎汁飲下

又方

篤耨香一味為丸甘草末為衣以蜀葵根煎汁送下

利小便去酸液下砂石

蜀葵根 錦葵葉 各三錢 赤小豆 二十錢

無花果 三顆 大麥 十六錢 甘草 六錢

右水煎漉過去滓飲服

治結石在膀胱抑壓尿道小便不利

火焰菜自然汁 六十四錢 枸櫞自然汁

巴且杏汁各三十二錢 砂糖 二十二錢

燒酒 五十六錢

右攪勻飲服

治石淋小便不利或水腫

蜀葵根 甘草 各八錢

右水煎去滓以焰硝末亞臘碎藥均末各二錢攪勻飲下

石淋因腐壞液者此方主之又治肺藏諸患

山歸來 三七草根 蜀葵根 甘草 各四錢

連錢草 龍芽菜 芸香 各一握 無花果 六顆

乾葡萄 八錢

胭脂草花 半握

茴香 六錢

右水煎漉過以沃君栗曠吉栗末四錢攪勻飲下

又方

乾葡萄

大麥

茴香

甘草 各四錢

右水煎漉過去滓飲服

治石淋腎痛水鏡方

蜀葵根

芸香

荷蒿花 各半握

茴香 二錢

右水煎漉過加蜜十六錢膽人樹油十錢攪勻以水鏡射尿道

道

又方

野菊花煎汁

人乳汁 各二十錢

蜂蜜 十錢



右攪勻以水鏡射尿道

治石淋腎癰膀胱癰小便不利莖中焮痛

茴香露水 六十四錢

篤耨香 四錢

雞子黃 二箇

右攪勻以水鏡射尿道及直腸

又方

茴香

蜀葵葉 各一握

獨活 四錢

右水煎取六十四錢以芸香露水二十四錢食鹽二錢攪勻

以水鏡射直腸

又方

牛乳汁 六十四錢

食鹽 四錢

巴且杏油 八錢

右攪勻乘溫以水鏡射直腸

又方

車前草露水 三十二錢

蘆薈一錢為末

龍腦五分為末

右攪勻以水銃射尿道。

又方

雞子白 一箇

人乳汁 十錢

楳梲 二錢為末

赤石脂 一錢為末

右攪勻以水銃射尿道。

治腎痛石淋腰痛。

葱丁味煨盛布囊乘溫熨熱痛處大效。

尿血

尿血者有因酷厲液者有因痔血月水之閉塞者有因腎膀胱之跌損者

尿血無腰痛者從腎藏或尿道而來

尿血無小腹絞痛者從膀胱而來

過房後小便雜血者可知發險證也

腎膀胱之病小便黑色全身發熱者惡候也

小便白濁血為片塊帶臭氣者從膀胱及尿道而來其證小腹

絞痛引于會陰股腠又婦人如此證其血沈著壺底者月經自

子宮絡隨小便通利而漏來之候也

尿中見如細毛者酷厲液填滿腎藏之候也

尿血因醋厲液腎絡破綻者此方主之

篤耨香 四錢

雞子白 二箇

右和勻溫酒或白湯送下

又方

石鹼 八錢

沃君栗 曠吉栗

硫黃花 各二錢

右為末糊丸空心白湯送下

治尿血

大麥

蜀葵根

甘草 各八錢

罌粟殼 五錢

右水煎漉過去滓加牛酪八錢攪勻飲下

又方

車前草為舍利別白湯送下

又方

車前草 三握

楳梲 四錢

砂糖 三錢

右水煎去滓和太麥煎汁三分之二飲下

又方

石榴皮 二錢

赤石脂 一錢

阿片 三分三厘

右為散白湯送下

小兒尿血不能服藥者此方主之

葡萄汁 八錢

蘆薈 四錢為末

牛膽 二錢

右攪和攤棉布敷心下及臍上

遺尿

遺尿者不覺小便通利也其所以因膀胱與尿道之括約筋為衰  
弱麻痺故也又有因酷厲液或石淋者

失氣昏冒眩暈癩癩搗搦咳嗽等證多遺尿

汚液填滿頭腦遺尿者難治

諸般酷烈病大便自利遺尿者精力衰憊之候死在旦夕矣

膀胱尿道之括約筋為衰弱遺尿者此方主之

明礬 砂糖 各六錢

右為散和入乳汁飲下

又方

阿仙藥 三錢 水 三十二錢

右煎沸瀉過空心飲服

又方

櫟葉 車前草 各一握 月季花 半握

右件水二百六十四錢煎至百八十錢為度 蘸布來溫蒸小腹及隲處

尿閉

尿閉有真假二證所謂真也者謂膀胱及尿道為閉塞不得通利也假也者謂腎鉢失度或自腎傳輸諸膀胱之水管為物所障礙而不得通利也蓋其證壯熱發汗頭痛耳鳴口渴引飲四肢倦怠不寐譫語小腹緊滿渾身浮腫大便祕結

直證者易治然至其甚則遂致不救

真證者當下腹隲處為腫脹假證者否

假證者渾身發汗帶惡臭

假證必無腰痛若無之者腎鉢細絡為麻痺之候也

假證發吃逆昏冒搐搦且冷汗出者死在旦夕矣於直證亦然

開腎膀胱閉塞利小便

○尿閉

杜松油 琥珀油 各五滴

篤耨香油 七滴

右和勻白湯送下

又方

亞臘邨藥均 四錢

焰硝 二錢

右為散白湯送下又癩毒初起用之尤効

又方

琥珀油 四滴

沃君栗曠吉栗 五分為末

右和勻温酒送下

又方

沃君栗曠吉栗 為末

大黃 為末各一錢

琥珀油 六十滴

右和勻白湯送下

又方

雞卵殼燒為末温酒送下

又方

鵲腦陰乾為末温酒送下

治尿道衰弱小便不利

洎夫藍為末蜂蜜和勻白湯飲下

又方

月李葉為舍利別和雞子黃飲下

尿閉因醋蘆液者此方主之

杜松木皮

水煎布漉文火煮作舍利別十錢

鬼茉莉根 為末四錢

肉桂 為末

胡蘆巴 為末各三錢

大黃 為末二錢

砂糖 六錢

右攪勻白湯送下

又方

篤耨香 四錢

白膽礬 一錢

右和勻為丸砂糖湯送下

尿閉因石淋膿淋者此方主之

篤耨香 八錢

甘草 烏末四錢

右和勻為丸以茴香露水送下

尿閉因播擲者此方主之

罌粟殼煎汁和人乳汁飲下

治尿閉

野菊花 二十錢

雞卵 二箇

沒藥 烏末四錢

右和勻盛布囊入沙鍋內酒煮取出乘溫熨熱小腹腰背

又方

葱根杵爛和猪脂雞卵塗小腹

又方

石腦油和燒酒塗小腹

婦人尿閉諸藥無効者此方主之

錦葵葉

茴香

連錢草 各十錢

右水煎漉過加入乳汁三分之一乘溫蒸小腹又以水銃射

尿道亦可





野菊花

零陵香

茴香 各三錢

右水煎一二沸瀝過飲服

又方

香橙皮露水 三十二錢

麒麟竭 一錢烏末

麝香 二分

右調和飲下

治子宮衝逆強頭腦益精氣

肉桂露水 三十六錢

安息香 一錢烏末

麝香 一分

右調和飲下

治子宮衝逆搐搦及張

鹿角精白湯點服

又方

鹿角精

琥珀油 各十滴

右和勻白湯送下總揮發香臭之劑為要

又方

剛鐵屑

右一味為散白湯送下

子宮衝逆脾胃閉胃虛生風氣者此方主之

丁香大陽煎 百錢

膽礬精 一錢五分

右攪勻飲下每服自十滴至二十滴

丁香大陽煎方 丁香十六錢燒酒二百六十四錢入壺內固封烈日曝之布漉收貯

醫方彙編

卷三

○子宮衝逆

三十三

治子宮衝逆腹滿癢急眩暈頭痛

丁香露水 百二十八錢

阿魏 十六錢 烏末

右入壺內固封烈日曝之漉過飲服

治子宮衝逆便秘腹滿

阿魏 四錢

沒藥

石鹼 各二錢

蘆薈 一錢

右為散蜜丸白湯嚥下

治子宮衝逆苦惱腹滿及子宮諸病開閉塞且臨產遲努張之勢

龍膽

良姜

杜松子

沒藥 各四錢

獨活 二錢

肉豆蔻 一錢五分

洎夫藍

龍腦 各一錢

酒石鹽 六錢

右為粗末入壺內投燒酒二百錢固封置溫處布漉去滓飲

服

治子宮衝逆

亞臘椰藥均 十二錢

龍腦 一錢

砂糖 八錢

醋 百二十八錢

右件先以燒酒六七滴和龍腦摩研又亞臘椰藥均水溶次

下餘藥攪勻飲服

治子宮衝逆經水不來

藿香

野菊花 各十錢

右剉盛布囊入鍋內水煮取出來溫蒸腹上

治子宮衝逆脾藏閉結

野菊花 八錢

茴香 六錢

又方 右二味水二百錢煎減三分之一為度以水銃射陰門中

艾葉 野菊葉 紫蘆葉 芸香各一握

獨活子 胡蘿蔔子 各八錢

右水煎漉過取百二十錢加芸香油八錢篤耨香二錢和勻  
蘸布罨蒸小腹及陰門

又方

芸香油 八錢 篤耨香 二錢 龍腦 一錢

右和勻塗紙撚條挿入陰門或攤棉布貼臍上

又方

硫黃灰攪炭火上燒薰入鼻中

又方

胡枌為末吹入鼻中發嚏為良煙草亦可

治子宮諸病開閉塞

芍藥 琥珀 沒藥各八錢 良姜 六錢

月桂葉 丁香 各一錢 龍腦 洎夫藍 各五分

右剉入磁器內投酒二百六十四錢熟灰上置引出藥氣布  
漉去滓飲下

又方

細辛一味水煎漉過加鐵粉末少許飲服

治子宮諸病

杜松子 茴香 各八錢

右水煎一二沸瀝過飲服為婦人諸病之要藥

又方

琥珀、太陽煎充効 方見中風門

治子宮癰腫及血塊

骨碎補 荳蔻菜 各二錢

梅肉

大黃 各一錢

右水煎一二沸瀝過飲服

去子宮惡液粘液散風氣

土青木香 六錢

沒藥 三錢

胡枳 一錢

右為散白湯送下

又方

蜀葵根 八錢

蚕休 三錢

右水煎一二沸瀝過飲服

治子宮結硬或癰腫癌腫

龍腦 五分為末

殺律亞律沒牟亞失 三分

海鹽水 八十錢

右攪勻以水銃射子宮內

又方

醋 八十錢

鉛白砂

龍腦 各一錢

右攪勻以水銃射子宮內又浸布來溫罨蒸小腹亦可

又方

薔薇花露水 三十二錢

雞子黃 一箇

鉛白砂 一錢

右攪勻以水銃射子宮內

治子宮水腫

殺律亞律没牟亞失 三分

洎夫藍 五分

右為末白湯送下

治子宮挺出

無花果

胡蘆巴

大麥 各十錢

右水煎漉過浸布乘溫蒸漏腹上及陰戶

又方

石榴花為散摻患部

又方

楹棹

罌粟殼各等分

右水煎浸布乘溫蒸陰戶

經閉

經閉者有因血液不足者有因多血粘稠者有因粘液閉子宮  
絡者有因子宮口閉結者其為證面色青白四肢懈惰惡心嘔  
吐飲食無節或嗜異味喫泥炭衄血吐血牙齒痛心下痞滿腹  
脹羸痛

經水不來則大便必祕結

經水初來也雖隨風土由性質而異期大率其歲始於十三十

四十五十六終於四十六四十八五十五十一歲

處女壯婦雖月水多寡不同大率其量自百二十八錢至百四

十八錢為律

月水將來之期處女於月上弦壯婦於中旬老婦於下弦

處女其血薄而少壯婦清而多老者稠而粘  
健康者其血一行大率自十錢至十二錢

壯婦無子經水不來者大率患血吐血尿血痔血  
勞力作強者雖經水不來無大害

經水將來不來者腰脚疼痛陰戶變急或小腹膨脹雷鳴放屁  
是子宮經脈閉塞不循環故也

經閉瘦婦則因血不足肥婦則因血粘稠  
因子宮口閉塞而經水不來者小腹痛引腰脚臨交接佳境經

血與精液共通來必發眩暈惡心嘔吐心煩不寐  
治經閉腹滿脹痛

肉桂 沒藥 各八錢

右為末白湯送下

又方

鐵粉 八錢 沒藥 四錢 琥珀 二錢 丁香 一錢

右為末白湯送下

又方

鐵粉 十錢 沒藥 五錢 砂糖 二錢

右為散白湯送下

通月水去汚液粘液

接骨木嫩葉 八錢 海大藍 一錢

右酒煎飲服

治經閉水腫諸般閉塞

鐵粉 百錢

酒石鹽 六十四錢

右為散以雨水三百二十四錢和勻入鍋內煮攪轉不住手布漉去渣澄清黑膜生上面為度和砂糖百錢文火徐徐煮稀稠得所白湯送下

通經水治腹滿急

鐵粉 八錢

肉桂 二錢

丁香 一錢

右為散温酒送下

通經水去惡血

沒藥

琥珀 各四錢

殺律亞律沒年亞失 三分

右為散以肉桂露水送下

又方

鐵粉 八錢

生姜

砂糖 各四錢

右為散温酒又白湯送下

又方

鐵粉 八錢

肉桂

肉豆蔻 各二錢

砂糖 三錢

右為末温酒送下

又方

鐵粉 八錢

肉桂 四錢

大黃 二錢

砂糖 四錢

右為散白湯送下

又方

茵陳

野菊花 各半握

右剉酒二百六十錢浸一宿漉過去滓飲服又加泊夫藍二



分亦可

治經閉水腫開肝脾閉塞

鐵粉 十六錢

右一味為末燒至赤色為度加硫黃八錢以鐵匙攪和不住手硫黃金化至赤色為度下火待冷為散白湯送下

治經閉坐藥方

蘆薈 四錢

沒藥 二錢

噎福栗醋 三錢

右為末蜜丸肉豆蔻之大挿入陰門

帶下

帶下者自子宮口不斷泄出乎稀水粘液也此證歷久不愈則顏色灰白飲食不進惡心懊懣身體懈惰眩暈頭痛肌肉消削大便或下

稀水粘液為黃綠色陰戶生癰者深汚癰毒之徵也

白帶下雜黑濁液或粘液或血帶惡臭流出者血液腐敗或癰毒之徵也

白帶下者不拘年齡處女寡婦又無孕者多患之

勞力作強者患此證小閑居安逸者尤多患之

姪娠雙胎者多患之

小便見如白鱗屑者白帶下之候也

小便見白線條或小便白色稠塗沈著壺底者白帶下又子宮  
脆弱之候也

小便黃色或綠色見白線條者白帶下之候也又其尿不止者  
深癥毒發帶下之候也

治白帶下遺精

琥珀

麒麟竭

鬼茉莉根 各二錢

右搗篩為散白湯送下

又方

琥珀太陽煎尤効

方見中風門

治白帶下

藿香露水 三十二錢

大黃 為末

鬼茉莉根 為末 各二錢

右攪勻飲下

又方

篤耨香 四錢

大黃 為末

砂糖 各二錢

右和勻為丸白湯化下

治帶下陰戶痒痛

野菊花

藿香

大麥

蚕休 各四錢

右水煎去滓加枯礬末三錢浸布來溫蒸陰戶又以水銃射  
陰門又加石灰水十二錢亦可

崩漏

附脫血

崩漏之所由起有因多血粘稠者有因血薄少粘者或有因子  
宮絡衰弱失機者大率其證顏色灰白或青或白皮膚失澤全  
身浮腫精力虧脫失氣眩暈心悸苦惱肌肉消削  
崩漏脫血因多血粘稠者此方主之

車前草葉 五握

右一味以太麥煎汁煮去滓加砂糖少許飲下

又方

車前草 蚕休 各四錢

右為散溫酒送下

又方

麒麟竭 二錢 琥珀 車前子 奄休 各一錢

阿片 五分

右為散以月季花露水飲下

又方

月季花并葉 八錢 膽礬精 一錢 滾湯 二百五十錢

右浸一宿去滓加砂糖十六錢入壺內固封貯之

崩漏脫血及經行過多因血薄少粘者此方主之

罌粟殼 地黃 各六錢

右水煎瀉過去滓加麒麟竭末一錢龍腦五分薔薇花露水

二十六錢攪勻飲服

又方

乳香 赤石脂 鐵粉 各二錢 龍腦

鉛粉 沃君栗曠吉栗 各二錢 鉛白砂 二分

焰硝錠 一分七厘

右為散白湯送下

又方

明礬 阿仙藥 各三錢 石榴皮 六錢

右為散白湯送下

又方

山茱萸 六錢 楹梓 三錢 砂糖 二錢

右水煎一二沸瀉過去滓飲服

又方

阿仙藥 十錢

乳香

沃君栗曠吉栗 各一錢

龍腦 五分

阿片 三分

右為末白湯送下

又方

阿仙藥一味水煎去滓飲服

又方

明礬 三錢為末

月季花舍利別 八錢

香橙皮舍利別 四錢

右和勻白湯送下

崩漏脫血因子宮絡虛弱者此方主之

麒麟竭

赤石脂

珊瑚

明礬 各一錢

洎夫藍

龍腦 各五分

右為散以月季花露水送下

又方

洎夫藍 一錢

阿片 七分

右二味浸燒酒布漉去滓飲下

治崩漏脫血

取冷水和醋二分之一蘸布每時敷陰戶

妊娠 附產

流產者其一在質其二在胎其三因疾病其四因外傷蓋質也者謂強實多血或虛弱多粘液也胎也者謂胎氣虛脆或胎動不安也疾病也者謂惡液病寒熱病燥痛赤痢下血勞瘵咳嗽噴嚏搗搦也外傷也者謂打撲缺損自高墜下或驚愕忿怒悲憂或用通尿管峻下劑也

交接之後發齒痛者妊娠之兆也

經閉惡寒振慄惡心嘔吐者妊娠之兆也

試驗妊娠之法蜜水相和服之爾後發腹痛者妊娠之兆也否者非

流產不累月者輕易治累月者重發險證

嘔吐噴嚏咳嗽或大音叫號或高舉手或荷重或聞異臭則多易流產

登圍便秘努責或裏急後重者易流產

流產後發搐弱者必死

孕婦患醋烈病則必死

孕婦陰戶生癰者宜早從事於治臨產必發險證

孕婦小腹及陰戶冰冷每時振慄顏色青白者死胎之兆也

孕婦睡中乳汁自流出者死胎之兆也

孕婦患白帶下且泄出粘稠液其色黃帶惡臭者多易流產

孕婦月水漏來者安產之兆也可知胎氣充實也

孕婦乳汁滴出者胎氣脆弱之兆也然乳房堅硬者胎氣亦充

實之兆也

孕婦心悸動發熱眩暈氣乏者胎氣虛弱或死胎之兆也

胎氣虛弱與死胎者可知易產於充實者也

孕婦小腹及腰脚冰冷腹內重墜且從坐卧動履而胎動移轉

橫骨痛引鼠蹊眩暈昏冒大便秘結顏色黧淡眼膜鉛色乳房

低下或自子宮而泄出粘滑汁或血或惡臭物者死胎之兆也

孕婦心悸動頭痛者宜刺肘絡瀉血必不可刺脚絡

孕婦太便秘結小便不利者宜施水鏡法通尿劑

孕婦常用之使易產之方

肉豆蔻 肉桂 一角 白瑪腦 各一錢

右為散温酒送下

治惡阻病嘔吐惡心

肉桂露水 藿香露水 各十六錢 枸櫞汁 十二錢

香橙舍利別 八錢 乳香 二錢為末 膽礬精 八滴

右攪勻飲下

又方

月季花 藿香 砂糖 各一錢 香橙皮

草豆蔻 各一錢五分 石菖根 二錢

右為末以枸櫞汁八錢搗持舍利別六錢攪和飲下肉豆蔻

之大日五六次

又方

香橙皮 枸櫞皮 石菖根 搗棹 各三錢

右水煎一二沸瀝過去滓飲服

又方

藿香露水 枸櫞汁 各六錢 膽礬精 三滴

右攪勻飲下

去臨產腹痛催生

百合花露水 二十四錢 肉桂 四錢為末

洎夫藍 一錢為末

右攪勻飲下

又方

肉桂 沒藥 洎夫藍 各一錢

右為末温酒送下



又方

土青木香一錢 沒藥 胡椒 洎夫藍各五分

右為末温酒送下

又方

乳香 沒藥 琥珀各八錢

右為粗末燒酒浸一宿絞去滓飲服

又方

禹餘糧

右一味為末飲服強隔膜之力逞努張之勢

治臨產嘔逆不止

楤梲六錢 肉桂三錢 砂糖一錢五分

右水煎兩三沸瀉過飲下

又方

良姜八錢 香橙皮六錢 楤梲四錢

右水煎一二沸瀉過飲服

又方

雞卵一箇和酒以冷水噉下大効

去耳枕痛下惡露

芍藥花露水 接骨木花露水各三十二錢

沒藥四錢為末 龍腦一錢為末

右攪勻飲下

又方

月桂實并葉搗羅為末温酒又白湯送下

又方

芸香露水 茴香露水 各十六錢 月桂實為末

白芥子為末 生姜為末 各四錢

右攪勻飲下

又方

胡椒 四錢

右為末取雞卵二箇相和盛布囊入鍋內蒸之取出夾温敷腹及臍大効

下胞衣去惡露

蜀葵根 三錢 肉桂 二錢

右水煎一二沸瀝過飲服

又方

肉桂 三錢 海夫藍 一錢

右為末酒服又肉桂露水和海夫藍末或琥珀末少許飲下

又方

鰻鱧肝陰乾為末温酒送下

胞衣不下者施噎藥大効

治產後乳頭破裂

糊和砂糖文火煮攤布帛貼患處

又方

雞卵油和波藥末傳之

又方

拔律殺沒醋把乙巴塗之

乳房不和乳汁難利者燒酒隔火煮棗溫蒸乳房又溫手時々  
捻和乳房

乳汁不利者此方主之

茴香 四錢

水晶

蕪合香 各二錢

右為末白湯送下

又方

茴香燒酒浸一宿絞去滓空心飲服

預防流產方

焰硝 四錢為末

大麥煎汁 二十四錢

蜂蜜 十二錢

醋 十錢

右攪勻飲下

又方

楤梲舍利別 十二錢

肉桂 為末

砂糖 各二錢

右和勻白湯送下

又方

肉豆蔻

肉桂

砂糖 各四錢

右為散白湯送下孕婦血實強壯者宜刺肘絡瀉血

又方

月季花舍利別 八錢

麒麟竭 為末

珊瑚 為末 各一錢

右和勻飲下

產前便秘者是因胎子推湯<sub>ス</sub>直腸<sub>ヲ</sub>此方主之

硫黃

右一味為散白湯送下除腹熱利大便

又方

人乳汁 六十四錢  
胡麻人油 三十二錢

右攪和以水銃射直腸

和蘭醫方纂要三之下終

西村正高圖書

善和樓庫書



明治壬申晚昏悶

石峯家士穀



