

Inches
Centimetres
KODAK Color Control Patches
© The Tiffen Company, 2000
Kodak
LICENSED PRODUCT
Blue
Cyan
Green
Yellow
Red
Magenta
White
3/Color
Black
A
M
B


扶桑名家書畫
西京

ヤ4
1433
.5



WA
1431
5

和蘭醫方纂要卷之四

病門目次

瘟疫
熱病
瘧疾
痘
失苟律陪君病
痛風 脚氣
癮瘡
癩病
疥

91-1949

癰

癰腫　赤腫　金創　結硬腫
粘液腫　蝦腫　凍瘡

湯火傷

狂犬咬傷　蠱毒

閃挫　打撲　竹木刺

補虛

美濃　大垣　春齡菴江馬元弘　譯

瘟疫

夫瘟疫之爲病也天地間有非時不正之酸敗氣自膝理而侵入則著于皮裏機乘律從呼吸而遊溢則客于心肺二藏從飲食而傳襲則染于膽汁乳糜液其所侵之部各雖不同及其發病總是散漫血中而傳注固形諸部流動之血乃爲之腐敗運行之機因而阻礙故爲熱遂發凡百諸證也蓋瘟疫流行之時

有傳染者有不傳染者又傳染有遲速輕重不等是由稟賦不同與精力強弱也其證惡寒振慄壯熱如燒頭痛腰疼眩暈昏冒嘔血吐血舌胎黑或白且著粘液太渴引飲氣息惡臭嘔吐吃逆煩悶不寐甚則譫擲引上竄直視眼目茫然恰如死人呼吸促迫津々冷汗出手足厥冷大小便自利其脈沈數或不均或結促

於煙草鋪患瘟疫者少何則煙草能防疫氣之故也

瘟疫初起耳聾者惡候也又歷日耳聾者不日復故之候也

瘟疫發汗嘔血小便通利過多者熱毒解散之兆也

瘟疫大便下利者惡候祕結者良候也

瘟疫其脈與平常不異者可知其證向險重也

疫熱劇盛眼赤如鳩眼鼻流清涕口吐黑汁舌上燥涸譫語不止者大率爲死候如此證貼發瘟疫當九日十日十一日十二日發斑之徵尋向康復然發斑細小壯熱如燒小便不熟者死

瘟疫精力虛憊心悸怔忡眩暈昏冒者可知至危急也

瘟疫譫擲掣引失血下血且斑疹發于肘臂心下者惡候也

瘟疫發斑乍發乍沒乍發者可知向險重也

瘟疫發斑鉛色精力衰憊者惡候也

瘟疫疹發尿道臨通利爲煩痛者瀕死

瘟疫四肢厥冷額上鼻梁冷汗作至者瀕死

疫毒腫發於耳後咽喉煩痛妨飲下者大率不過六七日而向

死

疫毒腫發於耳後不過六時之間忽爲滿大者可知向險重也凡發疫毒腫及斑疹而胃痛不可忍者多致不救瘟疫小便黑色者死候也

解疫熱散惡氣

白芷　土青木香　欵冬根　香橙皮各三錢
茵蔯　龍膽各二錢　蘆薈一錢

右件酒浸一宿布漉去滓飲服冷温任意

又方

大蒜一顆　芸香　白菌菜各半握

右剉杵爛燒酒浸一宿濾過去滓飲服

又方

杜松子　代赭石各四錢

右搗篩爲散蜜和白湯化下肉豆蔻之大

又方

胡桃核二顆　無花果三顆　芸香一握

右杵搗如泥和酒少許白湯送下

又方

白芷一味酒煎漉過去滓飲服

治瘟疫惡寒振慄壯熱如燒或惡性熱

白芷　欵冬根各八錢　胡桃肉
芸香　野菊花各四錢

右水煎去滓飲服
治瘟疫壯熱如燒全身發紫斑黑斑飲食不進

茵蔯鹽七分　泊夫藍　龍腦各三分三厘
肉桂露水五十六錢

右攪勻飲服發汗爲佳

又方

月桂實二錢　泊夫藍七分

右搗羅爲末白湯送下

又方

白芷　菖蒲根　芸香　月桂實并葉各十二錢

右剉酒浸一宿以蒸露鏸取露水飲服

又方

白芷根　良姜各十六錢

右水煎濾過取百六十錢加肉桂露水十六錢泊夫藍末一錢攪勻飲服

又方

黑泥灼的里亞加以白芷煎汁飲下

治瘟疫口舌燥渴大渴引飲

車前草露水百錢　肉桂露水十六錢

阿仙藥大陽煎十錢　珊瑚爲末一錢　鹿角精十滴

右攪勻飲下

治瘟疫壯熱煩悶頭痛如劈口渴脣焦不欲飲食

白檀　薔薇花各十錢

右水煎一二沸濾過去滓加龍腦末一錢攪勻飲下

又方

焰硝二十錢　辰砂六錢

右爲散砂糖湯送下

治瘟疫惡性熟胸脇痛諸般腐壞液病

硫黄花六錢　蘆薈　沒藥各三錢

泊夫藍五分

右爲散温酒又白湯送下又蜜丸服可

又方

蘆薈　沒藥各八錢　泊夫藍二錢

右爲粗末入硝子壺内投焼酒三百錢熱灰上置引出藥氣去滓加硫黄精二十滴攪和飲服自三十滴至五十滴

治瘟疫嘔吐不止心腹膨滿不進飲食

茵蔯鹽一錢　藿香露水二十二錢　肉豆蔻油十滴

右攪和飲下又塗心下尤良

又方

藿香露水十六錢　肉桂露水八錢

肉豆蔻油十滴　珊瑚六分爲末

右攪勻飲下

又方

黑泥灼的里亞加一錢　茴香露水十二錢

杜松木油 五滴

右攪勻飲下發讋氣吞酸爲佳

治瘟疫煩躁苦悶不能瞓

葡萄酒 二十錢　肉桂露水 四錢　阿片 一錢

右攪和飲下

又方

阿片　龍腦 各七分

右爲末白湯點服

治瘟疫下血失血及胆汁腐敗

白檀　薔薇花 各二錢

甘松香 一錢

大麥 六錢

右件以酒及醋煎布濾去滓飲服

又方

薔薇花露水 百錢　膽礬精 三十滴

右攪和飲下

預防傳染疫方

薔薇花露水和黑泥灼的里亞加早旦空心飲下

又方

燒酒每時塗鼻孔尤良

又方

瓦磚火燒投燒酒使其蒸氣薰蒸室中尤良

熱病

夫熱病之爲因也人身所外發之惡氣乃天地間爲辛酸氣所
壅遏不得發泄于外而鬱蒸于內由是心藏及神機經之機關
失常度生粘液腐敗液及膽汁腐壞以散漫血中血液自爲沸
涌粘稠留滯遂爲熱之基也蓋熱病多端略舉其目曰劇盛熱
曰惡性熱曰腐壞熱曰連綿熱曰往來熱曰發狂熱是也熱病
之證惡寒發熱頭痛嘔吐不欲飲食舌胎黑或白煩躁苦悶譫
語狂妄大便或下其脈洪數

春時病熱則輕易治秋時病熱則重難治

熱病屢吻發瘡者尋可治之兆然發屢吻裏面者熱氣向劇盛
之兆也

熱病粘液纏著牙齒者熱氣向增盛之兆也

熱病發頭眩暈掉者必至危急

熱病咽喉脾痛呼吸短促者必至危急

熱病呼吸短促者惡候也

熱病發搐搦掣引者惡候也

熱病裏熱外寒大渴引飲者必死

熱病睡中驚怖發搐搦者死期不遠矣

熱病全身見斑色者死期在近矣

熱病無發黃水腫者惡候也

熱病初起吐下黑汁者必死

熱病耳聾不能聞忽時開通者有必發衄血否則大便必下

熱病發吃逆嘔吐者內藏爲瘀鬱或腐壞之候也

熱病粘液下利支節疼痛者惡候也

熱病診其脈惠人手指振動者惡候也

熱病發頭痛胃痛惡心者有用吐劑得太効

熱病將增盛之時小便有泛濁通利過多者肌肉衰削之兆也

熱氣將解散之時泛濁多利者不日復故之兆也

熱病小便有砂子其色赤且軟者熱氣如燒消爍肌肉之候爲死徵

熱病小便雜如糠者精力虛憊之候也

熱病小便雜血者惡兆也又雜膽汁多者不日復故之兆也

熱病小便白色粘稠帶青者將變成惡性熱及水腫病之兆死期在近矣

熱病小便清澄白色者爲惡候

熱病小便有如細碎大麥而沈者壹底者其證淹纏難治之致不救

劇盛熱男子則多患之婦人則少患之

劇盛熱鉤血者吉兆也

劇盛熱嘔吐下利發汗者其熱解散之候也

劇盛熱多變成腐壞熱或腫癰

劇盛熱顏面汗出赤色其他乾燥者瀕死

劇盛熱吐血尿血者遂致不救

劇發於二十日四十日六十日者爲惡候

劇盛熱裏熱如燒外寒氷冷者瀕死

劇盛熱津々冷汗出者死

劇盛熱不能服諸飲者死

劇盛熱小便渾濁不止者必變成痿瘵

劇盛熱小便稀薄有光者發失心風痴獣之兆也

劇盛熱小便白色如乳汁者死

劇盛熱小便有塩其狀如片肉者死然小便赤有白塩者尋可治之兆也

劇盛熱小便赤色殆如漬肉水且雜血及油帶惡臭者死

劇盛熱初起小便帶黑色者良候也然頭頸疼痛小便黯色者

日向增盛之徵也

劇盛熱小便淡赤者雖淹纏歷日病毒未熟之兆也又其色赤泣濁沈底者病毒熟成已向解散之兆也又其色灰白泣沈底者病毒消解尋向康復之兆也

惡性熱其脈強實者良候也

惡性熱飲水即吐尋發吃逆復欲飲水者惡候也

惡性熱小便與平常不異者惡候也

惡性熱小便能熟且如雲懸于中間歷二三日變作泣者不日復故之兆也

腐壞熱全身發紫斑者死

腐壞熱呼吸短促胸脇疼痛且鼻梁扇動者遂致不救

腐壞熱不能瞑偶就寢則煩悶苦惱者惡候也

腐壞熱其脈疾數或不均者必發撮空摸床而死

腐壞熱小便渾濁恰如牛尿裏熱如火者死期在近矣

腐壞熱小便清稀不熟者死期在近矣

治熱病惡寒振慄魚沫汗身熱如火者之方

白芷　龍膽各八錢　黄芩　茵蔯一握

右剉酒百八十錢浸一宿絞去滓飲服

又方

茵蔯　薔薇花各四錢　香橙皮　曲香各二錢

葡萄一錢

右水煎一二沸濾過飲服

又方

茵蔯　龍膽各三錢

右酒浸一夜煮去滓飲服

又方

龍膽　良姜各三錢

右浸一宿布漉去滓飲服、治熱病煩躁口燥舌黑不欲飲食

大麥煎汁二十錢　蜜八錢　醋六錢

右入鍋內煮生沫爲度加砂糖少許攪勻飲下

丁香一錢　燒酒六十四錢　葡萄一錢　曲香二錢

又方

大麥煎汁六十四錢　曲香露水二十錢

葡萄汁八錢　甘草二錢爲末

右攪勻飲服冷溫任意

又方

鹿角屑　薔薇花各六錢　砂糖二錢

右水煎一二沸濾過飲服

又方

大麥煎汁二十錢　枸櫞汁十錢　焰硝一錢爲末

砂糖二錢

右攪勻飲下

○熱病

治熱病如燒煩渴下利
吉納吉納十六錢　焰硝四錢
右水煎漉過飲服

治熱病腹滿心下痞不欲食便泌
吉納吉納八錢爲末　沃君栗臞吉栗一錢爲末
茵蔯鹽七分　桃花舍利別十錢
右攪勻白湯送下

治熱病由胆汁腐敗者之方
酸摸根舍利別　枸櫞舍利別各四錢
罌粟殼舍利別三錢
焰硝精十滴
薔薇花露水十二錢

右攪和飲下

治熱病往來寒熱因腐壞液者之方
吉納吉納八錢　水二百錢
右煎至一百二十八錢濾過去滓以膽礬精十二滴攪勻飲服

治熱病發作有時大便下利者之方
明礬　肉豆蔻各四錢
右搗篩爲散以車前露水飲下

治熱病寒熱往來淹纏難治
大麥煎汁二十六錢
薔薇花舍利別　罌粟殼舍利別
膽礬精八滴
右攪勻白湯送下

又方

車前草露水四十八錢　薔薇花露水
枸櫞汁各二十四錢　薔薇花舍利別四錢
焰硝錠一錢　膽礬精十滴

右攪勻飲下

又方

大麥煎汁十六錢　枸櫞汁八錢
薔薇花舍利別六錢　焰硝錠二錢

右攪和飲下

治劇盛熱煩渴不食惡液留滯胃中者之方

大麥煎汁九十六錢　枸櫞汁三十二錢　砂糖八錢

右攪勻飲下

治劇盛熱徃來熱兼咳嗽者之方

大麥煎汁十六錢　焰硝錠二錢
蜀葵根舍利別四錢

右攪和飲下

治劇盛熱徃來熱連綿不解

硫黃精十滴　膽礬精亦可

右攪和白湯飲下

治劇盛熱徃來熱諸熱病

鹿角屑八錢　三七草根四錢　樓斗菜仁二錢
右水煎漉過去滓加殺律亞律沒牟亞失七分攪勻飲下

治劇盛熱往來熱惡性熱
吉納吉納二十四錢 爲粗末
殺律亞律沒牟亞失一錢 生姜舍利別八錢
右調和白湯送下

治諸般熱病惡血下利
薔薇花露水六十四錢 膽礬精十滴
右攪和加砂糖少許飲服

又方
酸模根十錢 薔薇花五錢 大麥三錢
右水煎漉過去滓飲服

治腐壞熱往來熱神機經熱

吉納吉納十六錢 香橙皮 肉桂各四錢
右爲粗末以燒酒百九十四錢和勻入壺內固封浸一宿布漉去滓飲服加膽礬精七滴服亦可

又方
吉納吉納八錢爲末 草豆蔻 香橙皮各二錢
右以燒酒浸一夜去滓飲服

解散連綿熱往來熱
吉納吉納四錢爲末 茴蔴鹽一錢 大黃二錢爲末
上好酒六十四錢
右攪勻飲服

又方

吉納吉納八錢　沃君栗曠吉栗

茵蔯鹽各一錢

右爲末白湯送下

又方

雞卵殼　沃君栗曠吉栗　焰硝錠各二錢

右爲末白湯送下

又方

鹿角屑二錢　茵蔯鹽一錢　泊夫藍七分

右爲末白湯點服

又方

諳室昧闍卜烈室霍　焰硝錠各一錢

沃君栗曠吉栗七分

右爲末白湯送下

又方

諳室昧闍卜烈室霍　焰硝錠各六分六厘

牽牛子一錢　丁香五分

右爲散白湯送下

又方

鬼茉莉根二錢爲末　雞子黃一箇　牛酪四錢

右攪和飲下

又水銃方

蜜十六錢　大麥煎汁二十四錢　食鹽二錢

○熱病

右攪和以水錡射腸中
又方
茴香露水五十錢　石鹼八錢
右攪和以水錡射腸中
又方
煙草葉水煎去滓取八十錢和食鹽二錢以水錡射腸中
治諸般熱病便祕腹滿煩痛熱腫
雞卵殼一味爲末白湯送下每服一錢
酒石鹽二錢　焰硝一錢
右爲末白湯點服
治諸般熱病及內癰或小兒發熱因酸漿者之方

治腸胃熱病心中煩悶腸中痛壯熱時發時止大便下利之證是也治法大率與疫痢瘧痢相同
大黃　焰硝各二錢
右爲末白湯送下
又方
妊娠筆君埒悶烈牟白湯送下　方具不食門
治腸胃熱病攣急絞痛
沃君栗曠吉栗　焰硝各二錢　辰砂一錢
右爲散白湯送下
治食食熱病因胃中生酸漿飲食無節時時發熱之證是也大率與疫痢不異
沃君栗曠吉栗　龍膽各三錢
右爲散白湯送下十日五六次

治夏日勞力作強或喫熱物而發熱身體如燒之方

焰硝一味爲末冷水送下

又方

枸櫞一味水煎去滓加砂糖少許攪勻飲服

瘧疾

瘧之將發也伸欠乃作寒慄鼓頷爪甲青白四肢酸疼其脈沈數諸證退去內外皆熱頭痛煩渴欲飲水其脈洪數既至發汗解熱之時唯覺身體疲弱倦重而已於間日與平常無異蓋此證有日發有間日發有間二日三十日三十日四十日發

瘧疾發作之期有遲速先後又有不違前期大率發作先期諸證加重者熱氣至極之候也又發作不違前期病勢亦同者淹纏難治之候也又重之候也又發作後期諸證稍輕者以漸向發作愈進熱氣反減者不日復故之候也

瘧疾大率可知發於酷暑液出春時病瘧則不過干五六發或七發也

瘧疾不過五六發而吐膽汁大便下利小便通利過多或發衄血痔血者良候也又鼻梁唇吻之熱如火者亦良候也

瘧疾無挾證者不過于十七發或十發而復故挾證者不過于十四發或二十發也

瘧疾小便赤帶黑色見如雲者其病將變之兆也至濁沈底者曰向險重之兆也

日發瘧夜發者難治晝發者易治

日發瘧嘔吐不止者尋復故之兆也

日發瘧多易發關節痛或結硬腫

多血之人患日發瘧則宜刺絡瀉血尤効

日發瘧小便白濁稍帶赤色者病毒未盡之候也

間三日發瘧者可知發於粘液酸液也

間三日發瘧者可知淹纏難治也惡液過多之人秋冬患此證則必至危篤年高者死

間三日發瘧自爲下利則不日復故

間三日發瘧多變成黃疸水腫

間三日發瘧發作不定者淹纏難治之候也

間三日發瘧衄血者爲惡候

間三日發瘧愈之後調護失宜過飡飲食則再發

間三日發瘧愈之後及間日而小便黑色者必至危篤

間三日發瘧四日發瘧其尿白浮泡沫且如雲懸于中間者可知稟賦素脆弱也

間三日發瘧四日發瘧發作之日其尿白或灰白如水發熱之後其色黑至翌日且其色黯赤帶黃者最可治之兆也

治瘧疾三日發瘧四日發瘧不欲飲食腹滿便秘

吉納吉納十錢　大黃五錢　茵蔯鹽一錢

右搗羅爲散溫酒又白湯送下

治瘧疾日發瘧不欲飲食

茵蔯舍利別十六錢　吉納吉納八錢爲末

決明栗曠吉栗一錢爲末

右攪和白湯送下

又方

吉納吉納五錢爲末　香橙皮舍利別十錢

野菊花煎汁六錢　大麥煎汁二十錢

右攪勻飲下

又方

龍膽　石菖根　香橙皮各八錢　野菊花三握

胡荽子四錢

右爲粗末熱湯百二十八錢浸一夜濾過去滓飲服

又方

車前草　蚤休各四錢

右水煎一二沸濾過飲服

又方

吉納吉納十六錢 上好酒六十四錢 爲末

右攪勻入壺內固封置温處引出藥氣布漉飲下

又方

接骨木嫩葉一味水煎飲服

瘧疾往來熱因胆汁腐壞者此方主之

茵蔯八錢 黄連二錢

右水煎一二沸漉過飲服

又方

鐵粉二錢 麒麟竭一錢 茵蔯鹽七分

黄連煎汁十六錢

右調和飲下

瘧疾因粘液及酸液者此方主之

細辛自然汁八錢 酒十六錢

右攪勻飲服得吐爲佳

又方

大麥煎汁十六錢 肉桂露水四錢 膽礬三分 爲末

右攪勻飲下得吐爲佳

又方

鬼茉莉根 酒石鹽各一錢 焰硝錠七分

右爲散白湯送下

截瘧方

明礬　肉豆蔻各二錢

右爲散昇晨白湯送下

解散瘧熱從來熱諸般熱病外用方

大蒜杵爛各二錢　燒酒隨宜

煙筒脂三錢　乳香一錢爲末　白芥子製如食用

右攪和作膏貼動脈上

又方

白菡萏葉半握　蜘蛛巢　食鹽　蓽麻子各二錢

燒酒隨宜

右石臼內杵爛作膏貼動脈上

治瘧熱解散之後不進飲食心下痞塞且強胃氣

肉桂　生姜各二錢　草豆蔻四錢

右搗羅爲散以蜜二百錢和勻慢火徐徐熬作舍利別白湯

嚥下栗子之大

治日發瘧

沃君栗瞿音栗一錢爲末　茵蔯鹽二分

殺律亞律沒牟亞失一分　藿香露水八錢

燒酒隨宜

右攪勻飲服

又方

鬼茉莉根一錢　肉桂露水十二錢　燒酒八錢

右攪勻飲下

又方

牽牛子　酒石鹽各一錢　食鹽五分

右爲散白湯送下

治日發瘧太渴引飲

大麥煎汁六十錢　枸櫞汁二十錢　砂糖十錢

右攪和飲服

治日發瘧外用方

蜘蛛十箇燒爲末以月桂實油小錢和勻塗顖顱脊推或動脈上

又方

蜘蛛巢隨宜以煤相和加酒夫藍末少許燒酒三分之一攪勻塗動脈上

解散間三日發瘧往來熱惡性熱之方

肉豆蔻四錢　明礬　食鹽各二錢

右爲散以茵蔯煎汁送下

又方

焰硝二錢　肉桂　生姜各一錢

右爲末發作已前白湯送下

又方

茵蔯　野菊花各八錢

右水煎兩三沸漉過去滓加龍腦末一錢飲服

又方

汝君栗曠吉栗雞卵殼亦可　焰硝各四錢

右爲散發作已前白湯送下

又方

燒酒六十四錢　龍腦一錢爲末　殺律亞律沒辛亞失一錢

右攪和每半時飲下一匕

又外用方

篤耨香八錢入砂鍋內上火和蜘蛛十五箇攪轉至灰色爲度加殺律亞律沒辛亞失一錢作膏貼動脈上

又方

芸香半握　杜松子三錢　食鹽二錢　乳香一錢

右爲末以醋六十四錢攪勻如膏塗動脈上

又方

雞卵殼爲末以篤耨香和勻貼動脈上

治間三日發瘧間四日發瘧粘液惡液蓄滯腸胃嘔吐惡心不欲飲食

茴蒺鹽　焰硝錠各一錢　東印度鮮蒼七分

砂糖二錢

右爲散溫酒送下

解散諸般瘧熱

龍膽二錢爲末　丁香爲末

泊夫藍七分爲末　大麥煎汁二百錢　肉桂爲末各一錢

砂糖十六錢　醋百二十四錢

右攪和每服自十錢至二十錢
小兒從來熟不能服吉納者此方主之
茵蔯舍利別　香橙舍利別各四錢　酒石鹽一錢
藿香露水　肉桂露水各二十四錢
右攪勻飲服

痘

夫痘之所由發天地間酸收氣乃自勝理而侵入又隨吸氣而傳注以留滯諸液其毒初而釀成也蓋分之爲二等所謂其一流行之時患此證也其一不拘歲時間患此證也大率初起惡寒振慄頭痛發熱眼目赤含熱淚嚏流清涕咳嗽聲啞鈲血嘔吐腹痛下利舌胎白眼胞腫起搐搦掣引歷三四日而見點不拘歲時間患此證者良候也見點以前發搐搦掣引者良候也見點之後發搐搦掣引者惡候也

痘非啻發身體外部於內部亦復然痘之初起發鈲血者良候也

痘之初起大便下利者良候也見點之後否
痘之初起發胃痛者宜用吐劑又無腹痛腰痛者毒氣劇盛之候也
流行之時患咳嗽喘急者大率發痘之兆也至貫膿發喘者不免死
痘稠密不分地界逆唾流出者遂致不救
痘頂陷凹發譫語者可知險證也
痘吐血小便不利者死在旦夕矣
險痘者大率不過八日而死又有歷十一日十四日十七日十九日而死者
險痘其尿與平常不異者爲惡候

孕婦患痘則胎子俱患之其痘稠密者惡候也即使婦人免死胎子必死
落痂之後用軟下劑爲宜
解痘初熱發汗消毒

白芷根三錢

右水煎一二沸去滓飲服酒煎服亦可

又方

罌粟殼舍利別八錢

右攪和飲下

治痘難發出

白芷根十錢　龍膽　芸香各五錢

薔薇花露水三十二錢

右水煎一二沸布漉去滓加沒藥末二錢龍腦末一錢鹿角精十滴攪勻飲服

又方

沃君栗曠吉栗一錢　諳室瞌闍卜烈室霍　洎夫藍各七分

右爲散以苗香露水送下

又方

取羊糞人乳汁或酒煮布漉去滓加砂糖飲服爲起脹之最藥

又方

黑泥灼的里亞加以酒飲下尤効

治遇水熱氣不解者之方

金剛刺根四錢　白芷根　蜀葵根各三錢

鹿角屑二錢　葡萄半握

右水煎漉過去滓和的里亞加四錢飲下

又方

大麥八錢　枸櫞皮　葡萄各四錢　肉豆蔻二錢

右水煎去滓飲服

治瘖無咳嗽喘急者之方

罌粟殼　蜀葵根各三錢　甘草二錢　砂糖三錢

右水煎布漉去滓飲服

又方

寫穜香油和薔薇花露水加砂糖少許飲服

治瘡發咽喉而膓痛咳嗽聲啞

薔薇花露水三十六錢　接骨木花舍利別八錢
焰硝錠一錢

右攪和飲服

又方

接骨木花水煎去滓以盞及醋三分之一攪勻以水銃射咽喉中

治瘡發瞼而膿爛

薔薇花露水二十四錢　鉛白砂爲末
泊夫藍爲末各五分　白膽礬一分

右攪和洗眼瞼

治瘡發眼膜而炊痛

白膽礬五分　阿片三分

右爲散和薔薇花露水點入眼中

又方

人乳汁四錢　龍腦五分爲末　泊夫藍二分爲末

右攪勻點入眼中

又方

雞卵油以龍腦末攪勻塗眼胞

又方

鵲巢茂草露水　野菊花露水各五錢

苗香露水三錢　泊夫藍五分爲末

右攪勻服之洗之

治瘄發眼胞而開合不任意痒痛

雞卵油十滴　龍腦油七滴　人乳汁隨宜

右攪和塗眼胞

預防瘄將發眼目者之方

龍腦　泊夫藍各五分

右燒酒浸一宿蘸布帛敷眼胞

又方

人乳汁和泊夫藍末少許點入眼中尤良又欲預防將發咽喉則以此藥浸布冝卷喉嚨

治瘄腹滿嘔吐下利者之方

肉桂露水四錢　藿香露水八錢　揾梓舍利別六錢

水晶爲末　沃君栗曠吉栗爲末　珊瑚爲末各五分

右攪勻飲下

治瘄毒生蚘蟲且毒氣刺戕腸中痛不可忍者之方

大黃二錢　鬼茉莉根一錢　甘索筆栗麻篤七厘

右爲末白湯送下

治瘄癒之後餘毒凝滯咽喉者之方

薔薇花　拳參根

右水煎去滓飲服

錦葵葉各二握

治因餘毒未盡咳嗽聲啞變將成虛勞肺癰者之方

無花果　大麥　葡萄各四錢　甘草
砂糖各二錢
右水煎漉過飲服
治餘毒凝滯支節將成痛風者之方
牛酪　篤耨香各二錢
右攪和作膏貼痛處
膽礬精爲解痘毒之要藥和薔薇花露水飲下其効不可言

失荷律陪君病
失荷律陪君之爲病也因粘稠液腐敗液及酸收液散漫于血中也其證身體懶惰壯熱如燒全身發紫斑黑斑顏色青白牙縫出血或齒痛不可忍舌燥胎白氣息惡臭大便祕結大率與脾病癒痛無異
失荷律陪君病必兼胸痛腹痛腰痛
住旱濕之地或海邊之人多易患此證
此證大便如泥或下利如水
小便每利變易不一有淡白如水者有粘稠渾濁者其色赤或黯色且有如赤土著尿壺之側以火近尿壺得温則其物融洛消沒也

治失荀律陪君病

梔骨木花　苗香　各十錢

右水煎一二沸漉過去滓以龍腦末一錢燒酒十五錢攪勻飲服

治失荀律陪君病牙齦黑色腐爛出血

車前草露水六十四錢　焰硝錠二錢　阿片　龍腦各七分

右攪勻飲下

又方

大黃二錢　肉桂　生姜各一錢

右水煎一二沸漉過加砂糖少許飲服

又方

明礬八錢爲末　膽礬精十五滴　薔薇花蜜隨宜

右攪和塗齒齦

又方

綠青　枯礬各二錢爲末　蜜八錢　醋四錢

右攪和慢火微煮以雞翎塗齒齦粘唾出爲宜

又方

薔薇花蜜四錢　硫黃精十滴

右攪勻每時塗齒齦

又方

車前草露水二十八錢　肉桂露水八錢

枯礬二錢爲末　焰硝錠一錢
右攪和塗齒齦
又方
石榴皮四錢　紫蘇葉半握
右水煎一二沸濾過加明礬末二錢攪勻含漱吐內
又方
麒麟竭　肉豆蔻　枯礬　沒藥各一錢
右爲末以薔薇花蜜和勻塗齒齦
又方
燒酒每々洗口內尤良
治失苟律陪君病氣息惡臭不可近者

乳香　沒藥各一錢　石菖根　肉豆蔻各七分
肉桂　焰硝錠各五分　砂糖一錢五分
右爲末以藿香露水十六錢丁香油十五滴和勻白湯送下
又方
肉豆蔻　肉桂各二錢　丁香　焰硝錠各一錢
砂糖四錢
右爲散白湯送下
治失苟律陪君病無腹痛腰痛者之方
黃連煎汁三十二錢　燒酒十六錢　阿片三分
殺律亞律沒牟亞失一分七厘
右攪勻飲下以水銃射直腸亦得

又方

沃君栗曠吉栗　雞卵殼　牡蠣各二錢

右爲散以杜松子煎汁飲下

治失尅律陪君病發搐擲掣引者之方

土青木香十六錢　良姜　石菖蒲各四錢

拘攣皮　龍腦各二錢　茵蔯一握　蚯蚓七條

葡萄酒三百六十四錢

右入磁器內浸一宿布漉去滓飲服

又方

苓藥十錢　琥珀五錢　砂糖二錢五分

右爲散白湯送下

治失尅律陪君病熱氣劇盛舌燥煩渴者之方

酸模根八錢　薔薇花半握　大麥四錢

右水煎一二沸漉過飲服

又方

甘草四錢　苗香三錢　大麥一握

右水五百七十錢煎至二百五十錢爲度去滓飲服

又方

薔薇花　鹿角屑各四錢　乾葡萄二錢

右水煎一二沸漉過去滓飲服

治失尅律陪君病支節疼痛者之方

茵蔯　芸香　紫蘇葉各半握　白芥子十錢

生姜四錢　肉桂　肉豆蔻各二錢

右件以燒酒六百錢浸一宿去滓和蓽茇汁八錢飲下治失荷律陪君病粘液病腐壞液病

鐵粉十六錢　龍膽　月桂皮各八錢

蓽茇汁八錢　酒二百七十二錢

右入壺內密封烈日中曝之絞去滓飲服

又方

取蠶蛾爲霜白湯送下

痛風　脚氣

痛風之所由起因酸收液辛峻液石灰樣液或神機經液活濁瘀血經水留滯或飲酒過度而其毒凝結於繫屬關節之筋膜腫起疼痛如咬如刺屈曲廻轉不任意也蓋其痛有發於肩胛者有發於股膝者有發於膝膕者有發於肘臂者有其痛固結不移動者有痛無定處遊走而痛者

痛風男子則多婦人則少

痛風全身發斑疹者良候也

痛風發於股膝者多變成水腫病

痛風其尿多清澄有光或有白色青色者或有懸于中間者或有全濁沈底者

小便粘稠帶惡臭者其證發於辛峻液或石灰樣液之候也
小便黯色者其證發於酸收液之候也又淡白色者發於粘稠
液之候也

治痛風歷節痛

牛旁根 十錢　砂糖 四錢

右水煎一二沸濾過飲服

又方

杜松木 十錢　砂糖 四錢

右水煎兩三沸濾過飲服

又方

山歸來　金剛刺根各八錢　杜松木 四錢

大黃二錢　茸草一錢

右水煎一二沸濾過飲服

又方

乳香二十四錢　砂糖八錢

右爲散温酒送下全身發疹爲佳

又方

蚯蚓 九條

右搗爛加燒酒九十六錢和勻空心飲下

又方

孔雀卵和砂糖飲下

又方

鬼茉莉根一錢　丁香五分　甘索筆栗麻篤一分
右爲末白湯點服
治支節疼痛麻痺攣縮
燒酒　接骨木花露水各三十二錢　泊夫藍五分爲末
龍腦爲末　阿片各三分爲末
右調和飲下
又方
蚯蚓杵爛浸燒酒　松樹皮刻浸燒酒
三十四錢　二十四錢
右調和飲下
又方
山歸來　鹿角屑
牛旁根各八錢
右水煎濾過飲服
痛風脚痛因酸收液者此方主之
牡蠣殼燒爲灰熟湯浸一宿取灰汁紙漉飲下
治痛風關節痛外用方
鬼脂或鵝脂塗痛處以火温之使徹皮間
又方
鉛白砂一錢　篤耨香四錢
右入鍋内慢火溶化加龍腦一錢塗痛處
又方
鉛白砂二錢　醋三十二錢
右攪勻塗痛處

又方

燒酒百錢　龍腦四錢

右入壺內固封烈日曝之塗痛處

又方

蚯蚓九條杵爛和燒酒塗之

又方

無花果六顆　白芥子十錢

右杵搗攪勻貼痛處發赤色爲度

又方

蚯蚓　乳香各六錢

右爲散和薔薇花油塗之

又方

篤耨香（テレメンテイナ）四錢　殺律亞律沒牟亞失一錢　燒酒隨宜

右入沙鍋內文火溶化塗之

又方

石鹼十六錢　龍腦二錢　燒酒隨宜

右攪勻塗之

又方

人尿精　燒酒各八錢

右攪勻塗之

又方

發泡膏貼痛處令發泡爲良

又方

蜀葵根　亞麻人　大麥各八錢

右杵爛如泥和人乳汁三分之一如膏貼痛處

支節疼痛因熱壞液者此方主之

白膽礬　綠青各四錢　焰硝二錢　枯礬一錢

沒藥一錢五分　阿片七分

右爲末以燒酒十錢接骨木花醋八錢葡萄酒五十錢和勻攤布帛敷患部

又方

石鹼二十錢　雞卵油八錢　鐵粉　鉛粉各四錢

龍腦二錢

右攪和作膏貼患部治脚氣衝心呼吸短促煩悶苦惱

桃花舍利別四錢　大黃二錢爲末　蘆薈爲末

沃君栗曠吉栗各一錢爲末

右調和白湯送下

又方

大黃五錢　藤黃五分　沃君栗曠吉栗二錢

右爲散白湯送下

又方

鹿角精十滴　酒石鹽精二十滴

右攪和白湯點服

脚氣脚痛因粘液者此方主之

薔薇花露水　肉桂露水各五十錢　砂糖十錢

大黃五錢爲末

右攪和飲下

又方

乳香四錢　噎福栗酷　蘆薈各二錢

茴蒜鹽一錢

右爲散白湯送下以粘液下利爲佳

癥瘡

夫染癥瘡之毒也小水淋瀝加痛其初利稀白汁次雜粘黃汁其終膿血淋漓陰莖緊脹煩熱腫痛名之謂癥淋又腹腿合縫之間煩赤腫痛遂爲膿潰名之謂便毒又陰莖皮及龜頭初發小疱漸爲膿蝕名之謂下疳凡其毒留滯於皮間機栗律潛匿於固形諸部久遠毒深注發頑瘡筋骨疼痛咽喉腐爛上齶腐蝕鼻梁崩陷妨言語耳聾眼盲陰囊潰爛肛門瘻瘡屈伸行坐不便腰脚痿脫遂爲癈痼

黑濁液及腐壞液過多之人多易傳染癥毒

少年或包莖者易傳染癥毒

癥淋勿早瘉以漸治爲良

尿道生癰小水淋瀝者易發諸般險證
用吐涎藥吐出濁唾齒齦腐爛咽喉腫痛氣息惡臭者可知涎
藥之應病也
用吐涎藥歷七八日不吐濁唾者止之宜用下劑
從毒之淺深吐涎亦有多少大率一日吐出之量自百錢至二
百錢或五百錢須酌酌之
頭痛劇盛骨節疼痛者宜施水銀劑外傳方尤効
治癩淋莖中刺痛小便淋瀝
蜀葵根 十六錢　甘草 八錢
右水煎二三沸濾過去滓飲服
又方

篤耨香 三錢　琥珀油 一錢　大黄 二錢爲末
拔律殺沒酷把乙巴 一錢五分　蜀葵根舍利別 四錢
右攪和白湯送下
又方
篤耨香 四錢　大黄爲末　鹿角屑爲末各二錢
右攪和爲丸白湯送下
又方
亞臘蜘藥均 三十二錢
右爲散白湯送下
治癩瘡去腐壞液
山歸來　金剛刺根各二十四錢　杜松木十二錢　燈硝八錢

甘草 三錢　大黄 四錢

右件水六百七十錢煎至四百二十錢爲度濾過去滓飲服

又方

甘草 八錢　杜松木皮 四錢　胡荽子 三錢

槲君貨篤 五十錢　石灰水 六百二十八錢

右件俱合入磁器內浸一宿布漉去滓飲服冷温任意

又方

金剛刺根　槲君貨篤 各六錢　曲香 三錢

大黄 一錢　茸草 一錢

右水煎一二沸漉過飲服

治下疳腐蝕

篤縟香 四錢　訶子 一錢 爲末　甘索筆栗麻篤 一分五厘

右攪和爲丸以山歸來牛旁根二味煎汁飲下

又外用方

篤縟香 二錢　赤石脂 爲末　乳香 爲末各一錢

右攪和作膏貼患處

又方

石灰水 五十錢　薔薇花露水 二十四錢

雞子白 二箇

右攪勻洗患處

又方

赤石脂 四錢爲末　龍腦 二錢爲末　燒酒 六十四錢

右攪勻洗患部熱痛除散則拔日栗均膏加赤筆烈失筆諸
篤少許攪和貼瘡上

治便毒潰爛歷久難愈

車前草露水　薔薇花露水各二十四錢
綠青爲末　乳香爲末各一錢　龍腦爲末十分　砂糖二錢

右攪勻洗患部

又方

車前草露水八錢　鉛粉　赤石脂各一錢
右攪勻洗患部

治癰毒凝滯耳內而膿痛

石鹼三錢　燒酒二十四錢

右入磁器內慢火烙化作軟膏送入耳內

治癰毒凝滯咽喉而膿痛

膽礬二錢　水煎去滓

右攪勻含漱口內

又方

蘿蔔自然汁八錢　甘草煎汁六錢
右攪勻每々洗口內

治骨節疼痛諸部腐爛

甘索筆栗麻篤一分五厘　燒酒二百錢
右入硝子壺固封索筆栗麻篤溶化爲度以大麥煎汁百錢
攪勻飲下自十錢至十五錢

治骨痛止腐爛去汚液

水銀　蜂蜜各四錢　入磁器内磨研不見星爲度

石膽爲末　甘草爲末　大麥粉各三錢

大黄三錢爲末

右攪和爲丸白湯送下流涎爲佳

治骨痛堅腫或腐蝕膿爛

固封膏百錢方見癰腫門　水銀六十四錢

猪脂二十四錢

右攪和不見星爲度貼患處

又方

甘索筆栗麻篤六厘　薔薇花舍利別三十二錢

右攪勻白湯送下

流涎方

甘索筆栗麻篤七分　黑泥灼的里亞加二錢

右攪勻暫令保口内藥氣徐徐透徹唾管則涎唾自出且欲止之宜用下劑

用流涎藥不奏其效者此方主之

甘索筆栗麻篤二分　小麥煎汁二百錢

右攪勻飲下

癩病

癩病者因血及鹹液自帶腐壞漸以凝聚生砂礫樣之物也大率皮膚糙澁鱗起發痒痺黑斑或生塊瘤爲凹凸而失常態或有全身不異于平常唯足心生結核以漸腐蝕露骨者又有皮膚白屑鱗起發白斑頭毛須白者患癩之人必嗜房事黑瘢風可知癩之一種也

癩有黑白之別所謂黑者皮膚糙澁痛痒如刺火熱生塊瘤爲凹凸者是也白者皮膚鱗起生白斑麻痺不知痛痒者是也

欲徵癩病則須考血味刺絡所瀉之血其味帶苦者癩病之候也又取所瀉之血以水攪澄飛過白砂溜止器底者亦癩病之

候也

漩面見冠緣徐徐降於壺底者癩病之候也又漩面見青泡者亦其候也

治癩病去血液腐壞

甘索筆栗麻篤一分一厘　蜜二十錢
水八十錢

右攪勻飲服自十錢至十五錢

又方

雞卵殼一味搗羅爲散每服一錢日五六次間七日一日止之宜用下劑非久服則無奏其效下劑方

大黃四錢爲末　牽牛子二錢爲末

桃花舍利別八錢

右攪和白湯送下汚液下利爲佳

治白癩

烏蛇十五錢中産之物本良　丁香一錢

肉桂一錢

右搗篩爲散白湯送下

疥

疥有乾濕二證蓋小疱發手指間有疱頂尖而大者又有扁而小者搔痒不可忍抓之則泄出乎稀水膿汁易染污于人也乾疥者重難治濕疥者輕易治

年高者難治壯年者易治

疥勿早瘥必發搔搦掣引而向死

疥瘥之後四肢浮腫者毒氣未盡之候必發險證

治濕疥發手指間搔痒不可忍

猪脂二錢　鉛粉七分

右攪和塗之

又方

鉛白砂三分

牛酪二錢　鉛粉一錢爲末　食鹽五分燒爲末

右攪和塗之

又方

胡麻人油二錢　黃蠟一錢　番瀉青一錢

白芥子一錢爲末　明礬一錢爲末

右攪和微火煮作膏塗之

治乾瘡

薔薇花油三錢　篤耨香　雞子白各二錢

鉛粉一錢五分

右攪和作膏塗之

癬

癬瘡者汚液蓄聚于皮間機栗律發赤黑斑其狀圓搔痒不可忍抓之則泄出乎黃稀水也有初發顏面項背者有發于手者有發于胸腹者有發于陰囊者

癬瘡婦人則少男子則多

癬發于陰囊者爲旱癩則必發腹痛腰痛淋痛疼痛

治癬瘡

牛酪四錢　硫黃花　綠青爲末

蔓荊爲末各二錢

右攪勻塗患處

又方

索筆栗麻篤一分　石灰水三十二錢

右攪勻得黃色爲度以雞翎點瘡上

又方

發泡膏貼患部取去膿汁爲要立治

癰腫　赤腫　金創結硬腫　粘液腫　蝦腫　凍瘡

癰腫者血液失運行之度稠粘漸加聚結於動脈及細絡而炊痛熱腫鼓動火熱竟爲膿熟也其證惡寒振慄壯熱如燒不欲飲食小便赤濁大便祕結之候也

癰腫口渴引飲舌胎黑者將至危險之候也

癰腫裏熱外寒者可知險證也

癰腫其色黑帶惡臭發譫語者死期在近矣

癰腫其尿赤色稀薄如水者日以加重之候也

其尿稀薄黯色者惡候也

患癰腫之人勿勞神志必有大害

治癰腫煩熱腫痛其他諸瘡瘍

金剛刺根　山歸來　精大麥各七錢　甘草二錢

右水煎澤過飲服

又方

三七草根十六錢　鹿角屑八錢　美人蕉花半握

右水煎去滓取二百六十錢加鹿角精十滴肉桂露水十六錢攪勻飲下

治癰疽腐蝕

甘索筆栗麻篤一分五厘　水二百六十錢　砂糖八錢

右攪和飲服

消散炊痛熱腫之方

蜀葵根一味爲末搭患處又水和塗之

又方

石鹼四錢　接骨木花八錢　醋十五錢

右入鍋內煮幷搗如膏貼痛處

又方

椰子油九十六錢　膽八樹油六十四錢

黃蠟四十二錢　篤耨香十二錢

右入鍋內煮作膏貼之

治癰疽丹毒炊痛熱腫

接骨木花一握水煎去滓　燒酒各六十四錢

右攪和蘸布乘温熨蒸患處

又方

鉛白砂　二錢　龍腦　五分　燒酒　百二十三錢

右攪勻隔火煮蘸布來温蔌患部

又方

金蛮陀　二十四錢　醋　二百五十六錢

右入砂鍋内徐徐煮減半爲度投新汲水二百八十錢調和復煮減半布漉去滓洗患部

又方

接骨木花露水　六十四錢　阿片　鉛白砂　各一錢

右攪和蘸布敷患部止諸痛散赤腫

搵捋　十錢　月季花露水　九十六錢

右入磁器内浸一宿炸爛絞去滓加阿片一錢燒酒二十四錢隔火煮蘸布來温敷患部

又方

煙草花　零陵香花

右水三百錢煮漉過加接骨木花醋薔薇花醋各十六錢燒酒八錢攪勻來温蒸潽患部

又方

車前草露水　接骨木花露水　各三十四錢　鉛白砂　二錢

右攪和浸布敷患部

又方

蜀葵葉　接骨木花　各一握　茵蔯　野菊花

月季花各半握

右剉水煎去滓加燒酒三分之一來温蒸湯患處

消熱腫去腐壞生新肉

椰子油二十四錢　金蜜陀百錢爲末　膽八樹油十八錢

右三味文火徐徐熬作堅膏和猪脂百錢再煮下火候冷加石灰百錢白膽礬八錢攪和得宜貼患處

止諸痛散神機經刺痛煩熱腫痛

膽八樹油三百四十錢　銀蜜陀百七十錢

右文火徐徐煮作軟膏名之固封膏

又方

固封膏百五十錢　番瀉青二十五錢　阿片二錢

龍腦二錢爲末

右攪勻貼患部

止諸痛

罌粟殼十六錢　接骨木花八錢

右水三百九十六錢煎至二百三十二錢布濾去滓離綿布來温蒸患處

又方

茵蔯　野菊花各十六錢

右剉水五百十二錢煎減半濾過和燒酒六分之一蘸布蒸患處

又方

櫟木皮八錢　石榴皮四錢
水三百八十二錢
右煎沸漉過取溫熏患部
治瘰痛熱腫癰腫丹毒且皮膚諸患
鉛粉百錢　酒百二十四錢
右入砂鍋內徐徐煮干火澄清布漉敷患部
治金瘡傷創多腐肉者且消蝦腫
沒藥十二錢　蘆薈八錢
右爲末入壺內投燒酒二百四十二錢固封烈日中曝之七日浸布洗創口
又方

金蜜陀爲末　膽八樹油各二百二十四錢
猪脂百六十四錢
右三味先將金蜜陀及油入鍋內上火溶化次和猪脂作膏貼之
治金瘡傷創濕爛瘡去腐肉
黃蠟三十二錢　膽八樹油二十六錢
綠青十二錢　金蜜陀十六錢
右件先將油及黃蠟入鍋內文火徐徐溶化候冷和綠青蜜陀作堅膏貼之
又方
芸香煎汁百錢　醋三十二錢　燒酒十六錢

食鹽三錢

右攪勻乘温蒸患處

又方

膽八樹油百錢　黄蠟二十五錢　金蜜陀八錢

沒藥十六錢

右入砂鍋内文火徐徐煮作軟膏貼之

開破癰腫去腐肉

膽礬十六錢爲末　綠青十錢爲末　醋二十二錢

蜜四十八錢

右攪勻作軟膏貼之

治潰癰脱疽金疡傷創

膽礬　砂糖　焰硝各三十二錢　明礬八錢

龍腦一錢　食鹽三錢

右爲末以膽八樹油二百錢和勻文火徐徐煮作堅膏貼之

治金創腐壞歷久不癒

膽礬少許水和蘸綿布敷創口

治疫毒發癰多腐肉者

篤耨香八錢　膽礬　沒藥各二錢爲末

薔薇花油三十二錢

右攪勻文火溶化作軟膏貼之

開破膏

扶日栗均膏十二錢　綠青十二錢爲末

右和勻貼之爲膿熟開破之要膏

治熟膿後久不生肉者之方

篤耨香（テレヘンテーナ）　蜜各八錢　雞子白二箇

右攪勻貼之

又方

白蠟十六錢　鉛白砂三錢　膽八樹油（ホルトガル）五十四錢

右攪和入鍋內文火徐徐煮作軟膏名之白膏

又方

塗雞卵油大効

治手指頭炮痛不可忍

取熱醋蘸布帛蒸湯患處充効

治陰囊癰潰爛多腐肉者

石灰水一升　龍腦二錢爲末　砂糖三錢

右攪勻文火煮蘸布帛乘温蒸湯患處若爲膿窩者以水銃射膿孔

消結硬腫

百合根煨臼內杵搗和薔薇花油貼患部

又方

煙草百錢

右剉水七百錢煎至二百錢爲度濾過去滓以上好酒百錢攪勻蘸布帛乘温蒸患處

又方

蜀葵根二十五錢

右一味酒煎去滓和猪脂十錢貼之

消散結硬腫機栗律腫

金剛刺根　山歸來　杜松木　玄參各四錢

右水煎去滓飲服

又方

辰砂二錢　甘索筆栗麻篤五分

右爲散白湯點服

又方

決君栗曠吉栗二錢　焰硝錠一錢

右爲散白湯送下

又方

拔日栗均膏八錢　蜀葵根爲末　野菊花爲末各二錢

胡麻仁二錢爲末　猪脂三錢

右攪和得所貼患處

消散脉卞鼠踈等結硬腫及機栗律腫

蜀葵根十六錢　葱白根十二錢　茵蔯

野菊花　接骨木花各一握　黄蠟五錢

百合油　膽八樹油各五十二錢

右件除黄蠟之外俱入鍋內上火煎沸布濾去滓和黄蠟徐徐煮作堅膏貼患處

又方

石灰水 百錢　龍腦一錢爲末

右攪勻來温蒸湯患處

消鮮粘液腫

鬼茉莉根 四錢　肉桂 二錢

右搗羅爲散白湯送下

又方

金剛刺根　穬君貨篤 各十六錢　甘草 八錢

右水五百三十四錢煎至三百八十錢爲度濾過去滓飲服

又方

茵蔯一握　接骨木花 半握　月桂實 四錢去皮

苗香二錢　明礬八錢爲末　燒酒 隨宜

右調和煮沸過浸布蒸患部

治蝦腫

旋奈葉 四錢　大黄 二錢

苗香一錢　酒石鹽一錢五分

右四味上好酒浸一宿引出藥氣去滓飲服

又方

金剛刺根 十二錢　山歸來 四錢　鹿角屑 八錢

甘草二錢

右剉水四百八十錢煎減半沸過去滓加沃君栗曠吉栗末

六錢攪勻飲服

治凍瘡發裂或手掌皸裂皴破

蘆薈一味爲末和胡麻油傅之又蜜和勻貼之亦得

又方

乳香一味爲末以雞子白和勻塗之

又方

蕪菁水煮熟杵爛如泥傅之又煎汁洗之可

又方

蕪菁煎汁十六錢　燒酒八錢　龍腦一錢爲末

右攪勻洗之

又方

取熟醋洗之

湯火傷

火傷之爲害由其品類有輕重所謂火傷湯傷沸油傷沸金傷硫黄灼傷樹脂灼傷是也

湯火傷淺而小者易治深而大者難治多變成潰瘍

沸油傷者可知難治於湯傷也

沸金傷者可知發險證也

硫黄灼傷樹脂灼傷者可知難治於沸油傷也

凡灼傷於眼目腹部者可知至危險也多致不救

火傷於毛髮之部者必發炎瘡

治湯火傷皮肉腐爛

膽八樹油三十二錢　黄蠟八錢　雞卵二箇

○湯火傷

右入鍋內以文火溶化作軟膏貼之

又方

石鹼一錢　蜜三錢　牛酪二錢

右和勻塗之

又方

薔薇花露水八錢　胡桃油二錢　雞子白二箇

右和勻塗之

又方

白蠟二十錢　膽八枚　油四十錢

右鍋內溶化去滓和龍腦末四錢作軟膏貼之

又方

雞子白一箇　薔薇花油隨宜

右和勻塗之

治湯火傷燉痛不可忍

蜀葵花浸胡麻油絞去滓塗之立止

又方

取敗冬葉自然汁塗之

又方

蜀葵葉煎汁百六十錢　燒酒二十四錢　醋十二錢

右和勻冷温適宜蒸患處

又方

燒酒和龍腦少許洗之

○湯火傷

又方

蜀葵葉　零陵香花　接骨木花各八錢

右水煎濃過去滓加燒酒三分之一乘温蒸熏患部

治諸灼傷潰爛者之方

石灰水百錢　鉛粉二錢

右和勻乘温蒸患部

狂犬咬傷　蠱毒

狂犬咬之爲害也因毒唾從創口侵入浸淫諸液漸爲腐壞大率剽熱大渴煩躁苦悶吐白沫黑涎狂亂惡水又有被咬之後歷半月一月又半歲而發者其證四肢懈惰神志鬱憂或怒或恐恰如發癎之狀矣蠱毒亦發諸般變證也

解狂犬咬毒及諸蠱螫毒

白芷八錢　芸香　獨活各四錢

右酒煎頓服

又方

芸香杵搗絞去滓加酒少許飲服

又方

膽礬精　十滴　燒酒　四十八錢

右攪和飲服

鮮狂犬咬毒

芸香煎汁　十五錢　鹿角精　十滴

右攪和飲下

又方

白芷　焰硝　各三錢

右爲散白湯送下

又方

鬼茉莉根二錢　酒石鹽一錢

右爲散白湯送下

又方

牽牛子爲末　酒石鹽各二錢　沃(オ)君栗(クリ)瞶(キ)吉栗(リ)一錢爲末

芸香露水　六十四錢

右攪勻飲下

又方

大蒜　芸香各二錢　蜂蜜　食鹽各四錢

右石臼內搗爛傅創口

又方

取海鹽水或酒或醋而洗創口

又方

燒酒　六十四錢　龍腦一錢

殺律亞律沒牟亞失一錢
右攪勻洗之

又方

採芸香葉杵搗和食鹽蜂蜜少許貼患處

又方

胡桃肉四顆　明礬二錢　食鹽一錢　蜂蜜五錢
右杵搗如膏貼之

又方

接骨木嫩葉搗爛和大麥粉貼之

鮮蝮蛇咬毒

燒酒和黑泥灼的里亞加及醋少許洗之

又方

黑泥灼的里亞加温酒送下

鮮諸般蟲毒

細辛一味酒煎飲服

鮮蜂螫毒

燒酒和赤石脂末少許洗痛處

又方

取人尿洗痛處刺痛立止

又方

醋洗創口尤良

又方

蜀葵葉杵搗絞去滓傅之

閃挫　打撲　竹木刺

治骨節閃挫

益母草一味水煎爽熱洗患處

又方

取柳木細剉水煎去滓加燒酒三分之一攪勻乘熱蒸患處由打撲閃挫血脈損破腐敗血作黑色者此方主之

熱湯一升醋一升和勻蘸布帛乘温洗患部

又方

石灰水和膽礬末少許鍋内煮洗患處

治閃挫打撲腫痛

胡麻油十二錢　黄蠟二錢

右以文火溶化下火以龍腦末沒夫藍末各五分肉豆蔻末一錢攪勻塗痛處

治自高墜下打撲閃挫瘀血凝滯者之方

無花果一味水煎温服

治打撲閃挫皮肉損破其色紫黑者之方

月桂實油塗之尤効

拔去竹木刺

水仙根杵搗和赤小豆粉傅之

補虛

治大病瘥後精力不復故或老人元陽不足者之方

良姜　肉豆蔻　肉桂各四錢　砂糖十錢

右搗篩爲散白湯送下

治性稟虛脆精力不足者之方

雞卵三箇　肉桂爲末　肉豆蔻爲末各一錢

上好酒適宜

右攪和以文火徐徐煮加砂糖二十四錢作舍利別白湯送下


和蘭醫方簒要卷之四終

附録

○蒸露鑵　蒸露鑵者邦俗呼云蘭卿吉盛藥於鑵内與上鑵相合上爐文火煮之藥水沸涌蒸升作露滴露受之於硝子壺固封收貯

蒸露鑵之圖





肉桂露水　肉桂百錢雨水四百錢燒酒百二十八錢共入
磁器浸一宿以蒸露鑵取露水三百二十八錢
香橙露水　香橙切爲小片三百二十八錢雨水六百五十
錢浸一宿以蒸露鑵取露水四百二十錢
丁香露水　丁香七十五錢雨水五百錢浸一宿以蒸露鑵
取露水二百錢
接骨木花露水　接骨木花百八十錢雨水四百錢食鹽一
握浸一宿以蒸露鑵取露水二百錢
薔薇花露水　薔薇花二百錢雨水六百錢食鹽一握以蒸
露鑵取露水二百五十錢
山香露水

地錦苗露水
藿香露水
連錢草露水
紫蘇露水
車前草露水
酢漿草露水　江州伊吹山多生之又所在有之苗高七
八寸莖直青色分生又枝六月葉間開小白花如豌豆狀根細多鬚
右滴露之法同前

○石灰水　石灰九十六錢滾湯八百錢浸一宿取灰汁布濾去渣收貯加索筆栗硼筲少許則爲黃色

○取精法　即納藥於曲頸鑵別設鍋鋪砂子厚可一寸安鑵於鍋內以砂圍鑵四邊慢火徐徐煨之則純粹液自滴出取之固封收貯又有以蒸露鑵取精者

曲頸鑵之圖



食鹽精　食鹽二百錢乾去水氣　乾土六百錢

右二味和勻以甲頸鑵取精

蚯蚓精　蚯蚓三十條水洗淨風日乾之加食鹽少許以曲頸鑵取精

鹿角精　鹿角屑八十錢以曲頸鑵取精

膽礬精　膽礬四十錢爲粗末以曲頸鑵取精

龍腦精　龍腦二十錢爲末以曲頸鑵取精

斯的栗吉活篤律　膽礬三百錢焰硝百錢爲末以曲頸鑵如法取之硝子壺收貯

焰硝精　焰硝二十四錢　燒酒六十四錢

右和勻入蒸露鑵安於砂中以文火徐徐取精

酒石鹽精　酒石鹽爲末三十二錢　燒酒百六十四錢
見後

右取精之法同前

殺律亞律沒牟亞失精　酒石鹽各五十錢
殺律亞律沒牟亞失製法見後

右二味爲末投雨水二百錢取精之法同前

硫黃精　盛硫黃於乳鉢別以鐘形樣之鑵倒懸蓋之四周
放火薰灼則碧焰升著鑵內作露墜下收貯

其圖



○取油法　從其物異其法有以蒸露鑵取露水冷定而分取油浮於水面者又有以曲頸鑵製者又有扞搗布包以榨木壓出者又有浸膽入搦油引出其氣者

肉桂油　肉桂二百八十錢　食鹽三十二錢
雨水二貫二百錢

右浸一宿以蒸露鑵取露水冷定而分取之

杜松子油

薄荷油

丁子油

肉豆蔻油

右取油之法同前

琥珀油　琥珀百錢　粗砂二百錢

右和勻以曲頸鑵如法取之

篤耨香油

右取油之法同前

月桂實油　去皮殼石臼內杵搗布包以榨木壓出收貯

巴且杏油

亞麻人油

右取油之法同前

茴蘭油　茴蘭百錢　膽八樹油三百二十八錢

右和勻盛磁器內於烈日曝之十五日令水氣盡布濾收貯

薔薇花油

野菊花油

藿香油

芸香油

胭脂草油

茴香油

百合油

右取油之法同前

龍腦油　龍腦八錢膽八撒油十六錢和勻石臼內磨研龍腦全化爲度收貯

雞卵油　雞子黃十箇納鍋內上武火燒黑煙盡爲度布包

絞取之收貯

誤郭姑奴謨油　蜀葵根三十錢　大蒜八錢杵搗

茴香十二錢　亞麻人十二錢

右四味以水浸一夜文火煮之布漉去滓再煮如合利別以茴香油百合油各五十錢和勻收貯

鬼茉莉根脂　鬼茉莉根六十四錢搗羅爲散投燒酒三百錢浸一宿攪轉數次以冷水投之則脂浮水面抄取上火熬令水氣盡至如膏又一法鬼茉莉根百錢杵爛投燒酒三百錢以蒸露鑵取露水冷定而分取脂入鍋內上火令水氣盡收貯

牽牛根脂

右取脂之法同前

○鹽

茵蔯鹽　茵蔯惣形燒爲灰投滾湯三指之高待冷定取灰汁以紙濾過上火徐徐煮令水氣盡則鹽著其鍋底取之收貯

酒石鹽　卽葡萄酒之垽濁凝於掃底爲石狀者是也其色白其味酸稍帶辛多出於拂浪斯國舶來間有之若無則代以芒硝亦可

○煆煉法

硫黃花　硫黃隨宜爲粗末入鐺固封埋於砂中熾炭四圍燒煆則硫氣自外作花著鐺內拆開拂取收貯

安息香花　安息香六錢爲末　砂十六錢

右煅煉之法同前

殺律亞律沒牟亞失　取馬尿塗人尿塗亦得曝乾去水氣盛罐別以小罐兩口相合鹽泥固濟安於砂上慢火煅之尿氣飛化作霜著罐內取之收貯勿令泄氣

索筆栗麻篤　水銀隨宜斯的栗吉活篤律見前溶化入石罐以文火煮令水氣盡至乾和食鹽等分別以罐上下相合鹽泥固濟埋下罐於砂中徐徐煅之霜著於上罐內取之收貯

甘索筆栗麻篤　索筆栗麻篤六十四錢　水銀四十八錢

右石臼內磨研不見星爲度入罐煅煉之法同前

赤筆烈失筆諦篤　水銀八錢斯的栗吉活篤律隨宜共合入硝于罐每時攪轉水銀溶化爲度安於烈火上令氣盡則作赤色末收貯

白筆烈失筆諦篤　水銀八錢斯的栗吉活篤律十六錢共合入硝于罐置暖温之處候水銀溶化以海水投之白粉沈底除去其水取之滾湯洗淨數回失辛味爲度焙乾收貯

焰硝錠　焰硝百九十二錢爲末入甜上火溶化攪轉不住手以硫黃花八錢徐徐和勻煙起燒盡而至淨乃以銀匕抄取移諸銅盤上冷定而作錠

白膽礬　膽礬入坩堝武火煅之取出曝之復煅復曝如此

凡八九次以其色白爲度收貯

鉛白砂　鉛隨宜投醸醋三指之高置温處每時攪轉酸味全失爲甘斤塗沈底爲度布漉入砂鍋内上文火令水氣盡則膜皮生上面乃抄取堅乙置冷處則凝固如砂子焙乾收貯

○諳室瞶　此物非金非石即金石相雜者也生於所堀取金銀之洞穴邊旁其形如織綿條軟而易碎其色黯黒或鉛色有光多出於拂浪斯國突乙都國又出於豊幡栗設國者其色赤有斑點尤爲佳品甚稀而難得我邦諸山有金銀銅鐵處有形色殆相似者近得生於本州金山者欲製而試用之未果

○諳室瞶閣上烈室霍

共爲末入甘堝武火燒令通赤移諸他器投滾湯洗淨其色至白如乳汁取去其水焙乾爲末收貯

○舍利別　舍利別者水四百錢砂糖三百錢以文火徐徐煮稀稠得所名之謂舍利別

茵蔯舍利別　茵蔯拌搗絞去滓百錢砂糖二百錢入砂鍋内文火煮作舍利別

醫栗殼舍利別　醫栗殼杵爛絞去滓和砂糖等分作舍利別

薔薇花舍利別　薔薇花八十錢滾湯一升浸一宿濾過去滓和砂糖百五十錢作舍利別

月季花舍利別

接骨木花舍利別

莖莖菜舍利別

右製同前

枸櫞舍利別　枸櫞切爲小片以水煮熟杵搗如泥和砂糖等分文火再煮作舍利別

搗搾舍利別

覆盆子舍利別

右製同前

白桃花舍利別　白桃花四十八錢蜂蜜九十六錢煮至六十四錢爲度布漉去滓上文火再煮作舍利別

蜀葵根舍利別

芍藥舍利別

龍膽舍利別

右製同前

石長生舍利別　石長生四十錢甘草十六錢水五百八十錢煮至二百四十錢爲度布漉去滓和砂糖二百九十錢再煮作舍利別

生姜舍利別　生姜三十二錢切爲小片　砂糖四百錢

先將生姜漿湯三百八十錢浸一宿文火煮至減半爲度布漉去滓和砂糖再煮作舍利別

○薔薇花蜜　薔薇花四十八錢上好蜜三百八十四錢浸

一宿文火煮之數沸布漉去滓收貯

○甘草糕　甘草四十錢　水四百錢

右浸一宿煮至二百錢爲度漉過去滓以慢火再煮如膏盛之於盆上烈日乾之收貯藥舖呼崒篤裹者卽是也

○公設律弗　卽諸藥加砂糖搗和得所捏作餅子之名也

薔薇花公設律弗　薔薇花五十錢石臼內搗末以水少許相濡加砂糖等分搗和作公設律弗

芍藥公設律弗

揾持公設律弗

香橙公設律弗

右製同前

○黑泥灼的里亞加　卽出於黑泥灼國的里亞加也和蘭人齎來今藥舖所貨賣者是也

○拔律殺沒酷把乙巴　卽樹脂也我邦無產出於蒲捋失栗乙國其色白黃稍帶臭氣與篤耨香其性甚相近舶來間有之

○拔律殺沒瞥律匪坑　卽樹脂也我邦無產出於瞥律匪坑國其色赤有香氣舶來間有之

○膏方

拔日粟均膏　黃蠟　番瀝青　松脂各四十八錢

膽八樹油 百九十四錢

右入鍋內徐徐煮作軟膏

亞律諾軟膏　謨郭姑奴謨油 百九十二錢 見前

黃蠟　松脂 各四十八錢　篤穆香 十六錢

右入鍋內徐徐煮作軟膏

○發泡膏　膽八樹油 百錢　番漉青 五十錢

黃蠟 十六錢　篤穆香 二十錢　白芥子 爲末

胡拼 烏末各十六錢　芫菁 四十八錢 爲末

右件除末藥之外俱入鍋內上火溶化加餘藥攪和不住手候冷油紙包收貯

○呼膿法　腦後枕骨下摘起上皮以拔針十字剪破可容豌豆一粒捺入孔內以拔日栗均膏攤紙貼護於其上歷三四日至膿成而潰又一法塗腐藥於線條以刮橫貫皮裏可容一寸繫托一二日膿已成則可取去線矣蓋隨其證施肘膕及股脇爲良

○誘嚏法　良姜或胡拼爲末以管吹入鼻中

○浴脚法　野菊花　薔薇花　罌粟殼 各三握

曲香 十二錢

右四味以水二升煎至一升五合去滓盛于桶內乘熱浴洗兩脚尋以衣被蓋之

○引降劑　白芥子 製如食用四錢　大蒜 拌爛一錢


醯醋二錢

右三味和麥餅貼足心錢之大

○大陽煎　納藥於硝子壺內固封烈日曝之十五日每時轉旋引出藥氣即受日光煎沸之謂也

○水銃

全圖



中國者室五方之民各異其俗器械異制衣服異宜生其所以異者外而天氣之寒暑地之高下內之四肢百骸五藏無有異五藏六腑之有異治病之術豈有東西不相通之理哉西人之精物理

真性。其於醫術。智巧竭焉。自中土以方。皆所不及。乃東於彼。施於我。和天地同仁之義。固非物也。福滯之徒。所與謀哉。馬蘭齋先生。已以蘭方名著一時。令嗣子道。承繼益勤。簡鍊之功。始且實通乃翁。嘗就具家所藏蘭書中。纂輯其要。分別門類。以為一書。刊以公世。子道胸襟云爾。道無東西。惟善之資。人無物我。不敢自

私余深有取焉○因為之序○

文化丁丑暮春五山池桐孫撰

三峰田禹則書

江馬元弘先生著述目録

和蘭醫方纂要續編　全三冊　嗣出

藥性解　金石草木ノ性ト主治効能ヲクハシク載ス　全五冊　嗣出

診脈圖說　脈動ヲ圖ニアラハシ診法ヲコトゞク載ス　全一冊　近刻

溺死活法、　手術道具ヲ以テ溺死ス者ヲ救フ法ヲ記ス　全一冊　近刻

癰癩合集　癰瘡癩病ノ諸說治方并外術ヲ悉ク載ス　全三冊　近刻

好蘭堂藏版

文化十四丑春刻成

書肆

京　都　河南四郎兵衛
同　河南喜兵衛
江　戸　須原屋茂兵衛
大　坂　葛城長兵衛
尾州名古屋　永樂屋東四郎
加州金澤　松浦善助
濃州大垣　松浦善兵衛

西村氏藏書

河南春和樓庫書

西村氏藏書

明治五壬申晩春閏

石峯室主敬