



74
1444
1

慶應二丙寅春刊

緒方郁藏譯本

以部三冊

內外新法

獨笑軒藏



91-2099

序

我諾而變古書云野鷄滯食。咀藜葉以吐污物。野猪逆上。磨頭樹木。傷爪以洩鬱血。白鷺便秘。以其嘴灌水肛內。以取快利。小禽向寒。頻浴瀦水。以固肌膚。是鑿家吐刺。刺絡。灌腸。灌水。諸方。所由源也。夫禽獸猶可資治方。况人而資人。豈可分東西彼此乎。西洋上古必弗氏諸名宿。其事尚矣。中古應湜。免氏。發明牛痘種法。世永受其澤。爾來俊傑並起。洞開幽曠。闡發精微。前代未有之奇病。千古難治之痼疾。皆深窮其理。而

講其術。於是乎。不問科之内外。新奇百出。鑿法益明。所謂肉其骨而起其死者。不一而足矣。蓋世益降。病益多。病益多。則療法藥製。亦隨而益變。我之所以資彼者。亦何得不日新哉。是余所以有日新鑿事鈔之著也。往者已矣。鈔中療疫新法。以付梨棗。今又按内外新法。頒諸同志。世或以余為遺故好新則誤矣。稽古而察今。推細而知大。蓋學問之道也。語曰。溫故知新。余有取焉。慶應紀元乙丑初夏。緒方郁子文謹識。

題言

一是著ハ西洋加刺烏斯氏ヲ本トシ雲埜里弗氏ヲ以テ補テ成ルノ書ナリ加刺烏斯氏ノ原本ハ紀元千八百六十二年鏤行ノ治法書ニノ彼國字「アベセ」ノ順ヲ以テ病門ノ次第ヲ立ツ固内景官能ノ次序ヲ踏ムニ非ス疾病發現ノ差等ニ據ルニ非ス唯治法檢索ニ便ナル力為ノ之今之ヲ翻シテ本邦ノ「イロ」順ヲ以テ次序ヲ立ルモ亦其意ニ倣フナリ

一和蘭人伊尔健氏加刺烏斯氏ノ書ヲ譯シ其卷

首ニ題シテ曰、方今治法書累ニ世出スト雖氏
 或ハ簡ニ過キ或ハ繁ニ過ク獨、加刺烏斯氏ノ
 書ハ其中ヲ得タリ是、元單ニ治法書ナレ氏處
 方ニ關ルノミナラス攝生法、手術等併舉シテ
 遺漏ナシ且、當時明家ノ諸說ヲ拔萃折衷セル
 ヲ以テ此ヲ夫、汎ク醫事日記ヲ涉獵シ能ハサ
 ル人殊ニ寒鄉僻地ノ老醫ニ贈ラハ一目ノ即
 輒今醫事ノ進步スル所ヲ知り速ニ溯年病院
 ノ治則ヲ窺フヲ得ント、是言ヲ以テ其書ノ
 大旨ハ得テ知ルヘシト雖、凡病ニ由リ徵候、原

因解剖等ノ說ナクンハ吾輩驟ニ其治法ノ蘊
 意ヲ辨シ難キ所往々之アリ、雲埜里弗氏ハ紀
 元千八百五十一年乃至六十年ノ間ニ成ル完
 備、内科書ニノ原病、總論ヨリ說キ、叙テ各病ノ
 徵候、原因、鑒別、治法、舍密檢查、器機檢查、解剖檢
 查等ニ至ルマテ詳悉ス、實ニ當時醫書中ノ博
 ニメ精ナル者ナリ今亦此ヲ以テ其慚ヲ補ハ
 サルヲ得サル所以ナリ

一抑、此書ノ本旨簡ニメ要ナルヲ貴フ故ニ病理、
 手術、器械等ノ新軌ニ出テ其論浩繁ニ涉ル者

ノ如キハは一舉ニ縷説シ能ハス將ニ集テ之
 ヲ編末ニ附セント期ス但編中ノ新藥ハ大抵
 皆予著ス所ノ藥性新論ニ出ツ統テ見ルヘシ
 郁又誌

内外新法目次

卷之一

胃加荅涼斯 附腸加荅涼斯

○急性胃加荅涼斯 ○慢性胃加荅涼斯 ○

急性腸加荅涼斯 本發症 繼發症 ○慢性腸加荅涼

斯 ○鈍性結腸加荅涼斯 ○乳兒下利 ○離

乳兒下利

胃焮衝腸焮衝

卷之二

胃瘍

胃症

胃癌

胃管癌

胃擴

胃管擴

胃管狹窄

咽喉燉衝

胃管燉衝

急性症
慢性症

附 喉頭及氣管燉衝

急性症
慢性症
即喉頭勞、氣管勞
扁桃腺燉衝
急性症
慢性症
壞疽症

卷之三

咽頭燉腫

本發症
繼發症

胃血

飲食不化

萎黃病

伊屈篤

遺精

遺溺

陰腫

陰痛

發スル者ヲ胃腸加荅流斯ト謂フ凡古人ノ所
 謂食滯熱、膽液熱、粘液熱、大人ノ雜行格列刺、小
 兒ノ夏日格列刺等皆是ニ屬ス、貌魯烏宰斯氏
 嘗テ此諸症ニ窒扶斯モ大流行格列刺モ共ニ
 合メ胃腸嫩衝ト總稱セシ、アレ氏輒近原病
 解剖學益精妙ヲ極メ各症ノ内狀ヲ親驗實測
 セシヨリ更ニ窒扶斯ト大流行格列刺ヲ除テ
 斯ク約訂セリ亦以テ加荅流斯ノ大意ヲ領會
 スヘシ胃腸加荅流斯ノ症治別記

○急性胃加荅流斯カタルムス、アキヒ

患者食欲食味ヲ失ヒ心下痞脹シ知覺過敏ニシテ
 強按ニ堪ヘス舌上苔ヲ被リ口臭惡ク手掌煩熱、
 大便秘閉シ惡心甚クメ食物、膽液、粘液、水樣液ヲ
 吐ス通例熱微ニシテ脈呼吸共ニ緩或ハ惡寒發熱
 勁クメ大渴、頭痛、謔語等ヲ發スルモアリ○原因
 ハ大抵飲食ノ誤用、勞力、不寐、冷氣冒觸、炎暑ノ時
 候、冷濕ノ天氣、寒暖ノ俄變、不慣ノ風土、情意ノ感
 動、生齒、過房、陰器ノ發成、月經、產蓐等ニアリ○解
 屍メ之ヲ檢ルニ胃ノ粘液膜膨腫メ膠粘液ヲ展
 布シ處々紅斑ヲ點シ或ハ嫩脆疣狀ノ隆起夥ク

簇生ス筋膜ハ歛縮ノ胃ノ全腔之力為ニ差狭窄セリ

治法 初起胃家痞實ノ自ラ吐セントスル症ハ速ニ吐法ヲ處スレハ能ク之ヲ未發ニ防ク一ヲ得ヘシ然レ吐藥ハ加荅派斯ヲ促スノ恐アルヲ以テ妄ニ投スヘカラス寧咽頭ヲ刺衝シ微温湯加密列泡劑等ニテ吐ヲ起コシ止ムヲ得サレハ乃吐劑ヲ用ヘシ但吐酒石ハ宜シカラス○輕症ハ唯水製羹汁、牛肉稀羹汁ノ如キ流動性ノ食ヲ與ヘ食規ヲ守ラシメテ足レリトス然レ諸症重ク

シテ此稀羹汁モ用ヒ得サレハ單新汲水ヲ與ヘ是亦堪ヘサレハ唯氷片或ハ蜜柑瓤ヲ口ニ含マシメ或ハ少許ノ菓實搾汁、稀解植酸ヲ用テ煩渴ヲ消セシメ胃痛甚ケレハ局處瀉血、毡布、老里兒結ル斯水、番木鱉、摸尔非涅、冷罨法、饅雜太甚キ者ハ制酸劑特ニ麻屈涅失垂便秘スル者ニハ灌腸法ヲ處スヘシ但下劑ノ内服ハ宜シカラス撰法左ノ如シ

第一方

吐根末

二

熱湯適宜浸取ニ弓加次藥

海

葱蜜子半

右調和、每十密扭篤與一匙至得吐

第二方

番木鱉越幾斯瓜一 白糖月二

右調和、分四包、每半時與一包

第三方

菲沃斯葉粗末 子三 錦葵葉粗末 子三

右調和、以水與乳汁為琶布

第四方

老里兒結尔斯水三 番木鱉丁幾十二滴

右調和入硝子瓶黑紙密封、每半時與十滴乃至

七滴

第五方

吐根末瓜十五 沸騰散月一

右調和頓服

第六方

煨製麻屈涅失亞羊 炭酸曹達瓜十五 蒸餾

水子二

右調和、臨用振蕩、每一時與一匙

嘔機ニ由テ食セシ物ヲ吐スル際ハ鎮吐法ヲ處

スル一勿レ嘔吐數回ニ及ヒ唯粘液或ハ膽液ヲ吐シ或ハ乾嘔ヲ發スルニ至テ乃多量麻酔劑少量天然炭酸水沸騰散里歇利飲ヲ與ヘ劇症ニハ氷粒ヲ用ヒ胃部ニ芥子泥ヲ貼シ下藥灌腸ヲ施シ仍嘔吐治マラサレハ沃胃謨丁幾結列阿曹多格綸傑等ヲ用ヒ或ハ溫湯浴ヲ施スモ亦妙撰方左ノ如シ

第一方

炭酸剥苔斯一

蒸餾水三四

枸橼酸水加蒸餾水一

者二

右令飽和每服一匙布匙

第二方

炭酸水一

右供飲料

第三方

莨菪越幾斯二 白糖一

右調和分六包每服一包日二三次

第四方

沃胃謨丁幾一

右每次五澹乃至十五澹以沙糖水一硝蓋和服

第五方

格綸傑末

丹二

薄荷油糖

羹一

右調和、分三包、食前四十分時、與一包、日三次

第六方

里歇利飲

劑一

右每服、一匙布匙、或一食匙

第七方

炭酸曹達

羹一

覆盆子水

引四

栗蠶子舍利別

引半

右調和、每服一食匙

第八方

老里兒結尔斯水

羹二

清淨摸尔非涅

羹一

右調和、每服七滴、乃至卅滴

第九方

收斂亞的兒

羹一

覆盆子舍利別

引一

右調和、每服一匙布匙、以一硝盞水送下

第十方

結列阿曹多

滴十

亞刺比亞護謨漿

引半

老里

兒結尔斯水

引四

右調和、每服一匙布匙、或一食匙

第十一方

忽氏拔尔撒謨非荅子一

右擦胃部

第十二方

刺賢埜兒精子一

右用法同前

○慢性胃加荅流斯「カタリス、ヘンリス、コロニキ」

是消食器常有ノ一大患ナレ氏往時其本性明亮
ナラズ其徵候ハ胃痛嘔吐ヲ主トス其痛壓スカ
如ク燃クカ如ク刺スカ如ク或ハ痙性窘迫ヲ兼

テ劇度ニ進ムアリ而自ラ發スルアリ心下ヲ按
メ發スルアリ或ハ食物胃ニ入テ即チ發スルア
リ但食物悉ク皆同様ノ祟ヲ為スモノニ非ス食
物ノ性味ト患者ノ稟質トニ由テ各自功害相異
ナリ甲人ハ塩造食物ヲ喜ヘ氏乙人ハ之ニ堪ヘ
ス軟滑物刺衝物温物冷物等此人ニ在テハ忽チ
疼ヲ作コシ彼人ニ在テハ却テ意ニ達スルカ如
シ然レ酸味膩膏ノ品ハ諸患者通メ堪ヘ難シト
ス嘔吐モ亦此病ノ固有症ナリ但其發作ノ回数
吐物ノ性量等ニ至テハ定アルヲナシ毎日一回

或ハ頻回夥ク酸味ノ稀液ヲ吐シ吐後輕快ヲ覺ルアリ却テ痛ヲ呼フアリ其空心ニ發スルアリ食後ニ發スルアリ或ハ常ニ全ク嘔機ナク唯炊衝ノ發動スルキノミ發スルアリ自餘心窩痞脹ノ食欲減シ或ハ反テ常ニ倍シ或ハ食欲欠ルニ饑餓ヲ覺ヘ或ハ其嗜ム所屢變易ス渴ハ全ク無ク或ハ非常ニ渴シ口臭ハ惡ク舌苔ハ數般或ハ苔ナク舌尖ノ乳頭赤腫ノ裸露シ兼テ舌苔アル者モ亦ヨク透見ス俱此乳頭赤腫ハ胃患ノ動靜ニ應メ顯潛スル者ナリ唾液ノ分泌ハ増盛メ其

性ハ酸大便ハ秘結スルヲ常トス○前件諸症經過中ニ交發歇シ或ハ本病治セサルニ諸症暫ク退除スルヲアリ

右諸症ヲ警徴スレハ能ク此病ヲ明断スヘシト雖凡間胃瘵胃癌胃瘍ト監別シ難キヲアリ是時其諸病ノ確徴ナクメ獨此加苔流斯ノ候ヲ得ハ姑ク之ニ藉テ從事スル凡妨ナシ然凡始加苔流斯ト定メシニ後胃瘵ノ正症現レ或ハ始胃瘵ノ看ヲ為セシニ後加苔流斯ノ徴現レシヲアルヲ以テ輕忽ニ診過スルヲ勿レ

慢性胃加答流斯ノ輕症ハ其徵候大抵局處ニ止
 レリト雖氏病勢劇ク或ハ長ク稽留シ或ハ患者
 體質銳敏ナル氏ハ又諸般ノ患症ヲ將來ス喻ハ
 全軀羸瘦、外貌憔悴、口内膿腫、艱肉、失苟兒陪苦症、
 體中諸部出血症、或ハ頭痛、頭重、不寐、精神意識ノ
 變調ヲ發シ或ハ脊髓ノ知覺過敏ト為リ局處ニ
 觸テ其候ヲ現シ或ハ總身膚表之ニ累感ノ亦過
 敏ト為ルコトアリ真ニ發熱スル者罕ナレ氏食後
 輕々惡寒潮熱ヲ覺ヘ頭ハ常ニ溫ニノ手掌ハ時
 ニ溫時ニ冷、足モ亦多クハ冷ヘ、處々局汗出テ動

スレハ粟疹ヲ發シ易ク終ニ膽液分泌、小便分泌
 ノ支障症ヲ發ス
 原因ハ急性症ノ誤治、食物ノ刺衝、銳烈ノ飲液、不
 化物ノ頑滯等ニアリ又體中ノ一器一系ニ非常
 ノ事アルヨリ起ルコトアリ喻ハ精神努力、情意劇
 動、驚怖、夜業、筋力勞役、過房、戀愛、經行、妊孕、過久哺
 乳、皮膚分泌、抑遏等ノ如シ○解屍ノ之ヲ檢ルニ
 胃ノ粘液膜白色ニノ往々赤色、褐色、黑色ノ斑アリ
 リ但、其形状、大小一ナラス静脈非常ニ充張ノ疎
 大ノ枝ヲ分チ或ハ毛様管モ亦血ヲ漲ラメハリ

キス腫脹病ノ状ヲ為スアリ胃ノ中央部ニ於テハ
 粘液膜高起ノ疣状或ハ皺紋ヲ現ハシ胃ノ下口
 邊ニ於テハ粘液胞膨腫シ粘液膜下ノ蜂窠質筋
 膜モ共ニ厚肥シ其厚サ半允母筋ニ至リ或ハ其
 質硬クメ豚肉ノ如ク軟骨ノ如ク或ハ癌腫ニ殆
 キモノアリ胃ノ上口邊ニ於テハ粘液胞ノ膨腫
 殊ニ多ク粘液膜下層ノ厚肥ハ却テ少シ胃ノ盲
 囊邊ニ於テハ織質甚タ薄ク粘液膜甚タ軟ニ半
 土崩シテ方ニ穿開セントセリ

治法 食規ニ配意スルヲ最要トス一頓ノ飽餐諸

品ノ雜食ヲ戒メ患者或ハ偏ニ肉食若クハ粉食
 ヲ嗜ムトアレ氏其量ヲ定メ毎時全ク消化シ終
 ル頃ニ非レハ次回ノ食ヲ許スヘカラス飲料ハ
 水ヲ良トス里母那堙酒石酸塩酸炭酸水モ亦佳
 經年葡萄酒モ病久ク稽留シ且患者平日之ニ慣
 レシ片ハ少許宛與テ可ナリ閑豁氣中ニ動クハ
 自カト他カヲ假ルトニ拘ラズ總テ益アリ温湯
 浴香竈藥擦法健胃硬膏海水浴等皆行テ佳内服
 ニハ清淨硃沙炭酸曹達頑固症ニハ括失亞睡菜
 菖蒲根橙花等ヲ與ヘ之ニ由テ病勢退カサレハ

石灰水、消酸銀ヲ用フ嘔吐、饋雜、胃痛等ノ各症ヲ
治ル法ハ急性症ノ條中ニ索ムヘシ撰方左ノ如
シ

第一方

括失亞粗末 酒石塩羊 常水適宜、浸取九

多加橙皮丁幾三錢

右調和、每一時與一匙

第二方

沃胃謨剥荅斯三 蒸餾水二

右調和一日服

第三方

加斯加栗刺粗末 熱湯適宜、浸四分時、瀝取

四次、加次藥 複方機那丁幾二 薄苛舍利

別羊

右調和、每一時與一匙

第四方

石灰水二

右每服一匙、以一小椀乳或乳清和服

第五方

清淨礪沙 麻屈涅失亞各一 枸櫞皮油糖

右調和、每服一刁夫、日三次

第六方

炭酸曹達二 括失亞 麻屈涅失亞各半

右調和、每服一刁夫、日三次

第七方

睡菜越幾斯一 單方驅風精二

右調和、每服一琶布匙

第八方

苦藥酒 橙皮丁幾各半

右調和、每服一琶布匙

第九方

菖蒲根二 如法浸四分時、瀝取四加次藥

大黃丁幾二 橙皮油糖半

右調和、每服一匙、日三次

第十方

消酸銀晶一八至 蒸餾水二

右溶化、收硝子瓶、黑紙固封、每一時與一食匙

○急性腸加荅流斯イカタルヒス、チキナリス、

凡腸加荅流斯ノ特ニ發スル部ハ小腸ノ上邊、旨

腸結腸直腸ナリ然レ其結腸ヲ犯スノ症常ニ多
シ古人ノ所謂泄瀉下利疝痛乳糜痢遷延下利溶
崩下利小兒下利等大抵皆急慢二性ノ結腸加荅
派斯ニ歸ス但痢疾ハ全ク其
本性ヲ異ニス

急性腸加荅派斯ハ通例十二指腸ニ在テハ右傍
季肋邊ノ疼痛格列刺様ノ吐瀉黃疸症等ヲ發シ

盲腸ニ在テハ右傍腸骨邊ノ疼痛右脚ノ攣痛麻
痺右睪丸ノ牽引患者右側ニ屈卧スル等ノ症ヲ

發シ盲腸炎衝
本條アリ直腸ニ在テハ重墜努責痛痒腫脹
粘液漏洩等ノ症ヲ發シ結腸ニ在テハ腹痛下利

ヲ主徵トス此症小兒ニ多ク婦人モ經行ノ事故
アルニ由テ男子ニ比スレハ之ニ罹ルヲ亦多シ
其下利頻數ニメ每次腹痛ヲ誘ヒ下物ハ始形ア
レレ漸ク溏滑シテ血ヲ交ヘ嬰兒ニ於テハ其色
綠血ノ分拆
セルニ由ルニ綿絮纖維條様ノ物凝聚セル者
ヲ混シ頻回下利セシ後ニハ努責ヲ發ス然レ痢
疾ニ於ル如ク甚シカラス諸症連綿スルヲ數日
ニメ即チ徐ク緩解スルアリ或ハ俄ニ痙性劇痛ヲ
發シ其痛下肢睪丸ニ蔓リ小便澁滯舌苔不食頭
痛嘔吐ヲ作コシ小兒ハ腹緊脹メ脚ヲ腹上ニ引

舉ケ搖擷、齶口等ヲ發スルアリ是症險篤ニ似タ
 レ此大都八日内ニ下利腹痛共ニ止テ元氣食欲
 常例ニ復スヘシ嬰兒ハ速ニ脱衰是急性本發症
 ノ經過ナリ一種急性繼發症ナルモノアリ毫毛
 疼痛ナクメ俄ニ下利ヲ發スルヲ徵トス總テ衰
 弱病ノ季期ニ副發メ惡臭物ヲ自利シ所謂瀉或
 ハ急性病慢性病ノ半ニ副發メ竊ニ其恢復ヲ躊
 躇セシムル症等皆是ナリ此本發症ニ非ルノ下
 利ハ經過安危預定メ難シ亘ク懇ニ注視メ下利
 毎ニ精力脱シ面貌憔悴スルヲ見ハ即惡兆ト決

スヘシ

治法 輕症ハ攝生法ヲ謹守スルノミニ能ク治
 スヘシ身體靜息軟和食料腹部溫覆ヲ最要トス
 熱微ニメ食欲失セス病專ラ大腸ニ在ル片ハ輕
 味ノ食ヲ許メ蔬菜肉類ヲ禁シ熱勁クノ病小腸
 ニ在ル片ハ唯少許ノ稀羹汁ヲ與テ全ク他ノ食
 物ヲ絶ツヘシ○其冷觸ニ由テ發スル者ハ腹部
 ニ毳布ヲ施シ過尔托根錦葵葉ノ煎汁舍電氏ノ
 白煎ヲ用ヒ褥内ニテ挖歇尔私散ヲ服サシメ刺
 戟藥ニ由テ起ル者ハ粘滑油質劑症ニ由テハ消

毒劑ヲ用ヒ大腸ノ燥屎此炊衝ヲ起セル片ハ軟
 和油質ノ緩下藥灌腸殊ニ蓖麻子油ノ灌腸ニ宜
 シ腹痛太甚ク之ヲ按ノ増劇スル症ハ局處ノ瀉
 血、毳布、麻醉藥努責後重勁キ症ハ緩和軟膏ニ麻
 醉藥ヲ加テ肛圍ニ擦シ或ハ之ヲ坐藥ニ為リ施
 シ或ハ微溫坐浴、局處蒸氣浴、毳布等下利劇ケレ
 ハ溫巾ヲ以テ腹ヲ覆ヒ香竈藥ノ罨法、挖歌尔私
 散、舍電發謨阿芙蓉液、水製阿芙蓉越幾斯等ニ宜
 シ總テ大腸ヲ犯セル症ニハ粘滑藥加阿芙蓉ノ
 灌腸又一奇法ト稱ス○繼發症モ亦緩和劑吐根

劑ヲ用ヒ速ニ治セサルヲ見ハ早ク刺衝溫罨法、
 阿芙蓉劑ノ内服灌腸、消酸銀、灌腸等慢性症ノ治
 法ヲ施スヘシ撰方左ノ如シ

第一方

挖歌尔私散 六氏至十八氏 白糖 一

右調合、分六包

第二方

蔓陀羅葉 烟草 各半 亞麻仁 一

右調和、供罨法

第三方

清淨摸尔非涅十氏

越没里膏三氏

右研和為擦劑

第四方

亞麻仁膏二氏

清淨阿芙蓉一氏

右為軟膏

第五方

加々阿酪三氏

菲沃斯越幾斯二氏至四氏

右研和分四個攤蠟紙供坐藥

○慢性腸加苔派斯ナカタクリス、コロニキスチ

此症亦多クハ結腸ノ患ニノ頑固ノ下利ヲ發シ

時ニ差進退アレ氏累月連年綿綿シ食欲可ニ存
 スレ氏漸ク羸瘦ノ四肢浮腫ヲ發シ小兒ハ乏力
 為ニ枯瘦極テ斃ル者多シ○解屍ノ之ヲ檢ルニ
 急性繼發症ト慢性症トニ於テハ結腸ノ血管著
 ク盈脹シ劇症ニ在テハ橫結腸下向結腸S狀結
 腸ノ部ニ當テ洩シ滲泌ノ頗硬固ノ假膜ヲ生シ
 粘液膜ハ收力ヲ失メ軟解スルアリ此景况殊ニ
 小兒ノ年齡ニ多シ或ハ粘液膜ノ血積黯紅ニノ
 正圓ノ膿腫ヲ生シ其底ハ灰白粘液膜下ノ蜂窠
 質ヨリ成ル者ニノ外見恰室扶斯ニ發スル膿腫

ニ髣髴タルアリ或ハ有故テ血積逾加ハリシ症
 ハ粘液膜廣ク土崩シ侵蝕深ニ進ミ膿腫正圓ヲ
 失ノ楕圓ト為リ外見恰痢疾ニ發スルモノニ似
 ルアリ然レ此膿腫ハ妄ニ穿開ヲ作サズ彼軟解
 ノ穿開ヲ作スノ症ハ多クハ腹膜卵巢肝臟等ノ
 病ニ累感ノ外ヨリ犯サル、者ニ限レリ又替久
 症ニ在テ結腸甚夕擴張ノ夥ク燥屎ヲ蓄ヘ粘液
 膜ハ黯色煤色若クハ緑白色ニメ乾涸シ或ハ白
 色ノ粘稠液若クハ敗膿汁ヲ排洩セルモアリ
鉅性結腸
 加苔派斯

治法是亦攝生法ヲ最要トス白色軟肉乳製食餌
 ヲ少許宛與ヘ酸類酒精難化物ヲ禁シ頑固症ハ
 居テ温暖ノ地ニ移スニ宜シ殊ニ小腹足脚ヲ温
 覆シ隔日ニ温湯浴ヲ施シ羸瘦甚ケレハ浴湯ニ
 乳汁肉煮汁擦皮煎汁或ハ葡萄酒ヲ加ヘシ腹内
 仍血積ヲ遺スノ候アラハ肛圍ニ蟻針ヲ貼シ粘
 液膜ノ分泌過盛ヲ制メ下利ヲ減スルニハ緩和
 劑阿芙蓉劑明礬單寧酸鉛糖消酸銀格綸僕加斯
 加栗刺結列阿曹多ヲ用ヒ兼テ冷水灌腸消酸銀
 灌腸漿粉加阿芙蓉灌腸明礬鉛糖灌腸等ヲ撰テ

亦隔日二行へシ總テ食餌醫藥共ニ必當ト見フ
ルモノヲ處シ時々刻々其功吾ヲ候ヒ若シ其妥
當セサルヲ察ハ苟モ主張セズ謹慎ノ試法ヲ行
ヒ各人各症妥當ノ法ヲ得テ之ヲ施ス下肝要ナ
リ

第一方

挖歌尔私散

十六八至十八八

白糖

一

右調和分六包每服一包日二次乃至四次

第二方

亞刺比亞護謨漿

四

阿芙蓉丁幾

六滴至十二滴



消酸銀晶

二

右調和供二回之灌腸劑

第三方

沙列布末

一

如法煮取一匕或二匕

右供飲料

第四方

沙列布末

十

煮取六多加次藥

阿芙蓉丁

幾

十滴至四十滴

麗春花舍利別

二

右調和每半時與一匙

第五方

格綸傑三 以常水煮八分時，濾取六弓加次

藥 阿芙蓉丁幾北滴至四十滴 實亞格日溫弓

右調和

第六方

明礬九八至十五 清淨阿芙蓉二 白糖羊

右調和，分六包，每服一包，日二三次

第七方

篤尔白室刺弓 常水適宜，煮八分時，濾取一

北加次藥 明礬一 阿芙蓉丁幾羊

右調和，供灌腸劑

第八方

消酸銀二 蘇餈水八

右溶和，供兩次之灌腸

第九方

葛刺健苔二 如法煮取六弓加次藥 水製

阿芙蓉越幾斯二 甘扁桃舍利別半

右調和

第十方

單寧酸六八至十二 水製阿芙蓉越幾斯二 白

糖羊

右調和分六包每一時與一包

第十一方

鉛糖二 清淨阿芙蓉一 護謨散一

右調和分六包每服一包日三次

第十二方

消酸銀晶四 醋酸摸尔非涅十五 遏尔托

根末二 甘草末適

右調和為四十九每服一粒或二粒日二次

第十三方

結列阿曹多二滴至三滴 礞沙加遏泥子精十五至

二 蒸餾水三至五

右調和每服一匙布匙日三次

第十四方

結列阿曹多一 銳烈燒酒四滴 沙列布煎四

右調和每一時與一匙布匙

第十五方

格綸傑越幾斯半 挖歌尔私散十 白糖一

右調和分十包每服一包日二次乃至四次

○鈍性結腸加苔派斯トールポルダレン、

是症夥ク風氣ヲ醸シ腹脹シテ微痛ヲ作コシ便

秘殊ニ已甚ク時ニ至堅ノ燥屎ニ血膿ヲ纏ヘル
 モノヲ通シ或ハ便秘ト下利ト交代ス且非常心
 悸動不食嘔吐瘵性乾效頑固逆上第五對神經ノ
 疼痛或ハ面色灰白呼吸不利神思鬱憂等ノ症ヲ
 發ス此症ノ治法甚ク難シ燥屎ノ堆積ハ疎滌ヲ
 要スレモ妄ニ下劑下藥灌腸ヲ施セハ却テ害ヲ
 招ケハナリ宜ク冷水灌腸石鹼灌腸油類灌腸ヲ
 施シ内服ニ蓖麻子油石鹼乳清或ハ催下ノ能ア
 ル鑛泉ニ乳汁ヲ調和スル者ヲ與ヘシ止ムヲ得
 スノ効下劑ヲ用ント欲セハ之ニ非沃斯越發ス

或ハ他緩性麻醉藥ヲ配用シ衰弱甚キ者ニハ健
 質安那或ハ他保固強壯藥ヲ配用スルヲ法トス
 然モ効下劑ヲ一頓ニ用レハ繼テ逾癡鈍ヲ益シ
 頻々用レハ聊通利アリト雖モ結腸ノ一隅ニ秘
 閉セル者ハ頑然トノ動カス故ニ此症ニ効下劑
 ヲ用ルハ總テ不當トス平素緩性ノ疎利藥ヲ持
 重シ兼テ溫湯浴溫衣服適宜運動肚腹按撫肛圍
 放蟻等ヲ行ヘハ能其患ヲ防クニ足ルヘシ然モ
 食規ヲ儉節シ刺衝起熱ノ飲液ヲ禁セサレハ療
 功現ルナシ

○乳兒下利チアアルルシ、ゲルシ、ゲルシ

此治法ハ先乳母ノ食規、乳房ノ疾患、乳汁ノ性質ヲ検査シ之ニ失アル片ハ即之ヲ除キ而後一日全ク哺乳ヲ休メ或ハ哺乳僅ニ兩三次ヲ限トシ渴スレハ新汲水ヲ與ヘ冷水ヲ以テ屢口ヲ洗ヒ勉テ身体衣衾ヲ清淨ニシ乳ノ外一切他食ヲ禁スヘシ醫藥ハ甘汞ヲ最良トス之ヲ初起ニ用レハ逾佳此ニ由テ吐ヲ發スル氏忌ムヘキニ非ス但人工食ニ製セル代食ニテ育ヒシ兒ト繼發下利ニハ頭功ナシ之ニ亞テ功アル者ハ吐根、加斯加

栗刺越幾斯、水製大黃丁幾ナリ阿芙蓉ハ内服、灌腸共ニ功アルト少シ撰方左ノ如シ

第一方

甘汞四 藥刺巴二 白糖半

第二方

右調和分八包、每一時一包宛、冷水送下

吐根二

如法浸瀝取二三、加舍利別羊

右調和每半時與一匙布匙

第三方

沙列布煎三 加斯加栗刺越幾斯八

右調和用法同前

第四方

沙列布煎_三 水製大黃丁幾_十滴

右調和用法同前

第五方

甘汞_一 白糖_半

右調和分六包每_二時半與_一包

第六方

吐根_二 如法浸瀝取_二勺加阿芙蓉丁幾_二滴

右調和每半時與_一匙布匙

第七方

沙列布煎_三 明礬_二

右調和用法同前

第八方

沙列布煎_三 阿芙蓉丁幾_一滴

右調和用法同前

第九方

沙列布煎_二 清淨阿芙蓉_八分

右調和用法同前

第十方

格綸僕ハ 水煎瀝取ニ 加桂皮舍利別ヲ
右調和每半時與一琶布匙

第十一方

埵繆兒丁 幾ニ 機那越幾斯ハ
右調和每一時與一琶布匙

沕年ノ幼院ニ於テハ乳兒下利ヲ療スルニ芥子浴ヲ用フ其法芥子末ニ握小布囊ニ盛り熱湯中ニテ頻ニ絞擦シ其湯十分黄色ト為リ猛烈眼ヲ刺スニ至リ患兒ヲ此ニ浴セシムル

大約五密扭篤乃至十五密扭篤皮膚赤色ヲ發スルヲ度トシ其兒ヲ引出シ温巾ニテ保護ス

○離乳兒下利アルルデキンデレシ

治法 此原因多クハ食物ノ量ト性トノ失互ニアリ故ニ養育法ヲ正スヲ治術ノ要件トス患兒全ク常例ノ食物ニ堪サルヲ察セハ復タ哺乳セシムヘシ然氏良乳母ヲ得サルハ牛乳或ハ沙列布ニ肉羹汁ヲ加ル者卵白ニ水ヲ調和セル者新鮮牛肉等ノ如キ刺衝セズ酸敗セズ能ク滋養スヘキ品ヲ撰ヒ與ヘシ○醫藥ハ沙列布沙護米亞

兒魯等ノ粘汁、罌粟壳煎汁、實亞格日溫、吐根、老里
 兒結爾斯水、兩三滴、洎芙藍、番木鱉、越幾斯、溫湯浴ニ
 宜シ、實驗家ノ說ニ麻屈涅失亞加大黃、石灰水、炭
 酸剥荅斯、燐酸曹達、酒石塩、忽氏、拔尔撒漢、非荅、薄
 苛水、苗香水、硃沙加過泥子精等ヲ俊驗アリト云
 手足厥冷、面色慘澹等ノ險症ヲ發セハ芥子泥、默
 栗薩、纈草ノ亞的兒浸、麝香、龍腦等ヲ佳トシ、慢性
 症ニハ格綸傑、加斯加栗刺、消酸銀、毘私繆篤、結列
 阿曹多ヲ佳トシ、所患特ニ薄腸ニ在ル片ハ專ラ
 灌腸法ヲ以テ療セスンハアラス、強壯劑ハ水製

機那越幾斯ヲ以テ絶品トス、此症亦阿芙蓉劑ハ
 カ所及慎戒スベシ、撰法左ノ如シ

第一方

亞刺比亞護謨漿 菩提樹花水 各半 遏尔

托舍利別 三

右調和、每半時與ニ茶匙

第二方

沙列布煎 三 炭酸剥荅斯 六

右調和、每一時與ニ一匙布匙

第三方

忽氏拔尔撒謨非荅子一

右供擦劑

第四方

實亞格日溫子半 麝香丁幾二滴至四滴

蒸餾水

右調和每一時半與一毳布匙

第五方

加斯加栗刺一錢至二錢 熱湯適宜浸瀝取二子

乃至三子加次藥 番木鱉越幾斯一錢至二錢

遇尔托舍利別子一

右調和每一時與一毳布匙

第六方

吐根末二錢至三錢 喇咕石半錢 白糖二錢

右調和分十二包每一時半與一包

第七方

喇咕石 茴香油糖 遇尔托根末各一 舍

電發謨阿芙蓉液滴一

右調和分四包每半時與一包

第八方

石灰水比一

右取半分加乳汁一匕為飲料

第九方

磷酸曹達 一錢至二錢

右早朝以少許羹汁頓服

第十方

格綸僕末 十二分乃至十八分

沙列布汁 以八分者二分製

舍電發謨阿芙蓉液 二滴 加密列舍利別 半

右調和每半時與一匙布匙

第十一方

消酸銀晶 六分

蒸餾水 一分

遇尔托舍利別

十

右調和每服一茶匙十二時中用盡

第十二方

沙列布煎 三分

水製大黃丁幾 二錢

桂皮水 一分

白糖 一錢

右調和每一時與一茶匙

第十三方

明礬 半錢至一錢

蒸餾水 五分

右調和供灌腸劑

第十四方

肉豆蔻油

玫瑰軟膏

各二

忽氏拔尔撒謨

非荅

半錢至一錢

阿芙蓉丁幾

一

右調和為軟膏擦腹上

第十五方

炭酸曹達

十六

右分四包以乳汁一懋篤和服

第十六方

消酸毘私繆篤

六分至十二分

白糖

一

右調和分六包十二時中用盡

第十七方

機那舍利別

三

右每服一琶布匙

第十八方

消酸銀晶

四分至二分

蘇錫水

五

右調和供灌腸劑

第十九方

老里尼油

肉豆蔻油

各二

加密列油

半

右為軟膏擦腹上

第二十方

護謨溶水

二

水製機那越幾斯

十五至

右調和供灌腸劑

第廿一方

消酸銀晶四分

亞刺比亞護謨漿半

舍電

發謨阿芙蓉液二滴

右調和供灌腸劑

第廿二方

護謨溶水三 升鏡塩水六滴至十滴

右調和供灌腸劑

別連獨及施貌兒氏ハ沙糖ヲ称用ス其法四分

時毎ニ白糖半ヲ冷水ニテ與ル一八日間、厥後



肉羹汁ニ白糖ヲ加ヘ用フ但塩ヲ配セス有時
テハ少計ノ卵黄ヲ調和ノ用タリ

以

胃焮衝リガスト 腸焮衝リエンチ

治法 急性胃加荅流斯 急性腸加荅流斯ノ條中ニ

索ムヘシ

內外新法卷之一

梅谷 濟世美校

內外新法

