



74
1444
3



以

内外新法卷之三

緒方郁子文重譯

咽頭焮腫アアブレインゲスアレトロ
 是胃管頭ノ後側ニ發スル焮腫ナリ嚥下不利呼
 咽困難ニノ頭痛ヲ發シ熱勢劇クメ時々戰寒シ
 漸ク頭痛煩悶頭圍膨腫等ノ症ヲ將來ス小兒ハ搦ス
 咽内ヲ候フニ圓ク紅腫ノ滑澤アリ本發症ト繼
 發症ノ二般アリ本發症ハ經過甚ク速ニメ治ヲ
 懈レハ吃逆窒息等ヲ以テ頓ニ斃ル善ク鑒別ノ

内外科新法



療スヘシ

治法 本發症ハ初局處ノ防焮法ヲ主トス即冷水
 ヲ以テ頻ニ含漱シ頸圍下顎ニ冷罨法ヲ施シ焮
 腫逾増劇ノ近鄰ニ廣マル片ハ氷片ヲ口ニ含テ
 徐徐ニ融解セシムヘシ其功古來襲用ノ溫含漱
 劑ニ優レリ但小兒ニ在テ寒冷法ノ如ク施シ
 難ケレハ唯冷水或ハ之ニ明礬ヲ溶シ以テ口ヲ
 洗ヘシ是亦十分ニ行ヒ難ケレハ明礬舐劑ヲ造
 リ撒絲筆ニテ患部ニ搽ルヲ妙トス然モ腫脹已
 甚ニハ下呼吸共逾不利シ或ハ腦ノ血積症ヲ



作ス時ハ局處ノ瀉血ヲ施スヘシ如斯治ヲ施ス
 ト雖モ遂ニ焮衝ヲ解散スルヲ能ハスモ既ニ釀
 膿ニ移ルノ候アル時ハ乃轉メ緩和藥ノ溫罨布
 ヲ施スヘシ内服藥ハ清涼下劑ニ限レリ但粘膠
 液過多ニメ之カ為ニ下呼吸ノ不利ヲ作ス症
 ハ吐酒石ノ吐劑ヲ佳トス然モ吐酒石ヲ以テ
 焮衝ヲ治セントスルニハ非ルナリ確乎化膿セ
 ルノ徴アル時ハ速ニ手術ヲ以テ開クヘシ其法
 直形ニストウリ或ハ刃ニセテ取リ布片若ハ
 硬膏ニテ其刃ヲ包ミ示指ニ沿ヘ或ハ示指ト中

指ノ間ニ挾ミ進テ指頭腫處ニ達スルニ至リ深
 刺ノ膿ノ噴出スルヲ度トス但此術ハ瞬速ナル
 ヲ貴フ然ラサレハ惡心ヲ發ノ能事畢ヘ難ケレ
 ハナリ夫匙ヲ以テ舌ヲ押ヘ或ハ小兒齒間ニ燧
 燧^ル苦ヲ挿テ療スル等ハ皆宜キ所ニアラス然レ
 若シ鍼開行ヒ難キ時ハ爪及ヒ指ヲ以テ抓破ス
 ヘシ而膿ノ排洩ハ患部ノ收カト嘔機ノ弱スト
 ニ由テ自能ク促シ来ルヘシ口内咽内ノ清刷嬰
 兒ニ於テハ注射法ヲ行ヒ長兒ニ於テハ溫湯ニ
 テ自合漱セシム毎日兩三回如斯清刷スルノ

ニノ大概速ニ全治スヘシ
 繼發症ノ病毒轉徙或ハ急性皮病後ニ發スル者
 ハ早ク鍼開セサルヲ法トス然レ若シ險症迫ル
 時ハ即チ鍼刺ヲ溫湯ヲ注射シ或ハ之ヲ以テ含漱
 セシノ病性ニ應メ格魯林加爾基明礬消酸銀單
 寧酸鑛酸等ノ如キ收斂刺衝強壯ノ外用法ヲ施
 シ且體質ニ應メ機那劑鑛酸劑ヲ内服セシムヘ
 シ○又頸椎ノ焮衝膿腫ヨリ此咽焮腫ヲ發セル
 時ハ專本病ノ治法ヲ處シ^{椎骨焮衝骨傷骨症}是
 亦已ムヲ得サルニ非レハ妄ニ鍼開スヘカラズ

凡悪膿饒多ニ漏洩ノ患者大ニ衰弱スル時ハ保固強壯劑特ニ機那劑ヲ與ヘシ

胃血 ガストロキ ハ

全身違和ヲ覺ヘ四肢倦重、頭痛、腹痛、惡心太甚ク動輒吐ヲ作コシ食欲失シ大便秘シ腹内ノ動悸亢ル等ヲ前徵トス此前徵暫間替留セシ後俄ニ吐血ス其血焦黑色ニシテ半凝泣セリ隨テ煩渴、胃痛、四肢振搖、寒戰、搐搦ヲ發ス少為ニシテ患者差安キヲ覺レ此大ニ罷憊シ脈甚夕疾數ニシテ胃痛、煩

渴逾増加ス體質元ヨリ虚弱ニシテ吐血ノ量多キ時ハ倏忽昏冒ノ四肢厥冷シ面色灰白ト為リ口唇亦冷テ全ク失色スルニ至ル通例一二時ヲ經テ脈力漸ク奮ヒ胃痛復發シ動悸復亢リ惡心嘔氣ヲ發シ更ニ復吐血シテ四肢厥冷、口内乾燥、煩渴等亦復蜂起ス次日復發スルヲ自、四回至五回其間煩渴發熱シテ患者眠著セズ舌上ハ厚白苔アリ但吐血ノ量ハ漸ク減シ其色亦稀解シテ微紅ヲ帶フ爾后一兩日ニシテ自、痲痛ヲ發シ或小醫藥ニ由テ大便通スル時ハ其色黒ニシテ即炭化血

ナリ然ル後諸症徐々ニ平夷シ煩渴止ミ食欲復
 故メ患者自緩解ヲ覺フ是ヲ初期ノ一發作トス
 此初期ノ發作ニテ斃ル者罕ナリ然レ精カ隨テ
 復スレハ隨テ再發シ每次衰弱ノ加ハルテ前ニ
 倍シ總身血虛ノ候ヲ現シ頭靜脈騷鳴シ心悸動
 亢盛シ精神或ハ醒覺ニ過キ或ハ頻ニ嗜眠ス如
 斯ニメ連旬累月ノ間ニ屢發シ薄弱家ハ血虛ノ
 極ニ至テ終ニ死ヲ致シ或ハ水腫狀ニ陥ルナリ
 雖然稟賦强健且其症經血痔血ノ抑遏ニ原ク者
 ノ如キハ每歲四五回發シテ二十餘年ヲ閱ル者

アリ○窒扶斯ニ於テ胃血ニ腸血ヲ兼ルト否サ
 ルトアリ其腸血ヲ兼サル者ハ唯腸ノ粘液膜内
 ニ出血シテ下洩セサルノミ此症大抵終ノ胃血
 後精神頓ニ醒覺シ繼テ脱衰眼昏惡心劇甚四肢
 冷徹顔面灰白眼陷鼻尖脈細絲ノ如キニ至テ死
 ス若能ク此期ヲ越ル時ハ次日或ハ次日ヲ俟ス
 ノ劇腹痛ヲ發シ黑物ヲ下利シテ即チ斃ル○胃
 癌胃瘍ニ發スル胃血ハ多クハ經過甚夕緩慢ニ
 ノ累月累年ノ間隔日ニ一發或ハ一週ニ一發シ
 テ骨喜色ノ黑物ヲ吐ス患者漸ク以テ羸瘦衰弱

ニ陷レ此毎發作ノ為ニ著ク罷弊ヲ致ス一ナシ
 治法前徵期ニ當テ早ク適應ノ處置ヲ施セハ能
 ク之ヲ未發ニ防ク一ヲ得ヘシ即靜息ノ食物ヲ
 断シ刺戟灌腸誘導瀉血特ニ胃部瀉血常習出血
 部ノ瀉血多血家ハ刺絡ヲ行フニ宜シ發作ノ際
 ニ當テハ身體ノ平卧氷粒冷菴法四肢結縛四肢
 大角法出血過多ナラサル症ハ蟻針法モ亦佳出
 血治ルモ仍靜息ヲ專ニノ再發ヲ防キ更ニ再發
 ノ候ナキ時ハ慎重ヲ加テ緩下劑或ハ灌腸法ヲ
 行ヒ以テ腸管ヲ清刷シ次ニ冷飲冷食ヲ與テ榮

養ヲ營ムヘシ胃ノ觸覺過敏或ハ精神醒覺ニ過
 ル時ハ少量麻酔劑ヲ用ヘシ但此ニ由テ綿々麻
 酔セシムルハ是トスル所ニ非ス○胃血頑固ニ
 ノ屢再發シ或ハ常ニ再發ノ恐アル症ハ巖ニ胃
 ノ充實ヲ戒ムヘシ渴ノ為ニ口内ニ含メル氷モ
 嚥下スルハ害アリ諸藥少量ニ與ヘ使藥亦固寡
 キニ宜シ此症ニ妥當ノ藥ハ硫酸銘糖刺多尼ナ
 リ之ヲ逐次ニ交換シ與ヘシ此ニ少許阿芙蓉ヲ
 配用スレハ尚妙トス又胃部ノ氷菴法四肢芥子
 泥大乾角法醋製灌腸法巴豆油等ヲ兼行ヒ體力

仍富ム者ニハ肛圍放蟻モ亦佳但胃血方ニ發シ
或ハ再發ノ候顯ル時ハ諸内服藥ヲ舍テ唯外用
法ニ限ルヘシ

各症治法 渴ハ每常十分ニ制スルヲ能ハス之ヲ
止ルニ足ルノ飲量ヲ與ル時ハ却テ巨害ヲ招ケ
ハナリ故ニ唯氷片或ハ枸橼酸ヲ類ヲ口ニ含テ
制止スヘキノミ胃痛劇甚ナル者ハ阿芙蓉ヲ與
ヘ腹内動悸已甚シテ煩惱ニ堪ヘサルモノハ肛
圍放蟻或ハ刺戟灌腸ヲ施スヘシ昏冒ハ必携ノ
一險症ナリ揮發藥ノ塗擦法ヲ行テ瞬速ニ醒覺

セシムヘシ煩悶已甚或ハ精神活起ニ過テ大ニ
患者ヲ脱衰セシムル症モ亦阿芙蓉ヲ主藥トス
煩悶及呼吸不利偶湧血ノ氣管ニ竄入シ或ハ喉
頭ヲ塞クヨリ起ル者ハ口内ヲ檢査メ之ヲ清刷
スヘシ血虛症ノ俄ニ危急ニ迫ル者ハ亞的兒上
好葡萄酒麝香ヲ用テ救急法ト為スヘシ但仍出
血ノ恐アル症ハ是類ノ劑大謹慎ヲ加ヘシ且
血虛症緩ニメ危急ノ候ナキ時ハ遽ニ其治ニ馳
スルヲ要セ又又出血ノ景勢全ク熄ム迄ハ有力
ノ食物葡萄酒鐵劑ヲ與ヘカラス○恢復期ニ於

テハ總テ出血ヲ催起スルノ諸件ヲ避絶シ瘥後
 又夕舌苔厚ク食欲復セズ消化力欠ル等ノ患ヲ
 遺スト雖氏妄ニ食欲ヲ喚起セントノ刺衝劑ヲ
 投スル勿レ唯扶助ヲ假テ微々運動シ新鮮氣ヲ
 受ケ温湯浴ヲ施ス等ニ由テ徐ニ食欲ヲ起スガ
 至當トス日々灌腸法ヲ以テ上廁ヲ取ルヲ亦肝
 要ナリ○若シ事時ニ由リ前條ノ療法悉ク行レ
 ス且常習症ニテ危險ノ恐トキ時ハ強テ醫治ヲ
 加ヘス唯静息ト攝生法ヲ細ニ諭ノ嚴守セシム
 ベシ又胃癌胃瘍ノ如キ器質變壞病ノ經過中ニ

以

時々輕發スル胃血モ亦唯姑息治法ト緩性食養
 ヲ處スヘキノミ俱此二病ニ發スル胃血其量差
 多ケレハ關係啻ナラス宜ク其本條ヲ照テ治ヲ
 下スヘシ
 飲食不化テイシスベ
 此症數般アリ食欲全ク絶ヘ食物胃ニ入レハ乍
 困憊ヲ起シテ吐出スルアリ急性胃加苔滌斯或
 ハ胃瘍胃癌等ノ徵ナリ或ハ軟化ノ食物ヲ少量
 ニ與レハ能ク消化スレ氏一切硬固ノ食品ニ堪

へサルアリ輕症胃嫩衝慢性胃加荅流斯胃ノ器
 質變壞病ノ微ナリ或ハ通常ノ良性食物ヲ適宜
 ニ用レハ能ク消化スレ氏食物ニ由リ假令ヒ常
 人ノ能ク消化スヘキ品ナレ氏久ク停滯ノ不和
 ヲ覺ヘ半日或ハ一日後胃中壓重酸敗ヲ作コシ
 隨テ他ノ食物ノ消化ヲ妨ケ遂ニ胃加荅流斯ヲ
 發スルアリ是實ニ難化ノ食物ニ由ルデアレ氏
 亦食物ニ一失ナク唯其患者ノ固有性ニ恰當セ
 サルニ由ル者ナリ是症元米胃力ノ乏キニ原ク
 者ニノ富族ノ成童ニ最多シ而屢發シテ齡ト共

ニ増重スレハ遂ニ胃衰弱ニ陥ルヘシ是亦他病
 ノ恢復期ニ發ノ甚長ク持續スルヲ屢之アリ或
 ハ總テ食物消化シ難ク良性軟化ノ品ト雖氏胃
 ニ滯泥ノ困憊或ハ噯氣ヲ發シ唯香料烈酒骨喜
 等ノカヲ假テ僅ニ消化シ得ルモノアリ是前症
 ト全ク異ナレ氏漸ク轉變スルニ及テハ區別ナ
 シ是症多クハ經過緩慢ニノ世ニ所謂饅雜胃痛
 胃粘液等ノ症ヲ發スルニ至ル或ハ消化甚タ急
 慢シ日常消化シ易キ品ト雖氏多時胃中ニ留リ
 良久シテ仍噯氣ヲ以テ其臭味ヲ上ルアリ此症

長ク稽留スル時ハ患者疲勞シ精神鬱重ス是真
 ニ消化機能ノ怠慢ナルヨリ發シ前症ト其致或
 ハ慢性胃加荅派斯ニ發ス或ハ食物可ニ消化ス
 レ氏食後忽胃部壓重口中乾燥引渴惡寒手足冷
 へ頭痛頭熱面色赤ク特ニ顴頰紅色ヲ畫シ而半
 時或ハ一時ヲ經テ諸症漸ク退散スルアリ其荏
 苒日ヲ延ク者ハ胃ノ覺機過敏血積ニ傾ケルノ
 徵ニノ聊誘因アレハ重患ニ陥ルノ恐アリトス
 但急性病ノ恢復期ニ此症ヲ發スル者ハ漸々ニ
 經過シ去ルベシ或ハ每常飲食消化終ルノ比ニ

初テ腹中困憊ヲ作スモノアリ是ハ胃ノ下口十
 ニ指腸或ハ脾或ハ肝臟ニ病患アルノ徵ナリ
 食規攝養飲食ノ誤用ニ起ル者ハ食欲ノ緩急消
 化器ノ強弱日常ノ習癖稟賦ノ一異性等ヲ計テ
 嚴ニ食規ヲ正スヘシ諸症劇ケレハ逾食量ヲ減
 シ禁戒緩ニ過ンヨリ寧嚴ニ過ルヲ良トス特ニ
 其急ニ發スル者ハ劇症退ク迄全ク飲食ヲ断ス
 ヘシ然氏稽留症ハ其嗜ム所ノ物ヲ少量ニ與テ
 可ナリ但初回ノ食既ニ自胃腸ニ下リ更ニ食氣
 ノ迫ルニ非レハ次回ノ食ヲ許スヘカラス固臨

卧ノ飲食ハ堅ク戒ムヘシ食物ノ性味ヲ撰ムト
 亦緊要ナリ其性味ノ當否ヲ定ルハ其量ヲ定ル
 ヨリモ難シ凡單簡ノ食ハ複雑ノ食ニ優レリ特
 ニ消化機弱ケレハ逾諸品ヲ雜啜スルト禁ス
 但食物ノ溫度ハ各人ノ性ニ任セテ可ナリ胃ノ
 運營怠懈シ或ハ胃液分泌ノ不及ナル症ハ香竈
 物刺衝物胃液分泌催進物ヲ食餌ニ添ヘ用ルニ
 宜シ然レ胃ノ覺機過敏多血燉衝等ノ候アル者
 ニハ右等ノ品ハ禁スヘシ總テ飲料ハ水ヲ最良
 トス但胃機ヲ振起セント欲セハ經年葡萄酒古

麥酒骨喜モ佳胃中酸敗液ナキ症ニハ里没那埤
 菓實搾汁ノ如キ酸味飲液モ與テ可ナリ○其急
 性ニノ發熱スル症ハ身體ヲ静息シ蓐ニ在テ療
 養スヘシト雖レ慢性ノ者ハ食後徐ニ適宜ノ運
 動ヲ為スニ宜シ消化器甚タ弱キ症ハ食後胃部
 ヲ溫覆シ輕々按撫シ或ハ健胃硬膏ヲ貼シ勉テ
 精神ヲ慰舞活潑シ身體ヲ適宜ニ動作シ灌腸緩
 下劑解凝劑石鹼、苦味、越幾斯等等ニテ便通ヲ整ヘ屢微溫
 浴ヲ行テ皮膚ノ運營ヲ催進スル等ヲ佳トス毫
 モ熱状ナク且他病ヲ夾マサル症ハ冷水浴川水

浴海水浴冷水多飲散步騎馬肆習等モ亦益アリ
 治法宿食有害物等ノ鬱閉セル症ニハ吐劑ヲ與
 へ其物既ニ腸管ニ轉ノ腹脹腹痛腹鳴等ヲ發ス
 ル症ハ唯食規ヲ正シ現症ヲ治テ其自下洩スル
 ヲ俟チ或ハ荅麻林度酒石孕鹼酒石少量大黃等
 ノ緩下劑ヲ以テ之ヲ促シ病未タ日ヲ經スノ多
 少發熱シ口燥キ渴強ク食欲全ク絶ル等粘液分
 泌ノ減耗セル候アル者ニハ酒石酸枸橛汁酒石
 酸塩沸騰散利歇里飲ノ如キ清涼酸味ノ劑ヲ處
 之胃部ニ觸テ痛シ或ハ飲食毎ニ痛ヲ作コス等

胃ノ覺機過敏ナル徴アル者ニハ老里兒結尔斯
 水番木鱉摸尔非涅ノ如キ緩性麻醉劑ヲ投シ初
 單性不化症ナリシニ轉ノ急性若ハ慢性ノ胃加
 荅派斯ニ移レル者ハ治法其條中ニ索ムヘシ替
 久症ハ胃中ニ汚物ヲ滲泌瀦蓄ノ益淹滯スル
 アリ即過多ノ酸敗液ヲ釀セル時ハ炭酸加里炭
 酸曹達石灰水喇帖石ノ如キ制酸劑ヲ與ヘ一切
 酸質ヲ含メル食持ニ胃中ニ入り分拆ノ乳酸醋
 酸炭酸酪酸ト為ルヘキ物品漿粉沙糖類ヲ禁スヘ
 シ但消酸硫酸ノ如キ一等強烈ノ酸類ハ能ク過

多ノ酸敗液ヲ制伏スルヲアリ此症ニハ冷水、苦
味強壯劑モ亦佳胃中ノ汚物亞尔加里性ナル時
ハ稀鹽酸、植物酸、乳酸、醋酸、酒石酸、酒石酸塩、收斂
亞的兒、エリシル、ヒトリオリ、ノインシグト、磷酸
等ヲ與ヘ以テ胃中缺込スル所ノ酸ヲ補テ功了
リ粘液夥ク堆積ノ自ラ粘膠液ヲ吐逆スル症ニ
ハ礞沙、少量、吐酒石、金礞黄等ヲ的當トス替久症
ニ於テ消化器衰弊シ胃機過敏ノ候ナキ時ハ香
竈苦味保固強壯劑ニ互シテ喻ハ少量、大黄、幾那製
劑、括失亞、健質安那、橙皮、薄荷、默栗薩、肉豆蔻、菖蒲

根、石鹼、牛膽、白屈菜、蒲公英、葛尔儒、紫堇、亞尔鮮、睡
菜、加私加栗刺、格綸僕、緩性鉄劑、剛鉄水等ヲ撰用
シ而酸敗液ヲ夾ム症ニハ亞尔加里性ノ制酸劑
ヲ兼用シ亞尔加里性ノ汚物ヲ蓄ル症ニハ酒石
孕鹼、酒石、酒石酸、礞沙ノ類ヲ伍用スヘシ○不化
ノ諸症一掃スル時ハ原因ヲ長驅シ或ハ食規ヲ
嚴守ノ再發ヲ防クノ策ヲ為スヘシ撰方左ノ如
シ

第一方

水揚梅根末

橙皮末

各一

麻屈涅失亞氏十

大黃末羊 白糖羊
右為散劑、納藥筭、每服一匙、日二三次

第二方

加斯加栗刺越幾斯一 橙花水四
右調和、每服一匙、布匙

第三方

麻屈涅失亞心 蝟蝟石羊 白糖羊
右為散劑、納藥筭、每服一匙、布匙

第四方

複方機那丁幾羊 橙皮丁幾一

右調和、每服一匙、布匙

第五方

炭酸剥羊 荅斯一 枸橛汁一 薄荷水四 橙
皮舍利別羊

右調和、每服一匙、布匙

第六方

括失亞越幾斯一 默栗薩水四
右調和、每服一匙、布匙、至一食匙

第七方

亞爾鮮葉一 橙皮 菖蒲根各羊 細劉盛

器加熟湯適宜浸八分時、濾取四勺、加次藥
失格列し加大黃舍利別二
右調和每服一匙布匙

以
姜黃病コロコ

此病ハ常ニ婦人ノ患ル所ニノ殊ニ其身體發成
ノ期、月經初出ノ前後ニ最多ク六五歳ヲ過レハ
漸ク罕レル歳以後ニ至テハ殆其難ヲ遁ルヘシ
但少女妊婦モ偶之ニ罹リ男子ト雖凡少女ノ如
キ養育ヲ受ク婦女ノ業ヲ操リ裁縫發成機遅々

スル者ハ亦之ヲ患ルコトアリ

治法 居ヲ清浄高燥ノ地ニ占メ有力食餌ヲ適宜
ニ用ヒ簡易ニ精神軀體ヲ攝養スルヲ以テ此榮
養機變常病ノ强壮法トス夫勁ク身体ヲ運動ス
ルヲ以テ有利攝養法ト唱ルハ無稽ノ説ナリ其
輕快ニ趣ク時適宜ニ運動スレハ實ニ能ク全治
ヲ促スニ足レ凡病中妄ニ筋力ヲ勞役スレハ大
害アルコト他病ニ於テ見ルト同一理ナリ○醫藥
ハ鐵劑苦味劑ヲ最良トス其劑初應セサルカ如
クナレ凡病増重スル時ニハ歷然ト顯功アリ若

シ初之ヲ用テ害アルカ如キヲ見ハ暫ク捨テ唯
 傍症ノ治法ヲ處スヘシ即心悸亢盛スル者ハ身
 體静息酸類地惹多里斯胃症甚キ者ハ麻醉劑亞
 鉛劑ヲ與ルカ如シ鐵劑ノ中ニ就テハ撒尔末兒
 扶斯乳酸鐵ヲ魁トス鐵屑ハ患者堪ヘ難ク且胃
 中ニ入テ酸化シテ後其用ヲ為スヘキ物ナルヲ
 以テ其功之ニ亞ク越質屋布斯末兒扶斯收斂鐵
 液并ニ鐵氣ヲ胎メル鑛泉モ亦稱用ス肺結核其
 他内臓ノ結核病ヲ合併セル者ニハ諸家鐵劑ヲ
 禁スト雖此發熱效血等ノ症ナキ時ハ敢テ之ヲ

恐ルニ足ラス特ニ收斂鐵液、硃鐵華ヲ用レハ甚
 タ佳、但剛鐵水ハ其含ム所ノ炭酸ニ嫌アルヲ以
 テ互シカラス滿保銅亞鉛モ此病ニ稱譽アリ此
 患者假令ヒ經閉スルモ通經劑ヲ用ルハ無益却
 テ害アリ又白帶下ヲ患ルモ其治法ヲ施スハ不
 當トス專ラ本病ノ治法ヲ主張ノ全身榮養機旺盛
 スレハ子宮ノ官能モ亦隨テ自常機ニ復スレハ
 ナリ撰方左ノ如シ

第一方

磷酸

一錢

淨水

一斗

栗鼈子舍利別子

一錢

右調和為飲料

第二方

亞尔箇兒鐵六分

桂末

白糖各半

右調和、分六包、每服一包、日二三次

第三方

枸橼酸鐵六分至八分

機那末

白糖各半

右調和、分六包、每服一包、日二三次

第四方

菖蒲根越幾斯一分

單方桂皮水五分

香竈酒

二分

右調和每服一匙布匙

第五方

乳酸鐵六分至八分

桂皮油糖

白糖各半

右調和、分六包、每服一包、日二三次

第六方

枸橼酸鐵一分

麻刺薺酒一分

右溶化、每服一匙布匙

第七方

礞鐵華一分

大黃末一分

蒲公英越幾斯適量

右研和為六十九、衣桂皮末、每服三丸、乃至五丸

日二次

第八方

撒尔末兒扶斯各十 蒸餾水二

右溶化、每一時半十滴、沙糖和服

第九方

硫酸滿侃各半 撒尔末兒扶斯各一 上好蜜

刃四 蒸餾水適

右研和、為九十九、衣桂末、每一時半、與三九

第十方

礪鐵華各半 大黃末各十二 白糖各一

右調和、分六包、每服一包、日二三次

第十一方

撒尔末兒扶斯 炭酸剥荅斯各半 睡菜越

幾斯適

右研和、為六十九、衣桂末、每服二三九、日二三次

第十二方

硫酸滿侃 撒尔末兒扶斯各一 白糖舍利

別 香竈水各二

右溶化、每服一匙、日三次

滿侃卜鐵、配合方八近頃佛郎二於于萎黃病

ニ称譽セリ但其効力ノ出ル所ハ全ク鐵ニ係ルカ故ニ其配合方ヲ浩ク茲ニ列舉スルハ無益ニ属ス

伊極篤アルト

治法其要三件ニ歸ス曰體質ノ伊極篤性ヲ滅却スルニアリ曰現症ヲ退治スルニアリ曰各自ノ餘毒症ヲ驅除スルニアリ○體質ノ伊極篤性ヲ滅ノ根治ヲ營ムニハ異常血液ヲ醸スノ源ヲ絶チ尿酸ノ過多ニ生スルヲ防キ諸分泌機ヲ進メ

筋力、神經力ヲ補フヲ要トス而其功ヲ遂ル者ハ專攝生法ニ係レリ攝生法ハ恰當ノ食規ヲ守リ總テ香料ヲ交ル者、滋養ニ過ル者、慄汗膏膩ノ品ヲ戒メ唯、羹汁、及ヒ牛肉ニ少ク蔬菜ヲ調理セル者ヲ與ヘ冷水ヲ飲料ト為サシムヘシ此簡易ノ食規即チ萬全ノ良法ナリ患者若シ冷水ヲ嫌テ刺衝物ヲ嗜ム時ハ少許葡萄酒、麦酒、骨喜、綠茶等ヲ與ルモ佳抑此患者ハ動スレハ強心ノ物品ヲ欲シ之ヲ與ヘサレハ昏聩ヲ發スルニ至ルヲ了リ故ニ此病ハ固ヨリ食物ヲ断シテ治スヘキニ

非ス誤テ断食療法ヲ施セハ俄ニ太甚ノ脱衰ヲ
 作コシ瀕死ノ危険ヲ招クニアリ然レ亦謾ニ患
 者ノ欲ニ充ツヘカラス精神勞役情欲ノ妄動ヲ
 節シ逸居長眠ヲ禁シ開豁氣中ニ徘徊シ田園稼
 圃ニ操作シ旅行獵騎泳游冷水浴等ヲ以テ皮膚
 呼吸諸筋ノ運營ヲ進起セシムルニ良○古來此
 病ヲ療スルノ方法甚ク夥クメ勝テ計フヘカラ
 サルニ至ル是畢竟此病ノ根治ハ專ラ攝生法ニ
 頼ルヘキヲ知ラスノ妄ニ諸藥諸法ヲ試驗セシ
 ニ由レリ其一ニ掲ルニ一刺絡是ヲ稱譽セシ

者アレレ其必當ノ症迫ル時ニ非レハ行フヘカ
 ラス二吐劑下劑是ハ脱衰ヲ作コシ易キヲ以テ
 大慎重ヲ加ルニ非レハ投スヘカラス但下劑ハ
 暫時用テ可ナルニアリ其品ハ大黃、旃那、滿那、蘆
 薈ニ宜シ三發汗劑是ハ全ク益ナシ之ヲ用ヒス
 凡患者自ラ善ク發汗スルヲ以テナリ四緩性利
 尿劑是ハ大ニ益アリ殊ニ磷酸曹連、磷酸安母尼
 亞、并ニ酒石酸、枸橼酸、醋酸ノ剥荅斯、曹連類ヲ良
 トス五苦味劑、保固強壯劑是ハ害アリ唯諸症治
 リテ患者漸ク恢復ニ向ヒ獨消食器ノ衰弱ヲ剩

ス者ニハ用テ可ナリ〔六〕格尔失屈謨是ハ衆醫殊
 ニ英醫ノ奇効藥ト称スル品ナレ氏根治ヲ為ス
 者ナラス但善ク諸症ヲ緩解スルノ能アリ〔七〕安
 質母扭謨、礞黄劑、朴窟福烏篤、蜀羊泉、双鸞菊、列僕
 利等是亦固奇効藥ト称スルニ足ラス撰方左ノ
 如シ

第一方

孕礬酒石半

旃那浸

二錢至四錢

大黃舍利別

右調和每半時或每一時與一匙

第二方

燐酸曹達一

橙花水四

覆盆子舍利別半

右調和每半時或每四分時與一匙

第三方

双鸞菊越幾斯十八

普綸茂里散十二

白

糖一錢或半錢

右調和分十二包每服一包日二三

第四方

蜀羊泉半

煮取五勺加次藥

格尔失屈謨

子丁幾二錢

海葱舍利別半

右調和

第五方

格尔失屈謨根丁幾 朴窟福烏篤華尔斯丁

幾各三

右調和每服卅滴至四十滴日三次

第六方

双鸞菊越幾斯一 金硫黄羊 蜀羊泉越幾

斯通

右調和為六十九衣桂末每服二丸乃至四丸日
兩次

第七方

格尔失屈謨根丁幾 双鸞菊丁幾各二 舍

電發謨阿芙蓉液一

右調和每服十五滴至卅滴日三次至五次

近頃斯格魯弗氏ノ實驗ニ格尔失屈謨ハ其子

ヨリモ其根乾根ニ可ニ効多キ力故ニ格尔失屈

謨根丁幾ヲ用ルニ良ト云

其他溢氣礫氣ヲ含ム冷泉ハ能ク尿酸ヲ生ス

ルノ素因ヲ驅リ亜尔加里性鑛泉ハ諸症極期

ヲ過テ恢復ニ向時并ニ虛性伊福篤ニ施メ強

壯ノ功ヲ羨シ鐵泉ハ瘡後遺ル所ノ關節病ヲ
 治ルノ能アリ宜ク撰用スヘシ又冷水療法ハ
 體中物質ノ新陳交代ヲ催進シ且肌肉ヲ収固
 ノ外感ナカラシムルノ功アリ但葡萄酒療法ハ
 此病ニ害アリ

現症ヲ退治スルニハ緩消燉法ヲ要トス殊ニ醋
 酸刺荅斯枸橼酸曹達ノ如キ緩利尿藥或ハ少量
 格爾失屈謨酒ニ宜シ但刺絡ハ其必當ノ候アル
 時施スヘキノ關節痛強ケレハ阿芙蓉模尔非
 涅菲沃斯類ノ麻醉藥ヲ與ヘ其部ハ常ニ高ク置

キフラ子ルニ包テ温保スヘシ所謂伊極篤紙蠟
 布等ヲ施スハ宜シカラス疼痛極テ劇ケレハ又
 麻醉藥ノ毳布罨法呵囉呔水或ハ鎮痛亞的兒ノ
 擦法ヲ施スヘシ冷水罨法モ亦能ク之ヲ緩解ス
 ルトアリ撰方左ノ如シ

第一方

格爾失屈謨根酒_三 舍電發謨阿芙蓉液_半
 右調和每一時半或每二時與二十滴乃至卅滴

第二方

拔荅忽倭謨油_{即鎮痛亞的兒一}

右供擦劑

第三方

蕪餅心_三

泉水_一

漬化加羯布羅精四_三

瀝過更加次藥

龍腦末

菘蓉越幾斯_{各半}

阿芙蓉越幾斯_二

銳烈燒耐_適

右研和為軟膏之稠

多魯烏松加烏斯
氏伊屈篤毳布

多氏云此毳布ハ伊屈篤ノ關節痛ニ施ノ每常

神驗アリ殆奇効藥ト称ノ可ナリト

各自餘毒症ヲ驅除スルニハ其法數般關節一局

處ノ所患ハ大概倭麻質性關節病ノ治法ヲ照ノ



之ヲ療シ結核腫ハ刺衝性ノ軟膏、罨法、毳布等ヲ

施シ膿腫ハカ所及鍼開ヲ遲延シテ良能ノ吸收

シ去ルヲ俟テ合併病ハ病性ニ應ノ各自對當

ノ治法ヲ處シ殊ニ動脈、強拘、心臟器体病ヲ併ス

ル者ハ別ニ本條アリ其條下ニ就テ其治ヲ索ム

ヘシ虚性伊屈篤變形伊屈篤ノ如キハ其虚状一

時ノ心臟機力ノ沈衰ニ因ルヤ否ヲ察シテ若然

ル片ハ芥子泥、塗擦劑ヲ外用シ薄苛泡劑、本酒、葡

萄酒、硃沙加遏泥子精、鹿角精、鹿琥精ノ如キ刺衝

劑ヲ内服セシノ慢性ノ衰弱症ニハ規尼涅、機那

鐵劑ノ如キ保固強壯劑ヲ處スヘシ撰方左ノ如シ

第一方

鹿琬精 忽弗滿鎮痛液各一

右調和每服卅滴日三四次

第二方

鹿琬精三 及鸞菊越幾斯及羊 格尔失屈謨

酒羊

右溶和每半時與一茶匙

豹列私老氏ノ經驗ニ一高年久ク伊屈篤ニ罹

レリ嘗其關節腫ノ疼痛發動セル際格尔失規
涅ヲ六十分氏宛日ニ三次用ヒシニ通例二月
或ハ三月毎ニ發動セル者再後期年餘モ發動
セサリシト云豹里安氏ハ安息香酸曹達ヲ称
美シ之ニ碯沙旃那ヲ配メ散劑ヲ製セリ用法
ハ初日四氏宛朝夕兩次用ヒ日々六分氏ノ五
ヲ乘シ一日ノ量卅四氏ニ上リ施療中此量ヲ
以テ主張ス施療日數ハ大都初年三月次年六
週乃至二月ナリ

以

遺精トスルルマ

內外諸法 卷三

遺精

三十五

遺精ハ其量交媾ニ由テ漏ルヨリ少シト雖凡全
軀特ニ腦脊髓ヲ犯ス一太甚シ他病ノ恢復期ニ
發スレハ其復故ヲ躊躇セシメ腦ノ官能消化器
ノ運營ヲ妨碍ス

治法 痔疾便秘等之カ因ヲ為ス時ハ先其治ヲ施
シ次ニ食規ヲ正シ刺衝ノ品ヲ禁シ殊ニ晚餐ヲ
減シ多飲ヲ戒ムヘシ膀胱充レハ陰莖勃起ヲ作
シ易キヲ以テナリ俱薄弱家ニハ強壯ノ能アル
食物ヲ與ヘシ身體精神ヲ適宜ニ役シ以テ想像

カノ搖奔ヲ遣ルハ益アレヒ過度ノ操作勞力ハ
害アリ稗史ヲ遠ケ仰臥ヲ慎ムヘシ仰臥ハ亦精
液送出ヲ作シ易キヲ以テナリ寢ルニハ藁蓐上
ニ卧シ衣衾ヲ輕スルニ宜而勃起シテ遺精スル
者ニハ龍腦忽布ヲ用ヒ薄弱家ニハ規尼涅血虛
家ニハ鐵劑體質銳敏ナル者ニハ貌魯謨剥荅斯
ヲ與ヘシ所謂遺精中者ヲ施スハ却テ害アリ是
其形器性ノ壓迫ヲ以テ徒ニ刺衝ヲ増セハナリ
又冷水浴殊ニ背ノ冷水滴浴海水浴冷水療法モ
良驗アリ俱陰部一局處ノ冷洗法ハ害アリトス

內外諸法

卷三

三十五

撰方左ノ如シ

第一方

龍腦及一 垂刺比垂漿并 菩提樹花水四

桂皮舍利別并

右為乳劑、每一時或每二時與一匙

第二方

忽布末十二分至 白糖一

右調和分六包每晚與一包或二包

第三方

忽布越幾斯十二分至 護謨散一

右調和分六包每晚與一包或二包

第四方

貌魯謨剥荅斯十二分至 白糖一

右調和分六包用法同前

第五方

貌魯謨剥荅斯二 燕窩水一

右溶化、每晚與一茶匙

蘓尔利氏過多ノ遺精ヲ療スルニ地獄石ノ腐
蝕法ヲ称セリ其法預尿道ノ覺機ヲ減センカ
為ニ先剛鉄ノ探子ヲ尿道ニ入レ次ニ刺列滿

度氏ノ腐藥装ニ地獄石ヲ具メ尿道ニ送り進
 テ膀胱内ニ臨マシメノ繼テ之ヲ拔退ル時地獄
 石ヲノ暫ク精囊^{シタタケ}阜ニ相觸レシム此法保固強
 壯劑ヲ用ヒツ、體質ノ銳鈍ニ應メ一週間ニ
 一次或ハ二次施シ一二月ノ際主張スル時ハ
 假令^レ畢丸著ク萎縮シ精系靜脈^レハリキス状
 ヲ為セル者ト雖^レ凡猶能ク良驗ヲ收ムヘシト
 云

以

遺溺

ハ^コク^レシ^スル^ナ

治法 此病ハ治術ヲ盡スト雖^レ凡七八歳以前ハ功

ナキ^レ多シ而其後遲キモ十二歳乃至十四歳ノ
 間ニ大抵自ラ治ス然^レ凡十八歳^レ廿歳ニ至テ猶此
 患ヲ抱ク者間之ナキニ非^レ通例寢後半時餘其
 兒ヲ打起ノ尿セシメ深更ノ飲食ヲ禁シ仰卧ヲ
 戒メ薰蓐ニ卧サシメ大便通利ヲ整ヘ蟲症ヲ夾
 メハ之ヲ驅除スル等ニ由テ治スル^レアリ膀胱
 及ヒ膀胱頸衰弱スル者ハ冷水澆注浴香竄浴越
 列幾的兒海水浴鐵劑機那番木鱉ヲ佳ト^レ多^ク呂
 烏^カ設^カ西^カ烏^カ氏^カハ菘蓐ヲ毎夕臨卧ニ與ヘ晝間ハ勉

テ尿ヲ膀胱ニ蓄ヘシメテ其筋ヲ臍脹シ以テ其
 瘻性緊縮ヲ防キ此ニ由テ屢根治ヲ得タリト云
 同氏又一種ノ縛帶ヲ称用ス其法彈力アル帶ヲ
 腹ニ纏ヒ其後ニ剛鉄ノ彈具ヲ繫ケ彈具ノ端ニ
 「エラスチセゴム」ノ鈍氷柱状ノ物附ス是其彈具
 ヲ肛門ノ方ニ進テ攝護腺ノ部ヲ壓定スルヲ主
 トス虞碌斯氏ハ龜頭下面ニ「ボウギ」ヲ置キ硬
 膏ニテ固定シ以テ同功ヲ得シト云多呂烏設亞
 烏氏ハ少女ノ遺溺ニ「エラスチセゴム」ヲ以テ囊
 状ノ物ヲ設ケ空氣ヲ充テ、膀胱ノ下部ヲ壓セ

シノタリ刺列滿度氏ハ香竈藥加燒酒ノ浴法ヲ
 施シ浴後「アラ子ル」ヲ以テ其體ヲ摩措ス此ヲ施
 ス一大都十五回乃至十八回ニノ全治ヲ得ルニ
 足ルト云私多列格尼涅、芫菁、格湃霍、華澄茄等ハ
 諸家ノ稱譽セシ品ナレ氏皆驗ナシ撰方左ノ如
 シ

第一方

菘若越幾斯二 甘草末 甘草膏各十
 右研和為十二丸衣伊里斯弗魯連底那末每晚
 臨卧與一丸

第二方

苋若越幾斯ハ十二分白糖ハ五十
右調和為十二包每服一包日三次

第三方

番木鱉越幾斯ハ越質屋布斯末兒扶斯ハ
右研和為七四丸衣石松子末每服一九日三次

第四方

菘若越幾斯ハ一蒸餾水ハ二
右溶化每服一茶匙日三次

以

陰腫

ハ

治法是ハ多クハ陰唇ハ拔ハ多ハ尼ハ腺ノ片側或ハ兩側
ニ於テ焮腫スルナリ初起消焮分散ノ法ヲ處シ
次ニ釀膿ヲ促シ既ニ釀膿セハ鍼刺スヘシ但鍼
口ハ大ナルヲ貴フ小ニ過レハ癢瘡ト為リ易シ
若癢瘡ニ變セハ沃胃謨丁幾ヲ注射シ撒絲ヲ挿
ミ以テ焮衝ヲ作シテ治癒ヲ促スヘシ然レ頑固
ノ癢瘡ハ其穿路ヲ切開クヲ妙トス乳頭狀陰腫
ハ單寧酸ヲ阿芙蓉ニ和シ或ハ塩酸鐵ヲ偏列設
里涅ニ溶シテ局處劑トシ保固強壯劑ヲ與ヘ温

湯浴ヲ施サシムヘシ小兒ハ冷氣ニ胃觸シ或ハ
清刷ヲ急リ或ハ局處刺戟ニ由テ陰腫若クハ白
帶下ヲ發スルニアリ是大抵自ラ治スレバ忽ニ
スル時ハ慢性症ニ陥リ易シ内服ニハ甘草、麻、
涅、失亞ノ劑ヲ與ヘ局處ニハ緩和洗劑、軟膏、塗擦
膏、^{清涼軟}、^{膏ノ名}ニ摸ル非涅ヲ加ル者ノ類ヲ施
シ尿後毎次温湯坐浴ヲ行ハシノ慢性症ニハ鐵
劑ヲ用ヒ斯キ局處劑ニ收瀉藥ヲ伍用シ鉛糖、蓮
沙、或ハ消酸銀ノ稀溶液ヲ洗劑トシ終ニハ唯、單
寧酸、皓礬ノ如キ收瀉劑ノミヲ施スヘシ壞疽性

陰腫大人ニ在テハ產褥熱ノ併症トシ小兒ニ在
 テハ流行病ト為テ發シ或ハ猩紅斑、麻疹等ノ如
 キ熱性病ニ繼發ス治法ハ規尼涅、格魯林加爾基
 或ハ收斂鐵液ヲ内服セシムヘシ而此症局處劑
 ハ最要トセス

撰方

鉛糖二 醋酸摸尔非涅一 蒸錫水一

右調和供洗劑

以

陰痛ハギルナリ左ス

内小前法 卷三

治法 往時ハ陰唇及ヒ鼠蹊ニ蜈蚣針ヲ貼ノ之ヲ療
 セリ之ニ由テ疼痛忽チ歇ムコトアレ氏或ハ絶テ
 功ナク加之斯類ノ瀉血屢行ヘハ其婦遂ニ經閉
 ニ罹リ妊孕ノ力ヲヒフ等ノ弊アリ冷水滴浴冷
 罨法モ亦功驗少ク産性孳急ヲ夾ム症ニ施ス時
 ハ却テ其病ヲ増重セシムルコトアリ因テ輒近ニ
 至テハ局處麻酔法ヲ称用ス是呵囉呔水ノ蒸氣
 或ハ亞的兒蒸氣ヲ局處ニ朝セシムル法ニ通
 例ニ羨乃至三爻ノ呵囉呔水ヲ以テ舐ク一二密
 扭篤間ニ疼痛ヲ忘レシル卓驗アリ此法ヲ施ス

ニハ花尔埤^ハ氏ノ装置ヲ最佳トス是藥ノ瞑眩
 總身ニ及フヲ見ハ患者意ニ任セテ施法ヲ捨キ
 忽チ藥力ヲ挫キ得ルヲ以テ人々恐怖セスメ信
 用スルノ利益アリ若其装置ノ貯ナキ時ハ呵囉
 呔水一爻家猪脂ニ研和シ丹^{クシ}奔^ボニ塗布メ腔内ニ
 挿入スルモ亦良阿芙蓉軟膏摸尔非涅軟膏、莖蓉
 軟膏等ヲ腔内ニ塗敷スル法アレ氏皆呵囉呔水
 ノ功ニ若カス或ハ醇青酸ヲ子宮頸ニ搽テ甚夕
 良驗ヲ得タリト云者アレ氏此藥過用スレハ大
 危險ヲ招クノ恐アルヲ以テ妄ニ患婦ノ手ニ委

子難ク屢醫手ヲ煩スノ弊アリ或ハ消酸銀一錢
 常水一匁溶化ノ丹奔ニ醮シ腔内ニ挿入スル腐
 蝕法ヲ試ル者アレ氏多クハ寸功ナク却テ危害
 ヲ招キ且之ヲ施スニハ必_ス醫者ノ手ヲ假リ加之
 瘥寧ヲ夾ム症ハ之カ為ニ疼痛ヲ増發スルノ弊
 アリ或ハ單寧酸ト消酸銀ノ丹奔ヲ施セシ者ア
 レ氏是亦別ニ奇驗ヲ奏セシナシ當今此合劑
 ハ唯腔ノ粘液膜織質變壞ヲ兼ル症ニ施スノミ
 要之右局處ノ諸方法ハ皆唯苟且ノ鎮痛ヲ目的
 トス根治ヲ得ント欲セハ内服劑ニテ全軀ニ涉

ルノ治法ヲ處セサルヘカラス設我印氏ノ加刺
 胃_ゴ膜_モ丁幾ハ内服劑中ノ奇効藥ト稱ス發作定時
 アル症ニハ每常規尼涅ヲ佳トス忽_ト布_モ亦卓驗
 アリ此病ニ最大功用ヲ為ス者ハ鑛泉浴ナリ即
 血質水分多クノ紅分乏キ人多産過房等ニ由テ
 虛憊セル患者ニハ含鐵鑛泉天然食塩浴ヲ佳ト
 シ瘰癧質ノ患者ニハ沃胃謨浴痔疾家ニハ硫黃
 泉塩泉ヲ佳トス而此治ノ終ヲ完スルニハ猛濤
 海水ニ浴スルニ宜シ故ニ北國ノ海浴ヲ最妙ト
 云其他腔子宮卵巢等ノ織質變常ヲ兼ル症ニハ

各自對當ノ療法ヲ處スヘキヲ固言フ俟夕又撰
方左ノ如シ

第一方

清淨摸尔非涅六八至十八

越没里膏二

右研和取豆大搽腔内

第二方

葭菈越幾斯八 越没里膏二

右研和用法同前

第三方

硫酸規尼涅六八至十八 稀硫酸一 蒸餾水四

右調和每服一匙日三次至六次

第四方

呵囉防水 甘扁桃油各二

右調和塗綿片挿入腔内

第五方

設我印氏加刺八 蒸餾水八

右調和每一時半與一匙

第六方

礫酸規尼涅六八至十八 枸橼皮油糖 白糖各

變

右調和分六色每服一色日二次至四次

波烏百尔篤氏ノ經驗ニ腔内汚疹ヲ發シ知覺

過敏ニメ痛痒ニ堪ヘサル症ニ極列設里涅ヲ

用タリ其法布片ヲ極列設里涅ニ蘸メ腔内ニ

挿入スル一日ニ兩次而朝暮冷水洗法ヲ行ハ

シム此ニ由テ痒疹共ニ速治シテ復々再發セザ

リシト云

以

陰痒フ、ヒル、キ、子、ウ

治法 陰痛ニ同シ

內外新法卷之三 梅谷濟 世美校



