



00
1874

ヤ4
1448
2



扶氏經驗遺訓卷之二

足守

緒方章公裁

義弟郁

子文

同譯

西肥

大庭

志景德

參校

腐敗熱

五ブリスヒトリダ
ワトコルツ蘭

徵候 神經熱ノ諸證ヲ具ヘ虚脱極メテ甚シク脈

短數弱小ニノ肌膚異常ノ熱ヲ發ス之ニ觸ル

ニ刺スカ如ク灼クカ如ク惡ムヘキ感觸ヲ與ヘ

久フシテ手之ニ慣レス却テ其熱ノ増スヲ覺ス

之ヲ放テ氏掌中ノ感觸急ニ去ラス

是動體ノ活
温ニ非ス溶



崩腐敗ノ爲ニ發スル熱ナリ而蒸氣噓氣諸排泄皆腐臭有テ油
 ノ如キ粘汗流瀉シ小便濃厚溷濁シ衄血尿血便
 血蓐瘡壞疽血斑後ニ本及溶崩下利等腐敗ノ徵
 ヲ現ハシ刺絡ノ得ル所ノ血黯色ニノ沕ツト血
 肝トニ分離セス混濁ノ糊ノ如シ平人ノ血ヲ器
ノ塊ヲナレ稀液分レテ滿面ニ浮フ其
稀液ヲ沕ト云ヒ其塊ヲ血肝ト云フ
 原由 此病率皆神經熱ノ繼病病ナリ然レ他熱
殊ニ熾モ亦溫藥ヲ誤用シ不潔ノ室中ニ蟄居ス
衝熱レハ終ニ此病ニ轉ス又傳染毒ノ侵襲ニ由リ尖
 苟兒ケラハ陪ボイ苦ノ素因ヲ胎ムニ由リ汞劑ヲ多服スル

等ニ由テ初起ヨリ直チニ腐敗熱ヲ發スル者ア
 リ而其本性ハ生力已甚シク衰弱ノ諸液溶渙ニ
 傾ク者トス
 治法 沈衰セル生力ヲ振起シ溶崩腐敗ヲ防クニ
 アリ生力ヲ振起スルニハ最有力ノ衝動藥ヲ用
 ヒ神經熱重證ノ治法咸舉テ之ヲ行ヒ殊ニ葡萄
 酒ヲ與フヘク腐敗ヲ防クニハ凝流ニ體ヲ收固
 シ溶崩ヲ拒ムヘキ方藥ヲ撰用スヘシ即幾那或
 皮鑛酸明礬第十方等ヲ内服セシメ冷瀉法ヲ頭上
 心下ニ施シ水ニ醋ヲ加ヘテ冷洗法ヲ行ヒ氷片
 夫大貴川 卷之二 二 道通齋藏

ヲ以テ諸部ヲ摩擦シ冷水ヲ飲マシメ新鮮清涼
ノ外氣ヲ迎入スル等ナリ但芫菁膏ハ此病ニ宜
シカラス其壞疽ヲ作シ易キヲ以テナリ而一部
ノ壞疽ハ幾那ニ葡萄酒明礬礪砂沒藥等ヲ加ヘ
テ蒸漏法ヲ行ヒ其敗臭ヲ禦クニハ蘓魯林加爾
幾全ヲ外用ス

腸胃熱ガストリセコルツカ

徵候 舌胎不潔黄色或黑黃惡心メ體味苦味汚味
粘味ヲ覺エ心下苦滿メ倦怠殊ニ甚ク頭重フメ

頭痛最劇シク脈甚短數ナリ而レハ焮衝熱ノ如
ク緊實ナラス神經熱腐敗熱ノ如ク微弱ナラス
自餘腸胃汚物ノ證アルト患者ノ體質ト當時ノ
越必必至密性病ト他ノ熱病ノ徵ナキトヲ參考メ
以テ之ヲ決スヘシ而仍微惑アル者ハ假リニ揮
發衝動藥或防焮衝藥ヲ投メ之ヲ試ムルニ兩藥
功ナク却テ害アル者ハ則此病タルヲ疑ヒナシ
此病經過定度ナシ唯停食ニ起因セル者ハ一二
日ニシテ解シ膽液熱粘液熱ノ如キハ數週連綿ス
ルヲアリ其時期モ亦一定ノ次序ナシ終始貫通

ノ純一ノ腸胃熱ニ止マルアリ始メ腸胃熱ニノ
後チ總身熱焮衝熱神經熱ノ類ニ變シ或始メ總身熱ニノ
中頃腸胃熱ニ轉シ後チ終ニ他ノ熱ニ變スル
アリ此病ハ獨リ純一ノ者ハ吐下ニ由テ汚物
排除スレハ全ク分利ヲ得ルト雖モ他熱ヲ兼併
シ或轉メ他熱トナル者ハ尚且發汗利尿ノ排泄
有テ而後ニ分利スルヲ得然レモ其分利多ク
ハ全カラヌノ粟疹膿腫驚口瘡及血斑等ノ轉徙
病ヲ致ス是其始メ疎滌藥ヲ急リ或發汗起熱ノ
藥ヲ用ヒ以テ其毒ヲ血中ニ輸タスニ坐ス凡腸

胃熱轉メ神經熱腐敗熱トナリ或遷延熱ニ徒ル
者モ亦多ハ皆之ニ因ス而其區別モ亦多端ナリ
乃其因ヲ以テ分テハ停食熱膽液熱粘液熱蛔蟲
熱等其性ヲ以テ分テハ焮衝性神經性腐敗性等
其兼證ヲ以テ分テハ兼胸痛證兼肝焮衝證兼頭
痛證兼腦焮衝證等ナリ
原由 近因ハ毒物腸胃ニ在テ消食機之ヲ制剋ス
ルヲ得ヌ其運營ノ變一身ノ血脈神經ニ波及
スルナリ而其毒ハ外ヨリ入ルアリ内ニ生セバ
アリ其外ヨリ入ル者ハ飲食ノ多寡性質等宜キ

失貴川 卷之二 道通齋成

二適セスノ消食機ノカヲ拒ミ化セスノ内ニ停滯セル者ナリ其内ニ生セル者ハ腸胃肝等ノ分泌機變常ノ其液膽液粘液胃液腸液等量ヲ差ヘ性ヲ敗リ以テ腸胃ニ鬱滯セル者ナリ其鬱滯間ニ非常故ニ過多ナルアリ

二其内ニ生スル者ニ於テハ分泌ノ變常第一因ニメ汚物膽液粘液等ハ其餘弊ナルノミ然レモ汚物除カサレハ熱證退カス故ニ汚物ヲ以テ其熱ノ近因トス而胃腸肝藏ノ衰弱弛緩感動過敏為ニ膽液

粘液生シ易ク僅微ノ事故ニモ鬱滯シ易シ平生靜坐ヲ業トシ飲食ヲ節ニセス難化ノ食物ヲ喫スル等或霖雨久ク霽

レス粘液鬱滯ノ因炎暑長ク退カス膽液鬱滯ノ因不良ノ飲食ヲ用ヒ憂苦悲愁ヲ被ムル等之カ素因トナル故ニ夏秋ノ時令寒暖不定ノ諸國繁華飽旨ノ都下ニ於テハ此病流行スルニ殊ニ多シ而其誘因ハ飽食勞思忿恚疼痛感冒等劇キ感動ヲ起ス者皆是ナリ故ニ諸熱病腸胃熱ヲ合併セサル者幾ント希ナリ

治法 唯腸胃ノ汚物ヲ疎解ノ滌除スルニアリ吐下ニ由テ解散セサル者ハ腸胃熱ニ非レハナリ但其病勢ニ準テ治法亦各小異アリ宜ク注意ノ

之ヲ分辨スヘシ

第一汚物排除ノ機撥ヲ現セサル者自吐下ヲ催サハル者

ハ先ツ孕鹼酒石名芒消等解凝瀉下ノ藥ヲ取リ

少許宛與フヘシ但強ク下利セシメサラシテ

要ス而粘液甚キ者ハ礪砂孕礬酒石名ヲ與ヘ感

動過敏ノ者ハ沸騰散第二方民埵列里精ヲ與ヘ水

瀉ヲ兼ル者ハ水瀉ハ排除ノ機ニ非ス亦礪砂ヲ與ルニ宜シ

凡是諸藥ハ分泌ト排泄トヲ催進ス故ニ之ヲ用

フレハ或汚物自ラ消除シ或惡心若クハ下ヲ催

スニ至ル是時ニ於テ始メテ其機ニ應メ吐劑下

劑ヲ用ルヲ良トス或右ノ諸藥功ナク亦吐下ヲ

催サス熱勢愈増進スル者アリ是ノ如キ者若多

血焮衝ノ微アラハ意ヲ用ヒテ刺絡ヲ施シ神經

熱證有テ腹部殊ニ胃部ノ痙攣ヲ兼ル者ハ顯草鏡菲

阿斯補葛私多樓謨名等ノ鎮痙藥ヲ取リ解凝藥

ニ伍メ與フヘシ

第二上ニ排除セントスルノ機撥ヲ現スル者ハ

直ニ吐劑第十三方少許宛與ヘ以テ吐ヲ得ルニ至ル

ヘシ一吐ノ後四分時ニ至ルマテ再ト吐セサル

者ハ更ニ復少許ヲ與ヘ以テ吐三回ヲ得シテ

要ス但毎吐後必加密列泡劑名ヲ與ルヲ佳トス
 若焮衝性ノ合併病有テ脈緊實ナル者ハ先ツ刺
 絡ノ而吐劑ヲ與ヘ吐ヲ得テ而下劑ヲ與フヘ
 凡吐劑ハ微ニ與ルニ宜シ一頓ニ多量ヲ與レハ
 過度ノ吐ヲ起シテ危險ニ陷ル者アリ胃ノ感動
 ハ患者各大ニ差等アル者ニメ預メ之ヲ知ル
 難シ其感動過敏ナル者ニ至テハ唯海葱蜜名加
 密列泡劑ノミヲ用ヒテ十分ノ吐ヲ得ニ足ル者
 アレハナリ然レモ久ク吐劑ヲ怠リ胃已ニ汚物
 ノ刺衝ニ慣レ終ニ感動遲鈍トナリ水瀉ヲ兼ル

者ハ少量ノ吐劑吐ヲ起サス却テ下ヲ増ス者ナ
 リ此證ハ吐根一刃ヲ頓服セシムヘシ但吐酒石
 ハ宜シカラス其下ヲ起スヲ以テナリ若其感動甚遲鈍ニメ
 下利多キ者ハ先ツ芫菁膏名ヲ胃部ニ貼シ阿芙蓉
 蓉液二三滴ヲ内服セシメ而後吐劑ヲ行フヘシ
 或以爲ラク吐劑下劑同功ナリ吐劑ニ代フルニ
 下劑ヲ以テスルモ可ナリト是豈然ラシヤ夫ノ
 自然良能ノ吐ニ由テ除カント欲スル者ハ下劑
 ノ能ク治ムル所ニ非ス且吐劑ハ胃肝ノ神經ヲ
 激動ノ其分泌機ヲ轉變スレモ膽液熱ノ如キニ於テハ此轉變ヲ

以テ能ク汚物ノ下劑ハ絶テ其功ヲ奏スル一能
泉源ヲ壅止ス
ハス之ニ加ルニ其排除ノ道路長クメ衰弱ヲ起
シ汚物ヲ血中ニ輸タス等ノ恐レアルナリ然リ
ト雖凡便秘甚キ者遽カニ吐劑ヲ與レハ動モス
レハ吐糞病ヲ起スニ至ル宜ク先ッ灌腸法ヲ行
テ腸ヲ一掃シ而後吐法ヲ處スヘシ

第三 下ニ排除セシトスル機撥ヲ現スル者ハ腹
滿メ腰痛シ雷鳴メ惡臭ノ尿氣ヲ洩ラシ或自ラ
下利ヲ發ス此證ハ始メヨリ直ニ下劑ヲ用フヘ
シ然レ凡亦少許宛與ルヲ良トス而感動過敏ノ

者ハ孕鹼酒石名芒消滿那名ヲ與ヘ感動遲鈍ノ
者ハ瀉利鹽孕礬酒石名ヲ與ヘ尚頑鈍ナル者ハ
之ニ補那ヲ加ヘ第十方衰弱甚クノ痙攣ヲ兼ル者
ハ大黃甘汞亞麻仁油ヲ與ルニ宜シ凡下劑連用
ノ長短ハ汚物ノ多少ト熱ノ増減トニ準フヘシ
熱勢諸證減退スレ凡大便仍穢物ヲ交フル際ハ
持續メ之ヲ用ヒ諸證全ク去リ食欲常ニ復スル
ニ至テ始テ漸ク強壯藥ニ移ルヲ法トス然レ凡
大便水瀉スル等汚物ノ微復現セハ再ヒ解凝藥
ヲ用ヒ上下排除ノ機ニ乘メ更ニ吐下劑ヲ撰用

夫大瀉丸 卷之二 通瀉劑

スヘシ是故ニ下劑ノ連施短キハ三日ニ足ル者アレ氏長キハ三週ニ至テ仍止ムヘカラサル者アリ

其他合併ノ熱病ト汚物ノ性質ニ注意メ治法ヲ處スルノ緊要ナリ即煥衝熱ヲ兼ル者ハ防煥藥ヲ與ヘ神經熱腐敗熱ヲ兼ル者ハ揮發強壯防腐ノ諸藥ヲ兼用シ腐敗ノ膽液ニ起ル者ハ酒石酸答麻林度名ヲ與ヘ腐壞ノ汚物ニ起ル者ハ硫酸鹽酸含ヲ與ヘ酷厲毒ニ起ル者ハ粘味ノ飲液列沙布漿亞刺比亞ヲ與ヘ粘液ニ起ル者ハ礪砂海葱護謨漿ノ類

遠志吐酒石名等ヲ與フルカ如シ

此病適當ノ排除ヲ得テ腸胃ノ諸證既ニ去レテ熱仍留連ノ治セサル者アリ是汚物ノ血中ニ達セルカ或合併病ノ所為ニ係ル宜ク民埜列里精安質沒扭名セル左水鑛泉等ヲ用テ總身ノ分利發汗ヲ促カシ或合併病ノ治法ヲ施スヘシ而其合併ハ神經證殊ニ多シトス故ニ衰弱甚キ者ハ強壯藥ヲ行ハザルヘカラス凡腸胃熱其終リ必強壯劑ヲ用ヒンノ要ス汚物ノ再ヒ生スルハ多ク皆衰弱ニ因レハナリ但

薄弱ノ徒ハ汚物仍未去ラス凡強壯藥ヲ與ヘテ
 可ナリ強壯藥ニハ先ツ蒲公英麻爾羅歌補睡菜
鏡等ノ越幾斯第十方ノ如キ苦味解凝品ヲ與ヘ次
 テ括失亞補ヲ用ヒ第十方證ニ隨テ大黃ヲ加ルヲ
 良トス

儻麻質熱コウブリスレウマチカカ羅

聖京屈熱シンブリスカタールラリスス羅

徵候 寒熱交發ノ四肢掣痛シ小便頻數ニノ或痛
 ヲ兼子其色溷濁ニノ瓦色ノ沈渣ヲ見ハシ彼邦

未之ヲ審ニセス其色汗スレハ輒輕快ヲ覺エ冷
 我邦ノ土盃ノ如キカ

ユレハ輒熱ノ進ムヲ覺ユ而儻麻質證ヲ發スル
 者ヲ儻麻質熱ト謂ヒ聖京屈證ヲ發スル者ヲ聖
 京屈熱ト謂フ蓋此兩證熱ト同時ニ發スルヲ常
 トスレ凡或先チ發スルアリ或後レテ發スルア
 リ

儻麻質證諸部殊ニ筋骨疼痛ヲ發ノ或腫起シ其

痛或一處ニ停住シ或彼此ニ遊走ス若夫ノ遊走
 外部ヨリ内部ニ向フ者ハ惡徵ナリ

聖京屈證即感冒證鼻孔氣管等ノ粘液膜ニ病患ヲ得

ル者是ナリ而其頻リニ嚏ヲ發メ稀凉苛厲ノ涕
液ヲ流泄スル者之ヲ鼻感冒ト名ク其液漸ク變
メ稠厚膿狀ト為ルニ隨ヒ熱ト諸證ト共ニ漸ク
減退ス其咳嗽頻數咽喉乾燥聲啞レ咽痛ニ稀凉
ニメ少苛厲ナル痰ヲ咯出スル者之ヲ咽喉感冒
或胸感冒ト名ク其痰漸ク烹熟メ粘膿狀ト為ル
ニ隨ヒ效嗽熱證亦共ニ減退ス右兩證鼻感冒多胸感冒
ハ相兼發シ或互ニ轉換ス

原由 近因ハ皮膚運營蒸氣ノ抑遏ヨリ對稱機
ニ由テ筋。湯乙膜筋膜。骨膜。胸膜。粘液膜等ノ總稱鼻孔。氣管



ニ嗽衝様ノ抗抵病ヲ發シ其湯乙湯其粘液變性ノ
苛烈ノ刺衝物ト為リ以テ那ノ抗抵ヲ持續セシ
ムルニアリ其變ノ筋。湯乙膜ニ在ル者ハ儂麻質ト為リ粘液膜ニ在ル者ハ聖京強ト
為ル蓋此抗抵唯湯乙管唯動脈ノ末梢赤血通セスノ
擬嗽衝ニノ真嗽衝ニ非ス故ニ其部微發赤起熱
スレニ結膿スルニ至ラス然レニ其刺衝甚シク
増進シ若クハ他因之ニ加ツテ終ニ血管ヲ侵ス
ニ至テハ乃真ノ嗽衝ト為ル凡皮膚衰弱ノ感動
過敏ト為ル者温居煖衣度ヲ過コシ若クハ閉室
ノ外氣ニ觸レテ總身ノ脆弱ヲ致セル者血

液變性ノ一種粘液様ノ惡液ト爲レル者或春時
秋末ノ氣候大氣ノ變性居恒風ヲ受テ寒煖ノ渝
變ニ係リ易キ住地等皆之カ素因ト爲ル而其誘
因ハ寒氣ニ冒觸シ寒煖急卒ノ變更ニ遇ヒ賊風
ニ感シ温服ヲ脱スル等ナリ

治法 皮膚ノ運營ヲ整復シ兼テ總身各部ノ焮衝
證ヲ預防スルニ在リ凡^レ樓麻質證^シ聖京^シ屈證^ニ共ニ
增長スレハ乃^チ真ノ焮衝ニ轉ス故ニ終始其熱ノ
劇易ヲ慮ツテ之カ策ヲ行ハン^トヲ要ス^レ即^チ熱勢
劇クノ多血ナル者ハ先ツ刺絡ノ消石ニ安質^ヲ没^ス

扭鹽 發汗安質沒扭金 硫黃吐酒石ノ類 ヲ伍シ與ヘ兼テ防焮ノ將

息ヲ命シ居室ヲ熱セシメス亦寒煖不等無ラシ
ムヘシ然^レ熱度減退スル者或始メヨリ熱劇シ
カラサル者ハ民^ニ塚^列里^精安質^沒扭劑^接骨^木花
第七方等ノ如キ刺衝少キ發汗藥ヲ與ヘ芫菁膏ヲ
外貼スルニ宜シ熱尚少キ者ハ雙鸞菊^{第十方}遠志^{九方}
蜀羊泉^鏡朴屈福烏篤脂^名硫黃^名等ヲ與ヘ或^ハ羯布^名
羅^ニ消石ヲ配用シ^{第十方}芫菁硬膏^名ヲ外敷スヘ
シ患者若^シ神經質ニノ痙攣性ノ劇痛アル者ハ阿
芙蓉ヲ與ルヲ良トス瀉血ハ最^ニ慎重ヲ加ヘ^ン

夫大貴川 卷之二 通鑑

ヲ要ス過度ナレハ必病ヲノ遷延瀰久セシム患部ノ瀉血ハ特ニ忌ムヘシ然レモ胸感冒ノ胸内刺痛呼吸困難乾欬等ノ證アル者肺嗽衝ヲ微肺勞ノ素質有テ既ニ肺患ヲ得タル者感胃ニ由テ動轉シ又肺勞ニ等ハ必刺絡セサルヘカラス痺麻質熱聖京屈熱共ニ能ク腸胃熱神經熱ヲ合併ス宜ク對證ノ治法ヲ處スヘシ殊ニ神經熱ノ合併甚多ク且危險ニ陥リ易シ是最注意ノ其治法ヲ施サンコトヲ要ス

凡聖京屈熱ハ殊ニ粘液膜ノ刺衝ヲ寛解シ烹熟

分利痰吐ヲ催進セシコトヲ要ス故ニ安管沒扭劑硫

黃接骨木花苗香過アチイ泥子甘草第二十一方緩和粘

滑ノ飲劑蜜劑紙劑等ヲ用ヒ湯蒸氣ヲ吸入セシ

ノ或バラ子ル布名ヲ以テ胸部ヲ溫被セシムルニ

宜シ若胸痛有テ刺絡證無キ者ハ其部ニ發泡膏

ヲ貼スヘシ樓麻質痛モ亦毛布若クハ絹布ニテ

患部ヲ溫被シ局處ノ發汗ヲ促カシ疼痛劇キ者

ハ近傍ニ莞菁膏ヲ貼ノ釀膿セシメ赤色焮熱焮

衝ノ微アル者ハ琪鍼吸角ヲ施シ感動過敏ノ者

ハ阿芙蓉膏第二十一方外貼スヘシ熱氣既ニ退テ

失大貴川 卷之二 通言

傳麻質證シキ聖キ京キ倨證ホ仍依然トノ留連スル者ハ後ノ傳麻質編ニ參勘メ各其治法ヲ行フヘシ

傳染熱

「エ」「ブ」「ア」「リ」「ス」「ア」「キ」「タ」「コ」「ン」「タ」「キ」「オ」「サ」「シ」「テ」「ケ」「ン」「デ」「コ」「ル」「ル」「ツ」「蘭」

徵候 凡熱病外來ノ傳染毒ニ起テ證候經過各毒固有ノ性ヲ具フル者之ヲ傳染熱ト謂フ即痘瘡麻疹疫咳傳染疫列漢多疫發黃熱恐水病哥烏垓百私篤密爾多扶兒ニ共ニ出ツ等ノ如キ者是ナリ

原由 傳染毒ハ各人ノ體質ヲ擇ハス常ニ一定ノ病ヲ起シ亦同種ノ毒ヲ釀成セシム而一般アリ

一ハ動體生機ノ作用ヨリ生シテ人身ヲ侵襲スル者ナリ一ハ大氣中ニ生シテ人身ヲ侵襲スル者ナリ然レモ其毒タル之ニ契合スル感應性ヲ具フル人ニ非レハ感染セス而其感染スル先ツ生力ノ抗抵病ヲ挑起ノ種ニノ病證惡寒發熱 嗽衝發疹等ノヲ發シ漸ク資成ノ機力病ヲ轉ノ終ニ已レト同一ノ毒ヲ釀成セシム猶夫ノ植物ノ種子先ツ芽ヲ抽キ枝葉ヲ生シ蕃息暢茂ニ花開キ實結テ終ニ同一ノ種子ヲ生スルト其機殆ト一ナリ故ニ急性ニノ經過ノ次序發疹排泄等植物ノ花 實ヲ結フ

ニ譬ノ時期整然タル者ハ植物ノ宿根セス一歳ニ榮枯ヲ爲ス者ノコトク慢性ニノ久ク淹滯シ時ニ増減浮沈スル者ハ植物ノ宿根スル者ノコトシ徵毒瘰癧毒ノ類ノ如シ其根ヲ拔サレハ其病ヲ治シ難シ是ニ由テ之ヲ觀レハ凡テ急性傳染病ノ治ハ其毒ヲ攻ムルヨリ早ク其生息蕃茂ヲ禦クニ在ルヲ知ルヘシ傳染熱固有性五件

第一生カヲ振起ス是邪毒侵襲ノ所爲ニノ病ノ初起ニ在リ故ニ其初メ多クハ皆焮衝性ナリ

第二焮衝ノ素質アル者ニ非レハ焮衝證久シク

持續セス忽チ轉メ反對證虛性ト爲ル是唯外毒ノ爲ニ苟ラク發動セル焮衝ニノ真ノ焮衝ニ非レハナリ

第三傳染毒ノ異ナルト各人生カノ差フトニ隨テ其證狀各同シカラス則傳染毒ノ性異ナル者ハ或直チニ生カヲ抑損スルアリ或ハ齊シク血質ヲ侵襲スルアリ各人生カノ差フ者ハ同一ノ傳染毒ヲ受クレル甲ハ焮衝熱ヲ發シ乙ハ神經熱ヲ患フルカ如ク各其熱狀ヲ殊ニス又當時ノ越必越必埤密性能ク各人ノ體質ヲノ一様ノ素因ヲ

有セシム乃痘瘡麻疹神經熱等ノ如キ各其毒ヲ
異ニスル者モ或一般ニ焮衝性ヲ得或一般ニ虛
性ヲ夾ミ或一般ニ腸胃性ヲ兼ルコアリ

第四大率皆十全ノ分利ヲ得難ク變形轉徙病等
ヲ以テ不全分利ヲナス是其毒頑性ニ生力之
ヲ化シ盡ス可能ハサレハナリ

第五傳染毒ノ増息スルト否ラサルトハ單ニ熱
勢ノ強弱ニ準フ故ニ起熱ノ諸因ハ皆能ク其毒
ヲ滋蔓セシメ解熱ノ諸件ハ皆能ク其毒ヲ減却
セシム

傳染熱經過四期

感染期 始メテ感染スルノ期ニノ所謂ル布種
ノ時トス其間タ較著ノ證候ナク短キハ三日許
長キハ十四日ニ及フ者アリ

發熱期 生力抗抵始メテ奮發スルノ期ニノ所
謂ル抽芽ノ時トス

發現期 痘瘡ノ如キニ在テハ起脹灌漿スルノ
期ニノ所謂ル花實結ヒ種子成ルノ時トス

減退期 諸證退散ノ期ニノ所謂ル凋落死枯ノ
時トス

治法 熱性ヲ查點メ各之カ備ヘヲ爲シ傍ハラ毒
 性ニ注目ノ對證ノ治法ヲ處センコトヲ要ス凡テ
 此病ハ自然良能ノ病毒ヲ化ノ體外ニ排擯セン
 トスルノ妙機ニ出ツ故ニ熱度中和ヲ得ル者性善
 痘瘡ノ醫ノ助ケヲ俟タス確定セル時期ヲ經テ
 確定セル時日ニ至リ自全治スルコトヲ得ルナリ
 然レ氏病勢差劇フメ熱性班然ト頒カル者ハ各
 其性ニ隨テ對證ノ治法ヲ立テサルヘカラス但
 病初ニ於テハ統テ防焮法ヲ行フニ宜シ其熱ハ
 則固ヨリ病毒排除ノ機ニ出ツト雖氏勢ヒ劇キ

時ハ其毒之カ爲ニ滋蔓スレハナリ古人斯ノ諸
 病ニ溫熱發汗ノ藥ヲ用ヒ其毒ヲ驅除スルヲ以
 テ治則トセシハ惑ヘルノ甚キ者ニ唯其毒ヲ
 増スニ足ルノミ故ニ方今ハ務メテ熱勢ヲ制挫
 シ以テ病毒ノ蕃息ヲ減却スルヲ治術ノ通法ト
 ス而病室ノ溫度ハ列氏驗溫管ノ十四度ニ越エ
 シメス夏日ハ冷水ヲ器ニ盛テ室内ニ置キ且之
 ヲ室内ニ撒潑シ羽毛ヲ充ツル衾褥ヲ除キ羽毛衾
褥ハ其熱ヲ増スノミナラス患 藁褥ニ卧ノ輕衾
者ノ毒氣ヲ永ク其中ニ含蓄ス ヲ被ヒ腐敗ノ微アル者ハ尚冷濕法ヲ施ス等缺

クヘカラサルノ要事タリ又務メテ大氣ヲ新鮮
 ニシ患者ヲ清楚ナラシメント要ス凡是患者
 ハ躬ヲ蒸發スル毒氣更ニ復其體ニ侵入ノ宛モ
 毒中ニ沈没セルカ如シ故ニ意ヲ用テ其蒸氣ヲ
 除逐シ大氣ヲ清鮮ニセサルヘカラス近世舍密
 術ニ據リ鹽酸蘓魯林等ヲ薰ノ大氣ヲ掃除スル
 法有レ凡皆的切ノ功無クノ肺質ヲ損害スル
 特ニ著ルシ是故ニ牖戸ヨリ風ヲ迎ヘテ新陳代
 謝セシムルヲ最勝ノ法トス而其戸一ハ天井ニ
 近ク之ヲ開キ一ハ褥牀ニ近ク之ヲ開キ以テ斜

ノニ風ヲ過ラシムヘシ毒氣重フノ下ニ居ル者
者アレ但此時患者善ク被覆ノ直ニ其風ニ中ラ
 ハナリハナリ又數患者一室ニ卧ストヲ禁シ
 サラントヲ要ス又數患者一室ニ卧ストヲ禁シ
 稠人ノ雜居ヲ戒メ速ニ患者ノ排泄物ヲ徹除セ
 シムル等皆忽カセニスヘカラス

傳染疫「テイヒスコン
クギオヒスコン
スロ

徵候 神經熱腐敗熱ノ諸證傳染毒ニ起因ノ發現
 スル者はナリ初起大抵焮衝性ニノ後チ必ス神經
 熱腐敗熱ニ轉ス亦或終始焮衝性ヲ帶ル者之ヲ

打氏述論 卷之二 通通齋

リ是患者ノ性質ト當時ノ越必埋密性トニ隨テ
其別ヲ爲スナリ

治法 神經熱ノ治轍ヲ踏ミ兼テ各自ノ病性ニ注

意ノ應當ノ法ヲ行ハントヲ要ス但初發大概防

焮法ニ宜シ神經熱編ヲ參考スヘシ其他傳染熱ノ通治法前見

ヲ取捨シ特ニ大氣ヲ清淨ニスルヲ要トス

列漢多疫ペスチスビボニカ羅ビボヘ

徵候 腋下鼠蹊等ノ腺焮腫シテ初ノヨリ壞疽狀

ヲ帶ヒ忽チ轉ノ真ノ寒壞疽ニ變シ皮膚紫斑ヲ

發ス而血液皮下ニ汎濫シ熱勢燬クカ如ク煩悶。

吐逆。腦ノ所患謔語昏冒等甚シク。諸排泄物腐臭有テ

衰弱脱力ノ極ニ至ル病勢甚猛烈ナレハ十二時

間ニ死ヲ致ス者アリ尋常第三四日ヲ以テ分利

スル者アレハ斃ル者十之七八ニ居ル

此病ハ原來列漢多地名ノ海濱ニ起リテ專ラ厄日

多トス私密爾那公斯丹扶乃百兒地名ニ行ハレ漸ク

相傳ヘテ北方諸地龍動哥寧偃私別爾健莫私哥

等ニ滋蔓セリ然レハ其毒大氣ニ傳ヘス直ニ接

シ感染スルノミ故ニ其患者ニ接セス其器什ニ

夫大貴川 卷之二 通通齋

哥烏垓百私篤コレラオリンデセブラー

クローブ蘭邦 俗所謂虎狼痢

徵候 稀薄ノ粘水ヲ吐瀉シ皮膚青色煩悶甚シク

胃部及少腹疼ミ下肢殊ニ腸劇ク攣痛シ四肢腹舌

共ニ冷徹スル滿爾茂兒石ノ如ク聲音嘶啞シ

小便閉止シ脈細小沈伏ノ應シ難ク時ニ結代シ

或終ニ全ク絶エ皮膚張力ヲ失フテ指ヲ以テ皮膚ヲ撮起シ

或之ヲ壓没メ其痕依然ト卒厥絶息スルニ至ル

經過迅速ナル列漢多疫發黃熱ノ如ク大抵發

病後二三日ニ死スルヲ常トスレバ其極劇ノ者

ハ十二時間ニ斃ルアリ或吐瀉止ムニ隨テ神經

熱狀ニ轉シ以テ漸ク死ヲ致スアリ幸ヒニ愈エ

ル者モ必ス神經消食機ノ衰弱ヲ殘シ經日彌久故

ニ復セズ而死スル者常ニ三分ノ二或ハ其半ニ居

ル此病始メ東印度ノ海濱及安日河瀕岸ノ地ニ

生シ漸ク傳送メ諸國ニ蔓延シ終ニ大洋ヲ越テ

亞墨利加洲ニ及ヘリ但人ニ相傳送スルハ列漢

多疫ノ如ク甚シカラス又高燥ノ地ハ多ク之ヲ

免ルト云發黃熱列漢多疫モ亦然リ

治法 證候ニ拘ラス初起直ニ刺絡ト吐劑ヲ行フ
ヲ要務トス 但稟賦甚ク虚弱ナル者ノミハ此例ニ非ス 之ニ由テ全ク
 其發作ヲ撲滅スルニ足ルコトアリ又兼テ蒸餅母
 及芳香藥ノ蒸溺劑ヲ心下ニ施スニ宜シ而後發
 作仍治マラサル時ハ甘汞ヲ與ヘ冷水ヲ多服セ
 シメ冷水灌腸法ヲ行ヒ全腹ニ冷溺法ヲ行フヘ
 シ且大黃ヲ與ヘテ以テ殘餘ノ膽液ヲ泄除シ極
 ヲテ劇キ證ハ澀水法ヲ施スヲ佳トス其神經熱
 ニ轉變スル者ハ宜ク神經熱ノ治法ヲ處スヘシ
 是時血液復頭腦ニ鬱積ノ刺絡ヲ要スルコトアリ

亦注意セサルヘカラス

犬毒恐水病

ラビウス ロンドン フレイス 蘭

徵候 水及飲液ヲ嚙下スルコト能ハス總テ流體光

體鏡類

ヲ視ルコトヲ嫌ヒ甚キ者ハ之ヲ見テ發搐

スル者アリ然レ氏硬固ノ品ハ自由ニ嚙下ノ毫

モ痛ヲ覺ユルコトナシ是此病ノ本證ニノ或最初

ヨリ之ヲ發シ或先ツ煩悶倦怠諸般ノ神經證不

寐悶夢殊ニ大等ノ前驅アリテ繼テ其本證ヲ發

スルアリ而其水ヲ恐ルニ及テハ必狂證ヲ兼發

ス經過急劇ニノ久キモ三四日ヲ越エス尋常搐
掣若クハ虚性ノ卒中證ヲ以テ死ヲ致スナリ此
病多クハ著シキ熱ヲ夾マス五官一モ妨ケナク
死ニ至ルマテ能ク人事ヲ省ス然レ氏時ニ大狂
ヲ發メ頻リニ唾ヲ飛ハシ事物ヲ擇ハス之ヲ咬
ミ或叫ンテ吠聲ヲ爲シ屢昏冒搐搦ヲ發シ大ニ
煩悶ヲ作スアアリ而陰器ノ怒張勃起スルモ亦
此病ノ固有證トス

原由 近因ハ神經。狂犬毒ヲ被ムルナリ遠因ハ創
處或口唇。眼瞼。鼻孔。陰具等ノ如キ皮膚嫩脆ノ部

ヨリ其毒ノ侵入スルニ在リ而其侵入或狂犬ノ
咬傷ニ由リ或患者ノ傳フルニ由ル蓋其毒既ニ
體中ニ入ルト雖モ空ク感染ノ部ニ潜蟄メ久ク
作用ヲ現サス大率二三週ヲ越エ或年月ヲ累子
テ始メテ發動スルナリ其一旦發動スルヤ既往
感染ノ部俄然トノ瘙痒焮痛ヲ起シ繼テ狂證ヲ
發現ス此ノ如ク隱伏セル病毒ヲ頓ニ喚起スル
誘因ハ過度ノ溫熱。情意ノ劇動。起熱ノ飲料等ナ
リ
此病ノ本體ハ神經性ニメ焮衝性ニ非ス其熱氣

大貴州 卷之二 一箇箇齋藏

少クノ神經證多ク且末期ノ状態播擧卒等以テ
之ヲ證スルニ足ルヘシ又其屍ヲ剖觀スルニ絶
テ焮衝ノ遺痕ナク偶彼此ニ赭斑ヲ見ルヲアレ
凡此毒ハ唯狂犬咬傷ニ由ルノミナラス他ノ人
畜モ發狂スレハ亦能ク此ヲ釀成ス故ニ狂躁極
メテ甚キ人畜ニ咬マレテ終ニ恐水病ヲ發セシ
者其例少カラス

治法 狂證方サニ發スルニ迨テハ治スル者罕レ
ナリ故ニ其毒ノ未發動セサルニ先テ之ヲ防ク

ヘシ其咬傷セル犬既ニ逃込シ或直ニ之ヲ打殺
スル等ニ由テ其狂犬タルヲ知ラス亦其毒ヲ
受ケシヤ否ヤ辨スヘカラサル者モ必預防法ヲ
施シテ之カ備ヘヲ爲サルヘカラス是危險最
モ恐ルヘキノ病ナレハナリ預防法ニ三アリ感
染ノ部ニテ直ニ其毒ヲ鑿ニスルト局處療法既
ニ肉質ニ混在セル者ヲ消滅化成セシムルト水銀
トス主其毒ニ抗抵スル神經カヲ轉セシムルト炭
トス主是ナリ是故ニ左ノ治法ヲ施ス一愈早ケレ
ハ愈良トス即先ッ患部ヲ亂刺シ吸角ヲ貼メ其

毒ヲ吸ハシメ次ニ焰消ヲ用ヒテ其部ヲ燒盡シ
其火力深ク肉裏ニ鑽透スルヲ以テ烙鐵ニ勝レリトス其部ニ赤降汞ト芫
菁ノ軟膏ヲ塗テ強ク膿潰セシムルヲ六週ニ至
ルヘシ爾後其創急ニ完愈スル者ハ仍_ホ狂證ヲ發
スルノ恐レアリ宜ク打膿法ヲ換ヘ行フ一期年
餘ナルヘシ眼瞼口唇面部等ノ咬傷右ノ治法ヲ
施シ難キ者ハ唯海水若クハ灰汁ヲ以テ洗フヲ
佳トス尚且ツ水銀軟膏一錢ヲ取テ創ノ周圍及
他部ニ塗擦スルヲ日ニ二次而甘汞二匁ニ莨菪
根一匁ヲ配ノ朝夕内服セシメ以テ徐ク吐涎セ

シムルヲ大約二週間ナルヘシ

病證既ニ發スル者モ猶左ノ治法ヲ行フテ良驗
ヲ得タリ即初起直ニ前條ノ外治法ヲ咬傷ノ部

ニ施シ水銀軟膏ヲ取テ一時半毎ニ身體諸部

頸_ニ塗擦シ勉メテ速ニ吐涎セシメ_{吐涎ニ由テ}間_{良善ノ分}

利_ヲ且ツ甘汞二匁莨菪根一匁合メ一時半毎ニ


内服セシメ而漸ク其服量ヲ増スニ宜シ又少壯

多血ノ徒ハ刺絡ヲ卒倒スルニ至ルヘシ微溫浴

モ亦處シ難キ證有ルニ非レハ之ヲ行フテ大ニ

利ヲ得ルヲアリ

密爾多扶兒ミルトルキルボシキムスコニタギオ
 徵候 此病ヲ患ル獸畜ノ肉ヲ啖ヒ或創處ヨリ其
 毒ヲ受ケテ之ヲ發ス其證先ツ發熱メ大ニ脱力
 ニ昏冒煩悶甚シク或吐逆泄瀉ヲ作シ而後一二
 ノ泡腫ヲ發出ス其泡始メ細小稀液ヲ充ツル細
 ス一二日ヲ經テ褐色ト爲リ黑色トナリ終ニ深
 ク皮中ニ侵蝕メ寒壞疽狀ノ腫瘍ニ變ス或淺ク
在ル而焮衝セス疼痛ナク四肢膨腫麻痺シ或潰
 亂ノ頰敗スルニ至ル又其熱初日ヨリ極劇ノ腐



敗熱ニ轉シ毒肉ヲ喫スル者持ニ然リ腐敗忽チ全身ニ及ヒ
 煩悶極メテ甚シク腹痛下血溶崩ノ諸證蜂起シ
 一晝夜若クハ二晝夜未泡腫ヲ發スルニ迄ハス
 ノ死スル者アリ然レモ大抵泡腫既ニ生シ發汗
 泄瀉ノ分利有テ其熱去リ病漸ク一局處ニ歸ノ
 終ニ寒壞疽ニ陥リ而後斃ルヲ常トス但其證甚
 惡性ナラサル者ハ慢ニ膿ヲ釀シ壞肉自剝離シ
 六週若クハ八週ヲ經テ幸ニ十全ノ復治ヲ得ル
 コアリ
 此病ハ身體ノ内外ヲ論セズ直ニ其毒ニ觸レテ

ノミ感染シ絶テ大氣ノ媒介ヲ俟ツナシ
 治法 治療ノ要ハ熱ト壞疽トヲ攻ムルニ在リ即
 其熱ヲ攻ルニハ初起直ニ吐劑ヲ與ヘ而熱勢退
 カサル者ハ次テ腐敗熱ノ治法ヲ盡クシ殊ニ醋
 飲料ニ加幾那羯布羅名等ヲ用フヘシ又酪餘名
 ヲ與ヘテ甚偉効ヲ收メシナリ壞疽ハ切斷ノ
 防腐催膿ノ蒸溺法ヲ行フニ宜シ然レ氏單ニ亞
 麻仁鏡ノ如キ緩和蒸溺劑ヲ連用スルノミニ
 全治ヲ得シ者亦屢實驗セリ

扶氏經驗遺訓卷之二終





