



扶氏經驗遺訓

四

ヤ 4
1448
4



74
1448
4

安政四年丁巳初秋新雕

緒方洪菴譯本

二帙

扶氏經驗遺訓



適適齋藏



91-1901

扶氏經驗遺訓第二帙目次

卷之四

第三編

焮衝病 總論

腦焮衝

脊髓焮衝

咽喉焮衝

口內壞疽焮衝

舌焮衝

卷之五

扶氏遺訓 卷之四

目次

適適齋藏



胸炆衝

心臟炆衝

腹臟炆衝總論

胃炆衝

腸炆衝

肝炆衝

脾炆衝

橫膈膜炆衝

腸間膜炆衝

臍炆衝

腹膜炆衝

網膜炆衝

腎炆衝

膀胱炆衝

子宮炆衝

卵巢炆衝

腰筋炆衝

眼炆衝

耳炆衝

羅斯

帶狀羅斯

卷之六

第四編

僂麻質病 總論

僂麻質

胯痛

腰痛

聖京屈

卷之七

第五編

腸胃病

其徴ヲ得ルヲ能ハサル者アリ或其焮熱外ヨリ
觸テ之ヲ知ルヘキ者アリ肝臟ノ如ク外表ニ近
ク位置スル者ニ於テ
然ルナリ排泄物ヲ以テ之ヲ辨スヘキ者アリ肺焮衝
ハ呼吸氣
ノ熱ヲ以テ之ヲ辨シ膀胱焮衝ハ小便ノ熱ヲ以テ之ヲ察ス可キカ如シ其腫脹モ深
ク内部ニ在ラス且骨下ニ潛レサル者ハ按シテ
之ヲ知ルヘク其疼痛モ胸肋焮衝胃焮衝ノ如キ
ハ劇烈ニメ甚タ察シ易キナリ然レ凡亦焮衝極
メテ甚フシテ死ニ至ルマテ毫モ疼痛ヲ覺エサ
ル者アリ大概膜及内臟外面ノ焮衝ハ痛強ク裏
面ノ焮衝ハ痛微ナシトス蓋シ神經節ヨリ出ル

神經ハ平常辨識知覺ヲ主トラスト雖凡焮衝ニ
由テハ平常ノ分ヲ越テ其部ノ疼痛ヲ腦神ニ達
スルヲアリ或全ク然ルヲ得サルヲアリ病故
ニ腹内諸臟ノ焮衝ニ於テハ醫熟ク之ヲ按シテ
審ニ摸索セン一ヲ要ス患者自痛ヲ知ラサリシ
部モ是ニ由テ初テ痛ヲ覺エ或患者痛アリトセ
シ處モ之ヲ按シテ痛ナク病患却テ他部ニアル
ヲ屢之アレハナリ
内部ノ焮衝痛ハ神經痛。痙攣痛ト混同シテ辨シ
難キ一甚多シ胸痛。胃痛。腹痛等極劇ノ焮衝痛ヨ

リモ甚シテ單瘧證ナル者少カラス凡焮衝痛ハ刺絡ヲ欲シ瘧痛ハ阿芙蓉ヲ要ス若誤テ焮衝痛ニ阿芙蓉ヲ投セハ之ヲ死サント必セリ宜戒慎ノ審ニ辨別セサルヘカラス

第一熱ノ有無ニ注意スヘシ其痛熱ヲ兼サル者ハ瘧痛ナリ惡寒發熱脈數ニ渴アル者ハ焮衝ナリ

第二脈ニ注意スヘシ脈牢實ニ強キハ焮衝ノ候トス然レ氏腹内諸臟ノ焮衝肺焮衝ノ極度ニ於テハ否ラサルコトアリ

第三小便ニ注意スヘシ其色赤キハ焮衝ノ徵ニ澹白水ノ如キハ瘧痛ナリ是兩

證ヲ監別スル首候トス

第四疼痛ノ消長ニ注意スヘシ其持續メ間斷無キハ焮衝トシ否ラサル者ハ瘧痛トス

第五按メ之ヲ察スヘシ患者能ク之ニ堪ヘ若クハ是ニ由テ其痛減スル者ハ焮衝ニ非ス若夫證候錯雜シテ疑似決シ難キ者ニ遇ハバ試ニ瀉血シテ之ヲ斷スルニ若カス但此瀉血ハ患部ニ施スラ良トス其辨別右ノ如シト雖氏瘧痛モスク連綿持續スレハ終ニ焮衝ニ轉スルコトアルガ故ニ初候ニ委子テ忽ニ看過スルコト勿レ

凡急性焮衝ハ大抵第七日若ハ第十四日ヲ以テ
終期トス而其終期發汗利尿出血等ノ分利證ア
リテ十全ノ消散ヲ得ル者アリ遷延焮衝ニ移ル
者アリ硬腫化骨結核膿潰壞疽等ニ陷ル者アリ
或又焮衝ノ後^{ウエ}乙^イ滲出メ近傍ノ空隙ニ^{ウエ}潴留ス
ル^一アリ即肺焮衝後ノ胸水腦焮衝後ノ頭水ノ
如シ或一部ノ衰弱麻痺ヲ殘ス^一アリ即腦焮衝
後ノ健忘肺焮衝後ノ粘液勞眼焮衝後ノ黑内障
ノ如シ或患部近傍ノ諸器ト癒著スル^一アリ或
一部ノ感動過敏ヲ殘ス^一アリ

内部焮衝ノ分消ハ熱ノ解散スルト分利證アル
トヲ以テ徵スヘシ然レ^レ脈動仍鎮靜セサル者
ハ假^トヒ其部ノ患苦咸ク去^リ未^タ十全ノ分消ト
スヘカラス而寒戰俄カニ發シ疼痛去^ルカ如ク
ニメ患苦全ク止^ス熱仍稽留スル者ハ結膿ノ徵
トシ疼痛及其部ノ患苦頓ニ^ニ遏^ミ脈沈細ニメ結
代シ四肢厥冷スル者ハ壞疽ニ陷ルノ徵トス
原由 近因ハ身體一部血脈ノ動機神經ノ覺機血
質ノ資生力共ニ亢盛メ其運管増進セルナリ然
レ^レ動靜二脈ノ動機其増進ヲ等フセサルヲ以

テ血液自末梢ニ充積鬱滯シ^{ウレ}血液蜂窩質ニ
滲漏ス是患部ニ腫脹ヲ現スル所以ナリ而血液
ノ鬱積ト運動ノ増進トヨリ焮熱赤色ヲ起シ覺
機ノ亢盛ヨリ疼痛ヲ發ス是故ニ焮衝ノ本性ハ
凝體生カノ過盛ト血質生カノ過盛ト二者ノ合
併ニ成レル者トス而此兩カ一者偏勝ヲ爲スニ
隨テ焮衝ニ兩種ノ區別ヲ生ス其一ヲ燥性焮衝
ト謂フ凝體纖維ノ緊張攣縮甚フシテ感動過越
セル者是ナリ其二ヲ濕性焮衝ト謂フ血質ノ生
力大ニ増進メ^{ウレ}涕^{ウレ}乙凝^{ウレ}泣ニ傾キ滲漏最モ甚キ者

是ナリ是故ニ諸焮衝必血液鬱積ヲ具フト雖氏
血液鬱積悉ク皆焮衝ト謂フヘカラス血液鬱積
スレ氏焮衝ニ非ル者アリ唯生力抗抵過盛ノ初
メテ焮衝タルトヲ得ルノ^{ウレ}然レ氏抗抵過盛亦
必諸焮衝ニ具ハルト雖氏抗抵過盛悉ク皆焮衝
トスル^{ウレ}勿^{ウレ}レ^{ウレ}單純神經性ノ抗抵過盛毫
モ血管ニ事ナキ者アリ^{ウレ}假令血
管ノ抗抵過盛スル氏亦未^{ウレ}焮衝タルトヲ得サル
者アリ唯血液其部ニ鬱積シ資生力旺盛メ初メ
テ焮衝ノ名ヲ得ルノ^{ウレ}ミ

右ノ病機或七日或十四日或廿一日ノ間ニ進期

極期退期ヲ經過メ自種ノ轉變ヲ為スナリ乃
 十全ノ分利ヲ得テ生カノ過盛血液ノ鬱積共ニ
 退散スルヲアリ或焮衝去ルト雖血液ノ鬱積
 資生カノ過盛仍殘留メ終ニ硬腫ト成ルヲアリ
 是殊ニ瀉血過度防焮法ノ誤用衰弱等ニ由ル
 或動機ノ亢進減スレ氏
 覺機ノ過盛仍退カスメ疼痛ヲ殘スヲアリ感覺銳敏
 患若ハ過度ノ瀉或焮衝増進メ極度ニ至リ
 血後多然ルヲ致ス
 生力運營益過盛メ資生ノ機一轉シ以テ結膿ス
 ルヲアリ是多クハ防焮法ヲ怠リ若ハ刺衝藥ヲ誤用メ益其焮衝ヲ鞭進スルニ由ル
 或焮衝極劇ニメ其部ノ生力之カ為ニ頽敗シ以

テ壞疽ニ陥ルヲアリ是全身若ハ一部既ニ虛脫法ノ過用進運藥ノ誤用等ニ由ル或水樣液ノ溢出織質ノ變常器
 體ノ癒著等ヲ殘スヲアリ

一部感應力ノ過盛稟賦焮衝性ノ體質少壯ノ年
 齡熱性ノ食養總身ノ焮衝熱一部多血一部衰弱
 等此病ノ素因トナリ創傷打撲毒藥病毒微毒痛風ノ類
 天氣ノ寒暖變革過度ノ勞思力作一部ノ痙攣血
 液ノ鬱積器體ノ變常結核類等總テ刺衝ヲ起ス者
 皆其誘因トナル或交感機病喻ハ腸胃汚物ニ由テ頸肺皮膚等ニ焮衝ヲ發シ或腦ノ躁擾ヨリ肝焮衝ヲ起スカ如シ對稱機病喻ハ蒸氣閉塞メ内臟焮衝ヲ起

如シモ亦之カ誘因トナルナリ

焮衝ノ種別甚多シ或輕重ヲ以テ之ヲ分チ或患

器ヲ以テ之ヲ分チ或標本ヲ以テ之ヲ分チ病因直チニ

患部ニ在ル者ハ之ヲ本焮衝ト云ヒ病因他部ニ

在テ交感若クハ對稱ノ為ニ發スル者ハ之ヲ標

焮衝或燥濕ヲ以テ之ヲ分チ燥性焮衝或病性ニ

隨テ之ヲ分ツ等ナリ其病性ニ隨テ之ヲ分ツ者

ハ喩ハ特ニ血質ヲ侵ス者ヲ純焮衝ト云ヒ神經

ヲ侵メ感覺過敏トナル者ヲ神經性焮衝ト云ヒ

湯乙管ヲ侵ス者ヲ樓麻質性焮衝聖京屈性焮衝

ト云ヒ淺ク外表ニアル者ヲ羅斯性焮衝ト云ヒ

腸胃毒ニ起因
セル者多シ 其部ノ脫衰壞疽ヲ兼ル者ヲ腐敗

性焮衝ト云ヒ徽毒瘰癧痛風等一種定類ノ病毒

ニ起因セル者ヲ定類焮衝ト云フカ如シ然レ氏

其生力ニ準テ虛實兩種ニ頒ツハ最治事ニ益ア

リトス實性焮衝純焮衝ハ患部總身共ニ其運營ノ

旺盛セル者はナリ虛性焮衝ハ總身若クハ患部

ノ運營虛衰セル者はナリ然レ虛性焮衝ハ更ニ

分テ五種ト為ス其一神經性焮衝虛實兩性ノ中

間ニ在テ血管仍カアル者ナリ其二弱性焮衝打

撲閃挫衝撞等ノ為ニ患部ノ生力衰弱シテ發セ

ル者ナリ其三腐敗性焮衝。總身生力脫衰ノ血液
溶崩ヲ兼ル者ナリ是總身生力ノ虚弱ト腐敗ノ
素因アルヨリ發シ若ハ腐敗傳染毒密爾多扶兒
ノ如キ生カラ抑損スヘキ病毒ヨリ起ル而初ヨ
リ腐敗性ヲ資ル者アリ日ヲ經テ肇メテ腐敗ニ
傾ク者アリ其四遷延焮衝血脈ノ運動真ニ増盛
セスメ累月積年荏苒彌久スル者ナリ是實性焮
衝ノ全分消スルヲ得サルニ坐シ或久ク一部
ニ淹留セル刺衝物ニ因リ或一部ノ虚衰ニ係ル
其五間歇性焮衝諸證一定ノ時刻ニ發歇シ其間

歇時ハ全ク解散シテ毫モ患害ナキ者ヲ云フ蓋
此證ハ真ノ焮衝ニ非ス唯神經變調ノ所為ニ出
ルノミ
近世焮衝ノ論說汎濫ニメ防焮法及瀉血等ヲ妄
投謾施スルヲ殊ニ甚シ凡一部ノ所患疼痛ヲ發
シテ或感覺過敏ヲ兼ル者或死後其屍ヲ解剖ス
レハ赤色ヲ見ハセル者沕乙ヲ滲漏セル者織質
變常セル者ハ則皆之ヲ焮衝トス然其所以患焮
衝ニ非スモ唯一部ノ神經證ナル者多シ其赤色
モ亦唯血液鬱積ノ殘痕ノミナル者多ク或死ニ

臨テ偶血脈末梢ノ破綻セルニ因ル者少カラ
ス資生力ノ運管不及ヨリ生セシ者往ニ之アリ
尚且眞焮衝モ遷延彌久ノ衰弱スルニ至レハ強
壯治法ヲ處セサルヲ得ス學者其之ヲ思ヘ
治法 第一捷手焮衝ノ起因毒物竹木刺腸胃汚物等ヲ除クニ
アリ第二焮衝ノ性ニ應メ各適當ノ治法ヲ施ス
ニアリ第三其分消ヲメ全カラシムルニアリ分
消全キヲ得レハ現發ノ諸證解散スルノミナ
ラス續發ノ餘證モ亦以テ禦クニ足ルカ故ニ十

全ノ分消ヲ得セシムルハ焮衝治法ノ最大主旨
トス然レモ分消ハ毎常良能ノ妙機ニ出ル者ニ
メ人術ノ得テ擬スル所ニ非ス醫能之ヲ領會メ
唯其良能ヲ扶ケ之カ妙機ヲ妨クルヲ勿ルヘシ
患部生力ノ運管減退スルノミナラス血脈末梢
ノ積血滯液盡ク吸收疎散セラルハニ非レハ十
全ノ分消ト謂フヘカラス故ニ固ヨリ減損治法
即防法ヲ主用スヘシト雖モ尚積血ノ疎解滯液ノ
吸收ヲ營ムヘキ生力機能ヲ逞フセシメンヲ
要ス故ニ其度ヲ過シテ神經證麻痺證等ノ虛性

病ニ轉セシメ或、其部ノ血液鬱積、洩乙滲漏等ノ
諸患ヲ殘スニ至ラシムルヲ勿レ是故ニ瀉血_殊
刺ハ此病ニ缺クヘカラサル法ニメ能、其時ニ適
ノ多量ノ血ヲ泄シ且、其逆射ヲシテ急疾ナラシ
ムル時ハ_{瀉法ハ}焮衝熱_{條ニ出ツ}、瞬時ニ病根ヲ滅却メ十
全ノ回復ヲ得セシムト雖、_凡若、誤テ其度ヲ過セ
ハ十全ノ分消ヲ為ス_一能ハス却テ焮衝ヲメ硬
腫壞疽ニ轉セシメ或、神經熱腐敗熱等ヲ招クニ
足ルヘシ
刺絡ハ總身焮衝ノ候アル者ニ行フニ宜シ而其

候除カサル間ハ屢之ヲ施シテ可ナリ但、初回ノ
刺絡ハ速ニ施シテ多ク之ヲ泄シ脈ノ牢實ナル
者之_レカ為_ニ軟小トナリ沈細ナル者之_レカ為_ニ浮
大トナリテ焮衝ノ諸證全ク去リ若、ハ著ク減ス
ルニ至ルヘシ_凡、此病ハ脈牢實ヲ以テ常トスレ
_凡肺焮衝腹内諸臟ノ焮衝ニ於テハ脈細小ナル
者ヲ却テ刺絡適當ノ候トス_但、焮衝病ノ刺絡ハ
卒倒スルニ至ル_一勿レ其血已ニ自、凝固セント
セル者之_レニ由テ運行躊躇スレハ益、凝泣メ壅塞
ヲ起スノ恐_レ有_レハナリ_一局處瀉血ハ血液ヲ呼

打針通訂 卷之四

テ益患部ニ堆積セシムル一アルカ故ニ唯刺絡ニ由テ總身ノ焮衝退キ血量既ニ減セル者或神經證衰弱等アリテ刺絡ヲ忌ム者ニ行フヘキノ

瀉血ニ兼テ直^チニ他ノ防焮法ヲ行フ可シ是亦其

度ニ適スレハ大ニ瀉血ノ量ヲ助クルニ足ル即

消石植酸ノ内服冷水冷氣ノ外用等是ナリ焮衝熱篇

ヲ參考スヘシ

次ニ反對刺衝法ヲ用テ病患ヲ他部ニ導クヘシ殊ニ腸胃ノ運動ヲ振起シ皮膚ノ分泌ヲ催進ス

ルヲ宜シトス下劑芥子泥羌膏然レ氏焮衝ノ劇勢既ニ

瀉血ニ由テ減祛セル者ニ非レハ之ヲ施ス一勿

レ凡運動ヲ増進スル者ハ必皆焮衝ヲ増進スレ

ハナリ但焮衝ノ餘燼ヲ消滅スルニハ反對刺衝

法ニ若ク者ナシ或患部ノ近傍ニ乾角法ヲ施ス

モ亦甚宜シ此法ハ血ヲ瀉スル一無キカ故ニ衰

弱ヲ起サスメ患部ノ積血ヲ疎解スレハナリ

積血ヲ疎解シ滯液ヲ吸收セシムルノ術モ亦怠

ルヘカラサル所ナリ大抵前ノ諸法此功用ヲ遂

クルニ足レリト雖氏若焮衝去テ鬱積仍殘留セ

夫大遺ル 卷之四 十一 通通齊成

ル者ハ吐酒石甘汞剝篤亞斯ノ主トル所トス若
其焮衝湯乙ノ滲漏ヲ兼ル者所謂濕性焮衝ハ初ヨリ用

ヒサルヘカラス

右ノ諸法ニ由テ焮衝ノ本性血管一系生力過盛既ニ除ク

ト雖氏仍觸覺過敏痙攣等ノ神經證ヲ殘シ患部

ノ諸證恰モ真焮衝ニ類似シテ瀉血スヘキノ候

ナク脈動諸證共ニ衰弱ヲ徵スル者アリ是所謂

神經性焮衝ニ移レルナリ此證ハ鎮痙麻醉ノ諸

藥菲阿斯老利兒結反對刺衝法芫菁膏ヲ以テ全

功ヲ收ムルヲ得ヘシ但芫菁膏ハ頗ル大ニノ

大抵方且大泡ヲ發セシテ欲ス是其部ニ於テ
ニ寸許津液漏洩ヲ起ス

ト緊要ナレハナリ若夫焮衝轉

ノ壞疽ニ陥リ若ハ初ヨリ之ニ傾ケル者ハ腐敗性咽

喉焮衝密爾鑛酸幾那攝爾扁答里亞亞兒尼加葡

萄酒多扶兒ノ類羯布羅等ノ如キ強壯防腐藥ノ主トル所ナ

リ宜ク撰用スヘシ

尚且病因病性ノ異ナルニ隨テ各對證ノ治法ヲ

處セシハアラス

純焮衝ハ專ラ前段ノ防焮法ヲ用フヘシ

神經性焮衝ハ初起ト雖氏刺絡ヲ慎ミ已ムト無

扶元遺訓 卷之四

ンバ 蟻 鍼 吸 角 ヲ 貼 シ 誘 導 法 殊ニ反 施 シ 緩 性

ノ 鎮 痙 藥 菲 阿 斯 老 利 兒 結 爾 斯 水 等 ヲ 清 涼 藥ニ 配 シ 用 ヒ 衰

弱 甚 シ キ 者 ハ 纈 艸 亞 兒 尼 加 ヲ 與 フ ヘ シ

腐 敗 性 焮 衝 ハ 總 テ 瀉 血 ヲ 禁 シ 初 ヲ 峻 功 ノ 強

壯 防 腐 藥 ヲ 用 フ ベ シ

腸 胃 性 焮 衝 膽 液 性 ヲ 殊ニ 多 シ ト ス ハ 吐 下 藥 ヲ 主 ト メ 防 焮

法 ヲ 兼 用 ス ヘ シ 或 唯 吐 下 藥 ノ ミ ヲ 以 テ 全 治 ヲ

得 ヘ キ 者 ア リ

濕 性 焮 衝 ハ 先 ヲ 瀉 血 シ テ 直ニ 甘 汞 實 芟 答 里 斯 等

ノ 疎 解 吸 收 ヲ 催 起 ス ル 諸 藥 ヲ 與 フ ヘ シ



儂 麻 質 性 聖 京 屈 性 焮 衝 ハ 真 ノ 焮 衝ニ 非 ル カ 故

ニ 固 ヲ リ 瀉 血 ヲ 要 セ ス 瀉 血 ス レ ハ 却 テ 其 病 ヲ 遷 延 瀰 久 セ シ ム ル

リ 唯 清 涼 發 汗 ノ 諸 藥 ヲ 用 ヒ テ 皮 膚 刺 衝 法 羌 膏

類 ヲ 行 フ ヘ シ 然レ 氏 其 焮 衝 增 進 ノ 真 焮 衝 ト ナ ル

者 ハ 瀉 血 セ サ ル ヘ カ ラ ス 但 一 部 瀉 血 ヲ 以 テ 足 リ ト ス

羅 斯 性 焮 衝 モ 亦 瀉 血 ノ 適 當 ス ル 所ニ 非 ス 妄 リ

ヲ 施 セ ハ 病 ヲ メ 遷 延 瀰 久 セ シ ム 宜 ク 主 ト メ 吐

或 消 散 セ シ メ テ 他 部ニ 轉 セ シ ム 猶 真 焮 衝ニ

下 藥 ヲ 行 フ ヘ シ 吐 下 藥 ノ 功 ア ル 一 猶 真 焮 衝ニ

刺 絡 ノ 功 ア ル カ 如 シ 唯 其 焮 衝 增 進 ノ 真 焮 衝ニ

轉 セ ン ト ス ル 者 ノ ミ 瀉 血 ヲ 行 フニ 宜 シ

扶元遺訓 卷之四

三

適道齋藏

定類焮衝ハ防焮治法ノ外各自病毒ノ性ニ應メ
或其毒ヲ驅除スル諸藥ヲ用ヒ微毒ニ水銀疥癬
毒ニ硫黄ヲ用ル
カ如或之ヲ導洩スル諸法芫菁膏芥
子泥等ヲ行フヘシ
弱性焮衝ハ主トメ亞兒尼加ヲ用ヒ冷漏法ヲ行
フ等ナリ

間歇性焮衝ハ幾那ヲ間歇時ニ與フヘシ
各證治法右ニ説クカ如シト雖氏諸焮衝經過急
速ニメ熱ヲ兼ル者ハ必皆發汗利尿等ノ總身分
利アルニ非レハ十全ノ復治ヲ得サル者トス
遷延焮衝ハ本性虚衰ナルカ故ニ治法モ亦強壯

ヲ要スト雖氏血脈感動ノ銳鈍ニ應シテ其藥ヲ
斟酌セスンハアラス或清涼ノ強壯藥ヲ殊ニ冷
氣冷水
用フ可キアリ或熱性ノ強壯藥幾那
鐵劑ヲ與フ可キ
アリ而尚且焮衝ヲ連綿持續セシムル各種ノ病
毒器體ノ變常血液ノ鬱積等ニ注目セサルヘカ
ラサルナリ但此證ノ血液鬱積ハ原是其部ノ虚
衰ニ起因セルカ故ニ瀉血ヲ要スルヲアリ氏宜
ク戒慎メ局處ニ之ヲ行フヘシ
血液鬱積「ゴンゲスチオ子ス
サンギイ子ア」ハ百病ノ原ト為ル
ト少ナカラスメ治法亦之ニ根據スヘキ者甚多シ

故ニ令別ニ之ヲ揭示スルノ左ノ如シ

徵候 體内一器一系ニ血液鬱滯充積シテ其部ノ官能多少常ヲ違ヘ其動機覺機或亢揚シ或減虚セル者はナリ而其鬱積甚シカラサレハ運營之カ為ニ却テ増進シ較甚シケレハ運營為ニ減却シ益甚シケレハ遂ニ麻痺ヲ起スニ至ル喻ヘハ腦ノ鬱積中等ナレハ思慮活潑ナルヲ得較強ケレハ感覺ヲ失ヒ尚甚シケレハ卒中腦ノ麻痺ヲ發スルカ如シ其他患部ニ壓重ヲ覺工温熱常度ヲ越エ肢體ノ運轉熱性ノ飲食ニ由テ諸證ノ増

劇スル等此病ノ徵候ナリ而運營妨碍ノ諸證皆此病ノ外候トナラサル者ナシ即胃ニ在テハ胃瘵及飲食不化腸ニ在テハ疝痛下利肝ニ在テハ膽液分泌ノ變常肺ニ在テハ喘息欬嗽若クハ勞欬腦ニ在テハ頭痛譫妄精神錯亂分泌器ニ在テハ分泌増益若ハ閉止等ノ如キ諸種ノ神經證ヲ起シ諸種ノ局處病ヲ發ス而其刺戟衝動劇シケレハ焮衝ヲ招キ麻痺ヲ起シ擴充排張甚シケレハ血管縱弛ノ脈腫血瘤等ヲ生シ或ハ時ニ破綻シテ血液ヲ漏洩スルノアリ乃其病狀ノ最モ明

ナル者ハ痔疾ナリ是唯門脈ノ血液鬱積ナルノ
ミ痔疾條ヲ參
考スヘシ

原由 此病ハ血液ノ強ク一部ニ鬱滯充積セル
者ナレト血質ノ生カ亢盛セサルヲ以テ焮衝ト
自ラ別アリ然レト諸焮衝血液鬱積ヲ兼子サル
者ナク血液鬱積動輒轉シテ焮衝トナルナリ然
メ血液鬱積ノ因三アリトス

第一局處虛衰 此病此因ヨリ起ル者最モ居多
シ而亦二般アリ一ハ局處ノ生カ衰弱シテ纖維
縱弛シ繋固維持ノカラ失フテ血液ノ攪入ヲ抗

拒スルヲ能ハサル者ナリ喻ハ打撲太甚シテ
其部縱弛スレハ血液其地ニ輻湊シ灌腸度ニ過
テ直腸弛緩スレハ終ニ痔疾ヲ發スルカ如シ一
ハ一部ノ脈管殊ニ靜脈ニ虛弱ニメ運動怠慢シ血液ヲ
健運順達スルヲ能ハスシテ滯留鬱滯ヲ致ス者
ナリ喻ハ其人ノ稟賦肺ノ血絡虛弱ナレハ肺
ノ血液鬱積ヲ招キ肺勞門脈素質虛弱ナレハ門脈鬱
積ヲ媒起スルカ如シ痔疾傳屍ノ肺病痔疾等ハ
多ク此素質ニ係ルナリ

第二局處刺衝 凡一部ニ刺衝アレハ其部ノ動

脈運營之カ為ニ増進ノ血液多ク其地ニ灌溉ス
是時靜脈運營均シク増進スルニ非レハ之ヲ收
攝シ去ルヲ能ハスノ其血必其部ニ鬱積セサル
ヲ得ス即毒虫皮膚ヲ螫セハ皮膚ノ鬱積ヲ起
シ沙塵眼ニ入レハ眼ノ鬱積ヲ生シ思慮腦ヲ犯
セハ腦ノ鬱積ヲ誘フカ如シ然レ病患刺衝モ亦
之ト異ナラス肺臟ニ結核アレハ恰モ外物ノ嵌
入セルカ如クニメ間断ナク其部ヲ刺衝スルカ
故ニ血液居恒ニ鬱積メ吐血肺勞ノ因トナリ子
宮ニ硬腫アルモ亦其刺衝ニ由テ血液鬱積ヲ致

シ終ニ崩漏ヲ發スル等ノ類一ニ枚舉ニ遑アラ
ス殊ニ諸病毒内臟ニ轉移メ綿々刺衝スレハ在
苒瀰久メ血液鬱積ヲ起スノ常ニ多シ凡刺衝ニ
二般アリ此病ニ於テハ之ヲ辨別スルヲ殊ニ緊
要トス直ニ患部ニ在テ刺衝スル一ナリ交感機
又ハ對稱機^病ニ賴テ他部ヨリ刺衝スル一ナリ
喻ヘハ刺衝物腹部ニ在テ腦肺ノ鬱積ヲ起スカ
如キハ交感刺衝ナリ皮膚ノ運管抑遏メ内部ノ
鬱積ヲ生シ月經痔血閉止メ肺胃腦等ノ鬱積ヲ
發スルカ如キハ對稱刺衝ナリ

第三 血行阻遏 脈管一部壓閉スル所アレハ血

液運行之カ為ニ妨碍セラレテ必鬱積セサル
ヲ得ス故ニ或ハ一部ヲ緊縛シ或ハ腫瘍硬腫内
臟腫脹等ニ由テ脈管ヲ壓窄スルテアレハ血液
必其近傍ニ鬱積ス喻ヘハ頸ノ腫瘍ニ由テ腦ニ
鬱積ヲ生シ肝臟硬腫ヨリ門脈鬱積疾痔ヲ招クカ
如シ緊衣久坐ノ痔疾ヲ發スル類モ亦此ニ屬ス血液自己ノ重力モ亦
此病ノ所因トナル即頭ヲ倒ニメ腦ノ鬱積ヲ起
シ足ヲ垂レテ脚ノ鬱積ヲ發スルカ如シ

治法 先全軀血液ノ多少ヲ檢索スルニアリ脈

牢實ニメ四肢倦重シ動スレハ呼吸不利シテ動

悸亢揚スル者ハ多血ノ徵ナリ此證ハ刺絡若ク

ハ局處ノ瀉血ヲ施シ清涼導洩ノ諸藥清涼下劑ノ類ヲ

用ヒ食ヲ減シ眠ヲ少フシ動作ヲ強フシ以テ諸液ノ消

進ム飲液ヲ多服シ冷氣ニ浴スル等ヲ專務トス

ヘシ次ニ局處刺衝交感刺衝定類病毒ノ有無ヲ

揅點メ之ヲ驅除スヘシ百方シテ寸効ナキ者此

一舉ニメ全治ヲ得ルヲ屢之アリ局處刺衝ニ起

レル者ハ常習刺衝特ニ多シ喻ヘハ腦ノ鬱積學

問刻苦ニ生シ肺ノ鬱積號泣高歌ヨリ發スルカ

如シ而、交感刺衝ハ腸胃汚物蛔虫等ナリ定類病
 毒ハ徽毒、疥癬、痛風、痺麻質等ナリ各其治法ヲ處
 スヘシ若夫局處ノ虚衰或、痙攣ニ起レル者ハ固
 ヲリ強壯鎮痙ノ治法ヲ要スト雖氏血管生カノ
 銳鈍ニ注意ノ謾ニ起熱ノ諸藥ヲ與フルト勿レ
 右ノ諸法ニ兼テ其鬱積ヲ分消セシムルノ外治
 法亦急ルヘカラス即局處ノ瀉血ヲ施シ發泡膏
 ヲ貼シ或、又收斂驅散ノ諸法ヲ行フ等ナリ患部
スヲ殊ニ
佳トス

腦焮衝「エ」セ「パ」リ「チ」ス「羅」ヘルセ
 「ン」セ「ト」ス「テ」キ「ン」グ「蘭」

徵候 譫妄昏睡間斷ナクシテ總身發熱シ眼赤頭
 熱顔面盈脹頸脈抗搏等血液頭腦ニ鬱積セル諸
 徵ヲ具ヘ患者頻リニ頭上ニ手ヲ舉クル者是ナ
 リ然レ氏譫妄昏睡身熱ヲ兼ル者モ皆此病ト思
 フト勿レ焮衝熱神經熱ノ劇證共ニ此證アレ氏
 必シ腦焮衝ニ非ス頭部血液鬱積ノ諸徵具ハリテ
 譫妄昏睡ノ稽留スルニ非レハ決メ此病タルト
 ヲ證シ難シトス而之ニ頭痛ヲ兼ルト否ラサルト
 アリ是其焮衝ノ所在ニ關係ス即其腦膜ニ在ル

者ハ痛甚シク腦質ニ在ル者ハ痛少ク唯壓重ヲ
 覺エテ麻痺ヲ兼ヌルナリ猶肋膜焮衝ト肺焮衝
 トノ區別アルカ如シ後詳于此病ノ歸終或十全ノ
 分消ヲ得テ餘患ナク全治スル者アリ或腦髓運
 管ノ衰弱ヲ殘ス者アリ癡呆健忘五官機能ノ乏弱等或轉ノ頭
 水硬腫膿潰壞疽等ニ變スル者アリ然レ凡通例
 其腐壞ヲ待タスノ死ヲ致スカ故ニ壞疽ニ轉ス
 ルハ甚タ稀ナリトス而其死スル者多クハ腦髓
 麻痺卒中ヲ致スニ由ル

原由 此病ノ近因固ヨリ腦ノ焮衝ナリト雖凡他

因モ亦同一ノ謔妄昏睡ヲ起ス₁アルカ故ニ其
 諸證具ハリテ腦焮衝ノ名ヲ得ル者其實ハ真焮
 衝ニ非ル者アリ之ヲ辨スル₁治術ニ於テ甚緊
 要ナリ即₊真ノ多血焮衝ニ出_ル者アリ全ク神經
 性ニメ血脈ニ係ル₁ナキ者アリ腹部殊ニ胃ノ交
 感ニ出_ル者アリ
 凡腦ヲ衝動スル₁劇クンテ其運營ヲ獎起シ或
 ハ變常セシムル者皆此病ノ遠因トナル即₊嚴寒
 酷暑勞思刻苦情意ノ感動慄忤ノ飲液頭部ノ打
 撲脊椎ノ挫傷血液鬱積病毒轉徙劇性ノ諸熱病

抄
傳
染
毒
就
中
神
經
熱
猩
紅
熱
ノ
如
ク
殊
乳
汁
ノ
刺
衝
膽
液
蛔
虫
ノ
交
感
若
ク
ハ
依
ト
昆
蛭
兒
歌
以
私
的
里
遷
延
神
經
熱
過
房
等
ニ
由
テ
腦
髓
衰
弱
ス
ル
ト
甚
シ
キ
者
衰
弱
甚
シ
ケ
レ
ハ
其
部
等
是
ナ
リ
此
病
各
自
其
本
性
燄
衝
性
神
經
ヲ
異
ニ
ス
ル
所
以
ハ
遠
因
ノ
差
異
ト
患
者
ノ
體
質
ト
ニ
係
ル
ト
猶
他
病
ニ
於
ル
カ
如
シ
ト
雖
氏
同
一
ノ
所
因
モ
其
侵
襲
ノ
緩
急
ニ
隨
ヒ
病
性
ヲ
メ
全
ク
相
反
セ
シ
ム
ル
ト
ア
リ
喻
ヘ
ハ
慄
忤
ノ
飲
液
ニ
慣
サ
ル
者
急
ニ
多
量
ヲ
飲
メ
ハ
真
ノ
燄
衝
證
ヲ
發
ス
レ
氏
微
之
ヲ
飲
テ
漸
ク
多
量
ニ
至
レ
ハ
神
經

性ノ腦燄衝ヲ患フルカ如シ
治法 腦ノ騷擾ヲ除クヲ以テ主トス然レ氏其原
因ト病性ノ異ナルトニ隨テ治法全ク相反セサ
ルトヲ得サル者アリ故ニ善審カニ診メ明ニ鑒
別セサルヘカラス
第一真腦燄衝 譫語間断ナクメ若クハ狂躁シ
若クハ昏睡シ眼内面部發赤活盈シ頭顱額額燄
灼發熱シ頭頸ノ動脈筑搏シテ靜脈怒張シ脈強
實ニメ數或壓迫セラレテ小便濃赤ナル者是ナ
リ此證ハ先刺絡ヲ行ヒ次ニ項窩顱顱ニ砭鍼若

失
大
貴
川
卷
之
四
二
十
一
適
齋
齋
歲

クハ角法ヲ施シ止ム得サレハ以テ適宜ノ
顛顛動脈ヲ刺開ス
 血ヲ瀉セル後芫菁膏ヲ項窩ニ貼シ全頭ヲ剃テ
 冷漏法ヲ行ヒ或毎一時冷水ヲ頭上ニ灌注シ芥
 子泥ヲ腓腸ニ外敷シ消石及清涼下劑瀉利塩甘
承等ヲ内服セシメ側ハラ遠因ニ注意メ
毎一時
 痛風毒等ニ起因セサルヤ否ヲ審ニ辨晰セン
 ヲ要ス右ノ如クニメ焮熱赤色頸動脈ノ筑搏等
 悉ク退キ焮衝證解散スル凡譫語昏睡仍陸續セ
 ル者ハ既ニ神經證ニ轉セルノ徵ナリ茲ニ至テ
 ハ其病患多血焮衝ノ所為ニ出テスメ衰弱ノ為

ニ起ル所ノ神經擾亂ニ係リ恐クハ亦液ノ滲漏
腫 應ニ其始ヲ資ルナルヘシ故ニ其治法ヲ轉
 メ阿芙蓉ニ甘汞ヲ加ヘ用ヒ殊ニ芫菁膏ヲ項窩
 ニ貼スルヲ緊要トス自餘麝香羯布羅亞兒尼加
名 實ナキ芫菁リ等ヲ内服セシメ昏睡仍止マサ
 ル者ハ宜ク全頭ヲ剃テ大ナル芫菁膏ヲ貼シ或
 艾灸法附ヲ行フヘシ
第三神經性腦焮衝 患者狂妄スレ凡狂證極メ
テ劇キ者
 リア血液頭腦ニ鬱積スルノ徵候ナク脈熱狀ヲ帶
 フレ凡小ニメカラナク多クハ四肢顫振等諸種ノ

夫々貴川 卷之四 二二二 適適醫藏

瘧證ヲ兼發シ大抵發病前衰弱ヲ起スノ諸因
アルヲ以テ之ヲ證スヘシ此證ハ腦神經ノ躁擾
ヲ鎮靖スルヲ以テ先務トス故ニ阿芙蓉ヲ本劑
トシ反對刺衝法微温浴ノ如キ誘導法ヲ兼用ス
ルニ宜シ尚頑固ノ證ハ麝香羯布羅葛私多樓謨
鹿琥精補ヲ用ヒ衰弱大ナル者ハ幾那亞兒尼
加名葡萄酒名ヲ與フヘシ吐劑モ亦反對刺衝ヲ
爲ス一強キヲ以テ腦ノ擾亂ヲ鎮靖スル卓功ア
リトス然レモ多血ノ患者ハ偶亦焮衝ヲ合併ス
ル者アリ宜ク其脈ト血液鬱積ノ徵トヲ以テ之

ヲ辨スヘシ若然ル一有ル時ハ先瀉血ヲ施シ防
焮法ヲ用ヒテ之ヲ退ケ而後直チニ鎮瘧強壯ノ
治法ニ移ルヲ佳トス

第三腸胃性腦焮衝 此證ハ腦ノ病患ニ腸胃汚

物膽液蛔虫等ノ諸徵ヲ兼ヌ治法ノ要ハ吐下藥
驅虫藥ヲ用ヒテ腸胃ヲ疎滌スルニ在リ但此證
モ亦神經性ト焮衝性ノ二般アリ焮衝性ノ者ハ
先瀉血ヲ施メ防焮藥ニ疎滌藥ヲ配用センヲ要
ス

右ノ諸證皆其誘因ニ注意シテ痛風疥癬ノ内攻

痔血。經血ノ閉止等アルヲ見ハ各其治法ヲ處
セサルヘカラス殊ニ腦ノ打撲創傷ニ起ル者ハ
外科術ヲ要スルノ外專ラ防焮法ヲ用フヘシ又
産婦ノ腦焮衝ノ如キハ病性ニ隨テ或ハ防焮法
ヲ施スヘキアリ或ハ鎮痙藥殊ニ羯布羅
阿芙蓉。莨菪ヲ投ス
ヘキアリ然レ其證間亦乳汁ノ腦ニ轉移スル
ヨリ發スルヲアルカ故ニ善之ニ注意メ乳房ノ
分泌ヲ催進セサルヘカラサルヲアリ

此病既ニ焮衝ノ時期ヲ踰テ精神病若クハ麻痺
病ニ轉セシ者ハ各其本條ニ就テ對證ノ治法ヲ

撰用スヘシ

小兒ノ濕性腦焮衝即腦
水腫ハ後ノ小兒門ニ詳説ス

宜ク參考スヘシ

脊髓焮衝「メイエリチス
「ロツケメル
「オントステーキン
「グ」蘭

徵候 脊髓ノ一處疼痛アリテ或荏苒稽留シ或發
歇往來シ早晚下肢ノ麻痺ヲ兼子或上肢モ共ニ
麻痺ス其麻痺大抵神經
末梢ヨリ始ル或其痛甚々微ニメ知リ
難ク或全ク痛ミナキ者アリ此ノ如キハ手ヲ以
テ脊骨ノ上端ヨリ毎椎序ヲ逐テ按シ下レハ患

者必焮衝ノ部ニ至テ疼痛ヲ知覺スル者ナリ或
水綿ヲ温湯ニ浸シ之ヲ以テ右ノ如ク摩措シ下
タレハ其痛ヲ覺ユルヲ殊ニ著ルシ以テ焮衝ノ
所在ヲ認メ知ルヘシ

焮衝急性ニメ熱ヲ兼ルモアレ氏多クハ慢性ニ
メ診辨スルヲ甚タ難シ而其麻痺唯外表ノミナ
ラス脊髓上邊ノ焮衝ニ由テハ頭胸ノ神經麻痺
シテ嘔噎。嗜啞。啞吃。心悸等ヲ發シ下邊ノ焮衝ニ
由テハ飲食不化等ノ諸證ヲ起スアリ故ニ此
病ハ誤リ認メテ他病ト為シ其治法ヲ過マル者

居^ツ恒ニ少ナカラス若其焮衝分消セサレハ遂ニ
液ノ滲漏ヲ生メ或ハ脊椎水腫トナリ或ハ脊椎
ノ癒著。乾涸。硬腫。消耗。膿潰。骨疽等ニ終ル

原由 焮衝常因ノ他。血液鬱積。殊ニ痔
血鬱積。癩麻質毒。病
毒轉徙。外傷等ヨリ之ヲ發ス

治法 防焮法ヲ行ヒ蟻鍼ヲ患部ニ貼シ水銀軟膏
ヲ塗リ甘汞及ヒ下劑ヲ與ヘ次ニ芫菁膏ヲ貼メ
久ク癒ス勿ルヘシ。病毒轉徙ヨリ起レル者ハ
各其病毒ニ隨テ治法ヲ處スヘシ

打氏遺言 卷之四

咽喉焮衝 「ア」シキナ「ロ」ケルオ

徵候 嚥下困難ニ疼痛シ或全ク嚥下スル一能
ハス或嚥下呼吸共ニ妨ケアル等焮衝ノ所在ニ
隨テ各其證候ヲ異ニス其焮衝特ニ咽喉「食」道ヲ侵
スアリ特ニ喉頭「氣」管ヲ侵スアリ或扁桃核「懸」壅ノ
ニ在ルアリ或懸壅ニ在ルアリ或舌ニ在ルアリ
總テ津唾過溢シテ口外ニ流泄シ「嚥」下困難ナル
粘液滲漏ノ患部ノ表面ニ纏布シ腫脹ノ壓迫ニ
由テ頸靜脈ノ血行ヲ遮リ呼吸利セサルヲ以テ
肺ノ血管流通セス病劇ケレハ遂ニ之カ為ニ肺

焮衝若クハ昏睡卒中ヲ起スニ至ル此病輕キハ
恐ル、ニ足ラスト雖モ亦極メテ危險ニメ急ニ
斃ル、者アリ是一ハ腫脹ノ甚キニ由リ一ハ焮
衝ノ部位ニ係ル其氣管ニ在ルカ如キハ危險最
モ甚シトス
此病十全ノ分消ヲ得サレハ硬腫結膿若クハ遷
延焮衝ニ轉ス而其死スル者ハ大抵窒塞ト卒中
トヲ以テス是其腫脹甚フメ氣管若クハ頸靜脈
ヲ壓窄スルニ由リ或ハ焮衝ノ為ニ腦肺ニ痙性
ノ緊縮ヲ起スニ由ルナリ

原由 焮衝常因ノ外咽喉内外ノ感冒或ハ力作メ
身體灼熱スル時冷水ヲ飲ミ或ハ口ヲ開テ寒冷
ノ東北風ニ遇フ等其誘因ト為ル又特ニ咽喉ヲ
侵ス傳染毒アリ即猩紅疹。徽毒等ノ如シ

治法 病ノ輕重ヲ斟酌メ防焮法ヲ用フヘシ輕證
ハ唯清涼藥ヲ内服シ分消藥ヲ外用メ足レリ分
消藥ハ第三十九方ノ含劑第四十方ノ舐劑或ハ
蓬砂錢半ヲ桑椹舍利別弓ニ和シ若クハ之ニ明礬
ヲ加ヘテ注射藥トシ或ハ其蒸氣ヲ吸フ等ナリ
其他フラ子ル布名ヲ以テ厚ク頸圍ヲ纏包シ礪砂

揮發膏名ヲ塗擦シ芥子ヲ以テ蒸漏シ刺絡及局
處ノ瀉血ヲ行フ等證ニ隨テ撰用スヘシ但蜚鍼
吸角ヲ頸ニ施セハ其功大ニ刺絡ニ優サル一屢
之アリ然リト雖氏重證ハ必刺絡ヲ以テ先務ト
セン一ヲ要ス胸内窘迫脈軟小嗜眠等ヲ以テ其
的候トスル一猶肺焮衝ニ於ケルカ如シ若防焮諸
法ヲ用ヒテ後嚥下困難呼吸不利依然トメ退カ
サル者ハ是痙攣ノ然ラシムルナリ宜ク阿芙蓉
ニ甘汞ヲ加ヘテ内服セシメ芫菁膏ヲ頸ニ貼シ
麻醉藥ノ毡布ヲ外敷スヘシ又此證ハ吐劑ヲ與

フルモ佳トス嚥下困難ナルヲ以テ之ヲ憚カル
一勿レ湧吐スルハ嚥下スルヨリ易ケレハナリ
焮衝ノ所在ニ隨テ治法各小異アリ咽喉衝ハ舐
劑含劑ヲ主トスヘシ咽喉衝ハ湯蒸氣ヲ吸入セ
シムヘシ扁桃核焮衝腫脹甚フメ將ニ窒息セン
トスル者ハ喉痺鍼ヲ用テ之ヲ刺破スルニ宜シ
速ニ危急ヲ免ル一ヲ得ヘシ舌焮衝モ亦腫脹甚
フメ口内ヲ填塞スル者ハ其兩側ヲ豎ニ截開ス
ルヲ妙トス

此病ニ於テ殊ニ注意ス可キ者ハ病性ノ區別ナ

リ因テ左ニ之ヲ列序ス

腸胃性咽喉焮衝

咽喉焮衝ノ諸證有テ腸胃汚

物ノ徵^{舌上汚}ヲ兼ル者是ナリ宜ク先吐劑ヲ用

ヒ^{或ハ唯吐劑ノミヲ以テ}次ニ下劑ヲ與フヘシ

但真焮衝ヲ帶ル者ハ瀉血及他ノ防焮法ヲ行ハ

サルヘカラス

聖京僵性咽喉焮衝

疼痛微ナレモ腫脹甚シク

患部ノ表面白色ニメ粘液ヲ塗布シ其患多クハ

扁桃核懸壅ヲ侵シ亦喉裏ニ及フ而或ハ身熱少

ク或全ク熱ヲ夾ム一ナシ此病唯其部ノ粘液膜

感冒ノミニ餘患ナキ者ハ恐ルニ足ラスト
雖^レ腫脹甚フノ咽喉ヲ室塞スルニ至テハ亦危
險ヲ惹ク^レアリ治法先^ニ腸胃毒ノ有無ニ注意セ
ン^レヲ要ス之ヨリ起ル者最多ケレハナリ此證
ハ先^ニ吐劑ヲ用^ヒ繼^テ下劑ヲ與フレハ速効アリ
然^レ腸胃清淨ナル者ニハ清涼發汗藥^{就中}ヲ
主用シ兼^テ硃砂揮發膏ヲ塗リ綿絮ヲ頸圍ニ纏
ヒ或ハ蒸餅母芥子泥ヲ外敷シ刺衝性ノ收瀋藥
殊ニ地榆^鏡第四十一方^四明礬硃砂^名等ヲ含漱
劑トシ且^ツ此類ノ藥液ヲ患部ニ塗布シ或ハ水銃

ヲ以テ其藥液ヲ注射シ以テ粘液ヲ滌除スルヲ
宜シトス若^シ諸法驗ナク却^テ熱勢ヲ増シ焮衝進
ム者ハ蟻鍼ヲ貼シ或^ハ刺絡ヲ施シ且^ツ甘汞ヲ用^ヒ
サルヘカラス又^ハ扁桃核懸壅ノ腫脹増大メ將^ニ
窒息セントスル者ハ宜ク截破メ其死ヲ拯フヘ
シ懸壅ハ堅ニ截
ルヲ佳トス
僕^ハ府^ハ所謂^ハ蟻
蓋^ハ瘰^ハ是^レ耳腺及^ニ下顎腺ノ腫脹セルナリ
甚キハ其腫内部ニ及^ヒ遂ニ呼吸ヲ室塞セシム
ル^レアリ此病ハ單純ノ聖京傷ニメ通常感冒ノ
流行スル時ニ流行ス治法大抵善ク温覆メ發汗

藥。清凉下劑ヲ與フレハ輒治ス然レ氏重キ者ハ
甘汞ヲ用ヒ蜚鍼ヲ貼シ或吐劑ヲ處セサルヘカ
ラス然メ此病ハ交感ニ由テ畢丸腫脹ヲ起シ易
ク且他部ニ轉移シ易シ故ニ嚴シク寒冷ヲ避ケ
シメ鉛劑。羯布羅。其他收斂驅散ノ諸藥ヲ外用ス
ルヲ禁スヘシ

腐敗性咽喉焮衝

咽喉ノ内面焮腫シ或ハ頸外

モ共ニ腫脹シ始ヨリ直ニ青紫色ノ斑点ヲ見ハ
シテ腐敗臭ヲ放チ呼吸困難ニメ發熱譫語共ニ
甚シク第二三日ニ至レハ患部ニ黑色ナル寒壞

疽狀ノ痂ヲ結シテ酷厲惡臭ノ稀液ヲ流シ口内
諸部上顎鼻孔ニ侵滲シ喘鳴昏睡窒息等日ニ漸
ク進ミ大抵第四日ヨリ第六日ニ至ルノ間ニ死
ス此病ハ歐羅巴地方甚タ希ナリ唯隱伏猩紅疹
ニ兼發スルノ間之アルノニ治法先吐劑ヲ與ヘ
次ニ幾那。攝爾扁答里亞。葡萄酒。鑛酸等ノ防腐
強壯藥ヲ内服セシメ且此諸藥及蘓魯林加爾幾
ヲ注射シ或筆ヲ用テ之ヲ塗リ或醋ニ浸藥ヲ加
ヘ煮テ其蒸氣ヲ吸引セシムヘシ又氷水ヲ多飲
セシメ或氷片ヲ布袋ニ裹ミ口内ニ含マシメテ

以テ偉効ヲ得ルコトアリ
常習咽喉焮衝 僅々ノ所因ニモ每常發作スル

所ノ咽喉焮衝是ナリ劇性焮衝ノ後咽喉一部ノ

衰弱連綿トメ久ク復故セス由テ屢再發スル者

ニメ難治ノ者甚多シ毎日朝暮明礬水明礬ニ錢ヲ水一北

ニ溶シ美味ノヲ以テ含漱シ冷水ヲ以テ外部ヨ

リ頸ヲ洗ヒ布名若クハ絹布ノ頰ヲ頸

圍ニ纏フヲ最良トス若シ之ニ由テ治スルコトヲ得

サル者ハ病毒轉徙ノ所為ニ非ルヤ否ヲ檢索ス

ヘシ

遷延咽喉焮衝

焮衝荏苒トメ持續シ經日癒ユ

ルコト無キ者ヲ謂フ咽喉一部ノ衰弱ニ起レル者

ハ前段ノ治法ニ宜シト雖此證ハ病毒轉徙ニ

由レル者特ニ多シ就中儂麻質毒痛風毒瘰癧毒

ヲ多シトス宜各其治法ヲ處シ焮衝甚キ者ハ時

々蟻鍼法ヲ行フヘシ又痔血鬱閉腹内壅積後ニ出ツ

ヨリ來ル者少カラス意ヲ注ヒテ詳ニ之ヲ察ス

ヘシ此證ハ痔血ヲ喚起シ解凝疎通ノ諸藥ヲ用

フヘシ殊ニ鑛泉名カル、スバットノヲ用ヒテ偉効ヲ

奏スルコト屢アリ又硬腫潰瘍等ノ如キ形器病ア

リテ此證荏苒瀰久スルコトアリ宜ク注意メ詳ニ
查點スヘシ

義膜咽喉焮衝 ウコロト名クル者アリ後ノ小兒門ニ詳説ス

口内壞疽焮衝 「ストマカセ」
「ゴウド」
「ロ」
「キ」
「ン」
「グ」

「ラン」
「モ」
「ン」
「ド」
「ラン」

徵候 口内諸部焮衝シテ腐臭ヲ放チ汚穢ノ粘物
舌上齒齦ニ纏布ス此病ハ多ク小兒ノ病ム者ニ
メ亦間一般流行スルコトアリ

原由 其因聖京偃若クハ腸胃汚物ナリ大人ニ於

テハ間失苟兒陪苦ノ一證ナル者アリ

治法 速ニ吐劑ヲ用ヒ 唯吐劑ノミニシテ
全治ヲ得ル者多シ 隨テ下

劑ヲ與ヘ酸類ヲ服セシメ 蘓魯林加爾基 「舍」
「ヲ」
「水」

ニ溶シテ嗽劑トシ或ハ筆ヲ用テ之ヲ塗布ス若

夫失苟兒陪苦ヨリ起ル者ハ其本條ニ就テ治法

ヲ索ムヘシ

舌焮衝 「ゴ」
「ロ」
「ス」
「シ」
「チ」
「ハ」
「シ」
「ロ」
「オ」
「ン」
「ト」
「ス」
「テ」
「キ」
「ン」
「グ」
「ラン」
「ト」
「ン」
「グ」
「ラン」

徵候 舌ノ全體紅腫焮熱シテ嚙下ヲ妨ケ甚シケ

扶氏遺訓 卷之四
レバ全ク嚙下スルヲ能ハスノ氣息モ亦窒塞セ
ントスルヲアリ而其腫大ナル者ハ全ク口内ニ
充填シテ僅少ノ罅隙モ遺スヲナシ此病分消セ
サレハ終ニ硬腫膿潰ニ移リ若クハ壞疽ニ陷ル
ナリ

原由 焮衝常因ノ外。局處ノ外傷。酷厲ノ刺衝物。齒
牙尖挺。痺麻質。感冒。病毒轉徙等ヨリ之ヲ發ス
治法 防焮諸法ヲ用ヒ刺絡及局處ノ瀉血ヲ施シ
腫脹甚キ者ハ豎ニ之ヲ截開スヘシ腫脹ヲ減シ
危篤ヲ免ルノ捷法ナリ頑固ノ證ハ水銀軟膏

ヲ擦スルモ亦偉効アリ

扶氏經驗遺訓卷之四終

