





1448  
7

安政四年丁巳初秋新雕

緒方洪菴譯本

三帙

# 扶氏經驗遺訓



適適齋藏



91-1904

扶氏經驗遺訓第三帙目次

卷之八

第六編

神經病 總論

其一 精神病

精神錯亂

依卜昆埵兒

卷之九

其二 瘧性病

癩癩

扶氏經驗遺訓 卷之八 目次 適適齋藏





扶氏通言 卷之八

舞蹈病

秦漢虞

夢中行步

魘不寤

不寐

刺發尼亞

顫震

身體強直

破傷風

喘息

心悸動

欬嗽

疫效

卷之十

慢性嘔吐

吃逆

神經痛

痒病

頭痛

面痛

扶氏通言 卷之八 目次 二 道通齊載



齒痛

耳痛

胃痛

嘈雜

疝痛

恐水病

渴病

善饑

錯聽

錯視

花風

卷之十一

其三麻痺病

卒中

肺癰

昏冒

卒死

眩暈

昏睡

局處麻痺



膈噎

不語及失聲

胃弱

異嗜

陽精無力

黑障眼

耳聾

失聽及失味

皮膚不仁

不食

不淫







ハ固論ヲ俟タス假令他病ニ原クハ純ラ神經系  
 ノ變ヲ徵スル者ハ亦之ニ算入ス然其病タル五  
 官眼耳鼻舌身精神諸筋ニ係ル運營ノ亢盛過敏ト減  
 却鈍感麻痺ト常態ヲ變セルトニアリトス  
 其經過頻漸緩急一定セス或ハ速ニ治スルニア  
 リ或ハ早ク死ニ歸スルニアリ或ハ生涯連綿ス  
 ルニアリ或ハ多時ヲ隔テ斷續スルニアリ或ハ  
 病狀彼此交換スルニアリ然氏多ハ年齢ト其壯  
 衰ヲ共ニスルナリ其病壯年ニ盛ニノ老年ニ衰ルヲ云フ而其病ノ  
 治スルハ病因ノ除クニ由ルカ年紀ノ加ルニ由

ルカ或ハ轉徙變形共ニ病ヲ致スニ由ル且此病ハ  
 危険必死ノ者ニ非スト雖氏腦心肺ノ如キ生命  
 ニ係ル貴器ヲ襲テ其部ノ麻痺ヲ致セハ忽然ト  
 ノ斃ル者少カラス或ハ補給機ヲ侵シテ羸瘦  
 勞瘵水腫等ヲ發スレハ徐ニ黃泉ニ逝ク者モ亦  
 多キニ居ル

原由近因ハ神經力内情ヲ違ヘテ其運營常度ヲ  
 紛メリ新奇異常ノ交感ヲ作シ或ハ其變ヲ補給ノ  
 機ニ及ス等ナリ而遠因ハ四般ニ歸ス  
 第一素質 先天ノ稟賦纖維ノ弛弱幼稚ノ年紀



婦人ノ素性。養育ノ過愛。衣食ノ飽煖。齒牙始テ生  
シ言語將ニ發スルノ期。月經初テ見ハレ慾火方  
ニ動クノ時。及市井ノ住居。室内ノ操業。地方ノ卑  
濕。氣候ノ冷濡等之ニ属ス

第二衰弱 或ハ飲食不給。或損大氣變敗。温煖減

却。氣候冷濕。失血。殊ニ月房勞。手淫。遺精。下利。帶下。

吐涎。脱汗。淋疾。及經過多。媿產過數。授乳過久等ノ如ク榮

養必需ノ物質ヲ失ヒ生命緊要ノ刺衝ヲ奪フ因

ヨリ來ルアリ。或ハ精神刻苦。筋力過動。急慢諸病。

及非常ノ温熱ヲ受ケ慄悍ノ飲液。茶。骨喜ヲ過用

スル等ノ如キ過度ノ刺衝ニテ諸カノ費勞スル

因ヨリ來ルアリ。或ハ動作ヲ怠リ筋力ヲ役セサ

ルヨリ來ルアリ。間暇逸居スレハ神經病。或ハ憂

愁。悲哀。戀著。猜忌。悒悶。麻醉藥誤用等ノ如ク直ニ

神經ヲ衰弱セシムル因ヨリ來ルアリ

第三對稱違失 多血滿溢。筋力壓止。腹内諸機。殊

生植ノ滯廢。皮膚分泌ノ抑遏。痔血。月經ノ鬱閉等

ハ皆神經力ニ對稱違失ヲ起スナリ

第四局處刺衝 其刺衝。蛔虫。汚物。大便壅滯等ノ

如ク胃腸ニ在ルアリ。腦髓。腹臟。痔脈等ノ血液鬱



積ニ在ルアリ。伊屈篤。癩麻質。疥癬。微瘡等ノ病毒  
 轉徙ニ在ルアリ。或ハ竹木刺。硬腫。結石。蓄水。骨瘍。  
 神經節腫等ノ如キ形器性刺衝ニ由ルアリ。過慮  
 多想等ノ如キ精神ノ刺衝ニ由ルアリ  
 或ハ又本病ヨリ釀シ来テ本因ノ存亡ニ拘ラス  
 更ニ病ヲメ持久セシムル因ト為ル者アリ。常習  
 ト衰弱ト是ナリ。時期常習ハ殊ニ不良ナリ。月經  
 寤寐等ノ如キ時刻ヲ定ムル生機ト共ニ發歇ス  
 ル者ハ尚且惡性ニメ頑固ナリトス。癩癧。精神病  
 等此常習ニ由テ頑固難治トナル者常ニ多シ

此病ハ右ノ諸因ニ從フテ純性神經病。虚性神經  
 病。轉徙毒神經病。多血性神經病。腸胃性神經病。形  
 器性神經病等ノ名ニ分ツヲ治術ニ益アリトス

治法 根治法ト姑息法トアリ。本病ヲ攻ムルヲ根

治法トシ。外證ヲ鎮ムルヲ姑息法トス

根治法ヲ行フニハ其病無形ノ單純證ナルカ將  
 有形ノ他病ニ原キ来ルカ先之ヲ檢セン。トヲ要  
 ス。而其單純證ハ直ニ神經上ニ係ルノ治法ヲ行  
 フヘシ。是ヲ直治法ト謂フ。其他病ニ原ケル者ハ  
 之ヲ探テ驅除スレハ本病亦隨テ退クナリ。是ヲ



隔治法ト謂フ斯ノ本病仍除クテ能ハサレハ則チ  
直治法ヲ施スニ宜シ

蓋治法ノ本旨ハ固ヨリ神經運營ノ變常過敏遲鈍變態

ヲ復故スルニ在ルノミト雖其遠因ノ異ナル

ニ隨テ治術亦差ハサルヲ得ズ即衰弱ノ之カ

因ト為ル者ハ強壯滋養ノ法ヲ施スヘシ唯是ニ

由テノミ全治スル者少カラズ全身若ハ一部ノ

多血其因ヲ為ル者ハ筋ヲ勞動ノ諸液ノ費耗ヲ

促カシ總身局處ノ瀉血ヲ行テ之ヲ導泄スヘシ

子宮或ハ痔脈ニ隱伏セル血液鬱積有テ然ル者

屢之アリ殊ニ意ヲ用テ探索セシテ要ス停食

蛔虫腹内壅積等ノ其因ヲ為セル者ハ吐下藥驅

虫藥解凝藥ヲ用フヘシ亦病毒内部ニ轉徙シテ

其因ヲ為セル者殊ニ多シ乃病ノ本體悉ク癩麻

質ニメ神經證ハ咸滕理抑遏ノ對稱機ナル者ア

リ是證ハ唯フテ子布名ヲ以テ軀體ヲ温被シ皮

膚刺衝法浴法ヲ行ヒ癩麻質藥ヲ内服シテ奇驗

ヲ奏ス或ハ亦伊倨篤疥癬黴毒汞毒等ヨリ來レ

ル者少カラス各自應當ノ治法ヲ處スヘシ或ハ

隱ニ苦心シ密ニ戀著スル等其因ト為レル者ア



リ多<sup>婦人</sup>之ヲ發覺セシメテ本病頃ニ除ク<sup>亦</sup>少キ所ニアラス<sup>以上隔</sup>治法

若其遠因識ル可ラサルカ若ハ之ヲ除ク<sup>氏</sup>本病依然トノ退カサル者ハ則<sup>直</sup>治法ヲ行ハン<sup>一</sup>ヲ要ス然リト雖<sup>氏</sup>若遠因ノ除クヘキ者有テ未<sup>之</sup>ヲ驅ラス<sup>謾</sup>ニ此治法ヲ行フ時ハ毫モ其功ヲ奏セス或ハ苟且一掃セルカ如キモ次テ復再發シ病愈増進ス慎マサルヘカラス

直治法數般アリ

第一神經特效ノ諸法ヲ行フヘシ即<sup>動物植物</sup>

揮發油<sup>實百兒油加耶</sup> 麻醉藥<sup>菲阿斯阿芙蓉拔</sup>

爾撒謨類亞的兒類<sup>猛劇ノ金石土塩</sup> 越列幾的兒瓦爾華尼等<sup>如キ是ナリ凡</sup>

テ恰當ノ神經藥ヲ擇フニハ平常ノ時ニ於テ患

部ニ異常ノ奇効ヲ致セシ者<sup>按ニ胃ニ於ル吐酒</sup>

カノ類<sup>或ハ平常ノ時ニ於テ今發セル所ノ患ト類</sup>

似スル證ヲ起スヘキ者<sup>按ニ癱病ニ雙鳶菊ヲ用</sup>

カノ類<sup>ヲ照査セシ<sup>一</sup>ヲ要ス而右ニ舉ルカ如キ有</sup>

カノ品<sup>麻醉ノ藥ヲ用ルニハ須ク左ノ法則ニ準</sup>

ハサルベカラス即<sup>初</sup>少量ヲ取テ謹慎メ之ヲ與



徐ク其量ヲ増加スベシ是感應力ノ銳鈍預知ヘ  
カラサレハナリ而麻酔藥ハ微麻酔證嗜眠頭眩  
眼花閃發  
等ヲ發スルニ至リ金屬製劑ハ少惡心ヲ起スニ  
至ルヲ限トシ是ヨリ復徐ク其量ヲ減メ終ニ全  
ク之ヲ止メ暫ク其動靜ヲ窺テ病仍退カサレハ  
又其法ヲ舉ケ行フ前ノ如クシ頑固證ニ於テ  
ハ數斯ノ如ク緩急ノ數月間持又スヘシ總テ有  
力竄透ノ神經藥ヲ用ルニハ之ヲ増シ之ヲ減シ  
時ニ且ク休止スルヲ最切實ニメ鴻益ヲ得ヘキ  
ノ妙法トス是法ニ據レハ器質ハ斷ヘス其感應

カラ恢復シ藥劑モ亦刻々其能カラ新ニスル  
ヲ得テ而甚ク器質ヲ損害スルノ恐ナケレハナ  
リ故ニ若是法ヲ知ラスメ大毒ノ藥品ヲ謾ニ連  
用スルキハ必其害ヲ被ラザルヲ得ス亦經久  
ノ神經病ニ於テハ數其藥品ヲ更換スルモ緊要  
ナリトス是ニ由テ每時斬新ノ刺衝ヲ起サシム  
レハナリ若單方ノ藥品功ヲ收メ難キ時ハ數品  
ヲ合セル複方ヲ投スルニ宜シ若又藥性劇烈ナ  
ラスメ能揮發強壯ノカラ有シ持長メ其功ヲ為  
スヘキ藥ハ又ク連用スルヲ可トス或ハ數年間



連用セサル可ラサル者アリ。

第二反對刺衝法ヲ行テ病ヲ他部ニ誘導スヘシ  
即浴法打膿法皮膚刺衝法腸胃刺衝法意識神經ノ病ニ殊  
効ア等是ナリ

第三對稱違失ヲ復スヘシ動機ト覺機ト對稱ヲ  
違フテ此病ヲ起ス者殊ニ多シ諸筋ヲ運轉シ微  
温浴ヲ行フ等大ニ功アリ

第四強壯法ヲ行フヘシ諸神經病ハ假令其原衰  
弱ニ係ラサル者ト雖氏畢竟神經ノ衰弱ヲ招キ  
之カ為ニ其病稽滯スル者少カラス故ニ強壯法

苦味藥。苦味收斂藥。鑛酸。鐵劑。寒冷。冷浴等是ナリ。 滋養法 滋補。飲食。田舎。住居。散步。逍遙。旅行等是ナリ。 共ニ良驗アリトス

第五攝生ヲ變シ居處ヲ轉シ或ハ圍擁セル諸件  
帷帳。屏風。卧具。食器ノ類ヲ總稱ス。 ヲ換フヘシ唯卑濕ノ地ヨリ高  
燥ノ地ニ遷レルノミニメ全治ヲ得タル者屢之  
アリ

第六刺衝物ハ一切之ヲ禁スヘシ是脆弱過敏ノ  
患者若ハ久ク強劇ノ刺衝藥ヲ多服セシ者ニ於  
テ然トス是患者ハ凡醫藥ニ属スルノ品類殊ニ  
ヲ衝動スル品 悉皆之ヲ避ケ茶骨喜香竄辛味ノ物ヲ禁



シ居ヲ田舎ニ移シテ養ヲ乳汁ニ資リ微温浴ヲ  
 行フヲ宜シトス或ハ蒲蓆阿把扶一派學流ノ名  
スルニ藥ヲ至微少量ニ用フルヲ以テ主トス此  
條凡テ醫藥ノ衝動ヲ避クルル意ヲ以テ之ヲ稱用  
ルセルナノ分量ニ從テ諸藥ヲ用フルモ亦可ナリ  
 甚頑固證ニ於テハ人為ノ分利ヲ作サシメテ病  
 ヲ他系ニ誘フヘシ瘡疹ヲ種テ皮膚病ニ轉セシメ  
下藥ヲ用ヒテ腸病ニ變セシ  
ルムル類ナ腦髓及神經ノ衰弱セル者ハ毎日冷水  
 ヲ頭上ニ灌溉スヘシ若夫神經證痙攣疼痛時刻  
 ヲ定テ發歇スル者ハ其間歇時ニ幾那ヲ用フヘ  
 シ最的實ノ功ヲ奏ス

姑息法ハ唯發現ノ外證ヲ鎮靖スルヲ旨トスト  
 雖此病ニ於テハ其功甚少カラス是ハ之ニ  
 由テ患苦ヲ免カレニハ外證却テ危險ナル者多  
 ク三ハ發作毎ニ病性愈深ク神經ニ侵入スル者  
癲癇ノ如キアレハナリ是ノ如キ證ニ於テハ姑  
殊ニ然リ息法亦根治法ニ屬ス  
 而此法ニ屬スル者ハ反對刺衝法ト鎮痙藥トノ  
 ミ

其一精神病シールスシ

精神錯亂インサンサニア



徵候 精神ノ運營常調ヲ錯越セル者ハ總テ之ヲ  
 精神錯亂ト謂フ而其心常ニ惕ミトメ人ヲ嫌ヒ  
 鬱ミトメ物ヲ憂ヒ自精力之弱ヲ覺ユル者ヲ鬱  
 憂病コリシト謂ヒ其心勇猛ニメ錯亂シ意氣揚  
 揚トメ喜テ人ヲ拒ム者ヲ顛狂マニト謂ヒ其心  
 茫々然トメ智慧ヲ失ヒ或ハ拘々乎トメ一念動  
 カス或ハ恍々トメ物ヲ辨識スルヲ能ハス若ハ  
 事ヲ思慮スルヲ能ハサル者ヲ健忘アメント謂  
 ヒ其辨識思慮共ニ乏弱セルカ若ハ全ク之ヲ脱  
 セル者ヲ癡呆マセト謂フ又其神識睡中モ仍

休止セス起テ事ヲ為ス者アリ之ヲ蘊ソム謨ム南ナム穎エイ律リツ  
 斯繆スミウ私シ夢中行歩ノ義ト謂フ  
 此病鑒定スルヲ甚々難キ者アリ其輕證ニ於テ  
 殊ニ然リトス或ハ患者一事ニノミ錯亂メ自餘  
 毫末モ變證ナキ者アリ或ハ時ニ發歇メ休歇セ  
 ル間ハ平常ニ異ナルヲナキ者アリ若夫他病ニ  
 傍發シテ之ト共ニ進退スル者如ク決メ此病  
 ニ屬セス熱病歇以私シ的テ里リ情セイ意イ劇動等凡テ非常  
 ノ感ヲ為ス者ハ皆能ク一時ノ精神錯亂ヲ起ス  
 ト雖氏其因止ハ其證輒去レバナリ而譚語ト精

夫貴川 卷之八 十 通 通 齊 成



神錯亂ト混ス可ラス歌イ私テリ依ト昆垓ホコ兒ノ  
 患者荏苒タル譫語ヲ兼發スレ氏唯傍證ニメ此  
 病ニ非ル者アリ急性慢性ヲ論セス熱病ニ兼發  
 セル譫語ノ如キ其熱解スレハ随テ退ク者亦然  
 リ決メ精神錯亂ト稱ス可ラス殊ニ少年醫輩ハ  
 深ク謹慎ヲ加テ之ヲ察シ妄ニ精神錯亂ノ名ヲ下  
 スト勿レ人ヲ斥シテ狂ト稱スルハ猶之ヲ斥テ  
 禽獸ト謂フト一般ナレハナリ  
 此病稽留證アリ間歇證アリ共ニ其經過長シテ  
 治シ難ク其快復期シ難クシテ再發シ易シ而秦

漢虞癩癩。麻痺等ノ如キ無形病ニ轉スルアリ伊  
 倔篤。皮疹病。痔疾。肺勞等ノ如キ有形病ニ變スル  
 アリ若夫卒中水腫消削病ニ移ルカ如キハ必ス  
 死スル者ナリト知ル可シ

原由 精神ハ固無形ナリ何疾病ニ罹ルヲ得シ  
 唯其人倫ヲ紊ルノ一事ノミ精神ノ病ト云ヘシ  
 且精神ノ本然ハ形質有ルヲ無ク亦形質ヨリ生  
 シタル者ニモ非ス實ニ是下界ヲ離レタル不朽  
 ノ者ト雖氏唯其作用ヲ營シカ為ニ人體ト結合  
 メ神經系就裡ニ舍セルノミ然氏其之ニ舍セル



ヲ以テ人體諸器ト同ク生活運營ノ則ニ準テ其  
動靜ニ罹ラサルヲ得ス亦互ニ其變ニ交感セ  
サルヲ得ス故ニ亦其運為妨碍セラレテ常調  
ヲ變スルヲアレハ精神病ト稱セサルヲ得ス  
然其實ハ神經病ノ一種ニ屬スルナリ

是ヲ樂人ノ箏ヲ彈スルニ譬フ若シ良器無キ  
片ハ名エト雖モ妙曲ヲ奏スルヲ能ハス且其  
器律ニ適ヘハ清音聽クヘシト雖モ律ヲ傷レ  
ハ樂人同一ニメ輒チ濁音ヲ奏セサルヲ得  
ス

是故ニ此病ノ近因ハ無形ノ精神ニ在ルニ非ス  
メ有形ノ腦髓ニ在ルナリ過敏。遲鈍。或ハ變調スルニアリ故ニ  
酩酊熱病麻酔藥ノ如キ有形物ノ刺衝能精神ヲ  
變セシメ勞瘵癩癩水腫等ノ有形病能ク精神病  
ヲ鎮ムルヲアリ以テ之ヲ證スルニ足ル  
腦髓右ノ如ク變常メ精神錯亂ヲ起ス所以ノ遠  
因ニ般アリ

其一無形之因 驚愕喜怒悲哀憂思憤慍猜忌嫉

妬失望戀慕遂ルヲ得ス所過度ノ思慮密室ニ  
其智ノ能ハサルヲ考究シ或ハ蒲桃酒骨過度  
喜類ノカラ借テ頻ニ神氣ヲ費勞スル者等



扶氏遺訓

ノ想像稗乘ニ耽リ傾刻ニ弱類レ或ハ一念動カス

一情移ラス是既ニ一時ノ終ニ真證トナル或ハ

徹宵不寐日ヲ重ル等之ニ屬ス

其二有形之因 慄悍飲液燒酒ノ過用當今民間

亂此ヨリ來阿芙蓉ノ過服等ノ如ク直ニ

腦ヲ侵シテ其變動ヲ起スヘキ者或ハ門脈鬱血

内臟壅塞便秘蛔虫等ノ如ク交感對稱ニ由テ甚

ク腦ヲ侵スヘキ腹内ノ刺衝腹内ノ神經ト交感對稱

最密ナリ常ニ注意 或ハ腦髓ノ焮衝若ハ血液鬱

積壽血經血衄血ノ閉止或ハ腦髓ノ衰弱全軀虛



來ル者アリ房事手淫ノ過度ヨリ來ル者アリ陰

器ハ腦ト交感親密ナルヲ以テ過房ニ係ル者最

多シ或ハ伊屈篤疥癬等ノ病毒轉徙或ハ墜下打撲

等ノ頭腦損傷劇ク腦ヲ振蕩スルニ由リ或ハ血

蓋骨ノ陥没スルニ由テ此病ノ因トナル或ハ腦髓

質ニ衝入スルニ由テ此病ノ因トナル

ノ硬腫結核腫瘍蓄水化骨等ノ如キ頭中ノ形器

病等之ニ屬ス若シ其諸因二三相合メ之カ因ト

ナル時ハ病愈險難ナリ喻ヘハ思慮過度ナルニ

兼テ藝居憂悶シ且消化シ難キ硬固ノ食ヲ喫セ

ルカ如シ 素因亦數般アリ知ラサル可ラズ 第一遺傳 父母

扶氏遺訓 卷之八

十三

適適齋藏



之ヲ兒ニ讓リ兒亦孫ニ傳テ一血屬ノ固有病ト  
ナレル者常ニ多ク實驗スル所ナリ **第二稟賦**  
膽液質。黑膽液質ノ人殊ニ此素因ヲ胎リ **第三七**  
情動キ易キ性 總テ情意劇動ハ已ニ一時ノ精  
神錯亂ニメ皆其慧明ヲ失フ者ナリ習ヒ性ト為  
レハ遂ニ真證ト為サルヲ得ス **第四生業** 布  
ヲ織リ履ヲ造ル者ノ如ク業ヲ寂寞ノ地ニ操テ  
心ヲ一事ニ勞スル者ハ此病ヲ生シ易シ **第五邪**  
教ヲ信仰メ心ヲ傾ケ思ヲ凝ス類是ナリ  
是故ニ此病ハ一時ニ多クシテ他時ニ少ク甲郷

ニ夥クメ乙地ニ稀ナル等其地宜ト時勢トニ隨  
テ大ニ榮枯盛衰アルナリ例スルニ大古ハ稀ニ  
メ村人野客都兒格國人ノ如キハ當今モ之ヲ患  
ル者少ク閭閻坊間ノ智巧ニ耽ル者殊ニ英吉利  
人佛郎斯人ノ如キハ此病ニ罹ル者最多シ  
此病モ亦神經性錯亂。多血性錯亂。虛性錯亂。轉徙  
毒錯亂。腸胃性錯亂。形器性錯亂等ニ分ツテ治術  
ニ益アリトス

治法 精神運營ノ守ヲ失ヘルヲ復スルニ二法ア  
リ一、速因驅逐法ナリ一、直治法 直ニ精神ヲ ナリ



遠因驅逐法此病多血焮衝或ハ腦ノ血液鬱積ヨ  
リ起ル者ハ總身局處ノ瀉血ヲ行ヒ狂亂甚キ者  
ハ顛顛動脈ヲ刺シ防焮藥下劑ヲ用ヒ吐酒石甘  
汞ヲ與ヘ頭部ニ冷濕法冷滴法ヲ行フ等ニ宜シ  
腦髓神經ノ衰弱ヨリ來ル者ハ續艸亞兒尼加攝  
爾扁答里亞亞的兒以上葡萄酒阿芙蓉等ノ神經  
藥引赤法微温浴頭部冷濕法等ノ如キ衝動法ヲ  
行フヘシ此證原腦髓過度ノ刺衝ヨリ來テ神經  
證ハ焮衝ノ第二期ナル者アリ亦原神經衰弱ニ  
メ腦ノ血液鬱積ヲ誘ヒ起シ以テ瀉血ヲ要スル

者アリ能ク鑒別セサル可ラス腸胃汚物腹内壅  
積蛔虫等ノ如キ腹内ノ因ヨリ來レル者ハ解凝  
藥ヲ用ヒ且其刺衝物ヲ排泄スルニ宜シ其他病  
毒轉徙ヨリ生セル者各其毒ノ治法ヲ行ヒ好愛  
スル所有テ嗜欲遂サルヨリ起レル者ハ其需ニ  
應メ之ヲ許ス等亦皆遠因ヲ驅ルノ治法ニ屬ス  
直治法近因ヲ治スルノ法ニメ直ニ精神腦髓ノ  
運營ヲ復故スルナリ而亦之ニ有形無形ノ二法  
アリ就中有形治法ヲ緊要トス凡百精神病唯之  
ニ由テノミ治癒スル者實ニ三分ノ二ニ居ルナ

夫ノ遺凡 卷之八 五 適適齋藏



本草綱目卷之八

通鑑彙編

リ然<sup>レ</sup>氏<sup>レ</sup>兩法相兼<sup>テ</sup>行<sup>テ</sup>功驗最<sup>モ</sup>的<sup>ト</sup>切<sup>ト</sup>ス  
 有形治法亦二般ニ分ル其<sup>レ</sup>一ハ反對刺衝法ヲ行  
 テ腦ノ變常ヲ他部ニ誘導シ以テ精神ノ運營ヲ  
 和平スルニアリ而<sup>レ</sup>腦ト交感最<sup>モ</sup>親密ナル者ハ腹  
 部ノ神經ナルカ故ニ腹内諸器ヲ衝動メ其運營  
 ヲ挑起スルヲ第一ノ先務トスヘシ神經ノ運營  
 ヲ復治メ偉効ヲ奏スル<sup>レ</sup>一比類ナシトス即<sup>チ</sup>吐劑  
 ヲ用<sup>ニ</sup>孕鹼酒石。孕蓬酒石。少量吐酒石ニ解凝越  
 幾斯劑ヲ伍メ連服セシメ病重キ者ハ黑烈僕里  
 根<sup>或ハ越</sup>藜蘆根<sup>或ハ越</sup>瓦刺<sup>或ハ越</sup>徵阿刺葉<sup>或ハ越</sup>格魯董<sup>或ハ越</sup>篤丁<sup>或ハ越</sup>幾<sup>或ハ越</sup>甘

汞等ヲ與ルニ宜シ或ハ亦惡心ヲ起サシメ饑渴  
 ヲ忍ハシムルモ神經衝動ノ偉功アリトス而<sup>レ</sup>先  
 菁硬膏吐酒石膏ヲ外貼シ打膿法<sup>殊ニ頂窩</sup>種疹  
 法<sup>疥癬傳染ノ精神</sup>艾灸法<sup>病自癒ル者アリ</sup>ヲ行<sup>ニ</sup>若ハ烙鐵ヲ  
 頂窩頭上ニ施ス<sup>偶火傷シテ本病</sup>等ノ如キ皮膚  
 ノ刺衝モ亦大ニ宜キ所ナリ總テ軀體ニ疼痛苦  
 楚ヲ起ス者ハ皆此病ニ良驗アリトス  
 其二ハ特効藥ヲ用<sup>テ</sup>腦ノ運營ヲ轉スルニアリ  
 即<sup>チ</sup>實<sup>チ</sup>芟<sup>チ</sup>答<sup>チ</sup>里<sup>チ</sup>斯<sup>チ</sup>。每日三十<sup>ニ</sup>至<sup>ニ</sup>四十<sup>ニ</sup>  
 老利兒<sup>或ハ越</sup>結爾斯水<sup>或ハ越</sup>曼陀羅華<sup>或ハ越</sup>羯布羅等<sup>或ハ越</sup>其最奇功ヲ

夫大貴川

夫

通鑑彙編



奏スル者ナリ殊ニ第五十方老利兒ハ余屢用テ其偉効ヲ實驗セリ若若血脈運營ノ亢盛ヲ兼ル者ハ實芟荅里斯ニ消石ヲ伍シ第五十方用ヒ少量ノ吐酒石ヲ交ヘ與ヘ或ハ冷水ヲ外用シ若ハ之ヲ多量ニ内服一日十六北スルヲ佳トス然凡麻酔藥ヲ用ルニハ最謹慎ヲ加ヘサル可ラス其服量度ヲ過スカ或ハ連用過久ナレハ遂ニ精神病ヲメ痲痺病ニ轉セシムルナリ就中阿芙蓉ハ謾ニ用ヒ難シ壅塞ヲ致シ血液ヲ頭腦ニ上輸スルノ恐アレハナリ唯患者已甚ク衰弱メ

本草綱目卷之八

通鑑

血脈ノ運營已ニ脱却セル者或ハ過酒年ヲ積ミ腦髓衰弊シテ起レル者ノ如キニハ大ニ宜キノ

無形治法モ亦通法ト各法ト二般アリ通法ハ諸精神錯亂ニ普ク通用スヘキノ法ナリ即其第一ハ患者ノ智慧ヲ明ナラシメテ以テ自其頑愚ヲ剋スルニ至ラシムルニ在リ故ニ大ニ教育法ニ關係スルナリ凡無教ノ頑童ハ大率狂者ニ異ナラス其暴恣姦惡魯鈍等ノ頑愚主ト為テ自智慧ヲ蔽フナリ故ニ之ヲ教育スルノ要ハ務テ其智

夫大貴川

十七

適道齋藏



ヲ研テ以テ自<sup>ラ</sup>其愚ヲ制セシムルニアルノミ狂  
者亦之ヲ教テ其智ヲ明ニスレハ其愚自退クニ  
至ルナリ蓋教育法ハ柔順ヲ以テ本トス故ニ此  
患者モ亦柔順ヲ以テ之ヲ教ルノ本トスヘシ夫  
ノ柔順ハ自己ノ私意ヲ抑テ他人ニ從合スル  
ノ常習ト為ル者ヲ云ノミ故ニ既ニ柔順ト為レ  
ハ私意自退テ公道ニ從フナリ是於テ諸事諸件  
巨細トナク專之ニ習ハシムルヲ猶頑童ヲ教ル  
カ如クシ亦且時々其欲スル所ニ悖テ強テ他事  
ヲ命スルヲ宜シトス第二ハ思慮ヲ動サシメ軀

體ヲ役セシムルニ在リ殊ニ開豁氣内ニ運轉セ  
シムルヲ佳トス内部ノ妄想自破レテ神氣宣發  
シ更ニ外物ト交渉スルヲ得ルナリ間暇逸居  
ハ此病ヲ培養スルノ最タル者ナリ強テ作業ヲ  
操シムヘシ但其所業ハ患者ノ才智ト病性トニ  
準テ宜キ者ヲ擇ムヲ良トス第三ハ日課ヲ定メ  
嚴ニ時期ヲ刻メ斷ス外ヨリ使令ヲ加ヘ怠リ有  
ル無ラシムヘシ第四遊劇奏樂等愉快ノ事ヲ以  
テ慰撫スルニ宜シ殊ニ樂器ハ精神ノ變ヲ調フ  
ルノ奇驗意外ニ出ルヲアリ第五之ヲ褒シ之ヲ



貶シ驕恣頑強甚キ者ハ呵嘖叱懲等總テ小兒ニ  
於ルト一般ニ之ヲ待スヘシ第六患者ヲメ醫或  
一人ハ我腹心股肱ト謂シメ其言行皆我為ニス  
ルノ忠實ト信任セシメン<sub>一</sub>ヲ要ス第七<sub>コト</sub>デ  
一<sub>一</sub>ニスチケベギンセルヲ發起セシメテ固<sub>之</sub>ヲ  
守ラシムベシ今此法ヲ末段ニ列スレ臣實ハ無形  
治法ノ冠首タル者ナリ何者是實ニ人ヲメ人夕  
ラシムルノ本原ニメ造次顛沛ニモ其心之ニ係  
著メ動カサル者ナレハナリ故ニ常ニ寺院ニ詣ラ  
シムルヲ佳トス

此段ハ彼教法ニ係ル語多シテ  
解ス可ラス唯其大概ヲ譯ス

其他住地ヲ轉シ居處ヲ變スルモ亦大ニ裨益ア  
リ若其狂躁劇甚ナル者ハ勉テ五官ノ刺衝ヲ避  
ケ強テ自在ノ運轉ヲ抑ヘ或ハ結縛纏包メカラ  
出サシメス或ハ暗室ニ籠テ蟄居セシムルヲ宜  
シトス各法トハ患者ノ性質ニ應シ病證ノ差異  
ニ準テ各之ニ應當スル無形治法ヲ行フヲ謂フ  
即チ傲慢ナル者ハ謙遜セシメ怯心沈黙ナル者ハ  
鼓舞メ發揚セシメ一念不動妄慮偽想等ノ者ハ  
各其性ニ應メ其邪念ヲ絶シメ以テ本心ニ還ラ  
シムル類是ナリ



無形治法固ヨリ實ニ大功アリト雖凡此法ヲ  
行フベキハ罕ナリトス大抵有形治法ト竝ニ行  
ハスンハアラス

凡凡此病ハ甚ク治シ難シ之ヲ算スルニ其治セル者  
大抵四五分ノ一ニ居レリ

依ト昆ト堙ト兒ト  
男子ニ依ト昆堙ト謂ヒ  
婦人ニ依ト昆堙ト謂フ

徵候 百般ノ瘧瘵證神經證交起リ諸證彼此契合  
セスメ屢變革シ非常ノ交感ヲ發シ奇異ノ嗜嫌  
ヲ為シ風氣痞脹酸液鬱滯大便秘結等ノ腸胃證

ヲ兼子喜テ悲涙ヲ流シ嗜テ幽閑ニ居リ常ニ身  
事ト其病トヲ以テ憂トシ獨之カ為ニ神思ヲ勞  
スルト甚クシテ顛沛ニモ之ヲ忘レ難ク奇異ノ想  
像ヲ起シ自大患ヲ抱クトメ藥治怠ルト能ハス  
小心翼トトノ神思樂マス悲哀鬱悶シテ動モスレ  
ハ哭泣シ瘧瘵將ニ發セントスル時ハ必ス小便淡  
白ニメ甚ク頻數ナル者是ナリ

凡凡此病ハ輕證ト雖凡諸證錯雜メ千態万狀ナリ  
重キ者ニ於テハ癩癩卒厥恐水奏漢虞夢中行步  
等ノ險證ヲ起シ或ハ精神錯亂ノ劇證ニ類スル



者ヲ發スルコトアリ然レ其狂證真精神病ニ非ス  
其癲癩亦真癲癩ニ非ス能辨別セズンハアラス  
此病ヲ依ト昆垚兒ト歇以私的里トニ分ツハ唯  
男女ニ就テ其稱ヲ異ニスルノミ決メニ病タル  
ニ非ス但之ヲ焮衝性依ト昆垚兒ト神經性依ト  
昆垚兒トニ區別スルハ治術ニ益アリトス  
其經過甚不定ナリ或ハ數年連綿スルアリ或ハ  
生涯退サルアリ或ハ時ニ間歇メ久ク休息スル  
コトアリ而懼ルヘキノ病ニ非スト雖レ病者ノ為  
ニモ他人ノ為ニモ甚煩ヲ為ス者ナリ故ニ此病

ニ於テハ二個ノ要訣アリ其一怖レサルノ勇ナ  
リ窒息癲癩昏冒卒厥等ノ至險證アリレ依ト昆  
垚兒性ナレハ決メ危篤ノ者ニ非ス其二惑ハサ  
ルノ忍ナリ患者甚麼ノ妄想ヲ為スレ忍テ之ニ  
惑ハサルコト勿ルヘシ

原由 近因ハ腸胃ニ循ル神經變常メ感覺過敏ト  
ナリ以テ非常ノ抗抵ヲ起シ奇異ノ交感ヲ發ス  
ルナリ遠因ニアリ  
其一神經衰弱 凡男女ヲ問ハス過房手淫過慮  
勞思痔血月經ノ過泄刺絡吐下藥ノ過用遷延下



利淋疾帶下。或ハ久シク疼痛ヲ忍ビ或ハ暴ニ體力ヲ勞スル類皆是衰弱ヲ起スナリ  
其二内部刺衝 腹内壅積痔血鬱閉月經不順潛伏伊屈篤虻虫等ヨリ此病ヲ發スル者多シ或ハ病ノ全體唯伊屈篤毒ノ神經ヲ侵襲スルノミニ在テ一朝脚痛ヲ發スレハ諸患乃チ一掃シテ痙攣蟬脫スル者アリ或ハ色情鬱沸スレハ其慾ヲ遂ケス由テ歇以私的里ヲ生スル者少カラス故ニ常ニ稗乘ニ耽リ春盡ヲ弄シテ慾火ヲ煽動スル人及年少ノ娶婦ニ於テ殊ニ然トス或ハ僂麻質

毒疥癬毒等ノ病毒轉徙或ハ黴毒ノ潛伏等ニ起因セル者亦多シ醫能ク意ヲ用テ檢索セスンハアラス多クハ右ノ諸因彼此相合スル者ナリ  
治法 治術ノ要ハ或ハ其遠因ノ刺衝ヲ芟リ或ハ其衰弱ノ原由ヲ除キ或ハ直チニ神經運營調ヲ轉セシメテ以テ神經覺機殊ニ腹部神經ノ過敏ヲ降鎮シ其運營ノ變調ヲ復故スルニ在リ故ニ治法左ノ三則ニ歸ス

第一先其病有形ノ因ヨリ來レルカ將無形ニ生セルカヲ檢スヘシ腹内壅積門脈血鬱滯等ノ有



形ノ因ヨリ起レル者最多シ故ニ之ヲ除クヲ以テ第一トスヘシ其徴ハ坐メ業ヲ操リ黙メ慮リヲ勞シ腹部ヲ壓スル衣服ヲ著シ消化シ難キ食餌ヲ喫スル等ノ病因有テ面色黧淡眼鼻口唇ノ縁ニ黄色ヲ呈シ腹肚痞脹硬滿ス而細ニ之ヲ按スレハ内臟彼此硬固ト為リ或ハ増大セルヲ覺ス食欲乏クメ定度ナク食後胃中煩滿シテ心氣鬱重シ上厠罕ニメ硬屎ヲ下シ或ハ數日秘閉シ若ハ不虞ニ泄瀉シ或ハ痔血ヲ泄シ若ハ痔痛ヲ患フル等其他病ノ經日彌久ナルト強壯藥害ヲ

形ノ因ヨリ起レル者最多シ故ニ之ヲ除クヲ以テ第一トスヘシ其徴ハ坐メ業ヲ操リ黙メ慮リヲ勞シ腹部ヲ壓スル衣服ヲ著シ消化シ難キ食餌ヲ喫スル等ノ病因有テ面色黧淡眼鼻口唇ノ縁ニ黄色ヲ呈シ腹肚痞脹硬滿ス而細ニ之ヲ按スレハ内臟彼此硬固ト為リ或ハ増大セルヲ覺ス食欲乏クメ定度ナク食後胃中煩滿シテ心氣鬱重シ上厠罕ニメ硬屎ヲ下シ或ハ數日秘閉シ若ハ不虞ニ泄瀉シ或ハ痔血ヲ泄シ若ハ痔痛ヲ患フル等其他病ノ經日彌久ナルト強壯藥害ヲ

ナシテ解凝藥効ヲ奏スル類是ナリ腸胃病編印

条及後ニ舉ル痔疾華爾屈篤ノ其治法ハ解凝法ヲ以テ主ト

スヘシ即蒲公英根麻爾羅歇蘆根紫堇薯艸珊篤

里白屈菜等ノ新鮮絞汁或越乳清酒石葉孕鹼酒

石安質沒劑亞兒加利劑就中曹石鹼石灰水硫黃阿魏

護謨安沒尼亞幾朴屈福烏篤等ヲ撰用シ或ハ冷

水ヲ多服シ或ハセルセル水ハシゲル水セド

リセル水等ノ解凝ノ功アル鑛泉ヲ飲シメ仍頑

固ナル者ハ水銀ヲ内服外用セシメ塩酸重土失

鳩荅莨菪盧會格魯莖篤丁幾ブリムメリ散附拔



爾撒謨丸附越栗失爾剝碌布利篤末兒扶斯鎮痛

液名カル、スバットマリエン、バット泉鑛ヲ用ヒ解凝

灌腸法所謂必設刺微温浴殊ニ石鹼等ヲ行フヘ

シ唯之ニ由テノミ本病ノ全治ヲ得ル者アリ是

腹部ノ運營復故スレハ神經ノ運營亦自其平均

ヲ復スルヲ得レハナリ但左件ニ注意セン

ヲ要ス即多血家黑膽液家感動過敏ノ人痔血ノ

患アル者ニハ清涼解凝ノ功アル草根新鮮絞汁

及越幾斯塩類等第二十二方ノ如キヲ與ヘ塩氣ヲ

含ム鑛泉ヲ用ヒ纖維弛緩セル寒粘液質ノ人ニ

ハ第五十三方第五十四方ノ如キ稍熱性ナル解

凝藥ヲ服セシメ血液腹内ニ鬱積セル者ニハ硫

黃劑ヲ用ヒ時々蟻鍼ヲ肛圍ニ貼スヘシ瀉下藥

ハ解凝セスメ却テ其功ヲ妨碍スル一アリ故ニ

下利ヲ要スル者モ唯解凝藥ノ服量ヲ増テ日ニ

一二回ノ通利ヲ得セシムヘシ然レ汚物鬱滯ノ

徵有テ食欲缺損腹部痞滿疝痛等ノ證アル者ハ

下劑或ハ吐劑ヲ投セサル可ラス若夫壅積頑固

ナル者ハ解凝灌腸法前ニ出ツヲ主トスヘク瘕瘕甚

キ者ハ解凝藥ニ鎮瘕藥ヲ配用シ衰弱甚キ者ハ



苦味強壯藥鐵劑及鐵氣ヲ含ル鑛泉ヲ兼用スヘ  
 シ病ノ季期ニ在テハ其壅積多クハ唯衰弱ニ係ル  
 ラ以テ殊ニ之ヲ宜シトス而騎馬等肢體運轉モ  
 亦欠可ラサルノ一良法ナリ唯之ニ由テノミ其  
 壅積間自疏解スルコトアリ且早旦空心ニ腹部ヲ  
 摩擦スルモ亦大ニ佳シ

自餘伊屈篤、倭麻質、瘰癧、疥癬、黴毒、蛔虫等ノ有形  
 ノ因ヨリ来レル者亦少カラス能ク之ヲ檢査ノ  
 各應證ノ治法ヲ行フヘシ

第二他因ナクシテ唯衰弱ノミニ起因セル者ハ

之ヲ單純神經性依ト昆垓兒ト謂フ帶下淋疾下  
 利遺精失血崩漏下劑解凝藥ノ過用等ノ如キ衰  
 弱ヲ起スノ原由有テ弱脈疲勞體温寡少等ノ衰  
 弱ノ諸證具リ且有形ノ病因更ニ之ナキ者是ナ  
 リ此證ハ唯其衰弱ノ起因ヲ除クヲ以テ專務ト  
 スルノ外他策アル者ニアラス故ニ下利淋疾帶  
 下遺精等ノ治法ヲ行ハサルヘカラス就中遺精  
 ハ此證ノ因ト為ルコト多シト雖陰部ノ衰弱多  
 ハ其感動過敏ヲ兼ルカ故ニ尋常ノ強壯滋補藥  
 ハ益刺衝ヲ起シテ液ノ輻湊ヲ進メ以テ愈遺泄



ヲ促スノ恐アリ宜清凉ヲ兼ル強壯收瀋滋養ノ劑ヲ撰用スヘシ即收斂亞的兒第五十方明礬百藥煎第五十六方等ヲ與ヘ諸刺衝起熱ノ食料ヲ禁シ筋ノ運轉ヲ避ケ以テ漸ク過敏ノ感覺鎮靖スルヲ俟テ幾那括失亞格綸僕鐵依蘭苔傑列乙等ヲ用ヒ總身局處ノ冷浴法ヲ行ヒ陰部會陰薦骨上ニ冷滴浴ヲ施シ脊椎下邊ニ強壯藥ヲ塗擦シ海水ピロモントドリビルグ共ニ鑛泉等ニ浴セシムルヲ佳トス

第三 神經運營ノ調ヲ轉シ且之ヲ強壯ニスルノ

法アリ單純神經性依ト昆垓兒形無ニハ固ヨリ終始此法ヲ行テ全功ヲ遂ヘク有形依ト昆垓兒モ亦有形治法ニ兼テ之ヲ行ハン一ヲ要ハ所謂轉調治法オムステムメンゲ子スウイセデハ神經ノ變調ヲ復シテ總身殊ニ消ノ感覺過敏ヲ鎮靖スルニ在リ其感覺過敏ト之ニ兼ル所ノ衝動トヲ鎮靖スレハ自強壯ノ功用ヲ為スナリ故ニ感動過敏ノ患者ニ於テハ此法乃無比ノ強壯治法トナル而其治法ハ唯鎮痙藥ヲ用ルニ在ルノミ即續艸橙葉橙皮水楊梅葛私多僕謨瓦爾拔奴謨收斂亞的兒



忽弗滿鎮痛液阿魏磷酸等ヲ與ヘ單微温浴或ハ  
 神經強壯藥ヲ加タル浴法ヲ命スル等ナリ蓋シ  
 此病ハ唯此類ノ緩性藥ヲ久ク數連用ノ非常ノ  
 大効アル者ナリ唯生橙葉二枚ヲ浸劑トシ日々  
 朝暮ニ冷服シテ奇驗ヲ得タル者多シ予ハ實驗  
 ニ據テ橙葉續草默栗薩水楊梅ノ泡劑第五十方ヲ  
 製シ唯之ノミヲ久服セシメテ全功ヲ收メシ者  
 少ナレトセト總テ依ト昆垚兒歌以私的里ノ治  
 法ニ於テ最缺ク可ラサル者ハ神經運營ノ平均  
 ヲ復スヘキナリ覺系ト動系ト平均ヲ失フ者殊ニ多ニ居ル故ニ諸筋

ヲ運轉シ微温浴ヲ行ヒ郊外ニ散步シ山野ニ旅  
 行シテ開竅氣中ノ生氣ヲ引キ以テ神經ヲ活潑  
 舒暢セントヲ要ス凡外氣ニ浴スルトハ神經虛  
 衰家ニ無比ノ強壯藥トナル者ニメ什麼ノ患者  
 タリト更ニ忌ム可キ者アルトナレトス真ノ強  
 壯治法ハ始ヨリ轉調治法ト兼行フヘキ者素之  
 アリ假令否ラサル者モ必之ヲ本治法ノ結局ト  
 ナス可シ是此病ハ荏苒日ヲ延テ自衰弱ヲ致ス  
 カ故ニ其終リ必強壯法ヲ以テ其全治ヲ固定シ  
 再發ヲ預防セサルヘカラサレハナリ然レ氏強壯



法ヲ行フニハ患者感動ノ銳鈍ト腸胃汚物ノ有  
無ニ注目セントヲ要ス若夫感動過敏ノ患者ニ  
誤テ初ヨリ保固收瀦ノ強壯藥ヲ投スル時ハ藥  
液消化セス胃中ニ停滯シ困重煩悶痙攣等ヲ起  
シテ食欲ヲ減シ強壯ノ功ヲナサスメ却テ衰弱  
ヲ来スナリ故ニ其感動ト藥力ノ強弱ト斟酌シ  
テ撰用セスンハアラス血脈過敏ノ者及血液鬱  
滯ニ傾ク者ニ於テハ殊ニ然トス是等ノ患者ニ  
ハ先<sup>ッ</sup>收斂亞的兒ヲ連用スルヲ宜シトス若此藥  
モ仍<sup>ホ</sup>其刺衝ノ過ルトヲ察セハ燐酸ニ續艸橙葉

著艸ヲ伍シ用ニ微温藥艸浴ヲ行ヒ而後徐ク少  
強キ苦味收瀦藥ニ移ルヘシ腸胃汚物未<sup>ク</sup>全ク脱  
セサル者此患者皆衰弱ヲ兼ルカ故ニ全ハ先<sup>ッ</sup>蒲  
公英著艸珊<sup>ト</sup>篤里睡菜麻爾羅歌ノ浸劑及越幾斯  
等ノ如キ純苦味藥ニ少<sup>ク</sup>解凝ノ功アル品ヲ撰  
用シ次ニ亞爾鮮格綸僕括失亞冷浸ヲ殊ヲ與ヘ  
或ハ之ニ大黃孕鹼酒石ヲ配用シ而後徐ク幾那  
橙皮鐵葛斯加栗刺鐵氣ヲ含メル鑛泉等ニ轉ス  
ヘシ但<sup>シ</sup>此諸藥モ仍<sup>ホ</sup>始<sup>メ</sup>ハ揮發製法ノ者ヲ用フヘ  
シ即幾那ノ如キハ初<sup>メ</sup>乙篤幾那丁幾ヲ良トシ



鐵ノ如キハ先末兒扶斯鎮痛液第五十方 礪鐵華礪

泉等ヲ用ヒ浴法モ始ハ強壯藥草浴次ニ鐵浴一

ニ撒兒未兒扶斯 又次ニ川水冷浴海水冷浴等ニ

移ルヘシ浴法ノ此病ニ於ル其効大ニ内服藥ニ

優ル<sub>一</sub>アリ若夫神經感覺甚タ過敏ニノ極テ緩

弱ノ藥モ非常ノ刺衝ヲ起ス者ハ神思ヲ安靜シ

支體ヲ勞動セス諸刺衝ノ品ヲ避ケ神經ヲ感攪

スル者ハ悉之ヲ禁絶シ居ヲ田舎ニ移シテ養ヲ

乳汁ニ資ルヨリ強壯ノ功ヲ為ス者ナレ是ヲ涅

瓦扶歇強壯法ト謂フ涅瓦扶歇ハ虛無ノ義又奪却ノ義ナリ 凡強壯

法ヲ行フニ當テハ殊ニ嚴ニ食規ヲ守ラシムル

一喫緊ノ要務トス即茶骨喜等ノ熱服ヲ禁シ植

物類就中葱燕類ノ消化シ難クシテ風氣ヲ生シ易

キ食物ヲ避ケ總テ食量ノ度ヲ節セシムヘシ是

此病ハ胃中停滯ヲ致シ易ク停滯スレハ吐下藥

ヲ用ヒサルヘカラスメ之ヲ用フレハ必強壯治

法ノ功用ヲ退却セシムレハナリ

姑息治法ハ依ト昆垓兒ニモ歇以私的里ニモ共

ニ欠ク可ラストス此病素ヨリ神經ヲ鎮靖スル

ヲ以テ治法ノ本旨トスルカ故ニ當ニ其急苦ヲ



輕快セシムルノミナラス亦大ニ其本治ヲ扶ク  
 レハナリ而此患者ノ每常苦ム所ノ最ナル者ハ  
 痙攣便秘酸液鬱滯風氣痞脹ナリ故ニ鎮痙藥制酸  
 藥驅風藥疎滌藥ヲ必需ノ姑息藥トス所謂依ト  
 昆垓兒散麻瘋涅夫亞孕礬酒石大製蓋茲ニ原  
 クナリ其他灌腸法阿魏一二錢刺比亞護謨ヲ  
テ諸患下チ一脚浴法ヲ行ヒ忽弗滿鎮痛液葛私  
 多ト儂謨續艸丁藥鹿琥液阿魏等ノ鎮痙藥ヲ用ヒ  
 鎮痙軟膏ヲ胃部脊椎ニ塗擦シ昏冒スル者ハ香  
 竈水ヲ以テ前額顛顛ヲ洗ヒ或ハ鼻前ニ羽毛ヲ

焚キ葱根ヲ割テ之ヲ嗅シムル等皆偉効アリ此  
 病ハ患者ノ覺機種々變易セル者相集テ一異性  
 ノ證ヲ為スヲ以テ鎮痙藥ヲ合用スルニハ殊ニ  
 之ニ注目セン一ヲ要ス麝香ノ如キ佳香ノ品モ  
 歌以私的里家ハ多ク之ヲ嫌フ者アリ阿芙蓉ハ便  
 秘ヲ起スノ害有テ患者之ニ慣レ易ク且連用ス  
 レハ遂ニ之ヲ欠ク一能ハサルニ至ル故ニ已ム  
 一ヲ得サルノ時ニ非レハ妄ニ與フヘカラスト  
 ス唯普ク用テ無危ノ品ハ菲阿斯ナリ便秘ノ患  
 ナク起熱ノ恐ナク殊ニ情意ヲ鎮靖スル一ト大ニ

夫大貴川 卷之八 三十 通通齋歲



阿芙蓉ニ優レシ諸神經證等ク皆神經衰弱ニ出  
ツト雖モ多血或ハ血脈ノ感動過敏ヲ兼ル者ア  
リ鑒別セサル可ラス是ノ如キ者ハ諸熱性ノ鎮  
痙藥刺衝藥ヲ禁シテ亞鉛華ホネ菲阿斯ラウ老利兒ル結爾  
斯水甘消石精等ノ如キ清涼鎮痙藥ヲ與ヘ芥子  
泥等ノ反對刺衝法ヲ施シ脚浴灌腸法ヲ行フニ  
宜シ瀉血殊ニハ單純神經性ノ者殊ニ私的里家ニ甚  
害アリ誤テ之ヲ行ヘハ諸證ヲ劇發シテ危險ニ  
陷ルトアリ慎サル可ラス凡レ依ト昆垚兒歌以私  
的里ノ劇證ハ少年ノ徒未熟ノ輩ヲメ大ニ疑惑

ヲ生セシメテ困厄セシムルト少ナカラス乃チ或ハ  
眩暈下卒厥ニ轉シテ數時數日依然トノ省覺セ  
ス或ハ咽喉絞窄證ヲ發シテ數時間呼吸窒絶シ  
或ハ搐掣シテ全癲癇ニ類スルノ證ヲ起シ或ハ  
胸内腹中ノ一處ニ劇痛ヲ發シテ動輒モスレハ  
局處ノ焮衝ト誤認スルトアル等ナリ精細ニ診  
察シテ純一ノ痙攣證タルトヲ鑒定シ以テ他病  
ト區別セントヲ要ス其微小便灰白ナルト尿意  
頻數ナルト咽中彈丸ヲ挿ムカ如キヲ覺ユルト

所謂梅核氣 喜テ涕泣スルト從來歇以私的里證アル



ト諸證ニ較著ノ因ナキト熱ヲ帶ル<sub>一</sub>ナキト是  
ナリ若能ク他病ニ非ル<sub>一</sub>ヲ認得<sub>レ</sub>ハ乃<sub>チ</sub>危險ノ  
恐<sub>レ</sub>ナシ前ニ掲クル諸法ヨク之ヲ治ル<sub>一</sub>ヲ得<sub>レ</sub>ハ  
シ然<sub>レ</sub>氏患者壯年ニメ多血ナルカ或ハ出血抑遏  
セル者ノ如キハ諸證留連スルニ隨テ貴要ノ部  
ニ危險ノ血液鬱積<sub>ノ</sub>卒中<sub>ノ</sub>類<sub>ヲ</sub>致ス<sub>一</sub>アリ獨<sub>リ</sub>此證ハ  
刺絡シテ其危害ヲ免<sub>レ</sub>シムル<sub>一</sub>緊要ナリ

扶氏經驗遺訓卷之八終





