

1448
8



扶氏經驗遺訓卷之九

足守

緒方章公裁

義弟郁子文

全譯

西肥

大庭志

景德

參校

其二瘧性病

「カラムプアグチ
グシキーテン」

總論

動機覺機ヲ問ハス凡、神經ノ運營亢盛セル者常
調ヲ變セル者總テ之ヲ瘧性病ト謂フ其侵ス所
ノ器各異ナルニ随テ現ル、所ノ證百般ナリト
雖氏素は一轍ノ神經病ナルカ故ニ治法亦少差

扶氏經驗遺訓卷之九

適齋藏



91-1905

アルノミニニメ皆一轍ニ歸ス

癩癩 「エ」レ「ピ」シ「ア」ル「フ」アル
レ「ン」デ「シ」キ「テ」蘭

徵候 搐搦シテ人事ヲ省セス叫號シテ顛仆シ口

ニ泡沫ヲ吐キ緊ク拇指ヲ掌中ニ盤屈ス 餘指仍
掣引動

揺シテ拇指ノ筋獨 リ 直緊張ヲ致ス 而其搐搦微ナリト雖氏人事

ヲ失フ者ハ皆之ヲ癩癩トシ諸證暴劇ナリ氏仍

能人事ヲ省スル者ハ之ニ算入セス

其病タル必時有テ發作ス而其發作二期アリ搐

搦期ト昏睡期ト是ナリ其搐搦期短キハ一二密

扭寫ニメ止メ氏長キハ一二時ニ至ル而其發ス

ルニ毫毛前徴ナク忽焉トメ叫號シ倒ルハ一恰

毛雷火ニ中レルカ如キ者アリ或ハ煩悶頭痛惡

心等ノ前徴有テ而後ニ發スル者アリ其奇異ナ

ル者ハ所謂覺風癩 「ア」ウ「ラ」エ「ピ」
レ「ア」ウ「チ」カ ナリ其始凜然タ

ル微風ノ感ヲ手指頭若ハ足指端ニ覺エ其感覺

漸ク上攻シ來テ腦内ニ達スレハ輒卒然トメ顛

倒ス或ハ又此證五官ノ一ヨリ始ル者アリ即先

異臭異味異色複視等ノ感覺有テ而後乍チ本證

ヲ頓發ス

其發作正ク時日ヲ刺スル者或ハ毎夜一アリレ氏多ハ定ル時刻ナクシテ每週毎月或ハ毎年一發シ或ハ二發ス

其終始甚不定ナリ生涯連綿スル者少カラス且其病タル甚治シ難シト雖氏死病ニ非ス唯顛仆ノ毀傷スルト有ルカ為メニ危險トスルノミ而介者ノ為ニハ甚困難ニ人ノ嫌疑ヲ起シ易ク且傳染ノ恐ナキニ非ストス

其治癒スル者二十人ニメ一人ニ過キス死スル者ハ甚罕ナリ其終精神衰弱痴呆發狂水腫消削

病等ニ轉スルヲ常トス

原由 近因ハ神經系運營ノ常調ヲ差フト最モ甚

キ者ニメ皆必腦中ニ在リ蓋其動機ヲ司ル部ニ即延髓ニアリトス

自餘播擲病其近因脊髓中ニアリト異ナル所以唯茲ニ在

ルノミ且此病ヲ患ヒテ死セル者ヲ解觀スルニ

必器質ノ變アルヲ見ズ故ニ器質ノ變ハ適此病

ノ遠因ヲ為セルトアリ氏決メ近因ト為ル者ニ

非ス而メ神經病常因總論ニ出ツノ他遺傳素質神經

衰弱房事過度驚駭劇甚或ハ他人ノ癩癩證ヲ視

テ深ク之ヲ感セシ等或ハ蛔蟲條蟲腸胃汚物腹

内壅積内臓閉塞等。或ハ病毒ノ轉徙。殊ニ疥瘡類形
器性ノ刺衝物。骨片或腐骨ノ嵌入出血ノ閉止。殊ニ衄血等皆此
病ノ遠因ト為ル尚且、本病久ク留滞スレハ神經
ニ此異常ノ運営ヲ起スヘキ常習ヲ得ルモ亦遠
因ノ一ニ屬ス

治法 根治法左ノ四件ニアリトス

第一遠因ヲ蹤跡メ之ヲ除祛スヘシ唯之ヲ除ク
ノミニメ全功ヲ收ル者甚少カラズ其一。腹内刺
衝。虫病。腹内壅積。内臓閉塞。ナリ此證ハ解凝藥ヲ久服セシメ
テ八日毎ニ吐法ヲ行ヒ頑證ニ於テハ尚盧會甘

汞蘇甘沒扭謨格碌莖篤丁幾等ノ峻下藥ヲ少量
ニ與ヘ解凝灌腸法ヲ施スヘシ。一年間此灌腸法ヲ連施シテ全治セラル者予自其二。多房手姪ニ由レル衰弱ナリ此
證ハ神經勞。脊髓勞ノ治法ヲ行フヘシ殊ニ幾那
ヲ末服セシメ鐵劑ヲ用フルヲ良トス其三。疥癬
毒轉徙。神經ヲ襲フ者ナリ此證ハ硫黃水銀安質沒扭朴
屈福烏篤脂薩爾沙蜀羊泉等ヲ内服セシメ硫黃
浴ヲ行ヒ久ク打膿法ヲ施スニ宜シ

第二體內ニ他患有テ此病ヲ媒起シ且留連セシ
ムルヲアリ詳ニ檢メ之ヲ芟ルヘシ就中血脈ト

神經ト對稱ヲ違テ然ル者ヲ多シトス少年多血
家及痔血月經閉止ノ者ニ於テ屢アル所ナリ此
證ハ榮養ヲ減シ睡眠ヲ省キ肢體ヲ運轉シ淡薄
ノ植物ヲ食料トシ六週或ハ八週毎ニ刺絡ヲ行
ヒ二週毎ニ下劑或ハ^ビットルワートル^ル泉一罇ヲ
與ヘ打膿法ヲ施シ痔血ヲ呼導シ月經ヲ催起ス
ヘシ若之ニ及メ諸液脫泄ヨリ起レル者ハ素ヨ
リ滋養強壯ノ治法ヲ行フヘシ

第三前二段ノ治法効驗ナク或ハ其遠因ノ徵ス
ヘキ者ナキハ直治法ヲ行フヨリ他策ナシ即直

ニ神經上ニ掙北メ其調ヲ轉シ其變ヲ復ス可キ
ノ治法ナリ所謂治癩藥ナル者甚多シト雖^レ予
自用テ偉効ヲ得シ者六種アリ亞鉛ト銅ト纈草
ト橙葉ト幾那ト頭上ノ灌水^{或海}ト是ナリ而就
裡亞鉛ヲ最偉効アリトス宜ク多量ニ服メ久ク
連用スヘシ則^テ丸藥ニ造^テ第九^方五十始朝夕一^丸宛
用^ヒ隔日毎ニ半^丸ヲ增加メ惡心ヲ起スニ至リ
是ニ於テ其量ヲ減ス斯ノ如クスルキハ十^丸乃
至二十^丸ニ至ル^レ疴害アル者ニ非ス頑證ハ半歲
若ハ周歲之ヲ連用シ輕證モ毎月二週間連服ス

ルヲ佳シトス或ハ第六十方ノ如ク他ノ諸藥ヲ
 合スレハ殊効アリト云續草ハ第六十一方ノ如
 ク續草油ヲ加ヘ用フヘシ大ニ其功カヲ増スナ
 リ橙葉其末四錢橙葉泡劑ヲ以テ送下スル一日ニ三次ナルヘシ殊ニ過房
 手淫等ニ起因セル者ニ奇効アリ又艾根末至一錢
 温タル麦酒ヲ以テ每晚頓服シ次テ發汗スルモ
 亦良驗アリ「ラゴロセ散」未詳モ亦然リ頑證ハ謹慎
 ヲ加ヘテ銀礬第六十方ヲ用フルモ亦良シ唯服後
 患者ノ皮膚黒色ト為ルヲ惡ムヘキノミ其他良
 若ヒオス菲ヒオス阿斯ヒオス雙鸞菊ヒオス實ヒオス芟ヒオス答里ヒオス斯ヒオス蔓陀羅ヒオス華等ノ麻醉

藥獨阿芙蓉ハ血液ヲ腦ニ上輸セシメテ卒中ヲ起スノ恐アリ用フヘカラスモ亦用
 フヘシ但此諸藥ハ服量強カル可ラス連用久シ
 カル可ラス本病ヲメ痴呆ニ變セシムレハナリ
 自餘實百兒油加耶普的油燐水銀佛甲草ホミト
 リアカレウムリュテウムフラテシスセタキム
 ニユカ未詳越列キテ兒テ艾灸法或ハ烙鐵ヲ頭蓋
 骨上ニ施ス等ヲ稱用ス凡右ノ諸藥按ニ麻酔藥ヲ除クノ他
 ハ久ク連用センテ要ス唯其發作ノ歇ムノミ
 ナラス神經ノ常習ヲ脱却シテ其素因ヲ消滅ス
 ルニ至ラスンハアラス故ニ數月連用メ其發作

夫大遺訓 卷之九 六 通通齋藏

全ク治ス氏仍^ホ一二年間其効驗アリシ所ノ前藥ニ幾那ヲ加ヘテ毎月二週間之ヲ用フルヲ佳トス世間ノ癩癩一旦治スル^ト有ルモ久ク保續スル^ト能ハサル所以^ニ皆此則ヲ守ラサルニ在ルナリ

第四石件ノ治法皆功ナキ者ハ皮疾種法疥癬ヲ佳トス

或ハ痔血呼法ヲ行^テ以テ人為ノ分利ヲ起ス^トヲ試ムヘシ

姑息法ハ唯其發作ヲ預防スルニ在ルノミ故ニ前徵アル證ニノミ之ヲ行^フ得ヘシ其最効

アルモノハ吐藥鹿琥液實百兒油ナリ又艾根末一錢温タル麥酒ヲ以テ送下シ直^ニ蓐ニ就クヲ佳トス夫覺風癩ノ如キハ手足ノ關節ヲ緊縛シテ神經ヲ遮止シ以テ其感覺ノ腦ニ輸^ルヲ防クヘシ故ニ此患者ハ常ニ螺旋ヲ具ヘタル革帶即ニ螺旋ヲ振轉シ以テ緊縛スルヲ良トス其既ニ發作スルニ及テハ唯靜ニ軟蓐ニ卧サシメテ其痙攣ヲ安カナラシメ以テ毀傷ノ患ナカラシムルノ外他技無シトス何者此時ニ方テハ口物ヲ

嚙下スルヲ能ハス灌腸藥モ内ニ入ルヲ能ハス
或ハ之ヲ注入スルヲ得ルモ直ニ流出スル者
ナレハナリ

舞蹈病

コレア「羅」ストフイ
モスダン「ス」蘭

徵候 一部或ハ總身ニ不隨意ノ運動ヲ發シテ其
運轉患者平素慣ル、所ノ動作ヲ擬シ且動モス
レハ彼此其部位ヲ轉換シ而能ク人事ヲ省ス是
癲癩ト異ナル所以ナリ此病輕重甚差異アリ或
ハ唯肘顔舌等ノ一部ニ之ヲ發スルアリ發歇ス
ル口吃

ノ類之
ニ屬ス

或ハ半身ニ發スルアリ或ハ時ヲ定テ發
歇スルアリ或ハ常ニ留連メ睡中ノミ休止スル
アリ或ハ暴劇ナル奇異ノ運轉ヲ起スアリ即數
時間跳躍シ疲勞ヲ極テ而倒仆シ或ハ偏足ニ據
テ劇ク全軀ヲ旋轉シ或ハ高ク上ニ飛揚シ或ハ
遠ク前ニ跳進ス其最甚キ者ハ所謂奔癡「ロー」
「カ」
「ラ」
「ム」
「プ」
是ナリ患者ノ足脚能ク其意識ニ逆テ其體ヲ
擔ヒ去リ馳驅スルヲ數時自佇立スルヲ能ハス
其終リ轉倒メ始テ自止ムノニ此病ハ身體方ニ
長成スルノ時七歳ヨリ十六歳
ニ至ルノ年齢ニ最多ク發ス而

ハサル者は是ナリ體軀精神共ニ其發作ノ時ノ態
ヲ保テ省覺ノ時ニ至ルマテ渝變セス四肢位置
ヲ易ヘス精神思フ所ヲ改メス内識潜蟄ノ明ニ
人事ヲ省セス恍惚トメ夢中ノ如シ但榮養ノ諸
機ハ依然トメ妨アルナシ而其發作數密扭篤
ニメ止ム者アリ或ハ數時數日留連スル者アリ
其解スル時ハ恰モ熟眠ノ醒覺セルカ如シ其發
作中或ハ奇異ノ交感驚怪ノ觸覺ヲ起スアリ
例スルニ心窩或ハ足心ヲ以テ事物ノ聲音ヲ聽
取スルアルカ如シ蓋古來愚民ノ鬼魅附憑等



ノ説ニ惑亂セル基源ハ皆此病及癲癇舞蹈病顛
狂等ニアリシノ正之ヲ觀テモ醫術ノ世ニ鴻益
アリシ鮮カラサルヲ知ルヘシ乃彼惡魔ノ所
為ナリトセシ者ヲ以テ神經病ノ作用トシ其藥
方ヲ處シテ之ヲ平康ニ復セシメ以テ其感氷釋
スルヲ得シニアラスヤ

原由 近因ハ精神ト神經ト睡眠ニ等キ一種ノ變
調ヲ得テ體軀ト精神ト其交通ヲ遏ムル者ナリ
故ニ次条ノ夢中行歩ト大ニ異ナラス蓋此病ハ
運化神經系ノ變ニ關ルナルヘシ遠因ハ癲癇舞

踏病ニ異ナラスメ就中歌以私的里及婦人ノ過慮勞思手姪色慾意ヲ遂サル類或ハ病毒轉徒蛔蟲等ナリ

治法 總テ神經病ノ治則ニ準ヒ其遠因ヲ蹤跡メ之ヲ除祛スヘシ直治法ハ亞鉛。纈草。幾那。橙葉。散シ或ハ浸劑トス。冷浴法。開竅氣。及強キ力作運轉等最功アルヲ余カ自ラ實驗スル所ナリ麻僣マケン。涅扶斯ニエフス。繆私ミウシ。磁石カヲ用ル磁石ノ療法モ亦此病ニ偉効アルヲアリ

夢中行歩ドムナムビリスミス。スライプワンデレスロ。ン

徵候 睡中聽言行歩等ヲ為スト恰醒覺セル時ノ

如クニメ辨識ナク醒覺セル時ノ辨識ニ非ルヲ云フ其睡中ニ為

ル所ノ諸件寤テ後一モ想記スルトナシ此病輕

重甚差等アリ其輕キ者ヲ云ハ尋常ノ夢ナリ其

次ハ嚙語ナリ其次ハ能聽テ能應答スルナリ其

次ハ立テ徘徊シ或ハ物ヲ操作スルナリ其最甚

キハ眼視明亮ニノ内外神識非常ニ過敏ナルナ

リ而諸證秦漢ハン虞グト能相肖似シ且互ニ相轉換シ

易シ凡此病ハ小兒幼年ニ固有ノ者トス或ハ生

涯之ヲ患ル者アレ氏多ハ年齡ノ長スルニ随テ

自癒ルナリ然其發作月ノ盈虚ニ準フ者多シ故
ニ或ハ其患者ヲ稱メ「隨月患」者ノ義ト
云フ凡此病ハ唯煩ハシキノミニメ危險ニ陷ル
者アルナシ然_レ氏其夜中奔走ノ際危難ヲ受ル
ノ恐レナシトセス

原由 近因ハ想像カト外識ト睡中ニ發動スルナ
リ蓋此病ハ腹部ノ神經系運化神區域ニ在ル者
ニメ其系ノ運營過越シ腦神經ノ辨識思慮ヲ致
スノ運營ニ勝テ其權ヲ擅ニスルナリ而生殖器
ノ運營モ亦大ニ之ニ關係ス何ノ為ニ此說アル
カ譯者其理ヲ詳ニ

スル故ニ此病ハ男子ヨリ婦人ニ多シ遠因ハ
ヲ得ススル故ニ此病ハ男子ヨリ婦人ニ多シ遠因ハ
舞蹈病ニ異ナラスメ少年ノ發生期腦ノ血液鬱
積及_レ蛔蟲等殊ニ其因トナル近年麻_子濕_子扶斯法
磁石カヲ用ル一種ノ法ヲ施シテ此病ヲ起サシ
ニメ未_レ之ヲ詳ニセスムル_一ヲ發明セリ故ニ方今之ヲ自然證ト人爲
證トニ區別ス

治法 舞蹈病秦漢虞ノ治則ニ準_レ總テ神經病ノ
通法ヲ用フヘシ預防法ハ其將ニ發セントスル
ニ先テ患者ヲ束縛シ或ハ冷水ヲ器ニ盛テ其牀
頭ニ置キ起立スルニ方テ之ヲ踏テ忽チ醒覺ス

可ラシムヘシ

魔不寤 「エピアルテス」又「インキヒ」
「ハロ」ナグトメルリ「蘭」

徵候 睡中上腹ニ甚キ壓重ヲ覺エテ呼吸ヲ妨ケ
苦悶ヲ起シ犬熊妖怪盜賊刺客等ノ来テ侵襲ス
ルカ如キヲ見之カ為ニ頻ニ動カントシ急ニ立
ントシ早ク救ヲ呼ントスレモ能ハス困極ノ至
リ大抵叫聲ヲ發シテ始テ醒覺シ以テ其苦楚ヲ
免ルナリ此證ハ通例睡著後半時許ニ起ルヲ
常トス而健全ノ人ニ於テハ罕ニ有ル所ナレモ

或ハ殆毎夜之ヲ發スル者アリ此ノ如キハ其睡
眠ヲ妨クルニ由テ其害全軀ニ及ハサルヲ得
ス

原由 近因ハ上腹神經ニ一種痙攣様ノ感動有テ
腦ニ交感ノ作用ヲナスナリ其遠因三種アリ第
一ハ晚飧過量風氣鬱蓄等ノ如ク胃ヲ膨脹充實
セシメテ形器様ノ壓迫ヲ為スニアリ第二ハ總
身若ハ一部腹ノ多血ニアリ第三ハ仰卧ニ由テ
血液或ハ風氣ノ上腹ニ鬱積スルニアリ

治法 其誘因ヲ除クヘシ即總身局處ノ多血ヲ退

ケ風氣ヲ驅散シ大便ヲ通利シ晚餐ヲ減シ仰臥ヲ避ル等はナリ

不寐 アグリプニア ペロースヘイ ドスラ スラ

徵候 體中別ニ疾病ナク又内外安眠ヲ妨クヘキ

ノ事故ナクシテ寐子難キ者はナリ 他病ノ傍證ニ非ルヲ云

此病ハ甚ク患者ヲ苦メテ累月或ハ數年留連シ

以テ終ニ衰弱虚脱ヲ致シ體內ノ諸機ヲ支ヘ精

神ノ運營ヲ害スルニ至ル而其證或ハ時ヲ定メ

テ發歇スル者アリ 例スルニ隔夜之ヲ發スル類ナリ

原由 或ハ神經ノ感動過敏ヨリ来リ 故ニ神經熱

後之ヲ患ル者多シ 或ハ精神ノ潜伏刺衝 勞思苦心七ヨリ

来リ或ハ腹内神經系ノ刺衝ヨリ来ル

治法 其原因ニ注目メ之ヲ除クヘシ血液鬱積大

便秘閉印華爾屈篤等ノ腹内刺衝ヨリ来ル者ヲ

殊ニ多シトス其他臨卧ニ微温脚浴若ハ全身浴

ヲ行ヒ或ハ一二匹ノ菲阿斯葉 或越 幾斯 ヲ臨卧ニ服

セシメ 阿芙蓉ヲ用ル 或ハ菲阿斯膏 或越 幾斯 ヲ顛顛

ニ貼メ良驗アリ若其人多血ナラスメ虚弱ナル

者年老ナル者ハ經久ノマラカウエイ 酒一盞ヲ

用ヒテ甚佳ナリ

刺發尼亞シローキテ蘭

徵候 搐搦痙攣劇烈ニメ奇痒ヲ覺エ或ハ劇痛ヲ
兼ル者是ナリ此病死スル者罕ナリト雖氏多ハ
慢性神經病精神錯亂消削病等ニ轉移ス

原由 多量ニ麥奴ヲ混シタル蒸餅ヲ久ク連用セ
ルヨリ發ス是故ニ此病ハ雨濕多シテ麥穀變性
ヲ為セル年ニ多ク或ハ一地ヲ限テ流行シ或ハ
諸州一般ニ流行ス

治法 先吐劑ヲ與ヘテ次ニ下劑ヲ用ヒ且阿芙蓉
半匁ヲ孕礬酒石ト伍シテ一時半毎ニ服セシム
レハ其治速ニメ其功亦必スヘシ而四肢ノ痙攣
劇痛ハ之ヲ逆壓シ或ハ緊ク束縛シテ靜止スル
トヲ得ヘシ

顫震ドレモル羅

徵候 一部或全身ニ發スルノ顫震其強弱微甚一
様ナラス甚キニ至テハ真ニ搐掣シテ四肢ニ劇
キ不隨意ノ運轉ヲ起ス者アリ即手ヲ以テ已ラ

打擲シ足ヲ以テ物ヲ踢倒シ或ハ掉頭跳躍等舞踏病ニ類似スル一アリ唯其運轉瘧性ヲ帶フルト節態ヲ致サ、ルトヲ以テ舞踏病ト區別スヘキノ此病他病ノ傍證ナラスメ神經ノ衰弱ヨリ起ル者本病ハ治シ難シトス

原由 衰弱多血。慄悍飲液燒酒。骨ノ過用。病毒ノ轉

徙殊。伊。儼。篤。等此病ノ常因ナリ或ハ又卒中。神經熱。

水銀毒。砒石毒。鉛毒等ノ傍證若クハ續證トシ發

メ終ニ本病ニ轉シ以テ久ク留連スル者アリ

治法 他ノ瘧性病ニ同シ若夫金石毒。病毒轉徙等

ニ起レル者ハ各其治法ヲ處スヘシ純粹神經性

ノ者本病ハ其病。脊髓ニアル者多シ亞鉛。番木鱈。蔓

陀羅華等ノ如ク脊髓ニ功ヲ為スノ品ヲ撰用シ

鐵浴冷浴ヲ行ヒ越列幾艾灸法附ヲ脊髓ニ施シ

血液鬱積ノ候アル者ハ蟻鍼ヲ貼スヘシ

身體強直テタニ。ハ。羅。レ。グ。ト。ス。テ。ロ。コ。グ。ヘ。イ。ト。蘭。

附 牙關緊急チリス。ニ。ハ。蘭。シ。ド。ケ。レ。ハ。蘭。

徵候 一筋若ハ諸筋一齊ニ瘧シテ持續スル者

是ナリ其一筋瘧セル者ハ舌硬。布里亞昆私繆

斯陰莖勃起者等ノ如シ諸筋一齊ニ痙攣セル者
 ハ其證狀一ナラス或ハ身體直伸メ強硬シ動力
 サルアリ或ハ前ニ屈スルアリ或ハ後ニ反スル
 アリ而其病稽留スル者アリ發歇スル者アリ急
 性ナル者アリ慢性ナル者アリ
 其經過種々ニメ一様ナラス急性ノ者ハ大抵三
 日ヨリ七日ニ至ルノ間ニ其痙攣終ニ心肺ヲ侵
 シ窒息中等ヲ發シテ斃ル、ナリ然レ病末ニ
 至ルマテ腦ヲ侵ス、ハ甚クナリトシ慢性ノ者
 ハ經過甚ク時ヲ定テ往來スル者ノ如キハ殊

ニ然リ此病數年留連シ毎日同時刻ニ發作メ而
 其持續スル、必ス四時間ナル者ヲ見シ、アリ牙
 關緊急モ亦癱瘓質ヨリ來リ或ハ形器性ノ因ニ
 係レル者ハ數月留連スル、アリ
 此病單純ノ神經病ニメ本原證ナル者ハ甚ク危險
 ナリ殆皆治スヘカラス他病ノ傍證ナル者ハ少
 輕ク慢性ノ神經衰弱及歇以私的里ノ餘證ナル
 者ハ最輕シトス

原由 近因ハ脊髓及交感神經肋間神經ノ一種ノ變常

ナリ其患腦中ニアラス故ニ癲癇遠因ハ膽液鬱

滯等ノ腸胃刺衝。牙關緊急殊ニ多ク之ヨリ来ル 痘瘡。猩紅疹等

ノ天行熱病。皮病内陷。淋疾閉塞等ノ病毒轉徙。或

ハ金刃創。臍及臍膜ノ創傷 刺創。手掌足心ノ竹木刺。或ハ

依ト昆垤兒歌ヒコソコテルヘイリス以私的里等ヨリ来ル

治法 本證ト傍證ト鑒別メ治ヲ處セントヲ要ス

傍證ナル者ハ主トメ其本病ヲ治スヘシ即腸胃

病ニ傍發セル者ハ吐劑。下劑。牙關緊急ハ殊ニ之ニ由テ治スル者多シ

焮衝熱ニ傍發セル者ハ瀉血。防焮藥。虛性神經

熱ニ傍發セル者ハ強壯鎮痙藥。阿芙蓉。微温浴。腐

敗熱ニ傍發セル者ハ麝香。羯布羅。此證ハ阿芙蓉ヲ禁ス其溶崩

腐敗ヲ進ム。樓麻質ニ傍發セル者ハ羯布羅。鹿琥

液。吐酒石。阿芙蓉。微温浴。依ト昆垤兒歌以私的里

ヨリ来ル者ハ神經強壯藥等ノ對證治法。病毒轉

徙ヨリ来ル者ハ反對刺衝法ヲ施ス等ノ如シ而

直ニ神經ヲ侵ス所ノ刺衝物。或ハ異常物體有テ

發セル本證ノ如キハ其因ヲ蹤跡メ速ニ之ヲ除

去シ而後ニ阿芙蓉ヲ用ヒ微温浴ヲ行フヘシ

此病ノ劇烈ナル者ニ證アリ破傷風ト小兒ノ牙

關緊急後ノ小兒編ニ詳説スト是ナリ

治法 先創中ノ異物ヲ除去シテ阿芙蓉軟膏或ハ
 菲阿斯^ホ琶布^{ハツ}ニ阿芙蓉ヲ加^ハテ之ヲ外貼シ内服ニ
 ハ阿芙蓉ヲ主藥トシ用ヒ又之ヲ灌腸藥トシ或
 ハ之ヲ脊髓ト心窩ニ塗擦スヘシ阿芙蓉ハ先每
 四分時半^ツ宛用ヒ三時ヲ經テ効無^クレハ一^ツ宛
 用ヒ仍^ホ効ナケレハ又一^ツ半宛用ヒ次第是ノ如
 ク增量シテ其功ヲ收ムルニ至ルヘシ尚^ホ且^ツ之ニ
 兼^テ剥^{ボツ}篤^ト亞^ア斯^ス半^ツ宛服セシメ菲阿斯^ホト曹^{ソウ}達^{ダツ}ヲ
 加ヘタル微温浴ヲ行フヲ宜シト^ハ若^シ多血^ト焮^ク衝
 ノ候有ル者ハ先刺絡メ蟻針ヲ脊柱ニ貼シ甘汞

ヲ用ヒ水銀膏ヲ擦シ以テ吐涎スルニ至ラシメ
 冷水滴浴ヲ行フヘシ而^{シテ}痙攣靜止スル^ト見ハ
 阿芙蓉ノ後服ヲ止ムヘシ若^シ又右ノ諸藥効ナキ
 者ハ菘^{ソウ}若^ニヲ用ヒ艾灸法ヲ脊柱上ニ行フモ佳ト
 ス創部ノ關節ヲ切斷スルハ痙攣ヲ鎮止スルノ
 速功ナシト雖^モ氏大^ニ阿芙蓉ノ功ヲ扶クル^トア
 リ

喘息^{アス}ト^マ羅^アム^ボル^スチ^グヘ^イ
 又^コルト^アー^デミ^グヘ^イト^蘭

徴候 熱ナクメ呼吸困難スル者是ナリ其輕キ者

ホ氏遺訓 卷之九
通論

ハ肢體ノ運轉ニノミ發スレハ重キ者ハ間斷ナ
ク持續シテ必ク欬嗽ヲ兼發ス而只其熱チキカ故
ニ熱病殊ニ熾 肺勞等ノ少氣短息ト自別アリ此
病ノ一種呼吸短促欬嗽吐痰等ノ諸證肺勞ト恰
モ能ク相肖似セル者アリ是亦其遷延熱チキト
羸瘦セサルトヲ以テ鑒別スルヲ得ヘシ而其
兼發スル所ノ欬嗽ハ乾欬ナル者アリ濕欬ナル
者アリ不斷持續スル者アリ發作ノ時ノミ發ス
ル者アリ

此病留連スレハ肺中ノ血液循行障礙セララル

カ故ニ肺ノ血液鬱積粘液鬱滯焮衝結核欬血窒
息等ノ局發病ヲ誘起シ或ハ之カ為ニ血液製造
宜キヲ失テ蒼身病水腫等ノ惡液病ヲ起シ或ハ
吸收機衰敗シテ水液四肢ニ腫滿シ胸腔腹腔等
ニ瀦留スル等ノ變ヲ將來ス

原由 近因ハ素ヨリ呼吸ノ機關障礙ヲ受ルナリ
而其遠因直ニ肺中ニ在ル者アリ交感ニ由ル者
アリ故ニ其區別甚多端ナリト雖氏之ヲ約スレ
ハ其治術ニ益アル者左ノ數件ニ歸ス

第一神經性喘息是純粹ノ痙攣證ニメ大抵時ヲ

大遺訓 卷之九 廿一 通論

定テ發歇シ多クハ依ト昆垓兒歇以私的里ニ傍發
スルナリ此證ハ患者ヲメ或ハ數時間窒息セシ
メ恐ル可キニ似タルトアレ氏危害ナク復自鎮
靜シテ復故スルヲ得ルナリ

第二多血性喘息是總身多血若ハ肺臟一部ノ血
液鬱積ニ起ル者ニメ殊ニ痔血衄血若ハ月經ノ
閉止ヨリ来ル

第三轉徙毒喘息是徽毒伊屈篤瘰癧毒甲狀軟骨腺腫起
此病ヲ起ストアリ等ノ呼吸器ニ轉徙シ或ハ皮疾潰瘍ノ
内陷。沕乙分泌ノ過閉等ニ起因セル者ナリ而沕

乙分泌ノ過閉ヨリ来ル者二般アリ一蒸氣抑遏
ニメ即、癩麻質喘息ナリ一小便分泌ノ減却ナリ
老人ノ喘息間之ヨリ来ル者アリ

第四腹疾喘息是其病腹内ニ在テ横隔膜ノ運動
ヲ支障スルニ起因セル者ナリ即、酸液鬱滯風氣
痞脹食物不化或ハ肝臟及其他内臟ノ壅塞腫脹
等ヨリ来ル者是ナリ

第五弛弱性喘息是呼吸器ノ衰弱弛緩ニ起ル者
ナリ而失苟兒陪苦萎黃病脱血後等ノ如キ總身
ノ衰弱ニ係ル者アリ又肺臟一部ノ衰弱ニ係ル

者アリ

第六本病喘息是肺臟ニ形器性。舍密性セヒシ或ハ器質ノ變有テ起ル者ナリ即鉛汞砒石等ノ鑛毒固著土砂塵埃等ノ竄入石工織工等ニ於ル者多ク是ナリ肺質及胸腔ノ水液蓄積或ハ大氣鑽入。胸肋軟骨ノ化骨。脊骨ノ屈曲。心臟動脈器質ノ變等之ニ屬ス

治法 通法ト各法トアリ通法ハ原因ニ拘ラス唯本病ヲ治スルノ法ニメ此病ニ於テハ無比ノ偉効アル一アリ故ニ其遠因知ル可ラサル者或ハ之ヲ知レルモ之ヲ除ク一能ハサル者ニ用フヘ

シ即蘆根及蒲公英越幾斯蘆謨安沒尼亞幾孕驗酒石。酒石葉。吐酒石少量。金硫黃等ノ解凝藥ヲ用ヒテ胸中及腹内ノ鬱滯ヲ疎解シ或ハ安質沒扭實アヒモイ芟荅里斯キタリ。硫黃。海葱等ヲ用ヒ「フ」ラ子布名ヲ以テ胸部ヲ温被シ以テ諸分泌ヲ進メ小便ヲ利シテ胸部ノ刺衝ヲ導泄シ且胸水ヲ預防スルニアリ經久喘息ハ大抵皆胸水ニ終ルナリ尚且芥子ヲ加タル脚浴ヲ行ヒ上膊ニ打膿法ヲ施シ足ニ蠟布鞞ワシヲ著スル等ノ反對刺衝法ヲ行ニ宜シトス

神經性喘息ハ亜鉛銅菲阿斯等ヲ内服シ蔓陀羅
 華葉ヲ薰スル等ノ鎮痙法ヲ用ヒ兼テ反對刺衝
 法ヲ行フニ宜シ但隱伏病毒ノ有無ニ注意セン
 一ヲ要ス而間歇性ノ者ハ新製ノ骨喜ハ錢ヲ一
 椀トシ頓服セシムヘシ其發作ヲ鎮靜スルノ速
 効アリ頑固證ハ屢用テ可ナリ且有形ノ病因ナキ者ハ其間
 歇時ニ幾那ヲ用フヘシ若夫歇以私的里性ノ者
 ハ阿魏ヲ内服外用灌腸法シテ偉効アリトス
 多血性喘息ハ總身多血ノ候或ハ常習失血ノ刺絡閉止等ヲ以テ之ヲ知ルヘシ刺絡
 ヲ施シ飲食ヲ節シ肢體ヲ運轉シ或ハ閉止セル

出血ヲ促カス等ニアリ
 轉徙毒喘息ハ各其毒ノ治法ヲ處スヘシ而上臍
 及足脚ニ潰瘍ヲ造テ久ク釀膿セシムルハ殊ニ
 宜シトス
 腹疾喘息ハ吐下藥ヲ用テ不化ノ汚物ヲ排泄シ
 格墨因薄荷第六十三方等ノ驅風藥及灌腸法ヲ以テ
 風氣ヲ驅散シ内臟壅塞ヨリ來ル者ハ解凝藥ヲ
 與ヘカルバツトエムス水ゲイルナウエル水ハ
 シンゲル水セルテル水以上皆鑛泉名等ヲ服セシムヘ
 シ

弛弱性喘息ハ有カノ強壯治法ヲ行ヒ失苟兎陪
苦ニ起因セル者ハ失苟兎陪苦ノ治法ヲ用フヘ
シ

本病喘息亦其因ニ準テ治法種々アリ其鑛毒ニ
由ル者ハ中毒治法ヲ用ヒ就中硫黃石灰水安質
沒扭阿芙蓉ヲ與ヘ硫黃浴ヲ行フヘシ其塵埃砂
石ノ竈入ニ由ル者ハ温蒸氣ヲ吸入シ海葱蜜ヲ
内服シ兼テ時々吐劑ヲ用フヘシ而此證ハ間々
衝ヲ起スコトアリ故ニ胸中疼痛煩悶等ヲ發スル
コト有ラハ速ニ刺絡蟻鍼ヲ行フヘシ其結核腫ニ

由ル者ハ瘰癧ノ治法ヲ用フヘシ毎日炭酸曹達
半錢ヲ水ニ溶シ用テ殊効アリ又乳養法ヲ行ヒ
騎馬ヲナス等結核勞ノ治法ニ準フヘシ其脊骨
屈曲ニ由ル者ハ尙樓ノ人此病ヲ患サル者殆少シ其因ヲ除ク能
ハス唯其患苦ヲ寬解シ吐血肺勞等ノ惡證ヲ預
防スルヨリ他ナシ血行ノ障礙ニ注意シテ時々
瀉血ヲ行ヒ打膿法ヲ施スヘシ患苦ヲ寬解シ病勢
ヲ頓挫スルノ最良法ナリ其心臟及血脈大幹ノ
器質ノ變心室擴張。瓣膜化ニ由ル者ハ其徵肢體
ヲ運轉スレハ乍胸中劇ク煩懣メ疼痛ヲ兼子或

否ラ 心悸頭眩ヲ發シ甚キ者ハ失氣昏冒シ脈動
 不整ニメ一臂牽引シ或ハ麻痺シ平卧スレハ輕
 快ヲ覺エテ諸證乃靜止ス 肺質ニ病アル者ハ起
 坐シテ前ニ屈スル氏
 輕快ヲ 而病甚キ者ハ心臟ノ部位腫脹スルヲア
 リ然氏之ヲ鑒別スルヲ甚難シ乃曾テ暴劇ノ努
 カヲ為ルカ心臟ノ焮衝ヲ患シカ或ハ形器性ノ
 毀傷ヲ受シ等ノ從前ノ事故ヲ探索シ或ハ聽管
 ヲ用テ之ヲ聽取シ以テ臆察スルヲ得ルノ
 或ハ又伊倭篤毒心臟ヲ犯シテ此證ヲ起スヲ屢
 アリ亦知ラサル可ラス此病ハ根治スルヲ甚難

シト雖氏數時刺絡シテ少量ノ血ヲ瀉シ心部ニ
 蟻鍼ヲ貼シ毎日屢冷慰法ヲ施シ消石實芟答里
 斯老利兒結爾斯水ヲ内服シ肢體ノ運轉ヲ禁シ
 清涼ノ食養ヲ命シ上膊或ハ左胸ニ打膿法ヲ行
 ヒ以テ心臟ノ運營ヲ減損シ血液ノ輻湊ヲ退却
 スルヲ營ムヘシ 然ラサレハ血液擴張スルノ極
 心臓破裂メ頓ニ死ヲ致スナ
 リ 予曾テ此證ニ右ノ諸法ヲ合用シ持久セルヲ
 半歳ニメ病徐ク减退シ終ニ根治ヲ得シヲアリ
 其肺ノ粘液過溢ニ由ル者ハ粘液勞ノ治法ヲ參
 考スヘシ此證又伊倭篤ノ轉徙及ヒ腹内ノ壅塞

ニ起回セル者甚多シ若然ル者ハ「メルラゴ」未詳蘆根越幾斯ノ如キ緩性ノ解凝藥ヲ久ク連用シテ偉効ヲ奏スル「アリ」若其粘液膠固ニメ吐痰シ難キ者ハ金硫黃モム蘆ム謨安ム没ム尼亞ム幾ム第六十四方 結爾ム茂ム斯海葱蜜ム礪砂ム加過ム泥子ム精ム硫黃等ヲ用テ其肺ヲ寬解シ其漏泄過多ナル者ハ麻爾羅歌ム土木香ム亞兒ム尼ム加ム遠志ム第六十五方 第六十六方 及第六十九方ノ越粟ム失爾ム等ヲ與ヘテ其肺ヲ強壯ニスヘシ然ム氏ム幾ム那ム依ム蘭ム苔ム等ノ強壯收斂藥ハ謨用スル「勿レ卒」ニ吐痰ヲ遏止メ窒息ヲ起スノ恐レアレ

ハナリ但括ム失ム亞ム葛ム斯ム加ム栗ム刺ムノ如キ純苦味藥ハ祛痰藥ト配用シテ可ナリトス其年齡ノ老衰ニ由ル者ハ前ニ舉クル弛弱性喘息及粘液過溢證ノ治法ヲ用フヘシ其胸肋軟骨ノ化骨ニ由ル者ハ不治ナリ唯姑息法ヲ行フヘキノ「其大氣竅」入ニ由ル者ハ二種アリ一ハ強テ重擔ヲ揚ケ或ハ劇ク樂器ヲ吹キ或ハ外傷墜下ノ激動等ニ由テ肺中ノ氣胞破綻シ呼吸スル毎ニ大氣之ヨリ肺ノ蜂巢質ニ竄入スルナリ一ハ肋骨ノ破碎膿液ノ侵蝕等ニ由テ肺ノ外面破裂シ大氣之ヨリ

胸腔ニ竈入スルナリ兩ナカラ之ヲ鑒定スル
甚夕難シ唯鎖骨ノ上邊ニ氣腫ヲ見ハスノ一證
ヲ以テ察スヘキノミ甲證ハ先刺絡シテ嚴ニ肢
體ノ運轉ヲ止メテ吸氣ヲ淺クセシムレハ
創痕自ラ癒テ竈入セル大氣ハ自吸收セラル、
トヲ得ヘシ且兼テ寒冷ノ氣ヲ吸ハシムルヲ佳
トス乙證ハ胸臆ノ治法ヲ用フヘシ

心悸動「バルヒタチオ」
ルトコロピンゴ羅ハ

徵候 心臟若ハ大血管常規ヲ離レテ過動ヲ為ス

者是ナリ甚キ者ハ其動視ルヘク其音聴クヘク
最甚キニ至テハ血行支障セラレテ昏冒ヲ發ス
ル者アリ或ハ又他部殊ニ腹部ノ動脈モ血瘤状ノ腫
脹ヲ致シ或ハ一部ノ痙攣ニ由テ同種ノ過動ヲ
起ストアリ乃依ト昆垚兒歌以私的里ニ於テ常
ニ多ク之ヲ見ルカ如シ

原由 大抵皆他病ノ傍證及交感證ナリ故ニ依ト
昆垚兒歌以私的里風氣蛔蟲大便秘結痔血鬱滯
内臟ノ壅塞腫脹等ニ傍發シ或ハ總身ノ多血伊
偃篤疥癬ノ侵襲等ヨリ起ルヲ常トス然レ間亦

心臟ノ本患ナル者アリ真ニ然ル者甚罕ナリ是亦其器質ノ變ニ係ル者ハ少ナクメ多ハ其筋纖維痙攣状ノ變ヲ為スニアリトス然リト雖其患過劇ニメ持久スレハ遂ニ器質ノ變ヲ將來セサルヲ得ス其器質ノ變ハ即心臓大若クハ一部血瘤状ノ腫脹ヲ致シ或ハ非常ニ擴張ノ巨大トナリ或ハ瓣膜化骨シ若ハ硬腫トナリ潰瘍トナル類是ナリ聽管能ク之ヲ徵知スルヲ得ヘシ

治法 先之ヲ他病ノ傍證トメ其本病ヲ探索セン

一ヲ要ス強テ之ヲ心臟ノ本患ニ歸センヨリハ却テ万全ノ大功ヲ得ルヲ多シ宜ク證ニ隨テ依ト昆垺兒歌以私的里風氣蛔蟲痔血鬱滯屢肛門ヲ貼シ硫黄ヲ内多血轉徙毒等ノ治法ヲ處スヘシ若夫心臟本患ナルモ之ヲ無形之變痙攣ニ歸メ治セン一ヲ要ス實答里斯第七方冷漏法之ヲ行ニ四回或氷片ヲ心部ニ貼騎馬大ニ奇驗アリ而其病實ニ器質ノ變ニ在ル者ハ鑒定治法共ニ甚難シ喘息篇心臟器質ノ變ヲ論セル条ト參考スヘシ

抄本遺言 卷之九

欬嗽 「ヒツシス」羅「フ
ス」蘭

徵候 呼氣激動シテ聲ヲ成スノ病ニメ熱無キ者
是ナリ 熱病。肺勞。肺焮衝等ノ
傍證ニアラサルヲ云 而吐痰スル者ト否
ル者トアリ

此病留連一樣ナラス或ハ不日ニメ治スル者ア
リ或ハ數週累年持續スル者アリ或ハ生涯連綿
スル者アリ而此病ハ單ハ危險ニ至ルコトナシト雖
凡其繼證甚懼ルヘシ乃肺焮衝。欬血。肺勞等ヲ將
来スルニ至テハ實ニ篤疾ノ一タルコトヲ免レス

凡肺勞ハ其始欬嗽ヲ輕蔑セルヨリ来レル者大
抵三分之二ニ居ルナリ而其最恐ルヘキハ稟賦
勞瘵ノ素質ヲ具スル者ニ在リトス

原由 近因ハ肺臟及他ノ呼吸ニ係ル器ノ痙性引
縮ヲ為ス者ニメ其遠因ニ般アリ一ハ肺臟ノ感
動過敏トナレルナリ一ハ異常ノ刺衝ナリ其感
動過敏ハ血液焮衝狀ノ鬱積ヲ致スニ由リ或ハ
神經ノ覺機亢揚スルニ由ル而其異常ノ刺衝ハ
直ニ肺中ニ在ル者アリ他部ニ在テ交感ヲ致ス
者アリ即聖京。偃。樓。麻。質。腸。胃。汚。物。内。臟。壅。塞。或ハ

伊倭篤疥癬癩瘰。黴毒等ノ轉徙或ハ結核潰瘍粘
液過溢等ノ肺臟器質病是ナリ

治法 其本性ヲ檢シテ其種類ヲ分チ以テ各自ノ
法ヲ處スヘシ

其一 樓麻質效是感冒ヨリ来レル者ニメ急證ト
慢證トアリ其病タル皮膚ノ運管抑遏スルカ為
ニ肺臟之ニ代テ不全分利ヲ致ス者ニメ其全體
對稱機作用ナリ故ニ其治法皮膚ノ機カラ進メ
テ肺ノ運管ヲ誘キ彼此相平均メ常度ニ復セシ
ムルニアリ乃病仍日ヲ延サル者ハ安質沒扭孕

鹼酒石。硫黃。礞砂。甘草。土木香。和胸越。栗失爾。按ニ第六

十九方 葛爾儒別涅實越幾斯等 第三十三方 第三十

七十一方 第七十二方 第 方 第 二十一 方 第

十二乙方ナリ但終始腸胃汚物ノ有無ニ注意セ

ン一ヲ要ス其頑固ナル者既ニ久キヲ瀰ル者ハ

蜀羊泉ヲ服シテ「布名」子ルノ襯衣ヲ穿チ芫菁

膏ヲ上膊ニ貼シ或ハ瑞香皮打膿ヲ一膊ニ行ヒ

重證ハ兩膊ニ行フ以テ久ク瘡エシメズ若單味ノ蜀羊泉

効ナキ者ハ依蘭苔ヲ伍シ第七十一方セル左ル水

ヲ用フヘシ而諸藥寸驗ナク病毒刺衝ニ由テ遂

ニ肺中結核ヲ生シ或ハ粘液過溢ヲ致ス者ハ乃チ肺勞ノ治法ニ移ルヘシ

其二瓦斯多利效胃効。肝効。蟲効。此證ハ肺ノ效嗽

ト全ク異ニメ其治大ニ差フカ故ニ能鑒別セン

一ヲ要ス其徵呼吸自在ニメ能ク行キ能ク走り


能ク談笑シ能ク深息シ其效總テ肺ノ動擾ニ拘

ラス特胃ニ事アレハ乃チ増劇ス故ニ食後最甚ク

ノ常ニ消食機ノ不調ヲ兼ルナリ治法其初期ニ

在ル者ハ二三日礪砂或ハ孕鹼酒石ヲ用ヒテ而

後證ニ隨テ吐劑或ハ下劑ヲ與フヘシ下劑ハ滿



那旃那ヲ佳トス然レ病既ニ久キヲ經テ印華爾

屈篤前出ツノ徵ヲ見ハシ且液質變性セントスル

者ハ有カノ解凝藥ヲ連用シ兼テ時々吐劑下劑

ヲ與フヘシ此病數月留連シテ吐痰甚ク宛モ肺

勞ニ肖似セル者單ニ吐劑ヲ用テ頓治セシ予

屢實驗セリ或又著草泡劑ヲ持久シテ旦夕冷服

セシメ或ハ麻爾羅歇括失ヲ用ルモ亦奇功ア

リトス若夫蛔蟲刺衝ニ起因セル者ハ驅蟲ノ法

ヲ處スヘシ

其三神經效即瘧他ノ諸因ナクメ單リ神經性ノ

諸證ヲ呈シ馳走談笑運轉及起熱ノ諸件皆其效
ヲ増サスメ却テ輕快ヲ覺エシメ獨情意感動等
ノ神經ノ騷擾能ク之ヲ劇發セシムル者是ナリ
此證ハ素ヨリ神經衰弱ノ治法ヲ處ス可シト雖
凡其感動ノ遲敏ニ應メ斟酌ナクンハアラス即
感動過敏ノ者ハ驢乳續草槲寄生菲阿斯阿芙蓉
エムス水泉鏡微温浴清豁氣騎馬等ヲ佳トシ感動
遲鈍ノ者ハ幾那括失亞鹿琥液等ヲ的當トス此
證ノ一種毎朝發作シテ惡心嘔吐ヲ起ス者アリ
是通常飲酒ニ耽リ燒酒ヲ嗜ム者ノ患ル所ナリ

宜ク慄悍ノ飲液ヲ禁シ括失亞及健胃劑ヲ用ヒ
老里兒結爾斯水ニ葭若ヲ伍メ之ヲ與フヘシ
其四多血效性即效此證總身ノ多血ニ因レル者
ト一部ノ多血ニ起レル者トアリ而總身ノ多血
ニ因レル者ハ少年ノ徒ニ最モ多シテ脈強實等
ノ多血ノ諸徵ヲ具ヘ運轉スレハ其效則増劇シ
呼吸不利胸内刺痛等ヲ兼子動スレハ吐血肺焮
衝ヲ發スル者是ナリ刺絡防焮藥減食肢體運轉
等血液ヲ減耗シ運營ヲ退却スルノ治法ヲ處ス
ヘシ其一部多血ニ起レル者ハ痔血經血等常習

ノ失血閉止セルカ若ハ初テ發セントノ抑遏セ
ラル、ヨリ来ルヲ多シトス胸内刺痛ヲ兼タル
欬嗽久キヲ經テ宛モ肺勞初起ノ如ナレハ唯痔
血ノ鬱閉ナリシ者屢之ヲ目撃セリ而亦月經天
然ノ終止ヨリモ之ヲ来ス_トアリ其痔血ノ抑遏
ハ腹部血液鬱積ノ徵及ヒ痔疾ノ素因アル等ヲ
以テ察スヘク月經ノ抑遏ハ月經初出ノ徵及年
齡等ヲ商量シテ之ヲ決スヘシ治法痔血ニ原_ケ
ル者ハ解凝性ノ越幾斯中和鹽硫黃ヲ用ヒ蜚_鉞
ヲ肛圍ニ貼スル等ノ痔疾治法ヲ處シ經閉ニ原

ケル者ハ經閉ノ治輒ヲ踏テ之ヲ漏泄シ其天然
ノ終止ヨリ来レル者ハ其機復起ス可ラサルヲ
以テ瀉血ヲ行フヘシ又此多血效肺ノ慢性焮衝
ナル者アリ其徵脈緊數ニメ屢發熱シ呼吸不利
シテ胸内刺痛シ欬嗽ノ痰ヲ吐セス是結核勞若
ハ焮衝性肺勞ノ已ニ其初ヲ為ントスル者ナリ
肺勞篇ヲ參考シテ治法ヲ處スヘシ凡テ焮衝性
欬嗽ハ皆單味ノ乳清若ハ之ニ酒石ヲ伍メ用ヒ
或ハ「セル左ル水_{乳汁}少許_エゲルセ水_{エム}セル
水_皆鑛_ヲ服シテ偉効アリトス

扶氏遺訓 卷之九
發メ止ムヲ常トス病劇キ者ハ顔面灰白ニメ青色ヲ帶ヒ口鼻血ヲ流出シ肺ノ痙攣甚シテ少_シ馬_ラハ呼吸全ク窒絶スル_トアリ其發作大抵每一時若クハ毎二時ニ在テ重キ者ハ尚頻發シ夜間ハ殊ニ暴劇ニメ笑談哭泣等僅ニ意識ヲ動カスニモ乍チ之ヲ起シ易シ而通例隔日毎ニ劇發スル者ニメ衰弱ヲ除クノ他患者微苦ヲ見ル_トナシ此病ハ唯小兒ノ患ル所ニメ且_一之ヲ病ハ復患ヘサル_ト瘡瘡麻疹ニ於_ケルト一般ナリ此病ハ終始三期ニ分ル其初期ハ尋常感冒效ノ

如クニメ熱ヲ兼子或ハ肺焮衝ヲ併シ徐ク此病ノ本性ニ移ル時間ナリ第二期ハ熱去テ咳嗽單純ノ痙性ヲ見ハセル時間ニメ數週稽留ス季期ハ其發作間歇性ヲ得テ衰弱益加ハルノ時ニメ三四週持續ス經過是ノ如クニメ其終始五週ハ週十二週或ハ其餘ニ至リ皮疾或ハ鶯口瘡ヲ發メ分利スルヲ常トス然_レ氏其病劇シテ且_ツ久キヲ經_レハ咳嗽ノ為ニ精力費耗シ嘔吐ノ為ニ榮養虧損シ以テ一身ノ虛脱瘦削ヲ致シ或ハ肺臟衰弱シテ粘液勞ニ移リ或ハ脊骨屈曲シテ佝僂ト

為ル等種々ノ繼病ヲ来ス₁アリ凡、此病其發作
ノミハ懼ル、ニ足ラスト雖₁繼發ノ餘證總身
虚脱

肺
勞
等

ニ由テ終ニ死亡ニ歸スルナリ

原由 近因ハ一種ノ傳染毒有テ横隔膜神經、胃神
經、肺神經等ヲ刺衝スルニアリ其毒元來大氣中
ニ含スト雖₁亦人々互ニ傳ヘテ相感染スル₁
ハ此患兒ヲ看待スル年高ノ徒モ其病ヲ感受ス
ル₁有ルヲ以テ證スヘシ而其神經ノ刺衝癲癩
狀ノ痙攣性運動ト胃肺ノ粘液分泌増盛トヲ起
スヲ以テ膽液分泌モ亦為、ニ常度ヲ踰ルナリ而

素質ヲ有セル患者ハ肺ノ焮衝ヲ来タス₁アル
カ故ニ原來神經性ノ病ナリト雖₁亦焮衝性ヲ
兼ル₁アリ凡、傳染病ハ痘瘡麻疹等ノ如ク必定
期ヲ待テ自ラ其毒ヲ驅泄スル者ナリ故ニ此病
モ亦然リトス

治法 胃腸ヲ清刷シ痙攣ヲ鎮制シ傍ラ合併病ニ
著目セン₁ヲ要ス但其時期ニ随テ亦斟酌ナク
ンハアラス即₁其初期ハ腸胃性ノ感冒ニメ多ク
ハ焮衝性ヲ帶ブ故ニ吐劑ヲ用₁第七十四方ノ
舐劑ヲ與ル等清涼解凝疎滌ノ法ヲ處スヘシ而

熱勢愈加リ呼吸困難胸内疼痛刺衝性效嗽等ヲ
起スヲ見ハ速ニ蟻鍼ヲ胸部ニ貼メ少量ノ甘汞
ヲ用ヒン_一ヲ要ス第二期ハ專ラ痙攣ヲ鎮制ス
ルニアリ乃_チ菲阿斯阿魏散劑トシ或ハ灌腸劑トス 莨菪第七十五
方等ノ鎮痙麻酔藥ヲ用ヒ效嗽劇キ者ハ阿芙蓉
ヲ與ヘシ第七十六方 但_シ阿芙蓉ハ連用ス可ラス其大
便秘閉及血液鬱積ヲ起スノ恐アレハナリ其他
萬苴越幾斯蜀羊泉失鳩答麝香_レ 孟ムパリスト
_レ 迷迭香ノ一種麻酔ノ功アル者 等其越必_ニ 姪密ノ性ニ隨テ撰
用シ或ハ芫菁軟膏或ハ吐酒石膏第七十七方 等ヲ心

窩季肋ニ塗擦メ皮膚ヲ刺衝シ或ハ海葱實芫荽
里斯芫菁丁幾等ヲ内服メ腎ヲ刺衝シ或ハ灌腸
法ヲ行フ等ノ反對刺衝ヲ施スヘシ大抵是ニ由
テ全治ヲ得ルナリ右ノ諸法功ナクメ季期ニ移
リ效仍_ホ數週留連シテ熱證全クナキ者ハ是_レ 衰弱
ノ為ニ痙攣退カサルナリ幾那ニ鎮痙藥ヲ伍シ
用フヘシ幾那鹽半_ハ至_一日ニ用フ 諸證時ヲ定メテ隔日
ニ増劇スル者ノ如キハ殊ニ之ヲ適當トス而其
效斷エス痰沫ヲ咯ク者ハ依蘭苔傑列乙ヲ用フ
ヘシ兼テ粘液勞ヲ預防スルニ良シ差後ノ衰弱

扶氏遺訓

ハ微温強壯浴。浴。麥芽 幾那。榭實骨喜。依蘭苔傑列乙
ヲ用テ内托スルヲ宜シトス

扶氏經驗遺訓卷之九終



