



ヤ 4  
1448  
10





24  
1448  
10



扶氏經驗遺訓卷之十一

足守 緒方章公裁

義弟郁子文 全譯

西肥 大庭志景德 參校

其三麻痺病アルラムミ  
ンゲン蘭

總論

凡神經ノ覺動兩機觸覺  
運動若ハ其一機全ク遏止シ  
或ハ大ニ乏弱セル者之ヲ麻痺病ト謂フ其近因  
ハ即神經ノ運營障碍ヲ被レル者ナリ其障碍或  
ハ真ノ衰弱ナル者アリ或ハ血管充張血液溢出

扶氏遺訓 卷之十一 一 適適齋藏



91-1907



外物嵌入。腫瘍。脫臼。束縛等ノ如ク外ヨリセル壓迫ナル者アリ。或ハ病毒侵襲。異性刺衝。交感刺衝。腸胃病。蟲病ヲ等ヨリ起レル瘧性ノ病患ナル者殊ニ多シトス。アリ故ニ此病瘧瘵ト交換シ或ハ疼痛瘧瘵ヲ兼發スル者多シ而其病。神經ノ末梢ヨリ始ル者アリ。根本ヨリ起ル者アリ。

卒中 「アホ。ブレキシ」  
「アホ。ブレキシ」  
「アホ。ブレキシ」  
「アホ。ブレキシ」

徵候 五官觸覺。諸筋運動ノ如キ神識運營。皆卒然トメ遽ニ遏止シ。脈動呼吸等ノ性命ニ係ル運營ハ依然トメ常ヲ違ヘス。或ハ却テ増盛スル者は。

ナリ此病ト證據肖似セル他患多シ能ク鑒別セズンハアラス。即癲癇ノ如キハ瘧瘵ヲ兼ルヲ以テ知ルベク失氣ノ如キハ脈動呼吸ノ絶止或ハ仍存スレハ極メテ細小ナリスルヲ以テ辨スベク沈醉ノ如キハ既往ノ所由ト現今ノ酒臭ト舉動ノ全ク絶エサルトヲ以テ察スヘキ等ナリ。凡此病發作一定ナラス。或ハ恰モ電火ニ中ルカ如ク卒然トメ瞬間ニ死絶スル者アリ。或ハ宛カモ熟睡セル人ノ如ク鼾息シテ脈動緩徐若クハ強實トナリ。五官觸覺ナク四肢舉動セス。或ハ時ニ瘧瘵ノ運



動<sup>ラ</sup>而眼胞垂レテ瞳孔散大シ泡沫口ニ充テ  
致ス下顎收ラス飲液下ラス大小便失禁スル等ヲ兼  
ル者アリ之ヲ全發卒中ト謂フ或ハ患者仍<sup>ハ</sup>辨識  
ヲ存シテ彼此ノ部麻痺スル者アリ之ヲ不全卒  
中ト謂フ<sup>世ニ所謂中</sup>又數般アリ或ハ頭ヲ除ク  
ノ他總身盡ク麻痺シ或ハ半身不遂シ或ハ單ニ  
觸覺ノミヲ失シ或ハ單ニ舉動ノミヲ亡ナフ等  
是ナリ其最<sup>モ</sup>輕易ナル者ニ至テハ或ハ眼胞垂テ  
偏眼細小トナリ或ハ口吻掣引メ喎斜スル等ノ  
如ク單ニ各部ノ一筋麻痺スル者アリ

全發卒中ノ經過種々アリ或ハ患者省覺スル  
ヲ得ス<sup>メ</sup>終ニ死スル者アリ或ハ再<sup>ニ</sup>辨識ヲ得  
テ次テ發熱シ其熱大抵時ヲ定メテ毎日發作シ  
之カ為ニ分利ヲ得テ第七日若クハ第十四日ニ  
全治スル者アリ或ハ然ル<sup>ヲ</sup>得ス<sup>メ</sup>第三日若  
クハ第七日其熱ノ發作中更ニ復本證大發シテ  
斃ル<sup>者</sup>アリ或ハ又<sup>ハ</sup>本來間歇熱ニ<sup>メ</sup>卒中ハ其  
第一發證ナル者アリ此證ハ省覺シテ患者爽快  
ヲ覺ユレ<sup>氏</sup>次日又再發メ大抵之カ為ニ死ス第  
二發幸ニ免ル<sup>ト</sup>得ルモ第三發ニハ必<sup>ズ</sup>斃ル







後ニ發スル 頭ノ下低。咽喉焮衝。肺焮衝等。以上皆

卒中甚多シ。或ハ力作過動。七情劇發。頭部温覆。日光暴

露。寒氣冒觸。血液ヲ内部ニ驅逐ス。過酒酩酊。病毒侵襲。頭部

外傷。腦焮衝等。皆血液ノ上輸ノ如キ是ナリ

腦髓痙攣。平素神經性ニ多血ナラサル人ニ

於テハ七情感激。痙攣搐掣ノ諸病。病毒侵襲。交感

刺衝等總テ腦ニ感動スル。劇シキ諸件皆之ヲ

誘發ス。

腦髓虚脱。高老ノ年齢過度ノ脱血。神經熱過房

等。腦ノ生カヲ奪ヒスル諸件皆之ヲ起スナリ。

凡、腦ノ病患刺衝卒中ヲ起ス者ノ中ニ就テ最モ

意ヲ注ク可キハ病毒轉徙ト交感刺衝トナリ病

毒轉徙ハ伊<sup>イ</sup>倨<sup>グ</sup>篤<sup>ト</sup>ト猩紅疹ノ内攻ヲ殊ニ多シト

シ交感刺衝ハ胃中ノ汚物ヲ多シトス殊ニ膽液

性卒中ハ間一般ニ流行スル。アリ古人此病ヲ

多血卒中ト洵乙卒中。按ニ所謂粘液トニ分テ

者故ナキニ非ス固ヨリ洵乙鬱積ニ由レル者ハ

之ナシト雖血液鬱積ニ由ラサルノ卒中亦少

カラス即痙性及虚性ノ者是ナリ。按ニ古人ノ區

氏今人ノ等ク之ヲ血液鬱積ニ歸。蓋此病ハ大ニ



素因ニ係ルナリ乃同一ノ誘因甲ニハ乍チ此病  
 ヲ發セシムレ氏乙ニハ絶テ些害ナキ者多シ而  
 其素因ハ殊ニ體格ニアリ即頸短シテ大ク頭深  
 ク両肩ノ間ニ嵌ルカ如クニメ軀幹矮小肥實セ  
 ル者是ナリ其他高老ノ年齡晝夜等分ノ時令冬  
 ヨリ春ニ移リ秋ヨリ冬ニ向フノ候我二月三月  
十月十一月  
 又驗氣管ノ度卑ク或ハ升降定度ナキ時等此病  
 ノ素因ニ属ス而此病一發セル者ハ必皆再發ノ  
 素因ヲ遺スナリ

治法 唯腦髓ノ運營ヲ恢復スルニ在リト雖氏茲

ニ兩個ノ要訣アリ其一。每證必腦ノ虚脱ナリト  
 思フヲ勿レ却テ強實ニメ其運營唯壓迫ノ為ニ  
 抑遏セラル、者多シ其二。每證必血液鬱積ニ因  
 セル者アリト思フヲ勿レ之ニ縁ラサル者亦少  
 カラス  
 是故ニ此病ノ本治法ハ先其運營支障ノ因ヲ除  
 クニ在リ其因ヲ除テ其運營復セサル時乃之ヲ  
 揚發スルノ治法ニ移ルヘシ必初ヨリ之ヲ運營  
 ノ脱却ナリトセスイ每常之ヲ支障ナリトセン  
 ヲ要ス



第一多血性卒中 此證ニ於テハ其血行ノ壓迫  
 ヲ除クヲ以テ第一務トス恰モ縊死セル者ニ其  
 索ヲ解クカ如ク此一舉ニ全治ヲ得ル者少カラ  
 ス脈強實。顔面紅盈。眼内赤脹。體温過越。及常習失  
 血ノ滯止既往慄悍飲液ノ過用等以テ之ヲ徵ス  
 ヘシ此證ハ必刺絡ノ多量ノ血ヲ瀉シ頗ル刺口  
 ヲ大ニシ逆射急疾ナラントヲ要ス 若夫失血閉  
 止ニ原ケル  
 者ニ於テハ足ニ 之ヲ行フヘシ 而軒聲ノ歇ムカ或ハ人事ヲ省  
 シテ言語故ニ復シ脈ノ強實減退スルニ至ルマ  
 デ之ヲ止ムルト勿レ若諸證未退カスノ其出血

自止ムト有ハ更ニ復他ノ絡ヲ刺スヘシ若又脈  
 動之カ為ニ細小トナレ凡諸證寛解スルト無キ  
 者ハ其刺ロヲ閉テ頸及項ニ吸角十二個ヲ施シ  
 頭上ニ蜚鍼二十個ヲ貼スヘシ然仍功ナク血液  
 上輸依然トメ退カス危篤相迫ル者ハ頸靜脈若  
 クハ顳顬動脈ヲ刺開セサル可カラス若夫痔血  
 月經ノ滯止ニ因セル者ハ蜚鍼ヲ肛圍ニ貼スル  
 ヲ佳トス然クメ而後仍未恢復スルトヲ得ス脈  
 復強實トナル者ハ三四時ヲ經テ更ニ又刺絡ヲ  
 行フヘシ但半身不遂ノ者ノ刺絡ハ健全ノ方ヲ



撰テ之ヲ行フヲ法トス。瀉血ニ兼テ又血液ヲ他  
 部ニ導洩スルノ諸法皆舉テ行ハス。シハアラス  
 就中醋三四食鹽。白芥子適吐酒石四ヲ灌腸藥ト  
 シ蒸餅母ヲ腓腸足跗。手臂等ニ貼シ芥子ヲ加ヘ  
 タル温湯ニ浴セシメ頭上ニ冷漏法ヲ行フヲ最  
 佳トス。患者若能ク嚥下スルヲ得ハ甚消ニ旃  
 那吐酒石ヲ加タル清涼下劑第九十ヲ與ヘ頭ヲ  
 高フセシメ狭窄ノ衣服ヲ脱セシメ總テ温暖ノ  
 事物ヲ遠ケ其嚥下スルヲ能ハサル者ハ柔靱撓  
 ムヘキノ管ヲ胃中ニ挿下シ以テ藥液ヲ注入ス

ヘシ凡此病血液鬱積ノ諸證退カサル間ハ決メ  
 刺衝藥ヲ用ルヲ勿レ吐藥モ血液上輸ヲ進メ易  
 キカ故ニ之ヲ禁スヘシ外用ニモ芳香ノ洗劑揮  
 發ノ嗅藥皆之ヲ忌ムヘシ右件ノ諸法ヲ盡シテ  
 毫モ寛解セサル者ハ其治希窮スヘカラス大抵  
 第三日更ニ大發メ斃ルヲ常トス若之ニ由テ  
 善候ヲ見ハスアアラハ其治轍ヲ更メス仍清涼  
 ノ下藥及灌腸法ヲ連用センヲ要ス而依然  
 トメ一層ノ佳兆ニ移ラサル時始テ吐藥ヲ與フ  
 ヘシ此ニ至テハ卓偉ノ一藥トナルヲアリ胃中



括遺訓 卷之十一  
瘡滿セル者ニ於テハ殊ニ然リ此時ニ方テハ芫  
菁硬膏ヲ大ニメ項ニ貼スルモ亦的當スヘク適  
宜ノ神經藥刺衝藥モ亦用ヒテ佳ナルヘシ然レ  
モ仍<sup>ホ</sup>慎テ血液上輸ヲ起ス可キ諸品ヲ避ケ清涼  
下泄ノ藥ヲ配用セスンハアラス即<sup>チ</sup>纈草亞兒尼  
加<sup>カ</sup>第九十<sup>方</sup>ベルトラム<sup>ト</sup>未<sup>カ</sup>詳<sup>カ</sup>龍涎香<sup>カ</sup>丁<sup>カ</sup>麝<sup>カ</sup>精<sup>カ</sup>等  
ヲ可トス而<sup>モ</sup>又甘<sup>カ</sup>汞<sup>カ</sup>實<sup>カ</sup>芟<sup>カ</sup>答<sup>カ</sup>里<sup>カ</sup>斯<sup>カ</sup>ヲ兼用シテ傍<sup>ラ</sup>  
沕乙ノ滲漏ヲ預防セン<sup>ト</sup>ヲ要ス若夫血液鬱積  
證盡ク去レモ其病全ク退<sup>カ</sup>サル者ハ神經性卒中  
ノ治法ニ移ルヘシ

第二神經性卒中

瘧性  
卒中

虛性卒中

血液鬱積及精

力旺盛ノ諸徵ナク顔面灰白ニメ體温寡少脈細  
小ニメ之ヲ按スルニカ<sup>ラ</sup>無ク之<sup>レ</sup>ニ兼ルニ失血脫  
液過房過慮神經病年齡傾老等ノ衰弱諸因前驅  
セルヲ以テ徵知スヘシ此證ハ揮發衝動ノ神經  
法ヲ行フヲ以テ主トス即<sup>チ</sup>纈草亞兒尼<sup>カ</sup>加<sup>カ</sup>鹿<sup>カ</sup>琥<sup>カ</sup>精<sup>カ</sup>  
葛<sup>カ</sup>私<sup>カ</sup>多<sup>カ</sup>僂<sup>カ</sup>謨<sup>カ</sup>龍<sup>カ</sup>涎<sup>カ</sup>香<sup>カ</sup>加<sup>カ</sup>耶<sup>カ</sup>普<sup>カ</sup>的<sup>カ</sup>油<sup>カ</sup>等<sup>カ</sup>ヲ内服セシメ  
醋<sup>カ</sup>芥<sup>カ</sup>子<sup>カ</sup>ベル<sup>カ</sup>トラム<sup>カ</sup>等<sup>カ</sup>ノ刺衝藥ヲ以テ灌腸シ且<sup>ツ</sup>  
芫菁硬膏ヲ項窩ニ貼シ芥子泥ヲ四肢ニ施シ<sup>六</sup>  
時換  
貼ス香竈藥ヲ洗劑或ハ擦劑トスル等ノ皮膚刺



衝法ヲ行フヲ佳トス諸藥功ナキ者ハ阿芙蓉ヲ  
他ノ神經藥ニ配用スルモ亦殊驗アリ若シ其諸法  
ヲ竭シテ寸効ナキ者ハ艾灸法ヲ頭上ニ行フヘ  
シ大ニ良驗ヲ收メシトアリ此證ニ於テモ亦隱  
伏セル血液鬱積或ハ失血滯止潛ニ害ヲ為ス者  
有テ刺絡ハ要セス氏蜚鍼ハ必行ハサル可ラサ  
ルトアリ學者忘却スルト勿レ

第三腸胃性卒中及膽液性卒中 既往ノ飽飧若  
クハ憤怒膽液性ノ越必<sup>エ</sup>埒密<sup>ヒ</sup>舌上汚苔心下痞硬  
噯氣惡心其他面部ノ皺襞ト眼内ノ白膜ニ黃色

ヲ呈シ患者自手ヲ以テ屢胃部ヲ按スル等此證  
ノ定徵ナリ治法ハ吐藥ヲ主トスヘシ然レ氏血  
液鬱積及多血證ノ有無ヲ檢メ若シ然ルト有ラ  
ハ先刺絡ヲ行ハシトテ要ス吐藥ハ吐酒石ヲ最  
良トス吐後ハ刺衝藥ノ灌腸法及下劑ヲ行フヘ  
シ以テ全治ヲ得ルニ足ルトアリ若シ是ニ由テ病  
仍退カス或ハ更ニ増進スルトアラハ其當否ヲ  
慮テ更ニ又吐藥ヲ用フヘシ若シ既ニ吐證ナク又  
汚物ノ徵ナクメ而血液鬱積ノ徵アラハ多血性  
卒中ノ療法ヲ用フヘク神經性ノ證アラハ痙性



卒中ノ治轍ニ移ルヘシ

第四轉徙毒卒中 伊<sup>イ</sup>倨<sup>グ</sup>篤<sup>ト</sup>脚痛ノ轉徙ヲ殊ニ多

シトス既往ノ病患ヲ探索シテ之ヲ徵知スヘシ

治法先<sup>シ</sup>生カノ虚實ヲ慮テ從事セン<sup>ト</sup>ヲ要ス伊

倨篤ニ因セル者ハ多ク皆<sup>ク</sup>焮衝性ナリ故ニ先刺

絡ヲ行<sup>フ</sup><sup>ト</sup>多血性卒中ノ如クシ次ニ反對刺衝

法ヲ施シテ病毒ヲ誘導スヘシ即<sup>チ</sup>脚痛内攻ヨリ

来<sup>ル</sup>者ハ脚ニ芥子泥ヲ貼シ芥子ヲ加ヘタル

脚浴ヲ行<sup>ヒ</sup>食鹽ヲ加ヘタル乾糠浴<sup>按ニ灰浴砂</sup>

<sup>皆灰中若クハ砂中ニ患者ヲ埋ムル</sup>ヲ處スル等

<sup>ナリ糠浴モ亦同種ノ法ナルヘシ</sup>

ナリ而朴屈福烏篤雙鸞菊等ノ各毒相當ノ藥ヲ

用<sup>ヒ</sup>以テ全功ヲ收ムヘシ若<sup>シ</sup>其生カ虚脱シテ神

經性ナル者ハ先<sup>ニ</sup>神經性卒中ノ治轍ヲ蹈テ兼ル

ニ誘導法及各毒相當ノ治法ヲ以テスヘシ

間歇熱卒中ハ一發後全ク蟬脱シテ餘證ナキヲ

以テ徵スヘシ治法ハ最大有力ノ驅熱藥<sup>幾那阿</sup>

ヲ用<sup>ヒ</sup>テ次日ノ發作ヲ禦クニアリ<sup>間歇熱條ヲ</sup>

頭蓋骨外傷或ハ頭腔頸等ニ器質ノ變有テ其壓

迫ノ為ニ起<sup>ル</sup>卒中ハ其因ヲ除ク<sup>ト</sup>能ハス唯

瀉血誘導法ヲ行<sup>テ</sup>血液鬱積等ノ標證ヲ治ムヘ



キノミ其根治ヲ得ル<sub>レ</sub>甚々難シトス

差後ニ遺レル局處麻痺ハ其本條ニ就テ治法ヲ

索ムヘシ後ニ出ツ

凡一田卒中ヲ患ヘシ者ハ切ニ再發ヲ禦カン<sub>レ</sub>

ヲ要ス預防ノ法ハ卧床枕ヲ高<sub>ク</sub>シ居恒脚ヲ温<sub>ム</sub>

ニシ飽食セス強飲セス晚餐ヲ用ヒス慄悍ノ飲

液ヲ禁シ情意ノ感動ヲ避ケ時々下劑ヲ用ヒテ

大便ヲ通シ春時我三四月冬前我九月十月適宜ノ瀉血ヲ行

フ等是ナリ

肺癰 アホブレキシアヒルモユス  
羅ゴングフルラムミンゴ蘭

徵候 室息頓ニ發メ短氣喘鳴苦汗淋漓シ煩悶極

メテ甚シクメ多クハ人事ヲ省セス其經過最モ

急速ニメ斃ル<sub>レ</sub>モ蘊スルモ十二時若クハ二十

四時ノ間ニ於テス

原由 其近因卒中ニ異ナラス唯其麻痺腦髓ニ在

ルト胸神經ニ在ルトノ別アル<sub>レ</sub>ニ而其誘因モ

亦卒中ニ同シ但此病ニ於テハ其壅滯氣管ノ枝

梗ニ在ルナリ即喘息ノ粘液過多ニメ茲ニ鬱塞

シ或ハ膿囊驟カニ破綻メ血液膿汁茲ニ壅滯ス



ル等此病ノ因トナル

治法 力所及速ニ肺中ノ壅塞ヲ排除メ其運營ヲ  
挽回スルニアリ即チ直ニ刺絡ヲ尺澤ニ行ヒ次  
テ早ク吐藥ヲ用ヒ芥子泥ヲ胸ト上膊ニ貼シ兩  
臂ヲ温湯ニ浴シ遠志。亜兒尼加ノ煎汁ニ吐酒石  
ヲ加ヘ用ヒ忽弗滿鎮痛液。鹿琥精。麝香等ヲ與ヘ  
芫菁硬膏ヲ外貼シ尚遠因ニ注意メ之ヲ驅除ス  
ル等卒中ニ於テスルカ如クスヘシ

昏冒 「リポテイミア」又「セイイン」  
「ロイミ」又「ウテラン」

徵候 觸覺運動共ニ廢絶シテ人事ヲ省セス脈動  
呼吸或ハ僅ニ存シ或ハ全ク絶スル者是ナリ然  
レ其輕重一樣ナラス其輕キ者ハ脈動呼吸少  
微弱トナレルノミ是ヲ昏冒「リポテイミア」ト謂フ其重  
キ者ハ脈ト呼吸ト僅ニ存スレト顯然ナラス是  
ヲ失氣「セイイン」ト謂フ其最重キ者ハ脈動呼吸共  
ニ全ク闕如ス是ヲ卒死「アシス」ト謂フ漢人所謂  
昏冒失氣  
其輕重アルヲ詳ニセス  
假ニ其字ヲ填ムルノミ而耳中騷鳴ト眼花閃  
發ト視瞻昏曠ト此病ノ前兆ナリ  
其經過モ亦一樣ナラス短キハ一二密「ミ」扭「ト」篤「ト」ニメ



醒覺スル者アレヒ久キハ數時ニ至リ數日ニ及  
フ者アリ而其醒覺スル時ハ必大息ヲ以テスル  
ヲ常トス預後モ亦其因ニ準テ一定シ難シ歎以  
私的里ヨリ来レルカ如キハ假令久ク留連スル  
ヒ恐ル、ニ足ラス多血ヨリ起リ或ハ心室ノ血  
行妨ケ有ルヨリ来レル者脱力已甚ナルニ因セ  
ル者ハ大ニ危篤ナリ熱病ノ初起或ハ其中間ニ  
發セル者ハ亦危篤ナリトス總テ此病久ク時ヲ  
移ス時ハ血行遲滯スルカ為ニ血液一部ニ滯留  
メ凝泣スルノ恐レアリ焮衝性ノ病患アル者ニ

於テハ殊ニ然リトス

原由 近因ハ心肺ノ運營遏止シ若クハ脱衰セル  
者ニメ神經運營為ニ其障礙ヲ被ムレルナリ昏  
冒ト卒中トノ區別實ニ茲ニ存セリ即昏冒ハ血  
行ノ障礙ニメ其因心ニ在リ卒中ハ神經ノ障礙  
ニメ其因腦ニ在リ故ニ甲ニ在テハ脈動全ク絶  
シ或ハ大ニ微弱トナレヒ乙ニ在テハ依然トメ  
常ヲ違ヘス或ハ却テ其カラ加ルナリ故ニ又  
乙ニ在テハ差後大抵麻痺ヲ遺スナリ有レヒ甲ニ  
在テハ決メ然ルナシ



遠因ハ驚愕。歡喜等ノ七情感激。神經熱。歇以私的  
 里病昏冒此病ヨリ起ル者甚多シ腐敗氣。麻酔臭草花ノ佳香。歇以私的里家ニ  
 昏冒ヲ起ス多シ。麻酔毒。蛔蟲。或ハ交感刺衝等ノ如ク神  
 經ニ劇キ感動ヲ為ス者。或ハ全軀多血。年齡少壯。  
 力作過劇。失血抑遏若クハ失血將ニ起ラントスル。衣服緊縛。心  
 臟疾患等ノ如ク。心臟ニ血液ヲ充積セシムル  
 甚フシテ其縮張ノ機關ヲ妨クル者。或ハ脱液。ハ  
 血。下利。霍亂。腹水。施術後等ノ如ク。甚キ虚脱ヲ起  
 ス者。是ナリ。

治法 心臟ノ運營ヲ活起スルニ在リト雖。其因

ノ異ニ隨テ大ニ差別アリ。斟酌ナクンハアラス  
 其普ク通メ害無キ者ハ冷水灌溉ナリ。而歇以私  
 的里家ニハ鼻下ニ羽毛ヲ焚キ葱莖ヲ割截シ。或  
 ハ醋ヲ嗅カシメ香竈ノ酒精ヲ洗劑トメ四肢ヲ  
 摩擦シ灌腸法ヲ行ヒ新鮮ノ大氣ヲ引ク等ヲ佳  
 トス。虚脱家ハ其體ヲ平卧セシメテ血ヲ心臟ニ  
 還流シ易カラシメ礮砂精ヲ加ヘタル揮發藥ヲ  
 嗅カシメ香竈ノ酒精ヲ以テ顔面心窩。脊骨ヲ摩  
 擦シ。嚙下ヲ得ル者ニハ烈酒ヲ與ヘテ生氣ヲ發  
 揮スヘシ。多血家ハ足脚ヲ垂テ頭胸ヲ高フシ脚



浴及臂浴ヲ施シ諸壓迫ヲ為ス者ヲ去リ衣服ノ  
緊縛ヲ解キ面部ニ冷水ヲ注キ仍<sub>ホ</sub>蘇セサル者ハ  
刺絡ヲ行フヘシ但香竈揮發ノ嗅藥洗劑等ハ決  
メ用フルトカレ  
右ノ諸法ヲ竭シテ寸効ナキ者ハ卒死ノ治法ヲ  
行フヘシ

卒死<sub>アスピキシ</sub>ア<sub>ア</sub>羅<sub>ロシ</sub>蘭<sub>ド</sub>

徵候 脈動呼吸全ク過テ觸覺運動悉ク絶シ死態  
ノ本相ヲ具フル者是ナリ故ニ真死ト混シ易シト

雖<sub>レ</sub>氏真死ハ體內腐壞始ルヲ以テ證トス眼ノ角  
膜ヲ按シテ之ヲ試ムヘシ柔軟ニメ其痕ヲ遺ス  
者是真死ノ確徵ナリ此病ニ於テハ死相悉ク具  
ハレ<sub>レ</sub>氏神識仍<sub>ホ</sub>內ニ存メ能ク體外ノ事ヲ聞知ス  
ル者間之アリ

原由 或ハ心肺ノ運營頓ニ形器性ノ支障ヲ受ル  
ニ由ルアリ<sub>ニ</sub>縊死。溺死。或ハ箱口セラレ或ハ毒氣  
<sub>炭酸氣</sub>ノ類ニ遇テ倒ル、カ如キ是ナリ或ハ温素。酸  
素ノ如キ生命必需ノ物ヲ奪却スルニ由ルアリ  
凍死ノ如キ是ナリ或ハ直<sub>チ</sub>ニ生カヲ脱却セシム



ル感動ニ由ルアリ雷死。愕死。麻醉毒ニ中リ疫毒  
ノ為ニ倒ル。カ如キ是ナリ而。又昏冒久ク醒覺  
セサレハ亦能ク此病ニ轉ス。或ハ又此病産婦。歇  
以私的里家ニ傍證トメ發スル。アリ其歇以私  
的里ニ於ケル者ハ一時ノ神經證ニメ若干時刻  
ヲ經レハ獨自ラ甦スル。ヲ得ルナリ

治法 先潜蟄セル生カヲ喚起シテ心肺ノ運營ヲ  
振發セシメ而後ニ運營妨碍ノ所因ヲ除カン  
ヲ要ス其先潜生カヲ喚起スル所以ハ夫感應力  
ノ現セサレハ刺衝ヲ感受スル者無キカ故ニ百

方皆無益ニ屬スレハナリ而。生カヲ喚起スルニ  
必需ノ者ニアリ温煖ト新鮮氣ト是ナリ故ニ先  
患者ヲ新鮮氣内ニ移シ温タル羽蓐ヲ被ヒ或ハ  
煖灰温沙ヲ以テ其體ヲ埋ミ或ハ温メタル物品  
ヲ心窩。胛間。足蹠ニ外貼メ屢之ヲ交換シ活體ノ  
温ヲ用  
佳ルヲ殊ニ又鹽灰若クハ精氣強キ藥品ヲ加ヘタ  
ル温湯ニ浴セシムヘシ斯ノ如ク蒸々温保スル  
ノミニメ獨自ラ蘇復スル者少カラス初生兒ノ  
卒死ノ如キハ殊ニ然リトス是實ニ諸他ノ治法  
ノ根基ナリ決メ他伎ヲ間ル。アル。勿レ且之



二無テ氣ヲ口内ニ吹入ルヘシ其鼻ヲ塞テ活人  
 ノ肺中ヨリ出ル氣ヲ殊ニ佳トス其活温ト活氣  
 ト大ニ心肺ノ運營ヲ挑撥スヘケレハナリ清淨  
 氣酸素瓦斯ヲ含マシムモ亦良シゴロキイハス名  
 ノ橐籥器ヲ以テ之ヲ行ヘシ但慎テ過度ニ肺ヲ  
 充張セシムルコト勿レ而布片ヲ胸上ニ置キ之ヲ  
 控キ之ヲ放チテ一弛一張呼吸ノ機ヲ作スヲ最  
 佳トス  
 其次ハ強力ノ刺衝法ヲ以テ心肺ノ運營ヲ挽回  
 スヘシ之ニ直達ト介達ト二法アリ直達法ハ肺

ヲ吹テ之ヲ擴張シ術ヲ須テ呼吸ノ機ヲ作シ越  
 列レキ幾ケル的テ兒ガ瓦ガ爾ニ華ニ尼ニヲ施シ其導子ヲ心窩ト相對  
 生血注入法ニ活體ノ血ヲ患者ノ靜脈ヲ行フ等是  
 ナリ介達法ハ神經及交感機ヲ媒トメ其功ヲ心  
 肺ニ達スル者ニメ即手掌足蹠ヲ摩措シ冷水葡  
 萄酒ヲ心窩ニ滴注シ硃砂精ヲ鼻下ニ接シ或ハ  
 之ヲ舌上ニ滴シ鳥羽ヲ以テ咽ヲ探リ刺衝藥ノ  
 灌腸法ヲ行ヒ心下ニ角法ヲ施シ劇音ヲ以テ聽  
 神經ヲ刺衝スル類是ナリ  
 運營妨碍ノ所因ヲ除クハ縊死ニ索ヲ解キ窒息



ニ毒氣ヲ去リ溺死ニ肺中ノ水ヲ吐カシムル等  
ナルヲ固ヨリ論ヲ俟タス刺絡ノ心肺ノ鬱血ヲ  
疎散スルモ亦肝要ナルヲアリ窒息ノ倒ル者  
ニ於テハ殊ニ之ヲ怠ルヘカラス

實驗ニ由テ之ヲ徵スルニ凡活機ノ復故スル必  
多少ノ時刻アリ知ラサル可ラス卒死セル者日  
ヲ經テ獨自ラ蘇甦スルヲ間アル所ナリ故ニ此  
患者ハ初ニ諸衝動法ヲ舉ケ行フテ而効無レハ  
之ヲ安靜ニ處メ適宜ニ温保シ少時ヲ經テ復行  
ヒ又休シ一行一休持久スルヲ十二時ニメ爾後

ハ夫腐壞ノ兆ノ見ハルマデ温煖ニ保護メ靜  
息セシメンヲ要ス

各種卒死其治法ヲ異ニスル者アリ即凍死ノ如  
キハ等ク温煖ヲ以テ緊要無比ノ者トスレモ其  
温度最微ニメ殆氷点ニ等キ者ヲ用ヒンヲ要  
ス稍其度ヲ踰ユレハ直ニ生カノ餘燼ヲ滅息シ  
テ溶崩腐敗ヲ作スナリ故ニ之ヲ雪中ニ埋メ或  
ハ氷水中ニ置クヘシ生カ仍内ニ存セバ之カ為  
ニ揚發スルヲ得ルナリ諸温煖ノ處置皆之ヲ  
禁ス温用ノ灌腸法モ亦猶害アリトス雷死ハ冷



水ヲ灌漑シ新<sup>タ</sup>土砂ヲ穿テ取テ其頸ニ至ルマ  
テ之ヲ埋没シ且<sup>ツ</sup>刺絡ヲ行ヒ阿芙蓉ヲ用ルラ佳  
トハ炭蒸氣及其他ノ毒氣ニ中テ窒息セル者ハ  
新鮮氣ヲ引キ冷水ヲ灌キ刺絡ヲ施シ醋ヲ用テ  
蒸溺シ又醋ヲ以テ灌腸スヘシ

眩暈 「フルチゴ」  
イセルンゴ 羅蘭

徵候 體外諸物皆旋轉スルカ如ク或ハ其身モ共  
ニ運旋スルカ如キヲ覺エ甚キ者ハ之カ為ニ暈  
倒シ尚<sup>ホ</sup>甚<sup>キ</sup>者ハ視瞻昏瞶シ人事ヲ省セサルニ

至ル此病少年ニ發スルハ怖ルニ足ラスト雖  
氏老人ニ於テハ卒中ノ前兆ナリトス

原由 諸神經病ニ同シ就中胃中飽滿蛔蟲<sup>インハル</sup>印華爾  
屈篤等ノ腸胃病交感ニ出ルヲ多シトス或ハ又  
多血衰弱腦ノ血液鬱積腦ノ形器病ニ因セル者  
アリ

治法 原由ニ準テ或ハ腸胃疎滌法ヲ行ヒ或ハ瀉  
血法ヲ施シ或ハ神經強壯法ヲ用フヘシ冷水ヲ  
以テ頭上ニ灌漑シ或ハ之ヲ以テ頭ヲ洗滌シ芥  
子ヲ加ヘタル脚浴ヲ行ヒ角法ヲ項窩ニ施シ燒



酒拔爾撒謨ヲ前頭顛額耳後項窩ニ擦シヨットル  
ワートル鑛泉名ヲ數日連服セシメ續艸芥子收斂  
亞的兒ヲ内用セシメ或ハ上膊項窩ニ打膿法串  
線法ヲ行ヒ足脚ニ毛製ノ行膝蠟布ノ足袋ヲ著  
スル等ヲ宜シトス而朴屈福烏篤ニ純精酒石ヲ  
配スル者第九十ハ實ニ此病ノ奇藥ナリトス

昏睡

コタルギスロ  
ラールグト蘭

徵候 睡眠常規ヲ踰エテ修ク寤ムルヲ能ハサル  
者是ナリ其修短一樣ナラス時トメハ數週數月

ニ及ヒ或ハ數年ヲ亘ル者アリ余曾テ一患者四  
年昏睡セル者ヲ  
見タリ余カ醫事日記ニ  
詳載ス就テ見ルヘシ而心ノ鼓動血ノ運行肺  
ノ呼吸ノ如キ生命ニ係ルノ機關ハ依然トメ妨  
アルヲナク分泌排泄著シカラス唯流質ノ食餌  
ヲロニ注入シテ以テ其命ヲ繫クノミ且此患者  
多クハ時々少間ノ醒覺ヲ得テ乍復睡リニ著ク  
ヲ常トス

凡此病危險ノ腦病ヨリ來レル者ニ非レハ死ヲ  
致スヲ罕ナリトス慢性ノ神經病及精神病ニ於  
テハ却テ是分利ノ徵ニメ之カ為ニ其病快復ス



ル者アリ

此病ノ輕證唯累リニ睡ニ就ント欲スル者ハ之ヲ嗜眠スラヘイトト謂フ

原由 緩慢ノ昏睡ハ婦人ニ多シトス月經ノ滯止

婚ス可キ年 情意ノ感動神經病精神病等其因ト

ナルナリ或ハ又病毒轉徙ノ腦ヲ侵シ麻疹毒ヲ多トス

腦腔ノ沔乙滲漏。腦髓ノ形器病等ヨリ起レル者

多シ小兒ニ在テ嗜眠昏睡時々發スルハ腦水腫

ノ前候ナリト知ルヘク老人ニ在テハ卒中ノ先

鋒ナリト知ルヘシ



治法 各其因ニ應シテ相當ノ治ヲ下サン<sub>一</sub>ヲ要

ス殊ニ注思シテ其體ノ滋養ヲ保續セン<sub>一</sub>ヲ計

ルヘシ而皮膚刺衝法ヲ施シ刺衝藥ヲ用テ灌腸

シ英堙兒末扶法艾灸法浴法等ヲ行フヲ佳トス

瓦爾華尼モ亦用ヒテ其導子ヲ心窩ト耳中ニ接ス奇効ヲ得シ

トアリ病毒轉徙ヨリ來レル者ハ内外水銀ヲ用

テ其功ヲ收ムヘシ

局處麻痺バラレイシスロカリニ羅アヲ

徵候 體内一部覺動兩機若ハ其一機虛耗シ或ハ



全ク廢失セル者は是ナリ其重キハ血液循環ノ機  
及、榮養補充ノ機モ其弊ヲ被ムル者アリ  
故ニ此病輕重一ナラス其輕キ者ハ唯感覺若ハ  
運動ノ一機減虛セルノミナルアリ或ハ其一機  
全ク廢失セルアリ或ハ其兩機共ニ減虛セルア  
リ廢失セルアリ或ハ脈モ亦衰ヘテ患部ノ温煖  
減耗セルアリ或ハ之ニ加ルニ其部羸瘦虛脱セ  
ルアリ或ハ其機質頹敗ノ寒壞疽トナレルアリ  
或ハ全軀憔悴シテ恰モ木乃伊ノ如キニ至レル  
アリ

凡、身體各部内外ヲ論セス此患ニ罹ラサル所ナ  
シ其患部ノ異ニ隨テ證狀同シカラス名稱モ亦  
等シカラス即チ五官麻痺。腸管麻痺。呼吸器麻痺等  
アリ一々枚舉ニ違アラス

此病卒中ノ餘患ナル者アリ局處ノ因ニ原キ起  
レル者アリ急發ノ者アリ徐來ノ者アリ痙攣ヲ  
兼ル者アリ痙攣ト交換スル者アリ

之ヲ統フルニ畢竟難治ノ一病ナリ而其治不治  
ハ專ラ病ノ新舊ト部位ト原因ト輕重トニ係ル  
乃チ日ヲ經ルト愈久キ者ハ愈治シ難ク。五官ヲ侵



セル者ハ甚タ癒工難ク。病毒轉徙ヨリ来レル者ハ少<sup>ヤ</sup>治シ易ク。真ノ虚脱ヨリ生セル者ハ治シ難ク。除ク可ラサル形器病有テ其壓迫ノ為<sup>ニ</sup>起レル者ノ如キハ治ス可ラス。感覺ノミヲ失セル者或ハ運動ノミヲ廢セル者ハ少<sup>ヤ</sup>治シ易ク。兩機共ニ廢失セル者ハ治シ難ク。其部ニ痙攣疼痛ヲ覺ユル者ハ仍<sup>ホ</sup>治スベク。其部ノ榮養衰敗セル者ハ甚タ治シ難シ

原由 近因ハ神經ノ所患ニノ多少其運營ノ機關ヲ失フ者ナリ而其運營ヲ妨クルノ因直<sup>チ</sup>ニ患部

ニ在ルアリ神經ノ根本腦脊髓ニ在ルアリ其中途

節神經ニ在ルアリ之ヲ注思スル<sup>一</sup>治術ニ於テ緊

要ナリトス乃<sup>チ</sup>卒中及脊髓病ヨリ来レル者ニ於テハ其根本ヨリ起リシ<sup>一</sup>顯著ナリト雖<sup>モ</sup>毎證必<sup>ス</sup>シモ然ラス實ニ神經ノ末梢ヨリ生シテ根本ニ及フ者アリ

世人此病ニ於ケル神經ノ所患ヲ以テ皆其運營ノ虚脱ニ歸スル者多シ甚タ歎スヘシトス固<sup>ト</sup>ヨリ然ル者アリト雖<sup>モ</sup>毫<sup>モ</sup>虚脱セル所ナク唯神經カノ進輸ヲ支フルノ因<sup>ニ</sup>有テ其運營抑遏セラ



ル、ニ起レル者多ニ居ルナリ故ニ此病ヲ兩種  
ニ分テ虚脱麻痺ト抑遏麻痺トニ區別ス  
抑遏麻痺ノ因種、アリ或ハ血液全軀若ハ一部  
ニ鬱積充張メ神經ヲ壓迫スルニ由リ或ハ病毒  
轉徙メ神經ヲ襲ヒ以テ其運營ヲ害スルニ由リ  
或ハ交感神經肋間對神經ノ作用ニ由テ腸胃ノ刺衝  
遠隔セル部ニ痙性ノ妨碍ヲ起スニ由リ或ハ緊  
縛腫脹硬腫溢血脱臼骨傷等ノ形器性壓迫ヲ受  
クルニ由ル等ナリ痙性麻痺モ亦之ニ屬ス是其  
神經真ニ虚スルニ非スノ強實ナレ氏痙攣ノ為

ニ其運營ヲ現スルヲ能ハサルノミ故ニ此證ハ  
痙攣痛ト交代スルヲ多シ  
虚脱麻痺ハ一部ノ神經力ヲ奪却シ若ハ衰耗セ  
シムルノ諸因ヨリ來ル之ニ頓ト漸トアリ其頓  
ニ奪却スル者ハ卒中電火驚愕等ノ如キ是ナリ  
其漸ニ衰耗セシムル者ハ過劇ノ刺衝非常ノ勞  
力房事過度熱病殊ニ神經熱及其他衰弱ヲ起スノ諸  
病是ナリ或ハ久ク一部ノ運動ヲ廢セルヨリ起  
ルノ麻痺モ亦之ニ屬ス

治法 先其病ノ虚脱證ト抑遏證トヲ辨センヲ



要ス兩證大ニ其治ヲ殊ニスルノミナラス其取  
ルト與ルト霄壤全ク相反スルカ故ニ之ヲ謬マレ  
ハ大害ヲ致スヲアレハナリ此病ニ遇フ毎ニ皆  
之ヲ虚衰ニ起レル者トメ刺衝法強壯法ヲ行フ  
徒アリ臆測已甚シト謂フヘシ古來是ニ由テ大  
過ヲ為セル者少カラストス

是故ニ抑遏麻痺ニ於テハ必ス先其抑遏ノ因ヲ除  
クヲ以テ始メトスヘシ或ハ唯是ノミニメ全功  
ヲ收ムルコトアリ即チ血液鬱積或ハ焮衝状ノ患ヒ  
ヨリ起レル者ハ瀉血ヲ行ヒ防焮法ヲ處シ病毒

轉徙ヨリ来レル者ハ芫菁膏ヲ貼シ打膿法ヲ施  
シ各毒相當ノ諸藥ヲ用ヒ腸胃ノ交感刺衝ニ出  
ル者ハ解凝法ヲ行ヒ峻下藥ヲ與ヘ奇驗アル  
器性ノ壓迫ニ由レル者ハ外科術ヲ用テ之ヲ除  
去スル等是ナリ此諸法ヲ竭シテ痲證仍依然タ  
ル時始メテ神經力興奮ノ治法ニ移ルヘシ次條  
ツ出

虚脱麻痺ニ於テハ始ヨリ直ニ有カノ強壯内托  
藥ヲ用ヒ兼テ神經力興奮ノ治法ヲ處スヘシ  
凡、麻痺病ノ治法ニ於テ知ラサル可ラサルノ要



扶正遺訓 卷之十一  
訣ニアリ其一ハ用藥ノ分量一次ハ之ヲ増シ一  
次ハ之ヲ減シ或ハ少<sup>シ</sup>馬<sup>ラ</sup>休止シテ以テ自然良能  
ニ其感應カヲ採拾スルノ餘暇ヲ與ヘ尚且其藥  
品ヲ時ニ交換メ刺衝ヲ新ニスルナリ其二ハ忍  
テ時日ヲ俟ツナリ是此病ニ於テハ醫ノ欠ク可  
ラサル所トス自然良能モ患部ノ生氣ヲ徐クニ  
蘇復セシムルニハ必ス若干時日ヲ費サ、ル可ラ  
ス故ニ之ヲ俟ツ<sup>レ</sup>ヲ知ラサル醫ハ此病ヲ療ス  
ル<sup>レ</sup>能ハス獨數週ノミナラス數月數年ヲ其治  
ニ費サン<sup>レ</sup>ヲ要ス然クスル時ハ早晚内外ニ良

候ヲ現ハス<sup>レ</sup>有ルヘシ今歲治スル<sup>レ</sup>能ハサリ  
シモ翌歲ニ至テ成功ヲ遂クル<sup>レ</sup>アリ

神經力興奮治法 神經内ハ蓋一種ノ元素有テ存  
在シ以テ其カヲ起シ其運營ヲ致ス者ナリト想  
見セン<sup>レ</sup>ヲ要ス瓦爾華尼ノ作用ヲ以テ之ヲ證  
スヘシ其感動唯ニ抵觸ノ刺衝ニ非ス<sup>レ</sup>神經自  
家ノ運用ヲ致ス者アル<sup>レ</sup>昭々タリ而其元素々  
ル誘去ルヘク持来スヘク推積スヘク障碍スヘ  
ク又遏止スヘシトス

神經力衰敗ノ半死廢セルヲ興奮發揮スルニ二



法アリ其一ハ局處刺衝ナリ是其運動ヲ増發シ  
且血行ヲ催進スルカ故ニ大ニ神經カラ發揮ス  
其法直ニ之ヲ患部ニ施スト他部ニ行テ交感セ  
シムルトアリ而乙法ハ甲法ニ優ルヲ屢多シ就  
中腸胃ノ刺衝ヲ殊ニ佳トス交感神經ノ循ル  
最多ケレハナリ其二ハ内ヨリスルノ興奮ナリ  
精神ノ鼓舞ル腦ヨリスト血行ノ催進ル心ヨリスト  
ヲ其最ナル者トス

此法ニ用フ可キノ醫藥ハ則吐藥催嘔藥第九十  
七方  
少量ノ峻下藥格磔莖篤丁幾十滴至十五滴日  
ニ三次服スルヲ殊ニ佳トス石

砂精。鹿琥精。鹿角鹽。亞兒尼加。纈草等ノ揮發神經  
藥。及拔爾撒謨性藥。芫菁。鼠婦蟻ハ  
蜂ノ類等ノ小蟲類。加耶普的油。纈草油第九十八方  
第九十九方實百  
兒油等ノ揮發油。羯布羅亞的兒。升汞亞的兒第百  
四方  
微毒ヨリ來レル者ニ殊ニ良シ其他病  
毒轉徙ニ因セル者皆用テ奇功アリ 燐或ハ莖  
芫菁。實芫荽里斯者ニ殊ニ用フヘシ 蕃椒。阿芙蓉。  
番木鱉第百方  
偉効等是ナリ此諸藥又洗藥。蒸藥。  
軟膏等トメ外用スベシ第百一方  
第百三方其他摩擦。  
亂刺。鞭撻尋麻ヲ  
以テス芥子泥。芥子浴。芥子蒸。芫菁硬  
膏。艾灸法等ノ皮膚刺衝或ハ騎馬。御車等ノ形器



性振盪或ハ眼ニ於ケル光輝耳ニ於ケル劇聲舌  
ニ於ケル辛温味等ノ如キ各部相當ノ刺衝或ハ  
諸地ノ温泉冷泉海鹽浴羅倨浴硫黃浴鐵浴麥芽  
浴麥酒醇浴燒酒糟浴滴浴射注浴等ノ諸浴法ヲ  
行フ類皆撰用スヘシ

醫藥ノ外此ニ用テ最偉功アル者ハ温煖ト越列  
幾的兒トナリ温煖ヲ用フルハ即チ毛布羊皮猫皮  
等ヲ以テ温覆シ温湯ニ浴シ重キ者ハ發汗蒸氣  
浴ヲ總身若クハ患部ニ行ヒ頑證ハ直チニ燃火ニ  
接スル等ニメ殊ニ活體ノ温煖ヲ奇驗アリトス

故ニ活物ニ膚接シ或ハ新ニ活獸ヲ割截メ患部  
ヲ挿ミ入ルヲ佳トス亦地中ノ自然温モ功アリ  
温泉ノ熱處ニ浴スルカ如キ是ナリ而寒冷モ亦  
神經ニ一時ノ刺衝ヲ為スカ故ニ又能ク興奮ノ  
功ヲ致スフアリ冷水滴浴射注浴灌漑法等ノ良  
効アル所以ナリ越列幾的兒ハ神經ト交力親昵  
ナルヲ以テ此病ニ殊ニ妙効アリ之ヲ行フニハ  
最弱ノ度ヨリ漸ク進テ最強ニ至ルヘシ即チ或ハ  
越列幾浴法未詳トメ之ヲ行ヒ或ハ身體ニ一入一  
出セシメ或ハ越列幾火ヲ發セシメ或ハ振動ヲ



起サシムル等ナリ瓦爾華尼モ亦同功ナリ但軟  
脆ノ部ニハ之ヲ施シ難シトス其織質ノ變ヲ作  
シ易ケレハナリ麻屈涅扶石モ亦諸法驗ナキ  
者ニハ試ムヘシ奇功ヲ奏スルアリ  
英堙兒末扶法モ亦用フヘシ其法豆大ノ芫菁硬  
膏ヲ一部ニ貼メ表被ヲ剝離シ番木鱉越幾斯摸  
爾比涅莨若等ヲ敷クナリ箕作氏著ス所ノ名醫  
彙講詳ニ之ヲ論載ス  
但之ヲ行フニハ大ニ其分量ヲ謹ムヘシ其藥力  
間内服スルヨリ強キ有レハナリ而之ヲ施ス  
ノ部ハ患部ニ循ル神經ノ根本ニ近キ處ヲ撰ム

ヘシ  
神識ニ關カルノ感動亦大ニ功有ルアリ即或  
ハ志願ヲ固守シ或ハ一部ヲ動サントスルノ努  
カラナシ或ハ想像カラ揚發シ或ハ神佛人為ヲ  
擇ハス強ク物ヲ信仰スル等ナリ就中信仰ハ不  
測ノ奇効ヲ奏スルアリ  
余カ實驗ニ據ルニ每常良功ヲ得シ者ハ吐藥催  
嘔丸第九十升汞垂的兒尼加番木鱉格碌莖  
篤丁幾越列幾的兒テプリツアーケンウイスバツ  
テンガステイン以上皆地名等ノ温泉浴麥芽浴六北

扶氏遺川 卷之卅一 三十 通 齋 藏



至十二北怒布二北燒酒麥酒醇浴燒酒醇浴魯西  
醇六北至十二北和湯ニ混スル者カ未詳等是ナリ

又脊髓麻痺ナル者アリ尋常之ヲ下肢麻痺ト名  
ク其麻痺一脚若クハ兩脚ヨリ始マリ或ハ一手  
ヨリ起リ漸ク諸部ニ瀰蔓ス其始行步動搖メ定  
ラス脊椎ニ壓重疼痛或ハ酸痛ヲ覺ユ其脊髓ヨ  
リ起レルヲ徵シ且病ノ所在ヲ檢スルニ一試  
法アリ烘リタル海綿ヲ取テ脊骨上ヲ按撫シ下  
レハ患部ニ當テ必疼痛ヲ知覺スルナリ此病數  
年或ハ生涯連綿メ他部ニ蔓延セス唯外部ニノ

止ルナリ或ハ又進テ十全ノ不遂ヲ起シ終ニ  
内臓ニ及テ直腸膀胱麻痺シ大小便秘閉或ハ失  
禁等ノ證ヲ來シ或ハ呼吸不利視力乏弱思慮虛  
衰肺癰腦癰中等ニ陷ル者アリ其原因必常ニ脊  
髓中ニ在リテ脊骨屈曲等ノ形器性壓迫ニ起レ  
ル者アリト雖氏又房勞手媼ノ為ニ脊髓虛脱セ  
ルヨリ來リ或ハ儻麻質伊倔篤瘰癧等ノ病毒轉  
徙ニ因シ或ハ血液鬱積遷延焮衝等ヨリ生セル  
ヲ多シトス其治法亦專ラ脊髓ニ行ヒ前段ニ舉  
クル麻痺治法皆之ヲ用フヘシ就中血液鬱積證



アル者ハ蟻鍼ヲ脊骨上ノ患部ニ貼シ冷濕法ヲ  
行フヲ殊ニ佳トス而艾灸法ヲ屢脊骨上ニ施シ  
テ又ク打膿セシムルヲ此病ノ主法トシ興奮劑  
ニハ的列並油ヲ主藥トシ三十滴宛日ニ四回用  
テ殊効アリ若夫徽毒ニ起因セル者等ハ脊髓勞  
ノ條ニ舉クル所ノ治法ヲ行フヘシ

本條ト參  
考スヘシ

### 膈噎

「デイスバギア」  
「デスリッゲ」  
「ロルヒ」

徵候 疼痛焮衝等ノ諸證ナクメ飲食ノ嚥下ヲ妨  
クル者はナリ病増進スレハ全ク嚥下スルヲ能

ハスメ乃饑餓ヲ極ムルニ至ル

原由 此病モ亦左ノ因ニ隨テ種別ヲ致スナリ

其一 痙攣

「ハイス」  
「ステリ」 歇以私的里ノ傍證トメ發セル者常

ニ多シ

所謂梅核  
氣ノ類

此證發歇スルヲ常トスレハ亦

稽留スル者アリ

其二 麻痺 卒中及半身不遂後ニ發セル者多シ

其三 病毒轉徙

徽毒「イダト」伊倨篤瘰癧ヨリ來レルヲ

多トス

其四 形器性妨碍 食道若ハ氣管頭ニ位セル腺

ノ腫脹硬結ニ由リ或ハ食道ノ一部開濶メ副囊



ヲ為スニ由レル等ナリ此病夫牛齡證ヲ兼ル者多キハ此副囊アルニ由

蓋此病ノ素因ハ住地卑濕喫茶過多或ハ好テ熱飲ヲ服シ或ハ常ニ冷飲ヲ多クシ或ハ燒酒ヲ過飲セル等ニアリ是此病ノ殊ニ和蘭地方ニ多キ所以ナリ

治法 各其原因ニ準テ之ヲ處スヘシ即瘵癰性ノ者ハ先ツ其瘵癰ノ因ヲ除ンテヲ要ス故ニ内臟壅塞ヲ疏解スル等依ト昆垓兒歇以私的里ノ治法ヲ行ヒ外用ニハ的里亞加菲阿斯失鳩答ノ蒸漏

法ヲ施シ瓦爾拔奴謨膏ニ雜腹蘭鹿角鹽阿芙蓉ヲ和メ外貼シ芥子泥芫菁硬膏ヲ施シ内服ニハ菲阿斯越幾斯老利兒結爾斯水阿芙蓉葭若ヲ用フヘシ加耶普的油モ亦總テ咽喉及胃ノ瘵癰ニ偉効アリトス沙糖ニ研和シ與ヘテ良シ麻痺性ノ者ハ流動物ヨリモ麤硬ノ品ヲ嚥下スルト易キナリ芫菁硬膏ヲ外貼シ加耶普的油薄荷油沙糖ヲ研和ス芥子極末芫菁丁幾ヲ内服スル等ノ揮發衝動法ヲ行ヒ越列幾的兒等ノ強劇刺衝ヲ施スヲ佳トス」病毒轉徙證ハ其病毒ヲ誘導シ去ルト瘵



擣病毒刺衝ノ為ニ必ス之ヲ兼發ス ヲ鎮靖スルトヲ以テ主トス

ヘシ故ニ前ニ舉クル諸鎮瘻藥皆之ヲ用ヒ項窩

ニ芫菁膏ヲ貼シ遠隔ノ部從前病毒ノ位セシニ

發泡打膿法ヲ施シ芥子脚浴ヲ行ヒ蠟布襪ヲ著

シ硫黃浴ヲ用ルニ宜シ且之ニ無テ各毒相當ノ

治法ヲ處スヘシ此證ニハ水銀ヲ用テ吐涎セシ

ムルモ亦奇効アルヲアリ流涎過閉ヨリ來レル

者ニハ愈然リトス形器性妨碍ハ腺腫ヲ最モ多

シトス此證ハ失鳩答海綿燒灰伊阿曹母オオモヲ内服

外用シ鹽酸重土第百五方水銀劑等ヲ用ヒ水銀軟膏

ヲ擦シ斷エス失鳩答硬膏ヲ外貼シ瑞香皮打膿

ヲ上膊ニ施スヘシ或ハ海綿燒灰ニ失鳩答越幾

斯ト亞兒尼加越幾斯ヲ和メ錠ト為シ舌上ニ置

テ徐クニ融解セシムルモ亦偉効アリ

此病不治ノ證ハ總テ乳汁ヲ用テ其命ヲ保續ス

ルヲ無比ノ良策トス又之ヲ以テ灌腸シ或ハ浴

湯ニ加フルモ可ナリ

不語及失聲アホニアスヘイドア蘭テイスポニアア羅

ステムメロ  
スヘイド蘭



不語ト失聲ト自別アリ不語ハ言語スル一能ハ  
サルナリ失聲ハ音聲ヲ發スル一能ハサルナリ  
不語ニ全然ノ證ト不全ノ證トアリ其常住持續  
スル者ハ天稟ニ由リ或ハ麻痺ニ由レルナリ時  
有テ發歇スル者ハ痙攣ナリ天稟不語啞瘖ハ皆耳  
聾ヲ兼ル者ニメ其本因通例耳中諸器ノ變質ニ  
在リ故ニ其治唯聽ク可キノ言語ニ代フルニ視  
ルヘク觸知スヘキノ事業ヲ肆ナラハシ文字ヲ教ヘ  
テ以テ言語ヲ通セシムルニ在リトス然レ氏亦  
此種ノ患兒ニ麻痺ヲ治スルノ藥ヲ用テ少其聽

識ヲ得セシムヘキモ無キニ非ス余曾テ一兒ニ  
莨菪ヲ與テ奇驗ヲ得タル一アリ又曾テ一兒能  
ク聽テ言フ一能ハサル者ヲ見シ一アリ是唯言  
語ヲ主ル器ノ病ナリトス麻痺性不語ハ專ラ麻  
痺ノ治法ヲ行フヘシ就中芥子「胡椒」ヲ嚼  
ミ加耶普的油ヲ舌ニ塗リ越列幾的兒「瓦爾華尼」  
ヲ施ス等ヲ良トス發歇性不語ハ皆痙攣ナリ小  
兒ニ於テハ蛔蟲ノ所為トシ大人ニ在テハ歇以  
私的里秦漢虞精神錯亂ノ傍證トス各其因ニ隨  
テ治法ヲ處スヘシ不全證ハ言語艱澁ナル者ニ



シテ種々其類ヲ異ニス或ハ言ント欲スルノ語  
ヲ出ス<sup>タ</sup>能ハサルアリ或ハ言ント欲スルノ語  
ヲ錯マルアリ兩證共ニ其罪精神ニ在テ想像カ  
ノ病ニ屬ス或ハ又分明ニ言フ<sup>テ</sup>能ハサル者ア  
リ<sup>吃</sup>其罪亦精神ニ在テ言語ヲ構成スル<sup>テ</sup>ノ宜  
シカラサルニ坐ス是多クハ其意前<sup>ス</sup>テ其語後<sup>ル</sup>  
ルニ在ルナリ故ニ謳歌スル時ハ蹉跌セス蓋是  
其精神歌節ヲ踏テ其語ヲ構成スレハナリ然レ  
<sup>氏</sup>又舌下<sup>變</sup>度短縮等ノ形器病ニ因セル者アリ  
或ハ其舌ノ言語ニ熟セサルヨリ来レル者アリ

治法其形器病ヲ除クハ固論<sup>ヲ</sup>俟ダス屢揚聲讀  
書シテ舌ヲメ徐々ニ言語ニ馴レシメン<sup>テ</sup>ヲ要  
ス頑固證ハ近來發明セル<sup>レ</sup>ハ<sup>ハ</sup>未<sup>人</sup>名<sup>カ</sup>ノ療法  
ヲ施スヘシ其法舌ヲ上方ニ向ハシメ断エス之  
ニ慣ハシムルニアリ

失聲モ亦全然證ト嘶<sup>ハ</sup>スル者トアリ其因<sup>ハ</sup>聲音  
器<sup>喉</sup>頭<sup>五</sup>軟骨<sup>ト</sup>被ヘル粘液膜ノ變常ニ在ルヲ多シ  
トスレ<sup>氏</sup>亦此器ニ循ル神經ノ病患ニ係レル者  
少<sup>ナ</sup>カラス粘液膜變常ハ感冒ヨリ来ルヲ常トス  
然ル者ハ感冒ノ治法ヲ處シ殊ニ硫黄安質没扭



ヲ用フヘシ若夫頸ノ瘰癧腫或ハ病毒轉徙微毒  
ト多ヨリ起レル者ハ各毒相當ノ藥ヲ用ヒ誘導  
法ヲ施シ咽喉勞ノ初起タルヲ察セハ本條ニ  
照シテ其治法ヲ行フヘシ其神經ノ病患ニ因セ  
ル者ハ總身衰弱ノ一傍證ナルアリ瘰癧證ナル  
アリ或ハ心肺ニ循レル神經ノ攣急ナルアリ宜  
ク強壯法鎮瘧法ヲ行フヘシ

胃弱 「アペプシア」  
「クテハンマー」  
「ロズ」  
「ラン」

徵候 食欲減少シ若クハ缺損シ若クハ節度ナク

食後胃部痞滿シテ食セシ所ノ者ト同味ノ暖氣  
ヲ發泄シ風氣膨脹シ神思鬱重シテ睡眠ヲ嗜ミ  
早ク酸液ヲ釀シ常ニ粘液ヲ生スル等總テ消食  
宜シカラサルノ諸徵ヲ呈スル者是ナリ

原由 攝養宜シカラスノ節度ナク常ニ美食ヲ貪  
リ頻リニ温飲殊ニ茶ヲ喫シ肢體ヲ運轉セズ精神  
ヲ勞苦シ悲憂ヲ極メ房事ニ耽ル等皆此病ノ因  
トナル

治法 先其證ノ真假ヲ辨センヲ要ス假證ハ胃  
神經ヲ妨クル所ノ有形ノ因有テ之カ為ニ假ニ



弱證ヲ現ハスナリ若シ誤テ之ニ強壯ノ劑ヲ處ス  
レハ啻ニ功ナキノミナラス却テ病ヲ進悪セシ  
メ其病毒ヲメ固著セシムルニ至ル

胃及消化機ヲ衰弱セシムル有形ノ因ハ即粘液  
膽液酸液等ノ胃中汚物或ハ痺麻質伊屈篤疥癬  
等ノ病毒轉徙若クハ局處多血ナリ各自其因ニ  
準テ或ハ之ヲ疏滌シ或ハ之ヲ他部ニ誘導スル  
等相當ノ治法ヲ行ハスンハアラス間他技ヲ費  
ス<sub>1</sub>ヲ要セスメ全功ヲ收ムル<sub>1</sub>アリ唯蜚蠊ヲ  
貼シ痔疾ノ療法ヲ處スルノミニメ胃ヲ強健ニ

シ消食機ヲ恢復スルノ良驗ヲ得シ者少ナカラ  
ス

若夫真證胃弱ナルカ或ハ有形ノ因ヲ除ケ氏仍  
依然タル者ハ真ノ健胃藥ヲ用ヒン<sub>1</sub>ヲ要ス其  
最<sub>モ</sub>功アル者ハ格綸僕健質亞那括失亞苦麥酒忽  
布盧會等ノ苦味藥ナリ但盧會ハ分量ニ意ヲ用ヘシ其他白椒  
每朝空心六個乃至九個ヲ吞ム連用スレハ甚タ奇効アル<sub>1</sub>余カ實驗スル所ナリ橙皮姜  
肉豆蔻葛縷子銳烈多精ノ古酒等ノ芳香辛味藥  
ヲ用ヒ虛弱甚シキ者ハ橙皮丁幾洸氏幾那丁幾  
等ヲ收斂亞的兒ニ合和シ或ハ<sub>1</sub>エリッシルヒトリ



オルメインシクト附等ノ如キ鑛酸ト辛芳藥ノ

合劑ヲ與ヘ或ハ剛鐵ヲ苦味辛芳ノ藥ニ伍シ用

ヒ第百六方或ハヒルモンテル方地等ノ鐵泉ヲ内服外

用スルヲ佳トス第百七方撰用ス第百八方外用ニハ

強壯軟膏詳方未健胃硬膏附等ノ揮發拔爾撒謨性

ノ劑ヲ胃部ニ貼シ其功大ニ内服藥或ハ末篤栗

加利精附捲埵兒拔爾撒謨非答附ヲ洗劑トシ或

ハ小囊ニ芳香辛味ノ藥ヲ盛リ屢燒酒ヲ注テ之

ヲ沾シ以テ心下ヲ慰シ或ハ強壯浴法ヲ行フ等

皆宜シ而寒冷モ亦用テ屢頑固ノ胃病ヲ治セル

トアリ即先ッ冷食及氷片ヲ喫セシメ次テ冷水ヲ

以テ胃部ヲ洗ヒ或ハ冷滴法ヲ行フ等是ナリ

此病モ亦感動ノ遲敏ニ注意メ右ノ治法ヲ處セ

ントヲ要ス其銳敏ノ者ニハ固性ノ強壯藥皆害

アリ宜ク唯揮發ニメ消化シ易キ品ヲ撰用スヘ

シ此病單胃神經ノ衰弱ノミニニメ其運營ノ變調

ナル者アリ此證ハ多ク發故ニ續草橙皮越栗失

爾赫篤里沃利亞的兒等ノ神經藥鎮痙藥ヲ用テ

健胃ノ良功ヲ奏スルト多シ

其他患者ノ攝生最嚴ナラントヲ要ス攝生宜シ



カラサレハ健胃ノ諸法ヲ盡ス凡唯勞シテ功ナ  
キノミ即諸温熱ノ飲料就中泡茶酸性ニノ風氣  
ヲ釀シ易キ植性ノ食物油脂乾酪焙炙ノ品乳汁  
ノ過用焼酒ノ過飲及飽食等ヲ嚴ニ禁スヘシ但  
炙肉ハ用テ益アリトス又身體ノ運轉ハ殊ニ缺  
ク可ラサルノ要事ナリ胃ヲ强健ニスルノ最良  
藥トナルヲ多シ

異嗜「マラシア」  
「ア」  
「子」  
「ゲ」  
「蘭」

此病ノ他病ニ傍發スル者時トメハ自然良能ノ

指揮ニ出ルヲアリ即腐敗病ノ酸味ヲ好ミ酸液  
家ノ土質ヲ嗜ムカ如キ是ナリ然レ凡亦病トメ  
来ル者モ少カラス即萎黃病ノ石灰土ヲ貪ルカ  
如シ其他歇以私的里鬱憂病蟲病等種々ノ異嗜  
ヲ兼發スルヲアリ各其本病ノ治法ヲ用フヘシ

陽精無カ「イム」  
「ポ」  
「テ」  
「チ」  
「ア」  
「ロ」  
「マ」  
「ン」  
「子」  
「レ」

徵候 娠孕セシムヘキノ交媾ヲ為スヲ能ハサル  
者是ナリ其種類多端ニメ輕重大ニ差等アリ百  
方ニスレ凡絶テ娠セシムルヲ能ハサル者ハ之



ヲ真證無カト謂ヒ唯時日配匹等ニ由テ然ル  
能ハサル者ハ之ヲ假證無カト謂フ假證無カハ  
其配匹充分ニ受胎ノ質ヲ具ル者ニ遇ヘバ仍能  
ク孕セシムルヲ得ヘシ此病陰莖全ク勃起セ  
サルアリ萎陰交媾ノ際精液射出早キニ過クルア  
リ全ク精液射出ノ機ヲ缺ケルアリ

原由 凡交媾ヨク其娠孕ノ機ヲ遂クルニハ三個  
ノ要鍵アリ第一精液其限定ノ地位ニ達セズ  
ハアラス第二精液能ク生活ヲ起ス可キノカラ  
含蓄セズンハアラス第三男之ヲ授クルニ能ク

新活物ヲ造為スヘキ度ニ適スルノ生力興奮有  
テ女亦之ヲ受クルニ能ク其度ニ適スルノ生力  
興奮ナクンバアラズ此故ニ之ヲ妨クルノ所因  
頗ル多シ或ハ龜頭ノ包皮狹窄尿道ノ瘻肉腫脹  
若ハ尿癭ノ為ニ路ヲ外ニ取レル等ノ如キ形器  
性ノ妨碍アルアリ或ハ精液ノ質稀淡ニメ刺衝  
カナク若ハ其製造宜シカラスメ不足シ若ハ之  
ヲ費スル多キニ過クルアリ或ハ神經力筋力劣  
弱ニメ陰具感動セズ勃張スルヲ能ハサルアリ  
故ニ高老ノ年齢重病ノ後勞力過度苦心勞思悲



愁哀傷房事ヲ過シ手淫ニ耽ル當今最多等其因  
 ト為ル或ハ又慾火熾盛ナルカ為ニ陰具ノ彊直  
 甚クメ精液ノ通路ヲ闔チ其射出ヲ遮キル者モ  
 間之ナキニ非ス  
 其因又對匹ノ好嫌氣稟ノ同シカラサル等或ハ  
 當時ノ模様ニ管スルヲアリ故ニ這婦ニ遇テハ  
 無カナルモ那女ニ交テハ能ク孕セシメ或ハ一  
 時身心ヲ疲勞スルヲ甚キカ若クハ他事ニ思慮  
 ヲ傾クル際ハ妊セシムルヲ能ハサルモ一時ニ  
 在テハ能ク然ルヲ得ル者アリ

治法

總身及局處

陰具

ヲ強壯治起セシムルニアリ

即シテ幾那シテ括シテ失シテ亞シテ格シテ綸シテ僕シテ鐵シテ格シテ碌シテ屈シテ斯シテ末シテ兒シテ扶シテ斯シテ等シテノ

強壯藥第百十方第百十有力ノ古酒香竄藥華尼

効ア等ヲ用ヒ鐵泉浴海水浴冷滴法脊骨ノ下部

トス等ヲ行ヒ芥子煎汁忽弗滿鎮痛液忽爾密

加精附等ヲ以テ陰部ヲ洗ヒ第百十越列幾的兒

ヲ施ス等是ナリ虛憊甚クメ感動遲鈍ナル者ニ

ハ謹慎シテ芫菁丁幾三四滴宛服セシメ或ハ燐

四分ハ之一宛ヲ收斂亞的兒ニ溶和メ用ヒシム

ルモ亦良シトス而兼ルニ卵肉羹汁肉食牡蠣蝸



牛叔格刺度沙列布鹿角膠等ノ滋養物ヲ與フヘ  
夫手姪過房ノ後ニ來レル者ノ如キハ最モ治  
シ難シトス然レモ此證必シモ其望ヲ絶ツ可キ  
ニ非ス余曾テ此患者ニ精神ノ刺衝皆之ヲ避ケ  
開豁ノ清氣ヲ引カシメ早起ト肢體ノ運轉トラ  
命シビロモント泉鑛ヲ内服外用セシメテ遂ニ  
復數健兒ノ父ト為リシヲ實驗セルコトアリ  
其他此病ノ施療ニ於テ患者ノ精神意識ニモ注  
目センコトヲ要ス懇慕甚クメ自慰ムルコト無キ等  
此病ノ因ト為ルコトアリコト云ンテル氏ノ話説ニ云

一男子娶迎ノ日ヲ期テ空ク時ヲ移スコト久ク其  
情ニ堪ヘサルニ及テ女乃至レリ此ヨリ連霄枕  
席ヲ共ニスレモ姪事ヲ行フコトヲ得ス是ニ於テ  
之ニ諭スニ新婦ノ蓐ニ入ルモ斷メ彼ト膚接セ  
サルノ意ヲ起サンコトヲ以テス爾後二三夜ニメ  
果シテ快美ヲ遂クルコトヲ得タリト是其例ト為  
スニ足レリ  
或ハ又男子甚々虚弱ニメ無カナレモ其婦少壯  
ニメ感動甚々銳敏ナレハ能ク其缺ヲ補テ懷胎  
スルコトアリ亦知ラサル可ラサルナリ



女子ノ不孕病ハ後ノ婦人門ニ詳説ス

黒障眼アマウロシス 羅ロ 蘭ラン

徵候 眼液濁ラス眼膜曇ラスメ物ヲ視ルコト能ハ  
ス瞳子散大シテ收縮シ難ク或ハ全ク收縮ノ機  
ヲ失フ者是ナリ所謂視力乏弱病ハ即此病ノ輕  
證トス而眼火閃發空中ニ異光ヲ見眼内ニ電火  
ヲ覺ル等ヲ此病ノ傍證トシ亦之ヲ前兆トス或  
ハ又此病瞳子散大セス却テ縮小セル者モ罕ニ  
之アリ

原由 麻疹病ノ諸因皆此病ヲ將來ス就中視力ヲ  
非常ニ勞スル等ノ刺衝過度ト病毒轉徙トヲ殊  
ニ多シトス

治法 難治ノ一病ニメ全治スル者甚タ鮮ナシ宜  
ク先麻疹病ノ通治法ヲ行フヘシ但其部位ノ脫  
弱ナルニ意ヲ注カンコトヲ要ス其血液鬱積ニ起  
レル者ハ其血ヲ誘導シ病毒轉徙ヨリ來レル者  
ハ其毒ヲ驅除シ腸胃ニ因セル者ハ吐下藥ヲ用  
ヒ吐酒石及第九十七方ノ催嘔丸偉効アルコトアリ而後内外ヨリ神經治  
法ヲ行フヘシ其部位感動銳敏ニメ脆弱ナルカ



故ニ外用法ハ殊ニ大ニ謹慎ヲ加ヘサル可ラス  
少刺衝ヲ過セハ益ナクメ却テ大害ヲ致シ易ケ  
レハナリ而其偉効アル者ハ纈草。亞兒尼加。白頭  
翁。葭若。越列幾的兒。麻屈涅扶斯等ナリ

耳聾 コホシス羅ド  
フヘイド蘭

原由 病毒轉徙ヨリ来レル者最多シ就中聖京屈。  
儂麻質ニ因スルヲ常トス其他血液鬱積。腹内壅  
塞。神經衰弱。過強ノ物響機質ノ變常等ヨリ起  
ル者亦少カラス

治法 必先水銃ヲ以テ外耳ヲ洗滌スヘシ經久ノ

耳聾モ唯町聾ノ凝積ニ由レル者多ク之ヲ除ク

ノミニメ全治ヲ得ルヲ屢之有レハナリ而血液

鬱積ニ由レル者ハ局處項窩ノ角法或ハ總身ノ

瀉血ヲ行ヒ聖京屈。儂麻質ニ由レル者ハ打膿法

耳後乳頭狀挺ノ部ニ先菁軟ヲ施シ峻劇ノ誘導

膏ヲ貼スルヲ殊ニ佳トス 藥ヲ用フヘシ總テ腹部ト聽器トハ交感親密ナ

ルヲ以テ下劑ヲ服用スレハ其因ヲ擇ハスニ三

日ノ快ヲ覺ユルヲアリ故ニ聖京屈。儂麻質ヨリ

来レル者ハ朴。屈。福。烏。篤ニ甘。汞。金。硫。黃ヲ伍シ與



ヘテ神驗アリトス第四百十且之ニ兼テ嚏劑第七

方ヲ用ヒ以テ鼻涕膜ヲ刺衝セシテヲ要ス是啻

ニ其分泌ヲ催進メ其毒ヲ誘導スルノミナラス

又能ク聽神經歐私太幾管耳中ヨリ口内ニ達スル管ニ交感

ノ刺衝ヲ起シテ大ニ其治ヲ扶クレハナリ而其

他黴毒等ノ各毒轉徙ニ原ケル者ハ又各毒相當

ノ藥ヲ行フヘシ外治法ハ揮發油ヲ挿ニ注射法

ヲ行ヒ或ハ藥蒸氣ヲ外耳ニ入ル等ナリ然レモ

其刺衝過強ナレハ外耳ノミナラス内部ノ聽器

ニモ焮衝ヲ起シ易キカ故ニ之ヲ行フニハ最謹

慎ヲ加ヘサル可ラス且其患者晴天ニ善ク聽ク

ト雨日ニ善ク聽クトヲ區別セシテヲ要ス其晴

天ニ善ク聽ク者ハ内膜ノ弛緩セルナリ能ク刺

衝藥ニ堪フヘシ雨日ニ善ク聽ク者ハ乾燥緊張

セルナリ弛緩藥ヲ的當トス余ハ此證ニ扁桃油

ヲ木綿ニ蘸シ或ハ少許ノ牛膽ヲ之ニ和シテ挿

マシメ偉効ヲ得タルト多シ或ハ又之ニ少量ノ

加耶普的油羯布羅石腦油ヲ和セル者ヲ稱譽ス

第百十五方ハ余カ屢用テ實驗ヲ歷シ者ナリ若

夫口ヲ開テモ善ク聽クトヲ得サル者ハ歐私太



幾管ノ壅塞セルナリ宜其管ノ注射法附ヲ行フ  
 へシ而越列幾的兒モ亦此病ニ殊効アルナリ  
 試テ可ナリ右ノ諸法皆功ナキ者ニ稱用スル所  
 ノ技術ニ法アリ乳頭狀挺鑽法ト鼓膜鑽法ト是  
 ナリ兩法共ニ記載ス附然レ氏甲法ハ其焮衝腦ニ波及  
 シテ危篤ヲ致スノ恐アルカ故ニ行ハサルヲ可  
 トス乙法ハ能ク功ヲ奏メ危害ナシト雖氏唯一  
 時ノ快ヲ取ルノミニメ久ク持續スルヲ得ス  
 故ニ凡<sup>ッ</sup>一時ノ輕快ヲ得ルニハ聽管附ヲ用ルヲ  
 佳トス

失嗅及失味

アレノスミア ア 羅 ゲ ブレ キ ア イ  
ブレ キ ア イン  
スマ カ カ 蘭

嗅味兩ナガラ同時ニ失ヲ常トスレ氏亦其一  
 官ノミ職ヲ廢スルナリ聖京偃ヨリ來ルヲ最  
 多シトス而聖京偃ノ傍證ナル者ハ本病ト共ニ  
 退散ス或ハ又痙攣病。麻痺病ノ兼證ナル者アリ  
 或ハ時刻ヲ定メテ往來スル者アリ

皮膚不仁ア ナ ロ ス テ シ ア ロ ゲ フ



皮膚觸覺ヲ失ヘル者其患唯一部ニ在ル者アリ  
全軀ニ在ル者アリ此病ハ内部ノ麻痺病ニ繼發  
スルヲ常トスト雖モ亦只皮膚神經ノ痙攣ヨリ  
來テ一小部ヲ局スル者アリ是多クハ潜伏伊屈  
篤ノ外徵ナリトス脊髓麻痺 局處麻痺ノ患者ニ  
於テハ間全軀ノ皮膚皆不仁スル者アリ

不食

アノレキシア羅ケブレキ  
アインユートリスト蘭

饑ルト食ヲ欲セサルト自別ナリ故ニ善ク饑テ  
食欲ナキ者アリ凡此病ハ胃中ノ汚物ヨリ來レ

ルヲ最多シトス然ル者ハ吐下藥ヲ用ヒテ之ヲ  
驅除スヘシ若夫諸熱病ニ兼發セルカ如キハ強  
テ患フルニ足ラスト雖モ亦胃神經自家ノ變調  
若クハ麻痺ニ出テ數月數年持スル者アリ輕  
カラストス多ハ是依ト昆垚兒歇以私的里鬱憂  
病等ニ傍發シ或ハ神經力他事ニ傾注スル一甚  
キヨリ來ル或ハ又此病貪飧飲酒ノ度ヲ過ス一  
久キヨリ胃腑感動遲鈍ノ大衰弱ヲ致セルニ因  
スル者少カラス

治法 若本病ノ攻ムヘキ者アラハ之ヲ攻ムヘシ



否サル者ハ直ニ胃ヲ刺衝メ其覺機ヲ挑起スル  
 治法ヲ行フヘシ即苦味藥香竈藥鹽類殊ニ鐵劑  
 等ヲ用ヒ兼テ肢體ヲ運轉シ精神ヲ鼓舞セン  
 ヲ要ス

不姪「ア」ナ「プロ」デシ「ア」羅「ゲ」ブレキ「ア」

姪欲欠ケタル者はナリ病態全ク不食病ト其致  
 ヲ同フシ病因亦之ト其類ヲ等フス而精液匱乏  
 其刺衝力缺損陰器ノ疾患神經ノ變調等ヨリ起  
 リ或ハ憂愁悲哀ノ事ニ遇ヒ或ハ精神ヲ他事ニ

勞役スル等之カ因トナル此病陽精無カヨリ来  
 ル者モ有レ氏亦他因ヨリ起レル者多クメ却テ  
 陽精無カノ因ト為ルト少カラス故ニ姪欲缺テ  
 其感動ナク且之ヲ嫌惡スル者モ交媾シテ能ク  
 子ヲ生スルトアリ是殊ニ婦人ニ多シ  
 治法 陽精無カノ治法ヲ行フヘシト雖氏若シ其  
 因此ニアラサル者ハ内外刺衝藥ヲ用ヒ就中羌  
 スト想像カヲ姪事ニ傾注セシムル等ヲ以テ其情  
 欲ヲ挑起セントヲ要ムヘシ

扶氏經驗遺訓卷之十一終







