

扶氏經驗遺訓
士

ヤ 4
1448
||



安政四年丁巳初秋新雕

緒方洪菴譯本

四帙

扶氏經驗遺訓



適適齋藏



扶氏經驗遺訓第四帙目次

卷之十二

第七編

消削病 總論

肺勞

吐膿肺勞

蓄膿肺勞

紅顴肺勞

咽喉勞

肝腎膀胱子宮腸間膜等諸器膿勞



卷之十三

虛勞

粘液肺勞

神經勞

脊髓勞

老衰病

枯勞

結核肺勞

歇屈扶加ハクツカ

卷之十四

第八編

氣水集積病

其一水腫病 總論

其腹水ハクスイ 總論

其胸水ハクスイ 總論

其心囊水腫

其頭水

皮膚水腫

其二氣脹病

風氣痞滯



鼓脹

窠質氣腫

子宮氣脹

卷之十五

第九編

過泄病 總論

其一失血病 總論

衄血

咯血

嘔血

痔疾

黑物吐下病

尿血

班病

卷之十六

其二脫液病 總論

吐涎

脫汗

遺尿

尿崩

膀胱粘液漏泄

淋疾

遺精

耳濕

完穀利

乳糜利

肝崩

下利

痢疾

霍亂

卷之十七

第十編

閉塞病 總論

便秘

吐糞病

尿閉

蒸氣閉塞

蒸原門塞

水閉

土糞痰

針灸

閉塞論 附論

第十論

卷之十二



扶氏經驗遺訓卷之十二

此論之要重矣足守其脈緒方章公裁

義弟郁子文同譯

第四類 西肥 景德 叅枝

第七編

消削病 トキアチ子 蘭

總論

徵候 榮養妨碍ヲ被テ形體消削セル諸病ノ總稱

然レ其消削實ニ病ノ本然ニメ

他病ノ傍證ナラス其治療ノ標的トナルヘキ者

夫氏遺訓 卷之十二

ニ非レハ之ニ属セス

原由 近因ハ体内ノ消耗機其補給機ニ踰越セル
 ナリ其因四般ニ歸ス第一榮養ノ道断ルニアリ
 之ヲ鴉多魯比亞ト謂フ枯勞ト第二體液及ヒ諸
 カノ虚耗スルニアリ之ヲ太別斯ト謂フ虚勞ト
 第三刺衝連絲スルニアリ之ヲ歇屈扶加ト謂フ
 第四膿ヲ釀成スルニアリ之ヲ布扶失斯ト謂フ

膿勞ト

此病ノ輕重安危ハ其原由ト體質ト外物ノ關涉

按ニ攝生

トニ隨テ甚タ差別アリ就中釀膿ヨリ

来レル者ヲ危險トス而其患生命必要ノ器ニ在
 ル者ハ愈然リ其第一因第三因ヨリ来レル者ハ
 差輕クメ間能ク數年ノ久シキヲ彌ルトアリ之
 カ危險ヲ徵スルノ主證ハ遷延熱所謂骨蒸熱ナ
 スナリ證ニ隨テ或ハ早ク之ニ傍ヒ或ハ晚ク之
 ニ加ッテ以テ大ニ其消耗羸瘦ヲ進ム殊ニ釀膿ニ
 因セル者ハ必ス始ヨリ之ヲ兼發ス故ニ此熱ハ
 内部釀膿ノ主徵ト知ヘシ而メ其死スル所以ハ
 諸液諸カラ費耗シ竭シテ全軀溶崩スルニ由リ
 或ハ生命必要ノ一器毀壞ヲ被ルニ在リトス

此病ハ又水腫ト同シク他病ノ季期ニ來テ將ニ死ニ就ントスルノ前驅ト為ルヲ甚タ多シ

治法 第一其原因 總身局處ヲ論セス其病ノ原トナル者ヲ除クヘシ

第二其消耗ヲ遮ルヘシ 遷延熱ヲ減却スルニアリ 第三有力

ノ滋養物 食物ノミナラス清淨氣ヲ引クヲ緊要トス 及有力ノ強壯藥

ヲ用テ體液ヲ補充シ生カラ恢復スヘシ但食藥

共ニ患者感動ノ遲敏ニ準テ斟酌ナクンハアラ

ス其刺衝過強ナレハ内托補益ノ功ナクメ却テ

費損減耗ヲ増スノ害アレハナリ

肺勞 フチシス。ヒルモナリス。羅コングテトリング。蘭

徵候 欬嗽喘氣羸瘦遷延熱ノ四證此病ノ本徵ナ

リ以テ他病ト辨別スルヲ得ルヲ殊ニ遷延熱

ハ之ヲ喘息ト分ツル主徵ナリトス欬嗽喘氣吐

痰等ハ喘息ト肺勞ト全ク均シケレバ唯此熱ナ

キヲ以テ異トスレハナリ其他患者己カ疾患ヲ

輕視シ具ニ其患證ヲ演說セス 依ト昆垓呪家ト相反ス動モス

レハ其患ヲ胸部ニ覺エヌメ腹内ニ在ルト意シ

諸證愈危險ニ進メハ愈其輕快ヲ期スル等亦肺

勞固有ノ徵候ナリトス耳ヲ患者ノ胸ニ附ケ或

ハ聽管ヲ中テ以テ之カ徵ヲ取ルハ膿囊ノ地位
 ヲ探クル等ニ用フヘシト雖モ其胸中ニ鳴ル者
 果シテ真膿ナルカ將粘液ナルカ之ヲ辨スル
 能ハス故ニ此病ノ吉凶ヲトスベキ者ニ非ス
 欬嗽ニ吐痰ヲ兼ルト兼サルトアリ吐痰ナキハ
 結核勞ナリ此證ハ死ニ至ルマテ略サル者アリ
 吐痰スル者ハ粘液勞吐膿勞ナリ
 胸内疼痛ハ多ク之ヲ兼ヌト雖モ必シモ毎ニ然
 ルニアラス故ニ定徵ニ屬セス
 凡慢性ノ難病世間ニ多シト雖モ此病ノ如ク危

險ニメ且夥キハナシ地上ノ靈生之カ為ニ其命
 ヲ隕ス者十中ノ六ニ居ルト云フ天下一般否ラ
 然リトス於テハ必ス此病留連一樣ナラス或ハ僅ニ一二月
 ナルアリ或ハ數年ヲ累ヌルアリ或ハ生涯連綿
 スルアリテ其治甚難シ而其難易殊ニ患者ノ體
 質ニ由ルナリ乃軀體ノ構成父母ノ遺傳等ニ係
 レル者ノ如キハ決メ全治スルヲナシトス是其
 病ノ種子深ク器質ノ中ニ舍メ萌起セントスル
 ノ機生涯苟且モ休ムトナク微聊ノ他患モ之ニ
 加レハ忽チ之ヲ誘發スレハナリ婦人ノ如キハ其

素因ヲ具フト雖月經順調スル際ハ永ク之ヲ
 發セス一旦月經滯止スルハ有レハ乃鬼録ニ上
 ルヲ免レス
 此病經過三期アリ
 第一期之ヲ將發肺勞ト謂フ甚緊要ノ時期ナ
 リ能ク之ヲ察セサル可ラス此時ニ方テハ仍肺
 勞ノ發成ヲ遮隔シテ能ク之ヲ防禦スルヲ得
 可ケレハナリ凡ソ肺勞ノ將ニ來ラントスル其
 道甚々多端ナリ左ニ之ヲ列ス即皆此期ノ徵候
 ニ屬ス

肺臟弛弱肺質衰弱メ弛緩スレハ粘液ノ分泌大
 ニ増益シ徐ク釀膿ニ變シテ終ニ其質ヲ損敗ス
 其徵屢感冒メ吐痰甚々多ク且其感冒證毎常久
 シク淹滯スル者是ナリ
 焮衝性肺患血液慢々此ニ鬱積メ漸ク遷延焮衝
 狀ヲ致スナリ其鬱積肺ノ全質ニ在ルアリ或ハ
 唯氣管ノ粘液膜ニ位セルアリ而徐ク硬腫ヲ結
 ヒ若ハ釀膿ニ變シ以テ真ノ肺勞ニ轉ス其徵乾
 欬頻數ニメ胸内時ニ刺痛煩熱シ脈常ニ緊數ニ
 メ微動ニモ必ス進ム而肢體ノ勞動起熱ノ諸件

七情ノ感激。慄悍ノ飲液。笑語劇談等。皆效嗽刺痛。煩懣ヲ増シ。動モスレハ。咯血スル者。是ナリ。

肺臟結核。其結核徐ク焮衝シ。漸ク膿潰スレハ。乃

チ肺勞ニ移ルナリ。徵候全ク前證ニ同シ。唯坐卧

ノ模様ニ由テ患證ノ増劇スルト。此病固有ノ痰

沫後ニ吐スルトト異トス後ノ結核勞条ト参考スヘシ

神經性肺患。神經虚衰若クハ。其運管支障ノ餘弊

一身及ヒ肺ノ補給機ヲ害シ。以テ遂ニ肺臟ノ榮

養ヲ妨ケ。其器質ノ損敗ヲ將來ス。其徵神經性ノ

諸證ヲ呈シ。故ナクメ。非常ニ羸瘦シ。乾效累リニ

發ノ瘰瘡性ヲ帶ヒ。胸内微痛ノ屢。瘰瘡性ノ咯血ヲ

起シ。諸證焮衝性ヲ帶ル。ナク亦發熱スルト。無

キ者。是ナリ。或ハ此證初。神經勞ニメ。後チ漸ク肺

勞ニ陷ル者アリ。

腹疾交感。消食機變常。胃中粘液。肝臟壅塞。膽液鬱

滯。痔血ノ壅止。腺ノ閉塞。印華爾屈篤等ノ腹部慢

性病。曾テ肺臟ニ素質ヲ有セル者ニハ。斷ニス交

感ノ刺衝ヲ起シテ。茲ニ血液鬱積ヲ致シ。以テ初

メニ假證ノ肺勞ヲ現シ。徐ク轉メ。真ノ肺勞トナ

ル。其徵腹疾ノ諸證ニ兼ルニ。效嗽連綿。呼吸不利。

夫遺凡 卷之十一 六 通論

羸瘦發熱盜汗等ヲ以テス殊ニ之ヲ確徵ス可キ
ハ胸病ト腹疾ト其増減相應シ且強劇ノ運動
起熱ノ事件高笑劇談等ノ直チニ肺ヲ害スヘキ
者皆強ヒテ崇ヲ為サルナリ

病毒轉徙痔血月經ノ抑遏頑癬黴毒瘰癧伊倭篤
失苟兒陪苦等ノ内攻打膿法白帶下經久潰瘍等

ノ如キ常習ト為レル排泄ノ閉塞熱病殊ニ發ノ疹熱

不全分利等其毒ヲ肺ニ輸セハ運營變常シ感動

過敏ト為リ其部衰弱シテ補給機常ヲ紊リ以テ

器質ノ變ヲ將來メ肺勞ノ素因ヲ釀成ス其徵他

ノ一病退散メ后チ欬嗽胸痛呼吸不利等ノ諸證
ヲ起ス者是レナリ

第二期之ヲ既發肺勞ト謂フ胸部ノ諸患ニ兼

テ遷延熱即チ勞熱ノ加ルヲ此期ニ移レルノ徵トス

其熱間歇熱狀ニメ往來シ初起ニ於テ然リ早朝熱ノ

休歇セル時モ脈仍數ヲ減セス日晡憎寒起熱シ

晨ニ向テ發汗シ病増進スレハ日午モ亦發熱ス

其他手掌煩熱メ兩顴紅色ヲ畫シ食後殊ニ然リ肢體羸

瘦メ諸筋カラテ失シ食欲恙ナクメ羸瘦加ルニ隨

テ却テ進ミ消食健全ニメ精神爽快シ攝生ノ諸

件ヲ輕忽ニメ自ラ危險ヲ慮ラス自ラ肺勞タル
ヲ信セス而其吐スル所ノ痰沫漸ク膿質ト為ル
ナリ但蓄膿證後ニニ於テハ仍乾欬ス
第三期 溶崩證ヲ發スルヲ以テ此期ノ徵トス
即チ早且脱汗シ大便泄瀉シ小便溷濁ニメ上面
ニ脂狀ノ膜ヲ結ヒ其熱重複メ午時ト日晡ニ發
作シ氣力虛憊極メテ甚シク形體消削速カニ加
リ吐痰益增多シテ臭氣ヲ帶ヒ氣急煩悶亦愈増
進ス然レモ食欲ハ依然トメ變セス或却テ増進
シ患者自ラ快復ヲ希望スルノ心モ亦愈増ス

女子ニ在テハ月經必此時ニ閉止ス而後足跗漸
ク浮腫シ聲啞レ咽痛ミ口内鶩口瘡ヲ生シ吐痰
過テ喘鳴シ氣急煩悶益加ハリ溶崩下利愈増ス
ハ乃死路ニ向フノ候ナリ或ハ卒ニ絶氣シ或ハ
徐ク窒息シ或ハ吐血シテ乃斃ル

原由 近因ハ肺臟ノ生力若クハ器質變常ノ其官

能血液製造及血液活起ヲ致スル能ハサルナリ蓋シ肺病

世ニ饒多ニメ且危險ナル所以ノ因三アリ即チ
其官能全軀ノ血液ヲ悉ク此ニ受容スルニ在ル
カ故ニ血液ニ富メルヲ最多キヲ以テ動モスレ

ハ血液鬱積及_レ焮衝ニ罹リ易キ一ナリ其賦性脆
 弱軟弛ニメ血絡多ク分泌吸収ノ機關ヲ具ヘ動
 揺間断ナクメ縮張亦定度ナシ故ニ血液溜滯シ
 易ク溢出シ易ク織質破綻シ易ク變常シ易ク一
 旦傷ヲ被ムル_レ有レハ復癒ユル_レ難キニナリ
 其位置膚體ノ表面ニ在ルニ等キヲ以テ常ニ外
 氣ニ暴露シ其變ニ感メ其害ヲ被ムリ易キ三ナ
 リ
 蓋シ肺勞ノ病タル四般ニ歸ス焮衝_{遷延}ト弛弱
 ト結核ト化膿ト是ナリ而其素因ハ左ノ數件ニ

屬ス_レ此素因_ニ於_テ其_レ首_ニ十五歲或ハ三歲

第一素質_ニ此質ヲ具セサル者ハ肺創_ノ如キ極
 劇_ノ誘因ヲ得テモ此病ヲ發スル_レ下_ニナシト雖_モ其
 質アル者ハ百事皆肺勞ヲ起シ易ク動モ_レハ
 ハ之ヲ發セシトスル_レ病萌生涯免ル_レ時ナク
 輕々タル感冒_ニ遇テモ忽チ此大患ヲ得ル_レナク
 其質ヲ斥シテ勞瘵質ト謂_フ其徵胸廓平坦ニメ
 左右後部狹隘_ノ胛骨羽翼_ノ如_ク外側ニ張_ル頸抽
 テ軀幹長ク齒牙雪白_ノ兩顴桃紅_{食後殊}著_シナク而_モ食
 後手心煩熱_ニ動モス_レ欬嗽屢發_ニ上逆_ノ顏

面發赤スル等肺及一身血絡ノ感動過敏ナルヲ
徴シ且ツ稟賦多血質ニ才智慧少自己ノ病
態ヲ意トセス肺ノ患苦ヲ以テ患トセス或ハ否
其實モ之ヲ其口ニ演ヘ不多ハ其病ヲ腹内等ノ
他部ニ在ルヲ思フ者是ナリ故ニ其景況總テ依
ト昆垓兒家ト正ク相反對生テ生ルルヲ報ヤル
第ニ傳屍者媾精ニ時相當テ病種ヲ兒孫ニ傳ル
價此病ヨリ著キハ九子ノ兒孫ハ生前其父母曾
業之ヲ患ヒシヲ有ルシヲ以テ徴トヘシ或ハ一
族皆此素因ヲ抱ケル者アリ

第三年紀ハ十六歳ヨリ二十五歳或ハ三十歳ニ
至ルノ際ハ血絡ノ生力最モ旺盛ス故ニ七情ノ
感動等毎ニ血ヲ心肺ニ驅逐スルヲ甚シ是レ世
間ノ勞瘵此年紀ニ於ケル者特ニ夥キ所以ナリ
此年紀ヲ越ユレハ同一ノ誘因ニ遇フト雖モ肺
勞ヲ發セスメ多クハ喘息ヲ起ス者トス
第四成長過急ハ軀體急ニ成長スレハ必ス肺勞
ノ素質ヲ致スナリ是レ胸廓ノ均シク増大擴張
スルヲ得サルニ由ル故ニ此時ニ當テハ殊ニ
意ヲ用ヒテ諸誘因ト為ル可キ者ヲ避シテ要

ス總テ瘦長ノ人ハ矮肥ノ人ニ比スルニ此病ニ罹リ易シトス

第五住地氣候 凡呼吸器ノ病ハ大氣ノ性質ニ管スルヲ甚タ大ナリ變敗汚濕ノ大氣密閉セル居室殊ニ動物ノ氣鬱蒸セル地ハ肺勞ヲ誘起シ易シトス是此病ノ田舎ニ少クメ大都ニ夥キ所以ナリ之ヲ比スルニ一ト十トノ如シト云フ又濕性ナル北方ノ氣ハ肺勞ノ素因ヲ致シ易シトス即チ北邦ニハ肺病多クメ南邦ニハ肝病腹疾ノ多キト人ノ知ル所ナリ

第六攝生所業 密室ニ業ヲ操ル者ハ開豁氣内ニ力作スル者ヨリ此病ヲ患ヒ易シ飽食過房等ノ攝生不良モ亦此病ノ素因トナル

第七肺臟努力常習 日常強劇ノ舞蹈ヲ事トシ高聲ノ謳歌ヲ口ニシ婦人體機發成ノ年紀及ヒ月經ノ時肺ヲ努力カスルハ殊ニ宜シカ或ハ起熱ノ飲料ヲ常用スル等之ニ屬ス

第八娩産過數 授乳過久 房事過度 少年早ニ房事ニ耽ルハ殊ニ此病ノ因トナル

第九肺臟感冒常習 屢感冒シテ毎時久シク淹

第十肺臟局處衰弱。屢感冒シ易ク且常ニ吸氣ヲ久ク内ニ保ツテ能ハス馳走升階登山等ニハ必ス少氣短息ス

第十一癯癭質。此素質アル者ハ常ニ肺ノ結核ヲ生シ易シ

第十二脊骨癒着。屈曲尙儻。肺臟索籥ノ機ヲ妨ケテ呼吸之レカ為メニ不利ス

右件ノ素因增長スレハ皆能ク肺勞ヲ致ス下雖凡多クハ次条ニ掲ル所ノ誘因有テ之ヲ促スニ由

ル但其誘因亦能ク此病ヲ起スト雖凡素因ナクメ單リ之ヲ發スルコトハ罕ナリトス其誘因左ノ如シ

其一感冒。凡百ノ肺勞感冒ヲ怠慢セルヨリ来ルヲ最モ多シトス大抵肺勞ノ初起ハ皆尋常ノ感冒歟ノミ其歟未タ止サルニ彼此ノ因屢之ニ加テ數再發シ知ラス識ラス徐ク肺勞ニ陥ルナリ窒卒篤名云ク世間感冒ノ為ニ命ヲ隕ス者疫病ニ斃ルヨリ多シト實驗ニ據テ之ヲ算スルニ肺勞ノ患者ハ感冒ニ起因セル者三分之一ニ

抄録
卷之十一

居ルナリ

其二咯血 凡肺勞ノ素質ヲ具フル者一咯血ス
ル一有レハ乃本病ニ陷ツ故ニ咯血ハ本病ニ轉
スルノ一確徴トス

其三肺臟焮衝 遷延焮衝粘液漏泄結核化膿皆
焮衝ノ繼證ナリ故ニ諸種ノ肺勞此部ノ焮衝ヲ
以テ原トセサルハナシ

其四肺臟血液鬱積 謳歌叫號吹器ヲ弄スル等
ニ由テ肺ヲ努張シ肢體ヲ勞動ン起熱ノ飲料ヲ
用テ身軀ヲ熱セシメ或ハ過度ニ煙艸ヲ喫スル

等皆血液ヲ肺ニ鬱積セシメテ此病ヲ誘發ス

其五害物吸入 金屬ノ蒸氣塵埃及酷厲ノ刺衝
物ヲ肺中ニ吸入スル等ナリ

其六胸部創傷及打撲

其七病毒轉徙 伊屈篤。倭麻質。黴毒。瘰癧。疥癬等
ノ病毒轉ノ肺ヲ襲ヘハ乃肺勞ヲ起ス一固ヨリ

論ヲ俟ス其他痔血經血等ノ常習失血閉止或ハ
經血初出ノ抑遏或ハ白帶下痢疾泄瀉等ノ常習
ト為レル粘液漏泄ノ壅閉或ハ間歇熱及精神錯
亂等ノ變形轉シテ此病トナル者勝テ計フ可ラ

失大貴川 卷之十一 三 適適齋藏

ストス

其ハ麻疹 感冒ニ亞テ肺勞ヲ誘起スルノ多キ者ハ麻疹ナリ此病ハ殊ニ能ク結核勞ヲ起シ易シ

其九傳染 肺勞危篤ノ極ニ至レハ肺中ヨリ一種感染ス可キノ毒氣ヲ泄ラスト云フ其說疑フヘキニ非ス若シ肺勞ノ素質アル者之ニ遇ヘハ乃感染ス或ハ患者ノ久ク着セシ衣服衾褥等ニ其毒染テ以テ人ニ傳フルトアリ但其傳染北邦ニ於ケルヨリハ南邦ニ多シ

原由ニ原テ肺勞ヲ本然勞ト偶發勞ニ區別スルハ預後ノ為ニモ亦治術ノ為ニモ益アリトス所謂本然勞ハ患者ノ體格稟賦遺傳等ニ因セル者ニメ全軀ノ器質已ニ既ニ肺勞ニ傾キ之ヲ發セントスルノ機居恒止マス之ヲ挫クヘシト雖モ全ク之ヲ除ク可ラス一旦正證ヲ發スルニ及テハ全然治ス可ラサル者是ナリ偶發勞ハ全ク之ニ及セル者ニメ體內他患ナケレハ猶能ク治スヘキナリ斯ノ如キ人ハ肺ニ鏡割ヲ被ムルモ肺勞ニ移ルヲ無キ者アリ而治術ノ為ニ最モ緊要

ナル區別ハ之ヲ紅額勞即チ嫩街勞ト吐膿勞ト結核勞ト粘液勞トニ分ツニアリトス

治法 先將發肺勞ト既發肺勞ト區別セシテ要ス將發ノ時ニ於テハ猶能ク其發成ヲ防クヘシト雖正既ニ發成セルニ及テハ之ヲ治スルノ難ケレハナリ

將發肺勞 微動ニモ呼吸促迫シ階ニ升リ山ニ登レハ氣息ノ絶スルヲ覺工深息セントシ若クハ吸氣ヲ内ニ保タントスレハ必ス效シ馳走長談神志撼攪亦乍チ效ヲ増シ食後ニ手掌煩面煩

熱シ舌上非常ニ赤シテ兩額紅色ヲ畫シ脈數ニメ亢揚シ易ク患者自ラ病態ニ意ヲ注カド殊ニ胸患ヲ顧ミス兼ルニ勞瘵質ヲ具ヘ傳屍等ノ素因アル者はナリ
凡肺勞ノ本治ハ專ラ此時期ニ在リトス此時ニ當テハ人術能ク之ヲ療シテ其本病自轉スルヲ防クテ得ヘシ余自實驗スル所其例少カラス肺勞ノ素質アル者ニ生涯其病ヲ逞發セシメス其厄運ヲ免レテ優ニ天壽ヲ終ルシムルハ實ニ唯此期ニカテ竭スニ在ルニシテ年紀長スレハ

抄氏遺言 卷之十二

其素質隨テ消スルカ故ニ斯クメ以テ恙ナク三十歳ヲ踰エシメンコトヲ要ス而其要トスル所ヲ醫ノ精意ヲ盡スト患者ノ嚴ニ能ク之ヲ守ルトニアリ
其治法肺ニ血液ヲ鬱積セシムル諸因ヲ除キ肺ニ病害ヲ致スヘキ諸件ヲ禦キ兼テ肺ヲ適宜ニ強壯滋補スルヲ諸證ニ通ノ宜シトス即過劇ノ運動馳走舞蹈劍法肆習等ヲ避ケ肺ノ努力高歌長談等ヲ慎ミ起熱ノ飲液ヲ禁シ田舎ニ生養シ清淨氣ヲ引キ葡萄酒恐ハ乳清ノ誤ヲ多服シ食料ハ植物品ヲ主トメ

肉類ヲ少フシ毛布ノ襯衣ヲ着シテ毛製ノ行膝ヲ穿テ房室ヲ遠ケ神思ノ感動ヲ禁シ騎馬乘舟等適宜ノ運轉ヲ致シ胸内焮衝ノ微候ヲ見ル毎ニ心ス少許ノ刺絡ヲ行ヒ上膊ニ打膿法ヲ施シテ累歳癒フコトナキ等是ナリ而此期ニ於ル各證治法左ノ如シマニ三日大ニ精息メ
第一胸内時々刺痛シテ一處ニ灼クカ如キ感觸ヲ覺エ乾效寧時ナク脈居恒ニ進促シ兩顴紅色ヲ呈メ或ハ時ニ咯血スル者ハ將ニ紅顴勞若クハ結核勞ヲ發セントスルナリ此證ハ必常ニ肺

天大遺言 卷之十二

共

適適齊歲

抄氏遺言 卷之十一

焮衝ノ微萌ヲ抱アリ其焮衝ノ起ルヲ視ル毎ニ
早ク之ヲ退ケテ其結核ニ進ク化膿ニ轉スルヲ
防カン_一ヲ要ス故ニ胸痛纒ニ發スルカ氣急少
加ハル_一有ラハ早ク尺澤ヲ刺シテ血少許四弓
ヲ瀉シ次テ二三日大ニ靜息セシメ嚴ニ淡薄
ノ食養ヲ命シ消石或ハ孕鹼酒石ニ老利兒結爾
斯水或ハ實芟荅里斯ヲ加ヘ第百十與ヘ兼テ乳
清乳汁驢乳ヲ殊ニ佳トス胡瓜汁黠失刺護結爾馱兒ボル
ラゴ詳等ノ新鮮絞汁及セル水鑛泉乳汁ヲ
エケルセ水鑛泉等ヲ服用セシムヘシ但甚ノ焮衝
ニ傾ケル者

ハ鑛泉鉄氣アル余曾テ此證ノ患者ニ每四週若ハ每
六週刺絡ヲ行フ_一數回一患者十六歳ヨリ二十
及フヘル者アリ兼テ右ニ舉ル治法ヲ施シ以テ其
命ヲ救ヒシ者少カラス結核勞ノ病萌アル者ニ
ハテエムス鑛泉水ヲ服セシメテ乳清ヲ兼用スル
ヲ甚佳トス
第二患者肺臟弛弱ニメ粘液勞ニ傾ケル者徴候
ハ参考スハ依蘭苔ノ水製傑列乙若ハ乳製傑列乙
ヲ久シク連服スルヲ以テ主トシ温居温飲ヲ禁
ス温室ニ寢ルハ殊ニ宜シカラス而メ騎馬ハ此

夫大貴川 卷之十二 七七 適適齋藏

證ニ奇効アリ聲ヲ揚ケテ讀書スルモ亦甚々妙
ナリ弛弱甚シキ者ハ冷水ヲ服用シ胸部ヲ冷洗
シテ偉驗アリトス

第三病毒轉徙證ハ感冒。僕麻質ヨリ来レル者最
モ多キニ居ルナリ蜀羊泉ヲ特效藥トス焮衝性ノ
者ニハ之ヲ單用シ第三十方 弛弱性ノ者ハ之ニ依
蘭苔ヲ配用シ第三十方 胸部ニ芫菁膏ヲ貼メ久ク
癒ストナク焮衝ヲ夾ム者ハ琪針或ハ刺絡ヲ行
ヒ仍効ナキ者ハ兩膊ニ瑞香皮打膿法附ヲ施シ
テ二三月釀膿セシムヘシ病毒ヲ誘導スルノ峻

効アル者トス自餘伊屈篤疥癬瘰癧等ノ轉徙モ
亦其治法異ナルトナシ但疥癬ニハ硫黄ヲ伍シ
瘰癧ニハ塩酸重土ヲ配スル等各毒應當ノ藥ヲ
兼用スヘク且毎證必病性ノ虛實焮衝性ニ注意
メ諸藥ノ斟酌アラシトヲ要ス若又月經痔血等
ノ遏閉ニ因セル者ハ復ヒ之ヲ導泄シ或ハ瀉血
ヲ行フヘシ

第四神經勞ニ傾ケル者微候ヲ參ハ乳養法ヲ
用ヒ驢乳ヲ居ト田舎ニ移シ馬ニ騎テ逍遙スル
ヲ宜シトス而神經甚ク虛衰セル者ハ幾那冷浸

劑ヲ與ヘ大ニ羸瘦セル者ハ大麥沙列布亞兒魯
〔附〕 蛞蝓牡蠣ノ煮汁等傑列乙質ノ滋養品ヲ用ヒ
 シメ肺ノ感動過敏ニメ嗽頻數ナル者ハ菲阿
 斯老利兒結爾斯水殊ニ良ヲ服セシメ其效ヲ鎮
 ムルノ姑息藥ニハ少量ノ阿芙蓉モ亦妨ケナシ
 トス
 第五腹疾交感證徵候前ハ必ツハ設刺兒灌腸法ヲ行
 ヒ蒲公英麻爾羅歇蘆根等ノ越幾斯及其新鮮絞
 汁或ハ酒石葉等ノ緩性解凝藥ヲ用ヒ「マリエン
 バーテルクレウスブロン子」エケル水セルチ



此水皆鑛泉等ヲ服セシムルニ宜シ依ト昆
有形ノ因ニ係ルノ治法ヲ參考スヘシ堉兒条
 既發肺勞 徵候既ニ前ニ說ケリ即第就中遷延
 熱ノ加ハルト早旦自汗ヲ發スルトヲ首候トス
 諸證ニ通メ此期ノ治法三則ニ歸ス即肺臟局處
 ノ病患結核化膿粘ヲ修治スル一ナリ熱勢ヲ減
 退スルニナリ諸液ノ費耗ヲ補給スル三十リ凡
 肺勞既ニ發成セル者ハ之ヲ難治トスル一世間
 普通ノ論ナリト雖此ニ狐疑ノ猶豫スル一勿
 レ醫家ノ考按ヲ鈍ラシ刀圭ノ銳鋒ヲ挫ク者之

夫大貴川 卷之二十一 十九 通通齊成

ヨリ大ナルハナシ肺勞ノ膿ヲ吐ク者モ亦能ク
治ス可キナリ死體ヲ解剖ノ著ク肺ノ一部虧損
セル痕ヲ視ルハ往々之アリ是皆以前肺勞ニ罹
テ其質化膿セル者復癒テ累歳ヨク生命ヲ繋キ
シノ證ナリ故ニ之ヲ攻伐スルノ勇ト之ヲ復治
スルノ望トヲ失ハス方伎ヲ竭シテ以テ本旨ヲ
達センコトヲ求ムヘシ

其主トスル所ハ先肺臟ノ病態如何ヲ觀察シテ
其病肺勞ノ某種ニ属スルト云フヲ檢索センコ
トヲ要ス



吐膿肺勞フチシス。ヒルモノナリス。ヒルユレシ

肺勞フチシス。ヒルモノナリス。ヒルユレシ

徵候 膿ヲ咯出スルヲ以テ主徵トス然レハ膿

鑒定甚難シ病初及輕證ニ於テハ殊ニ然リトス

或ハ羅掘塩酸類ヲ痰沫ニ和シテ試ムルハ舍密檢

査ヲ稱譽スル者アレハ亦確據シ難シ是一二ハ

其膿必粘液ト混メ純粹無雜ナル不能ハス一二

ハ粘液ハ軟衝セル部ヨリ分泌セシ者ハ舍密檢

査ヲ行フニ其現象膿ト同一ナレハナリ故ニ之

ヲ味ア鹹若ハ甜其臭氣惡ムヘク水塩水ヲ殊ニ

投メ沈底粘液ハ上且粘縷ヲ引クヲ以テ膿ノ

徴トスルノ確實ナルニ若カストス

治法 第一則 傑列乙質ノ滋養品ヲ用ヒテ諸液

ノ費耗ヲ補ヒ諸力ノ虚脱ヲ復スルニ在リ但温

血動物ノ傑列乙ハ血液ヲ焮灼シテ熱氣ヲ増進

スルノ害アリ宜ク冷血動物及植物ヨリ製スル

者ヲ用フヘシ即チ乳汁乳清驢乳人乳ヲ沙列布大

麥粉朝暮一食匙ニ攪拌シ煮テ供用ス和燕麥飲燕麥

水一クムルトヲ加ヘ煮テ麥粒開クニ至リ傾ケテ其

一スルト
我ニ
我ニ

汁ヲ取リ乳汁ニ食匙蜂 依蘭苔傑列乙日ニ二三

蜜一食匙ヲ加ヘ供用ス 以テ之ヲ製シ砂糖カ爾郎健苔傑列乙未詳近年

ヲ稱云 蛤蚧煮汁牡蠣肉等ヲ良トス此諸品ハ軀

體ヲ滋補シテ釀膿ノ為ニ費耗セル養液ヲ償フ

ノミナラス又肺ノ潰瘍ヲ完癒スヘキ一外部ニ

處メ功ヲ奏スルト一ナル者ナリ

第二則 專ラ肺ノ潰瘍ヲ治スルニ在リ前件ノ

藥此功ヲ兼攝スト雖氏亦肺ニ特效ヲ致スノ諸

藥アリ攝用スヘシ然レ氏其病ノ焮衝性ト弛弱

性ト全ク相反スルカ故ニ殊ニ意ヲ用ヒテ斟酌

抄田近訓 卷之十一

セスシハアラス即焮衝性ノ者此種最ニハ消焮
 ノ功有テ肺及血脈ヲ刺衝セサル者ヲ擇ヒ虚性
 ノ者ニハ專ラ辛温刺衝ノ品ヲ處センコトヲ要ス
 其甲種ニ属スル者ハ百爾蘭獨留謨曾テ屢其効ヲ親驗セル
 奇藥ナリ多量ニ用フルヲ妙トス散劑ハ一日チギ
 一タヨリニ錢ニ至リ煎湯ハ四錢ニ至ル實芝
 答里斯セルセル水鑛泉乳汁或ハエムセルケ
 テルブロン「エゲルセソウトブロン」シレシエン
 スオベルサルスブリュン子皆鑛泉乳ヲ加フ蘇魯林加
 爾基水ニ溶解シ老利兒結爾石灰水乳汁ヲ胡瓜
 汁ニ三ヲ用フ日ニ四次及黥失刺護結兒歌爾蜀羊泉等フ

新鮮絞汁諸鑛酸鉛糖第百十方等是十其乙種ニ
 属スル者ハ沒藥第百十九方忽弗滿氏沒藥糖
 リ十拔爾撒謨格拜霍ハ數用テ其奇功ヲ質驗セル所
 アスハル毛ム脂名未詳其油一滴至三滴 結麗阿
 曹多附一日二亞兒尼加ニ銕等是ナリ但此諸藥ハ頗
 ル謹慎ヲ加ヘンコトヲ要ス若胸内刺痛シテ煩悶
 増シ熱證加ハルコト有ラハ速ニ後服ヲ止ムヘシ
 唯切ナキノミナラス焮衝ヲ増シテ其死ヲ促役
 スレハナリ内服藥ノ外又直ニ肺ノ裏面ニ達シ
 テ其潰瘍ヲ愈ス可キ外用法アリ即茱沃刺那肥

夫大貴丸 卷之十一 三 隨道解疑

抄氏遺訓 卷之二十三 通通齋

束布苗香没藥ヲ水ニ煮テ其蒸氣ヲ吸入シ或ハ
時々參兒ヲ煮テ其蒸氣ヲ病室ニ充タシメ或ハ
炭酸瓦斯蘇魯林瓦斯獸圈氣海上氣ヲ引ク航海殊
ト良シ等之ニ属ス又氣候俄頃ノ轉變ナキ煖國
ヲ擇テ移住スルモ甚佳トス但移住スルニハ病
性ニ應メ其地ヲ擇ブテ緊要ナリ即吐膿勞ニハ
卑濕ノ地ヲ良トシ結核勞咽喉勞粘液勞ニハ高
燥ノ地ヲ佳トス
其他患者ノ軀體ヲメ膿液ヲ排泄スルニ便ナル
ノ保持ヲ致サシムルノ亦肝要ナリ即其坐卧ノ

模様如何ナレハ能ク欬嗽メ吐痰スルノ多キカ
ヲ視テ其保持ヲ定メ毎日數回其人ノ耐フ可キ
間是ニ據テ其膿ヲ咯出セシムルヲ妙トス或ハ
騎馬舟旅等ニ由テ其身盪揺セラレ自然ニ吐痰
ヲ促スモ亦裨益アリ凡膿ヲ咯出スルノ多キヲ
佳トスル所以ニアリ一ハ之ニ由テ肺中清刷ス
ルカ故ニ潰瘍自ラ治癒ニ向フヘク一ハ之カ為
ニ勞熱退テ溶崩證自ラ防クヘケレハナリ是故
ニ吐痰安ラカニメ善ク相次ク者ハ別ニ藥ヲ要
セス唯大麥煮汁蘆根煎汁燕麥飲或ハセルトル

大貴川 卷之二十三 通通齋

水ニ乳汁ヲ加ル等ノ如キ解凝稀釋ノ飲液ヲ與
 へ感冒ヲ防キ起熱ノ事件ヲ避クルノミニ足
 レルトアリ是故ニ吐痰妨ケ有ル者ハ各其因ヲ
 探テ之ヲ療セスンハアラス乃其痰甚タ粘膠ニ
 メ咯出シ難キ者ハ微温緩和ノ藥蒸氣ヲ吸入シ
 海葱蜜結爾茂斯密涅刺列遏兒訶亞舍利別礪砂
 加過泥子精護謨安沒尼亞乳劑附等ヲ用ヒ且飲
 液ヲ多服スヘシ腸胃汚物有テ然ル者ハ滿那孕
 鹼酒石等ノ緩下藥ヲ用ヒ證ニ隨テ吐藥ヲ與フ
 へシ感冒儂麻質ニ起因メ然ル者ハ感冒證ニ兼
 効嗽頻

數ニ酷屬稀涼液
 艸蜀羊泉等ヲ與へ胸部ニ發泡膏ヲ貼スヘシ
 神經證癩ニ起因メ然ル者ハ嗽頻發スル
 性ノ効
 者是菲阿斯阿芙蓉老利兒結爾斯水ヲ用フヘシ
 焮衝ニ起因メ然ル者ハ發熱煩悶氣急胸痛增發
 スルヲ以テ之ヲ徵ス
 消焮藥ヲ用ヒ蜚針ヲ施シ或ハ刺絡メ少許ノ血
 ヲ瀉スヘシ衰弱ノ為ニ然ル者ハ他因ナクメ服
 及諸證衰弱ヲ
 徴護謨安沒尼亞幾亞兒尼加礪砂加過泥子精安
 息香華等ヲ用フヘシ
 打膿法ハ此證ニ非常ノ奇功ヲ奏スルトアリ病

扶大貴川 卷之十二 三四 適道齋藏

初及病毒轉徙證癩ノ類 癩ノ類ニ於テハ殊ニ然リ能
其膿ヲ外導メ内瘍ヲ癒スヘシ勞瘵ノ患者偶火
傷メ大ニ肌膚ヲ傷ヒ潰膿日ヲ經ルノ間ニ本病
全治セル者其例少カラス胸部疼痛ヲ覺ユル
最多キ部ニ廣大ノ芫菁硬膏ヲ貼シ或ハ串線法
ヲ行フヲ佳トス然レモ患者ノ精力既ニ太甚ク
虚衰シ打膿却テ其疲勞ヲ促スノ恐レ有ル者ハ
之ヲ禁ス

若夫膿瘍外部ニ向テ肋間ニ起脹シ或ハ波動ヲ
見ハストアラハ之ヲ截開メ其膿ヲ外泄セシメ

ヲ要ス著膿肺勞条ヲ
参考スヘシ

第三則熱ヲ減シ焮衝ヲ退クルニ在リ勞熱ヲ
發スル所以ノ因三アリ諸液ノ涸竭ト血中ニ混
入セル膿液ノ刺衝ト肺中潰瘍ノ部ノ焮衝ト是
ナリ故ニ本病治スレハ其因自ラ除キ其熱亦隨
テ退クヘシト雖モ熱勢盛ナレハ消削衰弊増進
スルカ故ニ又其因ヲ探テ之ヲ治メ以テ熱勢ヲ
抑制セスンハアラス而其因トナルノ最多キハ
血質ノ焮衝増盛セルナリ固ヨリ清涼劑ヲ用フ
ヘシト雖モ衰弱ヲ起サル者ヲ擇フヘシ即チ剥

本草綱目 卷之三十三 通鑑 藥部

篤亞斯或ハ刺 构縁汁ノ飽和劑第百ニ 及孕驗酒

石等ヲ最佳トス或ハ肺中潰瘍ノ焮衝ニ起因メ

然ル者アリ其部ノ刺衝疼痛及呼吸不利等ヲ以

テ之ヲ徴トス此證ハ蜚針ヲ貼シ或ハ刺絡メ少

許ノ血ヲ瀉スヘシ總テ此病ハ每四週刺絡メ一

小椀許ノ血ヲ瀉スレハ勞熱ヲ退ケテ生命ヲ延

ルノミナラス或ハ本病ノ全治ヲ得ルコトアリ若

シ總身焮衝狀ノ證アル者ハ鑛酸ヲ良トス殊ニ

収斂亞的兒或多量ノ水ヲ加ヘ ヲ用テ効アリ然レ

氏此藥ハ動モスレハ効ヲ増シ下利ヲ起スノ恐

レアルカ故ニ頗ル謹慎ヲ加ヘンコトヲ要ス或ハ

腸胃汚物有テ然ル者アリ勞瘵家此合併ヲ 宜ク

緩和下藥ヲ用ヒ證ニ隨テ或ハ吐劑ヲ與フヘシ

或ハ亦其熱ノ増發衰弱及溶崩證ノ加ハルニ由

ル者アリ収斂亞的兒ト傑列乙劑ヲ殊効アリト

ス

右普通ノ治則ニ兼テ亦各證固有ノ病性ニ注意

シ各相當ノ治法ヲ行ハンコトヲ要ス乃疥癬毒ニ

ハ硫黃及打膿法ヲ兼子施シ徵毒ニハ水銀ヲ兼

用シ療瘰毒ニハ矢鳩答塩酸重土ヲ兼用スルカ

夫氏貴州 卷之三十三 通鑑 藥部

如キ是ナリ

凡姑息法ヲ行テ急迫ヲ緩メ危険ヲ避クルハ此病ニ於テ甚緊要ノ事務トス唯之ヲ行フノ外他策無キ一屢之有レハナリ

其一欬嗽 是本病ニ離ル可ラサルノ常證ナリ

ト雖氏増劇スレハ唯患者ヲ困厄セシムルノミ

ナラス肺中更ニ焮衝ヲ起シ或ハ咯血ヲ誘起ス

故ニ其増劇セシムルノ因ヲ探テ之ヲ寛解セン

一ヲ求ムヘシ前段吐痰ヲ論スル
条ヲ比考スヘシ

其二朝汗 是亦本病ニ傍フノ常證ナレ氏過度

ニ漏泄スレハ醫治ヲ要ス常ニ衣衾ヲ輕クシ數

外氣ヲ受ケシメ早且速ク卧蓐ヲ離レシメ時々

緩下藥ヲ服セシメ或ハ鑛酸叔飲亞明礬撒爾比

亞泡劑ボレ舌スラリキ未詳日ニ四
ハ至三十ハ等ヲ用ル

ヲ宜シトス

其三泄瀉 是溶崩初起ノ一主徵ナリ非常ニ虛

脱ヲ起スカ故ニ速ク遏止セン一ヲ要ス酸味ノ

諸品泡釀ノ諸物ヲ禁シ西瑪爾拔亞兒尼加根刺

答尼石灰水阿芙蓉等ヲ用フヘシ但阿芙蓉ハ内

服スレハ體ニ害アルヲ以テ之ヲ乳汁ニ和シ灌

扶氏遺訓 卷之三

通鑑

腸藥トシ施スラ佳トス其泄瀉若シ感冒或ハ腸
胃不化ヨリ来レル者ハ各其因ニ隨テ之ヲ治ス
ヘシ
其四咯血 是嗽衝ヨリ来ルアリ腸胃汚物ノ刺
衝ヨリ来ルアリ血絡ノ膿壞侵蝕ヨリ来ルアリ
溶崩ヨリ来ルアリ各其因ニ隨テ其策ヲ處スヘ
シ
其五鵝口瘡 是甚タ煩困ノ一證ニメ病末ニ發
スルヲ常トス蓬砂ヲ桑椹舍利別ニ和シ用ルヲ
佳トス若シ効無キ者ハ皓礬ヲ百藥煎越幾斯過

爾託^シ舍利別ニ和シテ瘡上ニ塗^ルシ^{第百二}
最後時期^{即第三期}微候^{前ニ詳ナリ}ニ至テハ術力既^テ竭盡
ス唯諸證ヲ寬解メ姑^ク困苦ヲ靜頓シ以テ安ラ
カニ黄泉ニ逝カシムルノ外ナシトス而其最モ
困苦トスル所ハ鵝口瘡ト吸氣ノ乏^キトナリ此
時ニ當テ患者ヲメ自ラ痛苦ヲ忘レ快然トメ神
ヲ清淨無累ノ域ニ馳セ晏然トメ魂魄ヲ天地ニ
歸セシムル者ハ獨阿芙蓉ノ存スルアルノミ若
此藥微^ニリセハ斯ノ如キ患者ニ遇テ醫其何ヲカ
為ル^トラ得^ン是故ニ阿芙蓉ノ此期ニ於^テルヤ患

扶氏遺訓 卷之三

通鑑

ノ壤域ヲ占メ汎ク肺質ヲ侵サス亦總身ヲ害セ
ス膿ヲ排泄スルノ猶打膿法ヲ行ヘル者ノ如ク
全軀ニ事ナク毎日多量ノ膿或ハ臭穢甚キアリヲ咯出シ
テ十年二十年或ハ其餘モ生命ヲ保續スル者ア
リ或ハ其囊潰亂メ傍圍ヲ侵蝕シ漸エス欬メ膿
ヲ咯出シ既發肺勞ノ諸證ヲ逞發スル者アリ或
ハ膿囊初起ヨリ肺ノ外面ニ位セルカ若ハ原内
部ニ位セル者徐ク外部ニ出テ焮衝ノ為メニ肋
膜ト癒着スル者アリ此證ハ其初甚々鑿定シ難
シ是レ患者胸内ニ患苦ヲ覺ルノ少ク大ニ呼吸

天妨ケス欬嗽亦輕微ニノ或ハ全ク之無キ者ア
レハナリ唯微熱留連メ羸瘦ヲ兼ルト赤尿ヲ泄
スト患者一方ニ卧スノヲ得サルト之ヲ徵スハ
キノミ管ステトスコト聴ヲ以テモ亦之ヲ察ス
ルノヲ得ベシ其膿聚積スレハ胸部一處膨然ト
メ腫起シ其部焮熱メ終ニ肋間ニ脹出シ漸ク波
動ヲ覺ルニ至ル是ニ於テ自ラ破潰スルカ若ハ
之ヲ截開シテ全癒ヲ得ルノアリ或ハ其膿囊ハ
全形ヲ吐出メ一旦輕快ヲ得レ在不日ニ復更
ニ膿囊ヲ釀シ一吐一釀陸續相次テ遂ニ悉ク肺

質ヲ費耗スルニ至ル者アリ結核勞ノ各核序ヲ
 逐テ結膿スル者ニ此類甚多シ或ハ又其膿ヲ血
 中ニ吸収シテ他部ニ輸送シ尿管等ヨリ之ヲ排
 泄メ全癒ヲ得ル者アリ然レ是甚希有ノトス
 他部ノ内臓ニ於テモ亦同種ノ膿膿ヲ致シテ膜
 囊ニ包蓄セラレ勞瘵ヲ發スルトナク能ク生涯
 ヲ終ル者アリ然レ一且破綻スルト有ハ其膿
 内部ニ溢出シ外貌健全ノ人ヲメ卒ニ死斃セシ
 ムルナリ即腎肝ノ膿膿腹腔ニ溢出シ腦ノ膿膿
 頭腔ニ潰決スルカ如シハ全ク之無キ未ダ

紅顴肺勞

ヲチシスフロリダ
羅即焮衝性肺勞

徵候 初起ノ徵候既ニ前ニ論說セリ 將發肺勞治
法第一ニ擧

ク増進スレハ特ニ兩顴紅色ヲ畫シ食後手掌兩

頰煩熱シ兼ルニ遷延熱ヲ以テス而乾欬スルヲ

常トスレ氏或ハ至僅ハ痰沫ヲ吐スルアリ且多

ハ皆咯血ヲ兼ルナリ

其本性肺ノ焮衝ナリ大抵初ヨリ結核ヲ夾ミ或

ハ卒ニ結核ヲ生シ膿潰ニ歸テ咯血スル者ハ殊

合ニ然リトス

夫ノ遺也

治法 將發肺勞治法ノ第一条ニ揭示セル諸法ヲ
 連施スヘシ就中時々刺絡ノ少許ノ血ヲ瀉シ胸
 部ニ蟻針ヲ貼シ乳汁乳清ヲ服セシメ實艾答里
 斯老利兒結爾斯水ヲ用ヒ打膿法ヲ行ヒ野外ノ
 氣ヲ引タラ以テ主トスヘシ而又大麥粉沙列布
 亞兒魯附燕麥飲製法前加爾郎健苔傑列乙等ノ
 如キ熱性ナラサル緩和ノ傑列乙類ヲ兼用セン
 一ヲ要ス此證ハ結核ヲ兼ル者多キ力故ニ亦茲
 ニ注意セスンハアラス
 結核肺勞ト粘液肺勞ハ後ニ本條アリ按ニ結核
勞ト粘液

勞ト共ニ肺勞ニ屬スルカ故ニ茲ニ論次スヘキ
 ニ似タレレ之ヲ後ニ擧クル者ハ消削病區分ノ
 序ニ準ラシ
 者ナラシ

咽喉勞 ブチシスタラセアリスエトラレ
インゲア羅ケールテリリンク蘭

徵候 聲音嘶啞シテ乾欬シ後チ漸ク膿痰ヲ咯ス
レ其初起ニ於テハ

吐痰微 ナシ 氣管焮痛ノ内面粗糙ヲ覺工或ハ之ヲ壓

シテノミ疼痛ヲ知り高笑劇談等喉頭ニ努カス

ル一有ハ必欬嗽スレレ飲食嚥下ハ自在ニメ疼

痛ナク病増進スレハ疼痛
スル者間ホ之アリ胸痛氣急等ノ肺ノ患

證ヲ缺ケル者是ナリ其初起久ク熱ヲ發セス大

抵釀膿スルニ至テ乃^チ發熱^ハ其經過甚々緩慢ナ
 リ綿々年ヲ經ル者少カラズ而メ氣管全ク膿壞
 荒蕪シ或ハ釀膿肺中ニ連及メ乃^チ斃ル、ヲ常ト
 ス
 原由 近因ハ氣管ノ慢性焮衝ニメ其終リ膿潰ニ
 陷ルナリ其遠因甚々多シ經久感冒ヲ最トス自
 餘黴毒瘰癧等ノ病毒轉徙高歌笑談叫號等過度
 ノ喉頭努力之カ因トナル此病氣管腺ニ位セル
 者屢アリ灰白曇暗ノ塊痰ヲ咯スル者即チ是ナ
 リ

治法 遠因ヲ蹤跡シ肺勞ノ通則ニ準テ之ヲ行フ
 ヘシ但其患部ノ異ナル肺ニアラズメ氣管ニ在ルヲ云フニ斟酌
 ヲ加ヘ且久キニ堪テ永ク一法ヲ連施セシメ
 要ス蓋シ其病ノ頑固ナルカ為ナリ其常ニ良驗ヲ奏セル者ハ
 瑞香皮打膿法ヲ頸圍ト上膊トニ行フテ久ク瘡
 サス嚴ニ防焮ノ攝生ヲ命シ咽喉ノ努力ヲ避ケ
 疼痛ノ發スル毎ニ蟻針ヲ貼スル等ナリ而感冒
 ニ起因セル者ハ硫加爾幾膏ヲ加ヘ丸藥トス
 普洛乙墨兒散附實芟答里斯蜀羊泉煎高苜越幾
 斯結爾歇兒黥失刺蘊麻爾羅歇ノ新鮮絞汁蘓魯

夫大遺川 卷之十二 十三 適道齋藏

林加爾藥第百二十五方「エゲルセソウトブロン」殊効「エ

ムセルケ」テルブロン（西ナカ）等ヲ用ヒ衰弱甚

キ者ハ没藥等第百二十六方ノ強壯藥ヲ兼用シ黴毒及

瘰癧ニ起因セル者ハ甘汞ヲ與ヘテ吐涎スルニ

至ルヘシ初起ニ於テハ「ハ」リングメルキ（ハ）リ

ハハ魚名ナリ「メルキ」モ亦早朝空心ニ與ヘテ良

驗アル「ア」リ其他蜀葵接骨木花失鳩答菲阿斯

ヲ煮タル濕蒸氣或ハ没藥煎爺兒煎等ノ拔爾撒

謨性乾蒸氣ヲ吸入スルモ亦甚タ功アリ（乾蒸氣）

未詳（差別）但感動ノ遲敏ニ注意メ之カ為ニ効ヲ増

鬪セシムル「」勿レ余曾テ失鳩答硬膏ニ菲阿斯
ヲ加ヘ久シク頸圍ニ貼シテ良効ヲ収メシ「」屢
之アリ

肝臟腎臟膀胱子宮腸間膜等諸器膿勞

徵候 各其部位ニ當テ固有ノ醜膿證ヲ見シ兼ル


ニ遷延熱ヲ以テスル「」肺勞ニ於ケルカ如キヲ

以テ之ヲ徵ス即「」肝勞ニ於テハ肝部ニ壓重疼痛

ヲ覺エテ其疼ニ右臂右股ニ連及シ左側ヲ下ニ

メ卧ス「」能ハス皮膚及痰沫黄色ヲ呈シ消食宜

ヲ失テ時ニ嘔吐シ大便秘閉シ或ハ瀉下シ小便
赤濁スル等ヲ徴トシ腎勞ニ於テハ腎部壓痛ヲ
覺エテ仰卧スレハ増劇シ患部ノ方ノ足脚搗擗
シ尿中膿ヲ交フル等ヲ徴トシ腸勞ニ於テハ腹
肚緊滿メ疼痛シ大便ニ膿血ヲ交フルヲ徴トシ
膀胱勞ニ於テハ膀胱ヨリ膿ヲ下シ子宮勞ニ於
テハ子宮ヨリ泄スヲ以テ徴スル等ナリ然レ腸
間膜勞及腹内膿囊勞等ノ如ク其部位外表ニ通
セス其膿ヲ外ニ排泄スルヲ能ハサル者ニ於テ
ハ明ニ之ヲ辨スルヲ難シ唯其部ノ壓重疼痛及



腫脹ト勞熱トヲ以テ之ヲ徴スヘキノミ
外部ノ創傷潰瘍付骨疽等モ潰膿スルヲ久フシ
テ脫液多キ者ハ終ニ勞瘵ニ陥ルヲアリ腰筋膿
腫腰筋焮衝ハ前ニ本条アリノ如キハ殊ニ然ルヲ多シ
原由 各部釀膿ノ因或ハ其部ノ焮衝ヨリ來レル
アリ或ハ病毒轉徙ニ由ルアリ或ハ他部ノ膿液
轉輸ニ由ルアリ殊ニ腎勞ハ他部ノ膿液轉輸ニ
由ル者多シ
治法 耗液ヲ補益シ脫カヲ復治シ勞熱ヲ制頓ス
ル等統テ肺勞ノ治轍ヲ蹈ムヘシ而膀胱勞子宮

失大貴川 卷之十二 適適齋

扶氏遺訓 卷之十二
勞ノ如キハ藥液ヲ注入シテ直ニ其潰瘍ヲ療ス
ヘシ又肝及腎ノ潰瘍ノ如キハ自其膿ヲ外泄セ
ントメ外ニ腫脹スルコトアリ常ニ茲ニ注意シテ
其腫脹波動ヲ見ハスコト有ラハ乃截開ノ之ヲ泄
スヘシ

扶氏經驗遺訓卷之十二終



