

74
1448
13



扶氏經驗遺訓卷之十五

足守

緒方章公裁

義弟郁

子文

同譯

西肥

大庭志景德

參校

第九編

過泄病

「オ」
「フ」
「ル」
「マ」
「ー」
「チ」
「グ」
「オ」

總論


徵候 沕^ウ乙^イ粘液。血液。或ハ自餘ノ諸液常度ヲ越工

若クハ常調ヲ錯テ過度ニ排泄スルナリ

原由 之ヲ總ルニ血液一部ニ鬱滯充積シ或ハ一

扶氏經驗遺訓卷之十五

適道齋藏



<91-1908(3)>

部ノ運營亢盛シ或ハ一部ノ刺衝過度トナリ或
ハ一部ノ衰弱弛緩スルニ在リ而其刺衝ハ舍密
刺衝病黙加刺衝病器質變常肺結核ノ如キ是ナリ病毒轉
徙。交感刺衝等ナリ其衰弱ニ由ル者ハ縱弛ノ維
持ノ力ナク液ノ充張ヲ拒ムヲ能ハス以テ其脫
泄ヲ恣ナラシメ或ハ其管圍ノ針眼哆開メ内液
自ラ滲漏スルニアリトス

治法 先其原因ヲ除クニアリ故ニ血液鬱積ニ因
セル者ハ之ヲ驅散シ運營亢盛ニ原ケル者ハ之
ヲ減退シ焮衝性ト感動過敏性ト刺衝ヨリ起レ
區別セズンハアラス

ル者ハ本部刺衝ト交感刺衝ト各之ヲ芟除シ衰

弱ヨリ来レル者ハ之ヲ強壯ニスルヲ法トス然

レ氏危篤急ニ迫ル者ニ於テハ直チニ局處藥血止

藥收瀉藥ヲ用テ其漏泄ヲ遏止セスンハアラス

其一失血病ハドモルラギア「羅」ゲ蘭

總論

徵候 血液管外ニ溢出メ體外腔内。或ハ蜂窠質内
ニ漏泄スルナリ而脈管ノ縱弛ヨリ起ルト破綻
ヨリ来ルトアリ

蓋血液ハ生カヲ舎セル貴要ノ活液ナリ故ニ一分ノ血液ヲ失ヘルハ即チ一分ノ生カヲ失ヘルニメ必ス衰弱ヲ將來スルヲ論ヲ俟タス是ヲ以テ此病ノ安危ハ唯其血量ノ多少ニ係ル者トス若其脱泄過多ニメ急劇ナル者ハ忽然トメ死ヲ致シ少量ナルモ綿々トメ久ク止サレハ徐ク虚脱メ衰弱諸病ノ原トナル然レハ焮衝病多血病ニ於テ之ヲ發スルハ自然ノ良能ニメ大利益トナリ能ク其病ノ分利ヲ營ムトアリ以上總身ニ致ス利害ヲ論ス局處ノ患害モ亦忽ニス可ラス肺胃ノ如キ貴重

ノ部ニ發メ脈管破綻セル者ハ殊ニ然レ毎常之ヲ創傷ノ如ク看做セントヲ要ス而其繼發スル所ハ焮衝漏血硬腫膿潰ナリ
原由 近因ハ血液ノ充張ト脈管ノ抗拒ト其平衡ヲ失ヘルニ在リ血行増進シテ充張過劇トナリ脈管ノ抗拒ニ克テ排開決破スル者アリ之ヲ實性失血トス血行ハ平常ニ異ナラサレハ脈管虚衰メ之ヲ抗拒スルヲ能ハス以テ恣ニ漏泄セシムル者アリ之ヲ虚性失血トス
實性失血ノ因總身ニ係レル者ニ般アリ一ハ血

脈運營ノ亢盛ナリ過酒過動忿怒驚愕等内外起熱ノ諸件失血ノ抑遏諸熱病

焮衝病等之一ハ神經運營ノ亢盛ナリ感動過敏

カ因トナル其局處ニ係レル者ハ二部ノ焮衝痙攣病毒

アリ證轉徙器質變常結核瘰交感刺衝腸胃汚物蛔虫齒

肉等等ナリ

虚性失血ノ因總身ニ係レル者ハ勞瘵腐敗熱全

軀衰弱失苟兒陪苦等ナリ其局處ニ係レル者ハ

一部ノ衰弱弛緩ナリ刺衝過度或ハ温蒸過度打

撲壓迫等ニ因ス而一部衰弱ヨリ發セル失血證

間全軀運營ノ亢盛ヲ兼併スルヲアリ肺及子宮

ノ失血ニ此證多シ

又血液稀薄ニ過テ其質凝聚シ難キ者失血ノ因

ト為ルヲアリ即チ失苟兒陪苦斑病遺傳ノ失血等

ニ於テ見ルカ如シ

治法 先其虚實ヲ検査シ實性ノ者ハ亦焮衝性血多

性ナルカ將神經性ナルカラ鑒定シ或ハ防焮諸

法ヲ行ヒ或ハ鎮痙降和ノ法ヲ處シテ而腸胃汚

物局處刺衝等ノ誘因ヲ除去センヲ要ス若其

諸法功ナキ者及危險急ニ迫ル者ハ止血藥收瀉

藥ヲ用ヒ或ハ外術ヲ行テ之ヲ遏止スヘシ脈細

微ニメ絲ノ如ク或ハ不齊結代シ耳鳴リ眼昏ミ
四肢厥冷シ頭眩暈スル者ハ是危險急ニ迫ル
ノ徵ナリ直ニ止血ノ法ヲ處スヘシ
殊ニ注意スヘキハ夫患部衰弱ト全軀ノ運營亢
盛ト合併セル者ナリ即全軀ノ為ニハ清涼減祛
ノ法ヲ處スヘク一部ノ為ニハ強壯藥ヲ用ヒン
トヲ要ス一部打撲ニ起レル失血ノ如キ是ナリ
其一部衰弱メ全軀血脈ノ運營亢進スレハ兩因
合併メ血液愈患部ニ充張ス故ニ刺絡メ血ヲ瀉
スルト患部ニ寒冷亞兒尼加及其他ノ強壯法ヲ

處スルト相兼子サルトヲ得ス

衄血 ユピ スタルキシス 羅子

衄血ハ平常ト病時トニ拘ラス世間ニ多キ失血
ニメ多クハ腦ノ多血鬱積ヲ導決スヘキ妙機ニ
出ツ然レ其漏泄過度ナレハ終ニ危險ニ陷リ
且死ヲ致ス者少カラス

原由 大抵多血ヨリ來ル故ニ少年ニ最多シ然レ

氏又血液溶渙 失苟兒陪 苦斑病等 月經痔血ノ不順腹内ノ

刺衝 蚶虫 類等 起因セルモ亦之レアリ

治法 凡衄血ハ其害顯著ナルニ非レハ決メ過止
 ス可ラス止血早キニ過テ眼盲耳聾腦瘀衝等ノ
 難證ヲ起セル者其例少カラス唯其漏泄過度ニ
 メ顔色灰白脈細小結代頭眩暈等ヲ發スル者
 或ハ衰弱及血液溶渙ニ起因セル者ノミ之ヲ過
 止スヘシ其法冷水ヲ前額ニ注キ醋明礬水綠礬
 水ヲ嗅入シ或ハ之ヲ注射シ脚浴手浴ヲ行ヒ甚
 キ者ハ明礬水ニ撒絲ヲ醃シテ鼻中ニ填塞スル
 等ナリ「フルーイパヒール」紙名一片ヲ口中ニ嚙ミ
 或ハ冷濕法ヲ陰部ニ行テ即効アルヲアリ内服

ニハ清涼下泄ノ劑ヲ用フヘシ就中酒石冷水多量ヲ和
 ス収斂亞的兒ヲ佳トス痙攣性ノ者ハ少量ノ吐
 根或ハ阿芙蓉ヲ酸類ニ伍シ與フヘシ
 屢再發スル衄血ハ其因ヲ查點メ之ヲ根治スヘ
 シ其因ハ多血衰弱腹内刺衝失苟兒陪苦血液腐
 敗等ニ在ルヲ多シトス其血液腐敗ニ原一者ハ
 幾那硫酸最モ効アリ

咯血 「ハ」ド「フ」テイシス「羅」

徵候 欬メ血ヲ咯出ス故ニ其血肺中若ハ氣管喉

頭ヨリ漏泄スルヲ微スヘシ其血唯口内ニ滲漏シ或ハ鼻ヨリ出テ口内ニ流ル、者此病ニ疑似スルヲアリ能ク鑒別セシヲ要ス

此病輕重安危甚タ一樣ナラス今之ヲ三等ニ區別ス其一輕證呼吸不利欬痰疼痛等ノ胸患前驅セス兼發セス一發後復來ラス胸部ニ餘患ヲ貽サ、ル者是ナリ其二重證既ニ早ク乾欬等ノ胸患有テ少前ニ戰慄ノ脈進ミ咯出スルニ方テ煩悶欬嗽脈亢揚面色慘澹等ノ諸證ヲ兼子少時ヲ經テ復咯出シ次テ氣急乾欬持續スル者是ナリ

其三險證未此患ヲ發セサルニ先テ患者既ニ肺勞ノ素質ヲ具ヘ一朝咯血スルニ當テハ煩悶窘迫極メテ甚シク一身發熱メ四肢厥冷シ冷汗出テ鮮血ヲ吐スルヲ數回次テ險篤ノ胸患竝ヒ起ル者是ナリ

此病ノ安危ハ必シモ血ノ多少ニ拘ラス唯原因ト體質トニ由ル者トス故ニ其患痔血ノ壅閉ヨリ來テ胸廓健良毫モ肺勞ノ素質ヲ具セサル者ハ數椀ヲ咯ク氏害ヲ惹クヲナシ然レ氏其素質アル者ハ微々タル一咯モ甚タ危篤ニメ必肺勞

ニ轉スルノ恐アリ

咯出スル所ノ血色曇黯ナル者ハ既ニ早ク漏泄
セル者ヲ排擯スルナリ誤リ認テ病ノ仍留連セ
ル者トスルヲ勿レ

此病ノ危険ハ出血ノ瞬時ニ在ラスメ多ク皆繼
發ノ肺焮衝ト肺勞トニ在リ真ノ咯血證窒息ヲ
起シテ斃ル者ハ甚タ罕ナリトス

原由 凡此病ハ其安危全ク素因ノ有無ニ管係ス
故ニ之ヲ檢知スルヲ最要ナリ素因トハ何ノ所
謂肺勞素質ナリ 肺勞条ヲ見ヨ 然レ肺勞既ニ發メ咯血

ハ其傍證ナルヲ亦屢アリ誘因ハ舞蹈馳走飲酒
驚愕溽暑熱蒸等ノ如ク内外軀體ヲ熱セシムル
諸件或ハ叫號ヲ劇クシ吹器ニ耽ケル等ノ肺臟努
力或ハ打撲墜下等強ク胸内ニ徹スル外傷腐敗
氣酷烈氣ノ吸入痔血經血等ノ抑遏皮疹内陷蒸
氣閉塞肺焮衝肺結核失苟兒陪苦ノ血液溶渙等
ナリ而其病ノ虚性ニ属スルト實性ニ属スルト
ヲ區別スルヲ殊ニ緊要ナリトス

治法 精神ヲ鎮メ軀體ヲ靜カニシ言語笑談ヲ禁

シ肺ノ微動モ必ス害アリ 衣服ノ壓迫ヲ脱シ冷氣ヲ引カシ

冷飲ヲ喫セシメ便秘スル者ハ灌腸法ヲ施シ
證ニ隨テ多少ノ瀉血ヲ肘ニ行フ大衰弱ノ者血
液溶渙ニ傾ク
者ハ之ヲ普通ノ第一治則トス總テ咯血較多
キ者ニ即効アル一法アリ食塩乾末一茶匙ヲ口
内ニ含ミ徐々ニ水ヲ以テ送下スル是ナリ證ニ
隨テ八分時毎ニ之ヲ行フヘシ

各證治法

第一焮衝性咯血 體質少壯脈實シ口渴シ出血
ノ抑遏起熱ノ諸因及ヒ外傷等ヨリ起レル者是
ナリ多量ノ瀉血ヲ行ヒ證ニ隨テ數
之ヲ行フ清涼ノ攝生

ヲ命シ消石ニ酒石トス菲阿斯トス實斐答里斯トスヲ伍メ第
百
四方之ヲ與ヘ或ハ消石ニ酒石ヲ研和シ粘漿ヲ
以テ送下セシメ殊効
アリ脚浴ヲ行テ足ヲ垂下セシ
メ胸部ヲ冷濕シ灌腸法ヲ施シ出血抑遏ニ因セ
ル者ハ從來ノ患部ニ蟻針ヲ貼スヘシ

第二痙性咯血 前段ノ諸徵ナク體質虛弱ニメ
感覺銳敏四肢冷エ脈細ナル者はナリ少量ノ吐
根第百四
十六方及酒石酸ニ菲阿斯ヲ伍メ第百四
十七方與フ
ヘシ而効ナク且單純神經性ナル者ハ酸類ニ阿
芙蓉ヲ配メ第百四
十八方用ルヲ宜シトス此證間亦血

液鬱積ヲ兼併スル者アリ然ルキハ先少量ノ瀉
血ヲ行ヒ消石ニ菲阿斯ヲ加ヘ與ヘ兼テ收斂亞
的兒ヲ粘味乳劑ニ滴加シ或ハ實芟答里斯ヲ蘓
魯林ニ和メ第四百九方用フヘシ若胸部痙攣甚クメ
欬嗽疼痛劇キ者ハ油質粘味ノ劑第五百五方ヲ服セ
シメ鎮痙蒸溺法ヲ胸部ニ行ヒ蒸餅母琶布ヲ上
膊ニ貼スルヲ宜シトス

第三腸胃性咯血 腸胃汚物ノ諸徵ヲ兼子殊ニ
膽液證ヲ見ハセル者はナリ芒消ニ答麻林度ヲ
伍スル等ノ清涼下劑ヲ投シ灌腸法ヲ行フヘシ

若自ラ已ニ膽液ヲ吐スル者ハ吐根ヲ與ヘテ其排
泄ヲ扶クルヲ良トス

右件ノ三證右ノ如ク原因ヲ攻ルノ諸法ヲ行フ
ト雖氏失血依然トメ退カス或ハ其咯出過多ナ
ル者ハ直チニ第四百四十八方ノ止血藥ヲ與ヘテ
可ナリ

第四虛性咯血 肺臟弛粘液失苟兒陪苦性ノ
血液溶渙或ハ膿勞證ノ血絡破壞等ヨリ發シ運
營亢盛ノ徵ナク亦痙攣ノ諸證ナキ者はナリ此
證ハ始ヨリ止血法ヲ處セ一ヲ要ス但脈候ニ

嫌ナキ者ハ先適宜ノ瀉血ヲ肘ニ行フヘシ而冷
氣ヲ引キ冷水ヲ服シ冷湯法ヲ施シ氷片ヲ胸ニ
貼シ明礬ヲ用ヒ第百三十五方殊効アリ幾那撒爾末兒扶斯
百藥煎等ヲ與フルヲ宜シトス食塩一茶匙ヲ頓服
スルモ亦奇驗アリ

差后治法 咯血ノ差后ハ再發ノ外恐ルヘキ者
ニッアリ創處ノ焮衝ト肺臟質中ノ溢血ト是ナリ
此両患アレハ必ス吐膿ヲ致シ或ハ結核ヲ生ス
故ニ差后仍少時間嚴ニ防焮ノ攝生ヲ命シ且肺
ヲ勞スルノ諸件ヲ禁シ胸部ニ壓迫疼痛仍殘

一ヲ見ハ適宜ノ瀉血ヲ肘ニ行ヒ或施芫菁
硬膏ヲ患部ニ貼メ久ク癒ヤス消石及清涼下劑
ヲ用フヘシ而肺ヲ清刷スルニハ甘乳清或ハ酸
乳清ヲ與ヘ或ハ蘆根蜜製法未詳ノ溶水酒石葉ヲ
和メ服セシメ而後ニセル水鑛泉ヲ用ルヲ佳
トス差后既ニ三週ヲ經テ咳嗽全ク發セス胸内
微患ヲ見ル一ナケレハ乃纔メテ肺勞ノ恐レナ
キ一ヲ保證スヘシ然レ氏尚遠因ヲ注視メ痔疾
腹疾惡液病等仍害ヲ為サレ一ヲ慮ラハ各其治
法ヲ處セレ一ヲ要ス而居恒過動飲酒等ノ起熱

法ヲ處セレ一ヲ要ス而居恒過動飲酒等ノ起熱

諸件ヲ避ケ高歌號叫等ノ肺ノ努力ヲ禁シ便秘
 セハ速ニ之ヲ利シ毫モ呼吸不利ヲ見ハ直ニ刺
 絡ヲ行フ等再發ヲ預防スルノ樞要ナリ
 唾血 咯セス歎セス血ヲ吐ク唾ヲ吐クカ如
 ク或ハ唾液粘液ニ混メ出ル者はナリ是日常多
 ク見ル所ニメ固ヨリ危篤ノ病ニアラス其血ハ
 齒齦上顎或ハ鼻ヨリ出ル者ナリ其因モ亦多ク
 ハ一局處ノ事ニ係レ氏或ハ痔血ノ閉止ヨリ来
 リ腸管兩端ノ對稱機ニ由テ痔血ニ代リ發ス或ハ失苟兒陪苦溶渙
 ニ原クモ亦之アリ而此失血ハ其發作大抵朝ニ

在ルヲ以テ常トス治法ハ撒爾非亞醋鑛酸明礬
 等ノ含嗽劑ヲ外用シ痔疾失苟兒陪苦ノ療法ヲ
 行フ等ナリ

嘔血「ハ」ド「マ」テ「メ」シ「ロ」ブル
「ド」ブ「ラ」キ「ン」グ「蘭」

徵候 嘔吐ニ由テ血液ヲ外泄ス其血他物ヲ雜ヘ
 サルアリ食物或ハ膽液ヲ混スルアリ其色鮮紅
 ナルモ有レ氏多クハ曇黯ニメ靜脈血ノ如シ其量
 僅少ナルアリ毎回一匙許ナルアリ日ニ二三回
 吐メ二三日留連スルアリ二三日ヲ間テハ吐ス

ルアリ日期ヲ刻メ吐スルアリ而大便ニ黑色ノ
凝血ヲ下スヲ常トス

傍證ハ惡心煩悶心下痞滿或ハ疼痛シ或ハ發熱
シ脫力極テ甚シク顔面黧澹萎縮シ汗出テ眩暈
スル等ナリ始メ頭腦ノ患證ナシト雖モ衰弱漸
ク加ハルニ隨テ譫語瘈瘲等ヲ發シ脈漸次ニ細
小ト為テ結代シ屢昏冒メ終ニ死滅ニ歸ス
嘔血ハ危險ノ病ナリ發熱劇キ者ハ殊ニ危シ一
時半若ハ二時毎ニ連發スル者及硬結腫等ノ不
治ノ因ヨリ來レル者モ亦然リ時期ヲ定メテ發

作スル者ハ較安ク痔血月經ノ抑遏ヨリ起レル
者ハ最モ危カラストス一男子痔血閉塞ヨリ嘔
血ヲ患ヒ每時一椀許ヲ吐スレト吐後直ニ食ニ
就キ更ニ餘患ヲ見サリシ者アリ但其危險トス
ル所ハ繼發ノ胃脘衝ト虚脫トナリ

原由 近因ハ其血絡ノ弛開若ハ破綻ナルト他ノ
失血ニ異ナラス而其血胃ヨリ出ルアリ或ハ路
ヲ短脈ニ假テ脾ヨリ出ルアリ短脈ハ脾ヨリ胃
ニ連ル血脈ナリ
解剖書ニ就テ遠因ハ痔血月經壅閉メ血液胃ニ
鬱積セル者ヲ最モ多シトス故ニ此病婦人
ニ甚々多シ其他

腹内壅積酷烈膽液硝子碎片或ハ蟲類ノ嚙下毒藥峻烈吐下藥胃ノ打撲外傷血液ノ溶解渙崩等之カ因ト為ル

治法 妄ニ収瀋藥ヲ用ヒテ卒ニ其血ヲ抑遏スル
一勿レ動モスレハ胃焮衝ヲ起シ硬結腫ヲ生シ
或ハ鬱滯ノ汚血ヨリ腸胃熱腐敗熱ヲ誘發スル
ノ恐アリ故ニ其始皆亞刺比亞漿ニ酒石酸或ハ
酸林度方第一ヲ和シタル酸味ノ粘漿及里歇利飲方第一ヲ
與ヘ兼テ油製乳劑ヲ用ヒ醋ヲ以テ胃部ヲ蒸溺
シ緩和灌腸法ヲ施シ脚浴ヲ行ヒ芥子泥ヲ腓腸

ニ貼シ緩和麻醉ノ劑ヲ以テ少腹ヲ温蒸スルヲ
宜シトス尚且多血焮衝ノ徵アル者發熱スル者
ハ足部ノ刺絡ヲ行ヒ痔血月經ノ抑遏セラル者ハ
蟻針ヲ肛圍陰唇ニ貼スヘク若右ノ徵ナクメ瘰
癧性ナル者ハ菲阿斯越幾斯吐根每八分時ハ
用ヒ瘰癧甚キ者ハ阿芙蓉麝香ヲ與フヘシ
治法右ノ如クニメ吐血仍止マス或ハ出血過多
ニメ脈細小結代昏冒等ノ險證アル者ハ乳清ニ
明礬ヲ加ヘ與ヘ兼テ里歇利飲ニ阿芙蓉液ヲ和
シ用ヒ冰冷水ヲ飲料トシ醋ヲ以テ胃部ヲ冷濕

セシヲ要ス吐血後須知ノ二訣アリ諸證ニ通
メ必之ヲ怠ルヲ勿レ其一ハ仍ニ三日間乳清ニ
答末林度ヲ加ヘ或ハ答末林度煎ニ孕鹼酒石ヲ
加ル等ノ酸味緩下藥ヲ用ヒ且灌腸法ヲ行フテ
以テ腸内ノ溢血ヲ排泄スヘキナリ其二ハ數日
間一切硬固ノ食物ヲ禁スヘキナリ蒸餅ノ小片
ト雖氏胃中ノ割口ヲ破傷スル恐レアリ

痔疾

ハバモルロイデス羅ア
ンベイエンシキテ蘭

痔ト痔疾ト自ラ別アリ猶伊倭篤痛ト伊倭篤病

ト差ヒ腺腫ト腺病ト異ナルカ如ク兩患各因ト
證トノ差アリ即痔疾ハ體內ニ屬スル病ニメ痔
ノ内因トシ痔ハ體外ニ屬スル局處ノ患ニメ痔
疾ノ外證トス

此病大別メ四種トス未發痔。即痔。既發痔。尋常ノ

直腸ノ病ニメ盲痔。壅閉痔。變見痔。轉徙證トアリ是

ナリ

凡痔ハ單個局發ノ者罕ナリ大率皆内部病患
ノ外證ニメ痔血ハ即其吉利濟病ナリ而其出血
月經ノ如ク期ヲ定メテ来ルアリ或ハ否ラサル

アリ然レ氏是未十全ノ吉利濟ナラス故ニ之ヲ
發スレ氏病根ヲ除ク_レ能ハス唯輕快ヲ得セシ
ムルノミ

此病ハ慢性病中ノ最モ緩慢ナル者ナリ生涯之
ヲ患ル者少カラス而其根治スルハ唯其因ノ遺
傳ナラス其病未日ヲ延カス其遠因除去シ易キ
者ニ在ルノミ此病又單リ死ヲ致ス者ニ非スト
雖氏内陷メ血液鬱積ヲ貴要ノ内臟ニ起シ或ハ
出血過多ニメ大虚脱ヲ致セハ又夕善ク人命ヲ
傷賊ス然レ氏亦急性病トナク慢性病トナク此

出血彼カ吉利濟ト為テ大ニ裨益アル_レ甚々多
シトス

此病ハ世間之ヲ患ル者ノ多キカ故ニ醫能ク注
視セスンハアラス殊ニ未發痔ノ如キハ醫ノ見
及ハサル所ニ於テ隱ニ慢性諸病ノ因ト為レル
_レ屢之アレハナリ

徵候 腰脊屢疼テ時ニ腹痛シ少腹充實スルカ如
ク緊満シ直腸絞窄スルカ如ク熱灼シ肛門會陰
陰部ニ濕痒ヲ起シテ局處ノ汗ヲ發シ或ハ頑癬
狀ノ疹ヲ生シ大便秘結メ木節ノ如ク小便努責

痛ヲ兼子或ハ淋瀝シ或ハ閉止シ直腸下邊時
 ヲ腫脹シ或ハ硬結シ兼ルニ腦肺胃等ニ血液鬱
 積ノ諸證有テ時々焮熱スル等是未發痔即內部痔疾
 徵候ナリ其他遺傳ノ素質坐メ操作スル生業
 常用飲食ノ熱性ナル等ヲ參勘メ以テ之ヲ鑒定
 スヘシ此期ノ鑒定ハ甚々緊要ナリトス此期ニ
 在テハ其根治仍營ムヘク繼發ノ諸患預メ避ル
 可レハナリ

原由 近因ハ腹内ノ多血ニメ即門脈血鬱積ナリ
 而遠因ハ他血液鬱積ノ因ニ異ナラス即

其一 局處衰弱 下劑過用 溫液過服 殊ニ茶 骨喜 房事過
 度 或ハ屢灌腸ヲ妄施シ或ハ非常部於煦溫
 スル等ヨリ來ル

其二 局處刺衝 起熱ノ飲液 辛味ノ食料 盧會及其
 他ノ峻下藥 微毒 伊屈篤等ノ病毒轉徙 伊屈篤ト
痔ト交相
 發スル之ニ屬ス

其三 形器性壓迫 腹内ノ血行ヲ障礙スル壓迫皆
 之ニ屬ス即腹帶緊縛 屈居久坐 勤學家及履匠ノ
此病ヲ患フル者
 多キ所 大便秘結 硬尿蓄積 內臟壅塞 肝臟ハ門脈
系ノ樞心十
 以ナリ 殊ニ此病ヲ起シ易シ 妊婦ノ子宮 臨月ニ至テ痔
ヲ患フル者多

キ所以等是ナリ

所謂遺傳ノ素質モ他ナシ唯生得痔脈系ノ衰弱
ナルノミ茲ニ健全ノ一人アランニ唯坐メ業ヲ
操リ骨喜ヲ多服シ辛味起熱ノ飲食ヲ貪ルル年
餘ニ至ラハ乃善ク痔家ト為ルヲ得ヘシ
痔疾ハ腹内多血門脈血ナリ故ニ腹内多血ノ患
害ヲ舉クレハ痔疾ノ患害自ラ瞭然タルヲ得
ヘシ即其局處ニ在ル者ハ直腸ノ痔脈充張腫起
メ焮衝失血粘液漏泄等ヲ起シ胃腸不和ニメ消
食健ナラス食欲進マズ酸液鬱滯シ膽液變常シ

胃瘕疝痛ヲ發シ便秘泄瀉ヲ致シ亦善ク膀胱ノ
諸患ヲ起ス等是ナリ其全軀ニ於ケル者ハ神經
ノ交感ト血液鬱積ノ轉徙トニ由テ諸般ノ病患
ヲ誘起ス即瘕瘰頭旋昏冒麻痺卒中依ト昆蛭兒
或ハ心疾喘息咯血肺勞咽喉勞衄血吐血尿血子
宮脫血白帶下諸種ノ皮疾殊ニ頑癬狀ノ疹ヲ陰
部薦骨邊或ハ他ノ遠
隔セル部慢性ノ潰瘍等是ナリ而痔血ノ鬱閉ヨ
リ一種ノ酷厲液所謂ヲ生スルヲモ亦之有ルニ
似タリ

是故ニ右ノ如キ慢性病ニ於テハ常ニ此因痔疾ニ

注視セシテ要ス唯腹内ノ血行ヲ順利スルノ
ミニメ全ク其病根ヲ脱除スルコト少カラス

治法 二般アリ甲ハ病根ヲ抜テ泉源ヲ塞キ以テ
痔血ヲ未萌ニ治スルニ在リ根治乙ハ痔血ヲ喚
起メ局處ノ鬱血ヲ攘ヒ以テ現發ノ患害ヲ制ス
ルニ在リ故ニ乙法ハ其病ヲ根治スルニ非ス唯
一時ノ快ヲ取ル姑息法ナルノミ尚且此法ハ痔
血ノ端ヲ啓テ患者ニ煩ヲ遺スノミナラス或ハ
之カ為ニ惡性危險ノ證ヲ惹出タスコトアリ是故
ニ專ラ甲法ヲ用ヒ乙法ハ唯根治法ノ處ス可ラ

サル者不治ノ病因ヨリ起リ或ハ遺傳ノ素因ヨリ生シ腹内血行ノ支障断テ除ク可キ

者ル或ハ從來痔血ニ慣レシ者或ハ痔血ノ鬱閉危

急ノ險證ヲ起ス者ニ施スヘキノミ

根治法 不断舉動メ久坐セス起熱ノ飲食ヲ禁

シ適宜ニ大便ノ通利ヲ進ムルハ痔疾ノ素因ヲ

除クヘキ最要法ナリ之ヲ犯ス者ハ善ク痔疾ヲ

患ヒ之ヲ守ル者ハ善ク痔疾ヲ免ル患者久ク羈

旅シ或ハ居ヲ田舎ニ移スコト半歳許唯右ノ攝生

法ヲ守テ全治セルヲ目撃セシ者少ナカラス

痔疾ノ本因ハ腹内多血ナリ故ニ之ヲ除クヲ以

テ治法ノ本旨トス **第一** 諸起熱ノ飲食ヲ禁シ久
坐ト腹部ノ屈迫ヲ避ケ嚴ニ房事ヲ慎ミ勉メテ
肢體ヲ運轉シ又腹肚ヲ按撫スヘシ總テ痔家ハ
坐メ業ヲ操ル可ラス唯高椅子ニ憑リ若ハ立テ
其職ニ就カン_一ヲ要ス **第二** 腹内ノ血行ヲ順利
シ内臟ノ壅塞ヲ開達セン_一ヲ要ムヘシ **第三** 適
宜ニ大便ノ排泄ヲ促スヘシ蘆根蒲公英ノ越幾
斯孕鹼酒石 第百六十八方 等ノ緩性解凝藥及ヒ硫黃ヲ
内服スレハ能ク第二三則ノ目的ニ達スヘシ就
中硫黃ハ痔疾ノ特效藥ニメ特ニ其功ヲ痔脈ニ



揮ヒ其運營ヲ進起メ其壅滯ヲ開釋スル俾能アリ
故ニ痔疾ヨリ起レル諸患肺勞水腫ノ如キモ
之ヲ用テ皆奇驗アリ酒石ヲ伍シ用ルヲ最モ良
トス 第百六十九方 神經性ノ患者ニハ沸騰散ヲ和メ之
ヲ與フヘシ 第百七十方 通例前ノ越幾斯劑 第百六十八方 ヲ
連用スル_一二三週ニメ足レリト雖モ功無レハ
硫黃ヲ與フル_一二三_日證ニ隨テ復前藥 越幾斯劑 ヲ
用フルニ宜シ或ハ此ニ盧會ヲ稱用スル者アレ
凡決メ宜シカラス此藥ハ唯腹内ノ多血ヲ増加
メ動モスレハ焮衝ヲ起シ痔血ヲ誘フニ足レル

ノミ大便ヲ利スルニハ蓖麻子油ヲ用フルモ亦
妙ナリ第四内臓ノ頑硬腫ヨリ起レル者ハ有力
ノ解凝藥ヲ用フヘシ就中カル、スバツト鑛泉ヲ特
効藥トス若缺クルニ値ハハ人工品附ヲ製メ之
ヲ與フヘシ其他病毒轉徙ヨリ来レル者ハ各定
類ノ藥ヲ撰用セン一ヲ要ス徵毒ニ水銀ヲ用フルカ如シ第五
直腸及ヒ痔脈ノ局處衰弱ノミニ因セル者ハ冷
水灌腸法ヲ行ヒ血液鬱積著シキ者ハ必、硫黃ヲ
兼用スヘシ

慢性痔疾ニ著草穗浸劑一椀宛毎朝夕連服メ奇

効アルヲアリ之ヲ用ル一期年餘ニメ全功ヲ収
メシ者余屢目撃セリ

局處治法ハ痔核及直腸腫脹ニ冷水ヲ外用スル
ト痔核ヲ截断スルトナリ冷水ノ能ク局處諸患
ヲ散スルノ駿速ナル一ハ人ノ知ル所ナレトモ
ニ此病ニ之ヲ施スハ愚惑ニ属シ亦危險ニ属ス
是唯表證ヲ治スルノミニメ病原ヲ断ツ一ナシ
故ニ之ニ由テ治セリトスルハ猶腺腫ヲ截断シ
或ハ消散セシメテ腺病ヲ治セリト想フカ如シ
豈愚惑ト謂ハサルヘケンヤ血液既ニ久ク腹内

失大貴川 卷之十五 三 適適齋藏

ニ鬱滯セルニ其路ヲ塞テ之ヲ他ニ嚮ハシメハ
必ス轉メ胃膀胱及他ノ内臓ヲ犯シ以テ諸般ノ
篤證ヲ起スヘシ亦危險ノ術ト謂ハサルヘケン
ヤ故ニ此法ハ其病唯直腸局處ノ衰弱ニ因メ腹
内多血ノ候ナク内臓壅塞ノ兆ナク且遺傳ノ素
質ヲ胎セサル者ニ行フヘキノニ嘗テ痔血ヲ發
セシ一有ル者及既ニ内陷メ貴要ノ部ニ轉セシ
一有ル者ハ殊ニ慎テ此法ヲ行フ一勿レ
喚痔法 是固ヨリ姑息法ニメ根治法ニアラス
故ニ唯前治法ニ論說セル諸證ニ行フヘキノニ

ニ法アリ一ハ外ヨリ喚テ血液鬱積ヲ直腸ニ誘
フナリ一ハ内ヨリ進メテ之ヲ茲ニ起サシムル
ナリ甲法ハ脚浴蒸氣浴蒸漏法ヲ行ヒ緩和ニメ
微刺衝スル灌腸法ヲ施シ蜚針或ハ吸角ヲ肛圍
ニ貼スル等ニアリ乙法ハ沸騰散第二蓬砂以上
起熱品以下或ハ盧會沒藥雜腹蘭黑列僕里鐵拔爾撒
謨丸第一百七方ボウルク子酒カムバグ子酒等ノ
如ク特ニ直腸ヲ刺衝スルノ異効アル品ヲ内用
スルニ在リ經閉条ト比患者多血ニメ血液鬱積
ニ傾ケル者ハ甲法ニ乙法中ノ清涼品ヲ兼子用

夫ノ遺ル 通通齋

フヘシ又起熱品ノミヲ用フヘキ者モ必ス甲法
ヲ兼子行ハン一ヲ要ス否ラサレハ血液鬱積ヲ
直腸ニ起サスメ他ノ貴重ノ部ニ致サン一ノ恐
レアレハナリ

按ニ以上論スル所ハ未發痔ニ此編所謂痔
疾ナル者ナリ以下局發ノ痔ヲ論ス即是既發
痔ナリ

盲痔 痔脈充脹シ若ハ直腸ノ蜂窠質ニ血液滲
漏シテ腫起セル者是ナリ肛外ニ在ルアリ肛内
ニ在ルアリ小ナルアリ大ナルアリ或ハ囊狀ヲ
為スアリ囊痔ト名ク疼ムアリ疼マサルアリ或ハ疼

痛忍ヒ難キアリ或ハ亦變ノ硬腫トナル治
法ハ前ニ舉クル痔疾通治法ヲ行ヒ殊ニ清涼ノ
攝生肢體ノ運轉ヲ命シ清涼下劑ヲ用ヒ硫黃ヲ
與フヘシ唯局處ノ衰弱ニノミ起因ノ毫モ内臟
壅塞ノ徵ナク腹内多血ノ候ナキ者ノミ寒冷ヲ
外用メ可ナリ疼痛スル者モ右ノ治法ニ宜シ但
靜息平卧シテ鬱血ノ充張ヲ適宜ニ壓定スヘシ
然レハ劇痛忍ヒ難ク焮衝性ナル者ハ刺絡ヲ行
ヒ琪針ヲ核上ニ貼シ按ニ肛ノ内外ニ拘ラス腫
脹メ突起スル者ヲ核トス
防焮諸法ヲ施シ冷水ヲ外用スベク若感觸甚タ

過敏ナル者ハ古來稱用スル所ノ「リナリア」軟膏
〔附〕或ハ之ニ菲外敷シ縛帶メ壓定スル「四分
阿斯油ヲ加フ時許ナルヘシ已ム「ヲ得サルキハ羅獨窓多兒
〔名〕ヲ以テ冷漏シ或ハ「リナリア」軟膏。菲阿斯油〔各〕
弓ニ鉛糖錢半ヲ和メ貼スヘシ但此法ハ連用ス可
ラス葡萄酒ヲ以テ煮テ製シタル林檎粥ヲ貼ス
ルモ亦驗多シ若夫痔核挺出メ括約筋ニ窘迫セ
ラル、者ハ外術ヲ以テ之ヲ收メント「ヲ要ス」或
ハ傍來ノ他因有テ疼痛ヲ起ス者アリ注意セサ
ル可ラス即「硬尿壅塞腸胃汚物濕濡外氣定類病

毒〔微毒〕感冒ノ類是ナリ或ハ唯單純ノ瘰癧ト原
ク者アリ各其因ニ準テ之ヲ療スヘシ瘰癧ト原
囊痔ハ通治法ノ外冷水ヲ外用スルヲ殊ニ佳ト
ス其著ク増大セル者ハ甚ク患者ヲ煩ハシ慢性
痔血ノ因ト為リ〔血管〕管〔弛〕弛ノ〔毎日〕日〔以〕以テ〔許〕許ノ血ヲ漏泄ス 虛憊セシメ
テ終ニ惡液病ヲ將來ス此證ハ截断スルヲ以テ
無比ノ良策トスルナリ硬結痔モ多クハ囊痔ノ
凝血ヲ含蔵セル者ヨリ他ナラス亦截開シ若ハ
截断スルヲ宜シトス然レ氏真ノ硬結腫トナリ
或ハ膿潰セル者ハ痔瘻ニ轉ス外科術ノ主トル

夫大貴州 卷之十五 三四 通通齋藏

所ナリ

汗痔

按ニ局處脱汗スル者

癬痔

按ニ肛圍頑癬状疹ヲ發スル者

拆裂痔會

陰痔

會陰貌僂屈狀ニ腫起ス

前陰痔

皆痔疾中ノ困難證ナ

リ痔疾ノ通治法ヲ施シ殊ニ硫黃酒石ヲ用ヒ專
ラ清潔ヲ旨トシ微温湯ヲ以テ屢洗淨スヘシ冷
水ヲ外用スルト勿レ鉛類收瀋藥ハ嚴ニ禁スヘ
シ

血痔

每常吉利濟ト看做メ防止セサレトテ

要ス總テ月經ノ如ク從事スルヲ佳トス唯其血
過多ニメ危害ヲ惹クノ恐レアル者ノミ失血病

トメ之ヲ療スヘシニ證アリ一ハ一頓ニ多量ヲ

脱泄メ急ニ危險ヲ致スナリ一ハ慢々ニ少許宛

漏出メ隱ニ神經病水腫病惡液病等ノ慢性諸病

ヲ將來スルナリ共ニ收瀋藥止血藥ヲ用フヘシ

殊ニ明礬ヲ佳トス子宮脱血条ヲ參考セヨ

癰閉痔

急卒ニ過閉セル者アリ緩徐ニ休止セ

ル者アリ急閉ノ者ハ焮衝性疝痛等ノ劇キ焮衝

證ヲ起ストアリ速ニ防焮諸法ヲ施シ蟻針ヲ肛

圍ニ貼シ刺絡ヲ行フヘシ而兩證共ニ經閉ノ如

ク從事セントテ要ス

變見痔

轉徙證ト變形證トアリ

轉徙證ハ其鬱血直腸ヲ辭メ他部ニ徙リ其地ニ
血脈腫脹官能障礙疼痛焮衝脫血漏血等ヲ起ス
ト宛モ直腸ニ於ケルト一般ナル者是ナリ所謂
胃痔血吐肺痔血咯ノ類皆之ニ屬ス其因内部ノ痔疾
未分利ヲ直腸ニ致ストヲ得スメ路ニ此ニ取ル
者アリ或ハ既發ノ痔血壅閉メ轉徙シ來ル者ア
リ乙因ハ鑿定シ易ケレ凡甲因ハ之ヲ知ルト甚
々難シ治法ハ勉テ其分利ヲ本地直腸ニ導クニ在
リ故ニ數蟻針ヲ貼スル等喚痔ノ法ヲ行フヘシ

膀胱痔

ハ轉徙證中極メテ煩困ニメ疼痛最モ劇

キ者ナリ是亦盲痔血痔ノ二證アリ盲痔ハ小便
淋瀝或ハ尿閉ヲ起シ膀胱痙攣シ或ハ焮衝シ終
ニ轉メ粘液漏泄膿潰硬腫等ヲ將來ス血痔ハ尿
血ヲ發シ其血或ハ凝結メ尿道ヲ填塞シ終ニ結
石ヲ生スルトアリ兩證共ニ其膀胱宛モ痔ヲ發
セル直腸ト患狀ヲ同フスル者ナリ治法ハ蟻針
ヲ貼シ或ハ其他ノ喚痔法ヲ行ヒ冷水ヲ外用メ
膀胱ノ鬱血ヲ驅逐シ且痔疾ノ通治法ヲ用フル
ニ在リ而毎四週或ハ直腸腫脹ノ時蟻針四個ヲ

打比通言 卷之三
肛圍ニ貼シ硫黄セル左ル水「ウ」ルチンケル水カ
ル、スバト皆鑛泉名等ヲ常用スヘシ盲痔證ハ其鑿
定殊ニ難シ動モスレハ膀胱伊屈篤尿石黴毒等
ト混同ス淋疾ヲ兼ル者ノ如キハ殊ニ然リ宜ク既往若ハ現今ノ
痔疾證或發作必ス定期アル等ヲ參勘メ之ヲ徵
スヘシ膀胱痔ニ發スル危險ノ一證ハ蓋小便閉
ナリ盲痔ハ腫脹ノ為メニ之ヲ起シ血痔ハ凝血
ノ為メニ之ヲ生ス共ニ測胞子ヲ用ヒテ導泄ス
ヘシ但焮衝證全退クヲ俟テ行ハシカテヲ要ス
若シ施シ難キ一アラハ先紙捻子ヲ挿入テ腫

起セル血絡ヲ壓縮シ或ハ凝血ヲ遣却シテ而後
ニ測胞子ヲ入ルヲ良トス總テ痔ノ轉徙證ニハ
蟻針ヲ直腸ニ行テ其利通ニ刺絡ニ優ルト知ル
ヘシ固ヨリ自然良能ノ吉利濟ヲ營ム地ニメ其
二三弓ノ出血能ク諸證ヲ輕快セシムルト刺絡
メ瀉スル所ノ數地ノ血ヨリ大ナリ是直子ニ閉
脈系ニ其功ヲ致スニ由ル者トス
變形證ハ即粘液痔是ナリ是紅血ニ代ルニ粘液
ヲ以テスル者ニメ直腸ニ在ルアリ膀胱ニ在ル
アリ腔内ニ在ルアリ直腸窘迫等痔疾ノ諸證ヲ

夫大遺川 卷之三 三十七 通言

兼發スルト曾テ痔血ヲ患シテアル等ヲ以テ之
 ヲ徴ス而其直腸ニ在ル者ヲ直腸白帶下ト名ク
 諸惡液病ヲ誘起スル等亦帶下ニ異ナラス原因
 ハ痔疾ノ血ヲ漏泄スル能ハサルニ由リ或ハ
 局處衰弱。病毒轉徙。及全軀惡液質等ニ在リトス
 治法ハ痔血ヲ喚起シ痔疾通治法ヲ行ヒ或ハ苦
 味解凝藥強壯藥ヲ用ヒ著草浸劑。ヒルモンテル
 水鑛泉及他ノ鐵氣ヲ含メル鑛泉ヲ與ヘ兼テ各自
 病毒徴毒殊ニ多シノ有無ヲ慮リ之カ策ヲ為サン
 要ス乳糜利ノ条ヲ參考セヨ

黒物吐下病

「モルビウスニグロ」
 「キテシ」
 「羅」
 「蘭」

徴候 黒色ニメテ多兒ノ如キ者ヲ夥シク吐逆シ且

下泄シ或ハ又褐色若クハ灰色 眩暈顫振シテ衰

弱痙攣ノ諸證ヲ兼發ス

大抵發病前不食痞脹等胃病ノ諸證有テ心窩少
 腹或ハ背脊ニ劇痛ヲ起シ或ハ其痛劇クノ昏冒
 スルニ至リ神志鬱憂等依トホ昆垓兒ノ諸證ヲ兼
 子面色黧淡微黃ニメ睡眠安カラス上腹緊滿メ
 大便秘閉シ脈不齊ニメ結代シ且屢變動スル等

大便秘閉シ脈不齊ニメ結代シ且屢變動スル等

ノ前兆アリ而其發スルヤ顛仆驚駭等ノ激動ニ
由ルカ若ハ故無クハ頓ニ劇ク黑物ヲ吐逆シ隨
テ亦之ヲ下泄シ脈軟小不齊ニ診ス可ラス腹
肚疼痛ノ痙攣劇シク兼ルニ煩悶顛振腹滿冷汗
眩暈昏冒大便努責四肢厥冷等ノ諸證ヲ以テス
或ハ頻ニ吐瀉メ二三日留連スルアリ或ハ止ム
一二三日ニメ復發シ復止ニ以テ數週ニ及フア
リ或ハ每發三四週持續メ發歇シ以テ半歲許ニ
至レルヲ見シテアリ此病ハ衰弱スルニ極メテ
大ナリ其泄ラス所ノ黑物多量ナルヲ實ニ驚異

掛氏遺言 卷之十五

スベク或ハ一日ニ數回ヲ泄ラス者ア此病吐
血ニ肖似スト雖其吐スル所ノ者舊敗血ニメ
參兒ノ如ク鮮紅ナラサルト前驅セル惡液病證
面色黧淡微黃神志鬱憂等ノ諸證ノ甚キト吐初直ニ黑物ヲ下ス
トノ早キ等ヲ以テ鑒別スヘシ
此病皆常ニ危篤ナリ發作中虚脱ノ斃ルハアリ
腐敗ニ陷テ死スルアリ或ハ虚勞水腫惡液病等
ニ終ルアリ而衰弱漸ク加ハリ昏冒頻ニ發シ四
肢厥冷シ冷汗淋漓シ吐下物益増シ脈愈細小ニ
メ知ル可ラサルニ至ルヲ必死ノ徵トス

夫之遺言 卷之十五

子九 遺言

原由 近因ハ胃腸腸間膜ノ血脈壅塞メ血液其内
 ニ充滯瀦留シ日ヲ積テ粘膠シ漸ク多兒狀ニ變
 シ損敗腐壞メ酷厲ノ者ト為レルナリ其血管ノ
 擴張頗ル大ナルヘキハ排泄セル所ノ血量ヲ以
 テ之ヲ計ルニ或ハ許大ノ膜囊ナラサル可ラサ
 ル者アリ解屍メ之ヲ觀ルニ其血管開濶メ間巨
 索ノ如キニ至リシ者アリ而其鬱滯セル敗血漸
 ク其血管ヲ嫩薄ナラシメ以テ僅微ノ因ニモ乍
 チ破綻メ腸胃内ニ溢出スルヲ得ル者トス遠
 因ハ久坐メ腹部ヲ盤屈シ履匠等坐メ業ヲ或ハ

間断ナク苦辛勞思シ或ハ消化シ難ク壅塞メ起
 シ易キ食物ヲ喫シ或ハ厚味膏粱ノ品ヲ飽カ或
 ハ起熱慄悍ノ飲液ヲ用ヒ或ハ痔血月經ノ壅閉
 セル等ニ在リ

治法 刺衝ヲ寛解シ穢物ヲ排泄シ而後傍ラ内臟
 壅塞ノ有無ヲ斟酌メ徐々ニ強壯法ヲ處セシテ
 ラ要ス而此病モ亦吐血ニ於ルカ如ク急ニ遏止
 セサルヲ法トス乳清答末林度酒石酸里歇利飲
 等ヲ用ヒ粘味ノ飲劑ヲ多服シ緩和メ灌腸法ヲ
 行ヒ香竈麻酔ノ藥ニ醋ヲ加テ蒸漏シ香竈ノ微

温浴ヲ施スヘシ諸内服ノ品悉ク吐メ納ルヲ能
ハサル者ニ獨リ香竈浴ノミヲ行テ奇驗ヲ得シ
トアリ病淹滯ノ衰弱甚シキ者ハ麥芽浴ヲ行ヒ
羹汁ニ雞子白ヲ加ヘテ灌腸スヘシ而強壯藥ニ
ハ著草浸劑ヲシト里ヲ與ヘ次デ格綸僕ホ那ヲ用
ヒ差后ハ著草ヲ連服シ必設刺兒灌腸法ヲ行テ
再發ヲ預防スルニ宜シ

尿血「ハ」ド「マ」モ「リ」ア「ロ」ブル
「テ」レ「ン」蘭

徵候 血液尿ト混メ宛モ曇麥酒ノ如キ者ハ腎血

ナリ尿ト分レテ凝固シ器底ニ沈ム者ハ膀胱血
ナリ腎血ハ苦楚疼痛ヲ腎部ニ覺エ膀胱血ハ之
ヲ膀胱部ニ發ス而尿道血ハ間單トリ出テ尿ニ交
ハラサルト有ルヲ以テ之ヲ徵知スヘシ

原由 膀胱血ハ其因ヲ痔疾ニ取レル者最多シト

ス痔疾各ヲ
参考セヨ其他膀胱結石或ハ潰瘍及器質變常

等ヨリ来ルヲ常トス

腎血ハ腎石ヨリ来リ或ハ腎ノ血絡弛緩ニ因ス
麥酒茶等ノ利尿飲液多服利尿藥ノ過用騎馬休
ムトナク房事度ヲ過ス類皆腎脈ノ衰弱弛緩ヲ

起スナリ。其他常習失血ノ抑遏。腸胃汚物或虫等ノ交感刺衝。重擔ヲ負フ等ノ腰筋努力。腎藏焮衝。血液溶渙。老衰等モ亦皆腎血ノ因トナル。尿道血ハ大抵痔疾轉徙ノミニメ皆尿道血脈ノ弛緩ニ因ス。

尿血ニ於テハ焮衝ノ害ヨリモ凝血ノ弊ヲ持テ恐ルヘシトス。尿道ニ梗塞メ尿閉ヲ起シ或ハ其凝塊終ニ結石ノ基始トナル。アレハ九折ハ腎治法 失血通法ニ準ヒ病因ト病證ヲ查點シ以テ其治法ヲ處セン。トヲ要ス。咯血茶ヲ比考スヘシ凡、尿血ハ

虚性ノ者ヲ多シトス。衰弱ヲ起スノ諸因有テ疼痛ナク血液鬱積ノ候ナク病屢發歇ス。然レ年齢ノ老高ナル等ヲ推シテ之ヲ徵スヘシ。此證ハ腎部ヲ冷洗シ或ハ冷漏シ酒精藥ノ擦法ヲ行ヒ龍牙草。著草。撒爾比亞ノ浸劑ヲ用ルラ良トス。而衰弱甚シキ者ハ礬乳清附「カレイベアト」未詳。幾那刺答尼亞。撒爾末兒。扶斯等ヲ撰用シ諸泡釀品及鑛泉ノ服用ヲ禁シ過劇ノ運動ヲ避クヘシ。然レ此血液鬱積。出血抑遏。及焮衝證アル者ハ瀉血ヲ行ヒ從前ノ出血ヲ復起シ清凉諸藥ヲ用ヒレトヲ

要ス勝脱痔ヲ而瘰癧性ノ者ハ少量ノ吐根油製
 乳劑阿芙蓉ヲ與ヘ打撲等ノ外傷ニ起レル者ハ
 冷濕法刺絡ヲ行フテ亞兒尼ニカ加ヲ用ヒ芫菁ノ誤
 用ヨリ来レル者ハ油製乳劑羯布羅ヲ良トシ結
 石ニ原ケル者ハ瀉血防嫩法及結石治法ヲ處シ
 腸胃汚物ノ交感ニ因セル者ハ下劑ヲ與ヘ證ニ
 隨テ吐劑ヲ用ルラ妙トス扁桃油若ハ罌粟油一
 食匙宛朝夕服用スルハ尿血諸證ニ通メ甚タ奇
 驗アリ若夫凝血梗塞メ小便澀閉スル者ハ注射
 法ヲ行ヒ紙捻子ヲ挿ミ測胞子ヲ施スヘシ差後

腎膀胱ノ凝血ヲ清刷セスンハアラス七表五
 水鑛泉ニ乳汁ヲ加ヘ用フヘシウルクガ志根
 鑛泉ハ殊ニ宜トス

斑病ハ一マトシハ羅

徵候 身體諸部處ヲ局セズ黧青色ナル大小斑
 ラ發シ其狀血斑病名後ニ出ツノ如ク亦答痕ノ如キア
 リ而衄血齧血上顎血等ノ失血證ヲ兼發シ大ニ
 脫カメ毫モ熱證ヲ見ハス一無キ者はナリ
 此病ハ發斑熱及失荀兒陪苦ニ甚タ肖似スレ

其發熱ナキラ以テ甲病ト別チ口臭ナク且小兒
ノ多ク患フルヲ以テ乙病ト辨ス然リト雖此病
モ亦畢竟失筭兒陪苦性ノ病類ニ算入スヘキナ
リ而其病タル緩慢ニメ久キラ瀰リ終ニ總身ノ
虚脱ヲ起シ或ハ閉止シ難キ失血屢發メ之カ爲
ニ斃ルヲ常トス

原由 血液溶換ト血管衰弱トナリ
治法 有力ノ强壮收瀋藥ヲ用フヘシ幾那。鑛酸。懈
皮浴殊効アリ余此藥ヲ以テ全功ヲ收メ皆ト少
カラス

一種先天斑病質ト名クル者アリ其稟賦諸種ノ
失血病ニ傾ケル者ニメ或ハ一門悉ク此質ヲ具
ルアリ之ヲ失血族ブルデー
スミリーイト謂フ此質ハ
者ハ唯姑息法ヲ以テ表證ヲ治ルノミ所詮根治
ヲ得ヘカラス早晚失血ヲ以テ其命ヲ終ルヲ常
トス

扶氏經驗遺訓卷之十五 終

