



性諸患補給機變常。組織變性等ナリ其全軀ニ及
フ者ハ總身衰弱ノ覺機亢盛シハ白帶下ノ如キ諸
神經病消削病ノ類ヲ繼發ス若其脫液甚夕過多
ナル者及肺臟ノ如キ貴要ノ器ニ在ル者ハ終ニ
遷延熱骨蒸ヲ起シテ勞瘵ニ陷ルヲ常トス
原由 其因通メ二般ニ歸ス

其一運營亢盛刺衝過度 欣衝性ト神經性ト有テ亦
本患標患ノ別アリ本患ニ屬スル者ハ血液鬱積
病毒轉徙傳染病毒外物竄入組織變性一部ノ感
動過敏平常ノ刺衝モ之カ為等ナリ標患ハ交感

ト對稱トニ出ツ腸胃及内臟ノ交感或ハ皮膚ノ
對稱ニ其原ヲ資レル者是ナリ皮膚ノ運營抑過
シテ其機ヲ他粘液分泌器ニ起シ以テ頑固粘液
漏泄ヲ發セル者少カラス乃粘液勞白帶下等之
ニ因セル者屢アリ

其二衰弱 總身ノ衰弱アリ局處ノ衰弱アリ而
亦本患ト繼患トアリ既往ノ刺衝過度ニ繼或ハ
亦其衰弱感動過敏ヲ合併セルアリ

治法 治法モ亦通メ二則ニ歸ス一ハ遠因ヲ蹤跡
メ之ヲ除クナリ唯是ノミニメ全功ヲ収ムル

アリ血液ノ鬱積ヲ疎散シ總身ノ衰弱ヲ恢復シ
病毒刺衝ニ由レル者ハ其標本ヲ分テ之カ治法
ヲ處スル等是ナリ皮膚ノ運管ヲ復メ白帶下粘
液勞自ラ全治セル者少カラ
ス一ハ患部ノ病態ヲ察メ直ニ之ヲ攻ムルナリ
即局處衰弱感動過敏分泌失常組織變性等ヲ療
スルニアリ

此ニ屬スヘキノ諸患他ノ病門ニ論說セル者
リ白帶下粘液勞ノ如キ即是ナリ各本條ニ就テ
之ヲ看ルヘシ

吐涎

「フテイアリス」ス「ス」ス「ス」ス
ペーキセルフルー「ス」ス「ス」ス

徵候 津唾ノ分泌排泄常度ヲ越テ過多ナルナリ

此病ハ大ニ健康ヲ傷リ久ク止サレハ生命ヲ害

ス是啻ニ榮養必窮ノ液ヲ費耗スルノミナラス

消食必需ノ原ヲ失亡スレハナリ故ニ其終リ漸

ク消削病虚ニ歸スルヲ常トス

原由 水銀ノ内服外用多キニ過キ或ハ久キニ失

セルヨリ来ルヲ多シトス其他失苟兒陪苦腹内

壅塞殊ニ肺ニ因シ或又妄ニ吐唾シ謾ニ喫煙ス

ルノ惡習ヨリ起レル者アリ

治法 水銀誤用ヨリ来ル者ハ屢下劑ヲ用テ硫黃

阿芙蓉微温浴等ノ永毒治法ヲ行ヒ甚シキ者ハ
伊阿胃謨附ヲ與ヘ失苟兒陪苦腹内壅塞等ニ起
レル者ハ各本病ノ治法ヲ施スヘシ

脱汗コピドロシス「オーフル」
マールチゲズ空一テニ蘭

徵候 發汗過多ニノ休サル者是ナリ此病通例他

病ノ傍證ニノ單發スル一甚々罕ナリ乃諸消削

病ノ溶崩時期婦人月經初見ノ際婦人此時ニ脱汗スル者多シ

或ハ一二年ト失苟兒陪苦衰弱諸病粟疹熱初起

患ル者アリテ本徵トス等ニ併發スルヲ常トス一種脱汗

熱ト稱スル者アリ粟疹ヲ發セスメ脱汗スル熱

病ナリ甚希有ト雖凡一般ニ流行メ人々相傳染

スル一アリ一千六百年間ニ流行セシ「シドル」ア

ングリキス英吉利脱汗ノ義即是ナリ唯發汗過多ヲ本

證トメ一二日間ニ斃レシ者少カラサリシト云

是哥烏煙百私篤ト反對ノ病ナリ彼ハ脱液證ヲ内部ニ起シ此ハ之ヲ外表ニ致ス總テ脱

汗諸病ハ生カラ衰弱セシムル一非常ニメ虚脱

ヲ起ス一甚急速ナリトス

原由 皮膚ノ衰弱麻痺諸液ノ溶崩腐敗或ハ血液

ノ膚表ニ進行スル一過強ナル等之カ因トナル

治法 皮膚ヲ強壯ニシ血液ヲ收固スルニ在リ其
 兩功ヲ兼攝セル者ハ礦酸ト明礬トナリ就中蘇
 魯林水一日ニ半稀硫酸殊効アリ其次ハ撒爾非
 亞泡劑トシ或ハ酒浸トストボレ五スラリキス未詳一日ニ
五ハ至三十用フトラ此病ノ特效藥ナリトス宜ク肺勞失葯
 兒陪苦等ノ本病治法ト兼子行フヘシ外用ニハ
 醋ヲ冷水ニ和シ或ハ礦酸ヲ稀メテ洗滌シ或ハ
 冰片ヲ外貼スルヲ宜シトス
 足脚陰部手掌腋下等ニ發スル一部ノ脱汗アリ
 是分泌器局處ノ溶崩性變常ヲ兼ルヲ以テ惡臭

忍フ可ラサルナリ明礬獨宿多兒等ヲ以テ之
 ヲ洗ヘハ速ニ遏止スト雖厄盲聾喘息肺勞等及
 諸種ノ轉移病ヲ發スルノ恐レアリ宜ク加密列
 撒爾非亞ノ煎汁ヲ以テ之ヲ洗ヒ之ヲ浴シ以テ
 徐々ニ強固スヘシ無危ノ良法ナリ惡臭ヲ除ク
 ニハ蘇魯林水ヲ以テ洗フヲ佳トス
 遺溺ユミレシス羅牙シウレケ
 徵候 覺セス意セス其尿不斷失禁スル者アリ只
 意セスメ遺泄スル者アリ兩ナカラ尿意急迫ニ
痲性遺弱

ノ忍フヲ能ハス直ニ之ヲ泄ス者アリ瘧性遺溺唯睡
中ノ遺失スル者アリ夢

原由 瘧性遺溺ハ結石尿砂苛尿老人ノ尿ノ如キ者ノ刺衝
痔血月經ノ壅閉膀胱直腸攝護ノ硬腫潰瘍腸胃
汚物蛔虫蛭虫印華爾屈篤等ノ如キ膀胱及其近
傍ノ連縣刺衝ニ因スルアリ或ハ妊婦季月ノ子
宮内臟腫脹ノ如キ形器性壓迫ヨリ起ルアリ或
ハ小便頻數常習ト為テ膀胱狹窄セルヨリ來ル
アリ而瘧性遺溺ハ難産卒中腰髓打撲脊髓麻痺
年齡老高經久尿閉後結石截斷後及膀胱ノ衰弱

麻痺等ニ起因スルヲ常トス

治法 瘧性遺溺ハ宜ク其因ヲ探テ之ヲ除クヘシ
蛔虫及腸ノ印華爾屈篤ニ起レル者殊ニ多シ乃チ
解凝疎通ノ藥ヲ久ク連用メ意外ノ良驗ヲ得シ
コ少ナカラス尿砂ノ膀胱ニ鬱滯セル者ハ曹達沸
騰散第百七方奇功アリ之ニ菲阿斯ヲ加ヘ且鎮瘧
擦劑ヲ兼用スルヲ殊ニ宜シトス

瘧性遺溺ハ甚タ治シ難シ強壯藥衝動藥收瀉藥
ヲ内服外用シ冷滴浴ヲ行ヒ越列氣レキ的兒レヲ施シ
芫菁ヲ用フルニ宜シ麻痺病及瘧性尿閉ノ條ヲ參考スヘシ其全不

治ノ者ニ至テハ常ニ澆器ヲ携ヘ湯衣ヲ着ル
 外別ニ伎倆ナシトス
 小兒ノ夢洩ハ大抵惡習ニ坐セルナリ臨卧ニ飲
 液ヲ用ルコトヲ禁シテ横卧セシメ夜間一二回喚
 起メ溺セシメ或ハ朝ニ教戒メ嚴ニ之ヲ懲シ睡
 中モ猶忘レサル可ラシメテ其惡習ヲ撓ハムル
 ヲ宜シトス若然クメ功ナキ者ハ刺衝物虫病ヲ多トス
 ノ有無局處ノ衰弱ヲ查點メ之ヲ療スヘシ大人
 ノ夢洩ハ局處衰弱ニ因レル者多シ強壯法ヲ行
 フヘシ已ムコトヲ得サルニ至テハ撓屈自在ノ

子ヲ造テ夜間ニ佩ルヨリ他策ナシトス

尿崩 チアベテス羅ロビ
 スフルロド蘭

徵候 小便分泌過度ニ增多シテ病患ヲ全軀ニ現
 ハス者是ナリ尿質ハ變メ溶渙性ヲ帶ルト否サ
 ルトアリ而或ハ單其排泄ノミ增多メ其質水ノ
 如ク日ニ五十比乃至百比ヲ溺スル者アリ或ハ
 其質變メ乳ノ如ク酒ノ如ク且飲用セル物品ノ
 臭味ヲ現ハス者アリ其世間ニ最モ多クメ殊ニ
 注思スヘキ者ハ所謂蜜尿ナリ尿臭ナクメ味甘

甜尿質減少シテ糖質ヲ含ム一此ノ尿中一其全軀ノ病患ハ口燥テ咽渴シ皮膚乾涸メ腰脊掣痛シ胃中懊惱シ或ハ劇ク吞酸嘈雜シ漸ク遷延熱ヲ起シ羸瘦麻痺水腫等ノ諸證ヲ發シ而終ニ溶崩證若ハ卒中證ヲ以テ死亡ニ歸ス是故ニ凡胸患等ノ顯著ナル局處病ナクメ形體消削セル患者ニ遇ヘハ必尿質ノ檢査ヲ怠ル可ラス是鑿家喫緊ノ一則ナリ此種ノ尿崩ハ其分量著ク增多セサル一聞之アルヲ以テ鑿亦此ニ注意セス之カ為ニ斃ル者常ニ少カラストス

原由 近因ハ小便分泌病機變常ヲ致セル者ニメ或ハ其質ヲ變シ或ハ其量ヲ變シ或ハ量質共ニ常態ヲ變セルナリ而遠因ハ就中皮膚ノ分泌抑遏シテ其機腎臟ニ轉セルヲ多シトス一婦人勞動後發汗淋漓セル體ヲ以テ急ニ冷室ニ入り良久ク此ニ止テ感冒セルヨリ頑固ノ尿崩證ニ罹リ年餘ヲ經テ辛シテ治セシ者アリ其他腎臟脊髓ノ衰弱過房過酒ヨリ起ル者多シ或ハ其部ノ血液鬱積痔血月經ノ抑遏腸胃汚物蛔虫刺衝病毒轉徙腎臟局處刺衝腎石ノ類及歇以私的里依ト昆垓兒等之カ

遠因トナル蜜尿證ニ於テハ腎中ノ生機舍密力
 變常メ茲ニ送輸セル血液ヨリ尿ヲ製セスメ糖
 ヲ造釀シ出タスナリ其作用ハ血中ニ混合メ未化
 熟セサル所ノ乳糜ヲ分解シ取ル者ニ似タリ此
 病ノ羸瘦虚脱ヲ起ス一太甚キ所以ン蓋シ之ニ
 アリトス

治法 其治甚タ難シ各遠因ヲ蹤跡メ其法ヲ處セ
 ズンバアラス故ニ證ニ隨テ治法全ク相及スル
 一アリ慢性蒸氣抑遏ニ因セル者ハ發汗藥ヲ用
 フヘシ殊ニ羯布羅。硫。碲。水。素。附ス。ヒリ。去。ス。ヒ。ニ。ス。ニ。瓜。宛。日。ニ。ニ。

三次ヲ佳トス就中蜜尿證ニ奇驗多シ兼テ熱浴。魯西亞浴。摩
 擦法ヲ行ハン一ヲ要ス諸證ニ通メ誘道ノ偉功アリ而衰弱
 ニ起因セル者ハ強壯藥ヲ與ヘ出血抑遏及嫩衝
 ヨリ來レル者ハ瀉血ヲ行ヒ蜜尿證。經閉。ヨリ起
 シ一アリ見腸胃汚物。蛔虫ニハ吐下藥。驅虫藥。内臟
 壅塞ニハ解凝劑。此病肝臟壅塞ヨリ起ル者カ
斯ヲ伍シ用テ全神經衰弱。感動過敏。歇以私的里
 依ト昆垓兒等ニハ神經藥。鎮痙藥。阿魏。莨菪。阿美
 腎石ニハ石灰水。麻屈涅。失亞亞兒加利劑ヲ處ス
 ル等各其因ニ準テ之カ治法ヲ立ツヘシ右ノ諸

法皆驗ナキ者ハ有カノ神經藥麻醉藥或ハ強壯
 藥錢那ヲ用ヒ打膿法等ノ誘導法ヲ施シテ之ヲ
 試ムヘシ阿芙蓉ヲ石灰水ニ和メ漸ク增量シ用
 ヒ温浴ヲ兼子行ヒ或ハ結麗阿曾多附十滴至二
 十滴ヲ毎日服用セシメテ奇功ヲ得或ハ亦新鮮
 牛胆ヲ用ヒテ全功ヲ收メシトアリ凡此種ノ病
 ニ於テハ舍密作用ニ注目メ從事セシトヲ要ス
 患者植物品ヲ食セスメ唯卵及肉ノミヲ喫スレ
 ハ尿中糖質ヲ生セサルト較著ナリ故ニ動物品
 ヲ食用トスルハ假令ヒ根治ヲ得スモ治癒ヲ進

ムルト顯然ナリト知ルヘシ

膀胱粘液漏泄

「セイストルル」
「イムフル」
「ドオイト」
「デ」
「ブ」

ラ
ハ
蘭

徴候 尿ト混ノ粘液ヲ漏泄ス之ヲ泄スニ當テ劇
 痛ヲ兼ル者アリ否サル者アリ此病尋常危篤ナ
 ラスト雖モ其粘液ノ漏泄過度ナルカ將傑列乙
 質ノ養液ヲ漏泄スル者ハ大ニ健康ヲ害シ終ニ
 性命ヲ賤フニ至ル此病宜ク膿ト粘液トヲ鑒別
 スヘシ且粘液漏泄モ久キヲ經テ敗壞スレバ遂

膿ニ變ノ膀胱勞ニ轉スルノ猶粘液勞ノ膿勞
ニ移ルカ如シ

原由 大抵膀胱局處ノ刺衝或ハ其衰弱之カ因ト
ナシ其刺衝ハ即尿石尿砂慢性焮衝及硬結腫或
ハ利尿藥ノ過用測胞子及紙捻子ノ久施或ハ伊
屈篤樓麻質疥癬微毒痔疾^{之ニ因スル者殊ニ多シ}等ノ病毒
轉徙等ナリ其衰弱ハ既往ノ焮衝及刺衝過度或
ハ久ク尿閉ノ已甚ニ膀胱ヲ緊脹セルノ餘害或
ハ房勞過度等ニ原ツケルナリ而蛔虫印華爾屈
篤等ノ腸胃交感モ亦之カ因ト為ルノアリ

治法 先尿石尿砂ノ有無ヲ檢メ之ニ因セル者ハ

其治法ヲ處スヘシ後ニ本條アリ其他痔血閉止ヨリ來

レル者ハ硫黃蒲公英越幾斯孕鹼酒石ヲ與ヘ琪

鍼ヲ肛ニ貼シ痔疾條ヲ參考セヨ伊屈篤樓麻質疥癬等ノ

轉徙ニ原ケル者ハ各毒相當ノ治ヲ施シ殊ニ

ラ子ルノ衣ヲ着シ温浴打膿法ヲ行ヒ衰弱ニ起

レル者ハ幾那鏤等ノ強壯藥ヲ用フル等各其因

ニ準テ從事センコトヲ要スウヰルゼンゲル水鑛ハ泉

諸證ニ通メ偉功アリ其他烏白烏爾識石灰水燐

酸等凡テ白帶下ヲ治スルノ諸藥皆此ニ効アリ

ト知ルヘシ又其漏泄膿ヲ混スルカ將其粘液變
メ膿ニ移レルカ之ヲ檢セントヲ要ス若シ膿ヲ
泄ス者ハ膀胱勞ノ治法ヲ行フヘシ膿勞條ヲ參
考スヘシ

淋疾 ゴノルルア 羅

徵候 尿道ノ粘液漏泄ナリ稽留スルアリ發歇ス
ルアリ痛ヲ兼ルアリ否ラサルアリ

原由 黴毒白帶下等ヲ患ヒ或ハ子宮腔等ノ局處
病ヲ病メル不潔ノ婦人ト交媾メ發スル最モ
多シトス然レモ亦此因ニ由ラスモ儂麻質伊偃

篤疥癬等ノ病毒尿道ノ粘液膜ニ轉徙セルヨリ
發シ或ハ痔血ノ鬱閉等ヨリ來レル者モ亦少ナ
カラス

此病交媾后ニ發セル者ハ皆之ヲ黴淋トスルヲ
宜シトス而其黴淋ニ非ルハ唯交媾ヨリ來ラ
スメ前驅セル儂麻質伊偃篤痔疾等ノ他患アリ
シカ若クハ此諸患ト交代シ發セルヲ以テ徵ス
ルノ外他ノ鑿法ナシ然レモ原黴淋タリシ者他
因ノ為ニ久ク淹滯シ終ニ變メ他性ノ淋ト為レ
ル者モ亦間之アルナリ

治法 徵淋治法ハ徵毒編ニ詳説ス就テ見ルヘシ
 伊屈篤儂麻質痔疾等ヨリ来レル者モ各其因ニ
 準テ本病ノ治法ヲ處シ兼テ尿道ノ粘液膜ニ特
 効ヲ致スノ諸藥ヲ撰用スヘシ本藥功ナキ者ニ於テハ殊ニ然リ
 就中拔爾撒謨骨泮波二十滴至三十滴沙糖ニ和
 メ日ニ二三次與フルヲ佳トス尿道注射法ハ危
 險ノ病毒轉徙ヲ起スノ恐レアリ謾ニ施用スル
 一勿レ

遺精ホルリチオ羅ヤ
ドフルーロ
ド蘭

徵候 識ラスノ夥シク精液ヲ漏泄スルナリ夜間
 好夢中ニノミ遺失スル者ヲ夢精ト謂ヒ晝間モ
 騎馬上圍大便窘迫スル時殊ニ然リ情欲發動美ヲ見美ニ觸
 ル、等僅微ノ刺衝ニ値フテ乍チ漏泄スル者ヲ
 漏精ホルリチオ
チウルナト謂フ
 夢精ハ少年多血ノ徒ノ房事ヲ慎ム者ニ於テ偶
 發スルハ恐レナシトス然レ氏累ニ發メ二三日毎
 ニ来ル者ハ手淫是多ハ其因トナルト其害ヲ等フス即依
 ト昆煙兒歌以私的里瘧癩健忘視力之弱神識疲
 憊等神經衰弱ノ諸證ヲ起シ殊ニ卓然又ハ男子

ノ本然性ヲ失セシム抑精液ハ生氣ヲ賦與セル
ノ要液ナリ故ニ缺耗スレハ自ラ生ラ欲シ生ラ
樂ムノ心退テ却テ生ラ憎ムノ念ヲ起シ終ニ自
減セント欲スルノ慮ヲ生ス是此病固有ノ一證
ナリ漏精ハ脫液諸病中殘掠最モ甚ク衰弱ヲ起
ス極テ多ク右ニ舉ル諸證ノ外毛髮脫落局處
麻痺言語蹇澁等神經勞脊髓勞ノ諸證ヲ發メ終
ニ斃ルヲ常トス
手淫ハ素病ニ非スト雖氏常習トナレハ其終遂
ニ欲火撲滅スヘカラス精液排擯セサル可ラサ



ルノ一病ト為ルカ故ニ亦此病類ニ属ス
原由 近因ハ陰器畢丸精囊射精管等ノ衰弱ニメ其覺動而
機亢盛セルナリ感動過甚衰弱甚者ハ精囊射精管大
ニ虚衰メ僅微ノ壓迫モ輒其精ヲ泄ラスニ至ル
而誘因ハ蛔虫汚物便秘等ノ腸胃刺衝腹内多血
久坐久キニ堪ル等ニ在リト雖氏其最モ多キハ
手淫ナリ手淫ハ小童青年ノ徒ニ於テ右ノ諸因
ヨリシ或ハ美ヲ見美ヲ想テ淫事ノ妄念煽動ス
ルヨリ出ル所ニメ輟サレハ其害弊窮竟漏精證
ニ陷ルヲ免レニ

夫大遺精 卷之十一 十四 遺精

治法 遺精ノ治法ニ即チ手淫ノ治法ナリ手淫輟サ
レハ遺精亦輟ム一能ハス其法先遠因ヲ除クニ
在リ即チ蛔虫汚物便秘等ノ腸胃刺衝ヲ芟リ腹内
ノ多血ヲ疎散シ淫情ヲ起スヘキノ諸件ヲ避ケ
神思ヲ方正ノ事ニ注カシメ強ク運轉動作メ大
ニ體カラ費耗シ日暮レ疲勞ヲ極メテ蓐ニ就カ
シメ肉卵酒類芳香ノ品等總テ刺衝ニ過ルノ食
料ヲ禁シ植物ヲ以テ榮養シ菓實類ヲ喫セシメ
晚餐ヲ減シ或ハ之ヲ用ヒシメス羽毛ノ裊褻ヲ
遠ケ仰臥セシメス勉テ早起セシメ手淫ノ常習

アル者ハ嚴ニ之ヲ禁止スル等ナリ而兼ルニ近
因ノ治法ヲ以テスヘシ其法陰具ヲ強壯シメ其
覺動ノ病機過盛ヲ退却スルニアリ然レ之ヲ行
フニハ頗ル謹慎ヲ加ヘン一ヲ要ス若シ之ヲ行
フ甚クメ過急ナルカ或ハ起熱ノ品ヲ以テスル
片ハ局處ノ刺衝ヲ起シテ却テ遺精ヲ増シ衰弱
ヲ加ヘテ所望ノ反對ヲ作ス一有レハナリ故ニ
初メハ鑛酸殊ニ稀如キ清涼ニ降鎮ノ功アル
強壯藥ヲ用ルヲ佳トス余カ實驗ニ據レハ叔欽
亞的兒十滴至二十滴日ニ三次依蘭苔傑列乙或

ハ其煎汁ニ和シ與ヘ其感動漸ク鎮靜スルニ隨
テ湯乙查幾那丁幾附ニ配用シ第百七十三方テ漸ク
格綸僕ニ轉シテ第百七十四方甚ク効アリ格綸僕ハ保
固強壯藥中此病ニ最モ適當ノ品ニメ屢全功ヲ
收メタリ第百七十五方ノ丸藥モ亦奇驗アリト
云而又之ニ兼ルニ同種降鎮ノ外用法ヲ行フ
極テ緊要ナリ即冷水ヲ以テ屢陰部會陰腰部ヲ
洗滌シ次ニ第百七十六方ノ洗劑ニ羯布羅精名
六分一ヲ加ヘテ之ヲ行ヒ毎日二三次冷水用水
海ヲ盤ニ盛リ其内ニ坐メ陰部會陰薦骨ヲ浴ス

ル等ヲ佳トス羯布羅ハ情欲ヲ制頓シ遺精ヲ退
却スルノ偉効アリ内服ニハ一二分宛菲阿斯消
石ニ伍メ朝夕之ヲ與ヘ外用ニハ第百七十六方
ニ和シ或ハ囊ニ盛テ陰囊ニ布貼スヘシ第百七十七方
右ノ諸法功ナク或ハ病極メテ重キ者ハ幾那括
失亞百藥煎ト答尼亞吉納護護鏡劑就中撒爾末
六方ノ等ノ強壯收瀦藥ヲ用フヘシビロモンテ
剛鏡酒ハ内服シ及浴法ニ行フテ偉効アルヲ
ル水泉ハ内服シ及浴法ニ行フテ偉効アルヲ
實驗セリ若缺ルニ遇ハ、人工品一浴ニ撒爾末
加ヲ製メ浴セシムヘシ兒扶斯半

夫元書
卷之十六
十六
通

耳濕 オトルルイア羅フルイイ
レグオイト、デオールンラン

徵候 兩耳或ハ偏耳ヨリ沕乙狀粘液狀或ハ膿狀

ノ液ヲ漏泄ス其液臭氣ナキ者アリ惡臭アル者

アリ腐臭ヲ帶ル者アリ

此病ハ小兒ニ多クメ殆ト皆癩癰性ナリ即此毒

ノ聽道粘液膜ニ著ケル者ニメ癩癰性ノ眼濕

ルブレノト全ク其致ヲ一ニシ亦能ク之ヲ交代

シ發ス此病或ハ癩麻質聖京屈ノ侵襲ヨリ來テ

所謂耳感冒ナル者アリ或ハ徵毒疥癬等ノ轉徙

ヨリ來ル者アリ或ハ耳焮衝ノ傍證若クハ繼證

ナル者アリ疼痛ヲ夾ムヲ以テ之ヲ徵ス或ハ亦

耳底ノ膿腫腐骨ニ因セル者アリ其液ハ膿質

メ腐臭アルヲ以テ之ヲ徵ス然レ腐臭必皆膿腫

腐骨ノ徵ナリト謂フ^{オモ}勿レ單聖京屈性ノ者

於テモ是臭アル^一有ハナリ

此病他患ヲ夾マサル者及小兒ニ於ケル者ハ恐

ル、ニ足ラス唯久ク淹滯スレハ聽識乏弱シ或

ハ器質ノ變ヲ將來ス

治法 原因ノ差異ニ準テ各自相當ノ諸藥ヲ用ヒ

兼テ誘導ノ諸法ヲ處スヘシ即癩麻質癩癰ニ因
セル者ノ如キハ排毒散 コラシヒス。アンチデイス
ナシラ内服セシメテ時々下劑ヲ兼用シ耳後ニ
先菁硬膏ヲ貼スルニ宜シ外用ニハ唯微温湯若
ハ緩弱ノ石鹼水ヲ以テ之ヲ洗フノミ決メ亞鉛
石膽水銀鉛等ノ製劑ヲ用フルコト勿レ能ク其漏
泄ヲ遏止スレ_レ之カ為ニ耳聾ヲ起シ病毒轉徙
ヲ腦ニ致セシ例少ナラス唯其漏泄頑固ニメ内
服ノ諸藥ヲ連用スレ_レ止マヌ或ハ其液惡性ニ
メ膿様ナル者ニノミ謹慎ヲ加テ之ヲ用フヘシ

完穀利 リオンテリア ペイスロロ ブ蘭

徵候 飲食セル物消化セスメ下泄スルナリ或ハ
嘔吐ヲ兼ルアリ或ハ善饑ヲ兼ルアリ皮膚滲澹
灰白ニメ衰弱羸瘦漸ク加リ終ニ勞熱ヲ夾ム
常トス健良ノ胃ト雖_レ消化スルコト能ハサル者
アリ豌豆類ノ莢膜蔬菜ノ筋理 波菘菜ノ綠色ノ
如シ是等ヲ見テ此病ト混同スルコト勿レ
原由 近因ハ飲食セル所ノ物其消化ヲ俟タヌメ
過急ニ胃中ヲ通下スルナリ遠因ハ消食力ノ缺

及ヒ胃液ノ變性ニ在ルアリ胃ノ感動過敏ニ
在ルアリ汚物。蛔虫。病毒轉徙等ノ胃中刺衝ニ在
ルアリ胃ノ器質變常ニ在ルアリ而飲食ノ過殮
殊ニ泡釀シ易キ未熟ノ植物或ハ酸敗セル葡萄
酒ヲ貪リ食物ヲ過急ニ嚥下シ下劑ヲ過用スル
等之カ誘因トナル

治法 腸胃汚物ノ徵アラハ吐下藥ヲ用ヒ先之ヲ
清刷シテ之ヲ强健ニシ兼テ其動機亢盛ヲ降鎮
セントヲ要ス乃苦味強壯藥ニ芳香藥ト少量ノ
阿芙蓉ヲ伍シ與ルニ宜シ其藥ハ格綸僕括失亞

沒藥。盧會。忽弗。滿。拔爾。撒謨。九。乙。查。幾。那。丁。幾。格。
皮。越。幾。斯。忽。弗。越。幾。斯。葛。蒲。根。薑。ラ。ク。カ。レ。イ。ベ。ア
ト鍊ヲ溶和等ナリ其他雞子黃。沙列布。肉羹汁。米
粥。強烈甘味。葡萄酒。收斂無酸ノ葡萄酒肉豆蔻。苦
麥酒。榎。楂。樸。榭。實。骨。喜。等ヲ與ヘ石灰水。鐵氣ヲ孕
メル。鑛泉乳汁等ヲ用ヒ胃部ニ拔爾撒謨性酒
精藥及香竈藥。枕子銳烈燒酒ヲ外貼シ重證ハ艾
灸法ヲ心下ニ行フ等撰用スヘシ尚且之ニ兼テ
蛔虫ヲ驅リ。樓。麻。質。伊。屈。篤。徽。毒。ヲ。攻。ル。等。病。因。ヲ
除クノ治法ヲ處スヘシ

乳糜利フロリス、クシス、クローリア、キ
ム、ロ、キ、ロ、プ、蘭

徵候 白色ニメ乳汁ノ如ク或ハ乳糜ニ類セル者
ヲ下泄ス或ハ糞穢ヲ混スルアリ或ハ血ヲ交ル
アリ共ニ窘迫ヲ兼テ急卒ニ起ル者多シ消食不
良ニメ皮膚滲澹灰白羸瘦漸ク加リ勞熱徐ク發
シテ乃斃ル

原由 近因ハ腸ノ粘液漏泄ナリ白帶下ト其致ヲ
一ニス其惡液病ヲ起シ羸瘦ヲ来ス等ノ害弊モ
亦猶白帶下ノ如シ故ニ此病ハ一ニ之ヲ直腸白

帶下ト名ク遠因ハ白帶下ニ異ナラス就中痔血
鬱閉、病毒轉徙及腸ノ衰弱ヨリ来ルヲ多シトス
治法 痔疾及ヒ病毒轉徙ニ因セル者ハ各其治法
ヲ行ヒ肝臟及其他内臟ノ壅塞ヨリ来レル者ハ
之ヲ開達シ殊ニ有力ノ苦味強壯藥ヲ用フヘシ
即格綸僕、括失亞坎百設、著草、鐵劑等ヲ與ヘピロ
モンテル水鑛ヲ服セシメ解凝強壯ノ灌腸法ヲ
行フ等ナリ

肝崩フロリス、キ、ス、ヘ、パ、チ、キ、ス、
ロ、フ、ル、フ、ル、ト、ド、蘭

通通

徵候 下利スル所ノ者水ノ如ク粘液ノ如クニ
其色血中ノ汚乙ニ類似シ糞穢ヲ混スルアリ否
サルアリ而絞痛ヲ兼ルナシ其下利時ニ隨テ
差異アリト雖氏大抵一日ニ十行十二行ニ至ル
此病或ハ發歇スル者アリ然ラサル者モ總テ緩
慢ニメ數年持久ス而メ其終リ衰弱羸瘦シ勞熱
ヲ發スルヲ常トス抑希有ノ病ナリ

原由 近因ハ血中ノ汚乙小腸ニ滲漏スルナリ痔
疾及内臟壅塞殊ニ肝臟ヨリ来ルヲ多シトス或ハ腸
ノ虚脱血液溶渙ヨリ起ル者モ亦之レアリ或ハ

實ニ肝臟器質ノ脱弛溶解若ハ膿潰ヨリ来ル者
モ亦之レナシトス可カラス然ル者ハ即肝病ニ
メ必死ニ属スルナリ

治法 病因ニ準テ其治ヲ處スヘシ始先著草珊篤
里等ノ緩性苦味解凝藥ニ酒石葉ヲ伍シ與ヘ次
テ幾那坎百設木硫酸等ノ強壯藥ヲ用ヒ是類ノ
灌腸法ヲ行ヒアゲル水「スパ」水「ヒロモン」テ
水皆鑛泉等ヲ少量ニ服セシムルハ通メ偉効アリ
トス

下利ヲアルルルロロロロアア羅羅

徵候 大便過多ニメ稀薄ナル者はナリ疼痛ヲ兼ルアリ否ラサルアリ速ニ止ムアリ一二日稽滯スルアリ或ハ甚タ緩慢ニメ數月數年ニ及フアリ其排泄物モ亦種々一樣ナラス糞穢ヲ下スアリ水液ヲ下スアリ粘液ヲ下スアリ胆汁ヲ下スアリ血ヲ下スアリ膿ヲ下スアリ其輕重安危亦種々ナリ極テ輕易ナル者アリ甚シケレレ氏恐ル、ニ足ラサル者アリ却テ治病的ノ吉利濟ナル者アリ或ハ險重恐ルヘキ者アリ

或ハ危篤既ニ迫レルノ徵ナル者アリ然レレ凡下利ハ皆患者ニ益アルノ佳事ナリト看做シ著キ惡候ノ有ルニ非レハ決メ遮キルル勿ラントラ要ス但純然ノ水液ヲ下シ是亦必シモ惡徵ナラス却テ吉利濟ナル者アリ更衣スル毎ニ虚脱ヲ加ヘ時ニ昏冒ヲ兼ル者ハ凶兆ナリトス又此病久ク稽留スルハ非常ニ衰弱ヲ作シ終ニ神經病惡液病完穀利虚勞水腫等ヲ發ス

原由 近因ハ腸ノ蠕動機ト分泌機ト兩ツナカラ尤進セルナリ其遠因多端ナレレ氏畢竟唯感動過敏

ト異常刺衝ノ二者ニ過キス而其感動過敏亦
二般アリ生力旺盛ニ因ル者多血性ト衰弱ニ因
ル者虚性神經性歇以私トナリ但感動遲鈍ノ衰
弱ハ下利ヲ起サスノ却テ便秘ヲ致ス者トス其
刺衝モ亦本部刺衝ト交感刺衝或ハ對稱刺衝トアリ停
食汚物蛔虫病毒轉徙器質變常等ニ因セルカ如
キハ本部刺衝ナリ齒牙新生情意感激煩悶疼痛
等ニ起レルカ如キハ交感刺衝ナリ皮膚抑遏ヨ
リ来レル痺麻質下利ノ如キハ對稱刺衝ナリ若
夫腸ノ感動過敏ト為ル者ニ汚物鬱滯ヲ兼ルカ

如ク兩因合併セル者ハ其下利甚タ猛惡ナリト
ス或ハ亦劇證痢疾ノ後腸ノ衰弱ノ為ニ甚タ頑
滯シ毎日數回泄瀉ノ生涯連綿スルヲアリ余曾
テ八十歳許ノ一老夫壯年ヨリ之ヲ患テ毫モ其
健康ニ妨ケ有ラザリシ者ヲ目撃セリ
其素因亦二般アリ一ハ各人ノ性ニ在リ人或ハ
微聊ノ誘因ニ遇フモ必泄瀉シ其自然良能モ亦
病ノ異同ヲ問ハス必分利ヲ此路ニ取ル者アリ
一ハ大氣ノ性ニ在テ普ク諸人ヲ此病ニ傾カシ
ムルナリ即歲々夏時一般ニ流行スルカ如キ是

ナリ是炎暑ノ為メニ膽液分泌增多シテ且ツ酷
厲ト為ルニ由ル熱帶諸地ニ於ケル流行下利モ
亦同一ノ因ニ出ルナリ

治法 或ハ其刺衝物ヲ驅除シ或ハ其感動過敏ヲ
降鎮シ或ハ兩ナカラ兼攝メ之ヲ行フニ在リ然
レ其刺衝物ノ異同ト感動過敏ノ原ク所盛或ハ
衰トニ準テ其法各差ハサルヲ得ス

夏時流行下利

七八月ノ間

我六七月

炎暑際ナキ時

ニ發メ多少腹痛ヲ兼ル膽液性ノ下利是ナリ
炎熱
為ニ膽液分泌增多
ノ酷烈トナルニ由ル
大黃ヲ特效藥トス二三日

間攝養ヲ嚴ニメ果實蔬菜麥酒酸味ノ品ヲ禁シ
唯燕麥水大麥水米煮汁雞肉若クハ犢牛肉ノミ
ヲ食トシ大黃水製丁幾日ニ半弓或ハ第百七十
八方ヲ服用スレハ尋常足リトス大黃末三四匁
宛每一時半或ハ每二時單服スレハ殊ニ効多シ服シ
易カラシカ為ニハ甘草膏ヲ加ヘ丸トスルモ可
ナリ然レ大便水ノ如クニメ汚物上湧ノ徵アル
者ハ先礪砂ヲ粘味ノ煎汁ニ和シ與ヘ水瀉ヲ治スルノ妙
功ア而後吐根ヲ以テ吐セシメ吐根モ亦水瀉ノ次
テ大黃ヲ服セシムヘシ證ニ隨テ吐劑ハ數回用

ヒサル可カクサルコアリ或ハ泄瀉水ノ如クニ
メ劇キ腹痛ヲ兼ル者アリ油質ノ品ニ礪砂ヲ加
ヘ緩和藥ヲ伍シ與ヘ第百七十九方兼テ是類ノ擦劑。琶
布。灌腸ヲ行フヘシ即効アル良法ナリトス
停食下利 治法前證ニ同シ證ニ隨テ吐劑吐根ヲ
與フヘシ其他ハ大黃ヲ用ルニ宜シ
諸種ノ下利大抵右件ノ治法ヲ以テ足レリトス
ト雖氏或ハ之ニ由テ下利止マス依然トメ水瀉
シ汚物鬱滯ノ兆ナクメ患者疲憊スル者アリ然
ル氏ハ之ヲ遏止セサル可ラス然レ氏之ヲ行フ

ニハ頗ル謹慎ヲ加ヘンコトヲ要ス決メ早キニ過
ク可ラス腸胃ノ清刷十分ナラスメ之ヲ遏止ス
レハ必大害危険ヲ惹クノ恐レアリ又其序ヲ紊
ル可ラス必緩法ヨリ始メテ強法ニ移ルヘシ其
法先ツ皮膚ノ對稱機ヲ以テ始トスヘシ夫皮膚
ノ抑遏能ク下利ヲ起スカ如ク其開達亦能ク下
利ヲ遏ムル者ナリ即「布子ル」名ヲ複ニメ腰腹
ヲ纏被スルヲ佳トス唯是ノミニ足ルコトアリ
其次ハ大黃末ナリ一二氏ニ少量ノ吐根ヲ和ス
第百八十九方次ニ牡蠣。蜆。石。礬。土。赤石脂等土質藥ヲ

夫大遺服 卷之十六 廿五

試 第一百八 其他亞刺比亞 薩謨沙列布 米粥等

粘膠藥ヲ用ヒ或ハ漿粉ヲ以テ灌腸シ或ハ葛斯

加栗刺越幾斯第百八十二方下利ヲ過テ毫末ノ

者ナ及肉豆冠ヲ用ヒ最後ニ阿芙蓉ヲ與フヘシ

阿芙蓉ハ其功諸藥ニ超絶スト雖ヒ危害ヲ起シ

易シ必ス下藥ヲ配用スルヲ宜シトス第百八十三方

儂麻質性下利唯感冒ヨリ起ル者大抵唯「ラ子」布名ヲ

以テ腹部ヲ纏包シ蓐中ニ發汗シテ粘味ノ飲液

ヲ多服スレハ足レリトス若汚物ヲ兼併セル者

ハ前段ノ治法ヲ行フヘシ

常習下利慢性 二證アリ一ハ其下利常ニ持續

スルナリ一ハ否ラスメ僅微ノ誘因ニ遇フモ輒

下利ス可キ常習トナレルナリ共ニ急性下利ノ

繼病ナル者多シ治法ハ總テ感動過敏ヲ兼ル腸

ノ局處衰弱ヲ目的トセン「」ヲ要ス然レ亦病的

ノ刺衝有テ敏性衰弱ハ其餘患ナル者アリ然ル

キハ有力ノ強壯藥ヲ用ルレ更ニ功ナシ唯其刺

衝ヲ除クノミニメ全治ヲ遂クヘシ其刺衝ニ由

ラスメ單純ノ敏性衰弱ニ由ル者ハ苦味收瀉ノ

性有テ鎮痙麻醉ノ功ヲ兼ル強壯藥ヲ連用シ兼

テ反對刺衝法ヲ行ハシテ要ス乃格綸僕第百
四方散末ハ一カ坎百設第百八橙皮西瑪爾拔葛
宛日ニ四次用フ斯加栗刺ガリカリア未詳櫛實骨喜赤拂郎斯酒ホ
ンタグカホルス皆酒名橙皮銕劑ビロモンテル
ラ浸漬ス等ヲ撰用シアラ子ルヲ以テ纏被シ強壯藥ノ
 擦法ヲ腰腹ニ行ヒ冷滴法ヲ少腹ニ施ス等ナリ
 芳香枕子丁子胡椒益智桂薑ヲ燒酒ニ浸シテ朝夕胃
 部ニ外敷スルモ亦良功アリ凡此證感動過敏ノ
 大ナル間ハ右ノ強壯藥ニ阿芙蓉少許ヲ加ヘシ
 一ヲ要ス諸藥寸驗ナキ者府利丁幾ニ阿芙蓉ヲ

加用ヒテ第百八奇驗ヲ奏セシ一少カラス其他
十六方番木鱉第百八百藥煎第百八モ亦甚タ偉効アル
十七方一多シ虚衰大ナル者ハ冷食ヲ良トス余曾テ頑
 固ノ證ニ唯乳汁ト冷肉ト白蒸餅トヲ用フルノ
 他一切ノ藥食ヲ禁メ全功ヲ収メシ一アリ
 右ノ諸法功ナキ者ハ蛔虫轉移毒等ノ刺衝ノ所
 為ニ非ルヤ否ヤ之ヲ検査セシ一ヲ要ス轉徙毒
 ハ伊倭篤僕麻質癰毒癰毒殊ニ多シトス若然
 ル者ハ各毒相當ノ治法ヲ行ヒ痔疾ニ因セル者
 ハ硫黄ヲ用フヘシ第百八自餘患者ノ飲食衣服
十九方

所業等ニ注目セムハアラス薄衣濕地或ハ過酒等暗ニ之カ因ト為ルヲ屢アリ

溶崩下利 膿勞虛勞水腫歇屈扶加等ノ病末ニ

傍發セル者はナリ各本病ノ治法ヲ行ヒ兼テ前

ニ舉ル遏止藥ニ阿芙蓉ヲ伍シ又糊質灌腸藥ニ

阿芙蓉ヲ加ヘテ行フヲ佳トス

失苟兒陪苦ニ兼發セル腐敗性下利ハ礬乳清附

百藥煎或幾那ニ少量ノ阿芙蓉ヲ配用スヘシ

腸ノ結核ヨリ來リ瘰癧性小兒ニ多シ或ハ腸ノ形器病ニ

因セル下利ハ檨實骨喜葛斯加栗刺越幾斯傑列

乙劑滋養藥ヲ用ヒ麥芽浴ヲ行フヲ宜シトス是類ノ下利多歲替滯メ頑固ナリシ者ニ蛞蝓煮汁ヲ葛斯加栗刺ト配用メ非常ノ神驗ヲ得シト亦屢之アリ

膿液下利 是腸内ノ膿腫破潰ノ徵ナリ乳汁乳

清酪餘沙列布蛞蝓煮汁幾那沒藥板爾撒謨骨

霍乳汁ニ石灰水ヲ加ル者等ヲ與ヘ乳汁ニ沒藥

液沒藥丁幾カ未詳或ハ板爾撒謨骨没藥一二錢

舍電阿芙蓉液少許ヲ加ヘテ或ハ之ニ鉛醋灌腸

藥トシ日ニ二三回之ヲ行フニ宜シ

乳兒下利

後ノ小兒門ニ論説ス

痢疾「テイセルスロ」テリ「ア」羅「ロ」

徵候 重墜努責メ頻リニ上圍スレ「氏」真ノ大便ヲ
 利セス唯些少ノ粘液或ハ血ヲ下シ腹痛劇クメ
 發熱ス故ニ原來過泄病ニ屬セスメ閉塞病ニ算
 入スヘキナリ而其病性全ク下利ト相反ス即下
 利ハ腸内ノ汚物ヲ排泄スレ「氏」此病ハ之ヲ内ニ
 鬱滯セシム又下利ハ獨自ラ治スル「ア」レ「氏」此
 病ハ否ラス大便排泄スル「ア」ラ得テ始テ治ニ就

クナリ

其經過一樣ナラス前兆有テ来ルアリ否ラサル
 アリ短急ナルアリ緩慢ナルアリ或ハ遷延メ經
 久痢ニ移ルアリ其前兆ハ大抵下利或ハ腹痛ヲ
 以テス而其發病ノ初先膽液性ノ大便歇「メ」努責
 メ粘液些少ヲ下シ「之ヲ白」次テ刺衝加ハルニ隨
 テ之ニ血ヲ交フ「之ヲ赤」輕證ハ熱勢早ク退却ス
 レ「氏」重證ハ疼痛漸ク増シ熱勢漸ク進「ミ」上圍間
 断ナク「一晝夜百」下物ニ一種ノ惡臭ヲ放ツ而
 メ此病ノ増進スル所以ハ傍發ノ炊衝ニ由リ膽

夫之遺風 卷之七下 廿九 通前條

液性汚物ノ過多ニ由リ或ハ精力ノ衰弱ニ由ル
其死スル所以ハ焮衝ニ由リ壞疽ニ由リ生力虚
脱ニ由ルニ在リトス疼痛劇烈ナリシ者頰ニ歇
テ顔貌萎縮シ四肢厥冷シ脈細小ニメ結代シ大
便失禁メ極テ惡臭ヲ放ツ者ハ壞疽ニ陷ルノ兆
ナリ熱漸ク退却シ痛徐ク減少シ下物逐次ニ常
糞ト為ル者ハ快復ノ良候ナリ
凡劇證痢疾ノ後ハ經久下利神經熱麻痺病遷延
熱等ノ諸病ヲ貽スル多シ

原由 近因ハ大腸ノ抗抵過劇ニメ痙攣性ヲ帶ヒ

且其粘液酷厲ト為テ分泌増盛セルナリ然メ其
本性ハ焮衝ニ非ス唯其刺衝増加シテ乃チ焮衝
ニ移ル可キノ故ニ感冒ニ於ケル氣管刺衝ト
全ク其態ヲ一ニス乃チ大腸ノ感冒若ハ痙攣質ト
名ケテ可ナル者ナリ猶感冒ノ噴嚏欬嗽甚シケ
レハ粘液ニ血線ヲ交ヘ刺衝増加スレハ遂ニ焮
衝ニ轉スルカ如ク一般ナリトス
遠因ハ多端ナレト畢竟異常刺衝ト感動過敏ト
ニ外ナラス就中皮膚運營抑遏ノ對稱機ニ兼テ
テ膽液增多メ酷烈ト為ルヨリ起ル者最多シ故

ニ此病八九月或七月比晝間大ニ熱シ暑熱ハ胆液分泌ヲ
増シ且之ヲ酷黄昏夜間冷涼ナルノ候蒸氣ヲニ一抑過ス
般流行ス其病タル即レ儂麻質性膽液病ナリ而流
行痢疾ノ極度ニ至レル者殊ニ腐敗性ニ傾ケル
者ハ一種ノ傳染毒ヲ生ス但其毒腸内ニ生々唯
其排泄物ニノミ寄舍ス故ニ其排泄物ノ氣ニ觸
ル、ヲ恐ルヘシトス又其素因各地ノ英エ埜密病
ナル者アリ即汚地泥沼卑濕ノ地凡テ間歇熱流
行スル所ノ處ハ痢疾モ亦毎歲流行ス
其他此病ヲ傍發シ或ハ媒起スルノ因仍多シ即

蛔虫中毒等ノ如ク腸ニ局處ノ刺衝ヲ起ス者痔
疾、病毒轉徙等ノ如ク腸ニ感動過敏ヲ進ムル者
或ハ齒牙新生等ノ如ク腸ニ交感刺衝ヲ致ス者
ノ類是ナリ

治法 大腸ノ抗抵ヲ降鎮スルニ在リ故ニ其刺衝
物ヲ除キ感動過敏ヲ治メン_一ヲ要ス然レ其刺
衝物ノ異ナルト感動ノ状態相違フトニ準テ治
法少差ナキ_一能ハス而其最モ多キハ儂麻質兼
膽液性ノ痢疾ナリ秋時ニ行ハル者大抵皆是ナリ通例左ノ治
法ヲ行テ足_レリトス即先吐根ヲ吐劑トシ用ヒ

次テ滿那答末林度ニ少量ノ吐消ト吐酒石ヲ配
セル緩下劑ヲ與フヘシ若之ヲ服スル一晝夜
ニメ寛解セサル者ハ粘味乳劑ニ阿芙蓉ヲ加ヘ
與ヘ第百九尚且之ニ兼テ大麥水。燕麥水。亞刺比
亞漿殊ニ等ヲ多服セシメ布子ル以テ腰
腹ヲ纏被シ鎮痙軟膏ニ阿芙蓉ヲ和メ少腹ニ塗
布スルヲ佳トス此病ノ初起ニ於テ吐根ヲ吐劑
トシ用フルハ諸證ニ通メ必功アリ唯汚物上湧
ノ徵ナク且大便常糞ヲ下ス者ノミ此例ニ非ス
トス

右件ノ治法ヲ行テ功ナキ者數證アリ發熱増進
メ脈緊實トナリ或ハ少壯ニ腹痛峻劇ニメ一
處ニ定住シ全腹緊滿メ之ヲ按スレハ必疼ハ者
ハ焮衝ノ徵ナリ刺絡ヲ必要トシ輕キ者ハ蜚鍼
ヲ腹部ニ貼ス而メ油製乳劑ヲ用ヒ第四十脈力
頓挫スルヲ待テ乃之レニ阿芙蓉ヲ加ルヲ良ト
ス若其脈實ナラスメ舌上不潔等腸胃汚物殊ニ
性汚物ノ徵アル者ハ仍持久メ第一道ヲ清刷スヘ
シ但其大便常糞ヲ下タスマ否ヤヲ檢メ若已ニ常
糞ヲ下ス者ハ前ノ緩下藥ト粘味藥ヲ持續シ用

先心遺風 卷之十六 三

水ノ如キ大便ヲ瀉スルニ至ルヘク其未常糞
 ラ下サル者ハ更ニ吐劑ヲ投スヘシ大抵常糞ヲ
 下ス^タ一ヲ得ルナリ然仍寛解セサル片ハ大黃ヲ
 用^ヒ第^{百九}十^一方或ハ甘汞ニ阿芙蓉ヲ伍メ之ヲ與フ
 ヘシ若焮衝ノ候ナク亦汚物ノ徵ナクメ疼痛劇
 ク後重甚ク僅ニ稀汁粘液若クハ血ヲ下ス者ハ
 感冒ニ起レル所ニメ即單純ノ儂麻質劑ナリ宜
 ク阿芙蓉ヲ亞刺比亞護謨ニ配メ内服セシメ亦
 之ヲ灌腸藥トシ兼テ芫菁膏ヲ腹ニ貼シ微温浴
 ヲ行フヘシ若亦始ヨリ精^力非常ニ虚脱セル者

温浴 亦宜シトス 儂麻質劑ニ於テハ殊ニ然リ
 若夫荏苒タル經久痢ト為ル者ハ亞兒尼加ヌ主
 藥トス根末一^ノ宛一時或一時半毎ニ與フヘシ
 此證腸内裏面ノ粘液剝脫メ滑利ヲ失フヨリ起
 ル者アリ然ル片ハ沙列布漿ヲ專用スルニ宜シ
 唯之ノミニメ全功ヲ收ムル^一間多シ又其頑滯
 スル所以ニ衰弱ニ在ル者ト直腸ノ虚焮衝ニ在
 ル者トアリ其衰弱ノ為ニメ遷延熱ヲ兼ル者ハ
 格綸僕坎百設木西瑪爾拔功アリ其虚焮衝ニ由
 ル者ハ升汞十分瓜ヲ阿芙蓉亞刺比亞漿^{或ハ粘糊ニ}

夫遺尿 卷之七
 三
 遺尿 或ハ粘糊ニ

和ノ灌腸ヲ行フヲ佳トス

閉塞痢ハ葡萄酒燒酒多量ノ阿芙蓉等ヲ誤用メ
痢疾頓ニ閉塞シ以テ諸種ノ惡證ヲ起セル者是
ナリ急慢ニ證アリ急證ハ焮衝性或ハ痙攣性ニ
メ疼痛劇烈腹肚緊滿大便秘閉煩悶痙攣等ノ諸
患ヲ發ス宜ク速ニ油質藥滿那甘汞ヲ與ヘ琶布
ヲ貼シ緩和灌腸法ヲ行テ其排泄ヲ再起シ焮衝
性ノ者ハ蜚鍼ヲ施シ痙攣性ノ者ハ菲阿斯ヲ用
ヒ微温浴ヲ行フヘシ慢證ハ頑固ノ儂麻質麻痺
水腫等ヲ起スナリ解凝藥下藥ヲ用ヒ兼テ新發

ハ神經性及
虚性痢疾 初起ヨリ阿芙蓉粘味藥此證モ亦吐
下藥ヲ用フ

ヘキ者ハ之
ヲ用フヘシ 等ニ續草白芷亞兒尼加葡萄酒等

神經藥ヲ伍シ兼テ微温浴ヲ行フニ宜シ若其虚

脱極テ已甚シク其排泄物臭臭ヲ放ツ者ハ腐敗

ニ陥レルナリ亞兒尼加根末服ハ每一時一
湯ハ半ヲヨリハ

至ト葡萄酒ト殊効アリトス

右ノ諸法ヲ行ヘ凡病頑然トメ退カス或ハ稍減

退スレ凡荏苒トメ治セサル者ハ實驗ニ據ルニ

左ノ諸藥甚良効アリ即番木鱉末一日ニ
半ヲ 及其越

幾斯每服ニハ
至四ハ 硫黃華甘汞升汞是ナリ升汞ハ少

量ニ用フベシハ分ハ分ヲ氷四弓ニ溶和シ亞刺比
 亞護謨漿三弓阿芙蓉液十二滴ヲ加テ半時毎ニ
 一食匙ヲ内服シ或ハ升汞十六分ハヲ阿芙蓉及
 粘漿ニ和メ灌腸藥トス而仍功ナキ者ハ左法亦
 大ニ良驗アルヲ稱譽セリ赫篤綸安質沒扭名
 一錢ヲ極末トシ白蠟半錢ヲ和シ文火ニ上セ手
 ヲ過メス攪拌メ烱解セシメ能ク混和メ遂ニ紅
 褐色ノ乾末ト為ニ至リ半ハ至一ハヲ一服トシ
 沙糖ヲ和メ用フ證ニ隨テ連服セシムヘキ者ア
 リ或ハ白蠟ヲ雞子黃ニ和シタル者モ功アリ微

西國正書局藏

諸ノ治法ヲ施スニ宜シ
 差後ノ治法ハ通メ皆苦味強壯藥ヲ連服シテ
 子ル布名ヲ腹圍ニ纏絡シ嚴ニ食禁ヲ守ルニ在リ
 自餘傍發ノ慢性痢疾他病ニ傍發セル者ヲ云ハ各其因ニ準
 テ本病ノ治法ヲ處スヘシ蛔虫ニ因ル者ハ虫病
 条齒牙新生ニ因ル者
 ハ小兒門病毒轉移及腸ノ潰瘍等ニ
 困ル者ハ慢性下利条ヲ併考スヘシ但諸證ニ通
 メ皆感動過敏ヲ鎮靜シ病毒刺衝ヲ驅除スルヲ
 以テ主トセンヲ要ス諸經久ノ痢疾或ハ痔瘻
 ノ為ニ頑滯スルヲアリ意ヲ用ヒテ檢セスンハ
 アラス

夫貴川 卷之十六 三五 通商齋藏

凡痢疾ノ預防法ハ「アラキル」布ノ腹帶ニ優レル者アル「ナシ」亦熟菓ヲ嚙スル「ヲ」ヲ稱スル者アリ過食セサレハ害ナシトス

霍亂「コレラ」羅「アラ」

徵候 吐逆泄瀉持續ノ兼ルニ胃痛腹痛煩悶重墜努責ヲ以テス其劇キ者ハ吐瀉殆ド間断ナク其重キ者ハ精力速ニ虚脱ヲ極メテ脈細小診知シ難ク四肢厥冷メ昏冒搐搦痙攣等ヲ發スルナリ其「」スル所ノ者初頭ハ胃中ノ蓄物及「膽液」

性霍亂ノ病末ニ至ナレバ其次ハ水様ノ稀液ヲ吐瀉ス

排泄ノ終ニ排泄物盡テ唯乾嘔努責ヲ致ス

或ハ始ヨリ一物モ吐瀉スル「」無キ者アリ乾霍亂

或ハ唯風氣痞滯ニ由ルノミナル者アリ然ル者風氣

疝ノ一種ニ屬ス

其經過一様ナラス或ハ懊懐煩悶心下壓重食欲缺乏等ノ前兆アル者アリ或ハ前兆ナク卒然トメ發スル者アリ或ハ輕易ニメ恐ル「」ニ足ラサル者アリ飲食不化ノミニ由ル者ノ如キ是ナリ或ハ峻劇猛烈ニメ速ニ斃ル者アリ劇キ者ハ其死一晝夜ヲ俟タ

ス哥烏埜百私篤卷之二ノ如ク一般流行スル者
ニ於テ殊ニ然リトス凡此病留連スルコト久キモ
三日ヲ越エス其間死ヲ致サレハ病勢必退却ス
而、其死スル者ハ焮衝ニ由リ或ハ生力虚脱ニ由
ルナリ

原由 近因ハ胃腸ノ痙攣性抗抵ニメ通例肝臟モ
亦之ニ與ルナリ膽液性ノ者ニ於テハ膽液ニ此
非常ニ増盛スルヲ以テ之ノ微
シハ故ニ其近因焮衝ニ非レハ神經ノ抗抵過劇
ナレハ遂ニ焮衝ヲ挾ミ易シトス
誘因ハ腐蝕性毒藥不化ノ飲食膽石蛔虫齒牙新

生。痙攣感動等ナリ然レハ英埜密及越必埜密病
ニ由ルヲ殊ニ多シトス即汚地泥沼多キ地痢疾
行ト其地及晝間暑氣甚クメ夜間冷涼ナルノ候
ヲ同フス七八ニ流行スルヲ常トス英埜密霍亂ハ間真ノ
越必埜密性ヲ得テ傳染病ト為ルコトアリ哥烏埜
百私篤ノ如キ即是ナリ

治法 其治駿速ニメ即効ナクンハアラス病ノ時
期短急ニメ僅ニ一二日ヲ争ヘハナリ而其主ト
スル所ハ腸胃ノ痙攣性抗抵ヲ鎮靜スルニ在リ
但過急ニ其排泄吐瀉ヲ遏止セサランコトヲ要ス

夫大... 三十七

各大麦粘汁、燕麥粘汁、亞刺比亞漿、稀薄、雞雞羹
汁等ヲ多服シ、里歇利飲^{第一}及少量ノ菲阿斯或
ハ少量ノ吐根ヲ用ヒ、油質藥ノ灌腸ヲ施シ、鎮痙
軟膏及ヒ麻酔藥、布ヲ外敷シ、乾角ヲ胃部ニ附
貼シ、且、微温全身浴ヲ行フヘシ、大抵之ヲ以テ足
リトス然レ、茲ニ注目セサル可ラサル者ニ、證アリ
リ危險ノ焮衝ト危險ノ虚脱ト是ナリ、疼痛劇甚
ニメ、灼クカ如ク、患者少壯多血ナルカ、或ハ必、
焮衝性ナルハ、必、刺絡ヲ行フヘシ、若前件ノ諸
法ニ由テ諸證退却セズ、脈細小トナリ、四肢厥冷

シ、或ハ昏冒スル者ハ、虚脱ノ極ナリ、阿芙蓉ノ外
ニ、極フヘキ者ナシ、乃、令電阿芙蓉液ヲ取テ、每
四分時二三滴宛、粘味乳劑ニ點服セシメ、兼テ之
ヲ擦劑トシ、及ヒ灌腸藥トシ、用ルル佳トス、然レ、
之ニ由テ泄瀉少減スルニ至ルヘキノ、決メ閉
止スルニ至ル、勿レ卒ニ閉止スルハ、必、危險ノ
焮衝ヲ招クナリ、衰弱甚シキ者ハ、阿芙蓉ニ兼テ
醇烈ノ葡萄酒ヲ用ヒ、ン、^一ヲ要ス、就中經年ノマ
ラガ^{名酒}ヲ最良シトス
哥烏埵百^前ニ本條アリ、就テ見ルヘシ

并月... 卷之十六

扶氏 遺訓

Vertical columns of text on the right page, including a small vertical label '扶氏 遺訓' at the top left of the column.

Vertical text on the far right edge of the right page.

