









乃消散ス其剥落ノ模様全ク他ノ皮膚病ト異ナ  
リ故ニ亦鑒定ノ一徴ニ屬ス

經過三期

第一期<sup>之ヲ抽芽</sup>發熱三四日弛張稽留ス其熱感

胃熱ニ類似スレ<sup>レ</sup>乾欬頻數眼内赤色羞明ノ淚

ヲ出タシ噴嚏ノ鼻涕ヲ流カス等一種ノ固有證

有テ自ラ麻疹熱タル<sup>ト</sup>徴シ諸證日又一日熱

ト共ニ増進シ頭痛前額ニ甚シク劇<sup>ク</sup>キ者ハ謔

語シ小兒ハ痙攣ヲ發スル<sup>ト</sup>痘瘡ニ於ケルカ如

ク或ハ下利ヲ起ス<sup>ト</sup>アリ

第二期<sup>之ヲ開花</sup>第三四日ニ方<sup>テ</sup>初<sup>テ</sup>顔面手臂

ニ見點ス其狀細小ノ紅斑ニ<sup>シテ</sup>微隆起ス<sup>レ</sup>凡<sup>レ</sup>痘

ヲ為サス三四日間陸續<sup>ク</sup>新疹漸<sup>ク</sup>發見シ稠密

ナル者ハ顔面手臂著<sup>ク</sup>腫脹ス然<sup>レ</sup>凡<sup>レ</sup>其腫脹痘

瘡ノ如ク甚シカラス而<sup>シテ</sup>眼患ト欬嗽トハ此期

至テ愈増進ス是<sup>レ</sup>此疹ノ粘液膜ヲ刺衝スルニ

由ルナリ故ニ其刺衝甚キ者ハ喉頭焮衝及肺焮

衝ヲ起スニ至ル開花三日ニ<sup>シテ</sup>紅色乃退キ見點

ノ序ヲ逐テ其斑徐<sup>ク</sup>消散ス見點終<sup>レ</sup>ハ熱ハ則

退クヲ常トス<sup>レ</sup>凡<sup>レ</sup>或ハ仍稽滯スル<sup>ト</sup>アリ是合



併病ノ在ルニ由ルカ若クハ發疹稠密ニハ刺衝  
過甚ナルニ係ル

第三期<sup>之ヲ凋落</sup>紅色退散ノ其表被麥糠狀ノ小

屑ト為リ或ハ麥粉狀ノ細末ト為テ剥落スル

恰モ花ノ飛散スルカ如シ此期ハ第六七日ニ始

ルヲ常トスレト或ハ第九日十日ヨリ來テ而數

日留連ス但其輕證ノ者ハ表被ノ剥落甚夕微ニ

メ斯ク著シカラサルモ亦之アリ此期ニハ又發

汗利尿泄瀉等ノ分利ヲ致スヲアリ殊ニ泄瀉ハ

良好ノ分利ニメ諸證之カ為ニ悉ク消散スル者

ナリ或ハ亦此時ニ當テ熱更ニ劇發シ肺腦若ハ  
腹臟ノ焮衝等危險ノ諸患ヲ發スル一アリ

此病ハ差後ノ繼患ヲ生シ易ク就中欬嗽結核膿

勞等ノ肺病ヲ貽シ或ハ眼疾腺病神經病等ノ諸

患ヲ起ス一多シ而其經過ノ間ハ危險ヲ致ス一

痘瘡ノ如ク甚シカラスト雖氏内陷スルカ若ハ

肺焮衝及他ノ合併病アレハ死ニ陷ル者モ亦之

アリ唯恐ル可キハ其餘弊ノニ麻疹ニ斃ル者

三十分之二ハ此餘弊ニ在レハナリ其患本病全癒

ユルノ後ニ在ルヲ以テ其本原ノ此ニアリシ一

夫貴州



ヲ知ラサル者多シ而從來肺患アリシ者及肺勞  
 ノ素質ヲ抱ケル者ハ殊ニ危シトス  
 此病モ亦痘瘡ノ如ク單純良性ノ者アリ他病ヲ  
 夾雜メ惡性ナル者アリ即焮衝性合併ハ熱性劇  
 烈ニメ過急ニ見點シ且稠發シ或ハ為ニ支障セ  
 ラレテ宣發スルヲ得ス兼ルニ焮衝性ノ肺患  
 ヲ以テス神經性合併ハ見點十分ナラスメ同等  
 ニ出齊セス其色灰白ニメ動モスレハ内陷シ易  
 クメ而諸種ノ神經證ヲ兼發ス腐敗性合併ハ疹  
 間ニ血斑ヲ夾發シ出血下利等ノ溶崩證ヲ兼ス

總テ他病ヲ合併セル麻疹ハ見點ノ期ヲ過テ熱  
 仍淹滯シ更ニ又焮衝ヲ發シ病毒轉徙ヲ作シ或  
 ハ溶崩證ヲ生スルヲ常トス

原由 近因ハ痘瘡ニ於ケルカ如ク一種定類ノ傳  
 染毒ニ中レル者ニメ其病ノ全體即ハ是其毒ノ  
 為ニ發動セル生カ抗抵ナリ而其毒ノ原始亦痘  
 瘡ニ於ケルカ如ク大ヒニ舊シカラスメ紀元五  
 六百年ノ間ニ始マレリト云フ其感染モ亦痘瘡  
 ニ於ケルカ如ク大氣ノ傳送ニ憑ラス唯其體ニ  
 觸レ若ハ其側ニ陪スルニ由リ其人身ヲ犯ス



唯一次ナルモ彼カ如ク然ラサル者モ罕ク其之ヲ  
 犯スニハ必契合ノ感受性ヲ要スルモ彼カ如ク  
 其流行大氣ノ性ニ依テ助ケラレ或ハ支ヘラル  
 ルヲ有ルモ亦彼カ如キナリ或ハ一般ニ普ク流  
行シ或ハ然ルヲ能  
ハサル者即然而此毒ノ痘瘡及爾餘傳染毒ト異  
之カ為ナリナル所以ハ其性粘液膜就中肺ノト交和親密ニ  
 メ全ク感冒ニ等シキ證狀ヲ發スルト其カ痘瘡  
 ノ如ク強劇ナラスメ器質ヲ害スルト斯ク太甚  
 カラサルト其作用彼ニ比スレハ緩慢ニメ斯ク  
 急劇ナラサルトニアルナリ

治法 其毒ノ異性ヲ胸臆ニ認テ其熱性ニ眼目ヲ  
 注ク可キハ素ヨリ痘瘡ニ同シト雖モ其毒ノ性  
 タル適宜ノ温保ヲ要スルヲ聖京屈ノ如キカ故  
 ニ其治法ニ至テハ痘瘡ト全ク相反スル所アリ  
 即チ痘瘡ニ在テハ寒冷ヲ以テ降鎮制伏ノ神藥  
 トスレモ麻疹ニ於テハ分利ヲ妨ケ内陷ヲ起ス  
 ノ殄毒トスルナリ蓋麻疹治法ノ主トスル所ハ  
 其毒ノ皮表ニ發泄驅散スルヲ進メテ體裏ニ  
 陷入轉徙スルヲ防キ且之ヲメ慢病ニ移ラシ  
 メス繼病ヲ起サシメサラシムルヲ務ムルニ在リ



故ニ適宜ニ温保メ嚴ニ冒寒ヲ防カンテ要ス  
 然レ氏決メ熱蒸ス可ラス其之ヲ温保センニハ  
 褥中ニ静卧スルノ外他策ナキカ故ニ小兒ニ於テハ殊ニ  
 然就褥ヲ以テ此病ニ於ケル萬古不易ノ治則ト  
 セリ宜ク病初ヨリ十四日間冬時ニ之ヲ守ラシ  
 ムヘシ但シ卧褥ハ獸毛ヲ充ル者ヲ宜シトシ羽毛  
ヲ充ル者ヲ禁ス被褥ハ毛布ヲ以テ製スル者ヲ佳トシ  
 室内ハ列氏驗温管十五度ノ温ナランテ要ス  
 而冬日ハ尚六週モ外風ヲ避ケテ以テ病毒轉徙  
 ヲ預防セサル可ラス單純良性ノ麻疹ニ於テハ

唯石ノ如ク温保メ防焮ノ攝養ヲ守ラシメ多量  
 ノ飲液ヲ服セシメテ而病末ニ緩下藥ヲ用フレ  
 ハ全功ヲ収ルニ足レリトス  
 第一期單性麻疹ニ於テハ右普通治法ノ外唯清  
 涼發表藥第二百四十五乙方ヲ用フヘキノミ但眼焮衝ト  
 效嗽トハ此病ノ固有證ニメ除ク可ラスト雖此  
 患者ノ為ニ煩困ナルカ故ニ寛解セシメサルヘ  
 カラス即眼患ニハ光氣ヲ避ケテ微温乳汁蜀葵  
 煎汁楨楂粘漿等ヲ以テ之ヲ洗浴スヘク鉛類ノ収濡藥  
 カラス效嗽ニハ燕麥粘汁大麥粘汁緩和砥劑等

大文遺集 卷之十九 六 適宜保藏



ヲ與ハ劇キ者ハ第二百四十六方ノ如キ麻醉性  
ノ油質藥ヲ用ヒ兼テ發表藥ヲ服セシメ蒸氣ノ  
多少ヨ  
ク效嗽ヲ増減ス腸胃刺衝一部焮衝等ノ合併有テ之ヲ  
増劇セシムル者ハ吐下藥。蟻鉞等ヲ行ハン一ヲ  
要ス總テ此期ニ在テハ肺焮衝。腸胃病等合併シ  
或傍發メ本病ヲ害スル一多シト雖正猶能ク之  
ヲ除キ易シトス少壯多血ノ徒ハ刺絡ヲ行ヒ小  
兒ハ蟻針ヲ施ス等怠ル可ラサルノ要務ナリ  
第二期前段ノ治法ヲ連施メ嚴ニ冒寒ヲ避クヘ  
シ此時隱ニ肺焮衝ヲ釀ス一アリ不斷注視セシ

一ヲ要ス若然ル一ヲ省取セハ必ス刺絡セサル  
可ラス前期之ヲ怠レ  
者ハ殊ニ然リ此期ニ於テ最モ恐怖ス可  
キ者ハ内陷ナリ其因胃寒ニ在ルカ若ハ情意感  
動。攝養ノ不良ニ在リトス其内陷セル者ハ假令  
較著ノ患害ヲ見ス正必ス之ヲ蔑視スル一勿レ直  
ニ性命ヲ害スル一無シト雖正之カ為ニ分利支  
障セラレテ極惡ノ病毒轉徙ヲ致シ危險ノ繼病  
ヲ起ス等其後患甚タ恐ル可ケレハナリ治法皮  
膚ノ分利ヲ復故スルニ在レ正其因ト證トニ隨  
テ一ナテス此二三證アリ其一毫モ惡證ヲ繼發



セスメ發汗利尿若ハ恰當ニ下利アル者はナリ  
是自然良能已ニ分利ヲ營メルカ故ニ唯温保メ  
接骨木花泡劑ニ安質没酒ヲ加ル等ノ發表飲液  
ヲ温用スルノミニメ足レリ(其二)肺焮衝腦焮衝  
咽喉焮衝腹臟焮衝等ノ險證ヲ起シテ發熱太甚  
シク譫語狂躁スル者はナリ瀉血ヲ行ヒ消石ヲ  
用ヒ芥子泥羌菁膏等ノ反對刺衝法ヲ施シテ先  
其焮衝ヲ退却セシメ而后發表法ヲ以テ皮膚ノ  
分利ヲ復セシメンコトヲ要ス其藥ハ殊ニ消石羯  
布羅ヲ注トス(其三)衰弱已甚ニメ痙攣搐掣シ四

肢微冷スル者はナリ鎮痙温補ノ發表法ヲ行フ  
ニ冝シ羯布羅ニ民埵列里精燕瑤精麝香阿芙蓉  
等ヲ配シ用ヒ無テ芥子泥微温浴ヲ施サンコトヲ  
要ス若夫泄瀉ニ因ル者ハ之ヲ遏止セサル可ラ  
ス飽食ニ因ル者ハ吐法ヲ行ハサル可ラス  
複性麻疹ハ各其合併熱ノ性ニ應メ相當ノ治法  
ヲ行フヘシ

(第三期)單性麻疹ニ在テハ唯能ク温保メ防焮ノ  
攝養ヲ守ラシメ滿那ニ酒石ヲ伍スルカ如キ緩  
和清涼ノ下劑ヲ用ヒ以テ其體中ニ殘留セル病



毒ヲ皮膚ト腎腸ト此時表被剝落ノ為ニ皮膚ノ運管完キトヲ得サレハナリ

ヨリ排除セントヲ要スルノミ此時更ニ局處ノ

焮衝殊ニ肺焮衝ヲ起シテ瀉血ヲ要スル者少カラス

宜ク適當ノ治法ヲ施スヘシ甘汞ト芫菁硬膏ト

ハ此期ニ於テ諸證ニ通セル病毒轉徒ノ要藥ナ

リ必之ヲ用フルニ宜シ獨布羅モ亦然リトス此

期ニ至テ欬嗽荏苒タル者ハ忽諸スヘカラス是

其餘毒肺ノ粘液膜ヲ侵セルノ徵ニメ漸ク結核

ヲ釀シ終ニ結核勞ニ轉スルノ恐レアレハナリ

宜ク先緩下發表ノ劑ヲ連服シ甘汞ヲ用ヒ芫菁

硬膏ヲ貼シ微温浴ヲ行ヒコヲ子ルヲ以テ胸部

ヲ被覆スヘシ良驗ヲ得ルトアリ而功ナキ者ハ

一二回吐藥ヲ與ルヲ妙トス是ニ由テ仍ハ驗ナキ

者ハ乳清（鑽泉）之ニ乳セル水（阿芙蓉）甘汞（金硫黃ト

ス遠志等ヲ試ムヘシ（老利兒）硫黃ニ失鳩答（老利兒）結爾

斯水ヲ配シ用ヒ兼テ瑞香皮打膿法ヲ行ハ殊

ニ偉効アルトシ若シ其効吐痰ヲ兼テ淹滯スル

者ハ依蘭苔傑列乙ヲ良シトス

麻疹モ亦種法ヲ行テ瀉益アリトス其法疹花滿

開ノ期ニ當テ漏泄スル所ノ痰液或ハ搔破セル



疹頭ヨリ出ル所ノ血ヲ採テ之ヲ行フナリ然リ  
ト雖氏此病ハ其危險大抵痘瘡ヨリ甚シカラサ  
ルヲ以テ唯惡性麻疹ノ流行スル時ニ當テ用フ  
ヘキノミ

猩紅斑 シカルラチナシ  
ロドフォンク  
蘭

徵候 初起發熱ノ咽喉疼ミ脉非常ニ短數ナル  
一ニ日大班乃發見ス其斑ハ猩血紅色周圍漫然  
トメ限界ナキ一宛モ羅斯ノ如ク其大ナル者ニ  
至テハ一斑ニメ全手全脚ヲ覆フアリ稽留ス



四五日ニメ乃消散ス而其表被巨屑ト為テ  
片剥落シ或ハ次テ水腫ヲ發スルトアリ通例  
此斑平塌ナレ氏或斑上ニ細小ノ粟疹ヲ發スル  
トアリ故ニ之ヲ二種ニ分ツノ徒アレ氏是徒ニ  
無益ノ區別ナルノミ

右說示セル所ハ此病ノ本徵ナリト雖氏其變候  
異證ヲ現ハス一此病ノ如ク甚シキ者ナシ故ニ  
或ハ唯咽喉焮衝ノミヲ發メ外證著シカラス或  
ハ外證全然トメ發見セサル者アリ  
是咽喉粘液  
膜ノ猩紅斑  
ナリ内證程  
紅斑ト謂フ或ハ諸徵悉ク關ケテ之ヲ辨スル



能ハス唯季期ノ表被剥落若クハ繼發ノ水腫病  
ヲ見テ始テ此病タリシトテ微知ス可キ者アリ  
經過三期

第一期發熱ノ咽痛ミ脉短數ナルト前ニ云ヘル  
カ如シ其脉ノ非常ニ短數ナルト他皮病ノ比似  
ス可キ者アルトナシ故ニ之ヲ以テ此熱ノ一主  
徴トス而效ナク嘔ナク眼亦淚ヲ流サス是麻疹  
熱ニ非ルノ證ナリ其熱モ咽痛モ共ニ次期ノ迫  
ルニ隨テ益増進シ甚シキ者ハ譫語痙攣ヲ兼發  
ス

第二期所謂開花ノ期ニメ稽留スルト五六日十

リ其斑始腕ト臂トニ發シ徐ク滋蔓メ總身ニ及

ヒ但顔面ニ發ス漸ク増大シ漸ク増紅シ且陸續

メ新斑日ニ増生シ咽痛亦愈増進ス是唯内部ニ

ル嫩衝ナ輕證ニ於テハ發斑スルノ始ヲ以テ其熱

退ク者アリト雖比多ハ依然トメ持續シ或ハ却

テ増劇シ動モスレハ腦嫩衝及ヒ腹臟嫩衝ヲ兼

發ス而此斑ノ性タル輕揮ニメ消散シ易ク且ツ

内部ニ轉徙シ易キヲ猶羅斯ノ如キナリ

第三期所謂落花ノ期ナリ發斑後第六日或ハ第



ルクハ尚後ル  
其表被大花瓣ヲ擬メ始テ剥落シ其  
斑ノ焮衝劇シカリシ者ハ間手臂足脚陰囊等  
表被其部ノ全形ヲ存メ脱シ咽喉モ焮痛太甚シ  
カリシ者ハ亦斯ノ如クニメ其剥落連綿スル  
數日或ハ既ニ脱メ又脱スルヲ數回ニ及フ者ア  
リ而轉徙ヲ致サル者ハ其熱利尿及自餘ノ分利  
ヲ以テ退散スルヲ常トス然リト雖此病ハ繼  
病ヲ發シ轉徙ヲ致スト少カラス就中水腫ヲ来  
タスト最多シ是冒寒等ノ其分利ヲ障碍スルニ  
由ルナリ而此水腫ハ多ク急性ニメ患者之ヲ為

ニ八日十四日ノ間ニ斃ルヲ常トス其徵初眼  
臉腫起メ次ニ四肢水脹シ而后ニ遍身水腫腹水  
胸水或ハ頭水トナルナリ或ハ其毒眼耳若ハ腺  
ニ轉徙メ其部ノ硬腫潰瘍ヲ生スルトモ亦少カ  
ラス凡此病ノ轉徙ハ器質ヲ殘掠スルト非常ニ  
甚シトス余曾テ八日間ニ眼目潰爛シ鼻骨耳骨  
共ニ皆頽敗セルヲ目撃セルトアリ  
皮膚病多シト雖其狡猾ニメ人ヲ欺ク者蓋シ  
此病ヨリ甚シキハ莫シ一般流行ノ際ニ當テ盡  
ク皆暴劇危險ナルニ其一二ハ安然トメ輕易ニ



經過スル下アリ或ハ世間咸良性無危ニメ斃ル  
ル者ナキニ其一ニ極メテ悪性ナル險證ニ罹ル  
トアリ其惡性證ノ流行スルニ當テハ死者ノ數  
實ニ疫病ニ均シク六人ニメ必一人ヲ損シ甚シ  
ケレハ三四人ニメ其一ヲ失ヒ極メテ惡性ノ者  
ハ發斑後一二日其毒俄然トシテ腦中ニ轉徙シ  
卒中證ヲ發メ斃レ或ハ外證輕易ナルカ如クニ  
ノ季期驟ニ内陷シ或ハ忽チ水腫ヲ起シテ不意  
ニ其命ヲ終ル下アリ而此病ニ死スルハ大抵腦  
焮衝咽喉焮衝若ハ水腫ニ由ルヲ常トス

諸種ノ熱病善ク此病ニ合併メ變證ヲ起ス下多  
シ即チ焮熱劇烈斑色濃紅ニメ全身ニ汎發シ咽  
喉焮痛甚シク且他ノ内臟焮衝ヲ兼發シ易キハ  
焮衝性合併ナリ皮膚黯澹微冷斑色活潑ナラス  
消散シ易クメ痙攣證ヲ兼發シ且神經性卒中ヲ  
起シ易キハ小便頻數ヲ以テ其兆トス神經性合併ナリ衰弱  
甚シク熱勢盛ニメ失血或ハ溶崩漏泄ヲ兼子斑  
色帶青ニメ血斑ヲ夾雜シ殊ニ其咽喉腫迅ク壞  
疽ニ轉スル者ハ腐敗性合併ナリ尋常壞疽性ノ  
咽喉焮衝多ハ此種ノ猩紅斑ニ屬ス



原由 近因ハ氣中ノ傳染毒ニ中レルナリ然レ亦  
 其毒人ヨリ人ニ傳フルナリ故ニ此病ハ兩個  
 ノ傳染性ヲ具フル者トス而其毒タル喜テ咽喉  
 ト皮膚トヲ侵シテ其部ニ羅斯狀ノ焮衝ヲ起シ  
 亦善ク腦ノ血管ヲ刺衝ス而又吸尿管ノ運管ヲ  
 減損スルノ性有テ其終リ諸部ノ水腫ノ生スル  
 ナリ其水腫ヲ生スル所以シハ是皮膚ノ組織ヲ  
 變メ其分泌ヲ妨ケ水脈即吸尿管ヲ衰弱セシメテ其  
 吸尿管ヲ支フルニ在リトス蓋シ此毒ハ契合ノ感  
 受性ヲ減却スルナリ瘡瘡麻疹ノ如クナラス故ニ

之ヲ患ハル一田ニ止マラス且人人相觸レテ感  
 染スルナリ無キニ非レレ之ヲ氣中ニ傳フルナリ多  
 キ者亦是瘡瘡麻疹ニ異ナル所以ナリ  
 此病ノ世ニ行ハル、其創甚々晚夕紀元一千六  
 百年間ニ在リト云ヘリ  
 治法 防焮治法ヲ以テ旨トスト雖レ此病毒轉徒ノ  
 恐レアルカ故ニ適宜ニ温保セサル可ラス宜ク  
 週間齋中ニ居ラシムヘシ又終始内部ノ焮衝就中腦ニ注目  
 シテ病ノ輕重ヲ商量シ合併證ノ差等ヲ分別シ  
 以テ各個ノ治法ヲ議セシナラ要ス



良性ノ單純證ハ唯褥中ニ靜臥メ清涼緩和ノ發  
表藥ヲ用ヒ緩下劑ヲ兼服ノ毎日溏便ニ行ヲ得  
レハ足レリトス其下劑ハ孕鹼酒石ノ溶水ニ安  
質没酒少許ヲ加フル者甚タ佳ナリ然レ諸證較重  
メ發熱熾灼太甚シク斑色濃紅ニメ總身遺ス所  
ナキ者ハ熾衝ニ進ニ腐敗ニ陷ルノ恐レアリ速  
ニ撲滅セサルヘカラス此ニ用ヒテ良功有ル者  
二法アリ蘓魯林水ノ内服ト冷水ノ外用ト是ナ  
リ蘓魯林水ハ水或ハ佳味舍利別ヲ加ヘテ小兒  
ハ日二三錢大人ハ二三勺用フヘシ冷水外用

ハ皮膚乾燥シ頭部熾灼シテ感覺遲鈍ナル者ニ  
ノミ之ヲ行フヘシ其法一時若ハ一時半毎ニ冷  
水ヲ以テ皮膚ヲ洗テ之ヲ涼解スルナリ然レ瀉  
血ノ如キ防熾ノ功一等強クシテ衰弱ヲ加フヘ  
キ者ハ病ヲメ速ク神經證衰弱證ニ轉セシムル  
カ故ニ謾ニ施スヘカラス若シ其人少壯多血ニ  
メ腦及咽喉ノ所患劇シキ者ハ唯蜚鍼ヲ貼スヘ  
キノミ若亦病勢尚劇烈ニメ發熱太甚シク既ニ  
腦ヲ侵シテ譫語昏睡ヲ兼ル者ハ冷水ヲ以テ頻  
頻頭部ヲ洗滌シ或ハ屢冷水ヲ頭上ニ灌溉スル



ヲ宜シトス

咽喉焮衝ハ通常接骨木花ト葵花ノ浸劑ニ屋施  
茂兒ヲ加ヘテ含嗽シ第二百四十七甲方ノ舐劑  
ヲ用ヒ頸圍ニ「アラ子」ヲ纏フテ足レリト雖氏  
其重キ者ハ蟻鍼ヲ貼シ芥子泥ヲ行ハン「」ヲ要  
ス

神經性合併證ハ初ヨリ適當ノ神經藥ヲ用ヒテ  
其力ヲ扶助シ腐敗性合併證ハ防腐藥ヲ與ヘ壞  
疽性咽喉焮衝前ニ本條アリノ台法ヲ施シ腸胃性合併  
證ハ初期ニ吐下藥ヲ行ハスレハアラス

此病ノ治法ハ剥落期ヲ以テ特ニ大切ノ時トス  
就中繼發ノ水腫ヲ預防シ且之ヲ療スル「」甚々  
肝要ナリ乃此期ニ在テハ患者勉メテ褥内ニ靜  
養シ夏日ハ四週冬日ハ六週家外ニ出「」スメ嚴ニ  
胃寒ヲ避ケ緩下藥發表藥ヲ用ヒ且甘汞ヲ兼服  
メ水脈ノ運管ヲ振起シ惡性ノ繼病ヲ禦カン「」  
ヲ要ス若既ニ水腫ノ初候見ハル「」有「」ハ早ク  
吸収ヲ進メ分泌腎腸ノ分泌ヲ促ス「」諸藥ヲ取リカ  
ヲ竭クシテ之ヲ用ヒス「」ハアラス就中甘汞年  
一「」隨「」毎「」時半ニ或「」三「」  
一「」或「」三「」  
一「」或「」三「」  
一「」或「」三「」



利尿尿泡劑 第二百四十七方 與へ微温浴ヲ行フヲ最

佳トス若能ク查點メ其熱ノ焮衝性タルヲ察

知シ其脉活潑其人多血ナルヲ診シ得ハ刺絡

缺ク可ラサルノ良法ナリ 小兒ハ三至四ヲ 大

抵之ニ繼テ尿自ラ利シ 從前効驗ナカリシ 利尿

藥モ始テ其力ヲ揮フヲ得ルナリ此證ハ消石

ニ酒石海葱遠志ヲ伍シ用ヒ「フ子ル」ニ琥珀ヲ

薰シテ全軀ヲ纏絡スルヲ宜シトス又此水腫ハ

葭苈ニ甘黍ヲ配用メ良驗ヲ得頑固證ハ芫菁丁

藥モ亦妙切ヲ奏スルヲアリ

此病ヲ預防スルニ少量ノ葭苈ヲ用フル説アリ

華聖滿氏ニ 諸家ノ試驗ヲ據ルニ偉効アリト云

其流行輕易ナルハ強チ之ヲ用フルヲ要セス

ト雖厄惡性ノ危證流行スルハ之ヲ行フテ可

ナリ其法良製ノ葭苈越幾斯一以テ桂水半ヲニ

溶カシ三歲兒ハ毎日五滴宛用ヒ自餘一歲毎ニ

一滴ヲ増加ス

律別屋刺 羅

徵候 紅色ノ斑ニメ其大三分兒母 或ハ一兒母中

至ルアリ



其初起發熱咽痛スル  
一二日ニノ發見シ五六日ヲ經テ乃剥落ス其剥  
皮麻疹ニ比スレハ大ニメ猩紅斑ヨリ小ナリ而  
病後水腫ヲ繼發スル者多シ  
其斑ノ形狀兼發ノ咽喉腫差後ノ水腫等ヲ以テ  
之ヲ觀ルニ此病ハ麻疹ノ變證ニ非スメ猩紅斑  
ノ一異種ナリ

治法 猩紅斑ニ同シ此病ハ通例良性ナリトス唯  
襦内ニ靜息スルヲ三週間清涼ノ緩下藥發表藥  
ヲ服用スルノミニ足レリ然レ其重證ノ者及

合併病ヲ夾ム者ハ嚴ニ猩紅斑ノ治轍ヲ蹈テ  
殊ニ其水腫ノ治法及ヒ預防法ヲ專用セスンバ  
アラス

越設羅 スロポルセレインギール  
ストオイトスラグ

徵候 赤色ニメ硬起セル斑ナリ能ク「ワンドロイ  
ス」風ノ一種ノ咬刺ニ肖似ス微熱ヲ兼ル者アレ氏多  
ハ然ラス二三日ニメ乃消散ス此病ハ毫モ危險  
ノ者アルヲナシ

原由 腸胃汚物ヨリ來リ或ハ感冒ヨリ起ル



治法 二三日室内ニ保養メ後チ下劑ヲ用フルノ  
外他伎ヲ要スルナシ

蕁麻疹「ウトリカリ」  
「アロ」  
「テロロ」  
「ス」  
「蘭」

徵候 紅色ノ大斑ニメ中央白ク煩痒灼クカ如ク  
ニメ忍ヒ難ク其形狀ト感覺ノ模様ト全ク蕁麻  
ニ傷ラレタルト同一ナル者ナリ而温ニ遇ヘハ  
輒チ消除シ冷ニ遇ヘハ輒チ發見スルラ此病ノ  
一異性トス此病熱ヲ兼ルト兼サルトアリ共ニ  
二三日ニメ消散スルヲ常トス

原由治法共ニ越設羅ニ同シ而兩病共ニ甚々慢性  
ニ轉シ易シ其既ニ轉セル者ハ些微ノ誘因ニ遇  
フモ輒チ發ノ煩困堪フ可ラス其所因ハ皮膚ノ  
失常若ハ全軀ノ惡液病ニ在リトス宜ク先ツ皮  
膚ノ運營ヲ恢復スヘキ治法ヲ行テ專ラ之ヲ清  
楚ニスヘシ皮膚病總論  
ヲ参考セヨ然クノ瘡エサル者ハ潛  
伏セル癩癧黴毒伊働篤等ヲ探索メ其治ヲ處セ  
ンコトヲ要ス

粟疹「ヨリア」  
「アリア」  
「アロ」  
「ギ」  
「ール」

通



微候、赤白兩種アリ、白粟疹ハ白色ニメ、粟粒ニ肖  
似セル細疹ナリ、諸部其處ヲ擇ハスト、雖氏多クハ  
胸部ニ發シ、或ハ數疹集合メ、透亮ノ小疱ト為リ  
含<sup>乙</sup>ハ<sup>ヲ</sup>或ハ尚<sup>ホ</sup>大ニ集合メ、真ノ水泡ヲ成ス者ア  
リ、赤粟疹ハ紫紅ノ細疹ニメ之ヲ發スルノ地モ  
亦赤色ナリ、其極テ細小ナル者ハ目之ヲ視ル<sup>ト</sup>  
能ハス、唯觸テノミ之ヲ知ルヘク、其皮膚宛モ、麤  
糙ノ褐子ニ觸ル、カ如シ、但、白粟疹ハ常ニ多ク  
シテ、赤粟疹ハ常ニ少ナシ、然<sup>レ</sup>一患者ニメ、兩證  
ヲ夾發スル<sup>ト</sup>モ亦之アリ、而、發熱多汗、酸臭ヲ放ツ乾

欬、煩悶、太息ヲ兼發スルヲ此病ノ常トス  
經過修短一定セズ、或ハ發熱三四日ニメ發見ス  
ルアリ、或ハ七八日若クハ十四日ヲ經テ始テ發見  
スル者アリ、而、其留連モ亦一二日ニメ止ムアリ  
八日若クハ十四日ヲ亘ルアリ、或ハ既ニ消メ復發  
スルアリ、其發見スルモ亦微弱ニメ勢ナキアリ  
急劇ニメ強烈ナルアリ、遍身處ヲ擇ハスト、雖氏  
殊ニ臂胸ニ多クメ、通例面部ハ免ル、<sup>ト</sup>ヲ得其  
將ニ發セントスルヤ先發熱メ、初起ヨリ汗多ク  
一種ノ酸腐臭ヲ放チ、乾欬煩悶メ安睡セス、輕輕

夫... 遺... 卷之... 汗... 通...



戰栗メ皮膚刺スカ如ク煩痒シ或ハ痙攣譫語等  
ノ神經證ヲ發ス其熱及ヒ欬嗽煩悶等ノ諸證大  
抵疹ノ發見ヲ以テ歇ムト雖<sub>レ</sub>或ハ仍<sub>レ</sub>依然トメ  
退カス益劇勢ヲ加ヘテ新疹陸續シテ發シ神經  
諸證亦愈増進スル<sub>レ</sub>アリ而<sub>レ</sub>后其表被微微剥落  
ノ以テ消散スルヲ常トス

此病ハ他病ノ傍證トシ發スル<sub>レ</sub>多クメ而<sub>レ</sub>惡ム  
ヘキノ惡徵ニ屬ス大抵本病ヲ輕快セシムル<sub>レ</sub>  
少クメ多ハ之ヲ増重セシメ殊ニ神經性ノ熱病  
ニ兼發メ更<sub>レ</sub>危險メ神經證ヲ招ク者ナリ其傍

ニ於テハ此病アリ<sub>レ</sub>ナシ千六百年間熱病ヲ  
療スルニ專<sub>レ</sub>ラ起熱ノ發汗藥ヲ投スルノ惡風行  
ハレシ時ヨリ世ニ多クメ羽蓐ヲ用ルノ地方ニ  
ハ之ヲ見ル<sub>レ</sub>最モ夥シ千七百年間ノ半ハニ至  
テ世醫熱病ニ防焮ノ清涼法ヲ行<sub>レ</sub>テ盛ナルニ  
至テヨリ漸ク少ナク方今ニ於テハ之ヲ見ル<sub>レ</sub>  
甚タ罕ナリ乃<sub>レ</sub>方今ハ唯此病ヲ流行セシムヘキ  
越<sub>レ</sub>必<sub>レ</sub>堙密ニ遇<sub>レ</sub>或ハ其人<sub>レ</sub>之ヲ發スヘキ素質ヲ  
抱キ或ハ腸胃汚物ノ排除ヲ怠リ温保度ヲ過セ  
ル者ニ之ヲ發スルノ由<sub>レ</sub>是故ニ此病ハ固ヨリ天



然ニ出ツレ者アリト雖正亦人工ニ係ル者多キ  
ニ居ルトス

治法 勉テ預防スルヲ治法ノ本旨トス故ニ每常  
之ヲ熱病ノ附屬物ト看做シテ催進センヨリハ  
之ヲ遮隔シ之ヲ減却センヲ要スヘシ諸熱病  
ニ於テ被褥ヲ輕クメ寒温ヲ適シ大氣ヲ清淨ニ  
メ腸胃ノ掃除ヲ怠ラサルハ此病ヲ發スル  
必<sup>ス</sup>罕ナルヘク既ニ其前兆ヲ見ル者モ斯ノ如ク  
處置スレハ能ク其發見ヲ防クヲ得ヘシ或ハ唯羽  
褥ヲ脱セシムルノミナシメ然正熱病分利ノ期日  
之ヲ標クニ足

ニ發メ諸證之ニ退散スル者ハ分利ノ粟疹  
ナリ決メ此例ニアラス適宜ニ保護メ内陷ヲ防  
カスレハアラス  
既ニ發見セル者ニ於テハ各兼發スル所ノ熱性  
ヲ檢メ之カ治法ヲ處スルヨリ他ナシトス若夫  
ノ溶崩證アル者ハ蕪魯林ヲ用ヒ甚キ者ハ稀硫  
酸ヲ與ヘ腸胃ノ清刷ヲ怠レル者ハ緩性ノ清涼  
下劑ヲ投シ答末林度ヲ持ニ冒寒ヲ避ケテ内陷  
ヲ防カレトヲ要ス  
若<sup>レ</sup>既ニ内陷セル者ハ其繼證ニ注目メ之カ策ヲ

大正十一年三月三日



議スヘシ其疹内陷スト雖氏有害ノ後患ヲ起サ  
スメ良能自ラ腸及皮膚ニ分利ノ排泄ヲ致ス  
アリ是ノ如キ者ハ適宜ニ温保スルノ外他ノ伎  
倆ヲ要セス然レ氏之カ為ニ神經證。腦患。肺。等  
ノ危険ナル轉徙證ヲ起ス者ハ強メテ速ク芥子  
泥ヲ施シ芫菁膏ヲ貼シ微温浴ヲ行ヒ羯布羅麝  
香ヲ内服セシメテ以テ皮膚ノ分利ヲ催進セス  
ンハアラス若ク焮衝ノ素因有テ局處ノ焮衝ヲ来  
タス者ハ瀉血ヲ怠ル可ラス麻疹ノ治法ヲ  
參考スヘシ  
此病熱ナク又發スル者アリ之ヲ慢性粟疹ト謂

フ其經過定度ナク多クハ久ク淹滞シ或ハ皮膚ニ  
其素質ヲ貽シテ屢再發ス大抵是唯内部惡液病  
ノ外證ナルノミ余嘗テ伊倨篤及ヒ脚痛ノ患者  
ニ於テ春時此疹ヲ得レハ其年必脚痛等ノ諸證  
ヲ免ル者ヲ見シテアリ夫苟兒陪苦ニ兼發ス  
ル粟疹モ亦此類ノ者アリ治法ハ唯其本因ノ惡  
液病ニ應メ各自相當ノ策ヲ回ラシ且皮膚清刷  
藥按ニ硫黃。安質。沒。桂。朴。屈。福。烏。篤。薩。爾。沙。根。ノ。類。ヲ用ヒ浴法ヲ行ヒ角  
法ヲ施ス等ヲ佳トス

天... 道...



血斑 「ベテキア」羅「シツフ」シケシ蘭

徵候 紫色褐色。黑色。若ハ紅色ノ小班ニノ其徑一分許形正圓ニメ分界歴然タル者是ナリ然レ亦其形正シカラス周圍漫然トメ分界ナキ者アリ或ハ其大二三兪母ナル者モ亦之アリ而其發スルニ部位ヲ擇ハス亦順次ナク定期ナク熱ヲ兼ルアリ否サル下シ其小ナル者ハ蚤刺痕ト甚タ善ク肖似セルカ故ニ之ト混同スルコトアリ然レハ蚤刺痕ハ必咬刺點アルヲ以テ看別スルコトヲ得ハシ

熱性血斑ハ其見發既ニ發熱ノ初日ニ在ル者ナリ次日ニ在ル者アリ或日ヲ經テ始テ發スル者ナリ而留連スルニ定期ナク消散スルニ表被ノ剥落ヲ以テセス其斑發メ其熱退カス或ハ却テ増劇スルコトアレハ輕快ヲ得ルコトハ甚々稀ナリ原由 近因ハ血液ノ皮下ニ溢出セル者ニメ故ニハ失血病ニ算入マ可ナル者ナリ全軀ノ衰弱ト間亦失血證ト合發スルコトアリ血液ノ溶崩トニ起因ス故ニ通例腐敗熱ノ常證タルナリ然レ過度ニ皮膚ヲ温保熱蒸メ局處ノ刺衝ト局處ノ衰弱トヲ致スヨリ生スルコトアリ

失血病ニ算入マ可ナル者ナリ全軀ノ衰弱ト



是歟衝熱ニ於テモ亦見發スル一有ル所以ナリ  
或ハ又腸胃ニ汚物有テ排除ヲ怠リ交感ニ由テ  
之ヲ生スル一アリ猶粟疹モ亦腸胃熱虫熱ニ傍  
發スル一有ルカ如ク一般ナルナリ或ハ亦分利  
ノ一證トシ發スル一アリ然レ是唯其餘證ノミ  
ニ決メ分利ノ本然ニ非ス是故ニ此斑ト粟疹  
トハ其原由殆ト同一ナル者ナリ故ニ亦屢互ニ  
相合併スル一アリ又此病ヲ兼ル流行病ノ行ハ  
ル一アリ是此斑本傳染スヘキノ性有ルニ非  
レレ之ヲ兼發セル熱病ノ傳染スルニ從屬ノ亦

共ニ傳染スル者トス

治法 全ク粟疹ト其趣ヲ一ニス其未發見セサル  
者ハ勉テ早ク之ヲ預防シ其既ニ發見セル者ハ  
勉テ速ニ之ヲ驅散セシテ要ス其之ヲ預防ス  
ルニハ其熱ノ初起ニ當テ清涼ニ保護シ兼テ腸  
胃ヲ疎滌スルヲ宜シトシ其之ヲ驅散スルニハ  
熱性ヲ檢メ各對證ノ治法ヲ行ヒ神經熱ト腐敗  
熱ヲ最多シト  
スレハ亦衝熱モ亦之アリ若然ル者ハ下劑ヲ投  
瀉血モ亦行ハル可ナリ  
シ答未林度ヲ鑛酸ヲ用ヒ醋ヲ以テ皮膚ヲ洗ヒ  
清鮮ノ外氣ヲ引クヲ佳トス殊ニ下劑ハ即効ヲ



奏スルヲ多シ  
慢性血斑ハ此斑ノ熱ヲ夾マサル者ナリ諸種ノ  
慢性病ニ傍發シ殊ニ多ク腸胃汚物蛔虫等ニ起  
因ス或ハ亦他病ノ傍證ナラスメ單發スルヲア  
リ斑病前ニ出ツノ類ノ如キ是ナリ是血液失イロ苟ル兒ル陪  
苦性ノ溶崩ヲ為セルヨリ來ル宜ク失血編ト參  
考メ之カ治法ヲ處スヘシ

天泡瘡ハハビキハシ羅ヲラ  
ルオイトスラ蘭

徵候 豌豆火ゴリ胡桃子大ニ至ルノ疱ニメ其形チ

圓滿二三合著ノ其形正裏面ニ水様ノ稀液ヲ充

填シ周圍ニ紅色ノ縁脚ノ纏フテ癢痒焮熱フル

者是ナリ其熱ヲ兼ル者ヲ急性天泡瘡ト謂フニ

三日稽留メ乾瀋シ或ハ潰膿メ遷延瀰久ス其熱

ヲ夾マサル者ヲ慢性天泡瘡ト謂フ陸續トメ逐

テ新疱ヲ發シ以テ數月數年ヲ經ルトアリ

治法 原由治法共ニ全ク水泡羅斯羅斯條ニ出ツニ同シ

專ラ熱性ニ準テ從事セントテ要スルト他ノ皮

病ニ異ラス別ニ注意スヘキハ唯外治法ノミ

鉛類石膽等ノ驅逐藥ハ決メ用フ可ラス危險ノ



轉徙ヲ起ス<sub>一</sub>アリ若其疱依然トメ久ク癒エサ  
ル片ハ謹慎ヲ加テ疱毎ニ毫鍼ヲ兩刺メ蓄液ヲ  
漏泄シ表被ヲ剝離セスメ其乾瀹ヲ自然ニ任ス  
ヘシ若亦疼痛嫩熱ヲ起ス者ハ薔薇水ニ楨楂粘  
漿ヲ加ヘテ温蒸スルヲ佳トス潰膿スルモ決メ  
脂膏ヲ施スト勿レ久ク膿膿セシムルノ害アリ  
若其疱壞疽ニ變セル者ハ<sub>老人ニ發セル者及疫  
熱ニ無ル者間之アリ</sub>  
幾那羯布羅石灰水ヲ以テ蒸漏スルニ宜シ  
慢性天泡瘡ハ皮膚病中遷延スル<sub>一</sub>殊ニ久シク  
治癒スル<sub>一</sub>最難キ者<sub>一</sub>ニメ其原因深ク潜ク

レ病毒知リ易カ<sub>一</sub>サ<sub>一</sub>ル者甚々多シ大抵他部ノ  
分泌<sub>殊ニ小便</sub>抑遏ニ因シ或ハ全軀ノ惡液病ニ其  
原ヲ資ル者ナリ先皮膚病ノ通治法<sub>總論ヲ參  
考スヘシ</sub>ヲ  
施シテ次ニ其遠因ヲ探索シ小便分泌ノ不調ニ  
因セル者ハ利尿藥ヲ處シ惡液病ニ起レル者ハ  
各毒相當ノ治法ヲ行フヘシ就中潜伏黴毒ヨリ  
來レル者多シ若然ル片ハ專ラ水銀劑ヲ用ヒン  
<sub>一</sub>ヲ要ス<sub>一</sub>蘓魯林加爾基浴<sub>一浴ニ  
加フ</sub>升汞浴ハ之  
ヲ行フテ偉効アル<sub>一</sub>多シ



鵝口瘡アタロ

徵候 口内舌上。上顎。食道等ニ生スル白色ノ小潰瘍ニメ或ハ胃腸肛門ニモ之ヲ生スルアリ其形海綿ノ如ク其質  
豕肉ノ如シ而一二日ニ消スル者アリ數週數月  
連綿シ隨テ消スレハ隨テ生スル者アリ其瘡ノ  
刺衝ニ由テ兼發スル所ノ局發證。交感證少ナカ  
ラス乃咽ニ在テハ咽痛。嚥下痛ヲ起シ氣管ニ在  
テハ欬嗽ヲ起シ食道胃ニ在テハ惡心。呃逆。胃瘕。  
嘔吐ヲ起シ腸ニ在テハ疝痛。腸焮衝。泄瀉。窘迫痢  
剥脫セル瘡等ヲ起スカ如シ而前徵ハ口内咽喉  
皮ヲ泄ス

乾燥ノ渴ヲ兼テ咽中ニ異物有ルカ如キヲ覺エ  
或ハ喉内刺痛メ糞糙ナルヲ覺エ或ハ惡心乾  
嘔嘔吐シ或ハ欬嗽シ或ハ聲音嘶啞シ或ハ胃部  
壓重シ或ハ煩悶シ或ハ嘈雜スル等是ナリ  
此病ニ死スル者ハ蓋咽喉ノ焮衝壞疽或ハ内臟  
焮衝ヲ媒起スルニ由ルナリ

原由 鵝口瘡ハ内部ノ粘液膜ニ發セル一種ノ瘡  
疹ナリ唯其織質ノ差ヘルヲ以テ皮膚ト趣キタ  
異ニスルノニ而其織質愈嫩脆ナレハ愈之ヲ生  
シ易シトス故ニ之ヲ患ルル乳兒ニ最多シ其遠



因ハ腸胃ニ汚物有テ其排除ヲ怠ルヲ殊ニ多シトス其餘ハ皮膚分泌ノ抑遏レ痺麻質ニ聖京ノ轉徙全軀血液ノ腐敗故ニ腸胃性腐敗熱肺勞ノ溶崩期ニ發スルヲ常ニ多シ等ナリ是故ニ驚口瘡ト粟疹トハ大ニ其類ヲ同フシ且其發成スルノ機モ亦大ニ其趣ヲ等フス故ニ其熱病ニ於ケルヤ夫粟疹ト同シク唯一傍證トナルノミニメ令利證トナルト甚罕ナリ而此病モ亦粟疹ノ如ク天行熱病ノ固有證トシ來テ一般ニ流行スルイアリ

慢性驚口瘡ハ唯病毒轉徙ニ由テノミ發ス殊ニ

骨ノ潰瘍等ノ如キ慢性病ノ過急ニ治セル後之ヲ生スルト多シ

治法 一部若ハ全軀ノ病因ヲ除去スルニ在リ即之カ本病ト為ル所ノ熱病血液腐敗等ノ治法ヲ施シ兼テ局處ノ治法ヲ行ハシト要ス是故ニ熱性ノ鵝口瘡ニ於テハ必先吐下藥ヲ用ヒテ腸胃ヲ清刷スルト喫緊ノ最要事ナリ間之ノミニ他技ヲ費ヤスト要セサル者アリ而清淨氣ヲ迎引シ熱性ヲ斟酌メ各之カ治法ヲ處シ瘡色宜シカラスメ腐敗ニ傾ケル者ハ強壯防腐ノ諸

夫大遺北 卷之十七 序



藥ヲ與入屢口内ヲ洗嗽シテ蓬砂此病ノ奇ヲ砥  
劑トシ第一百五十一方用フル等ヲ宜シトス但明礬石  
膽類ノ收瀋藥ハ之ヲ外用スル<sub>一</sub>勿レ俄ニ消散  
メ危険ノ轉徙ヲ起ス<sub>一</sub>アリ殊ニ其毒ヲ腦中ニ驅逐ス唯頑  
固ニメ既ニ慢性ニ變セル者ノ<sub>一</sub>皓礬ヲ塗テ可  
ナリトス而疼痛甚キ者ハ葵花トク過爾託亞根トク煎  
汁ヲ以テ含嗽シ腐敗ノ素質ヲ具フル者ハ幾那  
明礬等ノ防腐藥ヲ用<sub>一</sub>口深ク食道胃腸ニ蔓延セ  
ル者ハ油質乳劑ヲ與ヘ且油ニ乳汁ヲ和メ灌腸  
法ヲ行フニ宜シ

慢性鵝口瘡ハ局處治法ニ亞<sub>一</sub>ヒテ其本因ト為レ  
ル惡液病ノ治法ヲ施スヘク皮疹潰瘍等ノ内攻  
ニ原ケル者ハ更ニ潰瘍ヲ造テ舊痂ヲ喚起セン  
<sub>一</sub>ヲ  
乳兒ノ鵝口瘡ハ後<sub>一</sub>小兒門ニ詳説ス









