



74
1448
20



扶氏經驗遺訓卷之二十二

足守 緒方章公裁

義弟郁子文

同譯

西肥 大庭志景徳 參校

伊屈篤蘭アルトリチス羅即痛風ナリ然氏漢人所謂痛風ハ傳府實ト伊

徵候 骨節疼痛メ其部焮腫或ハ漫腫ヲ發シ其腫

動モスレハ結核腫或ハ加爾基腫ニ變シ必ス兼

ルニ不食吞酸粘液鬱滯風氣痞脹大便秘閉等ノ

消食不良ノ諸患ヲ以テス



< 91-1908(10) >

右件是伊偃篤ノ本相ナリト雖此病ハ其變幻甚タ多クメ諸證顯著ナラス或ハ全ク潛伏メ能ク他患ノ體ヲ擬シ陽ニ諸種慢性病ノ謹候ヲ現ハシテ人ヲ欺クト最モ甚キ者ナリ故ニ不明ニメ診決シ難キ諸病ヲ見ル毎ニ醫必_ス此ニ注思メ陰ニ此病ノ其因ト為レルニ非ルカヲ察セスンハアラス是故ニ之ヲ兩種ニ大別ス即顯發伊偃篤ト潛伏伊偃篤ト是ナリ

顯發伊偃篤

三證アリ

其一 急性伊偃篤發スルニ定期有テ兼ルニ發熱



ヲ以テシ終ルニ分利ヲ以テスル者是ナリ其發スルノ定期ハ大抵皆春分ノ候ニ在テ間歇スルト半歲或ハ一歲全ク其患苦ヲ見ズ而其發作ハ燄衝性熱病ノ分利ト一機ナル者ニメ全軀ノ病毒分利スレ_レ氏十全ナラス所謂轉徙ヲ各部ニ致ス局處ノナリ其證タル關節ニ燄赤腫痛其痛極敏所患ナル等ノ燄衝證ヲ作シ者アリ一身發熱メ稽留スルト大約三四週進期極期退期ノ三時ヲ經過メ酸臭ノ發汗ト濃厚白色如爾基狀若クハ帶赤色ノ尿塗トヲ以テ分利スルヲ常トス而其顯發ノ部位ニ

隨テ或ハ脚痛或ハ膝痛或ハ手痛等ノ名稱アリ
或ハ又其痛彼此ニ游走ノ轉移スル者アリ若其
内部ニ向テ轉スル者ハ甚タ恐ルヘシ此ノ如ク
整然トメ期ヲ定メ來ル者ハ其發證右ノ如シト
雖氏或ハ之ニ代テ其時期春分ニ疼痛ヲ發セス
唯發汗皮疹等ノ他ノ分利證ヲ致ス者アリ二三
留余嘗テ伊偃篤ノ發作ニ代テ吐涎ヲ發セシ者
ヲ目撃セリ

其二慢性伊偃篤發作定期無メ且熱ヲ兼サル者
是ナリ經過長短一樣ナラス數日數週數月或數

年連綿メ其疼或游走シ間瞬時ニ轉メ遠隔ノ部
ニ移ルコトアリ此證ハ分利ヲ得ルコト罕ナリ偶之
アルモ唯不全ナル者ノミ而本來慢性ナル者ア
リ急性證ノ分利ヲ得サルヨリ轉シ來レル者ア
リ

其三壞性伊偃篤前證ノ久ク日ヲ延クヨリ來ル
者ニメ組織變常器質變壞ヲ致セル者ナリ殊ニ
結核腫カ加爾基腫キヲ關節ノ周圍ニ形生ノ其運轉
ヲ妨ケ或ハ全ク之ヲ缺クニ至ラシムルヲ常ニ
多シトス而、又眞ニ骨腫贅骨ヲ生スルコトモ屢之

アリ

潜伏伊屈篤

伊屈篤ノ本證ヲ發セスメ他ノ病
 狀ヲ現セル者はナリ其病外部ヲ侵サスノ專ラ
 内部ヲ襲ヒ以テ其地ニ疼痛若ハ他ノ劇證難患
 ラ起ス者アリ之ヲ例スルニ胃ニ在テハ胃痛胃
 瘕酸液粘液慢性嘔吐等頭ニ在テハ頭痛頭眩耳
 聾失明等胸ニ在テハ久欬胸痛喘息等神經ニ在
 テハ依^ヒ剥^ボ昆^ク埵^ト兒^ル瘕^カ攣^ル搐^ク搦^ル麻痺等腎ニ在テハ腎
 石門脈系ニ在テハ痔疾水脈系ニ在テハ水腫ヲ
 起スカ如シ或亦專ラ皮表ヲ侵シテ潰瘍硬腫癭

瘤慢性皮疹等ノ諸證ヲ發スルヲアリ總テ此變
 形伊屈篤ハ内外ヲ論セス其本性ヲ持シテ動モ
 スレハ患部ニ硬腫結石及ヒ沔乙滲漏ノ凝結ス
 ル等ノ諸患ヲ致スナリ病證此ノ如ク變形スル
 所以ノ因ニ般アリ故ニ其種類亦自ラニ般ハ別
 アリ其一ハ一旦外部ニ發セシ者ノ復^クヒ内部ニ
 陷入セルナリ即内證緩慢ニ來ルト急疾ニ來ルト
 アリ共ニ從前ノ伊屈篤證消散ノ現證輒^クチ來ル
 ヲ以テ徵知シ得ヘシ其急疾ナル者ハ多ク胃寒ニ
 由テ内陷シ胃^ノ焮衝^ノ卒中窒息失氣等ノ急劇證ヲ

夫大醫集 卷之二十一 四 諸道齊

發スルナリ一其二ハ病毒元來外部ニ宜發スル
ヲ得スメ内邊ニ滯止スルヨリ發セルナリ即虛
其毒多ハ胃腸及運化神經ニ留着メ殊ニ荏苒夕
ル消食不良等ノ諸腹患ヲ起シ或ハ依剥昆垓兒
等ノ神經病ヲ生スルナリ脚痛ヲ發メ此等ノ病
患頻治スルヲ屢アル
者即チ之或ハ此因ヨリメ皮疹潰瘍等ノ慢性諸
患ヲ發スルヲモ亦之アリ此等ノ諸證ニ於テハ
之ヲ鑿察スルヲ甚夕難シ其主徴トスル所ハ父
母曾テ此病ヲ患ヒシ者時々伊倔篤性ノ輕痛ヲ
發スルヲアル者汗ヲ發スレハ諸患輕快ヲ覺ユ

ル者尿中常ニ加爾基狀ノ沈渣ヲ見ハス者時候
ノ更革天氣ノ淪變ニ應メ諸證變動スル者等は
ナリ余カ經驗ニ據ルニ潜伏伊倔篤ニ固有ノ一
證アリ患者皮膚ノ一局部ニ頑癩ヲ覺エ或ハ獸
毛ノ裏面ニ夾マレルカ如キヲ覺ユル者は是レナ
リ
原由 近因ハ體液ノ調和一種ノ變壞ヲ受ケテ補
給力常性ヲ變セルニ在リ其病性タル本來消食
機ノ衰弱ト乳糜製造ノ不良トヨリ起テ液質稠
凝ニ加爾基ヲ造リ酸液ヲ醸シ以テ骨等ニ交力

五 諸證齊發

ヲ有テル^トノ親密ナル一異毒ヲ生ス^ル者ナリ
而其發現ノ諸證ハ畢竟皆其病毒ヲ化熟メ之ヲ
排泄セントスル良能ノ機撥ヨリ外ナラス其機
若旺ニメ發熱ヲ兼ル者ハ全軀若ハ一部ニ於テ
十全ノ分利ヲ遂ケ以テ久暫ノ時月全ク其患苦
ヲ免ル^ト得^急性伊^屈篤^伊其力不及ニメ十全ノ分
利ヲ得サレハ其病外部^關ニ止テ慢性證トナリ
終ニ其部ノ器質ヲ荒蕪シ夫微毒^{ユキ}英吉利病トハ
全ク異ナル一種固有ノ骨腫贅骨骨疽等ヲ起シ
若又其毒ヲ外部ニ排泄スル^ト能ハサル者ハ所

謂潛伏伊屈篤ト為ルナリ能ク此内情ヲ理會セ
ハ夫^伊屈篤^伊ト伊屈篤ト其別自ラ明カナル^トヲ
得ヘ^レ乃伊屈篤ハ内ニ生メ外表ニ發出スル病
ナリ^伊屈篤^伊ハ表ニ起テ内部ニ襲入スル病ナリ
故ニ所謂伊屈篤證ハ深ク體裏ニ潛居セル病患
那良能ノ分利ニ由テ體表ニ發現セシ外證ナレ
氏^伊屈篤^伊ハ原來皮膚ノ運營抑遏メ而體內ヲ侵
掠スル病ナルカ故ニ其病患多クハ體ノ外邊ニ
位メ消食乳糜製造等ノ内部諸機ヲ犯ス^トハ少
ナリ且伊屈篤ニハ顯然タル一異質ノ病毒アレ

在倭麻質ニ於テハ唯鬱閉セル苛厲ノ蒸發氣其
毒トナレルノミ

遠因ハ飲食不節逸居安樂富人ニ此病多シ葡萄酒殊ニ酸味

ヲ帶過用房勞過度又ク色事ニ耽ケリシ後頓ニ絶ツ片ハ殊ニ之ヲ患フ

冷濕ノ大氣北國ノ瀕海此病多シ卑濕ノ居屋濕濡ノ生業

洗衣及諸急慢蒸氣閉塞倭麻質ヨリ伊倭水中ノ生業遺傳ノ素質等ナリ婦人經

出血ノ閉止痔血壅滯月經閉止遺傳ノ素質等ナリ婦人經

血収止ノ期ニ至テ始テ伊倭篤ヲ患ル者多シ是

從前此病ノ素質アレハ經血誘導ノ功ニ由テ其

患ヲ免レ来リシ者今其閉止セルカ為ニ乃チ發

見スルナリ又夫遺傳ノ素質ニ關ズルチ此病ノ
如ク甚シキハ無シ故ニ此素質アル者ハ既ニ幼
稚ノ時ニ於テ早ク之ヲ發スルチアリ

病毒造成ノ地ノ消食器及乳糜製造器ニ在リト

スルチハ古人モ亦既ニ言ヘルチアリ飽殮多房

逸居ハ伊倭篤ヲ扶ケ發スルノ因ナリト即飽殮

スレハ乳糜ニ酸味苛厲ノ未熟液ヲ生シ多房ト

逸居トハ腸胃ノ衰弱ヲ起シ乳糜ノ化熟ヲ妨ク

レハナリ且消食不良ハ必ス此病ニ前驅シ或ハ

之ト並ニ行ハル故ニ疎滌藥能ク之ニ驅ヲ奏

シ強壯藥能ク之ヲ預防スル等皆此說
ニ足ルヘク此病ノ痔血ト交互ニ相發スル
キモ亦等シク其因ヲ腹内ニ資ルノ徵トスルニ
足ル或ハ此病ノ因精液鬱滯ニ在リト云ル說ア
リ然レニ畢丸ヲ截ル者モ之ヲ患ルヲアリ其臆測
信ス可ラサルヲ知ルヘシ
或ハ又其本原他病ニモ此病ノ本證ヲ擬スル者
アリ鑒別セスンハアラス殊ニ微毒。瘰癧質。失苟
兒陪苦。皮膚病ノ内陷。經久潰瘍ノ急癒等ヨリ来
ルヲ多シトス

治法

病根ヲ除クノ治

根治法ナリ普
ク諸證ニ通ス

ト病證ニ隨

フノ治トニ法アリ蓋シ此病ヲ治スルニハ常ニ
有形ノ病毒アリト云フヲ胸中ニ置カン
ス否ラサレハ其術繁肯ニ中ルヲ得ス
其證ニ隨フノ治法左件ニ在リ

其一(急性伊屈篤)此證ニ於テハ唯其發作ヲ良能
ノ分利ト看做シ之ヲ扶ケテ十全ナラシムルノ
諸法ヲ盡シ之カ妨ケヲ為スノ諸害ヲ避ケ熱度
ヲ適宜ニシ攝生ヲ嚴守シ焮衝ヲ防キ發表ヲ促
カシ專ラ其治ヲ良能ニ委任セン

天... 道... 醫...

蠟布。新製毛布等ヲ著メ發汗ヲ促カスヲ良トス。諸外用藥皆宜

却テ危險ヲ惹ク₁多シ殊ニ冷水鉛劑羯布羅等ノ消散藥ハ其病ヲ貴要ノ内臟ニ轉セシムルノ恐アリ假令然ラサルモ患部ノ機力_熾ヲ抑損メ分利ヲ營ムノ適度ヲ失ハシメ以テ慢性證ニ移ラシムルナリ局處瀉血モ亦然リ能ク患部ノ熾衝疼痛ヲ減スト雖_レ其毒ヲ除ク₁能ハス分利ヲ妨ケテ遷延頑滯セシメ或ハ其部ノ衰弱ヲ起シテ虛證ニ徙ラシメ或ハ關節ノ腫脹疆直等ヲ生セシメ或ハ其毒ヲ貴要ノ内臟ニ轉セシメ或

ハ其部ニ屢再發スヘキノ素質ヲ貽_レサシム温蒸藥等ノ外用モ亦又然リ能ク疼痛ヲ寬解スレ_レ却テ其部ノ弛緩衰弱。膨腫。洩_レ乙滲漏。或ハ釀膿等ヲ媒起スル₁アリ或ハ又此證ニ吐藥及峻下劑ヲ稱譽スル者アレ_レ亦宜シキ所ニ非ス瞬時ニ其發作ヲ除ク₁アリト雖_レ其毒或ハ之_レカ為ニ俄ニ轉徙シ_キ其害極テ甚ク實ニ慙ム可_レ或ハ分利ノ機撥摧折セラレ姑_ク佇立シテ却テ惡性ノ劇證ヲ繼發シ或ハ又轉メ慢性證ニ徙ル等其害少ナカラス又世ニ即効アリト稱スル奇_ニ内服

モ此證ニハ害アリトス動モスレハ分チノ機極
ヲ挫テ危險ノ轉徙ヲ起ス一アリ其實ニ醫カラ
假ル可キ者ハ唯左ノ數證ノミ

第一焮衝峻劇ニメ其人多血強健熱勢太甚ニメ
患部發赤焮灼スル者此證ハ消石ニ礪砂ヲ伍シ
用ニ局處瀉血ヲ施スノ外其脈度ニ微メ刺絡モ
亦行ハサル可ラス

第二腸胃汚物證ヲ合併スル者此證ハ疎滌藥吐劑
ヲ急ル可ラス殊ニ之ヲ發作前ニ用フレハ大
ニ其經過ヲ短縮ス

第三焮衝強カラスメ疼痛極テ劇シク兼ルニ神
經證痙攣證ヲ以テスル者此證ハ菲阿斯越幾斯
ニ水ヲ加ヘテ軟膏ノ稠トシ微温ニメ外敷シ又
内服スルヲ宜シトス然クメ寛解セサル者ハ羯
布羅ニ阿芙蓉少許ヲ配シ用ヒ或ハ晚ニ挖歇爾
私散一劑ヲ與フヘシ

第四熱證解散スレ氏疼痛甚クメ局處證退カサ
ル者十全ノ分利ヲ得サル者ニメ乃所謂伊倭
篤藥ヲ處スヘキノ秋ナリ就中朴屈福烏篤ヲ最
佳トス此藥ハ諸分泌ヲ進メテ腸ノ排世ノ

ノ能アリ第二百二十五甲方ノ如ク製用ヒテ
 上圍日ニ二回ナランコトヲ要ス羯布羅民垣列里
 精モ亦此ニ用フヘシ老人及ヒ虚證ニ傾ケル者
 ハ鹿琥精ヲ與フルヲ良トス斯クメ而其驗ナキ
 者ハ慢性伊倔篤ノ治法ヲ行フヘシ
 其二慢性伊倔篤此證ニ於テハ其病毒ヲ化熟メ
 融解セシメ以テ之ヲ排除スルヲ治法ノ旨トス
 之ヲ要スルニ人エヲ以テ分利ヲ營マシムルコ
 猶前證ニ於テ自然良能ノ自ラ營メルカ如クナ
 ラシムルニ在ルナリ其治則左ノ如シ

第一特效藥ヲ用フヘシ特效藥ハ其病毒ヲ中和
 メ化轉セシメ軀體ヲメ伊倔篤質ヲ脱セシムヘ
 キ一異カヲ具フルノ藥ナリ就中羅倔塩ヲ以テ
 最トス即チカルハスバツト鑛泉蓬塩之ニ苦味藥ヲ
 佳トス第百ニ石灰水硝砂精硫磺水素附等十
 十六方ノ如シ
 其他硫黄硫黄浴「アルケン」子ウシ或ハ安質没
 扭金硫黄安質没亞古利斯丁幾附安質没硫加爾
 基第百ニ或ハ鹿琥精謁兒列耳痛風液忽弗
 痛液ト鹿琥精ト或ハ也故里私亞設兒利油
 等分ニ之ヲ和ス
 水銀升汞或ハ朴屈福鳥篤朴屈福鳥篤燒酒ニ溶朝夕一

夫貴川卷之二十三

食^ハ宛連用スレ^ル雙鸞菊薩^サ毘^ビ那^ナ第^二百^一十八^方
薩爾沙格爾失屈謨^サロド^ドテンド^ドルム^ムキリ^リサ^サ

薩爾沙格爾失屈謨^サロド^ドテンド^ドルム^ムキリ^リサ^サ
ハ^ハ殊^ニ奇^功アリ^リ雙鸞菊薩^サ毘^ビ那^ナ第^二百^一十八^方
薩爾沙格爾失屈謨^サロド^ドテンド^ドルム^ムキリ^リサ^サ
未^詳等皆特效藥ナリ宜ク撰用スヘシ而蟻浴塩^ハ
浴燒酒醇浴及^ウイスバー^バテン^ンテ^テフリ^リツ^ツ等^ノ鑛^ノ
泉浴モ亦勝^レテ異功アリ

第二發表藥ヲ連服シ打膿法ヲ久用シ諸分泌ヲ
催進メ病毒分利ノ機撥ヲ挑起シ以テ人工ノ排
泄ヲ營ムヘシ就中羌膏硬膏ヲ久ク貼スルハ甚
タ益アリ初先患部ノ近傍ニ一枚ヲ貼シ次テ又
其傍ヲニ一枚ヲ貼シ斯ノ如ク相尋^ヒテ數枚ヲ貼

スヘシ極テ頑固ナル者モ之ニ由テ全治セルト
屢之アリ又^アウ^ウテン^ンリ^リト^ト軟膏^ノ未^詳瑞香皮打膿
蒸氣浴等モ大ニ良シトス

第三消食器ヲ清刷メ之ヲ强健ニスヘシ温性ノ
解凝藥吐劑下劑ヲ撰用シ強壯藥ニハ殊ニ括失
亞ヲ連用スルニ宜シ

第四液質ヲ改易メ之ヲ新鮮ニスヘシ^{液質變性}
併考^ス乳汁養法ヲ行フ^ト數月ナラン^トヲ要ス^ル

第五體質ニ注目メ各之カ策ヲ處スヘシ衰弱家
ハ滋養強壯ノ諸法ヲ行ヒ多液强健家

夫大體... 卷之二十二 十三

或ハ断食シ防焮ノ攝生ヲ守リ下劑ヲ施スハ瀉血
ヲ施ス屢甬法ヲ行フ類是ナリ

第六局處ノ治法ヲ施スヘシ其標的ニアリ甲ハ
一部ノ刺衝ヲ寛解メ其患苦ヲ減却スルナリ喻
ハハ焮衝強キ者ニハ瀉血ヲ行ヒ神經性ノ者ニ
ハ芥子泥芫菁膏ヲ貼シ鎮痙麻酔藥ヲ擦スル等
ノ如キ是ナリ乙ハ一部ニ住着セル病毒ヲ揺蕩
メ其分利ヲ促スニ在リ其優レテ良驗アル者ハ
蠟布毛布猫皮等ヲ以テ断エス温保シ石腦油薩
毘那油加耶普的油拔爾撒謨字露忽氏拔爾撒謨

非答等ヲ塗擦シ華爾斯硬膏阿魏硬膏附瓦爾拔

奴謨膏阿芙蓉水銀軟膏ヲ外敷シ或ハ芫菁硬膏

ヲ貼メ久ク癒サス頑證ニハ艾灸法ヲ施シ局處

蒸氣浴碓砂精硫磺等ヲ加及滴浴ヲ行フ等ナリ

頑固證ニ於テ既ニ相當ノ内治法ヲ施セル後ハ

冷水浴モ亦用ヒテ奇功アリ

其三膀胱證其其儂儂質質ニ起ル者是亦伊倨篤ニ因

セル者ハ同一ノ治則ニ準テ之ヲ療シ最後ニ根
治法出ツニテ處シ殊ニ適宜ノ強壯法ヲ行

其四壞性伊倭篤關節屈曲シ器質變壞

羅倭塩シツトマン悉篤滿煎等ヲ内服メ後升汞浴蒸餾

處滴浴等ヲ行フヲ佳トス又「ウースバーテ」テ

ブルツ「アーケ」等ノ鑛泉浴モ良驗ヲ奏ス

其五内陷證其毒ヲ再外部ニ喚起セシメテ要ス

但緩急二種ヲ區別メ從事セスンハアラス急疾

内陷證ハ直ニ刺絡ヲ施シ總テ皆内部ノ焮衝ヲ

勉メテ防焮治法ヲ處シ既往ノ患部ニ芥子泥ヲ

敷キ現今ノ患部ニ芫菁硬膏ヲ貼シ熱勢頓挫メ

後羯布羅若ハ琥珀鹽ニ消石ヲ配メ之ヲ用フヘ

シ其頭中ニ轉セル者ハ頭痛劇烈ニメ危險恐ル

ヘシトス奏功最モ駿速ナル治法ヲ施サスンハ

アラス先シツ蟻鍼ヲ貼メ一時半毎ニ甘汞二ハ雙

鸞菊半ハヲ伍シ用ヒ項窩ニ芫菁硬膏ヲ貼スル

ヲ宜シトス胃ニ轉メ急性證ヲ起セル者ハ先適

宜ノ瀉血ヲ行フテ後芫菁硬膏ヲ胃部ニ貼スヘ

シ唯瀉血ヲ行フノミニハ其緩慢内陷證ハ引

赤法ヲ行ヒ芫菁硬膏ヲ貼シ内服ニハ羯布羅麝

香。礞砂精。燐亞的兒。朴屈福烏篤揮發丁幾

方等ヲ與フヘシ

其七虚性證專ラ緩慢内陷證ノ治法ヲ
兼テ

精カヲ奮起メ強壯ニセシテ主トス即

劑。白芥子酒浸。朴屈福烏篤揮發丁幾。ベルクシア

未等ヲ用ヒピロモンテル^ルドリビル^ルゲル^ル等ノ

強壯浴法ヲ行フヘシ鐵粉^ルニ硫黄^ル括失亞末^ル及

越幾斯ノ丸藥モ亦甚タ功アリ

根治法ハ即チ素質ヲ除クノ治法ナリ三則アリ

其一前ニ論舉セル諸般ノ遠因ヲ除クニ在リ^原

ル^{条ヲ看}乃チ飲食ヲ節シ過酒ヲ禁シ房事ヲ慎ミ

筋カヲ役シ乾燥ノ室ニ居テ乾燥ノ氣ヲ引キ寒

冷ノ地ヲ去テ温煖ノ郷ニ移ル等ヲ宜シトス

其二消食機ヲ強健ニスルニ在リ^{括失亞健質亞}

那⁺ポルトランド散^附等ノ苦味藥ヲ用ヒ鐵劑ヲ

與ヘ^ロピロモンテル^ルドリビル^ルゲル^ル水^鑛等ヲ服セ

シメ亦之ニ浴セシメ海水冷浴ヲ行フ等ナリ

其三諸分泌ヲ進メテ病毒ノ分利排泄ヲ促スニ

在リ^{運轉摩措温衣}。^{衣ヲ佳トス}温浴ヲ以テ皮膚

ノ蒸發氣ヲ催進シ一週毎ニ格爾失屈^シ護^ム等ノ利

尿藥ヲ用ヒ時ニ温性下劑ヲ投シ以テ腎

ヲ排泄ヲ促カシ且春秋毎ニ數週間^ハ福烏篤

健質亞那。土木香。藥刺巴。旃那。海葱。橙。桂。腰
 ノ酒浸ノ如キ分泌催進ノ藥酒ヲ用ヒシ
 ス殊ニ此ニ一種ノ奇功ヲ呈スル者ハ硫黃ト朴
 屈福烏篤ナリ第二百三十方此病ノ素質アル者ニ毎月
 四日間若ハ六日間連用メ毎日二三行ノ下利ヲ
 得セシムル片ハ確乎トメ其發作ヲ禦クヲ得
 ヘシ又硫黃ヲ含メル温泉浴ヲ夏日ニ四週間行
 一體質膨然タル多液ノ徒ハ時々打膿法ヲ行フ
 テ人工ノ分利ヲ作スラ大ニ利アリトス

徵毒 シヒリスロキテ

徵候 局患證 又根原證 ト汎患證 又蔓延 トアリ

局患徵毒 是唯感染ノ部ニ刺衝ヲ起スノミニ

×未他部ニ蔓延セス粘液漏泄 淋疾白帶下等 或ハ潰瘍
下疳ヲ生シ若ハ兩證ヲ兼發セル者ナリ

淋疾 其經過二期アリ患部ノ刺衝甚シク劇
 證ハ包莖腫閉。翻皮箝窄。鼠蹠腫。睪丸腫等ノ交感
 證ヲ起ス間ヲ初期トシ刺衝去テ已ニ慢性淋
后淋ト云ニ移レルヲ後期トス初期ハ修短定
 無シト雖氏大抵三週ヨリ八週ニ至リ

打...
延久...

延久キラ瀰テ或ハ數年ヲ經ル

ヲ兼サル者ハ其毒久ク住著スル氏全軀

スル一無キラ常トス亦然ラサル者モ之無キニアラス

下疳 瘡面豕肉状ニメ邊縁堆起シ劇痛スル

ナキ潰瘍ニメ甚シキ者ハ鼠蹊腫毒等ノ交感證

ヲ發ス此證モ亦一處ヲ局メ癒ル者アリト雖氏

多クハ其毒總身ニ蔓延スルナリ而其經過短キ者

ハ三週修ナカキ者ハ數月ニ及ブ

凡ツ徴毒ノ疑ヒアル者ト交媾シ或ハ創傷セル部若

ハ表被ナキ部口内肛門等ヲ以テ斯ノ如キ人ニ接ヒ

シ後局處ノ患證ヲ發セシハ皆之ヲ徴毒トス

ルヲ宜シトス假令ニ徴毒ノ固有證ヲ具ヘス氏斯

ノ如キ事故有テ後ニ發セル局患ハ概メ徴毒ノ

看ヲ做スヘシ而其創傷部ヨリ感染セル者ハ每

常危險證ヲ起ス者ト知ルヘシ

(汎患徴毒)蔓延證 局處ノ感染ヨリ延テ全軀ノ感

染ニ移ル其時日甚ク不定ナリ或ハ一二週ニメ

然ル者アリ或ハ數月ヲ經テ初メ然ル者アリ而

其創傷部及ヒ下疳ヨリ蔓レル者ハ其布行

速ナリトス且淋疾ヨリ及ヘル者ハ其以慢

夫...
卷之二十二
十七

ノ良性ナレ氏下疳ヨリ徒レル者ハ必
メ残酷ナリ

其毒ノ全軀ニ普達セルハ感染部ノ外ニ諸種
ノ黴毒證ヲ發スルヲ以テ之ヲ徵スヘシ其最ナ

ル者ハ陰部肛門ノ疣瘡上顎懸壅ノ潰瘍眼焮衝

皮疹頑癬狀ニメ越設羅ニ肖タル小班ナリ畢丸

腫便毒表被屑剝ヲ兼メ殊ニ前頭ニ之ヲ發ス交感ニ由テ生スル者ハ異ナリ夫、沕乙腫

腺腫等ナリ而其感染一等重クメ深ク攪入セル

ノ徵ハ骨腫殊ニ脛骨臂骨等ニ發ス骨疽就中額骨鼻骨等ニ生ス骨痛夜

ニ甚等ノ骨病惡性硬結腫海棉狀贅肉等ナリ



汎患黴毒一時間休歇ノ宛モ睡レルカ如ク毫モ
其徵候ヲ見ルナクノ而後再ヒ劇證ヲ發シ来
リ或ハ全ク他患ノ證狀ヲ擬メ現ハル、トアリ
之ヲ變形黴毒或ハ潜伏黴毒ト謂フ凡慢性諸病
多シト雖氏此病ニ由テ擬セラレサル者有ル
ナシ之ヲ鑒定スルハ甚ク難シト雖氏然氏亦
々茲ニ二法アリ一ハ當患ヨリ沂テ其遠源ニ蹤
跡シ至レハ乃チ其人嘗テ十年乃至十五年前黴
毒ニ感染セシト有テ爾後假ニ健全ヲ覺エ
數時アリト雖氏陸續ノ種々ノ病患ヲ

夫大貴川 卷之二十二 十八

テ今日ニ至レルヲ見ルナリ一ハ水ヲ用
ヒテ之ヲ試ムヘシ其病徴毒ニ原ケル者ハ
輕快ヲ覺ユルヲ見ルナリ

徴毒ハ人間ノ苦楚ヲ極メ盡シテ軀體ヲ傷リ精
神ヲ殘クノ惡性悉ク具備セル者ナリ夫面貌美
飾ノ鼻ヲ崩シ人間貴重ノ言語ヲ變セシムル等
其狡猾暴戾實ニ比類ナキ疾病ナリ而其進ム
ハ緩慢ニ治スルハ甚ク難ク軀體ニ惡ムヘ
キノ變壞ヲ生シ神識ニ忍ビ難キノ痛苦ヲ起シ
夜間ノ骨痛數年連綿ノ寧時ナキ者アリ獨リ患者ノ煩困ヲ受クル



ノミナラス介者モ亦其憂ニ與リ多クハ生涯ヲ窘
厄ノ中ニ遣クリテ高年仍其苦ヲ免レス其甚シ
キ者ハ水腫虚勞溶崩證等ニ陷テ乃斃ル而動モ
スレハ危險頑固ノ極ニ進ム所以ニアリ一ハ
其病多クハ始輕易ニメ意トスルニ足ラサルカ故
ニ患者怙然トメ之ヲ蔑視シ以テ其漸ク浸潤メ
深キニ入り終ニ遍軀ヲ掠畧セルヲ識ラサルニ
在リニハ此毒人體ノ器質ト交カヲ有スルヲ親
密ニメ其性亦互ニ相近シ蓋シ其原ヲ人體ニ資ルニ由ル體
其器質ト密合スルヲ他、病毒ノ比ニ非、終ニ混

メ一體ト為リ百方ストモ之ヲ分袂
能ハサルニ至ルニアリ且此病ニ於テハ其
蟬脫セル確微得テ知ルヲ能ハサルモ亦是其狡
猾ノ性ニ屬ス

原由 遠因ハ傳染毒ニメ近因ハ之ヲ感受メ起ル
所ノ中毒ナリ其毒ノ根元ヲ蹤跡スルニ大古ニ
於テ之アルヲナシ歐羅巴ニ於テハ千四百九十
三年ヲ以テ始トス厥後人ヨリ人ニ傳ヘテ陸續
受授シ断エス繁殖メ今日ニ及ヘリ其毒タル固
重ニメ氣中ニ融解揮散スヘキ者ニ非ス故ニ之

ヲ感受スルハ直ニ患者ニ接シ或ハ其毒ニ汚染
セル事物ニ觸ルニ由ルノミ而之ヲ感受スル
ノ地モ亦唯陰具肛門口唇咽喉乳頭眼内鼻竅等
ノ如キ表被ナキ部或ハ創傷ノ為ニ表被ヲ脫セ
ル部ニ限リ且契合ノ感受性無ケレハ之ニ感染
スルヲナシ蓋シ其感受性ノ有無總身ニ在ルア
リ一部ニ在ルアリ而粘液塗布ノ部位ハ感染ス
ルヲ遲鈍ニメ表被剝脫ノ部ハ甚々敏捷ナリト
ス病毒始テ一部ニ觸レテヨリ之ニ感染
デノ時間遲速一樣ナラス或ハ僅ニ 二日ナ

ルアリ創傷潰瘍ノ部ヨリ傳或ハ十日ノ久
 ラ俟ツ者アリ既ニ感メ起ル所ノ諸患
 抗抵ト病毒ノ滋蔓トナリ其感染ノ淺深部位ノ
 異同及局處傳染總身傳染等ニ由テ證狀差等アリ
 殊ニ局處傳染ト總身傳染ト能ク區別セス
 ハアラス局處傳染亦淺深強弱ノ差等アルヲ固
 ヨリ論ラ俟タス而亦之ニ粘液性傳染ト潰瘍性
 傳染トアリ或ハ之ヲ淋毒下疳毒ノ名ヲ以テ分
外證ノ違粘液性傳染ニ於テハ其毒粘液ニ包攝
 セラレテ其性緩柔ト為リ恣ニ殘掠セス宛モ

粘液ノ性質ヲ取レルカ如ク局處ノ刺衝輕クメ
 焮衝劇シカラス淋白帶下ヲ起スノミ且謾ニ増息スル
 ナク自體ニ蔓延スルモ他人ニ傳フルモ斯ク甚
 シカラス久ク一處ニ住著メ動クト少キヲ常ト
 ス潰瘍性傳染下疳ニ於テハ其毒初ヨリ局處ヲ荒
 蕪シ皮膚ヲ侵蝕メ潰瘍ヲ生シ其性酷厲ニメ自
 體ニ滋蔓スルモ他人ニ傳染スルモ甚タ銳烈ナ
 リ其局處ヨリ總身ニ傳フルノ時間ハ預定ハ可
 ラス或ハ日ナラスモ蔓延スルアリ或ハ
 月ヲ經テ初テ然ル者アリ婦人ノ體

夫大貴川 卷之二 五

泌ノ器ニ在テハ數年一局處ニ滯住

傳染スルヲ有リ且自體ニハ蔓延スル

多シ而其全軀ニ蔓延スル所以ハ患者ノ感受性

ニ係ルアリ傳染ノ部位及ヒ模様ニ係ルアリ創傷

ノ部ニ感受シ或ハ膿ニ由テ傳染セルカ如キ其

蔓延スルヲ最易クメ傳送スルヲ最速ナリ或

ハ治術ノ宜キヲ得サルニ係ルアリ淋下疳等ヲ

滋蔓セシムルヲ速テ一身ニ

其毒ノ體內ニ在テ蔓行スルノ道路及ヒ體內ニ

在テ本地ヲ占ムルノ部位ハ水脈ト腺トナリ故

ニ先水脈ニ焮衝様ノ所患ヲ起シテ腫脹ヲ近隣

ノ腺ニ生シ便毒繼テ遠隔ノ部ノ諸腺ニ及フ次ニ

上顎咽喉鼻竅眼内ノ粘液膜ト交カヲ有スル

親密ニメ茲ニ焮衝潰瘍ヲ起シ其次ハ皮膚ヲ侵

シテ一種ノ皮疹下疳様ノ潰瘍ヲ發シ其次ハ深

ク鑽入メ骨質ヲ襲ヒ終ニ内部ノ貴重器ニ及フ

ナリ

其病毒本然ノ何物タルヲハ他ノ傳染諸毒ト共

ニ吾人未明カニ知ルヲ能ハスト雖且其質固重

ニメ氣中ニ揮散セス其性慢然ニメ熾

ス喜テ腺水脈骨質粘液膜ヲ侵襲シ

機能ヲ變メ肉瘤骨腫等ノ異常ノ形

メ又全軀ニ浸淫メ其器質ト固結密合

ルヲ昭々タリ故ニ此病ノ本然ハ無形ノ作用ヲ

致スノミナラスメ活體ノ含密ニ係レル有形ノ

作用アル者ナリトス

然レ其病久シク稽留スルキハ其毒必化セラレテ

其力緩柔ト為リ或ハ暫時全ク休止メ其作用ヲ

現ハサ、ルニ至ルヲアリ所謂潜伏徴然リト雖

レ其毒宛モ睡寐セルカ如クニメ全ク枯死セル

ニ非サルカ故ニ一旦抗抵力ノ勃起スルニ當テ

ハ更ニ發動メ復舊痾ヲ再發ス斯ノ如ク間歇ヲ

致ス所以シハ水銀療法ノ不及ナルニ由テ僅ニ

毒カラ制頓スレレ未全ク毒質ヲ消滅スルヲ能

ハサリシニ在ルヲ殊ニ多シトス或ハ又其毒當

然ノ證状ヲ起サス、肺、神經、腹臟等ノ非常ノ部

位ヲ侵シ非常ノ諸證ヲ發メ全ク他病ノ態相ヲ

現ハスヲアリ所謂變形徴亦是前件ノ因ニ生シ

且其機前件ト一途ニ出ツル者トス

治法 其毒ヲ攻ムルト其證ヲ治スルトニ般

攻毒治法是啻ニ其毒ヲ消滅スルヲニ

ミナラス此病ハ器質ヲメ更ニ毒ヲ醸
ル所以ノ性ヲ存セリ共ニ之ヲ奪除セス
ラス故ニ十全ノ功ヲ收メンニハ其兩功ヲ具フ
ルノ治法ヲ行ハン_一ヲ要ス體中ニ現在セル病
毒ハ外證ト共ニ除ク_一一旦病毒ノ為ニ起リシ
所ノ病毒再醸ノ性ノ全ク脱セサル際ハ多少ノ
時日ヲ經タル後其毒更ニ生メ復_レ既往ノ證狀ヲ
發シ或ハ他病ノ態相ヲ以テ現ル_レ者ナレハナ
リ根治法ト姑息法トノ別即チ此ニ在リ姑息法
ニ由レル者ハ外貌既ニ癒ユルカ如キヲ得ルト

雖_レ其毒ト病毒再醸ノ性トハ仍_レ内ニ存メ暫ク
其作用ヲ現サルノミ
右兩功ヲ兼備セル無比ノ卓藥ハ水銀ナリ微毒
ヲ治スルノ良巧ト稱スル者ハ他ナシ是_レ此藥ヲ
用フルノ良巧ニメ細ニ用量ノ度ヲ節シ能ク瞑
眩ノ害ヲ慮リ以テ其兩功ヲ逞フセシムルニ在
ル_レ然_レ水銀ハ一種ノ毒藥ナリ謾ニ過用ス
レハ更ニ汞毒病ヲ將來ス謹テ之ヲ忘却スル_レ
勿_レ水銀ノ製法用法共ニ頗ル多シ皆法
毒ヲ制伏スルニ足ル而其功用ヲ達

要鍵ニアリ一ハ藥質遍ク體內ノ器々
スンハアラスニハ藥力刺衝能ク病毒ヲ
ルニ適スヘキ抗抵ヲ起サスンハアラス抑水銀
ノ體內ニ入テ專ラ功用ヲ致スノ地ハ殊ニ腺ト
水脈トナリ此病毒ノ體內ニ在テ專ラ本地ヲ占
ルノ部モ亦腺ト水脈トナリ故ニ此藥ノ此毒ヲ
滅却スル所以ンノ妙機特ニ茲ニ無クンハアラス
今其妙機ヲ考フルニ徽毒モ活體舎密ノ變ヲ起
シ前ニ出ツ水銀モ亦活體舎密ノ變ヲ起ス者ニメ而
其作用彼此互ニ相反スルカ故ニ亦互ニ相伐テ

之ヲ消シ之ヲ化スルニ在ルナリ因テ其功用ヲ
全フスルニハ水銀ノ輸送恰モ病毒ニ均合スル
ノ度ニ適セン一ヲ要ス那吐涎ノ前兆即是其度
ニ適メ遍ク水脈系ニ鑽透セルノ徵候ナリ
攻證治法是唯病毒ノ為ニ起ル所ノ抗抵ヲ制メ
患證ヲ除クヲ旨トスルノ也亦此ニ本證治法ト
屬證治法トアリ本證トハ病毒刺衝ノ為ニ發セ
ル焮衝及神經感動疼痛ナリ勉テ之ヲ除祛スヘ
シ能ク其患苦ヲ去テ本病癒ユルニ至ル
然レ之ニ憑依ノ全癒ヲ得タリト

夫大遺水 卷之二十三 十五 遺水

證トハ硬腫腫瘍皮疾潰瘍等ノ組織或ハ
泌機諸患神經病諸證ノ如キ是ナリ此諸患ハ
毒存在メ發見スル者アリ病毒盡テ仍残留スル
者アリ其證ヲ攻ムルハ毒ノ有無ニ拘ラス共ニ
一ナリト雖其毒存セル者ニ於テハ兼治法ト
ナリ毒無キ者ニ於テハ本治法ト為ルヲ異トス
ルノニ凡病毒仍存セル者ニ於ケルノ攻證治法
ハ皆是唯姑息法タルノニ那生カ抗抵休ニ諸證
消散シタリ凡決メ全治トスルヲ莫ルヘシ
各證治法

局患徵毒

根原

傳染ノ初頭ハ其患毎常唯局處ニ

在テ其地ニ住着スルヲ甚タ久シク特ニ粘液漏

泄證淋疾

ノ如キハ他部ニ滋蔓スルヲ無ク自ラ全

治スル者少カラス此毒ニ感セル者ヲ歴觀スル

ニ專ラ良能ニ委任メ醫治ヲ待タス初期ニ早ク

自ラ治癒シ毫モ惡證ヲ惹出サ、ル者古來甚々

多シ且輒近ニ至テハ醫家モ亦局患徵毒ハ皆良

能ノカニ任セ單防嫩藥ト減食法トノミヲ以テ

療ス可キノ說ヲ主張セシ者アリ之ヲ實驗ニ

スルニ斯ノ如クニメ全軀ノ傳染ヲ終セス局

患全ク消除セシ者實ニ往々之アリト 氏然レ
氏亦水銀ヲ用ヒサレハ諸證退カサル者多ク
ハ前説ノ如クニメ一旦消除シ患者自ラ全治セ
リト謂ヘル者多少ノ時日ヲ經テ復同一ノ證ヲ
發シ其毒未タ全ク滅セサルニ由ル或ハ他ノ患證ヲ他部ニ現
ハス者全軀ニ滋蔓セシルノ微亦少カラズ是故ニ之ヲ自然
ノ良能ニ任セ或ハ之ニ普通ノ療法防飲法ヲ處
減食法スルノミニメ而治スヘキト否ラサルトテ預決
定スル_ト甚難シ故ニ正道ヲ守テ根治ヲ營マン
ト欲スルノ徒ハ局處ノ感染ヲ見ル毎ニ毎常之

ヲ汎患黴毒ノ根始トセン_トヲ要ス是ヨリメ早
晚必ス全軀ニ蔓延シ普ク器質ニ浸淫スル者ト
思惟メ早ク之ヲ初頭ニ摧挫スルノ策ヲ圖ラシ
以テ後患ヲ防カスンハアラス若其毒一旦器質
ニ侵入スルニ及テハ其殘掠ヲ制スル_ト甚々難
ク遂ニ人壽ヲ賊_フノ最大不幸ト為ル_ト昭々々
レハナリ而其毒ヲ摧挫シ其侵入ヲ防禦スルニ
ハ唯夫特效ノ消毒藥水銀ヲ取テ早ク之ヲ投スル
ニ在ルノミ故ニ局患黴毒モ咸之ヲ用フルヲ
テ法トス輕證淋疾ノ如ク早ク自ラ共
治スル者ハ此例ニアラス水銀ハ

夫代貴州 卷之二十二 三七 通鑑齊民

初期ニ於テ直ニ其毒ヲ滅却スルト其眞能ヲ以テ儼毒抗抵ニ對スル一種ノ抗抵ヲ起シテカ滋蔓ヲ拒クトノ兩功ヲ具有セリ是唯理然リトスルノミナラス許多ノ實驗ニ據テ確徴セル所ナリ且水銀ヲ用フルト早ケレハ少量ニメ足ルト雖ヒ久ク猶豫スレハ十倍量モ猶其功ヲ較フルニ足ラス而斯ク多量ヲ投スルニ及テハ乘毒ノ後患亦太ニ恐レアリトス凡水銀ノ施用早ケレハ能ク傳染毒ノ滋蔓ヲ預防スルト夫恐水病ニ於テモ明ニ之ヲ證スヘシ犬毒仍一處ニ止

マルノ際ニ速テ早ク之ヲ用フレハ能ク全軀ノ汚染恐水ヲ禦キ得ルト古來ノ經驗少ナシトセス局患儼毒ハ粘液漏泄淋疾ト潰瘍疔瘡ナリ故ニ局患治法亦二般ノ別アリ凡局患ニ獨リ局處ノ治法ヲ施シ單ニ防痲藥減食法ノミヲ行フノ危殆ナル所以ハ前條既ニ之ヲ說示セリ斯クメ而後チ全ク健康ヲ覺ユルト若干月或ハ十ニ月餘ニメ頓ニ恐劇ノ汎患證ヲ發シ且骨腫ヲ起ス者甚タ多シ若斯患者ニ與フルニ早ク緩性ノ水銀劑ヲ以テハ二三十分ニ足ラスメ斯患ヲ未前ニ止ル

必セリ斯ノ如キ少量ノ水銀ト斯ノ如

病患ト其利害得失如何ソヤ

淋疾ハ初帶黄綠色膿様ノ物ヲ洩ラシ次ニ白色

ノ粘液ヲ流出ス其初期ニ在テハ弱スルニ疼痛

シ劇キ者ハ小便澁滯シ或ハ全ク閉止シ陰莖勃

張シ疼痛ヲ兼子罨丸熾蹊ニ交感ノ腫瘍ヲ發ス

ルトアリ而其諸證皆交媾ノ後ニ来ルヲ以テ鑒

定ノ徵トスヘシ伊^イ倨^グ篤^ト瘰^レ癧^レノ轉徙痔疾ノ變形

等モ亦同證ヲ發スルト有レハナリ全ク別個ノ

然^レ氏交媾後ニ發セシ者モ亦必^スシモ黴毒トシ難

シ子宮局處ノ病患ヨリ来ル者アリ但此證ハ黴

シテ其治法ヲ施毒ノ者ヲ為ス氏害ナレトス治法ハ時期ニ隨テ差別アリ即

チ初期ニ於テハ專^ラ防^ハ焮^法ヲ行ハレトラ要ス

身體ヲ靜息シ肉食ヲ嚴禁シ起熱ノ諸件ヲ避ケ

テ亞麻仁煎汁大麻子乳劑少量ノ消石菲阿等ノ

粘味飲液ヲ多服シ勉^テ患部ヲ清淨ニシ屢微温

湯ヲ以テ洗ヒ常ニ「スコルトバンド」吾邦ノヲ帶

シ疼劇シキ者ハ蟻鐵ヲ貼スル等是此證ノ通法

ナリ間能ク全功ヲ收メテ毫モ惡證ヲ貽サ

トアリ注射藥ハ用フヘカラス利ヲ為人ヨリモ

害ヲ惹ク多シ動モスレハ尿道ノ狹、硬腫ヲ
起シ易シ當今此證尿道狹窄及硬腫ノ世間ニ多キ所
ン其罪大抵皆期ニ先ツテ注射藥ヲ誤用セルニ在
リトス陰莖勃張メ疼痛スル者甚キ者ハ龜ハ先
頭屈曲ス
ツ瀉血ヲ行フテ多血家ハ刺絡
ヲ行フヘシ而後ニ内外阿芙
蓉ヲ用フヘシ包莖腫閉包皮焮衝メ龜
頭ヲ裹ム者モ亦先瀉
血ヲ行フテ焮衝ヲ退ケ繼テ阿芙蓉ヲ内服外用
セシメ兼テ羅獨窠篤兒ヲ菲阿斯煎汁ニ加ヘテ
温蒸シ且之ヲ包皮ト龜頭ノ間ニ注射シ又之ヲ
局處浴トシ行フテ汚液ノ滯留ヲ滌除スルヲ良

トス此證ハ間龜頭ノ釀膿壞疽等ヲ起スアリ
最モ注思セサル可ラス若夫下疳ヲ兼發セル者
ハ素ヨリ水銀ヲ兼用セスレハアラス翻皮瘡窄
包皮龜頭ノ後ニ翻
却メ焮衝スル者モ亦同一ノ治法ヲ處スヘシ
若前件ノ防焮治法皆功ナクメ十四日ノ後仍疼
痛退カサル者ハ必ス水銀ヲ内服セシムヘシ用法
次ノ
下疳条凡水銀ハ頑固ノ粘液膜焮衝濕性眼
焮衝等ニ通
メ益アルト人ノ知ル所ナリ此證ニ於テハ其毒
ヲ減却スルノ功アルヲ以テ特ニ之ヲ用ス
アラス既ニ第二期ニ遷リ所謂后淋ト爲テ疼痛

ナク唯粘液ヲ漏泄スル者ニハ拔爾撒^イ骨^ク拜^イ霍^ク
二十五滴至三十滴沙糖ニ和シト
或ハ丸藥トシ用ル^ル日ニ三次
 甚夕偉効アリ葦澄茄或ハ杜松實傑列乙^イ日^ニモ
 亦用フヘシ塩酸重土或ハ蘓魯林加爾基^キ一^日タ老^ク
 里兒結爾斯水^ス半^一ヲニ溶和シ三十滴宛日ニ三次
 用フルモ甚夕良驗アリ且ツ病頑固ニメ退カス
 殊ニ黴毒ノ疑決セル者ハ清血散ヲ用ヒン^トラ
 要ス若右ノ内服諸藥皆効ナキ者ハ注射藥ヲ行
 フテ可ナリ始先石灰水或ハ老利兒結爾斯水ヲ
 石灰水ニ和シ用ヒ効ナケレハ升汞水^水一^二ヲ

^溶皓礬。膽礬。銀礬等ヲ試シ而後ニ明礬或ハ楊皮
 煎ニ老利兒結爾斯水ヲ加ヘ或ハ沒藥ニ鉛糖ヲ
 和スル等ノ収瀋藥ヲ以テ之ヲ施シ或ハ局處冷
 水浴ヲ行フニ宜シ凡后淋久シク癒エサル者ニ
 於テハ必^ス意ヲ注テ合併病ヲ檢スヘシ屢之ヲ持
 久セシムルノ主因ト為ル^トアレハナリ
脫液病編ヲ參
考ス
 (下疳)ハ必^ス交媾後ニ發スルヲ以テ徵スヘキノ外
 其瘡面豕肉狀ニメ邊縁堆起シ疼痛微ナルヲ以
 テ鑿定スル^ト得ヘシ淋疾ト合併スル者アリ

夫大遺... 卷之二十二 主 道通...

否、サル者アリ故ニ淋疾ノ患者ヲ見ル毎ニ能ク
之ヲ檢セン_一ヲ要ス下疳ハ蓋全軀傳染ノ根始
ナリ早ク水銀ヲ内服セシメテ其毒ヲ初頭ニ滅
却シ其滋蔓ヲ未前ニ芟ラスンハアラス乃其初
起直ニ華涅滿溶汞散名ヲ取テ之ヲ與フヘシ衝
甚キハ先_子瀉蓋此劑ハ諸水銀劑中ニ於テ其生礦
血ヲ行フノ質ヲ亡_クフ_一最モ微ニメ其消毒ノ功ヲ有スル
一最モ多ク且其性緩柔ニメ軀體ヲ害スル_一最
モ寡キ者ナリ用法ハ初日ニ_一ハ_一ヲ與ヘ次テ日ニ
一_一ハ宛増加シ以テ呼氣惡臭齒齦疼痛頸腺腫起

等ノ吐涎ノ前候ヲ見ルニ至ルヘシ大抵七八日
ニメ毫モ外藥ヲ處スル_一ナク自ラ痊愈スル_一
ヲ得ヘシ而後仍七八日間持久メ毎日一_一宛之
ヲ用ヒン_一ヲ要ス凡水銀療法ノ後ハ獨此證ニ
於ケルノミナラス總テ其病患一旦癒ルハ暫時
患者ニ配意メ其再發ヲ注視シ若其徵ヲ見ハ更
ニ前劑ヲ取テ舊ノ如ク之ヲ行ハスンハアラス
通例外藥ハ用フル_一ヲ要セス唯石灰水ヲ以テ
屢洗滌シ些子ノ解凝軟膏ヲ貼スルノミニメ佳
ナリ以テ此病ハ外ヨリ之ヲ抑制セス内ヨリ

其毒ヲ滅却スレハ乃_ナ治スルニ足ル_ト證スヘ
シ然ルニ當今ニ至テモ單ニ升汞水赤降汞皓礬
膽礬明礬刺必斯印歇兒那栗斯等ヲ以テ外治法
ヲ施ス者ノ多キハ何_ナ唯局處ノ抑制ヲ營_メ
ルノミナルカ故ニ後_チ必ス咽喉潰瘍等ノ如キ諸
惡證ヲ繼發スル者少ナカラス是唯其枝ヲ芟テ
其根ヲ拔カサルノ致ス所ナリ下疳_{或ハニ}巖蹊
腫_{便毒}畢丸腫ヲ兼發スル_トアリ是多_クハ本患ノ交
感證ニメ焮衝退ケハ隨テ解散スルナリ故ニ防
焮法ト羅獨窠篤兒ノ温蒸_{温ニ過キサルヘシ}トノ

外他技ヲ要スル_トナシ然_レ其本患退_テ仍_モ持留
スル者ハ是其毒既ニ深ク侵入セルノ徵ナリ宜
ク水銀ヲ用フヘシ或ハ又淋疾モ下疳モ患フル
_トナクメ始ヨリ局患ノ便毒ヲ發スル_ト罕_クニ之
アリ始ヨリ水銀ヲ與フル_ト前件ノ如クセス
ハアラ_ス婦人ノ白帶下ハ即チ男子ノ淋疾ナリ
淋疾及_テ下疳ノ論說治法ヲ襲用スヘシ疣瘡ハ通
例水銀ノ内服ニ由テ他潰瘍ト共ニ消散スルナ
リ若_シ久_ク治セサル者ハ薩毘那結麗阿曹多_附
外用甚_ク効アリ切断腐藥モ亦行フテ可_クナル_ト

アリ閉塞淋ハ過強ノ刺衝藥或ハ收瀦藥ヲ注射
シ若シクハ寒冷ヲ誤用セシヨリ起テ已甚ノ惡證
ヲ見ハス者ナリ即チ局處及交感ノ焮衝ヲ劇發
シ或ハ神經ノ諸患ヲ將來シ甚シキ者ハ牙關緊
急身體強直等ヲ起ス一アリ治法ハ先ツ焮衝ヲ
降鎮シ多血家ハ刺絡ヲ行ヒ而後阿芙蓉ヲ内服
外用シ緩和ノ注射法ヲ施シ鎮痛ノ温蒸藥ヲ處
スルヲ宜シトス

汎患蔓延 咽喉ノ焮腫潰瘍。眼焮衝。皮疹。殊ニ前頭
便毒等汎患ノ初候見ハル、者ハ先ツ「ルキリ

ウスシ子リス 灰汞ノ義ナリ按ニ是第一酸化汞
華涅ハチ滿溶汞散。甘汞ノ如キ緩性ノ水銀劑ヲ用フ
ヘシ大抵全功ヲ收ムルニ足ル此諸劑ハ軀體ヲ
害スル一少メ之ヲ用フルニ便ナリ就中華涅滿
溶汞散ヲ最良トス用法服量前段ニ云フ所ノ如
シ但日ニ半匁ヲ増スニ宜シ凡水銀ハ服量過多
ナレハ速ニ能ク外證ヲ退クト雖モ藥力ノ鑽透
ト病毒ノ滅却トヲ切實ニスルヲ能ハス故ニ微
々之ヲ増サン一ヲ要ス而兼ルニ毎日第二二百二
方ノ清血劑料一二ヲ用ヒ單ニ飲液ヲ多服シメテモ治癒ヲ進

○藥功ヲ扶クル
○少ナカラス
○治法畢リ諸證退クマテ病牀
○離レシメス食料ハ澹泊ノ蔬菜類ヲ主トメ酸味
○塩藏及ヒ香竈ノ品ヲ禁スヘシ病既ニ日ヲ經テ
○深ク浸入セル者或ハ既ニ右ノ諸藥ヲ用テ驗無
○リシ者或ハ稍効アルカ如キモ其治ヲ全フスル
○一能サリシ者ハ升汞ヲ以テ必當ノ卓藥トス此
○藥ハ容易ニ吐涎ヲ起サ、ルヲ以テ其益殊ニ少
○カラス患者既ニ水銀ヲ多服メ吐涎ニ傾キタル
○一甚シキ者ハ他ノ水銀劑一二ハヲ與フルモ忽
○チ之ヲ發メ後服ヲ止サル可ラサル一多シ是等

ノ患者ニハ特ニ升汞ヲ用ヒスハアラス其用
法左ノ規矩ニ從ヘハ害ナクメ久ク連用スル
ヲ得即チ其胃中ニ入テ融解スル一ノ徐々ナラ
ンカ為ニ之ヲ丸藥ニ造リ其侵蝕力ノ直チニ胃
腸ヲ害セサランカ為ニ之ニ粘味包攝ノ藥ヲ配
シ且胃瘕惡心疝痛泄瀉等ノ神經證ヲ禦カンカ
為ニ之ニ阿芙蓉ヲ伍スルヲ宜シトス第二百三
十一方ノ配合乃チ此規矩ニ原ケルナリ是儼毒
ノ最良藥トメ余カ日常施用スル所ノ者タリ
月間ニ連用セ
シハル一アリ
服量ハ日ニ半ハヲ度トシ頑證ハ
數間

漸ク増加メ日ニ四分片之三ニ至ルヘシ而温ニ
保護ヲ致シ嚴ニ攝養ヲ守ルヘキハ固ヨリ論ヲ
俟タス兼テ薩爾沙類ノ煎汁ヲ多服シ温浴ヲ行
ヘハ大ニ藥カラ扶ケテ奏功愈著シトス然レ升
汞ハ肺ヲ犯スノ害アリ故ニ勞瘵質ノ人及ヒ之
ヲ用テ胸痛ヲ起ス者ハ他ノ方劑ヲ與ヘシヲ
要ス斯患者ニハ薩爾沙濃煎根ニ弓水ニ此ヲ以
テ煮テ一匕ヲ取リ
用フニノ如キヲ用テ間全功ヲ収ムルヲアリ升
汞ニ亞テ峻功アル者ハ赤降汞ナリ或ハ升汞ニ
優リテ奇効ヲ奏スルヲアリ服量ハ八分片之一

ヨリ六分片之一マテ日ニ兩次用フヘシ用法升
汞丸ニ異ナラス第二百三
十二方同藥ト雖レ製劑ノ方
ヲ轉換スレハ大ニ其功ヲ増スヲアリ故ニ這劑
既ニ驗ナキ片ハ則チ那製ニ換ヘテ試ムヘシ藥丸
ヲ散劑ニ換ヘ散劑類直ニ其効ヲ見ハスヲアリ又
均シク水銀劑ナリト雖レ甲ハ這證ニ的當シ乙
ハ那證ニ効驗有ル者アリ喻ハ焮衝性徽毒證ニ
ハ甘汞華涅滿溶汞散能ク奇功ヲ奏シ咽喉潰瘍
皮膚所患ニハ升汞赤降汞必ス偉能アルカ如シ
又永ク水銀劑ヲ施用スルニハ時々之ヲ徹メ休

夫氏遺訓 卷之二十二 三六 通通齋藏

歇スルモ甚夕益アルナリ

黴毒ハ水銀ヲ用ヒス氏治ス可キノ説ヲ主張ス
ル者アリ夫熱國ニ於テハ唯薩爾沙サールサ朴屈福鳥篤ハックホック
等ノ清血藥ノミヲ以テ全功ヲ収ムルナシト
ス可ラスト雖氏我地方ニ在テハ此等ノ劑獨リ
能ク根治ヲ營ムコト得ル者ニ非ス唯既ニ饒多
ノ水銀ヲ用ヒテ後病頑然トメ退カサル片全ク
水銀劑ヲ廢シ朴屈福鳥篤或ハ薩爾沙ノ濃煎ノ
ミヲ與ヘテ全治ヲ得ルコト有ルノミ
煎句氏ノ説ニ曾テ水銀ヲ久服シ且之ヲ塗擦法トシ吐涎法トシ行テ寸
驗無リシ者後チ唯朴屈福鳥篤煎ニ由テ全功ヲ

叔メシト云ル者即チ之カ證トスルニ足ル又夫虛弱ノ患者ニ於テハ
強壯劑大ニ其治ヲ扶ケテ病ノ餘藥ヲ滅盡スル
コト少カラス

凡、此病ノ治療ニ二個ノ難事アリ其第一ハ毒ノ
作用ト再醸性ト共ニ全ク竭テ已ニ根治ニ就ケ
ルヤ否ヤ之ヲ辨スルノ確徵ヲ得ルコト能ハサル
是ナリ現在ノ諸證ハ悉ク去ル氏之カ徵トスル
ニ足ラス那再醸性ノ有無ハ未タ知ル可ラサレ
ハナリ故ニ諸患皆退散スル氏仍若干時間少量
ノ水銀ヲ連服セスンハアラス但諸證ヲ除クニ

日ヲ費セル一修カリシ者ハ久ク之ヲ連用シ其
速カリシ者ハ亦之ヲ久クセサルヲ法トス而全
ク水銀ヲ徹スルニ及テモ仍前件ノ清血劑薩爾沙朴
屈福鳥ヲ連服セシメ以テ少シ焉其毒ノ動靜ヲ伺
候セン一ヲ要ス水銀療法完カラスメ病再發ス
ル者世間ニ多キ所以ヲ觀ルニ他ナシ唯其根治
ソ全否ヲ確知スルヲ能ハサルト右件ノ配意ヲ
忽ニセルトニ由レルノミ其患者モ亦水銀ヲ服
用スト雖氏諸證退散スレハ輒之ヲ徹メ寒氣
ニ冒觸シ攝養ヲ怠謾シ自ラ以テ康健ニ復セリト

メ其實ノ否サルヲ知ラス早晚復更ニ病者ト為
ルナリ第二ノ難事ハ謾ニ水銀ヲ久服スレハ所
謂汞毒病ヲ發スル是ナリ乃之ヲ為ニ腺腫潰瘍
等宛モカ徽毒證ニ肖似セル諸患ヲ發シ或ハ深ク
器質ヲ侵シテ諸液溶崩シ失苟兎陪苦ノ素質ヲ
生スル一アリ亦注意セサル可カラス

頑滯徽毒病既ニ久ク陳滯メ生機作用ト親和シ
深ク骨質等ヲ犯シテ遂ニ其組織ヲ變シ或ハ水
銀療法ヲ用ヒ盡クシテ皆驗ナク或ハ一時癒ム
ルナ有ルカ如キモ復其證ヲ易ヘテ再ニ起ル者

等はナリ更ニ峻カノ療法ヲ施サンコトヲ要ス此
證ニハ水銀ヲ皮膚ヨリ用ヒテ直ニ水脈ニ吸入
セシムルヲ最良ノ法トス蓋シ此法ニ由レハ水
銀ノ病毒ニ拵扎スルカ特ニ強クメ且消食機
刺化ヲ受ケサルカ故ニ固有ノ素カヲ逞フヒン
コ必セリ其最ナル者ハ外承浴ナリ即チ外承半
弓若ハ一弓ヲ一浴ニ溶解スヘシ瞑眩ヲ致サス
吐涎ヲ起サスメ非常ノ峻効アリ其次ハ擦法ナ
リ吐涎ヲ起ス者ト否サル者トアリ其吐涎ナキ
者ハ吉里爾魯軟膏ナリ第二百五十四方毎日一錢ヲ取

テ足蹠ニ塗擦スヘシ吐涎ハ患者ヲ害スルコト少
カラス故ニ後法ヲ行ハントスル者モ先此法ヲ
施サンコトヲ要ス吐涎擦法ニハ規告撒爾弗ヲ用
フ毎日一二錢宛體表諸部位地ヲ易ヘテ之ヲ擦
シ兼テ微温浴ヲ行ヒ攝養ヲ嚴ニシ或ハ斷食法
ヲ命シ以テ吐涎ヲ發スルニ至ルヘシ吐涎ハ大
抵發熱ヲ兼ル者ナリ本病ノ輕重ニ應メ久暫適
宜ニ持久セシムルニ宜シ吐涎擦法ハ黴毒諸法
中ノ最モ有効ナル者ニメ亦最モ峻劇ナル者ナ
リ故ニ能ク真ノ病毒分利ヲ營ムト雖モ其功蹟

ニ至テハ善惡相半セリ乃チ水銀固有ノ本質ヲ
存シ化セスメ遍ク全軀ノ器質ニ鑽透スルカ故
ニ其病毒ニ抵ルノ力勁クメ之ヲ滅却スルノ功
著シク其頑滯ノ黴毒ヲ治スヘキヲ敢テ他法ノ
企テ及フ所ニアラス然リト雖其器質ヲ荒蕪
スルヲモ亦極メテ已甚シク之ニ加ルニ固有ノ
礦質ヲ存メ體內ニ殘留スルノ害有ルヲ免レ
ス尚且ツ消食ト榮養トニ必究ナルノ唾液ヲ費耗
スルヲ以テ衰弱羸瘦ヲ起シ甚キ者ハ虛勞歇屈
扶加等ニ陷ラシムルノ大害アリ是故ニ此法ハ

唯已ムヲ得サル必需ノ際ニノミ慎重ヲ加ヘ
テ行ハンヲ要ス老者及ヒ衰弱多キ者ニハ斷
メ之ヲ處スルヲ勿ルヘシ斷食法モ亦之ヲ單用
シ或ハ少量ノ升汞ヲ兼服セシメテ根帶セル痼
疾ニ偉功アリ然レ其食物ヲ斷ツカ為メニ衰弱メ
病毒ニ抗抵スルノ力ヲ脱シ以テ一旦治セルカ
如キヲ有ルモ美饌ニ就ケハ抗抵復發メ病證再
ヒ起ルヲ屢之アリ仔細ニ配意メ外況ニ惑フヲ
無ランヲ要ス或ハ又病經久セルト療法ノ峻
刻ナルトヨリメ虛憊スルヲ甚シク黴毒本證既

ニ退クト雖_レ液質變性メ餘患為ニ久ク復セザル
ル_レアリ此ニ至テハ亞兒尼加。幾那。鐵等ノ強壯
藥能ク其諸證ヲ除クナリ或ハ又薩爾沙。朴屈福
烏篤ノ濃煎ニ旃那ヲ伍シ與ヘ或ハ剝爾林煎_ニ
方_{百三}ヲ用ヒテ能ク其餘患ヲ退治スル_レアリ若
夫夜間骨痛極テ劇シキ者ニハ瑞香皮ノ内服特
効アリトス_{日ニ}煎劑トシ用フヘシ之ニ薩爾沙
ヲ伍スレハ愈殊効アリ若_シ又病頑固ニメ諸法皆
驗ナキ者ハ悉篤滿煎モ亦鴻益アリ實驗ニ據ル
ニ百方盡テ後此方ヲ以テ全功ヲ収メシ者少ナカ

ラス塩酸金モ亦良驗ヲ奏スル_レアリ少量ヲ取
テ舌下ニ擦スヘシ伊阿胃謨モ沈疴ニ於テ療法
ヲ盡セルノ末ニ偉効ヲ奏セシ_レ多シ羅傑塩ヲ
配シ溶劑トスルヲ殊ニ佳トス_{第百三十三方}或ハ又
黴毒本證既ニ去テ唯全軀ノ液質變性セルカ為
ニ分泌變常。皮疹。潰瘍等ノ局處證殘留スル_レア
リ是既ニ水銀ノ主_ル所ニ非ス宜ク液質復良ノ
劑ノミヲ用フヘシ鑛酸モ亦殊効アリ稀硝酸_日
錢_{一ニ}ヲ粘味ノ飲液_{北ニ}和シ用フ或ハ又一異證
ヲ現メ大ニ醫ト患者トヲ困厄セシムル_レアリ

大ニ醫ト患者トヲ困厄セシムル_レアリ

所謂汞毒病是ナリ是其用ヒシ所ノ水銀良ク刻
化セサルト患フル所ノ病毒全ク滅却セサルトヨ
リ生セル液質調和ノ變常ニメ水銀ヲ用フルト
過度ナルカ若クハ用法規ニ適ハス兼ルニ寒冷ヲ
冒シ攝生ヲ妄リニセルヨリ起ル者ナリ水銀ヲ連
用スレハ諸證却テ進惡スルヲ以テ之ヲ徵スヘ
シ治法ハ硫黄ヲ用フルニ在リ人造ト天工トヲ
擇ハス硫黄水ヲ内服シ硫黄浴ヲ兼子行テ殊効
アリ就中温泉ニ浴スルヲ峻功アリトス
變形徽毒潜伏徽毒此證ハ鑒定スルト最モ難シ

許多ノ慢性病及ヒ徽毒ト全ク反對セル諸病モ
此毒ノ潜伏ニ出ル者少カラス乃チ麻痺癱瘓依
剝昆^{ボクニ}埴^テ兒^ル泄瀉便秘水腫歇屈^ク扶^カ加等之ニ起因シ
水銀ニ非レハ治スルト能ハサル者アリ殊ニ大
都下ノ如ク徽毒專ラ行ハル、地方ニ在テハ恒
ニ茲ニ着目セシムハアラス是故ニ疑似ノ患者
ニ遇ハ、其嘗テ此病ニ感染セルト有リシカ好
細ニ查問セントヲ要ス果シテ然ル者ハ其時ヨ
リ已往諸種ノ病患更互^カ蜂起スレト毎ニ之ヲ徽
毒ニ歸セスメ今日ニ至レルトヲ見ルハ此等

ノ人ニハ水銀ヲ試用メ之ヲ確定スルモ亦宜シ
トス速ニ良候ヲ見ハシテ其病性ヲ暴露セシム
ルヲアリ是ニ於テ嚴ニ規矩ヲ守テ專ラ對當ノ
療法ヲ施スヘシ余嘗テ是類ノ患者ヲ療セシ
アリ一貴妃年紀頗ル高ク一年來肛邊ニ癢痒ト
鑽痛トヲ覺ユルヲ極メテ甚タシ然レ外面腫脹
セス亦異色アルヲナクメ百方皆功ヲ奏セス是
痔疾變形證ニ似タリト雖レ蟻鉞及ヒ諸痔疾藥
咸ク試テ寸驗ナシ漸ク查問精細ヲ盡セシニ嘗
テ十二年前黴毒ニ感染シ通常ノ治法ニ由テ不

日ニ痊エタレレ爾來或ハ這般ノ病ヲ生シ或ハ
那般ノ患ニ罹リ或ハ一時全ク健康ヲ得シ等ノ
事有リシト云レリ是ニ於テ患部ニ升汞水ヲ外用
メ之ヲ試ミシニ從前阿芙蓉等ノ鎮痛外藥一モ
功無リシ者瞬時ニ奇偉ノ輕快ヲ得タリ故ニ升
汞丸ヲ造テ漸ク服量ヲ增加シ與ヘテ日ニ三分
ハ之ニ至リシニ煩楚堪フ可ラサリシ患證全
ク平癒ノ復發セス其後皮疹ヲ發シ又腺腫ヲ起
セシト有リト雖レ是亦升汞及赤降汞ニ由テ癒
ユルヲ得タリ而其勁敵盡ク攻治シ殘孽全ク

驅散以テ戰功ヲ畢レルハ已ニ期年ノ後ニ在
リシナリ

世ニ黴毒ノ預防法ト稱メ交媾ノ前後ニ施ス所
ノ擦藥洗劑等多シト雖一モ其功ヲ奏セシ者
アルナシ

脂肪過剰アチポシス 「オ」フルマ
「チ」ゲポト 「ス」ホル 「ン」ブル

徵候 脂肪ノ製造常度ヲ過越セル者是ナリ全軀
ニ在ルアリ局處ニ在ルアリ外部ニ於テハ脂肪瘤
等ヲ發シ内部ニ於テハ殊ニ心臟腎臟網膜等ニ

堆積メ各其部ノ官能ヲ支障シ全軀ニ在テハ舉
動不利遍身困重血行遲滯諸機怠謾等ヲ致シ分
泌排泄妨ケラレテ動モスレハ皮膚ニ羅斯及ヒ
膿腫ヲ發シ竟ニ惡液病ニ移リ水腫ニ轉スル者
多シ

原由 肢體ヲ運轉勞使セスメ滋味及ヒ肉食ニ飽
キ或ハ稟賦粘液質ニメ纖維弛緩シ兼ルニ常習
ノ失血閉止月經 収止 ノ後 肥滿 等 ヨリ 來ル 然 在
此病ハ大ニ先天ノ素質ニ管スル所アルナリ故
ニ平常滋味膏粱ニ飽ケ氏削瘦セル者アリ蔬食

夫... 道... 腎...

菜羹ニ入ミ馴レテモ却テ豊肌セル者アリ

治法 補給ヲ減シテ消耗ヲ増シ養液ヲ泄除セン
一ヲ旨トス故ニ飲食ヲ省キ滋味ヲ断チ常ニ澹
泊ノ植物ヲ喫シ勉メテ軀體ノ動作ヲ強クシ腫
寐ヲ少ナフシ思慮ヲ多クシ諸分泌排泄ヲ催進シ
殊ニ發汗下利ヲ促カシ断食法ヲ行ヒ水銀療法
ヲ施シ甚シキニ至テハ伊阿胃謨ヲ用フル等ヲ
宜シトス

扶氏經驗遺訓卷之二十二終

