



24
1442
21



扶氏經驗遺訓卷之二十三

足守 緒方章 公裁

義弟郁子文

同譯

西肥 大庭志 景德 叅校

第十三編

器質變性病 「デスオルガニサチオ子ハ羅「ウエー
フセルオントアールヂン」之蘭

總論

凡。疑體ノ組織形成常態ヲ變セラルノ病 癌。瘤。癥。瘕。瘰。癧。瘰。癧。瘰。癧。

硬腫。結核。化骨。結石。諸蟲 總テ之ニ属ス其外表ニ

在ル者ハ鑒定難カラスメ多クハ外科ノ與カル所



< 91-1908 (11) >

ナリ故ニ此編ハ其内部ニ於ケル者ノミヲ主ト
メ論説ス但其鑒定治法共ニ容易ナラスメ治療
家ノ甚タ難シスル所ナリトス

古人ハ此病ヲ斥シテ一ニ内臟壅塞ト稱シ或ハ
唯結塊硬腫等ノ名ヲ命セリト雖氏輒近ノ解剖
學家精細ニ之ヲ區別メ詳ニ統類ヲ分チ大ニ名
目ヲ增多セリ然氏是唯人身究理家病學家及ヒ
外科家ニ益アルノミニメ内科治療ノ為ニハ未
タ盡セリトセス何トナレハ一ニハ區別詳ナリ
ト雖氏各自ノ徵ヲ示ス一能ハサルカ故ニ仔細

ニ鑒別スル一ヲ得スニハ種類多キノミニメ
各個ノ治法ヲ分ツ一能ハス唯普通ノ治則ニ從
事スルヨリ他ナクメ而其治スヘキ者モ亦唯普
通治則ニ由テ治スル者ナレハナリ

是故ニ内科治術ノ為ニハ唯各腔頭胸ニ於テ裏
面ニ是病ノ在ル一ヲ察スヘキノ徵ヲ舉ケ且之
ヲ檢スヘキノ法ヲ示シテ足レリトスルナリ即
チ

腹腔ニ在テハ手ヲ以テ之ヲ按メ一處若クハ數
處ニ緊張腫起硬結等ヲ覺ユル者是ナリ其疼痛

ノ有無ハ壓シテ之ヲ察スヘシ但早朝空心蓐中
ニ在ルキ之ヲ診シ而后患者ヲ立シメ或ハ前ニ
屈セシメ或ハ側ラニ傾カシメテ之ヲ探ラン
ヲ要ス然クスルキハ深ク潛蔵セル小結塊ノ如
キモ能ク之ヲ檢出スルヲ得ルナリ患者側卧
ヲ厭ヒ仰卧ヲ難ンジ或ハ全ク然カスルヲ能ハサ
ルヲアリ然ル者ハ其卧シ易キノ方ヲ以テ其病
地ヲ占ムルノ部トス然ル者ハ此例ニ非ズ或ハ又患
器ノ官能久ク障碍ヲ被リ分泌液常態ヲ違ヘル
等ヲ以テ之ヲ察シ或ハ面色灰白帶黃等ノ惡液

證ヲ見ハシ黃色ヲ呈スル者ハ肝ニ病患ノ或ハ
痔疾ノ諸患ヲ發スル等ヲ見テ以テ之ヲ徵スヘ
シ
胸腔ニ在テハ呼吸不利シ或ハ側卧シ難ク或ハ
仰卧スルヲ得ス心臟血脈ノ搏動常規ヲ紊ル
等ヲ以テ之ヲ徵スヘシ喘息及肺癆ヲ參考スヘシ
頭腔ニ在テハ頭中一處不斷疼痛ノ何等ノ藥モ
之ヲ鎮止スルヲ能ハス其痛多クハ頭首保持ノ摸
様ニ由テ増劇シ或ハ精神運管常ヲ變シ五ノ機
能支障ヲ被スリ頭旋耳聾ヲ發シ痙攣麻痺

ス等ヲ以テ之カ徴トス

原由 凡、凝體組織形成ヲ違へ或ハ新ニ異物ヲ造

為スル所以ノ近因ハ成形力(病)ノ變常ナリ其變

常四般アリ太過嫩衝血液鬱積幼稚年紀不及虛

老衰等其變態惡液病病毒轉形器性及舍密性變

常是ナリ其誘因左件ニ在リ

第一嫩衝急性慢性及血液鬱積此ヨリ起ル者殊ニ夥

シ就中諸器ノ腫脹増大硬結癒着新生異物ヲ將

来スル等榮養過度ニ屬セル變常ノ因トナル

第二形器性壓迫緊縛結枯久坐腹部ノ壓窄等是

ナリ氣血ノ循環ヲ妨ケ尿管ノ運營ヲ支ヘテ此
變常ヲ生スルナリ

第三神經感動驚愕心痛勞思等ノ感動能ク一部

ノ補給機ヲ害スル可少カラス殊ニ多腺ノ部ニ

於テ然ルヲ多シ乃、乳婦驚愕ニ由テ瞬時間ニ乳

核ヲ發スルヲ屢之アリ

第四病毒轉徙病毒局處ニ轉メ住着スレハ其部

ノ榮養支障セラレテ常規ヲ變ス熱病殊ニ間歇熱皮

疹卒ニ抑遏セラレ黴毒癩癧伊屈篤等轉徙メ此

病ヲ生スルヲ多シ是等ニ於ケル器質病ハ其本

夫大貴川 卷之二十三 四

病ノ傍證ニ屬ス

第五液質變常(血液稠厚ト為テ黑膽液性ヲ帶フ
ルキハ殊ニ腹部ノ壅塞ヲ起シ膽液非常ニ粘膠
ナレハ肝臟閉塞。膽石ヲ生スル等固ヨリ論ヲ俟
タス

凡、體內一部ニ器質病有レハ他ノ疾患及、病毒多
ハ皆茲ニ輻湊スル者ナリ是亦治術上ニ於テ知
ラサル可ラサル所トス血液鬱積。惡液病。神經病
等ノ内部諸患偶、外部ニ器質病ヲ發メ頓ニ平癒
スルヲ恰モ其病毒誘因セラレテ一處ニ輻集ス

ルカ如キヲ屢之アリ

此病ノ區別ハ其本性ニ隨テ左ノ如ク分ツヲ治
術ニ益アリトス即チ

其一壅塞輕證管内殊ニ靜脈管含有ノ液質稠凝ノ

堆積溜滯シ以テ内臟肝臟中壅閉否塞シ緊滿腫脹

シテ運營怠慢セル者はナリ

其二組織變常重證木節腫。結核腫。剝列。編。軟化。

化骨。結石等ノ類皆之ニ屬ス

其三把刺失旬寄生ノ義ナリ活體中ニ形成メ更ニ自

家ノ生活ヲ為ス者はナリ啻ニ蟲類ノミナラス

亦夫、非韃扶田。

外表或内臓ニ生スル水胞腫ニ
或裏面ニ虫ヲ含スル者ナリ

瘤、木節腫、癌腫ノ如キ全體ニ拘ラスメ自ラ一區
域ノ長育ヲ致ス者皆之ニ属ス

治法 此ニ兩個ノ要戒アリ學者常ニ之ヲ心ニ銘
メ忘却スルヲ勿ルヘシ其一ハ勉テ其病ヲ器質
變常ニ歸セサランテ要ス若シ之ニ歸スルハ
ハ其治ヲ企ツルノ志折ケテ他ノ治スヘキ因ニ
由ルヲ有ルモ詳ニ之ヲ檢索シ深ク之ヲ攻治ス
ルノ思念自ラ弛ムヲ有レハナリ其二ハ假令真
ノ器質病ナルモ直ニ之ヲ不治ニ決セスメ諸種

ノ治法ヲ試シテ要ス實驗ニ據ルニ仍其用藥
意外ニ十全ノ功ヲ收メ或ハ全治セサルモ能ク
其増進ヲ支ヘテ患者ノ命ヲ延ヘシテ少カラサ
レハナリ

凡、此病ニ於テハ外科大ニ内科ノ右ニ出ル者ト
ス何トナレハ其病外科ニ属セル者ハ其種類精
細ニ辨別スヘクメ各自相當ノ治法ヲ處スヘシ
ト雖且内科ニ属セル者ハ唯其大概ヲ知ルヘキ
ノミニメ其變常ノ本性如何ヲ辨別スルヲ難ク
レハナリ是故ニ内科ニ於テハ唯普通治法ヲ

フヨリ他ナシトス乃チ解凝藥。摩擦。運轉等ニ由
テ患部殊ニ静脈ノ官能ヲ挑起シ水銀曹達等ヲ用テ
其部ノ吸收機カラ催進シ神經ノ運營ヲ發揚ス
ヘキ諸藥ヲ與ヘ壅塞物ヲ稀釋融化スヘキ諸品
水曹達伊阿胃ヲ投シ誘導法ヲ行ヒ滋養物ヲ減
シ焮衝證ヲ退ケ徽毒性ノ者ノ如キハ殊ニ其病
患ノ本性ニ注思メ水銀劑ヲ施ス等是ナリ或ハ
又患部ノ近傍ニ潰瘍ヲ造テ其毒ヲ誘導シ其養
ヲ奪却スルヲ甚タ益アリトス初起ニ在テハ能
ク十全ノ功ヲ奏シ已ニ日ヲ經シ者モ其增長ヲ

遮キルニ足ルコトアリ然リト雖氏患部ノ異ニ隨テ
治法亦少差ナクンハアラス乃チ腹部ニ於テハ肝
脾腸間膜卵巢ノ壅塞及其組織變常ヲ殊ニ多
シトス宜ク蒲公英等ノ解凝藥。解凝塩類。オホバ
ナクスゴム詳未曹達曹達ヲ含水銀安質没扭
等ヲ撰用シ必必設刺兒灌腸法及浴法等ヲ行フベ
シ頑固證ニメ感動遲鈍ナル者ハ盧會蘆甘没扭
護及是類ノ峻下藥ヲ與ヘ依ト昆埵兒条肝臟壅
塞ニハ水銀劑ヲ内服セシメ且之ヲ塗擦スルヲ
佳トス總テ頑固ノ内臟壅塞ニハ曹達ヲ主藥ト

大正書院 卷之二十三 七

スルナリ殊ニ之ヲ「カ」ル、スバツト水鑛泉ノ名ナリ天工品
 用フレハニ造テ用フンハ其鴻益勝テ稱揚スヘ
 カラス余曾テ此病ノ重證全腹硬滿緊脹セル者
 ニ諸有力ノ解凝藥ヲ與ヘ寸功ヲ奏スルヲ能ハ
 サリシ後之ヲ處シテ十全ノ奇功ヲ収メシトア
 リ伊阿胃謨モ亦有力ノ解凝融化痰ナリト雖臣
 其功必スシモ期シ難シ動モスレハ軀體ヲ犯シテ
 害弊ヲ致ストアリ故ニ已ムトヲ得サル時ニノ
 ミ羅倂塩ヲ配シ謹慎ヲ加ヘテ用ヒントヲ要ス
 第_二百_三方_一 若夫疼痛ヲ帶ル者ハ必ス時々蟻鍼ヲ

貼セスンハアラス失鳩答等ノ解凝藥琶布ヲ外
 貼シ其軟膏ヲ塗擦スルモ亦甚タ良効アリ或ハ
 單毎日數回患部ヲ輕ク摩擦スルノミモ裨益少
 カラス其他硃砂水銀實_チ芟_ギ答_ダ里_リ斯_ス伊阿胃謨_{イアウミ}等ノ
 軟膏皆良功ヲ奏シ蓖麻油ニ格魯_ク莖_シ篤_ト丁_ト然_ト和
 スル者_第二_百五_方ハ殊ニ偉驗アリ外部ノ硬腫ニ
 一而_一又石鹼硬膏ヲ断ヘス患部ニ貼スルモ亦大
 ニ宜シトス然_レ氏_ニ胸腔殊ニ肺臟ノ器質病ハ殊ニ謹慎
 ヲ加ヘサル可ラス解凝藥ノ刺衝強ケレハ效血
 ヲ起シ_レ炊衝ヲ増シ以テ結核ノ増大及_レ化膿肺ヲ

招クノ恐レアリ結核勞瘵ヲ参考スヘシ心臟器質病ハ既ニ
喘息編ニ論說セリ頭腔ノ器質病ハ之ヲ辨別メ
相當ノ治法ヲ處スルノ最モ難シ故ニ前件ノ普
通治法ヲ行セ液質ノ變常ヲ復治シ吸収ノ機關
ヲ催進スル等ノ外他策アルノナシ殊ニ誘導法
ヲ主トシ就中腸ト皮膚ニ導カンノヲ要ス項窩
上膊ニ打膿法ヲ行セ屢瀉血ヲ施スヲ宜シトス
外部器質病ハ内部ノ病患ニ替テ生スル者少カ
ラス是等ノ證ニ於テハ外病ヲ治メテ内部ノ大
患ヲ惹出ス下猶皮疹抑遏メ病毒内攻スルカ如

ク一般ナルノアリ故ニ先液質變常ヲ復治シ内
部ノ病因ヲ除祛シ盡クシテ而後初メテ其治法
ヲ企ツヘシ尚且彼此ノ利害ヲ比照シ外病ヲ治
メテ内病ノ危殆ニ遇ハンヨリハ寧之ヲ治サル
ノ安キニ處ケンカ善ク熟思セスンハアラス是
殊ニ外科者流ノ常ニ慎戒セサル可ラサル所ナ
リ又夫把刺失旬ノ如キハ其生機ヲ滅却スルヲ
以テ本治法トスヘキ者アリ喻ハ砒石ヲ用テ癌
腫水節腫ヲ除クカ如キ是レナリ

器質變性病中殊ニ注思スヘクメ別個ノ治法ヲ

行フヘキ者ニアリ蟲病ト結石ト是ナリ左ニ之
揭示ス

蟲病「ヘルミンチアシス」
「タルムシ」
「キテ」
「蘭」
「羅」

人身ハ内外ヲ論セス蟲類ヲ生セサルノ地ナシ
内部ニ於テハ腸管ヲ以テ最トシ肝肺腎膀胱子
宮。卵巢等皆之ヲ生シ腦中眼内ニモ亦之ヲ見ル
「ア」アリ而皮表ニ生スル者モ其類少カラストス
尋常腸内ニ生スル者ハ圓蟲。蟯蟲。帶狀蟲。條蟲ト
鏈蟲ト
二種アリ毛狀蟲。是ナリ然リト雖氏諸種異形ノ蟲類

モ亦尚茲ニ生スル「ア」アリ按ニ圓蟲ハ所謂如蟲
ナリ小腸ニ生ノ多ク
レハ胃中ニモ上行スル「ア」アリ小ナル者ハ二寸
許大ナル者ハ尺餘ニ及フ蟯蟲ハ大腸ニ生ノ殊
クメ直腸ニ住ス其長僅ニ一分許ナリ小兒ニ多
ナリ小腸ヲ以テ巢窟トス條蟲ハ共ニ所謂寸白蟲
ヲ具シ頭ト頸ト大小殆トス差別ナク其體寸々節
丈五六尺ヨリ六丈許ヨリ七八分許ニ至リ其長一
メ四口ヲ具シ過キト尾ト其夕細小ニメ其體廣キ
者モ二分許ヲ過キト尾ト其夕細小ニメ其體廣キ
ニ至ル毛狀蟲ハ大腸ニ生シ殊ニ盲腸ヲ巢トス
頭細小ニメ尾端漸ク太ク形ヲ彼邦ノ鞭ノ如ク其
長一尺五分ニ過ル者ナシト云ニ

徵候 顔面灰白ニメ眼圍青輪ヲ畫シ両頬屢色ヲ
變シ唾液湧出メ早朝及空
時ニ然リ口内惡臭ヲ放チ惡

心メ食欲定リナク善ク饑テ善ク吐シ鼻竅鼻背
痒クメ時ニ噴嚏シ腹肚膜脹メ硬カラス臍ヲ廓
テ疼痛シ身體羸瘦メ瞳孔散大シ睡中驚起シ易
ク俯卧メ咬牙シ多夢ニメ嚙語シ甚シキハ夢中
行歩ヲ起シ時々衄血シテ動モスレハ瘵擊搐掣
ヲ發スル等是蟲病ノ通證ナリ若夫蟲ノ全體ヲ
下シ或ハ其碎片ヲ泄ラス者ハ固ヨリ疑フ所ナ
シ而蟯蟲ハ肛内痒クメ昏暮殊ニ甚シ或ハ小便淋瀝シ
或ハ大便窘迫努責シ或ハ痔疾ノ諸證ヲ擬シ或
ハ直腸膀胱腫等ヨリ粘液ヲ漏洩シ或ハ時ヲ定

メテ神識常調ヲ失シ悲哀哭泣スル等ヲ徴トス
圓蟲ハ夫通證ノ外屢腹痛ヲ發シ特ニ臍邊刺ノ
ルカ如キヲ徴トス條蟲ハ物有テ急ニ腹ノ左旁
ヨリ升テ頸ニ至リ而復此ヨリ下降スルカ如キ
ヲ覺エ或ハ一個ノ塊物腹ノ左旁若ハ右旁ニ在
テ波動ヲ起スヲ覺エ或ハ物ノ腹内ニ吸着スル
カ如キヲ覺エ或ハ耳聾頭旋奇痒ヲ發シ或ハ手
指足趾ニ麻痺不遂ヲ起シ或ハ燒酒若クハ亞一
口ヲ嚙下スレハ腹内ノ諸證頓ニ静止スル等ヲ
之カ徴トス

凡、蟲ハ一種異常ノ刺衝ヲ致シ、消食類化ノ機能ヲ犯ストヲ以テ全軀諸機ニ非常ノ變動ヲ起シ其變動神識ノ運營ニモ及フ故ニ種々非常ノ諸患ヲ發シ危險ノ篤證ヲ起シ殊ニ希有ノ神經證ヲ來ス_トアリ是ヲ以テ諸病其因ヲ探リ得ヘカラサル者ニ遇ヘハ小兒ニ於テ姑ク之ヲ蟲證ト看做シテ其治ヲ下スヲ法トス實驗ニ據ルニ危劇ノ諸病百方術盡テ後路ヲ此治法ニ假テ全功ヲ收メシ_ト少カラス唯是蟲證ヲ具フル者ノミナラス断テ其候ナキ者ニ於テモ試ムハシト

ス其徵外ニ見ハレヌメ其蟲内ニ潛メル者屢之有レハ十リ

原由 蟲ノ生スルト蟲病ノ起ルト自ラ別アリ

腸内ノ蟲原來體外ノ蟲属ニメ偶内ニ入テ暫ク其命ヲ保續セル者亦實ニ之有リト雖_レ其他ハ咸活體生機ノ作用ニ由テ初テ生シタル者ナリ而幼稚年紀ニ成_レ形カ盛ニメ其機殊_ニ腸胃衰弱粘液鬱滯肉食粉麩ノ過_レ飧地方ノ卑濕大氣ノ濕濡_カ之為_ニ越_ニ越_ニ密_ニ密_ニ病_{アリ}等之ヲ生スルノ因トナル

蟲病ハ蟲ヲ因トメ發スルノ病患ナリ故ニ蟲病

夫、貴、冊、卷、之、二、三、士、

内ニ在リ氏其數饒多ナラス且静息スル氏ハ其
病ナシ然レ氏元は無用ノ剩物ニメ固ヨリ病患
ノ素因トセスンバアラス動モスレハ獨能ク最
危険ノ病ヲ媒起シ或ハ其人他病ニ罹ルヲ有レ
ハ之ニ危劇ノ合併證ヲ加フ

腸蟲ノ病患ヲ起ス所以三件アリ(第一)養液ヲ奪
フニ由ル蟲ハ蓋シ體內ノ食客ナリ故ニ饒多ナ
レハ其費ヤス所多クメ榮養給ラス羸瘦虚脱ヲ
起シ終ニ枯勞ニ陥ラシム(第二)汚物ヲ生スルニ
由ル其糞穢死屍腸内ニ鬱滯スレハ粘凝腐敗ノ

汚物トナル故ニ蟲熱ハ常ニ腸胃汚物ヲ兼子體
液酷厲ヲ狭サムナリ(第三)刺衝ヲ致スニ由ル飢
饑セルニ由リ若ハ他ノ事故ニ由テ其蟲騷擾シ
或ハ感覺敏捷ノ部ニ抵觸シ或ハ熱病等ノ為ニ
腸ノ覺機亢盛スルヲ有レハ則チ刺衝ヲ起スナリ
而其刺衝ニ局處ト交感トアリ其局處刺衝ニ依
ル者ハ腹痛。痙攣。泄瀉。痢疾。吐糞病等分泌ノ
變常。運動ノ増進ヲ起シ或ハ膿瘍ヲ發メ蟲之ヨ
リ外出スル等ヲ致ス其交感刺衝ノ神經ニ依ル
者ハ諸種ノ痙攣。搐搦。霍亂。癩癩。夢中行歩。發歇

ノ麻痺狂躁精神錯亂等ヲ發シ其血脈ニ依ル者
ハ蟲熱。皮疹。痔疾。血液鬱積。粘液漏泄等ノ諸患ヲ
起スナリ

是故ニ蟲腸内ニ現在セリ必_シモ蟲病ヲ發セス
外貌健全ナルカ如クニ卒_カニ劇證ヲ起ス_ト多
シ即チ是_レハ其夥シク増息スルニ由リ或ハ其
嫌フ所ノ物ニ值フニ由リ或ハ其饑餓ノ為ニ騷
擾スルニ由リ或ハ腸内感覺敏捷ノ部ニ群集ス
ルニ由テ其刺衝過劇ト為ルニ係リ一ハ腸ノ覺
機亢盛スルニ係ルナリ 諸熱病動モスレハ蟲病
ヲ兼發スル者即チ其覺

機亢盛スル
ニ由ルナリ

治法 姑息法ト根治法トアリ

姑息法ハ唯蟲證ヲ鎮靜スルナリ是危險劇烈ノ
蟲證有テ急ニ之ヲ治ムヘキ者或ハ熱病ニ於テ
腹痛等ノ蟲證ヲ夾_ミ之ヲ退ケサレハ焮衝膿瘍
穿蝕等ヲ起スヘキ恐レアル者或ハ驅蟲法ヲ行
テ蟲之カ為ニ甚シク騷擾スル者ニ行フヘシ其
要ハ蟲ヲ靜息セシメ且_ツ之カ為ニ起ル所ノ痙攣
ヲ鎮止スルニ在リトス其兩功ヲ具スル者ハ乳
汁ナリ飲劑トシ灌腸藥トシ且蒸溺藥トメ用_ル

へシ之ニ亞ク者ハ油。油製乳劑。油ハ殺シ馬其
着ヲ支フル。亞鉛華。菲阿斯越幾斯。水銀水。第三百
方飲劑及ヒ灌。等ナリ頑固證ニハ吐劑。阿魏。續草。
賜劑トシ用フ。モ亦佳トス。條蟲ノ劇證ハ亞爾鮮丁幾一食匙ヲ
服メ駿速ノ効ヲ奏スルナリ

根治法ハ驅蟲法ト防蟲法トナリ而驅蟲ニ亦三
法アリ其一ハ先殺蟲藥ヲ用ヒテ就中搗懸施那
偉効アリト
メ諸虫ニ通之ヲ逐ヒ之ヲ疲ラシ且之ヲ殺シテ
而后下劑ヲ投シ其死蟲ヲ驅泄スルナリ其二ハ
殺蟲藥ト疎滌藥ト同時ニ配用スルナリ其三ハ

峻下藥ヲ與ヘテ腸ニ痙攣狀ノ劇動ヲ打起シ以
テ蟲ノ生死ニ管セス強テ之ヲ驅出スルナリ

凡ッ驅蟲ノ治法ハ月ノ下弦ヲトメ之ヲ行フヘシ

此時ニ於テハ蟲腸内ニ強ク牢着セサレハナリ

按ニ漢人所謂上半月蟲頭向上易治下半月蟲頭
向下難治ノ説ト全ク相反セリ共ニ實驗ニ據ル
者ニメ斯ク相反スル者ハ何ソヤ念フニ是月ノ
盈虚ニ管スル者ニメ其實ハ月末月初ノ間ニ在
ルナルヘシ姑ク疑驅蟲藥ニハ必ス常ニ解凝稀釋
ノ品中和塩海
葱蜜ノ類ヲ伍スヘシ蟲家ハ皆粘液鬱滯ヲ
兼ル者ニメ其粘液即蟲ノ巢窟トナルノミナラ
ス驅蟲藥ノ功用ヲ妨クレハナリ驅蟲法ヲ行フテ

著シク蟲ノ外洩ヲ見サルトアリ氏必シモ蟲ニ
非サリシト疑フト勿レ蟲既ニ藥ニ由テ死セ
リト雖他物ノ如ク消化セラレ常糞ト為テ通
利スルト有レハナリ

各蟲治法

（蟻）煙草煎汁ニ油海塩水銀水（第二百三十四方）ヲ加ヘ

或ハ之ニ升汞稀溶水ヲ和メ灌腸藥トシ括（括）失（失）亞

越（越）幾（幾）斯（斯）ト太（太）那（那）設（設）丟（丟）謨（謨）補（補）ノ丸藥（第二百三十五方）ヲ造テ

連用スルト一二月ニメ能ク之ヲ根治スヘシ

（圓蟲）攝絲施那ヲ最良藥トス（第二百三十六方）舐劑トシ

或ハ其末ヲ蜂蜜ニ和メ用フヘシ小兒之ヲ服ス

ルトラ嫌フ者ニハ攝絲施那糕（製法未詳）ヲ製メ月ノ

下弦十四日間毎朝空心一茶匙ツ、與フルヲ妙

トス能ク嗜テ喫スル者ナリ而最後ニ藥刺巴甘

汞ノ下劑ヲ投スヘシ其他太（太）那（那）設（設）丟（丟）謨（謨）斯（斯）必（必）竭（竭）里

亞（第二百三十九方）胡桃越幾斯亞爾鮮（第二百四十方）鷓胡菜（第二百四十一方）

盧會（第二百四十二方）鐵劑（第二百四十三方）水銀劑（第二百四十四方）菜菔根（第二百四十五方）

早朝空心等皆之ヲ撰用シ或ハ鐵屑（二百四十六方）ドリユスプ

リリ（二百四十七方）等ノ形器性刺衝物モ亦之ヲ試ム

ヘシ凡驅蟲藥ハ汎ク知ラント要ス甲ニ功有

リシ者乙ニ然ル一能ハス乙ニ驗アリ甲ニ
否ラサル者多ケレハナリ外用藥モ亦驅虫ノ功
ヲ致ス者アリ太那設舌謨油石腦油ノ擦法少腹
ス太那設舌謨葉亞爾鮮ノ蒸漏法ノ如キ是ナリ
而相當ノ攝生法モ亦兼子行ハスンハアラス總
テ難化ノ粉麩粘味ノ食物ヲ禁シ日ニ食塩少許
ヲ嘗メ時ニ葡萄酒一盞ヲ喫シ勉テ強ク肢體ヲ
運轉スル等々可ラサル所ナリ

條蟲之ヲ驅ルニ緩急ニ法アリ甲ハ徐ク疲弊セ
シメテ緩慢ニ攘除スルナリ乙ハ一舉ニ打殺メ



急劇ニ驅逐スルナリ而緩法ハ急法ニ比スルニ
的實ナリ故ニ先之ヲ試ムルヲ上計トス殊ニ稟
賦薄弱感動穎敏ノ人ニ在テハ必此法ニ從事セ
サル可ラス其法彼カ嫌フ所ノ品ヲ投メ以テ漸
ク其カラ奪ヒ以テ徐ク其死ニ就カシムルニア
リ乃₄芒消或ハ瀉利塩ヲ毎朝連用シ日ニ一二回
収斂亞的兒或ハ錫屑日ニ三四錢玫瑰昆ヲ兼服
シ且毎朝空心乳汁ヲ以テ煮タル大蒜ヲ喫スヘ
シ余カ實驗ニ據ルニ石榴根皮第二百四モ殊驗
アリ余曾テ神經虛弱ノ婦人ニ亞爾鮮丁幾阿魏

夫... 卷之三

七

阿魏

丁幾各等分調和ノ日ニ三次六十滴宛與ヘテハ
日間ニ條蟲ヲ驅リシテアリ又錫屑一匁綿馬末
二錢玫瑰昆設爾弗適宜調和メ舐劑トシ日ニ三
次一茶匙宛用ヒ服後直チニ蓖麻油一食匙ヲ服
シ且食物ヲ少クシテ鹹味強キ塩蔵品ヲ喫スル
モ大ニ妙効アリ急法ハ最モ峻劇ニメ速効アリ
ト雖正亦危殆ヲ招クノ恐レ無キト能ハス間其
藥毒ニ由テ諸種ノ後患ヲ遺シ腸胃衰弱メ生涯
其餘弊ニ困ミ其患條蟲ノ惱ヨリ甚シキ者アリ
故ニ脆弱ノ人ニハ全ク之ヲ行フテ得ズ然リ

ト雖正其蟲頑然トメ動カス癩癩等ノ險證ヲ起
シ緩柔ノ方法絶テ功ナキ者ニ於テハ其救ヲ他
ニ求ムル所ナシトス其法專ラ軍陣ニ向テ敵ヲ
攻ムルニ異ナラス先之ヲ疲弊セシメテ腸内ニ
吸着スルノカヲ弱ハメ且痙攣ヲ媒起スルノ勢
ヲ挫クヘシ寒冷ト油ト饑餓ト茲ニ功アリ其次
ハ彼カ嫌惡スル所ノ藥ヲ投メ漸ク下邊ニ驅逐
スヘシ就中綿馬新鮮ノ者ヲ佳トスヲ偉功アリトス其次
ハ右ノ處置ニ由テ若痙攣ヲ起セハ其外洩ヲ支
ヘテ惡證ヲ發スルコトアリ預之ヲ禦クヘシ阿魏

ト菲阿斯トヲ宜シトス而後峻下藥ヲ投テ強ク
其外洩ヲ促セハ乃事畢ハレリトス頑固證ニハ
撒拔實爾刺^{末ト}モ亦奇驗アリ毎朝半夕ヨリ一
夕マデ蜂蜜ニ和シ用テ實驗ニ據ルニ左法ニ從
事スレハ殊ニ宜シ其初蟲ノ有無未明確ナラサ
ル者ハ先朴屈福烏篤脂ニ苦扁桃水ヲ配メ毎日
之ヲ試用スヘシ蟲アル者ハ若干日ヲ出テスメ
必ス便中ニ蟲片ヲ交ヘ下タスナリ是ニ於テ一二
日間「ハーリング」^ク「アンシオヒス」^{共ニ}等ヲ以テ食
養トシ^{アルト}繼テ一日晚餐ニ唯稀羹汁ノミヲ喫セシ

メ臨卧ニ綿馬末一錢^{或ハ}錢ヲ取テ頓服セシムヘ
シ亞的兒製綿馬油^附三十滴ヲ丸藥ニ造リ與フ
レハ殊ニ宜シトス而翌且先冷水一盞ヲ飲マシ
メ次テ藤黃六分甘汞一分麻屈涅失亞半夕菲阿
斯越幾斯一分ノ散劑ヲ服セシメ四分時ヲ經テ
蓖麻油半夕ヲ用ヒシメ而乳汁ヲ以テ灌腸ヲ施
シ石腦油ヲ腹上ニ塗擦スヘシ斯ノ如クメ蟲仍
外洩セサル者ハ復其法ヲ行フ前件ノ如クシ
然メ後モ仍頑然トメ之ヲ下サス下利亦太甚シ
カラサル者ハ又復前法ヲ舉ケ行フ一回ナル

ヘシ其蟲若團塊ト為テ外洩スルヲ能ハス一端
ノミ直腸外ニ下垂スルヲアラハ意ヲ注テ其絶
断ヲ防キ且之ヲメ腸内ニ引却セシメサラシ
ヲ要ス宜ク謹慎メ其露出セル部ヲ小木片ニ纏
ヒ桶ニ温乳ヲ充テ、其中ニ肛門ヲ没入セシメ
以テ徐々ニ引出スヘシ蟲ノ尖端出ルヲ以テ其
全體外洩シ盡スノ徴トス

防蟲法 蟲ノ再生ヲ防クニハ專ラ腸管ヲ强健

ニスヘシ常ニ有力ノ肉類ヲ食料トシ葡萄酒ヲ
適宜ニ飲用シ勉テ強ク肢體ヲ運轉センヲ要

ス殊ニ毎朝少量ノ「ピロモン」銕泉テル水ナリ或ハ鐵
粉等ヲ連用スルヲ佳トス小兒ハ數月間下弦ニ
當テ攝蘇施那ヲ連服セシメ繼テ葯刺巴ヲ投ス
ヘシ

皮表ニ生スル陰蝨及其他ノ蟲類ニハ總テ水銀
ヲ的藥トス赤降汞軟膏ヲ擦スルハ殊ニ佳ナリ
「アチリアシス」蝨病ノ義ナリ一種ノ蝨皮表或ハ
皮中ニ生メ癢痒忍ビ難ク之カ為
ルニ疲憊メ終ニ斃ニハ外汞浴ヲ妙トス劇證ハ砒
石水ヲ施スモ可ナリ潰瘍中ニ生スル蟲類ニハ
參兒ヲ外貼メ奇効アリ

結石 リチアシス 羅「ステ
ンシキーテ蘭

結石ト化骨トハ同種ノ病ナリ 按ニ流體ニ結石
云ヒ凝體ニ化

骨ト 兩病共ニ其所ヲ擇ハスメ生スト雖モ尿管

腎。輸尿管。膀胱。尿道。 膽道 膽腑。肝臟。膽
管。肝管。總管 ヲ殊ニ多シトス其他

腸。肺。腦。唾腺。心臟。大血脈ニモ亦能ク之ヲ發スル

ナリ是尿。膽液。唾液等一種溶崩性ノ變ヲ資レル

ヨリ生シ或ハ分泌機補給機ノ變常ヨリ來ル殊

ニ老人ノ化骨ハ補給機ノ怠慢セルト土質ノ過

剩セルトヨリ起ルヲ常トス古語ニ云「汝土ナリ

將ニ土ト為ラントスト蓋老衰スレハ土質自ラ
過剩スルノ謂ナリ

尿石 腎石 ロキリス スウリナリツ

徵候 膀胱石ト腎石トアリ

膀胱石 尿意頻數努責間断ナクメ劇痛ヲ兼子溺

スルニ臨テ尿線頓ニ絶ユル者是ナリ 其諸證坐
スルハ

微ニメ立ツ 小便或ハ淋瀝シ或ハ全ク閉止シ尿

口断エス瘙痒ヲ覺エ尿中常ニ粘液ヲ交ヘ屢砂

粒小石若ハ血ヲ混シ且少腹底裏ニ壓迫重墜ヲ

覺其壓重亦坐スルハ宜ク指テ直腸若ハ腔
内ニ入テ之ヲ探リ或ハ測胞子ヲ尿道ニ挿テ之
ヲ檢スヘシ若シ其石膀胱ノ粘液膜ニ纏包セラ
ル者ハ測胞子ヲ用ルモ亦鑒定シ難キナリ
是證ハ誤リ認テ膀胱伊屈篤膀胱痔トスルハ每
ニ多シ而膀胱ニ往來性ノ痙攣或ハ焮衝ヲ起シ
其質或ハ厚肥シ或ハ硬結シ或ハ海棉様ノ贅肉
ヲ生シ或ハ釀膿ノ遷延熱ヲ發シ終ニ膀胱勞ニ
移リ消削メ死スル者アリ

腎石腎部ニ蓄留痛若ハ往來痛ヲ發シ或ハ其部

ニ壓迫重墜ヲ覺工時ニ結石疝ヲ發シ尿中屢小
石砂粒ヲ洩ラシ其石大抵赤色ナリ其患アル方ノ股ニ壓
重麻痺ヲ起シ空心ノ時ニ惡心嘔吐眩暈ヲ發ス
ル等之カ徴ナリ

結石疝即チ結石病發作ハ頓ニ急劇ノ痛苦ヲ發メ其勢

極テ甚シク其證多クハ腎部ヨリ起ルナリ其疼痛

ノ峻劇ニメ頓發スルト腎或ハ膀胱ノ部ニ兼ル發メ全腹ニ及フ

ニ嘔吐叫號ヲ以テスルト其患アル方ノ拏畢筋

畢丸腿股尿道ニ攣痛掣引等ノ交感證ヲ起スト

既往ノ結石證ト誘因トヲ稽徵メ他患ト鑒別ス

ルヲ得ヘシ其誘因ハ結石ノ刺衝増多スルニ
由リ結石位地ヲ易ヘテ輸尿管ニ出
テ或ハ膀胱ニ降ル等ニ由レ或ハ腎ノ動
機亢盛スルニ在リ而其刺衝増多ハ乘輿騎馬等
ノ過劇運動ヨリシ其動機亢盛ハ慄悍飲液利尿
藥ノ過用情意ノ感動病毒ノ轉徙或ハ軀體ヲ熱
シ寒冷ヲ冒ス等ヨリス

結石腎中ニ留在スレハ其部ニ惡ムヘキ感觸ヲ
起シ小便分泌ノ支障結石疝及腎ノ焮衝硬腫化
膿等ヲ致スナリ其石動テ輸尿管ヲ降ルニ臨テ
ハ其部ノ疼痛痙攣焮衝結石疝等ヲ發シ或ハ輸

尿管内ニ固着メ癒合スル等ノ諸患ヲ將來ス而
此病ニ死スルハ焮衝ト釀膿トニ由ルヲ常トス
原由 結石ヲ生スル所以ハ一種ノ舍密作用ナリ

而之ヲ起スヘキ機會ニ遇ヘハ體內何ノ處トメ
之ヲ結ハサルナク腦中ニモ猶之
ヲ結フナリ何ノ液トメ
之ヲ釀サルナシ鹽液モ亦之ヲ
釀スナリ液ノ滯溜成
形力ハ變常液質ノ舍密性凝聚ニ傾ケル等即チ
其機會ニ屬ス尿路ニ在テハ是舍密作用殊ニ起
リ易シトス是尿ハ其素性ヨク結石ヲ釀スヘキ
ノ元質ヲ含ミ之ヲ結フヘキノ舍密力ヲ具有ス

レハナリ夜間常ニ用フル所ノ濾器ヲ視テ之ヲ
徴知スヘシ其遠因ハ舎密作用ニ係レル者ト生
機作用ニ係レル者トアリ其舎密作用ニ係レル
者ハ腎膀胱等ニ尿ノ鬱滯瀦留メ其質分拆離解
スルニ由リ或ハ凝血粘液等其結芒ノ心核ト為
ルヘキ者有テ石質之ニ凝着スルニ由リ或ハ澁
飲酸味ノ葡萄酒等結石ヲ扶ク可キ物質ヲ含メ
ル飲食ヲ過用スルニ由ル等ナリ但麥酒ヲ嗜ム
者ハ結石ヲ患フルト少ナシ故ニ夫麥酒ヲ用ル
國ニ於テハ葡萄酒ヲ用ル地方ニ於ケルヨリモ

此病ヲ見ルト稀ナリ又世間一般夥ク茶及骨喜
利尿ノヲ用ルト始メシヨリ以來此病實ニ減
少セリ其生機作用ニ係レル者ハ腎ノ分泌機結
石ヲ生スヘキ一種ノ變態ヲ得シニ在ルナリ其
變態ニ先天ノ者ト後天ノ者トアリ後天ノ者ニ
於テハ伊屈篤ノ變形ヨリ來ルヲ特ニ多シトス
蓋シ此病ト伊屈篤トハ互ニ能ク相類似セリ唯
彼ニ在テハ關節ニ石ヲ結ビ此ニ在テハ之ヲ腎
中ニ結フヲ異トスルノミ故ニ兩患屢相交代シ
或ハ互ニ相轉徙ス又結石ト蜜尿尿崩ノ一種ト

モ亦能ク相肖タリ此ハ石ヲ結ビ彼ハ糖ヲ醸ス
ノ差アルノミニメ共ニ過多ノ酸類ヲ基トセリ
恐クハ其醸成ノ機モ亦同一軌ニメ少其趣ヲ異
ニスル者ナルヘシ

舎密術ヲ以テ尿石ヲ分析スレハ多クハ尿酸。磷酸。
安息香酸。石灰土。粘液等ヨリ成レル者ニメ其合
和ノ量ハ種々一ナラス或ハ過度ノ土質。諸模尼
亞ヲ含メルアリ或ハ過度ノ酸類ヲ胎メルアリ

治法 姑息法ト根治法トアリ

姑息法ハ其苦楚ヲ寛解スル者ニメ所謂結石疝

ノ治法ナリ先其證ノ焮衝性ト瘧攣性トヲ辨別
セシトヲ要ス焮衝證ハ諸患急劇疼痛強烈ニメ

稽留シ始瘧攣證ナリシモ後焮衝證ニ轉スル者アリ膀胱ノ部感覺過

敏ニメ之ヲ按スニ堪ヘス脈熱狀ヲ帶テ小便赤
濁熱灼ス宜ク膀胱焮衝ノ治法ヲ襲用スヘシ即
刺絡ヲ行ヒ蜚鍼ヲ貼シ亞麻仁。菲阿斯葉ノ蒸湯
法ヲ施シ油製乳劑ニ菲阿斯越幾斯ヲ加テ内服
セシメ清涼下劑ヲ與フル等ナリ瘧攣證ハ焮衝
ノ諸候闕テ瘧攣ノ諸徵具ハル者是ナリ治法ハ
油製乳劑加阿芙蓉。亞麻仁煎。或ハ石松子末ニ粘

漿ヲ加ヘテ乳劑ト為ス者等ノ有力ノ鎮瘻藥ヲ
内用シ礪砂加羯布羅揮發膏ニ阿芙蓉丁幾ヲ加
テ外敷シ油質ノ灌腸藥ニ菲阿斯或ハ阿芙蓉ヲ
加ヘテ之ヲ行ヒ鎮痛ノ毳布ヲ貼シ微温半身浴
ヲ施ス等ニアリ其疼痛久ク稽留スル者ハ毎日
阿芙蓉ヲ用ヒテ僅カニ其苦楚ヲ忍ハサル可ラサ
ルニアリ

根治法ハ其目的トスル所ニアリ其石ノ結成ヲ
遮キルト既ニ結成セルヲ融解スルト是ナリ其
結成ヲ遮キルニハ腎ノ分泌機ヲ常規ニ復メ以

テ尿質ニ一種ノ變性ヲ得セシムル所以ノ源ヲ
絶^タシテ要ス故ニ蜜尿ト其治轍ヲ一ニス然^レモ
其兩目的^{之ヲ融カスト}ヲ兼攝メ實ニ結石ノ聖藥
ト稱スヘキ者アリ曹達及諸亞兒加利塩是ナリ
余カ知ル所ノ諸藥中ニ就テ實驗ヲ經シ卓効ノ
品ハ「カル、スバツト」^{曹達ヲ含メ}ナリ天工品ヲ最
佳トスレモ氏缺ルニ遇ハ、人工品ヲ用フヘシ若
兩ナカラ缺ルモハ炭酸水ニ曹達ヲ溶カシ或ハ英
吉利ノ曹達泉^{泉鑛}ヲ代用スルモ可ナリ之ニ亞ク
者ハ釐乙典^イ堙羅^ロ屈^ク用ル^{十滴宛羹汁ニ和シ}石鹼^石石灰

水。日ニ數ハハールレム油。ローフセムテ未詳等

ナリ實驗ニ由テ之ヲ觀ルニ右ノ羅屈塩劑ハ既

ニ結成セル石モ能ク之ヲ融解シ將ニ結成セン

トスル者モ亦能ク之ヲ遮キル。昭々タリ此塩

血中ニ入テ酸ニ遇ヘハ沸騰シ尿ニ交レハ之ニ

舍密性ノ融解カヲ賦スル。實ニ體外ニ在テ為

ルカ如キ同一ノ作用ヲ致ス者ナリト知ルヘシ

余曾テ「カル、スバツ」鑛ヲ用テ尿石石ヲ尿砂林砂

ニ變セシメシ。少ナカラス其他又麻屈涅失亞

半錢宛日ニ殊ニ第二百四十三方ヲ佳ト沸騰散。スニ十八至三十八日ニ三次

用炭酸曹達水。炭酸曹達半錢ヲ「セル」水及「ツ

シングル水。ゲートルナール水。ウールンゲル水

三品共等モ亦偉功ヲ奏スル。アツ植物品モ亦

良驗ヲ為ス者ハ蕪菁。萊菔。アールドベイエシ。へ

イデベツセシ。未詳蜜等ナリ

榎楂核。セイノスバツ子。薔薇ノ類解杜松子。三味

各等分ヲ合メ一茶匙宛日ニ三次用。ヒ烏白烏爾

識葉。兼テ鎮痛功アリ。半錢宛日ニ三四次服スルモ亦奇

功アリ

舍密術ヲ用テ其洩ラス所ノ石ヲ檢査シ以テ其

酸ヲ含ムト多キカ將羅屈塩ヲ孕ムト多キカ之
ヲ鑒別ノ各自的當ノ舍密藥ヲ撰用スルトモ亦
緊要ナリトス

若夫諸藥驗無キ者ニ於テハ碎石術或ハ截石術
（兩術共）等ノ外科法ヲ行フノ外他策ナシ但甲術
（附）ハ之ヲ行フト易シト雖氏乙術ハ大ニ謹慎ヲ加
ヘントヲ要ス殊ニ腎或ハ膀胱ニ膿ヲ釀セル者
及腎石家ニハ之ヲ行フト禁ス

膽石 「カルキリス、スピリアリウ
ス、羅ガルス、ステレ、ジ、蘭」

徵候 肝部胃部ニ壓重痞悶ヲ覺エ胃瘞嘔吐ヲ兼
ル者是ナリ患者時々肝部胃部ニ極劇ノ疼痛ヲ
起シテ已甚ノ惡心嘔吐ヲ兼テ皮膚ニ黃色
ヲ發スルト二三日ニメ而後結石ヲ大便ニ下ス
ヲ常トス之ヲ膽石疝ト謂フ

原由 膽石ハ真ノ石ニ非ス華爾斯質土質ヨリ成
レル一種ノ可燃物ニメ即膽液ノ凝結セル者ナ
リ故ニ膽液ノ分泌ヲ進メ其稠厚ヲ増シ肝臟ニ
壅塞ヲ起ス者ハ皆之カ因トナル即チ稟賦膽液
質由食ノ飽食飲液ノ寡少腹部ノ緊縛久坐屈居

心痛勞思殊_レ忿怒ヲ堪_レ忍テ飲食スル等ノ如

キ夫婦和熟セサル者ニ之ニ属ス
此病多キ所以ナリ

治法 膽石_レ疝ノ治法ハ前条ノ結石_レ疝ニ同シ就中

油質藥鎮痙藥ヲ用ヒ灌腸法蒸漏法ヲ施シ_レ熨衝

性ナル者ハ刺絡ヲ行フ等ニアリ

根治法ハ結石ヲ融解シ再生ヲ防禦スルヲ旨ト

ス此病モ亦亞兒加利ヲ主藥トスルナリ乃チ曹

達_レカル、スバツト_レ天工品ノ缺ルニ遇_レハ及其他ノ

曹達劑ヲ與_レ或ハ苦味越幾斯ヲ伍シタル石鹼

丸_第二百_四方_十ヲ連服セシメ時々下劑ヲ兼用スル

ニ宜シ_レ若_レ嘔吐太甚シキ者ハ曹達ヲ沸騰散ニ製

シ用_レ十三_方或ハ炭酸曹達一錢ヲ_レセル_レ

水一盞ニ溶シ與_レ一日ノ_レ或ハ英吉利ノ曹達泉

ヲ飲マシメテ偉効アリ_レ尚且_レ的列_レ油_第二百_四方

ヲ内用シ植物品ヲ食料トシ_レ飲液ヲ多服シ_レ軀體

ヲ運轉シ兼テ内臟壅塞ノ治法ヲ行フヘシ

遠西名醫 蔡病龜鑑 青木浩齋先生譯 全部三冊

扶歌蘭度 此書ハ診察法ヲ懇諭セル者ニ扶歌蘭度君ノ著ナリ彼經驗遺訓ト同ク一生ノ實測ヲ積ミ八十歳ニ至テ初テ上梓シ經驗遺訓ノ卷頭ニ附シ一帙ト做メ世ニ同行セシム其論ノ精詳明確實ニ診察ノ龜鑑醫人ノ寶玉ト謂ツベシ占來脈論診察論アリトイヘ庶豈コノ書ノ確切ナルニ如シヤ

泰西名醫彙講 箕作阮甫先生纂述 既刻八冊

西洋諸國ノ諸名醫輩各々痼疾ヲ救ハント故メ日夜焦心割苦シ而之速ニ大發明ヲ致セル名方奇藥多シ故ニ亦之ヲ纂輯セル叢書少カラズ今其中ヨリ奇偉持後日用ニ最切ナル者ヲ抄譯集録ノ濟世裨益供ス医家百古無驗ノ痼疾ニ遇フキ此書ヲ探索メ其裨益ヲカラハ偉勲神績ヲイタサント必セリ

内服同功 空洞石阪先生閱 山田寛輯録 初編全一冊既刻

此書ハ外用劑ヲ以テ小兒及ヒ大患人等内服藥ヲ懇云者ニ施テ其効内服藥ト相伯仲スルノ良方ヲ輯録セル書也

西洋算籌用法略解 空洞石阪先生口授 勇逸筆記 懷中本全一冊

附算籌合刻篋入

窮理格致問答箕作先生校正 初編二冊既刻 二編上二冊并圖一帖既刻 二編中二冊近刻 二編下近刻

原書ハ之クシテ且ソ價貴シ儼奇書珍本アリト雖モ容易ニ机上ニ置キガタシ此ヲ以テ先生為ニ此書ヲ翻刻セシメ生徒ヲ以テ學ビヤ又カラシム此書ヤ窮理ノ入學ニシテ自問自答ニ説キ其上圖ヲ描キ丁寧又覆メカ又處ナシ實ニ儒門ノ大學ト謂フベシ殊ニ文法モ正シケレバ和蘭文典ト共ニ必讀スヘキ書ハ之レニ勝セハナシ

瓦鸞麻 譯和蘭文語 大庭雪齋先生譯 初編二冊既刻 自大序至數字自代譯至附錄

和蘭文語ニ邦語ヲ對譯シ又注解ヲ加ヘテ明詳ナレハ苟モ初學ノ徒此書ヲ熟讀スルトキハ他書ニ對シ文理判然トシ疑惑ナカルベシ實ニ蘭學入門必讀ノ書ナリ

公氏病學淵源 兒玉順藏先生譯 病證各論部既刻 次編近刻

銃工便覽 折本全一帖

西洋ノ步兵銃騎兵銃ノ圖ヲ出シ又器具ノ分解シテ真形ヲ寫シ名稱ヲ記シ銃鍊ノ術マテラ丁寧ニ記シタレバ銃工師傅ヲ受ズモ其秘術ヲ知ルベシ又雷粉製作ノ器ヨリ分量迄ヲ記シ陣中早蟻燭ノ製小銃琢法其他細事ニ至ルテ又明詳ニ載スハ武術研窮ノ士左右ニ欠ヘカラス

翻刻
重學淺說

全一冊

此書ハ西洋人ノ發明セルヲ翻刻ス重學ハ格知日用ノコニシテ奇ニ妙ノ理ヲ
説キタルモノナリ一ニ圖ヲ出シテ理解シヤスカラシム夫ハ川ヲホリ山ヲウカチ家ヲツク
リ城ヲキツク等重學ヲ解スルトキハ大石大木ヲ動スニ人カヲ勞スルコトナシ故ニ
士農工商ノ各チ十ク一讀シテ其益少ナカラズ



安政四年丁巳初秋

三都書賈

- 京二条通柳馬場 若小屋 茂 助
- 江戸日本橋通壹町目 須原屋 茂兵衛
- 同二町目 山城屋 佐兵衛
- 同芝神明前 岡田屋 嘉七
- 同淺草茅町二丁目 須原屋 伊八
- 大坂心齋橋通北久宝寺町 秋田屋 治助
- 同安堂寺町其ノ入 秋田屋 善助
- 同安堂寺町南ノ入 秋田屋 太右衛門

