



扶氏經驗遺訓

二五

ヤ 4
1448
23



144
1448
23



扶氏經驗遺訓卷之二十五

足守

緒方章公裁

義弟郁子文

同譯

西肥

大庭志景德 參校

第十五編

小兒病「シ」キン「レ」テ「ン」デ「ル」ト「蘭」

總論

世上ノ病者ニ就テ之ヲ算スルニ小兒其三分之
二ニ居ル而其治術モ全ク大人ト別個ニメ實ニ
自家ノ一科ヲナセリ故ニ之ヲ研究スルニ



491-1908(53)

ノ為ニ極テ緊要ナリトス巧ニ能ク大人ノ病ヲ
療スル凡小兒ニハ甚々拙ナキ者アリ是其處法
唯藥量ヲ減メノ足ル者ニ非ス其病機モ法術
モ全ク大人ト異ナル者アレハナリ
小兒固有ノ諸件

第一時ノ刻ニ生成化育ノ毫モ定住スル常態
ヲ有セス殊ニ生レテ暮年ニ至ルノ際ハ半母體
ノ外ニ在テ半母體ノ内ニ在ルカ如ク仍未全ク
母氏ノ生殖機ヲ離ルニ至ラス其初大氣界ニ
生出メ而五神界ニ進ミ神識界ニ到リ新器目ニ

生メ舊器愈完備シ前景行テ後景襲代シ轉換變
革須臾モ休ム時ナキナリ是故ニ小兒ノ生活ハ
一定ノ常態ヲ得ス唯那地一定ノ常態ヲ得ルノ地ニ違ヒ
ントスルノ機撥ナルノ故ニ其景况亦宛カモ
疾病ノ如ク且吉利濟ノ模様ニ髣髴タリ醫モ亦
爾ク看做シテ之ヲ處置セスハアラス乃チ他
ニ在テハ疾病吉利濟ノ發證タルヘキ者此ニ在
テハ生成化育ノ機撥トナルナリ

第二從前他ニ憑依シタル生活即今轉メ自立ノ
生活トナル其轉換實ニ大跨ノ一步ナリト雖

未之竟也 卷之二十一 二 道通

生レテ半歳乃至一歳間、宛モ母體ノ一隅、如ク其懐ニ居テ生氣ヲ引キ榮養ヲ受ケ以テ其轉換ノ漸徐ナルヲ得ルナリ造物主ノ靈智豈驚歎セサルヘケンヤ故ニ此漸徐ノ轉換乳養ヲ云ハ自然ノ常道ニ出ル者ニメ將來ノ健全ヲ得ルヲ全ク此一事ニ係レリトス若之ヲ虧クナル者ハ自然ニ背ケルノ最大事ナリ何物カ能ク之ヲ償フヲ得ン

第三大人ニ比スレハ運營甚タ疾速ニメ血液ノ運行物質ノ消耗補給皆緩徐ヲ得ス故ニ病患ニ

當テ衰敗スルヲモ危險ニ陷ルヲモ俄頃ニメ吉利濟ヲ得ルヲモ回復ニ至ルヲモ亦輕捷ナリ是ヲ以テ小兒ハ常ニ睡寐ニ由テ靜息セシメンヲ要ス其齡愈幼ナル者ハ愈然リトス

第四動機覺機過盛ニメ血管ノ生機ト補給機トハ其偏勝殊ニ甚シ故ニ神經諸患、痙攣、痲痺ヲ起シ易シ

第五榮養補給ノ運營偏勝メ其機長育發生ニ專ラナリ故ニ消食機類化機腺、水脈ノ運營殊ニ要路ニ當テ亦疾患ニ罹リ易シ

第六各器ノ長育大小不齊ニメ平均ナラス故ニ
血液及ヒ諸液ノ分賦平等ナルヲ能ハスメ腦髓
肝臟腸胃等殊ニ疾患ヲ生シ易シ

第七體機發動ノ期殊ニ大切ナリ此期ニ當テハ
能ク病患發動シ真ノ病ニ非
サル者多シ亦能ク病患除去ス
就中生齒ノ期成長ノ期七ニ於テ然リトス

第八諸部ノ交感已甚ニメ強烈ナリ其胃腸ノ腦
髓ニ於ケル者ヲ殊ニ大ナリトス諸種ノ病患死
斃唯此交感ニ係ル者多シ

第九兒齡ニ三期ノ別アリ其時限自ラ察然タリ

第一期生誕ノ初ヨリ生齒ノ季スエニ至ル是發成長

育最モ盛ナル期ニメ諸器未具足セス真ニ仍ナ經

營造為ノ際ナリトス故ニ此期ニ在テハ死スル

者極メテ衆シ小兒三分之一
此期ニ斃ト雖氏亦其補給回

復ノ速ナルヲ實ニ驚異スヘキ者多シ且此期ニ

ハ生齒ノ大吉利濟有テ更ニ一層ノ新生機神識
作用

起ルナリ第二期齒牙抽出メヨリ第七歳ニ至ル

夫經營造為既ニ齊テ諸器平均ヲ得病ニ感シ死

ヲ致ス前期ニ比スレバ大ニ少ナシ然レ氏仍

急喘格魯烏布及ヒ洩乙滲漏ヲ兼ル腦嫩衝等總

テ煥衝性ノ病ニ罹リ易シ殊ニ第七歳ヲ著目ス
ヘキノ秋トス之ヲ過ル已往ハ右ノ諸病ヲ發ス
ルノ罕ナレハナリ凡小兒此期ニ死スル者大抵
六分之一ニ居ル是ニ由テ之ヲ算スレハ地上ノ
靈生其半ヲ十四歳歳ニ誤リ以内ニ喪亡ス第
三期七歳ヨリ十四歳ニ至ル兒齡中最モ健全ナ
ルノ期ニメ人生ノ死亡此時ヲ最モ少ナシトス
小兒診法
小兒ノ病ヲ診察スルハ至難ニメ其法亦全ク別
種ナリトス是其主トメ據トスヘキ言語ト才智

ト闕如シテ其患状ヲ訴ヘス其動機盛ナルヲ以
テ脈亦確徵ヲ取ルニ足ラス且其全軀諸機未一
定セサルヲ以テ其病亦一定ノ確證ヲ呈セサル
ハナリ宜ク左ノ數證ヲ據トメ各其徵ヲ取ルヘ
シ
脈動 一歳兒ハ通例一密扭篤ニ九十動ナリ故
ニ此數ニ踰レテ以テ熱病ノ徵トス
溫度 體溫増盛シ殊ニ頸額熱スルヲ以テ熱病
ノ徵トス
渴 渴ヲ飲ヲ好ミ口内熱セル者モ亦熱病ノ徵

ナリ
食欲 食欲缺_ル者ハ腸胃汚物或ハ熱病ノ徵ナ
リ
排泄 殊ニ大便ニ注意シ其多寡硬軟及ヒ色ヲ
檢シ其他嘔氣放屁嘔吐口臭舌候尿色膝理ノ燥
濕皮膚ノ發疹等ヲ察スヘシ
腹候 殊ニ胃部肝部ヲ摸索スヘシ
呼吸 欬嗽喘鳴シ及呼吸氣ノ熱セル者ハ内部焮
衝ノ徵ナリ
啼泣 是兒ノ自ラ内情ヲ訴フル所ノ者ナリ能

ク之ヲ辨察スルヲ甚タ緊要トス啼泣メ煩躁ス
ル者ハ苦惱總身ニアルノ徵ナリ啼泣メ脚ヲ腹
上ニ掣ク者ハ痛腹部ニアルノ徵ナリ啼泣メ口
邊ヲ擱ム者ハ齒牙抽出スルノ徵ナリ啼泣メ欬
スル者ハ痛胸内ニアルノ徵ナリ其他聲音ノ變
易嘶嘎吸乳嚙下ノ支障等亦注意メ查點セズ
ハアラヌ
睡寐 其多少靜不靜ヲ檢スヘシ兼ルニ搐掣驚
起ヲ以テスル者ハ總テ神經所患ノ候ナリ
治法 小兒ハ自家固有ノ諸件アルヲ前ニ論說セ

又看過スルコト勿ランコトヲ要ス
孩兒ニ在テハ殊ニ專ラ第一道ニ注意セズンハ
アラス酸液粘液飽食風氣及大便鬱積ハ小兒諸
病ノ常因ナリ故ニ麻僣涅失亞大黃苗香第二百五十六
方及灌腸法ハ諸病ニ通メ捷功アリ若シ其治ヲ
怠レハ重證ニ至ルヘキ者モ早ク之ヲ與フレハ
能ク其病ヲ未萌ニ禦クコトヲ得ヘシ就中大黃ハ
孩兒ノ一主藥ナリ唯第一道ヲ清刷スルノミナ
ラス亦能ク肝腎ノ分泌ヲ催進シ殊ニ緊要ナリトス他ノ
下藥ノ如ク衰弱ヲ起サスメ却テ保固強壯ノ能

カヲ呈ス

神經ヲ降鎮シ痙攣ヲ防禦スルニモ注意セシ
ヲ要ス麻僣涅失亞。蝟蛄石。芍藥。續草第二百五十七方及
緩和灌腸法能ク其功ヲナスニ足ル
頭部ノ血液鬱積ニモ亦断エス注意セズンハア
ラス頭顱熱灼シ顔面紅活シ嗜眠搐掣ヲ兼ル者
即是ナリ下劑ヲ用ヒ灌腸法ヲ行ヒ頑證ハ耳後
ニ蟻鍼一歳兒ハヲ貼スヘシ
減祛ノ劑ヲ處スルニハ最謹慎ヲ加ヘサル可ラ
又其初ニ在テハ繼テ脱力疲斃スルコトアリ峻劇

夫大遺用
通

ノ吐下藥ハ殊ニ然リ消石ノ如キモ孩兒ノ胃ニ
ハ仍奪カシ功過越セリトス故ニ病患ニ由テ起
ル所ノ吐瀉モ亦是意ヲ以テ之ヲ處置シ速ニ制
止センコトヲ務ムヘシ
衝動藥及諸揮發ニメ深ク器質ニ鑽透スルノ劑
モ亦皆大ニ慎重セサル可ラス動モスレハ腦ニ
危險ノ血液鬱積ヲ起シ易シ殊ニ阿芙蓉ハ生初
ノ孩兒ニ禁スヘシ俄然トメ卒中ヲ媒起スルコ
トアリ少長セル兒モ極テ危急ニ迫ルニ非レハ決
メ之ヲ用フルコト勿レ
諸藥驗ナキ
泄瀉ノ如シ是亦少量ナラ

シコトヲ要ス宜ク阿芙蓉丁幾六分滴ノ一ヲ用フ
ヘシ一滴ヲ砂糖一錢ニ研和即是六十分ハ之一
ニ當レリ然レ氏願クハ唯外敷藥灌腸藥ニ製メ
用フルヲ良トス凡麻酔藥ハ總テ皆禁スルヲ宜
シトス體軀ハ仍經營造為ノ際ニ當レルニ之ヲ
投スレハ其機關ヲ碍ヘテ殊ニ神經ノ器質ヲ侵
シ深ク其質中ニ浸漸ノ其弊ヲ生涯ニ及ホスノ
恐アリ
藥物ヲ皮膚ヨリ施スハ小兒ニ肝要ナリトス其
皮膚ノ神經力吸收力盛ナルカ故ニ其功ヲ誘引

九

スルニ佳ナルノミナラス此路ニ由レハ腸胃ヲ
損害スルノ患ナケレハナリ阿芙蓉ノ如キハ殊
ニ此法ニ由ルヲ良シトス
小兒ハ大人ニ比スルニ物質ノ消耗急速ナリ故
ニ斷エス資給ヲ營マントス其睡眠多クメ食ヲ
求ムルノ數ナル者ハ之カ為ナリ故ニ疾病ノ際
ト雖凡ク食ヲ斷ツト能ハス殊ニ大氣ノ養ヲ
肝要トス宜ク配意メ清淨氣ヲ引カシムヘシ
交感ノ作用ヲ注視スルノ最緊要ナリトス其神
經ノ交感小兒ニ於ケルカ如ク甚シキ者アルト

ナシ之ヲ知ルト診察ノ為ニモ治術ノ為ニモ大
ニ益アリ腦ノ劇證其因ノ胃ニ在ルカ如ク病因
ト病證ト全ク其所在ヲ異ニスルト多ク且反對
刺衝法誘導法ノ奇功ヲ奏スルト最モ多ケレハ
ナリ單個ノ緩和灌腸腹部足脚ノ緩和蒸溺等唯
之ヲ腸管皮膚ノ一部ニ行テ驚歎スヘキ奇驗ヲ
全軀ニ見ハスト少ナラス是目的ヲ以テ行フ所
ノ吐法ハ唯排泄ノ功ヲ致スノミナラス亦鎮痙
ノ良藥トナリ且胃ノ交感ヨリ起レル腦肺ノ所
患ヲ一掃スルト常ニ多シ蓋シ小兒ハ吐法ヲ行

フニ危殆ノ恐ナシトス是小兒ノ胃ハ吐易キ
ノ性ヲ有スレハナリ第二百五十八方ノ催吐啜
藥殊ニ佳ナリトス

又能ク日常呼吸ト音聲トニ注意メ夫格魯烏布

後ニ發スルヲ見ハ初起ニ早ク之ヲ撲滅セン

トヲ要ス

小兒ノ諸患ハ必シモ皆之ヲ疾病ト看做サ、ル
ヲ佳トス諸所患唯體機發動ノ所為ニ出ル者多
シ若然ル者ハ決メ之ヲ遮ル可ラス唯能ク之ヲ
導達セスシハアラス然レモ生レテ二歳ヲ踰ル

頃多液肥實ニメ多食スル者殊ニ瘰癧ノ素質ヲ
具セル者ハ先哲ノ例ニ倣フテ四週毎ニ大黃或
ハ旃那浸劑ヲ與ヘテ下ヲ取ルヲ肝要トス此類
ノ兒ハ飲食ノ消射類化宜シカラスノ排除スヘ
キノ剩物體內ニ鬱滯スルト常ニ多シ偶自然ノ
良能皮疹潰瘍等ニ由テ之ヲ分利スルトアリト
雖氏恬然トメ弃置スル片ハ諸種ノ疾病之ヨリ
萌起スルト少カラス故ニ此時ニ當テ下劑ヲ處
スレハ右等ノ諸患ヲ除クノミナラス嗽衝及腦
ノ血液鬱積ヲ防禦シ且腸蟲甚タ生シヲ驅除ス

ルノ利有テ亦能ク童蒙教育ノ一助ト為ル
リ是下劑ノ用後ハ其兒必ス柔順トナル者ナレ
ハナリ腸胃鬱積ノ大ニ神意ニ感動スル所以シ
亦以テ見ルヘシ

小兒攝生法

第一期ノ際ハ造為發成ノ機撥陸續トメ連進ス
勉テ之ヲ碍ヘサランコトヲ要ス故ニ生レテ半歲
許ニ至ル間ハ植物ノ如ク看做メ唯靜息睡眠セ
シムルヲ佳トス

諸器諸力ノ發成長育續々序ヲ逐テ平等ナラン

コトヲ要ス決メ之カ支障ヲ為スコト無カルヘク亦強
テ之ヲ助長スルコト無カルヘシ五官ノ機精神ノ用
ヲ喚起スルコト早キニ過ルハ殊ニ宜シカラス
漸々徐々外來ノ感動ニ慣レシメシコトヲ要ス亦
善ク有害ノ物件ニモ習ハシムヘシ向來必ス之
ニ冒觸セサルコトヲ得サレハナリ生初六週ヲ過
キハ朝ニ微温湯ヲ以テ全軀ヲ洗浴シ後漸ク轉
メ之ヲ冷水ニ換フヘシ神經ヲ健運シ皮膚ヲ強
固シ神經病。癩麻質。聖京偃ヲ預防スルノ良
ナリ尚且勉テ毎日開豁氣ニ觸レシムル

リトス

蓋シ大氣ト水トハ活體生氣ノ原資ナルカ故ニ
亦軀體養育ノ要品ナリ故ニ毎日總身ヲ洗ヒ一
週間ニ三次微温浴ヲ行ヒ日ニ開豁氣中ニ遊ハ
シノ居宅寢室ニモ清淨氣ヲ引カン_一ヲ要ス
清潔ニスルモ亦缺ク可ラサルノ要務ナリ清淨
ノ外氣ヲ引キ室中ノ鬱蒸氣ヲ攘ヒ時ニ洗法浴
法ヲ行ヒ屢襁褓被褥ヲ革_{タム}ヘシ
睡寐ハ初生六月ニ至ルノ際缺ク可ラサルノ一
件ナリ睡中ハ宛_カモ植物ノ如クニメ補給成形ノ

機用專ラナレハナリ決メ之ヲ打起スル_一勿レ
兒齡愈幼ナレハ愈多ク睡ラレメシ_一ヲ要ス爾
後徐ク之ヲ短フスルハ各兒ノ性ニ任_カスヘシ
食物ハ消化シ易ク類化シ易クメ滋養スヘキノ
品ヲ撰ムヘク年紀ノ異ニ應メ其體ニ佳適スヘ
キノ物ヲ與フヘシ第一期ハ所謂憑依生活ヨリ
自立生活ニ轉スルノ際ニメ仍_テ他ノ扶助ニ寄リ
他ノ生氣ヲ受タルノ時ナリ母氏若ハ乳母ノ乳
房ニ就テ吸取スルヲ最良トス若缺タルニ遇ハ
者煮乳煮水各半ヲ合メ之ヲ與フヘシ_一歳ハ

乳汁ニ勝ルノ食ナケレハナリ六週ヲ踰ル者ハ
 兼テ毎日三次稀粥ノ濃汁ニ舊焙ノ「ベスコイト」
 蒸餅ノ一粉末或ハ蕎麥粉ヲ水ニ煮テ合和シ少
 許宛與ヘ已ニ半歳ヲ過キタル虚弱兒ハ稀牛肉
 羹汁ヲ許スモ可ナリ然レ氏生齒前ハ謾ニ動物
 品ノ食餌ヲ與フヘカラス動モスレハ血液ヲ熾
 衝セシメテ熾衝病ヲ起スノ恐アリ生齒前硬固
 ノ食ヲ與フルハ固ヨリ宜シカラズ爾後七歳ニ
 至ルマテハ仍朝暮乳汁ヲ食料トシ午時ノ少
 許ノ肉食ヲ許シ消化シ易キ蔬菜胡蘿蔔 菠蔞菜

ラ研末ヒル蕃薯菽豆ノ類ヲ交ヘ喫セシムルヲ佳トス一油膩
 餅菓糖製ノ品香竄ノ物骨喜等ハ仍之ヲ禁スヘ
 シ飲料ハ水ト乳汁トヲ宜シトス酒ハ斷メ飲マ
 シム可ラス常ニ冷水ヲ飲マシムルハ生涯ノ為
 ニ無上ノ鴻益アリ胃腸ヲ强健ニメ善ク諸物ヲ
 消化セシメ善ク諸物ニ耐ヘシムルノ良品タリ
 飲酒ハ全ク之ニ反セリ刺衝過度ナルカ為ニ強
 補セスメ却テ衰弱ス來スナリ早ク之ヲ許ス可
 ラス
 早ク精神ヲ使役セシム可ラス體軀ノカラ成ン

ニシ成長ノ機ヲ專ラニセシメサル可ラサレハ
ナリ然セサレハ體カト成長ト自ラ碍ヘラレテ
神經病ノ素質ヲ生シ後終ニ痴愚ヲ来スノ原ト
ナリ總テ小兒ハ自體ノ事ニ甚シク注意セシメ
ス勞思セシメス却テ微聊ノ疾患痛苦ニハ慣テ
懸念セサル可ラシハルヲ緊要ナリトス

初生兒諸病

シイキテン、デバ、パス、ゲ
ホーレン、キン、デレ、ロ、蘭

母胎ノ暗地ヲ出テ明光ノ大氣界ニ移リ憑依生
活轉メ自立生活ト為ル真ニ非常ノ大步ナリ應

ニ是病弱ト為リ死斃スル者ノ多カルヘキニ大
抵其患害ヲ被ラス恬然トメ此大步ヲ致ス者ハ
實ニ驚異スルニ堪タリトス造物主ノ靈智豈仰
畏セサルヘケンヤ

其轉換ノ景况ヲ觀ルニ一新世界ニ移リ来テ百
千ノ新刺衝ヲ受ケ光氣、大氣、衣服、被褥、溫度ノ渝
變、五神ノ刺衝ニ冒觸シ從來憑依生活ニメ他體
ノ一隅タリシ者即今獨立ノ活體ト為テ自ラ生
ミシ飲食消化、血液製造、榮養補給、溫素發生、皆肇
テ自ラ之ヲ為シ血液運行全ク革マリ呼吸排泄

亦各新ニ起ル豈非常ノ變動ナラスヤ
 其轉換變動斯ノ如ク大ナリト雖モ其良能獨自
 ラ之ヲ平ラケ之ヲ治メテ毫モ他ノ扶助ヲ假ル
 一ヲ須ヒス故ニ凡百ノ初生兒大抵唯温保ヲ適
 宜ニメ母乳ヲ授ケ大黃舍利別ニ驅風藥ヲ加ヘ
 用ニ第ニ百五以テ黑便ヲ疎滌シ盡スノ外更ニ
 他技ヲ施ス一ヲ要セス但シ此藥ハ能ク黃疸腹痛
 及其他ノ酷厲液病危險病ヲ預防スルノ妙功ア
 一若脚ヲ腹上ニ挈テ啼泣スルハ腹痛ノ徵ナリ
 小兒散按ニ第ニ百
五十六方ヲ與ヘ加密列燕麥ノ煎汁ニ

少許ノ油ヲ加ヘテ灌腸スルヲ最良トス
 初生兒患ル所ノ諸病左ニ之ヲ列ス裡ニ就テ牙
 關緊急ト丹毒トハ大危險ノ病ニメ眼焮衝ハ生
 涯ノ失明ヲ貽ス一アリ最モ恐ルヘシトス

卒死アスヒキ
シアスヒキ

徵候 生初呼吸血行共ニ過絶メ動揺スル一ナキ
 者是ナリ大氣中ノ自立生活未始マラスメ夫憑
 依生活仍持續セル者ナル一間亦之アリ
 原由 先天ノ生力虚弱分挽ノ滯滯手術ノ暴劇ヲ

用類或ハ臍帶頸圍ニ纏絡シ或ハ粘液咽喉ニ壅塞シ或ハ母氏ノ生機ヲ断ツ臍帶縛止早キニ過キ或ハ室内ノ大氣熱ニ失シ冷ニ失スル等之カ因トナル

治法 其原由ニ準テ證候各差ヒ治法亦各同シカラス真ノ虚弱ニ因セル者ハ顔面灰白ニメ總テ生活ノ徵ナシ衝動法ニ宜シ温浴ヲ行ヒ口内及肛門ニ大氣ヲ吹キ入レ灌腸法ヲ施シ冷水或ハ葡萄酒ヲ心窩胸部ニ點滴スヘシ心腦ノ血液鬱積ニ原ケル者ハ顔面紅活メ盈脹ス是ハ分娩ノ滯滯

臍帶ノ纏絡或ハ臍帶ヲ縛止スルノ早キニ過クルヨリ来ル臍帶ヲ破テ血一二匙ヲ出シ且灌腸ヲ行フヲ良トス粘液咽喉ニ壅塞セル者ハ啼ント欲シテ啼クヲ能ハス聲嗄喘鳴ヲ兼ヌ吐法ヲ行ヒ衝動劑ヲ用フルニ宜シ總テ初生兒ノ卒死ハ動物ノ温ニ浴セシムヘシ母體ト親密ニ附貼シ能ク被覆メ抱キ温ムルヲ殊ニ良功アリトス

黄疽イクテ

黒便ノ排除ヲ怠テ肝臟清刷セス其膽液ヲ血中

ニ吸收セルヨリ起ルナリ皮膚ニ於ケル非常ノ
大氣刺衝モ亦之ヲ扶クルヲアリトス是危險ノ
病ニ非ス大抵二三日ニメ獨リ復治ス第二百五
十九方ノ大黃吸藥ヲ與フルヲ宜シトス

濕爛

エキスコリア
チオチス

股間腋下等ノ濕爛ハ初生兒ノ常患ナリ通例其
部ヲ清淨ニシ屢清水ヲ以テ洗ヒ二三日小兒散
ヲ連用スレハ乃治ス軟膏油脂ハ外敷ス可ラス
惡性ノ釀膿ヲ致シ易シ鉛類外用ハ殊ニ禁スヘ

シ内攻ノ危険ノ瘰癧ヲ起スノ恐アリ而粘著ヲ
禦クニハ石松子末ヲ撒スルヲ良トス右ノ簡易
治法若シ功ナク剥脫轉メ潰瘍トナリ愈深ク侵
蝕スル者ハ瘰癧黴毒等ノ惡液病アリト臆測シ
兒體ニアルアリ慎重ヲ加ヘテ汞劑ヲ用フハシ
始先越扶屋布斯密涅刺列ヲ與ヘ功ナケレハ華
涅滿溶汞散一日二十
分ニ麻屈涅失亞ヲ配シ用フ
ルニ宜シ頑固ノ釀膿證ハ亞鉛華軟膏ヲ最良ノ
外用藥トス或ハ肛門剥脫ノ驚口瘡狀トナリ口
内ノ驚口瘡ヲ兼發スル者アリ專ラ驚口瘡ノ治

治法 預防法ハ生初光輝ヲ避ケ配意メ屢眼ヲ洗
淨シ黑便ヲ排泄シ清淨氣ヲ引キ總テ清潔ヲ專
トスルニアリ
本治法ハ微温湯ニ乳汁ヲ和シ或ハ接骨木花ヲ
泡劑トシ嫩軟ノ海棉若ハ棉布ニ醮シテ断エス
眼ヲ蒸漏シ且洗淨シ以テ酷厲物ヲ眼間ニ聚著
セシメサルヘシ稀キ皓礬水或ハ羅獨宍篤兒ヲ
以テ同法ヲ行フモ亦可ナリ頑固證ハ極弱ノ升
汞水ヲ外用シ亞鉛華軟膏若クハ水銀軟膏ヲ眼
瞼ニ塗擦スヘシ内服ニハ小兒散ヲ與ヘテ下ヲ

取ルヘシ而仍治セサル者ハ之ニ甘草十二分瓜
之一ヲ加テ日ニ二次服セシメ微温浴モ亦行フ
ヘシ

丹毒 エレイシ
ペテス

徵候 生テ六週ヨリ八週ニ至ルノ際發熱ノ渴ヲ
兼子先紅斑ヲ四肢ニ生シ次テ少腹陰部ニ發シ
兼ルニ皮膚硬腫ヲ以テスル者是ナリ然レ亦
其硬腫嫩熱セズ發赤セズ身熱ヲ兼發セズメ却
テ厥冷スル者アリ或ハ咬筋下顎ニ著テ咬ム
ヲ主トシノ筋ナリ

硬腫ノ啼叫スルヲ能ハス唯幽微ノ聲ヲ發スル者アリ而後竟ニ皮膚硬結ノ宛モ枯木ノ如キヲ得ルニ至ル其經過四日七日或ハ十四日死スル者ハ寒壞疽トナルニ由リ或ハ窒息ヲ以テ其屍ヲ解觀スルニ蜂窠質内ニ帶黄ノ汚乙滲漏ノ腺水脈及肝臟腫脹セリ

原由 寒冷ノ胃觸不潔ノ污垢胃腸清刷ノ懈怠母氏ノ惡液病等ニ起因ス

治法 下藥ト灌腸トニ由テ第一道ヲ清刷シ温浴ヲ行ヒ少量ノ甘汞ヲ服セシメ豆粉ニ接骨木花

末。玫瑰花末ヲ和メ外用スルニ宜シ若シ其紅色變メ惡色トナリ痙攣證ヲ起ス者ハ續草泡劑並鉛華麝香ヲ與ヘ幾那。亞兒尼加ノ蒸漏法ヲ施スヘシ

牙關緊急 チリス、ヒス、エ、ト、テ、タ、ニ、ヒ、ロ

徵候 生初十四日以内ノ病ナリ啼叫メ乳ニ就クトスレ氏之ヲ吸フヲ能ハス嚙下困難ニ直チニ之ヲ逆出スルヲ徵トス按メ之ヲ檢スルニ咬筋硬強メ其下顎引ケ氏之ヲ開クヲ能ハス終ニ自

カラ上顎ニ緊接シ少腹膜脹メ全軀強拘シ卒中
ヲ發メ俄然トメ斃ル、ヲ常トス其經過二日ヨ
リ四日ノ間ニアリ此病大抵不治ニ属ス死者ト
活者ト五十ト一トノ如シ

原由 乳汁ノ不佳。黑便ノ鬱積。鬱蒸ノ動物氣寒冷
ノ冒觸。或ハ臍帶ノ切斷短キニ過クル等ノ局處
刺衝其因ヲ為スヲ常トス

治法 捷手吐劑ヲ與ヘ乳ヲ改換メ微温浴ヲ施シ
亞鉛華^{ハヤク}第^二百^六十^一方^方ヲ用ヒ第^二百^六十二^方ノ吸藥
ヲ服セシムヘシ余自ラ此法ヲ行テ一小兒ヲ救

ヘルニアアリ第^二百^六十三^方ノ軟膏ヲ頸脊及腹
ニ塗布スルモ亦宜シ若シ諸藥驗ナキ者ハ二時
毎ニ阿芙蓉液六滴ヲ加ヘテ灌腸ヲ行ヒ芫菁軟
膏ヲ脊ト胸トニ擦スヘシ

哮喘^{アストマ}イシモハシテ

徵候 其發作尋常喘息ノ如クニメ吸氣完カラス
短促メ響音ヲ為シ時ニ全ク絶息シ四肢掣引メ
厥冷シ顔面發赤スル一二密^{ミツ}扭^ト篤^ト呼吸穩靜ト
為テ諸證全ク退散ス是初生第一週ヨリ二歳ニ

至ルノ際ニ發スル病患ナリ其發作多ハ早朝醒
起ノ時或ハ啼泣奮怒ノ時ニアリ窒息ニ由テ死
スル者間之アリト雖氏大抵危險ノ繼證ナク病
勢漸クニ挫ケテ緩弱トナリ終ニ自ラ消除スル
ヲ得

原由 胸腺非常ニ大ニメ硬ク或ハ其縮小スル
遲延ニメ兼ルニ胸神經ノ動機覺機甚々銳敏ナ
ルニ在リトス
胸腺ハ胸骨内面ニ位セル腺ナリ
胎兒ニ在テハ頗ル大ナレ氏後漸
ク縮小メ竟ニ
全ク消滅ス

治法 其治ハ胸腺ノ徐クニ縮小スルニ在リ故ニ

唯良能ノ作用ニ任スヘキノニ宜ク滋養少キ攝
養ヲ命シ諸踈滌ノ劑ヲ處シテ其機ヲ扶ケ且ツ
胸神經ヲ鎮靖メ痙攣ヲ制止シ以テ姑息ノ策ヲ
行フヘシ乃動物加爾基刺蝟石類類纈草第二百五少
量ノ亜鉛華ヲ與ヘ劇證ハ麝香ヲ用ヒ微温浴ヲ
行フニ宜シ

徵毒シロ匹羅

徵候 潰瘍皮膚疹等ナリ既ニ之ヲ先天ニ得テ生ル
全アリ生初若干日ヲ經テ始テ之ヲ發スルアリ

其父母ノ微毒等ヲ稽微メ之ヲ知ルコトヲ得ヘシ
 治法 汞劑ヲ用フヘシト雖其製方用量共ニ緩柔
 ナランコトヲ要ス通例小兒散ニ越質屋布斯密涅
 軒列半匁或ハ一匁ヲ加ヘテ一日ニ用ヒ浴法ヲ
 行テ足レリ頑證ハ華涅滿溶汞散或ハ甘汞ヲ與
 フヘシ若其授乳ノ母方ニ之ヲ患フル者ハ其母
 ニ水銀療法ヲ行ハスンハアラス若口内ニ微毒
 性ノ潰瘍ヲ發セル者ハ升汞四分匁之一ヲ石灰
 水三匁ニ溶化メ塗ルヲ宜シトス

下利子アルル
トシ羅

下利ハ初生兒ノ患ワルコト最モ多キ一證ナリ腹
 痛ヲ兼ルアリ否サルアリ其腹痛スルコトハ脚ヲ
 腹上ニ掣クヲ以テ徵スヘシ
 此病ハ通例危殆ナクメ却テ利益アリ謾ニ過止
 スヘカラス唯病勢過劇ナル者又ク蓄留ノ精力
 虚脱スル者或ハ俄然トメ閉止スル者ノニ危険
 トス

原由 乳兒ニ在テハ酸液ト感冒トヲ通常ノ因ト
 ス微長セル者ニ於テハ生齒ノ刺衝飽餐蛔虫等

ニ起因スルヲ常トス凡下利屢發スレハ消食機
衰弱シテ更ニ復屢發スルノ素因ヲ招クナリ若
夫腸間膜腺及腸腺ノ壅塞ヨリ來レル者ハ極メ
テ惡性ナリ

治法 病因ニ準テ各其治法ヲ異ニス

第一酸液下利大便綠色ニメ其狀細研セル煮卵

ノ如ク口ニ酸臭ヲ放ツヲ以テ之ヲ徴ス麻屈涅

失亞大黃即小兒散捷効アリ驗ナキ者ハ刺蝟石第二

十四方ヲ與ヘ腹痛劇シキ者ハ加密列泡劑ニ燕麥

煮汁ト油一食匙トヲ加ヘテ灌腸ヲ行フヘシ斯ク

メ而下利仍止サル者ハ其罪食物ニアリ其兒仍
乳ヲ哺スル者ニ於テハ乳母ヲ勸メテ動作ヲ多
クシ肉食セシメ第二百六十五方ノ湧乳散ヲ與
ヘ而仍功ナケレハ乳母ヲ換ルヲ宜シトス人エ
ノ養育ヲ受ル者ニ於テハ舊敗ノ乳汁腐壞ノ燕
麥粘汁ヲ用ル等其攝生宜シキニ適セサルヨリ
起ル者多シ能ク注意セスレハアラス

第二生齒下利齒牙抽出ノ初ニ發スル者是ナリ

其下利水ノ如キヲ常トス生齒ノ初徴ヲ替ヘテ

之ヲ知ルヘシ次ニ本條アリ其太甚カラサル者ハ善ク

頭腦ノ所患ヲ誘導メ痙攣發熱等ノ險證ヲ預防
スルヲ以テ下劑ヲ用フルノ煩ヲ省クナリ故ニ醫
治ヲ施ス₁ヲ要セス其過劇ナル者モ亦唯刺衝
ヲ寬解シ抗抵ヲ鎮靖スヘキノ₂其刺衝物ハ素
ヨリ除ク₁能ハサレハナリ少量ノ小兒散鎮痙
散_{第二百五} 蝟蝟石亞刺比亞趨謨漿沙列布漿等
ヲ用ヒ粘味ノ灌腸法ヲ行フ₁佳トス若_レ其泄瀉
尚_レ峻劇ニメ為_レニ痙攣ヲ起ス者ニ至テハ阿芙蓉
ヲ以テ遏止セス₁ハアラス然_レ氏之ヲ用フル
ニハ嚴ニ慎重ヲ加フヘシ若_レ服量ヲ過_スシ用法ヲ



誤ル_レハ急速ニ閉止メ忽チ卒中ヲ發シ死ヲ致
セハナリ其泄瀉₁原_レ來生齒刺衝ニ腦ノ血液鬱積
ヲ兼攝シタルノ作用ニ出テ毫モ衰弱ニ係ル₁
ナキ者アリ若_レ之ニ阿芙蓉ヲ投セハ卒中ヲ起ス
₁必セリ其兒多血肥實ニメ頭部熱シ顔面赤キ
者₁是ナリ宜ク先_レ耳後ニ蟻蟻二個ヲ貼スヘシ多
ハ之ニ由テ泄瀉自ラ止ムナリ然ク_レ仍_レ止_レサル
者ハ乃_レ阿芙蓉ヲ用フル_レ氏恐_レナシ_レ若_レ又毫モ血
液鬱積ノ徵ナク亦多血ナラス且_レ脆弱ニメ羸瘦
シ現今危劇ノ神經證ヲ兼發セル者ハ初ヨリ阿

夫_レ貴_レ也

通_レ道_レ齊_レ集

芙蓉ヲ用テ可ナリ然リト雖凡兩證共ニ其用量
最モ少カラントヲ貴フ少量能ク功ヲ奏スル者
ニメ且腦ヲ侵スノ害ナケレハナリ第二百六十
六方ヲ用フルヲ佳トス初先此散一服阿芙蓉液
四分滴之
一ヲ含メリ
十分ハ之一ニ當ルヲ與ヘテ其効否ヲ候フヘ
シ一服ニメ泄瀉乃止ムトアリ若繼テ更ニ泄瀉
セハ復之ヲ與フヘシ但初服後二時ヲ經テ第二
服ヲ與フルヲ良トス而効ナケレハ復之ヲ與ヘ
テ泄瀉減退スルニ至リ證ニ隨テ後服ヲ止メ或
ハ時間ヲ遠ケテ仍之ヲ與フ宜ク之ニ兼テ毎二

時漿粉ヲ灌腸藥トシ用ヒ沙列布漿米煮汁雞卵
水ヲ服セシメ腹部ニ第二百六十七方ノ軟膏ヲ
擦シ衰弱大ニメ泄瀉持續スル者ハ葛斯カス加栗刺カシ
越幾斯セキス第二百六十八方ヲ用フヘシ卓逸ノ特效藥トス
温浴モ亦偉効アリ
第三感冒下利衣服ノ輕薄夜間ノ裸體卧具ノ濕
濡等ヨリ來ル者はナリ是等ノ因ハ多ク人ノ意
トセサル所ナリ醫能ク檢查セスンハアラスフ
ラ子ルヲ以テ腹部ヲ纏包シ温煖ニ保護メ接骨
木花泡劑ヲ與ヘ漿粉ノ灌腸法ヲ行テ足レリ

夫
道
道
道

凡小兒下利遷延シ或輕因ニ遇フモ忽チ再發
スル者ハ葛斯加栗刺越幾斯ヲ連用シ加密列ノ
温浴ヲ行ヒフ子以テ腹脊ヲ温覆シ強壯
軟膏附ヲ腹脊ニ塗布シ少量ノ動物品ヲ食料ト
スルヲ通メ宜シトス差長セル者ハ槲實骨喜モ
亦良功アリ

或ハ胃軟化病名甚シキ者ハ胃膜
ヲ穿蝕スルニ至ル附泄瀉ノ因トナ
ルトアリ亦注意セスハアラス其徵下利頓ニ
發メ顔面速ニ萎衰シ羸瘦俄ニ加ハリ粘水ヲ瀉
下シ或ハ酸臭ノ物ヲ吐シ或ハ食物ヲ吐シ屢太

息メ胃部全腹膨脹シ心下ヲ按スルニ疼痛アル
トシ徵シ嗜眠メ渴甚シク脈極メテ細數ナリ蟬
鍼兩三個ヲ胃部ニ貼シ薄荷加密列ノ蒸藥ヲ心
窩ニ施シ日ニ兩次微温浴ヲ行ヒ每一時蘓魯林
水ニ水ト護謨漿ヲ和メ一匙布匙ツ、内服セシ
メ粘滑藥ノ灌腸ヲ施シ乳汁ヲ飲料トシ頭ニ冷
漏法ヲ行フ等ニ宜シ

嘔吐ハホミ
トシ

小兒ノ嘔吐ハ大率皆胃中ノ害物ヲ排除セント

スルノ良能ニ出ル者ナリ故ニ扶ケテ之ヲ催進
 スルヲ法トス脆弱ノ孩兒ハ加密列泡劑ヲ多服
 セシメ海葱密一茶匙ヲ與ヘ少長セル者ハ催吐
 嘔藥第二百五十八方一茶匙ヲ與フヘシ而兩三吐ヲ得
 ハ乃大黃單味或ハ小兒散ヲ用フルヲ佳トス能
 ク其吐逆ヲ鎮メテ残留セル汚物ヲ清刷スルノ
 良功アリ兼テ粘味ノ飲料ヲ用ヒ其吐過劇ニメ
 大便仍通セサル者ハ粘滑藥ノ灌腸ヲ施スヘシ
 然レ氏亦其因甚タ深クメ輕カラサル者アリ決
 メ忽ニス可ラス乃嘔吐ニ兼ルニ發熱ヲ以テシ

胃部膨脹メ之ヲ壓スニ疼ム者ハ蒂叫スルヲ以テ其疼ヲ知ル
 胃嘔衝ノ徵ナリ胃部ニ兩三個ノ蟻鍼ヲ貼メ粘
 味ノ飲液ヲ用ヒ兼テ緩下藥ヲ與フヘシ若シ發熱
 ノ昏睡狀ヲ呈シ且大便秘閉スル者ハ其吐腦ノ
 嘔衝ニ交感ノ發スルナリ之ヲ除クノ策ヲ處セ
 スンハアラス若シ又嘔吐遷延メ常ニ屢發スル者
 ハ慢性腦病胃軟化若クハ蛔虫ノ徵ナリ各自對
 證ノ治法ヲ行フヘシ慢性嘔吐條ヲ參考スヘシ

搐搦コクラム

小兒ノ痙攣搐搦ハ其因ニ注目スルヲ殊ニ肝要トス而其因腸胃ニ在ル者最モ多シ即チ酸液飽餐汚物蛔虫大便秘閉風氣鬱滯是ナリ疎滌劑ヲ用ヒ灌腸法ヲ施シ麻俵涅尖垂蛭蝟石等ノ制酸藥驅風藥鎮痙散第二百五十七方等ヲ與ヘ吐證アル者ハ吐劑ヲ處スヘシ極劇ノ搐搦證屢發ノ毎時卒中狀ノ昏睡ヲ兼子諸鎮痙法ヲ盡シテ寸驗ナカリシ者曾テ過食ノ患アリシヲ聽テ終末ニ吐藥ヲ與ヘ痙攣頓ニ鎮マリ昏睡全ク醒テ十全ノ回復ヲ得シテアリ

少長セル兒ニ在テハ生齒之カ因ト為テ搐搦ヲ發シ或ハ其因腦ノ血液鬱積者ハ厥衝ニ在ル者アリ顔面紅活頭顱灼熱嗜眠昏睡等ヲ以テ之ヲ徵知ス急性腦水條ト比考スヘシ一兩三個ノ蜚鍼ヲ顱顙耳後ニ貼シ下劑ヲ用ヒ灌腸ヲ行フニ宜シ若夫血液鬱積ノ候ナキ者稟賦虛弱ニメ神經性ナル者腸胃ヲ疎滌メ痙攣仍依然タル者ハ直達ノ鎮痙法ヲ處セスンハアラス動物加爾基蜚蝟石類鉅鉛華鉅鉛華纈草ヲ内服シ灌腸ヲ施シ鎮痙擦法ヲ行ヒ微温湯ニ浴スル等是ナリ過強ノ衝動藥ハ過度ノ刺

夫... 適宜劑

衝ヲ起シテ卒中ヲ來スノ恐アリ慎重セズンハ
アラス故ニ麝香阿芙蓉ハ唯急迫ノ時ニノミ用
フヘシ但阿芙蓉ハ瀉腸藥トスルニ宜シク亦少
量ナラレトヲ要ス

熱病コイル

徵候 前頭口内呼氣熱シテ渴ヲ兼子脈疾數トナ
ル之ヲ小兒熱病ノ通徵トス然レ氏小兒ノ脈ハ
甚々欺キ易シ故ニ確據ス可ラストス

治法 其因通例腸胃汚物聖京偃生齒ノ刺衝ナリ

輕證ハ唯小兒散二三服ヲ與ヘテ室内ニ保護ス
ルノ外他技ヲ要スルコトナシ然クメ治セサル片
ハ乃其種類ヲ鑒別メ之カ治法ヲ處スヘシ

其一胃熱小兒ノ熱病之ヲ最モ多シトス食欲缺

テ惡心噯氣シ口内惡臭有テ舌上汚苔ヲ被ヒ屢

嘔吐スル者は是ナリ或ハ兼ルニ腹部膨脹メ大便

常調ヲ差ヘ或ハ時ニ泄瀉シ或ハ胸内喘鳴メ煩

悶シ或ハ輕微ノ搐掣ヲ發メ睡中驚起スル等ノ

諸證アリ先催吐舍利別按ニ第百五十八方ヲ與ヘテ吐

三回ヲ得ルニ至リ大便秘閉スル者ハ先ツ次テ瀉腸メ吐法ヲ行フヘシ

灌腸ヲ施シ清涼下劑第二百六十九方ヲ與ヘ卵及肉羹汁ヲ禁スヘシ總テ小兒ノ熱病ニ食ヲ嫌フ者ハ必ス先催吐舍利別ヲ與フヘシ其熱ヲ初起ニ退治ス或ハ然ラサルモ病ヲ良善ニ向ハシメ後ニ施療ニ便宜ヲ得ルト少カラズ皮膚疹將ニ發セシトスル者モ亦用テ良功アリ

其二聖京屈熱嘔メ鼻涕眼淚ヲ流シ欬嗽メ聲音嘶啞シ孩兒ニ在テハ喘鳴粘痰ヲ咯出シ得ルヲ以テナリ者是ナリ此證モ亦始ニ催吐舍利別ヲ用フヘシ是腸胃ノ汚物ヲ掃除スルト肺ノ粘液ヲ排泄ス

ルト格魯烏布ヲ預防スルトノ三利益アリ次テ清涼發表ノ吸藥第二百七十方ヲ與ヘ燕麥煮汁ニ冰糖ヲ加ヘテ兼用シ接骨木花泡劑ヲ服セシムヘシ

其三生齒熱生齒ノ諸徵ヲ兼テ發スル熱病ナリ生齒ノ本條ヲ參考スヘシ

其四蟲熱腹痛脹滿メ之ヲ按スルニ硬カラサル等ノ蟲病ノ諸徵ヲ兼發ス治法ハ防痲藥ヲ用ヒ乳汁ヲ内服シ且灌腸藥トシ油質藥水銀水第二百三十四方甘汞等蟲病ノ姑息藥ヲ與フルニ宜シ蟲病條ヲ參考スヘシ

其五 嗽衝熱貴重ナル内臓ノ局發嗽衝ヨリ起ル
者是ナリ腦肺ノ嗽衝ニ因スル者殊ニ多シ其呼
吸短促メ喘鳴シ頻ニ歎セシトメ啼泣スル痛ア
徴者ハ肺嗽衝ノ徴トシ昏睡状ニメ時ニ搐掣ス
ル者ハ腦嗽衝ノ徴トス而腹部ノ内臓殊ニ肝臓モ亦
局發嗽衝ヲ起ス多シ之ヲ按スルニ其部起脹
メ嗽熱シ之ヲ壓セハ疼痛ノ候啼泣ヲ見ハスヲ以
テ之ヲ徴ス前段ノ吸藥按ニ第七方ニ消石半錢ヲ
加ヘ用ヒ頭胸若ハ腹部ニ兩三個ノ蜚蠊ヲ貼シ
少量ノ甘汞ヲ與ヘ灌腸ヲ施シ昏睡證持續スル

者ハ頭ニ冷漏法ヲ行フヘシ肺嗽衝證ニ於テ前
件ノ諸法功ナク喘鳴メ將ニ窒息セシトスル者
ハ催吐吸藥第二百五十八方ヲ與ヘ少量ノ金硫黄ニ沙
糖ヲ研和シ用ヒ腹部嗽衝ニハ蜚蠊防嗽藥ノ外
温乳ノ蒸漏法及微温浴法ヲ行フテ殊効アリ
小兒ノ腦嗽衝肺嗽衝ニ腸胃汚物ヨリ来レル擬
證アリ亦知ラサル可ラス曾テ一小兒數日來昏
睡状ニ陥リ防嗽諸法ヲ盡セ尺寸驗ナカリシ者
單ニ吐法ヲ行テ病忽チ全治セシ一アリ是胃中
不化ノ食物鬱滯ノ昏睡等ノ腦患ヲ起セシ者ナ

ル一昭々タリ

其六皮膚熱痘瘡麻疹猩紅斑等ノ諸熱是ナリ初起ニ於テハ之ヲ鑒別スル一甚々難シ宜ク普通ノ治法ヲ施スヘシ殊ニ腸胃ノ清刷ヲ怠ル可ラス

生齒

「デンチチオ、ヂ」
イシリ区羅

生齒ハ疾病ニ非ス自然ノ發動ナル一猶生産ノ如ク一般ナル者ナリ然リト雖氏生産モ傍来ノ因ニ由テ篤疾ヲ起シ危険ヲ致ス一アルカ如ク

生齒モ亦然ル一有テ諸病ヲ起ス一少カラス醫常ニ茲ニ著目セスンハアラス

徴候 生初第五月ヨリ第十二月或ハ第十四月ニ至ルノ際頻ニ流涎メ屢口邊ヲ搦ミ或ハ口内ニ物ヲ納テ咬ントシ口中熱メ其部ニ觸ル、ヲ嫌ヒ時ニ俄然トメ愁訴スルカ如ク啼叫メ手ヲ口邊ニ遣リ加ルニ齟肉腫起スル者之カ徴タリ尚且之ニ兼テ泄瀉殊ニ便秘發熱皮疹頭熱效嗽喘鳴短息痙攣搐掣及ヒ腦肺ノ局處焮衝等諸般ノ傍證ヲ發スル一常ニ多シ

諸證發歇往來、其齒抽出シ了、レハ脱然トメ全
ク止ムト雖、凡若恙ナク穿發スル、レハ能ハサレハ
其諸患愈増劇メ終ニ搐搦卒中若クハ窒息等ヲ發
メ乃斃ル其傍證ニ就テ最モ佳候トスヘキハ泄
瀉ナリ能ク諸患ヲ誘導メ發熱痙攣等ノ危険ヲ
防禦スルニ足レリ

其經過二期アリ第一期ハ第五月ノ頃ヲ始トス
此時ニ在テハ齒已ニ肉裏ニ萌生スレ、凡仍未々
外見セス、凡日ニ増息長大ス神經之力為ニ衝動
セラレテ抗抵増起スル、レハ津唾ノ分泌進テ流涎

スル、レハ強キヲ以テ知ルヘシ而其甚シキ者ハ
劇證ヲ起シ交感ノ諸患ヲ發ス第二期ハ齒牙已
ニ外ニ露ル、凡ノ時ナリ通例第七月ヨリ第十二
月ニ至ルノ間ニアリ始先、前齒ヲ生シ次ニ犬齒
牙即ヲ生シ齲齒ヲ生ス然レ、凡亦其時期之ヨリ早
キ者アリ甚シキハ母胎ニ在テ既ニ抽出セル者
アリ其早キニ過ルヨリハ遲キニ過ルヲ以テ佳
候トス

原由 小兒此期ニ當テハ齒牙ノ抽出スルノミナ
ラス之ニ併メ言語智慧共ニ發動ス此大轉變動

輒險證篤疾ヲ起シ殊ニ腦ノ血液鬱積ヲ来タスノ
因トナル
生齒刺衝ニ由ルノ病患。局發ト交感ト一般アリ
局發證ハ其部ノ焮衝。腫脹。疼痛。流涎。牙關緊急。或
ハ釀膿。壞疽等是ナリ。交感證ハ腸ニ於ケルヲ最
モ多シトス。泄瀉。或ハ血ヲ交。便秘。吐糞等是ナリ
而其血管ニ於ケル者ハ發熱。皮膚ニ於ケル者ハ
發疹。胸ニ於ケル者ハ歎嗽。喘鳴。粘液膜ニ於ケル
者ハ眼焮衝。耳漏。神經系ニ於ケル者ハ痙攣。腦患
等是ナリ

齒牙抽出ヲ支ヘテ之ヲ疾患トナラシムルノ因
種々アリ第一其形狀ニ由ル。喩ハハ犬齒即ノ如
キ最モ抽出シ難シ是其巔キ尖リ其根巨キヲ以
テ始。尖頭刺衝シ後續々齦肉ヲ排擴メ患苦ヲ起
スナリ第二數齒一齊ニ發生スルニ由ル其發生
發熱ノ為ニ催進セラレテ然ルヲ致ス多シ
痘瘡麻疹等之ニ由テ死スル者少カラズ第三他
病ノ合併ニ由ル第四各人ノ體質ニ由ル癩癧。英
吉利病。神經病等ノ素質有テ之ヲ支フル間之
アリ第五一般ノ流行性ニ由ル一地ノ衆兒皆之

ニ罹ルコトアリ

治法 誘因^{刺衝}ハ即將發ノ齒牙ナリ之ヲ除ク可
ラス故ニ唯血液鬱積瘰癧等ノ標證ヲ攻テ以テ
危險ヲ防禦スヘキノ誘導法ヲ以テ主トスヘ
シ殊ニ緩下藥ヲ用ヒ灌腸ヲ施スニ宜シ良能已
ニ自ラ泄瀉ヲ發ノ其機ヲ扶クルト少ナラス而
頭部ノ血液鬱積ニハ一二個ノ蟻鍼ヲ貼シ瘰癧
證ニハ亞鉛華纈草ヲ用ヒ甚シキ者ハ麝香ヲ與
ヘ微温浴及鎮瘰灌腸法ヲ行テヘシ而患部ハ為
ニハ過爾訖^レ亞根ノ類ヲ咬シメテ齧肉ヲ軟和ス

ルヲ宜シトス若薄膜齒尖ヲ掩ヘル者ハ之ヲ截
ルヘシ但之ヲ截ルハ早キニ過ク可ラス其抽出
ヲ促カサスメ却テ之カ支障ヲ致スコトアリ

皮疾^{ホイドシケ}

皮疾ハ小兒ノ常ニ多ク患ル所ナリ其因唯滋養
過度^{殊ニ動物}體液過多或ハ有害辛味ノ食料ニ
在ルコト多シ又體軀汚穢温保過度大氣ノ變敗濕
濡等ニ原ツクアリ或ハ又瘰癧ノ素質ヨリ來ル
アリ

治法 通例唯攝生ヲ革^ラタメ滋養ヲ省キ諸油膩辛
 味鹹味起熱ノ食物ヲ禁シ植物品ヲ喫セシメ清
 潔ヲ專^ラニシ數襯衣ヲ換ヘ室内ノ氣ヲ疎通シ
 微温糠浴^{詳未}ヲ行ヒ大黃ニ麻屈涅失亞ヲ加ヘ^{十即}
 散^{小兒}用ヒ兼テ三色堇菜泡劑ヲ連服セシムルノ
 外他技ヲ要セス然^クメ治セサル者ハ前劑ニ越
 扶屋布斯密涅刺列ニ三^一歲毎ニ半^クヲ加フヘ
 シ服量ハ日ニ兩三次ノ下ヲ得ルヲ度トス頑固
 證ハ越扶屋布斯ニ代^{フル}ニ普魯乙茂兒散^{甘汞金}
 三^分ハヨリニ^分ハ^テ以テシ薩撒弗刺斯泡劑^{硫黃各}
 一^テ一晝夜ニ與フヲ以テシ

百七十^方ヲ與フルニ宜シ其瘰癧毒ニ原ケル者ハ
 頭腺腫起等ヲ兼發ス宜シク瘰癧治法ヲ行フヘ
 シ頭瘡室涅亞^{頭瘡ノ一種}モ亦同法ヲ處シ頑固
 ノ頭瘡ハ乳母ヲ易ルヲ要トシ室涅亞ハ頭髮ヲ
 截除シ^{短カ}過^ル屢梳ツリ且微温石鹼水ヲ以テ
 洗滌スルヲ宜シトス
 局處ノ外用藥ハ總テ之ヲ禁スヘシ内攻ノ病毒
 轉徙ヲ貴要ノ部ニ致スノ恐レアリ大抵前件ノ
 内服藥ノミニ足レリトス^{頭瘡條ト參}
 乳兒^ニ於^テ頑固ノ皮疾ハ乳母ノ潛伏徽毒ニ

因セル者亦常ニ少カラス能ク検査セスンハア
ラス

格魯烏布羅編中義膜咽喉焮衝ト譯スル
者即チ是ナリ其名冗長ニメ

稱呼ニ便ナラス近歲其原名少ク
耳目ニ慣レタリ故ニ今之ヲ改ム

徵候 聲音嘶啞呼吸短息ノ喘鳴シ或ハ水ノ淬ス

ルカ如ク離ノ鳴クカ如キ音ヲ發シ效亦啞テ離

聲鷄聲吠聲ヲ擬シ病増進スレハ頸ヲ延ヘテ仰

テ呼吸シ肺焮衝ニ於テハ前ニ屈且發熱スル

烈シク甚シキ者ハ昏睡スルニ至ル

此病ハ早ク診辨センコトヲ要ス危險最大ニメ其

斃ル、コト極テ速ナレハナリ能ク此病ニ擬似メ

混同シ易キ病ニアリ其一ハ咽喉感冒ノ劇證是

ナリ聲音嘶啞メ效嗽吠ルカ如シト雖モ呼吸短

促セスメ離ノ鳴クカ如クナラサルヲ以テ之ヲ

鑑別ス其二ハ急喘出次是ナリ之ト混同スレハ

殊ニ危シトス急喘ハ麝香阿魏等ノ鎮痙藥ヲ要

シ格魯烏布ハ防焮藥瀉血ヲ欲ス其治法全ク相

反スレハナリ甲ハ俄然トメ發スルヲ常トスレ

氏乙ハ必先聖京僞證有テ而後ニ来リ甲ハ熱ナ

シト雖^レ凡^レハ每常發熱ノ其熱勢多^クハ劇烈ナリ
 甲ハ痙攣病ニメ發作弛張シ或ハ數時全ク休歇
 スルトアレ^レ凡^レハ間斷ナク持續メ同調ナリ乙
 ニ於テハ小便赤色ナレ^レ凡^レハ痙攣^徴甲ニ在テハ灰白
 痙攣^徴ナル等以テ之ヲ鑒別スルトヲ得ヘシ
 其經過甚タ迅速ナリ二三日ニメ終ルヲ常トス
 又キモ六日ヲ越ユルトナシ而其斃ル者ハ室
 息ヲ以テシ卒中ヲ以テシ或ハ本患既ニ退テ後
 ニ發スル所ノ腦ノ血液鬱積或ハ腦髓麻痺ヲ以
 テス

原由 近因ハ氣管粘液膜ノ痙攣ニメ速ニ凝性ノ
 列印波ヲ滲漏シ其液凝固メ膜狀剝列編狀ノ物
 ヲ造為シ以テ氣管ヲ狹窄シ或ハ真ニ之ヲ梗塞
 スルニアリ小兒七歳ニ至ル迄ノ年紀^{此年紀ノ際成力}
 最モ旺盛ス及^レ此年紀ニ於テ謾ニ酒肉類ヲ供ス
^{ル當今小兒ノ養育此惡風ニ從レリ往古ニ比スルニ此病夥シキ所以ナリ等之カ素}
 因ト為ル口ヲ開テ寒冷ノ東風或ハ北東風ニ中
 ル等ノ感冒其誘因ノ最ナル者タリ
 治法 勉テ早ク痙攣ヲ分消シ兼テ凝固セル列印
 波ト既ニ形成セル膜狀物ヲ融釋シ且^ツ排泄セシ

ムルニアリ其救療極テ駿速ナラサル可ラサル
 一他病ノ比ニアラス故ニ其本徴アル一ヲ見ハ
 早ク催吐吸藥按ニ第二百五十八方ヲ與ヘテ温蒸氣ヲ吸
 ハシムヘシ而驗ナキ者ハ咽喉ニ蟻鍼ヲ貼スヘ
 シ但一歳兒ハ多キモ三個ニ過キスニ歳兒ハ四
 個ヲ貼シ年紀ニ準フテ漸ク其數ヲ増シ一ヲ要
 ス半歳兒ニ十二個ヲ貼シ之カ為ニ死タル者ヲ
 目撃セシ一アリ慎マサル可ラス譯者云我邦ト
彼地ト蟻ノ大
小甚タ異ナリ焮衝病編ニ愚
説ヲ贅セリ就テ看ルヘシ而孩兒ハ一時毎ニ
 甘汞半匁宛差長セル兒ハ二匁迄服セシメ兼テ

吸藥按ニ第二百七
十方ナルヘシニ消石ヲ加ヘ用ヒ接骨木花
 煎ノ温蒸氣ヲ吸入セシメ酒醋一食匙ヲ灌腸藥
 ニ加ヘ施シ非常ノ偉効アリ以テ適度ノ下ヲ得
 セシメシ一ヲ要ス然クメ十二時ヲ經ル後仍輕
 快セサル者ハ是瘧癰ノ病ヲ控テ持續セシムル
 ナリ硫酸銅ニ沙糖ヲ研和シ水或ハ舍利別ヲ以
 テ與フヘシ奇功アリ其服量初ハ吐ヲ起スヲ度
 トシ用ヒ一年齡ニ隨テ
一匁至四匁次テ一時毎ニ四分匁之一
 ヲ與フルヲ良トス若室息證更ニ増發スル一ア
 二ハ復其量ヲ増加メ吐ヲ起スニ至ラシメ水銀

軟膏ヲ頸圍ニ塗擦シ芥子泥。羌菁硬膏ヲ咽喉ニ
外貼スヘシ喘鳴持續スル者モ吐劑ヲ宜シトス
能ク氣管ノ凝物ヲ排除ス。硫黄モ亦此ニ偉効ア
リ而衰弱痙攣増進スル者ハ麝香ヲ與ヘ昏睡及
腦ノ血液鬱積煩悶鬱滯セ退カサル者ハ更ニ復
蟬鍼ヲ項窩顛顛ニ貼スヘシ若右ノ諸法ヲ盡シ
テ皆驗ナキハ是既ニ腦髓麻痺ヲ來セルナリ仍
頭部ノ冷濕法。冷水注射法間、良効ヲ奏スルニア
リ
當今世間此病ヲ恐ル、ト甚シキヨリ小兒欬嗽

吠ルカ如キ響音有テ聲啞ヲ兼ル者ニ遇ハハ每
ニ之ヲ格魯烏布ノ初起ト認メ直ニ攻撃ノ方ヲ
處メ之ヲ過マルト多シ亦慎サル可ラス若斯ノ
如キ擬似證ヲ見ハ先催吐吸藥ヲ與フルヲ宜シ
トス快吐兩三次ニメ真證擬證ヲ論セス全ク之
ヲ退治セシト其經驗少カラス是ノ如キ聖京僞
狀ノ證ハ實ニ將發ノ格魯烏布タルト常ニ多ク
メ吐劑ハ早ク之ヲ未萌ニ滅却スルノ能アリ而
急喘モ亦吐劑ノ良功ヲ奏スル病ナリ故ニ此法
ハ三證ニ通メ的當スル者ナリトス

急喘アルストマ、アキキ、イ、フ、ン、チ、ト、羅

蘭ド

徵候 急頓ニ喘息證ヲ發シ其發作大抵呼吸支ヘ

ラレテ喘鳴シ或ハ雜聲ヲナシ將ニ窒息セント

メ煩悶太甚シク咳嗽犬ノ吠ユルカ如クニメ毫

モ熱ヲ兼ルナキ者是ナリ諸證摺滯スルト三

時若ハ四時ニメ全ク退キ或ハ終日快然タルト

ヲ得翌夜更ニ一層ノ劇證發作シ而復醒解スル

ト前ノ如シ通例第三發ニ至レハ窒息メ乃チ斃ル



或ハ此病摺留性ト為テ格魯烏布ト混同シ易キ
トアリ其鑒定ヲ誤ルハ甚々危シトス是彼ハ
焮衝病ニメ此ハ痙攣病ナルカ故ニ治法相及ス
レハナリ即チ急喘ニ於テハ哮喘進退シ或ハ全
ク間歇スルトアレ氏格魯烏布ニ於テハ間斷ナ
ク持續シ此ニ於テハ毫モ熱ナケレ氏彼ニ於テ
ハ焮衝熱ヲ兼發シ此ハ小便清稀ナレ氏彼ハ赤
色ナル等ヲ以テ之ヲ鑒別ス而此病ハ二歳後ハ
歳ニ至ルノ兒ヲ侵スナリ亦以テ之カ徵トスヘ

按ニ格魯烏布ハ初
生兒トホシテ患フ

原由 寒冷ノ冒觸大氣ノ冷濡。居室ノ卑濕等其常
因ナリ

治法 カヲ竭メ急速ニ痙攣ヲ除祛セスンハアラ
ス先吐劑ヲ與ヘテ次ニ阿魏ヲ内服セシメ第二
方十二亦之ヲ灌腸藥トシ多量ノ麝香ヲ用ヒ胸腹
背脊ニ鎮痙擦法ヲ行ヒ胸ニ芥子泥芫菁硬膏ヲ
貼スルニ宜シ

腦水腫「ヒドロセ」

徵候 急慢ニ證アリ急性腦水腫「ヒドロセ」
「アキユ」ハ所謂驚

風大抵皆ニ於テハ殊ニ其前徵ヲ知ルヲ緊要ナ
是ナリ

リトス頭蓋骨縫久シク哆開メ合着セス頭顱非
常ニ大ニノ軀體ト對稱セス額及頭蓋ノ前半殊

ニ太ク精神活潑ニノ智慧早ク生シ或ハ遲鈍ニ
アリ頻ニ眠ヲ嗜テ遊戲中動モスレハ睡著シ瞳

孔濶大ニメ斜視シ脚力固カラヌメ顛仆シ易ク
屢頭痛ヲ發シ寢ルニ腹及額ヲ下ニスル等是其

前徵ナリ其既ニ發セル者ハ時期ニ般アリ第一
期ハ昏睡ニ搗擗ヲ交ヘ發シ或ハ癩癩狀ノ劇シ

キ痙攣ヲ起シ嘔吐ノ頭ヲ立起スル便秘シ頭ヲ

以テ物ニ倚ラントシ居恒前或ハ傍ニ頭ヲ傾ケ
一異種ノ直視ヲナシ或ハ斜視メ眼球轉搖シ脈
甚ク不齊ニメ時ニ疾數トナリ時ニ緩柔トナル
第二期ハ之ヲ麻痺期ト名ク昏睡甚クメ打起
スレ氏醒覺スルヲ能ハス四肢孰レカ麻痺ヲ發
シ終ニ卒中ニ轉メ乃チ死ス

其初起ニ在テハ鑒定シ難キヲ有テ蟲熱生齒熱
ト混同シ易キヲアリ嘔吐ト便秘トヲ以テ之ヲ
鑒別スヘシ此ニ證ハ他ノ腦患ニ之ナキ所ノ者
タリ

其經過八日ヨリ二十一日ノ間ニアリ而一歳ヨ
リ七歳ニ至ル兒ノ最モ多ク患フル所ナリ且此
病ハ往時ニ比スルニ輒近三十年以來世間ニ甚
ク多シト云

此病本原證ト標發證トアリ標發證ハ他病ニ繼
發セル者ニメ殊ニ急性熱病内臟焮衝ヨリ轉セ
ル者多シ其屍ヲ解剖メ之ヲ觀ルニ腦髓ノ血絡
ニ血液鬱積メ洩乙液夥シク其空隙ニ滲漏セリ
原由 天稟ノ素質ニ係ル者アリ頭顱ノ巨大ト腦
髓ノ薄弱ト是ナリ而一眷族ノ兒悉ク之ニ罹ル

アリ或ハ父若ハ母ノ族ノミ之ヲ患フルアリ或
ハ一定ノ年紀ニ至レハ乃皆之ヲ發スルアリ其
他癩癰ノ素質精神努力ノ早キ思慮勞役ノ久シ
キ想像力ノ挑起酒及香竈品ノ過用齒牙ノ抽出
諸急性熱及腦焮衝等ヨリ来リ或ハ頭ノ打撲衝
突過強ノ熱蒸寒冷ノ冒觸等ヨリ起ル故ニ夏日
裸頭ニメ日光ニ暴露シ或ハ冬日驟カニ温帽ヲ
脱シ頻ニ頭髮ヲ短截スル等ノ後之ヲ發スル
常ニ多シ或ハ又癩癰疥癬頭瘡耳濕等ノ病毒腦
ニ轉徙メ之カ因ト為ル亦少ナラス小兒ノ温

帽ヲ脱シ頭髮ヲ短截スルノ近世ノ風習トナリ
シヨリ頭瘡ハ減セリト雖モ腦水ハ倍增スル
ヲ得タリ蓋是古ハ温帽ニテ酷厲ノ癩毒ヲ皮下
ニ喚ヒシ者今ハ抑壓スルニ由ルナルヘシ
治法 先腦ニ焮衝若ハ血液鬱積ノ在シ
速ク之ヲ除祛シ以テ洩乙ノ滲漏ヲ禦カン
要ス故ニ先蟻鍼ヲ耳後顛顛ニ貼シ手紀ニ應
甘黍半匁或ハ一匁ヲ每一時或ハ每一時半ニ内
服セシメ刺衝藥ノ灌腸ヲ施シ醋ヲ加シ以テ日ニ
三四行ノ下ヲ得セシムヘシ下ヲ得ル極メテ

緊要ナリ若シ甘汞單味ニ足ラザルコト見ハ
藥刺巴ヲ配用スヘシ尚且頭髮ヲ剃テ冷漏法ヲ
行ヒ或ハ氷ヲ囊ニ填テ外貼シ少量ノ實芟答里
斯ヲ與ヘ足蹠ニ芥子泥ヲ敷キ孩兒ハ芥子煎汁
ヲ以テ足脚ヲ纏絡スルニ宜シ大抵之ニ由テ全
功ヲ收ムルニ足ル其昏睡ト搗掣トノ歇ムヲ以
テ功ヲ奏セルノ徴トス然レモ昏睡仍歇マスノ
面紅ク額熱スル者ハ屢蟬鍼ヲ貼シ頭ニ冷水ヲ
灌溉スヘシ無比ノ良法ナリ其法始メ一時毎ニ
之ヲ行ヒ毎時其時刻ヲ進促シ且漸ク高ク之ヲ

灌キ以テ其兒啼泣スルニ至ラハ已ニ之ヲ知覺
スルコトヲ得タルノ徴ナリ徐ク其度ヲ減シ其數
ヲ少フスヘシ而昏睡仍頑然タル者ハ項窩ニ芫
菁硬膏ヲ貼シ實芟答里斯海葱密刺發斯煎甘消
石精等ノ利尿藥ヲ兼用スルヲ宜シトス
凡、此病一回發セシ者ハ後チ再感ノ素質ヲ貽ス
ナリ瘰癧性ノ兒ハ殊ニ然リトス之ヲ預防セシ
ニハ膊ニ打膿法ヲ施シ毎日朝暮頭ニ冷洗法或
ハ灌溉法ヲ行ヒ十四日毎ニ甘汞藥刺巴ノ下劑
ヲ投スルヲ佳トス其偉効アルコト屢實驗セリ

慢性腦水腫モ亦同一ノ治法ヲ行フヘシ唯其術
ヲ緩簡ニメ長ク連用スヘキノミ海葱醋ヲ以テ
頭ヲ蒸漏シ水銀軟膏ヲ項ニ塗擦シ或ハ項ニ打
膿法ヲ行テ強ク釀膿セシムル等ヲ殊ニ良トス
尚且癩癰疥癬等ノ遠因ヲ探テ之カ治法ヲ處セ
スンハアラス
其他腦ノ器質病多シ腦髓ノ過大非達質^{ヒダチ}埒^チ斯^ス結
核硬腫釀膿軟化等是ナリ其鑒定甚タ難クノ其
治法亦愈難シ之ヲ腦水ト區別スルハ諸證善ク
相肖似セリ^レ氏昏睡ヲ一證ナキヲ以テ之カ徵ト

ス或ハ之ヲ兼ル^ル^ルアルモ時々發歇メ持續スル
^ルナキ者ナリ治法ハ腦水ニ異ナラス此諸患亦
能ク腦水ヲ誘發スル^ルアリ腦髓軟化ハ病末ニ
至ルマテ患兒能ク歩走シ四肢虛弱ニメ記憶智
慧共ニ乏衰シ俄然トメ劇頭痛ヲ發シ或ハ卒然
トメ一時ノ痙攣ヲ起ス等ヲ以テ其徵トス其病
末大抵神經性ノ卒中ヲ以テ頻ニ其命ヲ終ル

腦外水腫 ^{ヒドロセパリス、エ}
^{キスチルニス}

腦髓ト腦膜トノ間ニ水液ノ鬱蓄セル者ニメ尋

常皆先天ノ病ニ属ス頭蓋骨縫合著セスメ却テ
漸次ニ開濶シ蓋骨愈擴張メ愈薄片トナリ全顱
増大メ縫際腫起シ張力有テ裏面ニ液ノ波動ヲ
覺ユル者是ナリ所謂解顱然レ氏體中資成ノ機
仍持續メ休ス發生長育妨ケナクメ十四歳或ハ
十八歳ニ至ルマテ能ク其命ヲ保續スル者アリ
此病治ヲ得ル₁甚タ難ク唯初年ニ於テ罕ニ之
ヲ救フ₁アルノミ水銀劑峻下藥利尿藥ヲ強ク
用ヒ或ハ潰瘍ヲ造リ或ハ頭ニ冷水ヲ灌漑シ或
ハ海葱醋ヲ以テ蒸漏シ或ハ強硬ノ粘膏ヲ貼メ

徐々ニ壓縮スル等ヲ宜シトス或ハ亦慎重ヲ加
テ時ニ鍼刺シ穿テ直ニ壓縮ノ術ヲ行ヒ以テ功
ヲ收ムル₁間之アリ

脊椎水腫モ亦同一ノ病ナリ脊骨ノ下部椎骨ノ
隙際ヨリ突出シ腫起メ張力有テ是、不治ノ病
ナリト雖₁氏慎重メ時々鍼刺シ穿テ隨テ壓縮ス
ルヲ良トス然レ氏此病ハ古來皆死亡ニ歸スル
ヲ常トス

瘡勞

アトロピ
ア、ロ、ピ、ア、
ル、ド、ル、セ、
ン、テ、リ、カ、
グ、デ、ル、イ、
ン、フ、ア、
ン、デ

蘭

徵候 腹肚膨脹ノ硬ク或ハ顯著ノ堅塊ヲ胎ミ四
 肢削瘦セル者はナリ通例食欲強クメ或ハ饜ク
 下ヲ知ラス其類リニ食メ愈削瘦スルヲ以テ往古之ヲ魔カノ所為トセリ大便
 常ニ秘閉メ時ニ溏瀉シ或ハ腹痛ヲ兼子面貌憔悴
 悴メ者老ノ如ク皺縮シ全軀ノ皮膚生氣乏シク
 メ縦弛シ黠埶越的兒皮膚病編ヲ發スル下多シ
 原由 近因ハ腸間膜腺ノ壅塞ニメ乳糜ノ製造妨
 ケラレ以テ良血ヲ釀ス下能ハサルニアリ而父
 母ノ病弱。老衰。或ハ徽毒。癩癧。或ハ母乳足ラス。或

ハ乳母健ナラス或ハ頻リニ才智ヲ鼓舞メ厚味
 粘膠多酸ノ食品ニ飽カシメ或ハ難化ノ穀粉蕃
 薯ノ類ヲ以テ哺養スル等其遠因トナリ其他蛔
 虫。汚穢。腹帶ノ緊縛。大氣ノ密閉。腐敗。濕濡。酒精藥
 阿芙蓉劑ノ誤用等亦之ヲ將來ス
 此病ハ一歳ヨリ三歳ニ至ル兒ノ患フル所ナレ
 氏癩癧病ノ一證ト為テ少長セル者ニモ亦發ス
 ル下アリ
 蓋シ此病ハ其時宜ヲ失ハス早ク其術ヲ盡セハ
 亦善ク治スヘシト雖氏若之ヲ怠ルキハ腸間膜

腺咸ク硬結ノ毫モ養液ヲ輸ルル能ハサルニ至
リ或ハ腸間膜腺ノ慢性焮衝遷延化膿ヲ起スニ
由テ終ニ死亡ニ歸ス

治法 腺ノ壅塞ヲ疎解シ滋養強壯ノ法ヲ處シ以
テ消食器及全軀ヲ健全ナラシメン
初歳ニ在テ母乳良乳ノ乏シキヨリ起レル者ハ
良乳母ヲ擇ムニ若クナシ若之ヲ得難キ片ハ
新鮮ノ野牛乳鷄卵水ヲ飲料トシ麥芽ノ微温浴
ヲ行ヒ小兒散ヲ連用メ足レリト
此年紀稍長シ
病亦頗ル進メル者ハ鷄卵水榲實骨喜其腹肚硬
滿ヲ軟化



効藥ナリヲ與ヘ麥芽浴ヲ行ヒ清潔ヲ專ラトシ
日ニ洗淨セル襦衣ヲ換ヘ極メテ緊要ナリトス
毎次琥珀或ハ他ノ拔
爾撒謨藥ヲ以テ薰ス
ハ愈佳ナリトス乾燥ノ居室ニ住マシメ開
窓氣中ニ遊ハシメ其藥ハ先麻屈涅失亞大黃ニ
甘永若クハ越扶屋布斯密涅刺列ヲ加ヘ用フヘ
シ越扶屋布斯密涅刺列ハ殺虫ノ功アルヲ以テ
殊ニ宜シトス而蒲公英越幾斯ニ幾那ヲ伍シ與
ヘ第百七
十三方亦鐵劑ヲ處スヘシ其腺ノ壅塞原來
衰弱ニ因セルヲ以テナリ就中越扶屋布斯末兒
扶斯礪鐵華極末ノ鐵屑等ヲ用ヒ或ハフツン

ケルケールナール共鑛泉ノ如キ過強ナラサル
 鐵泉ヲ服セシノ兼テ強壯解凝ノ軟膏ヲ腹部ニ
 塗擦シ以テ内服藥ノ功ヲ扶クルヲ宜シトス麥
 芽浴ハ此病ノ要藥ナリ既ニ勞熱ヲ發セル者モ
 之ヲ行フヘシ亦能ク其熱ヲ驅除ス
 腸間膜腺間慢性焮衝ヲ發スルヲアリ常ニ注視
 セスンハアラス若其候ヲ見ハ速ク之ヲ除祛シ
 以テ其化膿ヲ禦カンヲ要ス既ニ化膿セルニ
 至テハ病治ス可ラサレハナリ故ニ腹内疼痛ヲ
 發スルヲアラハ輒チ急ニ蟻鍼三四個ヲ患部ニ

貼スヘシ甚タ功アリ

跛病カヲウチカチオスホク子ア
羅コレケレイキヒンケン蘭

徵候 外来ノ所因ナクメ漸徐ニ跛行スルニ至リ

急頓ニ發スル者モ亦之アリ 平卧スル片靜居スル片ハ疼痛ナ

シト雖氏跪坐行歩舉動ニ胯關節疼痛シ之ヲ壓

テモ亦疼痛シ多少ノ時日或ハ僅ニヲ經ルニ隨

テ其足延長シ且股骨頭低下スル者是ナリ

原由 近因ハ胯關節ノ焮衝狀ヲ為セルナリ而瘰

癧毒ト痺麻質トノ轉徙最常ノ遠因トナル或ハ

顛仆等ノ外傷ヨリ起ル者モ亦之アリ

治法 初發ニ在テハ蜚鍼ヲ患部ニ貼シ毎日石鹼
温浴ヲ行ヒ朝暮水銀軟膏ヲ膝關節ニ擦シ年紀
ニ準テ甘汞一二分宛日ニ三次内服セシメ兼テ
清涼下劑ヲ與ヘテ日ニ一二行ノ澹便ヲ得セシ
ムヘシ是最上ノ良法ナリ之ニ由テ疼痛減シ足
徐ク短縮シ回復ノ候ヲ見ハサハ仍其法ヲ持長
メ他技ヲ費スル勿レ若ハ日ヲ經テ仍依然タル
者ハ芫菁硬膏ヲ膝關節ニ貼スルヲ宜シトス
右件ノ緩柔治法ハ病既ニ時日ヲ經シ者ニモ偉

功ヲ奏スルノ少カラス故ニ諸證ニ通メ必ス先
此法ヲ處センノヲ要ス而寸驗ナキニ至ラハ乃
轉メ灸灸烙鐵アクチアレ「ボテンチアレ」共ニ未詳ニ等
ノ峻劇治法ヲ行フヘシ

扶氏經驗遺訓卷之二十五 大尾

夫... 五三

增補
改正譯 鍵

廣田憲寬先生補正

全部五冊

和蘭語ト我邦語ヲ對譯セル舊本即チ譯鍵ト題セル者既ニ世ニ公敷セリ然
リトイヘ凡蘭語ヲ載スル一要約ニ過ギテ初心ニ便ナラス之ヲ注譯スル亦彼意
ヲ盡ザル一少カラス學者之ヲ感ムル久シ此ヲ以テ今又失ニ其不足ヲ増加シ
譯語ヲ改正シ且ウ々々其語類ヲ存表ノ増補改正四字ヲ冠ラシメ以テ舊本ニ別
ツト云フ實ニ此書ト簡便
ニ又備レリト謂ツベシ

病學通論

緒方洪菴先生譯述

初篇三冊 既刻
次篇兩冊 出

事物ノ病ヲ成ス所以テ理ヨリ諸ノ病因ヲ證シテ其病源ヲ究ルニ醫家コレヲ熟
讀セバ百般ノ病理判然トシ發見スル所ナクハ自ラ明決スシ凡ソ志ヲ濟生
ニ用ルモノハ日夜手ヲ
解ヘカラザルモノナリ

扶氏經驗遺訓

同 輯

全部廿五冊

扶敬蘭度ハ當時西洋諸國ニ卓絶タル名醫ニシテ著書頗ル夥シク其經
驗遺訓最モ單思醫ノ家ニ於テ最モ珍貴ナル書ニシテ原上ニ於テ撰
梓初ニ於テ彼内科書中未ダ有ル如キ確切ナルモノアラズ凡ソ濟生ニ從事
スルモノハ此ヲ讀ムルニ必ズカクベカラザルモノナリ

扶歌蘭度 察症龜鑑 青木浩齋先生譯

全部三冊

此書ハ診察法ヲ懇諭セル者ニ扶歌蘭度君ノ著ナリ彼經驗遺訓ト同ク一生ノ實測ヲ積ミ八十歳ニ至テ初テ上梓シ經驗遺訓ノ卷頭ニ附シ一帙ト故メ世ニ同行セシム其論ノ精詳明確實ニ診察ノ龜鑑醫人ノ寶玉ト謂フベシ占來脈論診察論アリトハ此書ヨリ書ク確切ナルニ如シヤ

泰西名醫彙講

其作阮甫先生彙述

既刻八冊

西洋諸國ノ諸名醫輩各々痼疾痼疾ヲ救ヘテ效ヲ日夜焦心割苦シ而シテ二大發明ヲ致セル名方奇藥多シ故ニ亦必ク彙講セル業書少カラズ今其中ヨリ奇偉特拔日用ニ最切ナル者ヲ抄譯集録シ濟世ノ裨益ニ供スル家百方無驗ノ痼疾ニ遇フキ此書ヲ採索シ其裨益ヲカラハ億萬神績ヲイタサント必セリ

内服同功

空洞石阪先生閱山田寬輯録

初篇全一冊既刻

此書ハ外用劑ヲ以テ小兒及ビ大患人等内服藥ヲ患ム者ニ施テ其効内服藥ト相伯仲スルノ良方ヲ輯録セル書也

西洋算籌用法略解

空洞石阪先生口授

男連筆記

附算籌合列筆入

懷中齋全一冊

窮理格致問答箕作先生校正

初編二冊既刻 二編上一冊并圖一帖既刻

原書ハ越クシテ且ツ價貴シ儼奇書本アリト雖モ容易ニ机上ニ置キガタシ此ヲ以テ先生為ニ此書ヲ翻刻セシメ生徒ヲシテ學ビヤスカラシム此書ヤ窮理ノ入學ニシテ自問自答ニ説キ其上圖ヲ描キ丁寧反覆ノコトス處トシ實ニ儒門ノ大學ト謂フベシ殊ニ文法モ正シケレバ和蘭文典ト共ニ必讀スヘキ書ハ之レニ勝ルハナシ

瓦鸞麻

譯和蘭文語

大庭雪齋先生譯

初編二冊既刻

和蘭文語ニ邦語ヲ對譯シ又注解ヲ加ヘテ明詳トシレハ苟モ初學ノ徒此書ヲ熟讀スルトキハ他書ニ對シ文理判然トシ疑感ナカルベシ實ニ蘭學入門必讀ノ書ナリ

公氏病學淵源

兒玉順藏先生譯

病證各論部既刻

銃工便覽

折本全一帖

西洋ノ歩兵銃騎兵銃ノ圖ヲ出シ又器具分解シテ真形ヲ寫シ其構造ノ詳ニ及ビ銃ノ術ヲテラ下學ニ記シタルハ銃工師傳ヲ受スル其秘術ヲ知ルベシ又雷銃ノ構造ノ器ヲ分量法ヲ記シ陣中早蟻燭ノ製小銃製造法其他細事ニ至ルテハ明瞭ニ載ス

