



13  
1025  
2

敏氏藥性論卷之二目次

第二 興奮藥

安謨尼亞劑

硝砂精

一丁

○獨尊地氏安謨尼亞精

○安謨尼亞加龍腦塗劑  
○石鹼加龍腦塗劑  
○石鹼加龍腦塗劑  
○流動石鹼加龍腦塗劑

硝砂加過泥子精

四丁

炭酸安謨尼亞

丁四

○炭酸安謨尼亞水

焦臭油性炭酸安謨尼亞

五丁

琥珀酸安謨尼亞水

六丁



敏氏藥性論

卷之二目次

一

二

91-2098

每五藥性註  
卷之二  
五五五五五

民垚列利精 六丁

酒精 七丁  
○設里酒  
○亞爾箇兒  
○稀酒精  
○白葡萄酒及赤葡萄酒

依的兒 丁十一  
○依的兒精  
○醋酸依的兒

甘鹽精 丁十四

甘硝石精 丁十五

龍腦 丁十五  
○龍腦精  
○龍腦酒  
○龍腦油  
○龍腦膏  
○龍腦粉  
○龍腦單方  
○龍腦露  
○龍腦水  
○龍腦舍利別

唐桂皮 丁十九  
○唐桂皮耐  
○唐桂皮油  
○唐桂皮露  
○唐桂皮水  
○唐桂皮舍利別

錫蘭桂皮 一二十

丁子 一二十

老利兒實 一二十

加耶布底油 二二十

白芷根 二二十  
○復方白芷精

小茴香 三二十

葛縷子 四二十

胡荽子 四二十

邊沈子 四二十

彬必涅刺根 四二十

角茴香 五二十

○彬必涅刺耐  
○彬必涅刺里  
○彬必涅刺根

文大藥性註  
卷之二  
目次  
二  
五五五五五

每頁藥中註  
卷之二  
目次  
三  
凡三片非片

纈草根 六丁十  
○纈草酸  
○纈草油  
○依的兒製纈草耐  
○纈草熬  
○纈草耐  
○纈草水

亞爾尼加花 八丁十  
○亞爾尼加耐  
○默里路篤硬膏

默里路篤 八丁十  
○默里路篤硬膏

土木香根 九丁十  
○默里路篤硬膏

攝兒扁太里亞根 九丁十  
○亞爾尼加耐  
○默里路篤硬膏

弊爾答刺謨根 九丁十  
○亞爾尼加耐  
○默里路篤硬膏

加密列花 丁三十  
○加密列舍利  
○淡加密列水  
○濃加密列水

羅瑪加密列花 二丁十  
○揮發性加密列油  
○加密列水  
○濃加密列水

土荊芥 二丁十  
○泊夫藍耐  
○泊夫藍舍利別

泊夫藍 二丁十  
○泊夫藍耐  
○泊夫藍舍利別

接骨花 四丁十  
○接骨子熬膏

菩提樹花 四丁十  
○接骨子熬膏

薄荷葉 五丁十  
○薄荷油  
○英吉利薄荷精  
○酒製薄荷水

○薄荷糖球  
○薄荷舍利別

兔答屈里斯巴葉 六丁十  
○兔答屈里斯巴葉

默栗薩葉 六丁十  
○迷迭香油  
○迷迭香膏  
○迷迭香精

文八藥生命  
卷之二  
目次  
三  
凡三片非片

每... 羅瑪捲埤兒 刺賢埤兒花 末沃刺那 肉豆冠華 益智 攝度亞里根 干姜 良薑 華尼刺子 芸香

羅瑪捲埤兒 七三丁十

刺賢埤兒花 八三丁十

末沃刺那 八三丁十

肉豆冠華 八三丁十 ○肉豆冠華油

益智 九三丁十

攝度亞里根 九三丁十

干姜 九三丁十

良薑 九三丁十

華尼刺子 丁四十 ○華尼刺耐 ○加糖華尼刺散

芸香 丁四十

薩毘那葉 丁四十 ○薩毘那熬 ○薩毘那軟膏

石腦油 丁四十 ○石油依的兒根

香窠醋 三四十 香窠醋酸 三四十

香窠露水 四四十 酒製瘡創水 四四十

香窠硬膏 四四十 拔爾撒母油合劑 四四十

芳香散 五四十 香窠剉藥 五四十

香窠耐 五四十 酸性香窠耐 五四十

香窠酒 六四十

玫瑰油 六四十 橙花油 六四十

附 橙花舍利別 六四十

文... 卷之二 目次 四 足... 歲及

阿魏七十四 ○阿魏耐阿魏併私的里水

瓦爾拔奴謨八十四 ○瓦爾拔奴謨加洎夫藍

護謨暗母尼亞九十四 ○護謨暗母尼亞硬膏

沒藥五十 ○沒藥熬 ○沒藥耐

河狸香一五十

麝香二五十 ○麝香耐

### 第三 緩和藥

甘扁桃八五十 ○扁桃油 ○複方扁桃乳

嬰粟子九五十

### 附麗春花九五十

亞麻仁九五十 ○亞麻仁餅 ○亞麻仁油

大麻子一六十 ○加硫亞麻油

里古卜胃母二六十

阿列襪油三六十

亞刺比亞護謨四六十 ○護謨漿 ○護謨合劑

### 附歇兒拔斯鳩母花五六十

蜀葵根六六十 ○蜀葵舍利別 ○和胸飲料

文心藥生論 卷之二 目次 五

楡樟仁 七六丁

甘草根 八六丁

○甘草 〇甘草膏 〇甘草釵  
〇甘草膏 〇甘草釵 〇甘草散

附 胡盧巴子 七丁

蘆根 七丁 〇蘆根煎

沙列布 一七丁 〇沙列布漿

加爾刺健 二七丁 〇加爾刺健膠

目次終

敏氏藥性論卷之二

獨逸

敏都氏原著

日本

足立寬譯補

第二興奮藥 (Excitantia.)

安謨尼亞劑 (Stimoniaca.)

安謨尼亞劑 = 數種アリ即之ヲ左ニ列舉ス

一 苛性安謨尼亞水 又 碓砂精 (Liquor ammonii caustici, Spiritus Salis ammoniaci caustici.) 此劑

ハ單純安謨尼亞瓦斯一分ト水十分ト相和ノ成  
ル者ナリ即チ此劑ヲ製スルニハ碓砂ト抱水石灰

トヲ合シテ之ヲ微火ニ温メ其蒸餾スル所ノ尾  
 斯ヲ冷水中ニ導キ以テ飽和セシムル者ナリ  
 〔効用〕 硃砂精ヲ外敷スルキハ皮膚ヲ刺戟シ粘  
 膜ヲ腐蝕ス又之ヲ内服スルキハ輕量ナレハ胃  
 液ノ分泌ヲ亢進シ若シ大量ナレハ劇シキ胃潰  
 衝ヲ發スルノ性アリ其多量ヲ取リテ之ヲ獸類  
 ニ與フルニ多クハ搐搦ヲ發シテ斃ル乃チ此獸  
 ノ血ヲ檢スルニ甚稀釋トナリテ其凝泣性ヲ失  
 フ者ナリ又中等ノ分量ヲ服スルキハ脈搏較增  
 多シ體温亦増加シテ氣管枝ノ粘痰ヲ疎解シ發

汗ヲ催進ス服後暫時ニシテ忽尿中ニ安謨尼亞  
 塩ヲ泌別スルヲ見ルナリ其餘此劑ノ効用ニ就  
 テハ其檢査尙未タ充分ナラス

〔主治〕 方今ハ内服ヲ廢シテ之ヲ外用ニノミ供  
 ス即一昏倒及ヒ假死等ニ於テ之ヲ顛藥トナシ  
 用ヒ二皮膚及ヒ皮下ノ虛性嫩衝例之ハ傳麻質  
 私及ヒ凍瘡等ニ於テ之ヲ外敷ス其他ハ通常他  
 ノ藥品ト伍シテ左ノ諸製劑トナシ用フ

○苛性安謨尼亞精 又獨尊地氏安謨尼亞精

*Liquor Ammonii caustici Spiritus Spiritus*



Chrom. Caus. (Sordid.) 此劑ハ酒精十分中ニ安謨  
尼亞氣一分ヲ和シテ成ル者ナリ之ヲ外用スレ  
ハ刺戟衝動ノ効ヲ奏ス

○安謨尼亞塗劑又揮發塗劑 (*Sinimentum ammo-  
niatum, sinim. volatile*) 製法ハ阿列襪油四分。硝  
砂精一分ヲ玻璃壘ニ納レ頻リニ振盪シテ能ク  
之ヲ混和セシム白色石鹼様ニシテ半流動ノ合  
劑ナリ

○安謨尼亞加龍腦塗劑 (*Sinimentum ammoniato-  
camphoratum*) 龍腦油 竜腦一分ヲ阿列襪油四分  
九分ニ溶和ノ製ス

硝砂精一分ヲ以テ製スル者ナリ

○石鹼加安謨尼亞塗劑 (*Sinimentum saponato-  
ammoniatum*) 白石鹼一分。水三十分。酒精十分及  
ヒ硝砂精十五分ヲ以テ之ヲ製ス

○石鹼加竜腦塗劑又阿列埤兒獨屈 (*Sinimentum  
saponato-camphoratum, Spodolax*) 製法ハ常用石  
鹼十六分。歌涅茶石鹼及ヒ龍腦各八分ヲ取リ微  
温ノ酒精三百二十分ニ溶解シ温ニ乘シ濾過シ  
テ其液ニ捲埤兒油一分。迷迭香油二分及ヒ硝砂  
精十六分ヲ調和シ之ヲ小キ玻璃瓶ニ移シ密封

シテ冷水ニ浸シ急ニ冷却セシム

○流動石鹼加龍腦塗劑又流動阿剌埤兒獨屈

*Perimentum saponato-campheboratum liquidum,*

*Sturiger (Spaldok.)* 歌涅茶石鹼三十分稀酒精

二百三十分竜腦五分ヲ微温ニ乗シテ溶和シ捲  
埤兒油一分迷迭香油二分及ヒ硃砂精八分ヲ加  
ヘ瀉過シテ其液ヲ取リ之ヲ固封シ貯シ此劑ハ  
上ニ攀クル者ト同品ナレド唯其稀酒精ヲ用フ  
ルヲ以テ水分ヲ含ムト多シ

以上載スル所ノ製劑ハ猶<sub>ホ</sub>他藥ノ塗劑ニ等シ

ク之ヲ塗擦スルキハ其器械的ノ摩擦ト藥中  
ノ揮發成分ノ皮下ニ吸攝セラレテ其組織ニ  
自家ノ能カヲ致ストニ由テ効ヲ奏スルト亦  
疑ヒナシ

(二) 硃砂加過泥子精 (*Siquor strumarii amictus*)

〔製法〕 過<sub>ラ</sub>泥子<sub>ス</sub>油一分ヲ酒精二十四分ニ溶和シ

テ硃砂精五分ヲ加ヘ之ヲ玻璃瓶ニ納レ固封  
シ貯シ透明ニシテ微黃色ノ液ナリ

是レ劑中ノ三藥互ニ相助ケ局部及ヒ全身俱ニ  
之ヲ興奮スルノカヲ兼ヌル者ナリ

〔主治〕 〔一〕胃腸粘膜ノ弛緩セル者ニ與ヘテ驅風ノ効アリ 〔二〕熱性病或ハ失血ニ由テ體力衰脱スル者 〔三〕氣管支焮衝ノ粘痰鬱滯シテ咯出シ難キ者ニ用フ

〔用量〕 十滴乃至二十滴ヲ少許ノ粘滑飲料ニ加シ單服スルヲ最佳トス

〔三〕炭酸安謨尼亞 又純精鹿角塩 (*stramonium carbonicum*, *Sal. Cervi Purpureum*) 白色ノ塩ニシテ揮散シ易ク甕透ノ臭氣アル者ナリ効用ハ純安謨尼亞即硝砂精ニ齊シク但之ヨリモ較緩ナルノ三

〇。二尾(三匁)乃至〇。四尾(六匁)ヲ水ニ溶解シテ與フベシ

邨爾羅篤氏ノ實驗ニ據レハ炭酸安謨尼亞ノ血中ニ鬱積スルハ體温著シク低下スル者ナリト謂ヘリ然レハ之ヲ醫藥トシテ常量ヲ人ニ與フルハ亦此ノ如クナルヤ未タ其詳カナルヲ得ス

又此塩一分ヲ取テ水五分ニ溶解スル者ハ之ヲ炭酸安謨尼亞水 (*Liquor stramonii carbonici*) ト名ツケテ藥舖ニ備フルナリ此劑ハ即二十滴乃

至四十滴ヲ以テ一服ノ量トス

(四) 焦臭油性炭酸安謨尼亞 又 揮發鹿角塩 (*Stannum*,

*muum carbonicum pyro-oleum, sal Cornu Cervi vola-*

*tile*) 炭酸安謨尼亞三十二分ヲ一石白ニ納レ動物

性揮發油 動物質ヲ取り之ヲ乾餾スルニ二回ナ

ルルハ竈透ノ焦臭アル油質ヲ得ル之

ヲ名ツケ一分ヲ取りテ徐々ニ滴加シ絶エス播

磨シテ全ク調均セシメ固封シ貯フ微黄色ノ粉

末ニシテ臭氣竄烈ナリ一度ニ〇。二尾(三尾)乃至

〇。五尾(八尾)ヲ與フヘシ又此塩一分ヲ餾水五分

ニ溶解セシ者ハ二十滴乃至三十滴ヲ以テ一服

ノ量トス

(五) 琥珀酸安謨尼亞水 又加琥珀鹿角水 (*Siquor cornu*

*muum succinoy, sig. Cornu Cervi succinatus*) 琥珀

酸末一分ヲ餾水八分ニ溶解シテ揮發鹿角塩適

宜(大約一分)ヲ加ヘテ其液中和性トナルニ至リ

静定スルヲ二十四時間濾過シテ其液ヲ取り

テ瓶ニ入レ固封シ貯フ褐色ノ液ナリ其五滴乃

至三十滴ヲ一回ノ量トス

(六) 醋酸安謨尼亞水 又 氏埜列里精 (*Siquor stramonii*

*acetoi, spiritus Mandevau*) 硝砂精十分ニ稀醋酸

適宜(大約九分)ヲ加ヘテ中和スルヲ度トシ更ニ若干ノ餾水ヲ加ヘテ藥液ノ全量ヲ三十分ト成シ之ヲ固封シ貯ク無色透明ノ液ニシテ極テ揮發ナル者ナリ此劑ハ中和性ノ液ニシテ微鹹味アルニ腐蝕ノ性ナレ此物ノ動物體中ニ入ルヤ忽チ化シテ炭酸安謨尼亞トナル者ナレハ其況發ノ効用ニ於テハ畧炭酸安謨尼亞ニ異ナラス然レニ此劑ハ頗ル大量ヲ典フルモ亦胃腸ノ消化機ヲ害スルヲナレ故ニ數茶匙乃至數食匙ヲ取リ通常他ノ飲料ニ加ヘ温服シテ殊ニ發汗ノ

効アリ

酒精 (Spiritus Vinici)

酒精ハ化學家ニ之ヲ抱水酸化依迭兒ト名ツク通常葡萄酒ノ醱酵ニ由テ炭酸及ヒ他ノ抱合物ト共ニ化生スル者ナリ又迄今ハ其元素炭素水素及ヒ酸素ヲ集合シテ之ヲ人造スルヲ得ルナリ

〔効用〕 之ヲ皮膚ニ貼スレハ其蒸散ノ急劇ナルカ為ニ凉冷ヲ覺エ粘膜ニ觸ルハ組織中ノ水分ヲ奪却スルニ由テ大ニ之ヲ刺衝ス適宜ノ分量ヲ服シテ之ヲ血中ニ吸收スルハ神經系

及ヒ心臟ヲ刺衝興奮シテ其人自ラ爽快ノ覺エ  
身體表部ノ脈管殊ニ其頭部ニ在ル者充脹シテ  
發汗ヲ增多ス假令其量酩酊スルニ至ラスト雖  
モ亦己ニ炭酸及ヒ尿素ノ排泄ヲ減ス若シ之ヲ  
持長シテ用フルキハ組織中ノ脂肪益増加シテ  
肥胖スル者ナリ又之ヲ體外ニ於テ試ムルニ例  
之ハ新鮮ノ血液若クハ他ノ生物ヲ取リテ之ヲ  
酒精中ニ蘸スキハ其轉化作用殊ニ其酸化作用  
ヲ妨クル者ナリ又酒精ヲ内服スルキハ必ス其  
身ニ溫暖ヲ覺ユレドコレ復本來體温ノ増息ス

ルニ由ルニアラス畢竟其胃神經ヲ輕々刺衝ス  
ルト胃及ヒ皮膚ニ循行スル血管ノ擴張シテ常  
ヨリモ多量ノ血ヲ受ルトニ由テ自ラ溫暖ヲ起  
スニ過キサルノミ乃チ驗温器ヲ以テ之ヲ驗ス  
ルニ少量ノ酒精ヲ服スル者ニハ體温ノ著シク  
昇降スルヲ見ス又其中量ヲ服シテ尚酩酊ニ至  
ラサル者ニハ體温却テ著シク低下シ大約一時  
半許ニシテ故ニ復ス又大量ヲ用フルキハ體温  
ノ低下更ニ著シクシテ常候ヨリモ二度余ヲ減  
シ且數時間持續スル者ナリ蓋シ温血族殊ニ人

ノ久シク酒ヲ断チシ者ニ於テハ假令中量ノ酒  
精ヲ用フルモ其體温甚ク著シク低下ス然レモ  
稍之ニ慣ル、其ハ遂ニ復溫度ノ昇降スルヲ見  
ス蓋シ亞爾箇兒ニ依テ斯ノ如ク體温ノ減少ス  
ル所以ハ方今尚未タ其理ヲ確定スルヲ能ハス  
恐クハ其神經中樞腦及脊ヲ侵ス者ニアラス  
シテ一ハ物質轉化ヲ司トル細胞例之ハ血ノ機  
能ヲ克制スルニ由リ一ハ便利比氏カ謂ル如ク  
蒸發氣ノ亢進スルヲ以テ身體ノ表位ヲ冷却ス  
ルニ由ル者ナルヘシ乃チ試ニ新鮮ノ血液若ク

ハ純粹ノ歌謨虞路賓紅血球中ヲ空氣ト共ニ振  
盪シテ之ニ一分ノ酸素ヲ含マレノ而シテ後極  
少量ノ酒精ヲ加フル其ハ他ノ酸化シ易キ者ニ  
觸ル、モ亦其酸素ヲ與フルノ力ヲ妨クルヲ以  
テ之ヲ證スヘシ苦扁桃ノ條都テ熱性患者ハ之  
ヲ健康ノ者ニ比スレハ能ク多量ノ亞爾箇兒ニ  
堪ヘ得テ酩酊スルヲナキモ亦體温減少シテ常  
ニ病ノ輕快ヲ覺ユル者ナリ又健康ナル温血族  
ニ適宜ノ酒精ヲ服セシムル其ハ其尿汗及呼吸氣  
中ニ於テ僅カニ酒精ノ痕ヲ見ルニ過キサレズ

文  
九

若シ其酩酊スヘキ的ノ量ヲ用ノルホハ右ノ排  
泄物中ニ於テ其量著シク増息ス然レモ亦熱病  
ノ患者ニ於テハ真ノ酒精分ヲ排泄スルモノ之  
ヲ健康體ニ比スレハ甚タ僅少ナル者ナリ又其  
酩酊スルホハ諸般ノ神經大概皆麻痺スル者固  
ヨリ論ヲ俟スシテ明カナリ然モ多量ノ酒精ヲ  
持長シ用フル時ハ漸ク神經系ヲ興奮シテ終ニ  
所謂ル酒客狂躁ノ症ニ陥ル者ナリ

〔主治〕 〔一〕消化器心臟或ハ隨意神經ノ衰弱セル  
者ニ與ヘテ揮發興奮ノ効アリ 〔二〕食膳ニ加ヘテ

滋養ヲ助ケ 〔三〕腐蝕性諸症ニ與ヘテ體中ノ傳染  
毒ヲ防キ 衛氏用法 〔四〕腐敗性熱病ニ於テハ旁ラ之  
ヲ用ヒテ解熱療法ヲ助ケレム

酒精ハ稍脈管ヲ擴張セシムルニ由テ醸膿ヲ  
進ムルノ性アル者ナレハ都テ單純ノ激衝性  
諸症ニハ注意シテ多量ノ酒精ヲ與フル勿レ  
酒精ハ之ヲ單味若クハ稀釋シテ外用スルコ  
アリ例之ハ經久ク脱汗虚性激衝ニ塗擦藥ト  
ナシ惡性ノ創面ニ用ヒテ之ヲ衝動シ旁ラ其  
毒ヲ撲滅シ及ヒ善性ノ瘤ニハ其組織中ニ注



射レテ之ヲ分解セシムル等是ナリ

製劑

(一) 酒精又精製酒精 又 亞爾箇兒 (Spiritus, Spiritus  
*Nimi rectificationis, Alcohol Nimi*) 百分中純亞  
 爾箇兒九十分乃至九十一分 容量ニ就テ云フ ヲ含ム者  
 (二) 稀酒精又再製酒精 (*Spiritus dilutus, Spiritus Nimi  
 rectificatus*) 百分中純亞爾箇兒六十八分乃至六  
 十九分ヲ含ム者  
 右二種ハ共ニ製藥ノ用ニ供スル者ニシテ殊ニ  
 耐劑ノ料トス又葡萄酒ハ亞爾箇兒塩類酸類依

的兒類脂糖及ヒ多量ノ水分等ノ自然ニ混和ス  
 ル者ナリ葡萄酒ノ上好ナル者ハ藥舖ニ之ヲ上  
 好白葡萄酒及ヒ上好赤葡萄酒 (*Vinum generosum  
 album & rubrum*) ト名ツク獨逸國刺應<sup>ライ</sup>地方ニテ  
 製スル所ノ家上葡萄酒ノ酸類依的兒ヲ含ムコ  
 少キ者 古來列應酒ト唱 フ撰レテ用フヘシ又設  
 里酒 (*Vinum Heremicum*) ト唱フル者ハ伊斯巴尼ノ  
 南地ニ於テ製スル者ナリコレ亦葡萄酒ノ一ニ  
 シテ藥用トナスニ宜シ然レモ坊間ニ鬻ク者ハ  
 槩子偽製ニシテ真品歟ナキカ故ニ注意セサル

可ラス上好ナル刺應酒ハ大抵其百分中純亞爾  
箇兒八分乃至十一分ヲ含ミ設里酒ハ十七分乃  
至十八分ヲ含ム者ナリ

依的兒 (ether)

依的兒ハ化學家ニ之ヲ依迭兒依的兒又酸化依  
迭兒ト名ツク酒精ト硫酸トヲ合シ蒸餾シテ製  
スル者ナリ乃チ此ノ如クナスホハ依的兒ハ水  
分ト共ニ餾出シ又此二品ハ自ラ相分レテ和ス  
ルトナク水中ニハ唯僅カニ依的兒ノ痕ヲ見ル  
ニ過キス然レモ酒精ハ能ク依的兒ヲ溶和スル

者ナリ

効用

依的兒ハ極メテ揮發ニ速カニ飛散ス  
ルヲ以テ之ヲ皮膚ニ貼スレハ寒冷ヲ生シ内服  
スルホハ揮發興奮ノ効ヲ奏スルヲ恰モ酒精ニ  
同シ又之ヲ吸入スルホハ忽劇シキ麻醉ヲ發ス  
若シ此物尙處ニ觸ル、ト稍久ケレハ終ニ其部  
ヲ腐蝕スルニ至ルナリ攝耳警拉那兒度氏ハ曾  
テ若干量ノ依的兒ヲ取テ之ヲ犬ノ胃中ニ注キ  
シニ忽臍液ノ分泌ヲ著シク増進シ又之ヲ腸中  
ニ於テ注キシニ其部ノ血管充血ヲ起シテ腸液

ノ分泌ヲ增多シ兼テ吸收機ヲ増速シ又乳糜脈ノ甚シク充漲セシヲ見タリト云フ蓋シ其乳糜脈ノ充漲スル所以ハ脾液ノ增多スルヲ以テ脂肪ノ消化ヲ促スト旁ヲ吸收機ノ増進スルトニ由ル者ナリ

〔主治〕 〔一〕殊ニ急劇ノ全身衰弱諸症ニ用ヒテ屢衝動興奮ノ効アリ蓋シ此症ニハ其効猶<sup>ホ</sup>亞爾笛兒ニ齊シト雖モ亦此ノ如ク持續セズ牙<sup>グ</sup>摩<sup>マ</sup>拉<sup>ラ</sup>陳氏ノ説ニ依レハ依的兒ハ神經系及ヒ消化機ヲ損害スルノ頗ル速カナリト云ヘリ〔二〕輓近ハ右

ニ舉ル所ノ健體効用ニ基ツキテ之ヲ患者ニ試

ミ以テ勞瘵家ノ滋養機ヲ助クルノ良効アルヲ賞賛セリ甫斯<sup>ホ</sup>帝<sup>テ</sup>耳<sup>ル</sup>氏〔三〕腹内諸臟ノ痙攣及ヒ

痙攣痛ニ用ヒテ鎮痛ノ効アリ

〔用量〕 十滴乃至二十滴ヲ取り之ヲ白糖ニ和シ

或ハ其刺戟性アルヲ以テ粘滑液ニ和シ用フル

ニ宜シ

輓近外科ノ手術ニ於テ依的兒及ヒ他ノ同性

揮發品ヲ局處麻藥トシテ屢之ヲ使用セリ其

法ハ一種ノ裝置利<sup>ル</sup>必<sup>ル</sup>爾<sup>ル</sup>獨<sup>ル</sup>尊<sup>ル</sup>ヲ用ヒテ藥液ヲ

霧ノ如ク細分セシメ之ヲ皮膚ニ噴射スルキ  
 ハ其部非常ニ冷却シ且其藥液細分ノ幻微ノ  
 分子トナリ恐クハ其一分表皮内ニ竄透シ以  
 テ皮膚ノ知覺ヲ滅殺スル者ナルヘシ故ニ此  
 法小手術ニ於テハ頗ル便利ナル者トス又往  
 時ノ全身麻藥ハ唯此依的兒ノ顛法ニノ三限  
 リタレ氏千八百四十六年波士敦廠後格魯々保  
 兒母ノ世ニ發明セシ以來ハ全ク之ヲ廢棄セ  
 リ蓋シ依的兒ハ格魯々保兒母ニ比スレハ危  
 害トシト雖モ亦其用法繁雜ニシテ甚タ便

ナラサルニ似タリ

依的兒ハ甚タ燃ヘ易ク且大氣ニ遇フハ動  
 モスレハ火ヲ引テ爆鳴スルヲアレハ若シ之  
 ヲ外用スルキハ常ニ必ス謹戒セスレハアル  
 ハカラス

〔製劑〕

○依的兒精 又 忽布滿鎮痛液 (*Spiritus aethereus*,

*Liquor anodynis Hoffmanni*) ト名ツクル者ハ依的

兒一分ニ酒精三分ヲ加フル者ナリ効用主治及

ヒ用量共ニ純依的兒ニ同シ

○醋酸依的兒 又 醋酸依迭兒 (*ether aceticus, ethyl acetat*) 醋酸那篤倫酒精及ヒ硫酸ノ三味ヲ合シテ蒸餾スルキハ其硫酸ハ那篤倫ト合シ醋酸ハ依迭兒ト合シテ蒸餾スコレ即チ醋酸依的兒ナリ此物十一倍ノ水ニ溶解ス其効用ハ殆レト純依的兒ニ同シ但シ醋酸ヲ含ムニ由テ清凉爽快ノ佳香アリ

格魯兒依的兒精 又 甘塩精 (*Spiritus salinis*)  
*vis chlorati, spiritus salis dulcis*

甘塩精ハ酒精ト格魯兒トヨリ轉化メ成ル者ナリ成分ハ格魯刺兒格魯兒依迭兒亞爾埜嗜度及ヒ酒精ニメ其分量常ニ一定ナラス小量ヲ用フルキハ効用及ヒ主治共ニ依的兒精ニ同シ又十滴乃至三十滴ヲ用ヒテ利尿藥トス

硝酸依的兒精 又 甘硝石精 (*Spiritus ethere vis nitrosi, spiritus nitri dulcis*)

甘硝石精ハ硝酸ト酒精トヲ合シ蒸餾シテ製スル者ナリ故ニ畢竟亞硝酸依迭兒ノ酒精ニ溶解シタル者ニ過キス其性効用法等都テ全ク甘塩精ニ齊シ

○依的児及ヒ其製劑ト性効ヲ同フスル植物性ノ藥品數種アリ皆多少揮發油ヲ蘊蓄スルニ由テ衝動興奮ノ効ヲ顯ハス者ナリ故ニ今其用ノ家モ廣キ揮發油即チ竜腦ニ就テ其効用ヲ詳説シ以テ他ノ模範トナサント欲ス

龍腦 (Camphora)

竜腦ハ日本及ヒ支那ニ産スル樟樹科ニ屬スルラウルス、カムホラ<sup>樟</sup>樹ノ片材ニ水<sup>ラウリネア</sup>ヲ加ヘ蒸餾シテ製シタル固形ノ揮發油ナリ即チ他ノ揮發油類ト齊シク甚タ水ニ溶難シ<sup>水一千分ハ竜腦僅</sup>

酒精依的児及ヒ固性油ニハ溶解<sup>易シ</sup>

効用 粘膜或ハ創面ニ竜腦ヲ貼スレハ大ニ刺戟シテ終ニ<sup>煥</sup>衝ヲ起スニ至リ又胃ニ入ルルハ速カニ消化機ヲ害シ血液充張及ヒ胃ノ加答流ヲ起シ又之ヲ血中ニ吸收スルヤ其量僅カナル<sup>中</sup>ハ衝動興奮スル<sup>ノ</sup>猶酒精或ハ依的児ニ於ケルカ如ク若シ多量ナレバ汎發ノ痙攣ヲ發ス但シ此痙攣症ハ一時其勢劇甚ナルモ亦速カニ鎮靜ス故ニ其分量過度ナラザル<sup>中</sup>ハ復後害ヲ殘ス<sup>トナシ</sup>殊<sup>ニ</sup>之ヲ犬ニ試<sup>ス</sup>適宜ノ量ヲ取テ之ヲ

蝦蟆或ハ温血族ニ與ヘ試ムルニ心臟ノ運営甚シク強盛シ死後尚久シク其刺衝機ノ保續スルヲ見ル又此龍腦ヲ取テ其痙攣及ヒ他ノ中毒諸症ヲ起スニ至ラサル的ノ量ヲ獸類ニ與フルハ其健康ナル者ト敗膿等ヲ尿管ニ注射シテ故ラニ熱症ヲ起ス者トニ論ナク皆暫時著シク體温ヲ減少ス但シ少量ナルハ加之ナラス其病獸ニ於テハ健康ノ者ヨリモ尚一層温度ヲ減少シテ病勢モ亦大ニ緩解スルカ如シ竜腦ハ甚ク稀釋セル者ト雖モ能ク白血球ノ機能ヲ一時減

殺スルナリ又龍腦及ヒ此種ニ屬スル他ノ諸品ハ多クハ有機質ノ變敗ヲ防クノカアリ

**主治** (一) 傳染性諸病及ヒ刺衝性諸症ニ於テ將ニ心臟ノ麻痺ニ陥ラントスル者殊ニ羅斯ノ重症必路護弗氏ノ說ニ係ル (二) 粘液ノ氣管支ニ充塞スル者ニ用ヒテ良シ (三) 潰瘍ノ虛性或ハ汚穢ナル者ニ外用シテ因牙ノ發生ヲ促カシ慢性ノ浮腫ニ貼メ之ヲ鼓舞シ皮下嫩衝ノ吸收ヲ進ム其他都テ衝動興奮ヲ要スル症ニ於テ之ヲ外用スルニ宜シ

竜腦ノ内服ニ於テ致ス所ノ効用ニ就テハ古  
來之ヲ試驗シ或ハ病者ニ就テ屢之ヲ實驗セ  
シト雖モ尙未タ其真理ヲ極ムルヲ得ス乃チ  
劇性ノ熱病ニ於テ龍腦ヲ用フルハ時トノ  
大ニ發汗シ之カ為ニ其病ノ分利スルヲアレ  
此ノ如キハ果ノ揮發油ノ効ニ由テ直ニ皮  
膚ヲ衝動シ以テ發汗ヲ催進スルニ由ルヤ又  
其解熱ノ効力ニ由テ然ルヤ當令ト雖モ未タ  
之ヲ確證スルヲ得ス又竜腦ハ能ク生殖ノ機  
能ヲ抑制スルト云フ說アレドコレ亦未タ疑

ヲ免レサル所ナリ

用量 ○。一尾(二匹弱)乃至○。三尾(五匹)ヲ散劑若  
クハ乳劑トナシ二時毎ニ與フヘシ乃チ此散劑  
ヲ製スルニハ初メ先酒精一二滴ヲ龍腦ニ滴加  
スヘシ然ルハ甚タ粉蜜ニ易シ且竜腦ノ散藥  
ヲ貯フルニハ必ス之ヲ蠟紙ニテ包ミ以テ其飛  
散潮漸ヲ防クヘシ又乳劑ヲ製スルニハ唯亞刺  
比亞護謨末ヲ加フルノミニテ足レリ即チ竜腦  
二尾(一月半)護謨適宜及ヒ水百五十尾(大約五号)  
ヲ取リ好ク調和スヘシ



又竜腦ヲ油ニ溶解セル者(竜腦一分、甘肅桃油九分)ヲ皮下ニ注射スルハ、通常其為ノニ疼痛、腫瘍等ヲ發スルノ憂ナク、又藥液ノ吸收甚タ速ニシテ實ニ賞用スヘキノ良法タリ

前章安謨尼亞ノ條下ニ準ケシ塗劑及ヒ復方白芷精白芷ノ條ニ見ユノ外尚數種ノ外用製劑アリ、今之ヲ左ニ列示ス

(一)竜腦精 (*Spiritus camphoratus*) 竜腦一分ヲ酒精七分ニ溶解シ、餾水二分ヲ加ヘテ製ス、無色透明ノ者ヲ佳トス

(二)竜腦酒 (*Vinum camphoratum*) 竜腦末、亞刺比亜護謨末各一分ヲ取り好ク研和シ、白葡萄酒四十分ヲ徐々ニ注加シ、絶ヘス攪拌シテ溶解セルムル者ナリ、白色微濁ノ液ナリ

(三)竜腦油 (*Olum camphoratum*) 竜腦一分ヲ取り上好阿列磯油九分ニ溶解シ、玻璃瓶ニ内レ固封シテ貯フ、塗藥及ヒ擦藥トノ用フ

(四)竜腦官粉膏 (*Unguentum Ceruuae camphoratum*) 竜腦五分ヲ官粉膏官粉一分、家猪脂二分ヲ以テ製ス百分ニ煉和スル者ナリ、痔瘡ヲ豫防シ、或ハ之ヲ治スルノ良

劑タリ然レ此膏ハ硫化水素ニ遭フホハ硫化  
鉛ニ化シ黑色トナリテ甚タ汚穢ヲ生スル者ナ  
リ故ニ龍腦並鉛華膏ヲ以テ之ニ優レリトス即  
チ並鉛華膏並鉛華一分家猪脂二十分ニ竜腦一  
分ヲ和スル者ナリ

〔五〕龍腦硬膏 (*Emplobatum fussum camphoratum*)  
鉛丹硬膏百分ニ竜腦一分ヲ捏和スル者ナリ

唐桂皮 (*Cortex Cinnamomi Cassiae*)

唐桂皮ハ支那ニ産スル樟樹科ノ一ニシテシナ  
モムム、カシミアト唱フル樹ノ皮ナリ乃チ左ノ製

劑ヲ作リテ藥用トス

〔一〕桂皮油 (*Oilum Cinnamomi Cassiae*) 微濃厚ニシ

黄色或ハ黄褐色ノ油ナリ其質水ヨリモ重シ酒  
精ニハ能ク溶解ス油糖劑トシテ用フヘシ

〔二〕單方桂皮露水 (*Aqua Cinnamomi simplex*)

唐桂皮一分ヲ適宜ノ常水ニテ浸漬シ蒸餾シテ  
藥液十分ヲ取リ之ヲ貯フ

〔三〕酒製桂皮露水 (*Aqua Cinnamomi spiritosa*) 唐

桂皮一分ヲ稀酒精一分及ヒ常水十分ニ浸漬シ  
蒸餾シテ五分ノ藥液ヲ製ス

右二種ノ製劑ハ他ノ衝動興奮ノ合劑ニ加ヘ或ハ其劑料トシテ用フ

〔四〕桂皮舍利別 (*Pyrops Cinnamomi*) 桂皮搗碎

ノモ二分ヲ酒製桂皮露水十二分及ヒ玫瑰水二分ニ浸漬スルヲ二日濾過ノ十一分ノ液ヲ取リ之ニ上好ノ白糖十八分ヲ加ヘテ舍利別ヲ製ス帶赤褐色ノ者ヲ佳トス

〔五〕桂皮酎 (*Sinct Cinnamomi*) 桂皮一分ヲ稀酒精

五分ニ浸漬シテ酎劑トナス赤褐色ノ者ヲ佳トス十滴乃至三十滴宛衝動藥トシテ屢子宮ノ虛

性諸病ニ賞用ス

錫蘭桂皮 (*Cortex Cinnamomi Zeylanici*)

東印度産ノ樟樹科ニ属スルチンナモムムサイラニクムノ皮ナリ其含ム所ノ揮發油ハ之ヲ唐桂皮油ニ比スレハ大ニ芳香ナリ故ニ價モ亦昂シト之ニ六倍ス錫蘭桂皮ハ多クハ散末トナシテ他ノ衝動劑ニ伍用スルヲ唐桂皮ニ同シ〇三瓦五瓦乃至〇五瓦八瓦ヲ一服ノ量トス

丁子 (*Caryophylli*)

丁子ハ東印度ニ産スル樟樹科中ノ一種カリヲ

フィルス、アロマチクス<sup>丁香</sup>ノ花蕾ヲ採テ陰乾セ  
シ者ナリ他ノ興奮諸藥ニ伍用ス其油ヲ丁子油  
(*Oleum Caryophyllorum*)ト云フコレ亦藥舗ニ備  
ル品ナリ

老利兒實 (*Fructus Sauri*)

老利兒實ハ即チ樟樹科中<sup>ラウルルス</sup>ノ  
樹ノ子實ナリ又之ヨリ製シタル油ヲ老利兒油  
(*Oleum Sauri*)ト云フ其成分ノ主タル者ハ老利  
兒酸ト脂糖トノ抱合物ニノ旁ラ揮發油及ヒ古  
羅々非爾ヲ含メリ此油ハ常ニ凝固スルヲ以テ

之ヲ老利兒膏 又老利兒酪ト名ツケテ擦劑トシ  
用フ

加耶布底油 (*Oleum Cayputi*)

加耶布底油ハ東印度ニ産スル桃金娘科ニ屬ス  
ル<sup>ミルタセ</sup>ノラレウカ<sup>ミノルト</sup>ト唱フル樹ノ葉及ヒ其種  
子殼ヨリ製シタル油ナリ極ノテ純粹ナル者ハ  
無色透明ニシテ藥舗ニ之ヲ再製加耶布底油  
(*Cayputi rectificatum*)ト名ツク然レモ其再製ヲ  
經サル者ハ綠色ヲ帶フ共ニ香氣竜腦ニ類似ス  
ル者ニシテ往時ハ廣ク藥用ニ供シタレモ方今ハ

其用殆ント廢レテ概子唯之ヲ齧齒痛ニ外用ス  
ルノミ其法ハ加耶布底油丁子油各一瓦(十六分)  
及ヒ格魯々保兒母二瓦(三十二分)ヲ調和シ其一  
二滴ヲ齧齒ノ孔内ニ滴シ旁ヲ數滴ヲ頰ニ擦入  
シテ大ニ効アリ

白芷根 (*Rhizis Angelicae*)

亞カ伯<sup>アル</sup>山麓ノ山中ニ生スル繖頭花科ノ一種<sup>ア</sup>  
ンゲリカ、アルカンゲリヤ<sup>白</sup>ノ根<sup>根</sup>ナリ其成分ハ  
揮發油、樹脂質及ヒ苦味分等ニシテ其他効用ハ畧<sup>ナ</sup>  
前條ニ載タル諸藥ニ同シ乃チ左ノ製劑ヲ作テ

藥用トス

○複方白芷精 (*Spiritus Angelicae compositus*) 白芷

十六分。繖草<sup>各細割</sup>スル者<sup>者</sup>四分。杜松子<sup>搗碎</sup>ル者<sup>者</sup>四分ヲ取  
リ蒸餾罐ニ納レ酒精七十五分及ヒ常水百二十  
五分ヲ注キ浸漬スルヲ二十四時許蒸餾シテ百  
分ノ藥水ヲ取り更ニ竜腦二分ヲ加ヘ濾過シテ  
其液ヲ貯<sup>レ</sup>無色透明ノ液ナリ塗擦劑トシテ衝動  
興奮ノ偉効アリ

小茴香 (*Fructus Foeniculi*)

園生繖頭花科ノ一ニシテニケルコトヲスチナリ

レ苗ノ子實ナリ小苗香ハ驅風ノ一良劑ニシテ  
能ク風氣ノ醸生ヲ防キ又速カニ之ヲ驅逐スル  
者ナリ從來此藥ニ就テハ別ニ其特異性効ヲ論  
説スル者ナレト雖モ亦此中ニ含メル揮發油ハ  
腸ノ實質及ヒ其神經ヲ刺戟スルヲ以テ消化諸  
液ノ分泌ヲ増シ旁ラ腸ノ蠕動機ヲ興奮スルノ  
効アルハレ通常泡劑及ヒ所謂聖土セントゲル傑兒孟緩下  
泡劑ノ料トナス即チ梅那葉酒精ニ漬ノ樹  
脂分ヲ除ク者十六  
分。接骨木花十分。小苗香五分。過泥子五分ヲ細剉  
搗碎シ合メ貯置キ用ニ臨ンテ純精酒石三分ヲ

加ヘ泡劑トシテ之ヲ與フ其他三種ノ製劑アリ  
之ヲ苗香油。苗香舍利別及ヒ苗香水トス就中苗  
香水ハ苗香ニ水ヲ加ヘ蒸餾セシ者ニメ少許ノ  
揮發油分ヲ含メリ通常之ヲ興奮和劑ノ料トス  
葛縷子 (*Struatus Carni*)  
葛縷子ハ繖頭花科中ノ一種「カルム。カルヴィノ子  
實ナリ其油ヲ取テ藥用トシ主治全ク小苗香ニ  
同シ

胡荽子 (*Struatus Carianolvi*)

園生繖頭花科ノ一種「コリアントルム。サチブム

ノ子實ニシテ都テ小苗香及ヒ葛縷子ト異ナラ  
ス

過泥子 (*Struthus chinensis vulgaris*)

園生繖頭花科ノ一種。ピムピ子ルラ。アニスムノ  
子實ナリ。聖土。傑兒孟緩下泡劑ニ加ヘ用フ其油  
ハ阿芙蓉加安息香耐或ハ硝砂加過泥子精ニ加  
フ

彬必涅刺根 (*Radix Sumpnellae*)

獨逸國ニ自生スル繖頭花科中ノ「ピムピ子ルラ」  
サクシフラガト唱フル草ノ根ニノ其効分ハ揮

發油及ヒ辛辣ナル樹脂質ナリ耐劑ニ製メ用フ  
ルヲ常トス

○彬必涅刺耐 (*Struth. Sumpnellae*) 彬必涅刺根

搗碎ス一分ヲ稀酒精五分ニ浸漬ノ製ス帶黃色  
ル者ノ液ナリ其二十滴乃至六十滴ヲ取リテ慢性ノ  
扁桃腺燉衝ニ用ヒテ効アリ

又此ニ類セル一藥アリ即チ應百刺篤里亞根

(*Chusonia Sumpnellae*) ト唱フル者ナリコレ

亦繖頭花科ノ「イムペラトリエ」ラストル子ウ  
ムト云フ草ノ根ニノ百烏攝陀尼涅ト名ツク

クル一種香窠ナル結晶分及ヒ揮發油其他樹  
脂分ヲ含ノリ此草根ハ專ラ家畜醫ノ藥用ト  
為ス者ナリ

角茴香 (*Ononis spinosa stellata*)

支那ニ産スル木蘭科ノ一種イルリチウム。アニ  
サト<sup>ム</sup>子實ナリ内服ニハ他ノ興奮藥ニ伍  
レテ浸劑ト為シ與ヘ或ハ時トノハ他藥ト配ノ  
衝動瘵濕劑トナスアリ又和胸飲ニ加ヘテ其  
一味トナス即チ蜀葵根八分甘草三分莖菜根一  
分點<sup>ト</sup>刺<sup>シ</sup>護<sup>シ</sup>葉四分及ヒ歌<sup>ル</sup>板<sup>ス</sup>屈<sup>ム</sup>母<sup>ム</sup>花二分ヲ

細判レテ之ニ角茴香<sup>搗碎セ</sup>二分ヲ加フ

纈草根 (*Ranix valeriana*)

獨逸國野生ノ敗醬科ニ屬スルワレリヤナ。フイ  
レナリス<sup>敗醬ノ</sup>根ヲ採收シテ藥用ニ供ス其効分  
ハ一種ノ揮發油ト植酸ナリ共ニ藥用スヘシ蓋  
シ其油ノ効用ハ酸ヨリモ較大ナル者ニ似タリ  
纈草根ハ殊ニ神經機能ヲ沈靜シ或ハ鎮痙藥ト  
ノ世ニ稱譽セラレ者ナリ就中併私的里家ノ  
全身衰弱ヲ兼ヌル者ニ良シ其他麻痺ニ於テモ  
亦之ヲ賞用セリ



每上藥中計 卷之二 冠三片 補片  
〔用量〕 纈草根〇五瓦(八匁)乃至一瓦(十六匁)ヲ取  
リ浸劑若クハ散劑ト為シテ之ヲ與フ

〔製劑〕

〔一〕纈草油 (*Oil Valerianae*) 一滴乃至四滴ヲ白糖  
ニ和シ或ハ豫メ油糖劑ト為シ貯ヘ置キテ之ヲ  
與フヘシ

〔二〕纈草煎 (*Stis Valerianae*) 纈草根一分ヲ取り  
酒精及ヒ常水各二分ヲ以テ浸漬スルヲ三日間  
ニシテ其液ヲ攪リ又酒精及ヒ常水各一分ヲ其  
渣滓ニ注キ三日間浸漬シ攪リテ前後ノ二液ヲ

濾過シ煎煮シテ第二稠ノ煎劑ト為ス黒褐色ニ  
シテ水ニ和スレハ微渾濁ノ液トナル〇二瓦(三  
匁)強乃至一瓦(十六匁)ヲ取り丸劑トナシテ日ニ  
數回之ヲ與フベシ

〔三〕纈草酎 (*Tinct. Valerianae*) 纈草末一分ヲ稀  
酒精五分ニ漬シ酎劑ト為ス者ニシテ褐色ノ液  
ナリ服量ハ十滴乃至三十滴ヲ白糖或ハ葡萄酒  
ニ和シ用フ

〔四〕依的兒製纈草酎 (*Tinct. Valerianae aetherea*) 纈  
草一分ヲ依的兒精依的兒一分ヲ酒精五分ニ浸

清シテ耐劑トナス赤褐色ノ液ナリ用量ハ前ニ  
同シ

〔五〕續草水 (*Aqua Valerianae*) 續草根一分ヲ適宜  
ノ常水ニ浸シ蒸餾シテ藥水十分ヲ取ル者ナリ  
之ニ青色ノ刺切母斯紙ヲ蘸スニ其紅變スル者  
ヲ佳トス

〔六〕續草酸 (*Extractum Valerianicum*) 續草酸ハ脂肪  
酸中ノ一種ニシテ流動物ナリ臭氣甚ク惡ムベ  
シ此酸ハ常ニ亜鉛、蒼鉛或ハ規屋ト抱合スル者  
ヲ藥用トス決シテ單味ヲ用フルトナシ

亞爾尼加花 (*Stilax chinensis*)

獨逸國ニ産スル聚成花科中ノ一種アルニカ、モ  
シタナノ花ヲ採テ藥用ニ供フル者ナリ此花ノ  
効分ハ揮發油及ヒ苦味質ニシテ腦脊髓ノ卒中症  
ニ起因セル麻痺ニ於テ大ニ之ヲ賞用セリ或ハ  
癲癇症ニモ亦之ヲ用ヒテ効アリ用法十瓦(三号)  
弱乃至二十瓦(六号弱)ヲ沸湯百五十瓦(大約五号)  
ニ浸出シテ二三時毎ニ一食匙ヲ與フハシ亞爾  
尼加根モ亦常ニ藥舖ニ備フレ氏方今ハ全ク其  
用ヲ廢セリ其他亞爾尼加耐 (*Stilax chinensis*) ハ亞

爾尼加花一分ヲ稀酒精十分ニ浸出シテ製シタル黄褐色ノ酎劑ニシテ擦劑或ハ膏劑トナシ之ヲ外用ス

默里路篤 (*Herba Meliloti*)

默里路篤ハ獨逸國ニ産スル蛾形花科ニ属スルメリロチユスヲフィンナリス草零陵香ト唱フル草ノ葉莖ヲ採收シテ藥用トナス者ナリ亞爾尼加耐ノ如ク分解ノ効アリ常ニ硬膏ト為シテ用フ之ヲ默里路篤硬膏 (*Emplastrum Meliloti*) ト名ツク製法苳若硬膏ニ同シ此藥ノ効用ハ恐ラク

ハ其默里路篤酸玖麻里涅ヲ含ムニ由ルヘシ蓋シ其默里路篤酸ノ効用ハ未タ之ヲ詳ニセスト雖モ玖麻里涅ハ都テ揮發油ニ固有ノ性能ヲ有スルヲ亦明カナリ

土木香根 (*Radic Stelmaii*)

土木香根ハ聚成花科ノ一ニシテイニユラヘレニウムノ根ナリ成分ハ伊紐里涅ト唱フル抱水炭素質ノ外尚揮發油及ヒ樹脂質ヲ含アリ蓋シ往時ハ此二質ノ衝動性アルヲ以テ多ク之ヲ藥用セリ即チ其根或ハ其熬劑製法續草〇五瓦(八八)熬ニ同シ

乃至一瓦(十六八)ヲ取り日ニ數回之ヲ與フヘシ

攝兒扁太里亞根 (*Radic Staphentariae*)

攝兒扁太里亞根ハ北亞米里加ニ産スル馬兜鈴科ニ屬スルアリストロピアセルペンタリヤト唱フル蔓草ノ根ナリ効用主治及ヒ其用量共ニ全ク他ノ衝動藥殊ニ纈草及ヒ亞爾尼加花ニ異ナラス

弊爾答刺謨根 (*Radic Squithu*)

獨逸國ノ内地ニ培養セル聚成花科ノ一種ニシテアナチクルユスヲフィシナルムト唱フル草ノ根ナ

リ味苛烈ニシテ灼カ如シ往時ハ舌ノ麻痺、蓋痛ニ用ヒ或ハ發汗劑トシテ稱用シタルニ方今ニ至テハ唯稀ニシテ用フルノミ乃チ其用法ハ五瓦(四瓦)乃至十瓦(八瓦)ヲ取り百五十瓦ノ沸湯ニ浸出シテ之ヲ與フ

加密列花 (*Flores Chamomillae vulgaris*)

獨逸國野生ノ聚成花科ニ屬スルマトリカリアカモミルノ花ヲ採收シテ藥用トス其効用ハ大概鎮痙ニアリテ殊ニ婦人生殖器ノ神經症及ヒ其交感ニ由テ發スル所ノ諸症ニ於テ之ヲ用

ヒ或ハ又通經劑トシテ用フルコアリ蓋シ此品ノ効能モ亦一種ノ揮發油ニ係ル者ナリ

〔製劑〕

(一) 加密列慈 (*Extr. Chamomillae*) 加密列花二分ヲ酒精及常水各八分ニ浸漬スルコト二十四時間ニシテ其液ヲ搾リ又酒精常水各四分ヲ以テ其渣ヲ浸漬スルコト更ニ二十四時ニシテ之ヲ搾リ前後ノ二液ヲ合シ濾過シテ第二稠ノ煎劑トナス。綠褐色ニシテ水ニ溶和スレハ微渾濁ヲ生ス服量ハ〇.五瓦(八分)ヨリ二瓦(三十二分)ニ至ル

(二) 濃加密列水 (*Aqua Chamomillae concentrata*)

加密列花十分ニ適宜ノ水ヲ注キ重湯鍋ヲ用ヒ蒸餾シテ藥液百分ヲ取り酒精二分ヲ加ヘ更ニ蒸餾シテ十分ノ藥液ヲ製シ罈中ニ納レ固封シ貯フ

(三) 淡加密列水 (*Aqua Chamomillae*) 右ノ製劑ニ九

倍ノ水ヲ加ヘテ稀釋スル者ナリ

右二劑ハ他ノ興奮藥ノ佐使藥トシテ用フルヲ常トス

(四) 加密列舍利別 (*Syrupus Chamomillae*) 加密列花三

分ヲ取り沸湯十五分ニ浸漬スルヲ數時間濾過  
シテ十分ノ液ヲ取り上好ノ白糖十八分ヲ溶和  
シテ舍利別トナス者ナリ常ニ他ノ興奮劑ニ加  
用ス

〔五〕加密列油浸 (*Ulem Chamomillae infusion*) 加密  
列花二分。酒精一分ヲ蓋アル器ニ納レ密閉シテ  
放置スルヲ一二時間次テ上好阿列襪油二十分  
ヲ注加シ重湯鍋ヲ用ヒ煮テ時々攪拌シ酒精分  
ノ盡ク飛散スルヲ候テ擦出シ一二日ヲ經テ其  
油ヲ濾過シ蠟ニ入レテ之ヲ貯ル黄綠色ニノ透

明ナル者ヲ佳トス殊ニ專ラ外用ニ供ス

〔六〕揮發性加密列油 (*Ulem Chamomillae aetherium*)  
暗青色ノ濃厚ナル油ナリ二滴乃至四滴ヲ以テ  
一服ノ量トス

羅馬加密列花 (*Ulem Chamomillae*  
*Romanae*)

歐羅巴ノ南部ニ産スル聚成花科ノ一種ニノア  
ンテミス、ノビリスト唱フル者ナリ其花ヲ採テ  
藥用ニ供ス此物ノ効用ハ尋常ノ加密列ニ異ナ  
ルヲナシ唯其揮發油ヲ含ムト多キカ故ニ其効

カモ亦随テ強シ此品モ亦泡劑トナシ之ヲ用フ  
レ正甚タ稀ナリ

土荊芥 (*Herba Chempedii*)

土荊芥ハ藜科ノ一種ニノヘノポヂウム、アムブ  
ロシヲイデス<sup>トク</sup>ノ葉莖ヲ採テ藥用トナス者  
ナリ其質揮發油ヲ含メリ麻痺、舞蹈病及ヒ痙攣  
諸症ニ於テ之ヲ賞用セリ服量ハ一瓦半(二十四  
ル)乃至三瓦(二刃半)宛日ニ數回之ヲ與フ

洎夫藍 (*Peewi*)

洎夫藍ハ歐羅巴ノ暖地ニ培養スル所ノ「コロク

スサチブユスト唱フル草ニシテ鳶尾科中ノ一種  
ナリ其雌藥頭ヲ採收シテ藥用ニ供ス黄色苦味  
ニノ芳香アリ又揮發油ヲ含メリ洎夫藍ノ効用  
ハ恐クハ唯衝動興奮ニ過キサルヘシ但シ往時  
ハ之ヲ麻醉藥中ニ実入セリ故ニ當今ト雖モ尚  
之ヲ加密列ト同シク供用シ殊ニ月經不足ノ旁  
ラ疼痛ヲ兼ヌル者ニ用フ其用法ハ〇五瓦(八ル)  
乃至一瓦(十六ル)ヲ取り丸散若クハ浸劑トナシ  
テ與フ

〔製劑〕

每上藥中言 卷之二 三十四

(一) 泊夫藍耐 (Sinct. Cassi) 製法 雙蘭菊 八二十滴 耐 = 同シ

(二) 泊夫藍舍利別 (Syrupus Cassi) 泊夫藍一分ヲ上好白葡萄酒二十四分ニテ浸漬スルヲ三十六時濾過シテ二十二分ノ液ヲ取り白糖三十六分ヲ溶和シテ製ス鮮黄色ノ者ヲ佳トス

(三) 泊夫藍硬膏 (Emplastum Aspericum) 黃蠟 哥魯保紐母 松脂各六分ヲ取り文火ニ上セ熔解シテ之ヲ濾過シ次ニ護護安母屈亞及ヒ瓦爾拔奴母各二分ヲ帝列並底那三分ニ溶解セル者ヲ加ヘ

又之ニ乳香末 沒藥末 阿里拔奴母末各二分及ヒ泊夫藍末一分ヲ捏和シテ硬膏ヲ製ス赤褐色ノ者ヲ佳トス

其他阿芙蓉加泊夫藍耐及ヒ加泊夫藍瓦爾拔奴母硬膏アリ俱ニ其本條ニ詳ナリ

接骨花 (Flores Sambucus)

接骨花 ハ忍冬科ニ属スル「サムブクス」ニグラノ花ナリ古來發汗藥トナシ世ニ於テ大ニ之ヲ稱譽シ屢泡劑トナシ與フル者ナリ又爰ニ一ノ製劑アリ之ヲ接骨子熬膏 (Mucosa Sambucus vispi)



本草綱目卷之二十一 近三石部

rosas)トス即チ接骨木子ノ搾汁ヲ煎熬シテ之ニ白糖ヲ加ヘ製シタル者ナリ其用法ハ二十瓦(六了弱)ヲ取リテ他ノ發汗合劑百五十瓦(五号)ニ和シ與フヘシ或ハ又別ニ接骨花中ノ揮發油ヲ製シテ用フルヲアレヒ通常濃淡二種ノ接骨花水製法如密列ハ多ク亦揮發油ヲ含ム者ナリ

菩提樹花 (Catalpa binnata)

菩提樹科ニ屬スル「チリヤウル」ニホリヤ「及ヒ」チリヤ「チリヤ」ノ一種ノ花ヲ採テ藥用ニ供スル者ナリ但此花ヨリ微芳香アル揮發油ヲ製

ス此品ハ屢發汗劑トシテ用フ其用法ハ泡劑トナシ或ハ又濃淡二種ノ菩提樹花水共ニ加密列水ヲ製シ他藥ノ佐使藥トシテ用フ例之ハ民埜列里精ノ如キ者ニ之ヲ和シ服セシムルニ宜シ

薄荷葉 (Mentha piperita)

薄荷葉ハ唇花科ニ屬スル「メンタ」ニホリヤ「薄荷」ノ葉ニシテ獨逸國ニ於テハ藥用ノ為メニ之ヲ培植ス薄荷葉ハ單味若クハ他ノ同効ノ藥品ニ伍シテ泡劑トナシ或ハ大約十五瓦(半号)ヲ取リ百五十瓦(五号)ノ水ニ浸出シ他藥ヲ伍シテ合劑

本草綱目卷之二十一 近三石部 三十五

ヲ作り典フベシ又製劑數品アリ之ヲ左ニ揭示ス

一薄荷油 (*Oleum Menthae piperitae*)

二英吉利薄荷精 (*Spiritus M. piperitae officinarum*)

薄荷油一分ヲ酒精九分ニ和スル者ナリ

三薄荷水 (*Aqua M. piperitae*) 薄荷葉一分ヲ適

宜ノ水ニ漬シ蒸餾シテ露水十分ヲ製ス微濁ノ

液ナリ

四酒製薄荷水 (*Aqua M. pip. spirituosum*) 製法ハ酒

製桂皮露水ニ同シ



五薄荷糖球 (*Stictulae M. piperitae*) 先ツ少許ノ

薄荷油ト酒精トヲ以テ玻璃櫃ノ内面ヲ濡シ糖

球ヲ納レ頻リニ振盪シテ之ヲ製ス

六薄荷舍利別 (*Syrupus M. piperitae*) 製法ハ加

密列舍利別ニ同シ緑褐色ノ者ヲ佳トス

免答久里斯巴葉 (*Stictia Menthae europaeae*)

薄荷ノ別種ノシタクリスバ蘭種薄荷ト唱ト名

ツクル者ニシテ同シク唇花科ニ属スル者ナリ

其葉ヲ採テ藥用ニ供ス用法ハ全ク薄荷ニ同シ

其揮發油精劑露水及ヒ舍利別皆常ニ藥舖ニ備

黙栗薩葉 (*Salvia melissae*)

是レ亦唇花科ノ一種ニメ、メリッサヲフィンナリス  
麝香草ノ葉ヲ採テ藥用トナス者ナリ局方中載  
スル所ハ葉ト濃淡露水ナリ用法分量共ニ薄荷  
ニ同シ

迷迭香葉 (*Salvia Rosmarini*)

園生唇花科ノ一種ニシテ、ロスマリヌスヲフィン  
ナリス<sub>迷迭</sub>ノ葉ナリ<sub>香</sub>多クハ香竈浴或ハ菴瀨劑  
トシテ外用ス又諸種ノ製劑アリ即チ左ニ掲ク

(一) 迷迭香油 (*Oilum Rosmarini*) 無色ノ稀薄ナル

油ニシテ同量ノ酒精ニ溶和ス

(二) 迷迭香精 (*Spiritus Rosmarini*) 迷迭香葉<sub>搗爛ス</sub>  
五分ヲ酒精常水各十五分ニ浸漬スルヲ二十四

時蒸餾シテ藥液二十分ヲ製ス無色透明ノ液ナ  
リ

(三) 複方迷迭香軟膏 (*Unguentum Rosmarini compositum*)

家猪脂十六分、牛脂八分、黃蠟二分及ヒ肉  
豆蔻油二分ヲ取り重湯鍋ヲ用ヒ煮テ之ヲ熔和  
シ稍冷ユルヲ俟テ迷迭香油及ヒ杜松子油各一

分ヲ和スル者ナリ是レ帶黄色ノ軟膏ナリ此軟膏ハ神經カヲ鼓舞シテ之ヲ強壯スルノ効アリ蓋シ其然ル所以ハ外敷ノ際其摩擦スル由テ益揮發油ノ衝動性ヲ助ケ以テ神經末梢ノ榮養機ヲ催進シ旁ラ其運營ヲ換起スルニ由ルナリ

捲埥兒 (*Herba Sappali*)

捲埥兒ハ野生唇花科ノ一種ニシテチームムセルピルルム伊吹麝香草ヲ陰乾セシ者ナリ通常捲埥兒精トナシテ外用ス製法ハ迷迭香精ニ同シ  
羅瑪捲埥兒 (*Herba Myrsini*)

園生ノ唇花科ニ属スルチームムフルガリス同上種ノ葉莖ヲ收メテ藥用ニ供スル者ナリ往時ハ其油ヲ取リテ藥舗ニ供セシモ當今ハ全ク其用ヲ廢セリ

刺賢埥兒花 (*Stou Sarandulac*)

園生唇花科ニ属スルラヴンヂラヲフイシナリスト唱フル草ノ花ナリ通常他藥ト伍シ香竈泡劑トシテ與フ刺賢埥兒油及ヒ刺賢埥兒精製法迷迭香精ニ同モ亦藥舗ニ備フル者ニシテ就中其精劑ハ洗劑トナシ麻痺ニ用ヒテ効アリ

毎頁藥性註  
卷之二  
五十五頁

未沃刺那 (*Melba Majoranae*)

未沃刺那モ亦唇花科ノ一種ニシテ「ヨリガヌム」  
マヨラナト名ツクル草ナリ其効分ハ一種ノ  
揮發油ニメ未沃刺那油ト云フ之ヲ單軟膏ニ和  
シテ外用トス効用前ニ同シ

肉豆冠華 (*Mucis*)

肉豆冠華ハ東印度ニ産スル肉豆冠科中ノ「ミリ  
スチカ」ニリマキフラグラシス冠樹ノ子實ノ外皮ヲ採  
テ藥用トナス者ナリ之ヨリ製シタル油ヲ肉豆  
冠華油 (*oleum Mucidis*) ト名ツク之ヲ白糖ニ和

スル者ハ他ノ健胃藥ニ伍シ用フルニ便ナリ又

肉豆冠華酎 (*Tinct. Mucidis*) ハ肉豆冠華一分ヲ酒

精五分ニ漬メ製シタル赤黄色ノ酎劑ナリ三十

滴乃至四十滴ヲ以テ服量トス

益智 (*Fructus Cardamomi minoris*)

益智ハ抹刺拔兒産ノ薑科ニ屬スル「エレッタリヤ」  
スタタミナ

カルダモムムノ子實ナリ通常他藥ニ伍シテ製

劑トナレ用フ例之ハ香竈酎後條ニナリノ如シ  
攝度亞里根 (*Chusoma Ziboniana*)

東印度産ノ薑科ニ屬スル「ケルケマ」セドアリ

鬱金ノノ根ニシテ諸種ノ製劑殊ニ驅風劑ニ加  
一 種  
ヘテ用フ乃チ内服ニハ其〇五瓦(八〇)乃至一瓦  
(十六〇)ヲ取リテ散劑或ハ浸劑等トナシ與フハ  
シ

干姜 (*Zingiber officinale*)

干姜ハ熱國ニ産スル薑科ノ一種ニシテチンギ  
ベリス、ファイシナリスノ根ナリ日常香椒ノ料ト  
シテ食饌ニ具ヘ又香竈酎ニ加、或ハ干姜酎法製  
ニ同シトナシ藥用ニ供ス就中干姜酎ハ一次ニ  
二十滴乃至三十滴ヲ與フハシ

良薑 (*Alpinia galangana*)

良薑ハ支那産ノ薑科ニ属スルエピニア、ファイシ  
ナルムノ根ナリコレ亦香竈酎ノ料トス

華尼刺子 (*Struthium Vanillae*)

華尼刺ニラハ亞米利加州ノ暖地ニ産スル蘭科中ノ  
蔓草ニメワニルラ、プラニホリヤノ子實ナリ其  
穀ニ結晶性ノ効分ヲ含メリ之ヲ華尼里涅ニラト名  
ソク又此子實ヲ以テ左ノ製劑ヲ作ル

○華尼刺酎 (*Sinct. Vanillae*) 華尼刺一分ヲ酒精

五分ニ浸漬メ製スル者ナリ三十滴乃至六十滴

ヲ以テ一次ノ服量トス

○加糖華尼刺散 (*Vanilla saccharata*) 華尼刺子  
細判ス一分ニ上好白糖九分ヲ合シ研末シテ製  
ル者 灰白色ノ粉末ナリ此劑ハ他ノ油糖劑ト同シ  
ク散劑トナシテ與ヘ或ハ丸劑ノ衣ト為スヘシ  
往時ハ華尼刺ニ生殖器ヲ衝動興奮スルノ性アリ  
トシテ間之ヲ催春藥トシテ用ヒタリ

芸香 (*Galie Scutae*)

芸香科ノ一種ルタグラダラレンスノ葉ヲ採テ  
藥用ニ供ス此藥ハ殊ニ其中ニ含メル揮發油ニ

由テ通經ノ効アリ服量ハ芸香葉十瓦(三弓弱)ヲ  
水百五十瓦(五号)ニ浸出シ與フヘシ其他芸香ニ  
ハ耳質<sup>ルチ</sup>涅<sup>チ</sup>ト唱フル一種ノ結晶分ヲ含ムト雖モ  
此成分ハ恐クハ復特別ノ効用ヲ有スル者ニ非  
ス

薩昆那葉 (*Summitata Sabinae*)

薩昆那ハ松栢科ニ屬スルサビナヲスイシナリス  
ト名ツクル灌木ニシテ其嫩葉ノ尖ヲ摘テ藥用  
トス其中ニ一種ノ揮發油ヲ含メリ之ヲ薩昆那  
油ト名ツケテ共ニ藥用ニ供ス性酷烈ニシテ

多服スレハ胃嫩衝吐逆瀉下血尿及ヒ膀胱加答  
流ヲ發ス就中骨盤内ノ諸臟ヲ甚シク刺衝シテ  
其充血症ヲ發セシムル者ナリ故ニ多クハ之ヲ  
通經劑或ハ墮胎藥トシテ大ニ賞用セリ但シ主  
治適中ノ症ニ於テ適宜ニ之ヲ用フルキハ頗ル  
亦偉効ナシトセス

〔用量〕

薩毘那葉ハ丸散若クハ浸劑トナシテ〇三瓦(五  
ル)乃至一瓦(十六ル)宛日一數回之ヲ與フヘシ又  
其油ハ半滴乃至一滴ヲ以テ服量トス

○薩毘那熱 (*Cata Sabinae*) 薩毘那葉二分ニ酒  
精常水各六分ヲ注キテ浸出スルヲ二十四時間  
搾リテ其液ヲ取り更ニ酒精常水各三分ヲ其渣  
滓ニ加ヘ浸出シテ搾ルヲ又前ノ如クシ前後ノ  
液ヲ合シ煮テ第二稠ノ熱劑トナス綠褐色ニシ  
水ニ和スレハ微渾濁ス内服ニハ〇〇五瓦(一ル  
弱)ヨリ〇二瓦(三ル)ヲ極量トス

○薩毘那軟膏 (*Unguentum Sabinae*) 薩毘那熱  
一分ヲ取り單蠟膏九分ニ煉和スル者ニシテ刺  
戟ノ性アリ



又家畜醫ノ專ラ用フル葛兒里那根 (*Senecio*  
*Carolinæ*) ト唱フル者ハ聚成花科ニ屬スル「カ  
ルリナ、アカウリス」ノ根ニシテ効用薩毘那ニ  
類似ス其効分ハ揮發油及ヒ樹脂質ナリ

○石腦油 (*oleum Petreæ Stalvianæ*) 地下ニ在  
ル植物質ノ分解シテ生スル者ニシテ地下ヨリ  
涌出ス此物ハ數種ノ抱水炭素質ノ多クハ油性相  
合シテ成ル者ナリ所謂分析的蒸餾ノ法ヲ用フ  
ル片ハ又漸クニ此成分ヲ一々分ツテ得ヘ  
シ乃其家初ニ餾出スル者ヲ石油依的兒 (*Petroleum*

*Petroli*) ト名ツク極メテ揮發ニシテ甚ク焚ハ  
易キ無色ノ液ナリ多クハ亞米利加産此二物共  
ニ傳麻質斯性ノ諸患虚性ノ焮衝例之ハ凍瘡等  
ニ擦劑トシテ外用ス就中生石腦油ハ專ラ之ヲ  
家畜科ニ用フ其他又石油依的兒ハ局處ノ鎮痛  
藥トシテ用フルコアリ

○以上開載セシ所ノ諸藥品ヲ配伍シテ製スル  
者數種アリ今之ヲ左ニ揭示ス

(一) 香竇醋 (*Essentia aromatica*) 迷迭香油 杜  
松子油 枸橞油 各一分 捲埤兒油 二分 丁子油 五

分。桂皮耐百分。香竈耐五十分。稀醋酸二百分。及  
ヒ 錮水一千分。右混和シテ冷處ニ静定スル  
三日濾過シテ其液ヲ取リ瓶中ニ貯フ透明赤  
褐色ノ液ニシテ甚タ佳香アリ洗劑或ハ薰劑  
トソ用フ

〔三〕香竈醋酸 *Spiculum acetum aromaticum* 丁子  
油九分。刺賢堊兒油。枸橼油各六分。弊瓦没篤油。  
捲堊兒油各三分。及ヒ桂皮油一分。醋酸二十  
五分ニ和ス透明ニシテ黄褐色ノ者ヲ佳トス  
此劑ハ特ニ嗅藥或ハ薰藥トノ用フ

〔三〕香竈露水 *Aqua aromatica* 散爾比亞葉四  
分。迷迭香葉。薄荷。刺賢堊兒花各二分。小茴香。唐  
桂皮各一分ヲ取リテ酒精二十六分及ヒ常水  
百三十分ヲ以テ浸漬スル。二十四時間之ヲ  
蒸餾シテ露水七十分ヲ製ス

〔四〕酒製愈創水 *Aqua cubana spiritosa* 薄荷。  
迷迭香葉。芸香葉。散爾比亞葉。亞爾鮮葉及ヒ刺  
賢堊兒花各一分ヲ取リ稀酒精十八分及ヒ常  
水五十分ニ浸漬スル。二晝夜間之ヲ蒸餾ノ  
藥液六十六分ヲ製ス微渾濁ノ液ニシテ香氣

竈烈ナリ

〔五〕香竈硬膏 (*Empellatum aromaticum*) 黃蠟三十  
 二分、牛脂二十四分、帝列並底那八分ヲ取り溶  
 解セシメ半ハ凝泣スルニ及テ肉豆寇油六分、  
 阿<sup>リ</sup>拔<sup>バ</sup>奴<sup>ヌ</sup>末十六分、安息香末八分、薄荷油、丁  
 子油各一分ヲ捏和シテ杆トナシ蠟紙ニ包ミ  
 貯<sup>フ</sup>

〔六〕拔爾撒母油合劑 (*Martina oleo-sabianca*) 刺  
 賢<sup>ト</sup>堙<sup>ト</sup>兒<sup>ト</sup>油、丁子油、桂皮油、捲<sup>ト</sup>堙<sup>ト</sup>兒<sup>ト</sup>油、枸<sup>ト</sup>櫞<sup>ト</sup>油、肉豆  
 寇<sup>ト</sup>華<sup>ト</sup>油、橙<sup>ト</sup>花<sup>ト</sup>油各一分、百露拔爾撒母三分、酒精

二百四十分右混和シ時々振盪シテ冷處ニ放  
 置スル<sup>ト</sup>一<sup>ト</sup>二<sup>ト</sup>日濾過シテ其液ヲ取り穢中ニ  
 固封シ貯<sup>フ</sup>黄褐色ニシテ透明ノ者ヲ佳トス  
 擦劑トシテ外用スルニ宜シ

〔七〕芳香散 (*Salvia aromatica*) 桂皮末五分、益智  
 末三分、及ヒ干姜末二分ヲ研和スル者ナリ他  
 ノ散劑ノ佐藥トシ用<sup>フ</sup>

〔八〕香竈劑劑 (*Species aromatica*) 薄荷、迷迭香葉、  
 捲<sup>ト</sup>堙<sup>ト</sup>兒<sup>ト</sup>末、沃刺那、刺賢堙兒花各二分、丁子、華澄  
 茄各一分ヲ細判シテ混和スル者ナリ蒸漏劑

トシ或ハ乾蒸劑トシ用フ

〔九〕香竈酎 (*Sinct. aromatica*) 桂皮四分、益智、丁子、良薑、干姜各一分ヲ取り搗碎シテ稀酒精五十分ニ浸漬シ以テ酎劑トナス者ナリ赤褐色ノ品ヲ佳トス二十滴乃至三十滴ヲ一服ノ量トス

〔十〕酸性香竈酎 (*Sinct. aromatica acida*) 製法前ニ同シ但豫メ酒精五十分中ニ純硫酸二分ヲ加フルノ差アルニ此酎八十滴乃至十五滴ヲ取り粘滑液ニ和メ日ニ數回之ヲ與フヘシ

〔十一〕香竈酒 (*Vinum aromaticum*) 香竈劑藥二分ヲ取り酒製癒創水五分及ヒ上好赤葡萄酒十六分ニ浸漬スルヲ八日間搾リテ液ヲ取り濾過シテ貯フ透明ニシテ赤褐色ノ者ヲ佳トス蒸溜劑等ノ料トス

其他玫瑰油 (*Essen. Roseum*) 及ヒ橙花油 (*Essen. Styracis*) ヲ軟膏等ニ加ヘテ之ニ佳香ノ添ルヲアリ其分量ハ大約此油一滴ヲ取リテ膏藥三十瓦ニ和スル者ナリ就中橙花油ハ所謂ル橙花水中ニ存スル者ニシテ此水劑ハ

常ニ他ノ衝動藥ニ伍シテ佐藥トナシ或ハ他ノ合劑ニ加ヘテ香料トナシ用フ又此水劑ニ白糖ヲ加ヘ煎熬スル者ヲ橙花舍利別 (*Syrupus aurantii Stomaci*) ト名ツク其他橙皮油 (*Oil aurantii Corticis*) ハ薄荷油ト同シク内服ニ供スル者ナリ

右ニ舉ル所ノ揮發油ハ多クハ皆油糖劑トナシテ諸散劑ノ調味料トスル者ナリ乃チ油一滴ヲ取リ白糖二瓦(三十二匁)ニ和スルヲ法トス揮發油劑ノ外尚護謨華兒斯性ノ者數種アリ即

子之ヲ左ニ舉ク

阿魏 (*Asa foetida*)

阿魏ハ包社國應儒河ノ近邊等ニ生スル繖頭花科ノ一種スコロドスマ、*Scorodolium*ノ根ヲ鑽刺シテ滲出セル護謨華爾斯ノ凝固セシ者ナリ其中ニ含メル揮發油ハ臭氣甚ク惡ムヘクシテ恐クハ大蒜中ニ在ル者ト同一物ナルヘシ此藥ハ古來專ラ併私底里性ノ痙攣ニ賞用シ其外他ノ痙攣諸症ニモ亦之ヲ用ヒタリ然レモ近今ニ至リ併私底里ノ諸症ハ大概攝生不良、貧血、殊ニ婦人

生殖器ノ病的變狀例之ハ充血。子宮變位或ハ其  
屈曲潰瘍。加答流及ヒ卵巢焮衝等ニ起因セル  
ヲ發明セシ以來ハ治法モ亦隨テ一變セシカ故  
ニ婦人科ニ於テ阿魏ヲ用フルト大ニ廢レタリ  
然レモ原<sup>モト</sup>此藥ハ無害ノ品ニシテ且世醫ノ普ク  
賞用スル所ナレハ其主治ノ症ニ之ヲ灌腸劑ト  
シテ用フルヲ良トス乃チ阿魏五瓦乃至六瓦(大  
約四刃乃至一刃半)及ヒ蛋黃一個ヲ水百瓦(三  
半ニ溶和)其半劑ヲ取テ一回ノ灌腸トスヘシ  
其他阿魏耐<sup>(Tinct. olear. foetidae.)</sup>ハ阿魏一分ヲ酒

精五分ニ漬メ耐劑トナス者ナリ赤褐色ニシテ  
微黃色ヲ帶フル品ヲ佳トス。服量ハ二十滴ヨリ  
六十滴ニ至ル。又阿魏併私底里水<sup>(Squae foetidae)</sup>  
<sup>(antihystrica.)</sup>此品ハ瓦爾拔奴謨八分。阿魏十二分。  
沒藥六分。纈草。攝度亞里根各十六分。白芷四分。薄  
荷十二分。捲埵兒。羅瑪加密列各八分。及ヒ河狸香  
一分ヲ列篤爾多ニ納レ稀酒精百五十分ヲ注キ  
浸漬スルヲ二十四時間ニシテ更ニ常水三百分  
ヲ加ヘ蒸餾シテ三百分ノ藥液ヲ製ス。用量ハ數  
茶匙ヲ與フベシ。又阿魏硬膏<sup>(Emplastum olear.)</sup>

阿魏耐  
阿魏硬膏

其稍冷ユルヲ炭テ阿魏末六分護謨暗謨尼亞二分ヲ和シ更ニ之ヲ帝列並底那四分ニ溶和セル者ナリ

瓦爾拔奴謨 (*galbanum*)

瓦爾拔奴謨ハ包社國ニ産スル繖頭花科ノ「エリ」ラ、エリュベツセンスノ莖ヨリ滲出スル脂ヲ精製セシ者ナリ帶綠黄色或ハ帶黃褐色ノ凝塊ニノ揮發油ヲ含メリ此物婦人ノ生殖器ヲ興奮スルノカアルヲ以テ殊ニ之ヲ月經不順ノ症ニ稱用

セリ乃チ其〇。二瓦(三〇)乃至一瓦(十六〇)ヲ取リテ丸劑若クハ乳劑トシテ與フ又瓦爾拔奴謨加泊夫監硬膏 (*Emplastum Galbani crocatum*) ト唱フル品ハ密陀硬膏二十四分黃蠟八分ヲ熔融シ其稍冷ユルニ及テ精製瓦爾拔奴謨二十分熔融セル帝列並底那六分ヲ加ヘ次ニ泊夫監一分ニ少許ノ酒精ヲ合セシ者ヲ加ヘ捏拌メ之ヲ製ス此硬膏ハ刺戟興奮ノ効アルヲ以テ方今ニ至リテモ尚往々之ヲ醫用ニ供ス

護謨暗母尼亞 (*Ammoniacum*)

是レ亦色社國産ノ繖頭花科中ノ「ドレマ」アムモ  
ニアムムノ脂ナリ黄褐色ノ凝塊ニシテ臭味甚  
ク悪ク猶大蒜ノ如シ之ヲ温ムレハ必ス軟解ス  
氣道ノ粘膜及ヒ其筋組織ヲ衝動スルノ性アリ  
丸劑トナレテ一度ニ〇。二瓦(三瓦)乃至一瓦(十六  
瓦)ヲ與、又護謨暗母尼亞硬膏 (*Emplastum communi*)  
ハ常ニ藥舖ニ備フル者ナリ此品ハ黃蠟、松脂  
各四分ヲ熔和シ布ヲ以テ濾過シ其稍冷ユルヲ  
埃テ精製護謨暗母尼亞六分ト精製瓦爾板奴謨  
二分トヲ取り帝列並底那四分ニ溶和セル者湯重

鍋ヲ用テ加ヘ捏攪シテ之ヲ製ス此硬膏ハ分解  
ノ効ヲ有ス

沒藥 (*Myrrha*)

沒藥ハ亞刺比亞産ノ灌木ニシテ「ブルセラ科」ニ  
屬スル「バルサモデンドロン」エーレンベルギア  
ヌムノ脂ナリ色赤褐ニシテ光澤アリ味苦クメ  
窟透ノ香氣ヲ有ス衝動ノ性强クメ之ヲ服スレ  
ハ消食器及ヒ心臓ヲ侵スト猶他ノ辛温諸藥ニ  
異ナラス若シ其多量ヲ服スルカ如キハ時トノ  
又吐血ヲ起スニ至ルコトアリ然レハ通例ハ只胃



腸粘膜ノ分泌ヲ進メテ榮養ノ機能ヲ扶クル者ナリ  
株祿弗氏ノ又斐兒篤氏ノ試験ニ依レハ没藥耐三十滴ヲ服セシムル中ハ白血球ノ數增多  
ノ平均常量ノ四倍ニ至ルヲ徵知セリト云フ  
且此試験ヲ行フテ前後都テ五回ニ及ヒシニ皆殆ント同一ノ成績ヲ見タリト云フ是ヲ以テ觀  
レハ没藥ハ健康體ニ於テ血液ノ製造ヲ司ル腺ノ機能ヲ亢進スルヲ明カナリ蓋シ往昔ヨリ萎黃病ニ没藥ヲ用フル者ハ唯其實驗ニノミ據ル所ト雖モ亦能ク此理ニ暗合セリ然レモ方今ニ

至テハ其用稍廢レタリ

**用量**

没藥ハ丸劑若クハ散劑トナシテ〇二瓦

(三瓦)乃至一瓦(十六瓦)ヲ與フヘシ没藥熬(Pole. ofp.)

捣碎セハ没藥ル者一分ヲ錫水五分ニ漬ス二

日間時々攪拌シテ濾過シ其液ヲ煎熬シテ第三

稠ノ熬劑トナス者ナリ赤褐色ニシテ稍黃色ヲ

帶フ〇三瓦(五瓦)乃至一瓦(十六瓦)ヲ以テ服量ト

ス又没藥耐(Sinct. ofp.)ハ没藥一分及ヒ酒

精五分ヲ以テ製ス赤褐ニシテ帶黃色ノ者ヲ佳

トス用量ハ三十滴乃至四十滴ヲ與フベシ屢之



分泌物アリ其量大約二三瓦ヲ容ル香氣峻烈ニシテ脂肪様ノ光澤アリ乃チ之ヲ取テ精製シ再々其囊ニ納ムルノ故ノ如クシテ之ヲ販賣ス此麝香ニ二種アリ一ヲ支那産トシニヲ吐番産トス共ニ藥用ニ備フ成分ハ河狸香ニ同シ

〔主治〕 一ハ熱性病ノ將ニ衰脱ニ陥ラントスル者例之ハ茅扶斯、喉衝及ヒ急性發疹病等ニ於テ有効ノ興奮藥トナセリ乃チ之ヲ與フル時ハ一時危急ヲ凌キ本病ヲシテ善候ヲ呈ハスニ至ラシムル者ナリ 二ハ諸器ノ痙攣症ニ効アリ就中

ラリシギスムニス。ストリダルス即チ小兒ノ聲門痙攣ニ於テ大ニ聲譽アリ

都テ麝香ヲ處スルニハ宜シク時期ヲ晚ル可ラス又少量ニ失スルヲ勿レ

〔用量〕 多クハ單味ヲ白糖ニ和シテ散藥トナシ用フ但シ其香分ノ揮散脂肪質及ヒ揮發油分ノ浸潤ヲ防カンカ為ニ必ス蠟紙ニ包テ之ヲ與フハニ初生兒ハ大約〇。一五瓦(四分ハ)ニ乃至〇。五瓦(一ハ)弱宛日ニ數回之ヲ與ヘ大人ニハ〇。二瓦(三ハ)強乃至〇。五瓦(八ハ)ヲ以テ服量トナ

スベシ又時宜ニ由テハ内服ヨリモ灌腸劑トシ  
テ用フルノ優レルトアリ是時ハ右ノ分量ヨリ  
モ較大ナルヲ要ス然レ其價甚タ貴キカ故ニ  
多クハ斯ノ如キ多量ヲ用フルト能ハサルナリ  
其他麝香耐 (*Sinct Moschi*) ハ麝香一分。餉水二  
十五分ヲ注キ精細ニ研和シテ後稀酒精二十五  
分ヲ加ヘ浸漬シテ製シタル赤褐色ノ液ナリ此  
耐劑モ亦臨時適用ノ良劑ニシテ服量ハ三十滴  
乃至六十滴ヲ以テ常トス

第三 緩和藥 (*Emollentia*)

往時ハ此種類ニ屬スル藥物頗ル多端ナリシモ  
方今ニ至テハ其數大ニ減少セリ但シ此種類ノ  
藥物中自ラ其性情ノ相異ナル者アルヲ以テ更  
ニ之ヲ細別シテ三類トス乃チ其第一類ノ品ハ  
之ヲ搗碎シテ水ニ攪和スル時ハ真乳劑又種子  
乳劑ト名ツクル一種ノ乳樣液ヲ生スル者ナリ  
第二類ノ品ハ即チ固性油ニシテ苛烈ノ性ナキ  
者ナリ通常或ハ之ヲ單用シ或ハ之ニ乳化物油  
加フル性アル者例之ハ護護ノ如キ是ナリヲ加ヘ

乳劑トナシテ用フルヲ多シ又第三類ノ品ハ頗ル許多ニシテ都テ護膜質及ヒ粘液分ヲ溶出シ得ヘキ植性品及ヒ水ニ浸漬シ又之ヲ煮ルルハ醇爛スルノ性アル者皆之ニ属ス

此種ノ藥物類ハ皆適當ノ方劑ニ作リテ之ヲ局處ニ用フレハ宛モ一層ノ被膜トナリ若シ小表皮ノ剥脱セル者ニ於テハ之ニ代リテ其部ノ神經末梢ヲ益護シ以テ分泌液及ヒ外来物ノ為ニ起ル所ノ刺シキ刺戟ヲ緩解スル者ナリ其他又嫩衝ニ由テ組織ノ腫脹スル者ニ於テ此包攝軟

和及ヒ滋潤ノ劑ヲ貼スルルハ著シク其刺戟ヲ減殺スル者復疑ヲ容レサル所ナリ又例之ハ皮嫩衝咽頭嫩衝結膜嫩衝等ノ如キ外表ノ病ニ於テハ其病症ノ經過ト藥物ノ効用トノ景況ヲ直チニ目撃シ得ヘキ者アリ今其經驗ヲ以テ推スルハ他ノ組織ト雖モ其造構同一ナル者ニ於テハ必ス亦同一般ノ景況ナカル可カラス乃チ緩和藥ハ内服シテ腸管呼吸器及ヒ泌尿器ノ嫩衝性諸症ニ屢偉効アル者ハ蓋シ之ニ因ルナリ抑モ緩和藥ノ腸中ニ効ヲ奏スル所以ハ甚タ簡

易ナルヲ以テ又輒スク其理ヲ了解スヘシ例之  
ハ今加答流ニ由テ胃腸粘膜上ノ表皮剥脱スル  
ルハ其腸内ニ既ク消化諸液ノ絶エス劇シキ刺  
戟ヲ起スニ由テ遂ニ腸ノ蠕動機ヲシテ非常ニ  
亢進セシノサルヲ得ス是時ハ必ス其疝痛ヲ發  
スルト下利ヲ起ストニ由テ之ヲ徵知スヘキナ  
リ故ニ此症ニ於テ扁桃乳若クハ沙列布煎等ノ  
緩和藥ヲ真フルルハ概子其諸症ノ大ニ緩解ス  
ルヲ見ルヘシコレ他ナレ其護謨様ノ越繆兒失  
涅油分細分者又ハ植性ノ粘液腸管ノ剥脱面ニ

疑着シ之ヲ包攝スルニ由テ其良効ヲ奏スルノ  
外ナキナリ  
呼吸器ノ諸病ニ於ケル緩和藥ノ効用ハ猶右ニ  
說所ト畧相似タリト雖モ是レ亦全ク同一様ト  
ハナシ難シ乃チ夫ノ俗間ニハ喉頭及ヒ氣管支  
ノ嫩衝ニ於テ乳劑及ヒ他ノ緩和藥ヲ大ニ賞用  
スト雖モ蓋シ其理ニ於テハ未タ確實ナラサル  
所トス抑緩和藥ヲ嚥下スルルハ粘滑物必ス喉  
頭ノ上際ヲ經テ食道ヨリ胃中ニ達スルナリ此  
時粘滑物ノ一分自ラ沿路ノ周圍ニ疑着シテ其

文獻醫學 卷之二 五十六

部ノ病的感覺喉頭及ニ氣管支嫩衝ハ大概咽喉者ナリ於テ傷破スルカ如キヲ覺フル者ナリ一時咳嗽ヲ止ムルヲ得ヘシ然レモ其藥物ノ全量ハ直チニ胃ニ下ルカ故ニ一旦血中ニ吸攝セラレ後始テ其効用ヲ呼吸器ノ粘膜上ニ顯ハサルヲ得ス然ルニ又爰ニ一大疑問アリ乃チ緩和藥ノ性タルヤ多クハ之ヲ腸中ニテ吸收スルヲ甚ク少ク或ハ其全ク吸收セサル者ナリ又假令其僅カニ吸收スルモ全ク變化セステ直チニ呼吸器ノ神經或ハ粘膜ニ達スルノ理ナカルヘレ例之ハ固性油ノ

如キ假令其實ハ之ヲ血中ニ吸攝スト雖モ復此ノ如キ迂遠ノ道路ヲ經テ後チ再ヒ局處ニ於テ緩和包攝ノ効ヲ呈ハシ得ヘキヤ未タ甚ク疑ヲ免レス果シテ然ルカ如キハ又古來生理說ト全ク齟齬スルニ似タリ  
緩和藥ノ泌尿器上ニ於ケル作用モ亦之ト同一般ナル者ナリ即チ扁桃乳及ヒ亞麻仁煎ハ當今ト雖モ尚腎臟或ハ尿道ノ急性嫩衝諸症ニ於テ之ヲ用ヒ而シテ其効用モ亦粘膜上ニ凝着シテ一種ノ被蓋トナリ以テ酷烈ナル尿ノ刺戟ヲ包

攝スル者ナリト云フ然レ其其實ハ果レ然ル  
ヤ否ヤ甚タ之ヲ信シ難シ蓋シ恐クハ其粘液分  
或ハ細分セル油質ニ由テ斯ク著シキ効用ヲ呈  
ハス者ニ非ス畢竟其乳劑ト共ニ多量ノ水ハ血  
中ニ入ルト其服藥ノ為メニ患者ノ食量ヲ減シ  
テ自然其攝生ニ當ルトニ由ル者ナランカ然レ  
氏綴令其奏効ハ何的ノ作用ニ由ルト雖モ凡テ  
緩和ノ液劑ハ之ヲ泌尿器及ヒ生殖器ノ刺戟性  
諸症ニ用ヒテ屢偉効アルト又其時トノハ微便  
秘ヲ起スノ外殆ト他ノ害ナキヲハ固ヨリ其疑

ヲ容レサル所ナリ

甘扁桃 (*Smygdalae dulcis*)

地中海近地ニ産スル扁桃科ノ一種「アミグダリュ  
ス」コムムニスノ仁ヲ採テ藥用ニ供スル者ナリ  
其成分ノ主タル者ハ固性油及ヒ越繆兒矢涅是  
ナリ

〔用量〕

甘扁桃ハ大抵必ス乳劑トナシテ用フ即  
チ其二十瓦(大約六号)乃至三十瓦(大約一号)ヲ取  
リ皮ヲ去リ搗碎シテ十倍ノ水ヲ注キ能ク之ヲ  
播磨シテ布ニテ濾過シ此液ニ扁桃舍利別及ヒ



苦扁桃水少許ヲ加ヘテ其味ヲ調ヘ更ニ適宜ノ水ヲ和シテ稀釋シ以テ内服ニ供ス之ヲ扁桃乳ト名ツク

○扁桃油 (*Oleum amygdalorum*) 此油ハ油質ヲ含

ムコ多クシテ空氣ニ觸ル、モ乾固セス又寒冷ニ遇フモ凍結スルコトナシ此品モ亦乳劑ニ製ス

藥舖ニ之ヲ油製乳劑 (*Emulsio Oleae*) ト名ツク

他ノ油類ヲ用ヒテ製スル者ハ必ス別ニ其油乳劑ト稱シテ之ヲ別ツ 即チ甘扁桃油二分、護謨一分、水十二分ヲ以テ製スル者ナリ

○複方扁桃乳 (*Emulsio amygdalorum composita*)

菲沃斯子一分、甘扁桃仁四分ニ稀扁桃水六十四分ヲ注キ研和シテ乳劑トナシ白糖六分及ヒ煨麻屈涅矢垂一分ヲ加ヘテ製スル者ナリ呼吸器加答流ノ症ニ於テ一茶匙宛一時毎ニ之ヲ服用セシム

嬰粟子 (*Jomon Japonensis*)

嬰粟科中ノ「パパ」ルソムニズルムノ種子ナリ其成分ハ甘扁桃仁ト一樣ニシテ主治用量共ニ亦之ニ同シ其他之ヨリ搾出セル嬰粟油モ亦藥用ニ供スヘシ

罌粟子ハ微麻酔分ヲ含ムト雖モ其量極ノテ  
如微ナルヲ以テ亦意トスルニ足ラス

○麗春花 (*Storax Rhoadesii*) モ亦此種ニ属スル  
者ニシテ即チ同科中ノ「パパブル」レアス麗春花  
花ナリ通例舍利別トナシ用フ即チ新鮮麗春花  
十二分ニ熱湯二十分ヲ注キ浸漬スル一  
ニシテ輕ク絞リ濾過シテ其液二十分ヲ取リ之  
ニ上好白糖三十六分ヲ和シテ製ス濃紅色ノ者  
ヲ佳トス

亞麻仁 (*Semen Linii*)

亞麻科中ノ一種リヌムウシタチシム亞麻ノ種  
子ナリ此物ハ右ニ舉クル二品ニ比スレハ價廉  
ニシテ且緩和性ノ粘液分ヲ含ムト多ケレハ其  
用又遙カニ之ヨリ優レリ内服ニハ搗碎セル亞  
麻仁大約二十五瓦乃至五十瓦七弱乃至十四  
瓦弱ヲ取り水一瓦黎瓦黎瓦ハ容量ノ名細水千ヲ以テ  
煎シテ内臟殊ニ泌尿器粘膜ノ急性焮衝ニ與ヘ  
又外用ニハ之ヲ搗碎シ蒸漏劑トシテ用フヘシ  
但シ此蒸劑ノ本旨ハ温和ト濡潤トニアリ其温  
度ハ患者ノ能ク之ニ堪ヘ得ルヲ以テ適度大抵

ノ五十度ヲ以テ適宜トス

但シ此蒸漏劑ハ速カニ冷却シ易キヲ以テ宜シク大量ノ亞麻仁ヲ布袋ニ包ミ温湯ニ浸シ其薄キモ大約一拇指横徑ノ者ヲ用フヘシ是時ハ先ツ蠟布ニテ之ヲ覆ヒ更ニ毛布或ハ綿花ニテ其上ヲ被覆シ以テ温氣ノ飛散ヲ防ン

トヲ要ス  
往時ハ亞麻仁ヲ搗碎セル者ヲ亞麻仁粉ト名ツケテ藥舖ニ備ヘタリ方今ハ之ニ代フルニ亞麻仁餅 (*Macarta Seminis Linis*) ヲ以テス此品ハ亞

麻仁ヲ搗碎シテ其油ヲ搾リ去タル者ナレハ之ヲ蒸漏劑トナスキハ猶<sub>ト</sub>亞麻仁粉ノ如ク温濕ニ遇フモ速カニ變敗スルノ憂ナキヲ以テ之ニ優レリトス

○亞麻仁油 (*Olum Linis*) ハ此油ヲ石灰水ト攪和シ諸般ノ湯瀝火傷ニ於テ劇易ノ差別ナク專ラ之ヲ賞用ス即チ亞麻油石灰水各等分ヲ取リ之ヲ攪和スルキハ一種緩和清涼ノ塗附藥ト成ル又硝酸銀一瓦(十六分)ヲ少許ノ水ニ溶解シ之ヲ三百瓦(十号)ノ亞麻仁油ニ和スル者モ火傷ニ

塗敷シテ大ニ賞賛ス

○加硫亞麻油 又硫黃拔爾撒母 (*Oleum Sini sulphuratum*, *Balsamum Sulphuris*) ハ亞麻仁油六分ヲ  
潤キ鉄鍋ニ内レ硫黃華一分ヲ加ヘ篋ヲ以テ頻  
リニ攪拌シ煮テ好ク合和セシムル者ナリ但シ  
此劑ヲ製スル中ハ豫シノ用意シテ鍋中ノ沸溢  
ヲ防クニ要アリ粘稠赤褐色ノ液ニシテ帝列並  
油ニハ全ク溶解ス擦劑トシ或ハ繃帶藥トシ用  
フ

大麻子 (*Fructus Cannabis*)

獨逸國ニ産スルワルナセ苧麻科中ノカシナビス。サチグ  
麻ノ子實ニシテ其成分ハ右ニ舉クル二品ト全  
ク相同シ大麻子ノ乳劑ハ殊ニ急性ノ痲疾ニ於  
テ大ニ賞用セリ然レモ其効實ニ他ノ乳劑或ハ  
之ト同量ノ單水ヲ與フルヨリモ勝レル者ナル  
ヤ未ク之ヲ決定シ難シ又用法及ヒ分量ハ全ク  
甘扁桃仁ニ同シ右ニ舉クル四品共ニ若シ其久  
シク貯ヘタル陳腐ノ品ヲ以テ乳劑ヲ製スルモ  
ハ其臭味甚ク嫌惡スヘク且消化機ヲ損害シテ  
下利ヲ起スノ性アル者ナリ

里古ト曹母 (*Lycopodium*)

歐羅巴ノ北地及ヒ内地ニ生スル石松科ニ屬スルリコポヂウム。クラフトムノ穂ニ小キ腎臟形ノ蒴アリテ其中ニ無數幻微ノ種粉ヲ含メリコト即チ里古ト曹母ナリ至微至細ノ粉末ニレテ之ヲ指間ニ捻スレハ滑ラカニ且皮膚ニ粘着シ易シ其成分ニハ固性油粘液分及ヒ他ノ中和性ノ質ヲ含メリ  
往時ハ里古ト曹母ヲ以テ殊ニ尿管ノ刺戟性諸症ニ賞用シ其他呼吸器及ヒ消化器ノ疾病ニモ

亦之ヲ用ヒタリ即チ其用法ハ概子護謨及ヒ水ヲ加ヘテ研和シ乳劑ト為シテ之ヲ與ヘシナリ又當令ニテハ例之ハ會陰鼠蹊及ヒ婦人ノ乳房等ノ如キ相觸レ易キ部ノ皮膚濕爛ニ於テ撒布藥トナシ用フルノ屢之アリ

阿襪列油 (*Alum Chiroum*)

阿襪列油ニ二種アリ一ヲ上好阿襪列油 (*Al. Chir. Optimum*) ト云ヒニヲ尋常阿襪列油 (*Al. Chir. Commune*) ト云フ共ニコレア。ヲイロペアノ子實ヨリ採リタル油ニシテ其價ノ廉ナルカ故ニ屢

油製乳劑トシテ内服ニ供スルコトアリ此劑ハ即  
 キ上好阿列襪油五瓦(四瓦)亞刺比亞護謨二瓦半  
 (二瓦)及ヒ水百五十瓦ヲ以テ製ス但シ上好  
 ノ品ト雖モ亦動モスレハ變敗スルコトアルヲ以  
 テ阿列襪油ハ概子唯軟膏或ハ塗藥トナシテ外  
 用ニ供スルヲ佳トス  
 阿列襪油ノ全身浴ハ歇頓刺氏冷水浴ノ如ク  
 湯潑火傷ノ部位潤キ者ヲ絶ヘス此中ニ浴セ  
 シムレハ甚ク偉効アリ維斯列耳氏ハ此浴法  
 ヲ以テ其効大ニ冷水浴ニ優レリト云ヘリ

亞刺比亞護謨 (*Summa arabicum*)

亞弗利加洲ニ産スル諸種ノアカシヤ樹ノ脂ニ  
 シテ夏日其幹ヨリ自ラ滲出シ或ハ其皮ヲ鑽刺  
 シ滲出スル所ノ液ヲ取りテ之ヲ凝固セシムル  
 者ナリ亞刺比亞護謨ハ亞刺賓酸ト石灰苦土及  
 ヒ加里ノ抱合セル者ニシテ其酸ハ或ハ之ヲ亞  
 刺比涅トモ名ツク即チ一種ノ抱水炭素質ナリ  
 亞刺賓酸ハ之ヲ腸中ニテ吸收スルコト甚タ僅カ  
 ニシテ粘滑包攝ノ性ヲ有スル者ナリ故ニ單味  
 或ハ油製乳劑ニ加ヘテ之ヲ醫用ニ供スル者猶

他ノ緩和藥ノ如シ即チ護謨一茶匙ヲ取り一盞ノ水ニ溶解シ日々數回之ヲ與フヘシ此方ハ極メテ簡便ニシテ腸ノ加答流諸症ニ甚タ良効アリ

其他此護謨ハ腸中ニ入ルモ甚タ吸收シ難キカ故ニ之ヲ他ノ諸藥ニ伍用スルホハ其主藥ヲ久シク胃腸内ニ停留セシメ以テ局處ノ効用ヲ助クル者ナリ

製劑

(一) 護謨漿 (*Mucilage Gummi*) 此劑ハ單適宜

護謨ヲ二倍ノ水ニ溶解セシ者ナリ用量ハ其十五瓦乃至二十瓦(大約四号乃至六号ヲ取り他ノ合劑百三十瓦(四号一号)ニ加ヘ與フヘシ

(二) 護謨合劑 (*Mixture Gummosa*) 護謨白糖各十五分ヲ錫水百七十分ニ溶和スル者ナリ但シ此劑ハ用ニ臨ニテ製スルヲ佳トス

(三) 護謨舍利別 (*Syrupus Gummosa*) 護謨漿一分ニ單舍利別三分ヲ和スル者ナリ

(四) 護謨錠又蜀葵錠 (*Tabla Gummosa, P. Althaeae*) 護謨白糖各二百分ヲ取り錫水<sup>塞</sup>冷者六百分ニ溶

解<sub>レ</sub>瀝過<sub>シテ</sub>銅鍋ニ納<sub>レ</sub>重湯鍋中ニ煮<sub>テ</sub>絶<sub>エ</sub>  
 ス之ヲ攪拌<sub>シ</sub>蜂蜜ノ稠ト成ルニ至<sub>レ</sub>ハ卵白<sub>攪</sub>  
 トナ<sub>ス</sub>者百五十分ヲ加<sub>ヘ</sub>頗ル粘稠トナルヲ待<sub>テ</sub>  
 橙花油糖一分ヲ加<sub>ヘ</sub>此液ヲ紙製ノ型<sub>ニ</sub>傾瀉<sub>シ</sub>  
 温處ニ放置<sub>シテ</sub>乾固<sub>セシ</sub>ムル者ナリ  
 爰ニ玄參科ニ屬スル二種ノ藥草アリ乃チ其  
 一ハ歌兒拔斯鳩母花 (*Flora Nebucosi*) ニシテ  
 合<sub>ル</sub>ババス<sub>ム</sub>ム<sub>ム</sub>ダ<sub>ブ</sub>シ<sub>ホ</sub>ル<sub>メ</sub>ノ花ナリ其効分  
 ハ油質<sub>依</sub>的<sub>兒</sub>ヲ用<sub>ヒテ</sub>浸漬<sub>ス</sub>及<sub>ヒ</sub>多量ノ糖  
 分ナリ通例和胸飲料ニ加<sub>ヘ</sub>用<sub>フ</sub>其二ハ里那

利亞 (*Herba Simarouba*) ナリ此物ハ概子軟膏ニ  
 製<sub>シ</sub>燃衝性<sub>肛門</sub>校腫ニ貼<sub>シテ</sub>緩和ノ効アリ  
 コレ恐クハ植性粘液ヲ含<sub>ム</sub>ニ由<sub>ル</sub>ナルヘシ  
 乃チ此軟膏ノ製法ハ里那利亞二分ニ酒精一  
 分ヲ注<sub>キ</sub>温處ニ放置<sub>スル</sub>テ數時ニシテ家猪  
 脂十分ヲ加<sub>ヘ</sub>之ヲ重湯鍋中ニ煮<sub>テ</sub>酒精ヲ揮  
 散<sub>セシ</sub>メ其液ヲ榨<sub>リ</sub>毛篩ニテ瀝過<sub>シ</sub>放<sub>冷</sub>ス

蜀葵根 (*Radic Althaeae*)

青帶地方ニ産スル錦葵科中ノアルテア<sub>マ</sub>ヲ<sub>ハ</sub>イ<sub>シ</sub>  
 ナリス<sub>蜀</sub>ノ根ニシテ多量ノ植性粘液ト粉質ト



ヲ合メリ

古来呼吸器ノ急性諸患ニ緩和藥トシテ大ニ賢  
用セリ其他蜀葵葉錦葵葉及ヒ錦葵花等皆藥鋪  
ニ備フ

製劑

(一)蜀葵舍利別 (*Yugipus althaeae*) 蜀葵根一分ヲ齧  
水二十分ニ浸漬スルヲ二時間濾過シテ十五分  
ノ液ヲ取り白糖二十四分ヲ加ヘテ製ス諸種ノ  
合劑ニ加ヘ用フ

(二)和胸飲料 (*Species pectorales*) 蜀葵根八分。甘

草三分。莖菜根一分。款冬葉四分。歌兒拔斯鳩母花。  
角茴香各二分ヲ細剉シテ混和スル者ナリ

(三)緩和煎料 (*Species emollientes*) 蜀葵葉。錦葵葉。  
默利魯篤ロッド。加密列花。及ヒ亞麻仁各一分ヲ和スル  
者ナリ

(四)含嗽劑料 (*Species ad gargisum*) 蜀葵葉。接骨  
花。錦葵花各等分ヲ合和スル者ナリ

(五)菓實和胸飲料 (*Species pectorales cum fructibus*)  
尋常和胸飲ノ料十六分中ニ攝刺篤尼實ト細剉セ  
六分。精大麥四分。無花菓ル細剉セ三分ヲ加フ

楤棹仁 (*Semen Galenic.*)

歐羅巴ノ南地ニ産スル林檎科ノ一種「チドニア」  
ヅルガリス楤ノ仁ヲ採ボマゼテ藥用トス此仁ノ外皮  
ハ殊ニ植性粘液ヲ含ムト多シ通例楤棹仁十瓦  
(三号弱)ヲ水二百瓦(七号)ニテ煎シ用フ或ハ之ヲ  
搗碎セスシテ直チニ水ヲ注キテ振盪スルモ亦  
能ク其粘液分ヲ浸出スル者ナリ往時ハ之ヲ楤  
棹漿 (*Mucilage Galenic.*) ト名ツケテ眼科ニ多ク  
用ヒタリ當今用フル所ノ楤棹漿ハ楤棹仁一分  
ヲ取り玫瑰水五十分ニ浸漬スルト半時間時々

攪拌シ濾過シテ之ヲ製ス稍收斂ノ効ヲ兼スル  
者ナリ

甘草 (*Radix Squiritiae.*)

甘草ニ二種アリ乃チ歐羅巴ノ南地ニ産スル蛾  
形花ニ属スル「グリチルリ」サ「グラブラ」及ヒ「グリ  
チルリ」サ「エヒナタ」ノ根ナリ共ニ藥用ニ供ス其  
主タル成分ヲ「アウリチル」知「児利質」チト名ツク質微黄  
ニメ粘滑ナリ其大量即チ十五瓦乃至三十瓦大  
約半号乃至一号ヲ服スル時ハ必ス下利ヲ發ス  
然レモ少量ナル時ハ此害ナク且其一分ハ腸中

ニ入テ變化ヲ受クルコナク之ヲ體外ニ排洩スル者ナリ

〔製劑〕

〔一〕生甘草膏 *Succus Squiritan crudus* 黑色虛脆ノ圓柱形ナル杆ニシテ甘草根ノ搾汁ヲ煎熬シ乾固シテ製シタル者ナリ

〔二〕精製甘草膏 *Succus Squirit. depuratus* 八暗褐色ヲナセル粘稠熬劑ニシテ是レ生甘草膏ヲ水ニ溶解シテ精製セシ者ナリ

〔三〕甘草根熬 *Extr. Squiritan Radicis* 甘草根一分

ニ冷水六分ヲ注キ浸スコ四十八時搾リテ液ヲ取り又冷水三分ヲ以テ其渣滓ヲ漬スコ十二時間搾リテ其液ヲ取り前後ノ二液ヲ合シ靜定シテ濾過シ第二稠ノ熬劑トナス褐色ニシテ全ク水ニ溶解ス

〔四〕甘草錠 *Tabl. Squiritan* 餹水ヲ以テ甘草根ヲ浸出シ亞刺比亞護謨及ヒ白糖ヲ加ヘテ錠トナス者ナリ

〔五〕甘草舍利別 *Syrupus Squiritan* 甘草根一分ヲ水十八分ニテ浸漬スルコ一夜間濾過シテ其

液ヲ取り之ヲ一回煮沸ニ更ニ重湯鍋ヲ用ヒテ煎熬シ又再ヒ瀘過シテ七分ノ液ヲ取り之ニ上好白糖及ヒ精製蜂蜜各十二分ヲ加ヘテ製ス

〔六〕複方甘草散 (*Sylvis Liquirit. Compositus*) 旃那ノ條ニ詳カナリ

〔七〕甘草膏越里幾矢兒 (*Elisir e Succo Liquiriticae*) 精製甘草膏二分ヲ茴香水六分ニ溶解シテ礪砂加過泥子精二分ヲ加フル者ナリ褐色ニシテ渾濁ノ液ヲナセリ服量ハ數茶匙ヲ與フヘシ但此劑ハ用フル毎ニ必ス振盪スルヲ要ス

甘草膏ハ通例他藥ニ伍シテ其味ヲ調理スルノ用ニ供ス蓋シ舍利別ハ方今尚專ヲ之ヲ用フレヒ多クハ藥物ノ味ヲ調理スルコトクメ却テ其厭ノ可キ氣味ヲ生スルカ故ニ甘草膏ヲ用フルニ如カス即チ甘草膏五瓦乃至十五瓦(四瓦乃至四号)ヲ取りテ他ノ合劑百五十瓦(五号)ニ和シ與フルヲ要ス

又胡蘆巴子 (*Semen Foeniculi Graeci*) ト名ツクル者アリ此品ハ一時藥用ニ廢レタルモ復再ヒ之ヲ用ノルト成レリ乃チ蛾形花科中トリ

ゴ子ヲ、<sup>セ</sup>ヌム、グレクムノ種子ニシテ多量ノ  
粘液分、固性油及ヒ少許ノ香竈樹脂質ヲ含メ  
リ方今專ラ家畜科ニ於テ之ヲ藥用トス

蘆根 (*Silixoma graninis*)

獨逸國ニ産スル禾本科ノ一種「アグロピリム、レ  
ペン」スノ根ナリ「護謨質粉質、糖分、蛋白質及ヒ中  
和性ノ諸質ヲ含メリ蘆根ハ新鮮ノ者ヲ採リ新  
鮮搾汁トナシテ用フヘシ卷ノ四白屈菜ノ條ヲ参考スヘシ又蘆  
根熬 (*Esth. graninis*) ハ蘆根一分ヲ熱湯六分ニ  
浸漬スルヲ六時間瀝過シテ急ニ煎熬シテ舍利

別ノ稠トナシ之ニ四倍ノ冷縮水ヲ注キ瀝過シ  
煮テ第二稠ノ熬劑トナス者ナリ赤褐色ニシテ  
水ニ溶ケ易シ丸藥ノ劑料トノ用フルニ宜シ

沙列布根 (*Salsola stipis*)

獨逸國ニ産スル蘭科ニ属スル草此草ニ數ノ球  
種アリ  
根ナリ其主タル成分ハ一種ノ抱水炭素質ニシ  
之ヲ拔蕪里涅子ト名ツク此物ハ本來水ニ溶解セ  
サレ在亦之ニ由テ醇爛シテ粘液様ノ物ニ變ス  
ルナリ此物ハ腸中ニ吸  
收スルヲナシシ沙列布ハ特ニ急性ノ腸  
加答流ニノミ用フ即チ其一二瓦(十六公)乃至半

了強ヲ取り水百五十尾(五号)ヲ以テ煎シ之ニ白糖少許ヲ加ヘ真フヘシ但シ單寧劑モ亦此症ニ適當ナレト之ヲ沙列布煎ニ伍スルモハ彼ノ拔蕪里涅ヲ分離沈降セシムルカ故ニ其配伍ヲ禁ス又腸第扶斯ニ於ケルカ如ク腸ノ刺衝機亢進スル者ニハ沙列布ノ淡煎ヲ作り終日飲料ニ代ヘ與フルニ宜シ小兒ノ下痢症ニモ此煎劑ヲ與ヘテ効アリ世人多クハ之ヲ以テ真ニ滋養ノ効アル者ト看做セト其實ハ大ナル誤ナリコレ決シテ滋養補益ノ目的ヲ以テ用フヘキ者ニ非ズ

其他沙列布漿 (Mucilage of Starch) ハ沙列布一分冷水十分及ヒ沸湯九十分ヲ以テ製スル者ナリコレ亦藥舖ニ於テ購得ルノ品トス但シ此劑ハ必ス用ニ臨ンテ製スルヲ要ス

加爾拉健 (Carrageen)

北大西洋ニ産スル「コンドル」ス。クリスプスト名ツクル海蘇ナリ此物ハ粘液分及ヒ膠質ニ富ミ凡ソ百分ノ且海水中ノ諸塩分ヲ含メリ之ヲ沸湯ニ浸スキハ殆ント溶解シテ僅カニ少許ノ植物纖維ヲ殘スニ過キス其濃厚ナル溶液ハ冷ユ

文  
七十一  
史  
五  
式  
成  
反

レハ必ス凍凝スルニ至ル乃チ一瓦(十六分)ノ加  
爾拉健ヲ以テ大約二十五瓦(七分)ノ膠劑ヲ得ヘ  
シ人或ハ此加爾拉健ヲ以テ殊ニ滋養ノ効アリ  
ト看做ス者ハ恐クハ唯其膠劑ノ形狀頗ル古方  
ノ牛肉濃煎ニ髣髴タルニ因ルヘシ但シ加爾拉  
健ハ腸管刺衝機ノ旺盛ナル症ニハ緩和包攝ノ  
偉効アリ其他呼吸器ノ病ニ於テモ亦効アル所  
以ハ蓋シ前條ノ總論中ニ述ヘシ所ノ理ニ因ル  
ノニ用量ハ其五瓦(四分)ヲ取り水三百瓦(十分)ヲ  
以テ之ヲ煎シ或加爾拉健膠 *Gelatina Curagora*

ヲ製シ數茶匙宛之ヲ服用セシム即チ加爾拉健  
一分水四十分ヲ取り重湯鍋中ニ煮ル一小時許  
搾リテ濾過シ之ニ白糖二分ヲ加ヘ手ヲ止メス  
攪拌シ煎熬シテ其全量十分トナルニ至リ放冷  
シテ製ス此劑ハ必ス用ニ臨ンテ製スルヲ要ス

敏氏藥性論卷之二 終

文獻通考 卷之二 三

明治八年十月十五日

版權免許

東京第五大區四小區下谷煉塀町

二拾二番地寄留

足立寬藏版

東京馬喰町貳丁目

英蘭堂

島村利助

發兌書林





