



宸篤兒藥性論  
三

ヤ 5  
1029  
2



1029  
2

宏篤兒藥性論卷三目次

○強壯解熱劑

香竈叔欬藥

玫瑰花

○玫瑰昆設爾弗水

○玫瑰蜜

○水楊梅根

○撒爾菲亞油

撒爾菲亞

苦味叔欬解熱藥

水楊皮

○楊皮越幾斯  
○撒里矢捏製法

七葉樹皮

○七葉樹皮加酸煎

○烏華烏爾矢





括クワツシ矢シ亞ア  
○ ○ ○ ○ ○  
括クワツシ矢シ亞ア越エツ幾ケ斯ス  
○ ○ ○ ○ ○  
珊サン篤トク里リ越エツ幾ケ斯ス

睡スイ菜サイ  
○ ○ ○ ○ ○  
睡スイ菜サイ越エツ幾ケ私シ  
○ ○ ○ ○ ○  
格コク綸リン僕ボク越エツ幾ケ私シ

粘滑苦味  
依蘭苔イランガイ  
○ ○ ○ ○ ○  
依蘭苔イランガイ和ワ胸キョウ錠テイ  
○ ○ ○ ○ ○

鹹性苦味  
葛兒儒カエルニウ  
○ ○ ○ ○ ○  
葛兒儒カエルニウ越エツ幾ケ斯ス  
○ ○ ○ ○ ○

紫堇  
○ ○ ○ ○ ○  
紫堇越エツ幾ケ斯ス  
○ ○ ○ ○ ○  
蒲公英ボウケイ越エツ幾ケ斯ス

麻マ爾ニ羅ラ歌カ  
○ ○ ○ ○ ○  
麻マ爾ニ羅ラ越エツ幾ケ私シ斯ス  
○ ○ ○ ○ ○  
矢シ枯コ列レツ乙イツ舍セ利リ別ベツ

傑ゲ尼ニ私シ陀ダ  
○ ○ ○ ○ ○  
黎レイ稠チウ牛ニウ胆タン

香竈苦味  
○ ○ ○ ○ ○  
亞ア爾ニ鮮セン水スイ丁テイ幾ケ  
○ ○ ○ ○ ○  
○ ○ ○ ○ ○  
亞ア爾ニ鮮セン油ユ

亞ア爾ニ鮮セン  
○ ○ ○ ○ ○  
亞ア爾ニ鮮セン水スイ丁テイ幾ケ  
○ ○ ○ ○ ○  
亞ア爾ニ鮮セン油ユ

忽コト布フ越エツ幾ケ私シ  
○ ○ ○ ○ ○  
忽コト布フ越エツ幾ケ私シ  
○ ○ ○ ○ ○  
土ツ木ボク香カウ刺シ  
○ ○ ○ ○ ○  
土ツ木ボク香カウ刺シ越エツ幾ケ私シ

葛斯加栗刺

加密列花

泥菖根

橙皮

橙皮精  
橙皮水  
橙皮舍利  
橙皮別  
橙皮丁  
橙皮油

枸椽皮

攝爾扁太里亞

桂

桂油  
桂水  
桂精  
桂丁

家篤兒藥性論卷四目次

○ 枸椽水  
○ 攝爾扁太里亞  
○ 攝爾扁太里亞丁  
○ 攝爾扁太里亞油

家篤兒藥性論卷三

和蘭

小倉

漢侄 家篤兒 著

母沕 普勒歇 技補

洞海林疆健卿 譯補

強壯解熱劑

香竄叔斂藥

玫瑰花

玫瑰油  
玫瑰水  
玫瑰精  
玫瑰丁



家篤兒藥性論卷四目次

葛斯加栗刺  
 加密列花  
 泥菖根  
 橙皮  
 橙皮精  
 橙皮舍利  
 橙皮別  
 橙皮丁  
 橙皮油  
 枸椽皮  
 枸椽水  
 枸椽精  
 攝爾扁太里亞丁  
 桂  
 桂水  
 桂油  
 桂精  
 桂丁  
 桂丁  
 桂丁  
 桂丁

家篤兒藥性論卷三

和蘭  
 漢侄  
 家篤兒  
 著  
 小倉  
 洞海林疆健卿  
 譯補  
 強壯解熱劑  
 香竄叔  
 欽藥  
 玫瑰  
 花  
 蘭



歐羅巴ノ南地ニ在テハ原野ニ自生シ和蘭ニ於テハ多ク花圃ニ培植スル玫瑰樹ノ花葩ナリ氣味甘美ニメ微ク收斂ス○輕症ノ咯血子宮血白帶下腕汗等ニ浸劑トナシ用井口内或ハ咽喉ノ矢苟兒倍苦粘液性緩慢咽喉焮腫ニ含漱劑トシ用ウ○二錢ヨリ二匁或ハ三匁至ヲ以テ六匁ヨリ二十四匁ノ液ヲ取り服ス

○玫瑰昆設爾弗リコルセルハ 主治本條ニ同シ服量一匁ヨリ二匁至

○玫瑰蜜メロ 外用メ矢苟兒倍苦

性ノ汚穢潰瘍鵝口瘡粘液性咽喉焮腫ノ良藥タリ○服量二錢ヨリ一匁至

○玫瑰花水 アタラシム 此物多ク點眼水トシ用井又香氣美好ナルヲ以テ外用諸藥ニ加用ス

水楊梅根ラヂキス、カレール 林下樹陰丘墟等ニ生ス林氏之ヲギムウルバニムト云○根長大ニメ線條ヲナシ色黯褐色ニメ氣味香竈丁子ノ如ク且收斂ス○彪花ベニ 此根ヲ以テ間歇熱ノ妙劑トス其効全ク渠カ

主張スル如クナラスト雖氏唯輕症ノ歳首間  
 歇熱ニ用井テ良ナリ故ニ先哲職歇蘭度ハ貧  
 寔ノ患者ニ此根ヲ以テ解熱劑ニ加用スト云  
 フ○大病治メ後全軀衰弱ヲ餘ス者瘰癧病矢  
 苟兒倍苦消食器ノ衰弱及ヒ其衰弱ニ因テ生  
 スル風氣膨脹酸敗液下利等ヲ治ス○散或ハ  
 煎劑トス煎劑ハ半弓ヨリ一弓至ヲ以テ煎メ  
 六弓或ハ八弓ノ液ヲ取ル  
 撒爾菲亞サヘルバサルヒア羅  
 林氏之ヲサルヒアオヒシナリ云ト云フ味苦

瀉ニメ氣龍腦ノ如シ○癆瘵家脱汗ニ因テ較  
 著ノ衰弱ヲ致ス者ニ用井テ能ク其脱汗ヲ歇  
 ム經久ノ冒寒粘液過泄ヲ兼ル者諸般ノ瘡疹  
 表皮弛緩ニ由テ連綿トメ治セザル者ニ用井  
 テ良ナリ○含漱劑トメ驚口瘡齒齦ノ矢苟兒  
 陪苦及ヒ牙疳ヲ治シ洗滌劑トメ弛緩汚穢ノ  
 潰瘍ヲ治ス○一弓ヲ以テ浸メ六弓ヨリ八弓  
 ノ液ヲ取リ一匙ツ、與フ  
 補 增補依百乙藥性論ニ曰諸粘液分泌ノ  
 病ニ効アリ故ニ後癩白帶下ニ良ナリ又婦



人既ニ離乳ノ後、乳汁自然ニ溢流メ止マザルヲ治ス

○亞的兒性撒爾菲亞油 オレウム、アハテ

輒近須泥埵兒 名、人 肺勞家ノ脱汗ニ清効アル

ヲ賞ス、其説ニ曰之ヲ浸劑ニ比スレバ胃ニ

受ケ易シ、然氏無熱衰弱ノ人ニ之ヲ用井、多

血質、痙攣性咳嗽、咯血等ニハ用ウルヲ勿レ

○通常油糖劑トシ用ウ、其方撒爾菲亞油ハ

滴白糖四勺、右ニ味調勻、毎時一茶匙ヲ用ウ

○苦味収斂解熱藥 アドストラセリン、ゲンリチ

シガ羅、ピテル、サ一メンテ、ロケン、デ、オス、コールツ、デレ一ヘンテ、ミラテ

保固強壯ノ性アリテ且、味収斂スル

者、是ヲ苦味収斂解熱藥ト謂フ、能ク

衰弱ヲ挽回シテ、強壯セシムルノ要

藥タリ○腸胃中汚物停滯スル者、或

ハ胆液性ノ者、嫩衝ノ景況アル者、生

力沈衰セル者、消食器衰弱セル等ニ

由テ此劑ヲ用井難キ者ハ、下劑若クハ香竄苦味ノ品等ヲ配用スレバ、能

ク其害ヲ除クナリ

水楊皮 コルテキス。サリシス。アルバ 羅

楊樹ノ藥用ニ供スル者數種アリ。其中水楊樹

皮最モ用ウルニ良ニメ。且得ルニ便ナリ。故ニ

之ヲ撰用ス。○楊皮ハ枝條ノ二年或ハ三年ヲ

經テ。二三寸強按ニ茲ニ用タル寸ハ。列雲蘭土

即念佛尺ノ一寸或ハ諸斯的爾單尺ヲ用ウルカ

當ル。若新製尺ヲ用ウレハ甚小ニ過グ大ニ及

ビ。柔嫩撓屈スベク。皮色漂褐。色味苦ク。収斂

スル者ヲ採用スベシ。○此樹皮ヲ以テ幾那ニ

代用スルノ說紛々蜂起シ。或ハ稱譽シ或ハ詆

誹ス。伏兎的連名及ビ諸賢ノ質驗說ニ云ク。楊

皮ヲ以テ幾那ニ比スルニ。其解熱ノ効ハ夏ニ

劣レリ。而モ防腐収斂ノ効ニ至テハ。殆幾那ニ

匹敵スト。○楊皮の應ノ病症ヲ別ツテハ。種ト

ナス。其一ハ間歇熱ニ用ウ。就中單純ハ歲首間

歇熱。腹臍ノ衰弱ニ由テ治スル。能ハサル者

ニ。苦味ノ藥品ヲ伍メ甚々驗アリ。又和蘭ノ一

醫云。經久歲抄間歇熱ニ用井テ間効アリト。○

其二。腐敗熱ニ用ウ。此根防腐ノ効峻ナリト。雖

消化シ易カラザルヲ以テ。又此症ニ投シ難シ

若シ之ヲ用井ント欲セバ、必大量ヲ禁シ。香竈  
刺戟藥及ビ自餘ノ防腐藥殊ニ鑛酸ヲ加フベ  
シ。然レ、此焮衝ノ景況アリ、呼吸困難シ、胃ノ部ニ  
方テ膨滿懊惱シ、腸胃汚物等ノ諸症アル者ハ  
用ウルヲ勿レ。○其ニ、癆瘵熱ニ用ク、此熱殊ニ  
内外局處ノ大潰膿劇甚ノ失血、其他諸液ノ過  
泄等ヨリ生スル者ニ大効アリ、真ノ肺癆熱ニ  
用井ント欲セバ、必精細ニ其當否ヲ検査スル  
ヲ要ス、如何トナレバ、此症間、慢性ノ隱伏焮  
衝ヲ挾有スルガ故ナリ、若此焮衝アルヲ曉得

セズ、誤扱スルキハ、剝地ニ其咯痰ヲ止住シ、煩  
悶愈甚シク、熱勢愈熾ニシテ、終ニ死期ヲ促スニ  
至ルナリ、然レ、特リ肺臟大ニ弛緩シテ、知覺銳  
敏ナルニ由テ、粘痰ヲ咯出スルヲ、經久休マザ  
ル者ハ、沒藥、歇爾蘭獨留謨、其他香竈ノ諸藥ヲ  
加ヘテ大ニ効アリ。○其四、經年ノ粘液漏泄、白  
帶下、後痲等ニ良ナリ。○其五、虛症ノ胃血痔血  
子宮血等ニ用ク。○其六、矢苟兒倍苦ニ用ク。○  
其七、内臟弛弱ニ因テ起ル所ノ下利、血液腐敗  
ニ陷ントスル痢病等ニ良ナリ。○其八、外科ニ

管ル諸病其部ノ弛緩ヲ兼併シ来レル者ニ用  
 ウ。故ニ經久弛緩ノ疽狀瘍、癌腫等ニ用井テ、コタ熱  
 不得ノ惡臭ヲ減シ、寒脫疽ノ蝨食ヲ制止シ、又  
 破<sup>ハシ</sup>腠ヨリ生スル脫疽、齒齲ノ矢苟兒倍苦瘍、脫  
 肛、脫子宮、局處ノ衰弱弛緩ニ用井テ効アリ○  
 散或ハ煎劑トシ内外共ニ通用ス。散劑一刃ヨ  
 リ半錢至ヲ。一時或ハ一時半毎ニ用ウ。煎劑ハ  
 一弓ヨリ四弓至ヲ以テ、煎メ八弓ヨリ二十四  
 弓ノ液ヲ取り、一時毎ニ一匙ヲ與フ

○楊皮越幾斯 エキスマラク、オム、バル、ボル 羅テ

主治本條ニ同シ。一刃ヨリ一錢至ヲ服ス

○撒里矢捏 サリシ子 千八百二十五年ヨリ  
 同二十八年ノ間ニ於テ、ホシ洪旦<sup>名</sup>、ヒ色布<sup>名</sup>、テ涅爾<sup>名</sup>ノ  
 二家、水楊皮ヲ分析メ亞爾加里アルヲミル。之  
 ヲ撒里矢捏ト名ク。同二十九年ニ至リテ、レ列落  
 屈斯<sup>名</sup>人始メテ之ヲ精製スルヲ得テ、諸醫ヲ  
 メ解熱ノ効ヲ試マ令ルヲ得タリ○ヒ密屈<sup>名</sup>而  
 人拔爾列<sup>名</sup>同勿孫<sup>名</sup>同厄羅爾仁<sup>名</sup>同夏愚村<sup>名</sup>同麻健  
 實<sup>名</sup>同林斯<sup>名</sup>同斯底屈麻依爾<sup>名</sup>同蛤羅布<sup>名</sup>同斯當<sup>名</sup>  
 瓦羅麻<sup>名</sup>同勃龍<sup>名</sup>同等ノ諸名家此鹽ヲ試用メ、解

熱ノ効殆ド規尼捏ノ如キヲ曉得セリ然氏其製太煩冗ニノ費多キガ故ニ價モ亦隨テ貴カラザルヲ得ス且今時幾那ノ價太貴カラザルカ故ニ人々未喜ンデ此鹽ヲ用ウルニ至ラズト雖後來若シ簡便ノ製ヲ發明スルカ或ハ幾那ノ價再飛躍スルニ遭ハハ豈此鹽ヲ以テ要藥トセザルヲ得ンヤ○烏多歷吉多名國ノ醫勃龍名ノ試驗説ニ從ヘバ撒里矢捏ハ其解熱ノ効實ニ規尼捏ニ及バスト雖然氏間又疾患ノ景況ニ因テ其効規尼捏ノ右ニ出ルトアリ

ト云フ撒里矢捏の當ノ病症ヲ左ニ舉ク  
○第一間歇熱ノ患者發熱間殊ニ發熱ノ後多時血液頭腦ニ幅湊シテ頭痛劇烈ナル者○第二身體衰弱ノ自汗淋漓タル者○第三數回規尼捏ヲ投ズト雖其熱頑固ニメ効ヲ奏スルヲ能ハザル者等共ニ用井テ佳ナリ○服法規尼捏ノ如ク免熱時ニ於テ一時毎ニ二匁ヨリ四匁ヲ散若クハ溶液トシ用フ又十二匁ヨリ二十匁ヲ孟偃設爾六匁ニ和シ每次一匙ヲ服ス○勃龍名此鹽ヲ以テ間歇熱ヲ治スルノ外更

ニ弛張稽留熱ノ少シク弛退スル時ニ方テ此  
鹽ヲ投メ間良驗ヲ奏シ粘液熱蟲熱癆瘵熱ニ  
モ亦效アリトス遷延神經熱ニ解熱劑トシ用  
井テ其熱ノ發作不整ナルヲ調理スルニ殊効  
アリ○勃龍氏又此鹽ヲ慢性病就中粘液癆白  
帶下胃虛ニ用井テ良効ヲミル又胃瘵ニハ硝  
酸毘私密薦ヲ加ヘ用井テ其効偉ナリト云  
補 增補依百乙藥性論ニ曰揚皮ハ没食子  
酸華爾斯。色分。護謨ヲ含ム。外尚一種ノ苦素  
アリ。之ヲ分析メ撒里矢捏ト名ク。解熱ノ効

蓋シ此素ニアリ○撒里矢捏ヲ得ルニハ諸  
揚殊ニ水揚皮ノ越幾斯ヲ製シ水ヲ加ヘテ  
之ヲ稀薄シ稀硫酸ヲ加ヘテ之ヲ澄清シ滓  
ヲ去リ石灰ヲ加ヘテ中和鹽性ノ物トナシ  
濾過メ液ヲ取リ煎熬メ舍利別ノ稠トナシ  
亞爾箇兒ニ浸出スルハ華爾斯状ノ物ヲ生  
ス此物赫色ニメ光アリ結芒セス味甚々苦  
ク風ヲニテ濕ヒ水及ヒ火酒ニ溶化ス○墨  
林騏舍密書ニ曰撒里矢捏ヲ得ル簡便ノ法  
ハ先單寧ヲ濃降シ去ルヲ良トス其法揚皮

水浸此浸液中單ニ醋酸鉛及ビ蛋白ヲ加ヘテ浸液ヲ清澄シ水氣ヲ蒸散ス○弗里設藥性論ニ曰撒里矢捏ハ揚ノ種類皆之アリ其内サリシス。ペイリキス。サリシス。アメーグダリナサリシス。ヒチリナハ之ヲ含ム。尤モ多シ。合藥家引土滿名嘗テ武羅昆喏名ノ法ニ從フテサリシス。プラエココキス皮六北ヲ以テ製メ潔白純精ノ撒里矢捏三十一錢ヲ得タリ○其芒ハ疏鬆ニメ重々相疊リ白色瑩々破碎シ易ク邊端光アリ或ハ葉片

フナシ或ハ鍼狀ヲナス味峻苦ニメ後ニ揚皮ノ味アリ風ヲミテ變ゼズ水ニ溶ケ易ク火酒ニモ亦溶化シ亞的兒及ビ亞的兒油ニハ溶解セズ

七葉樹皮カコルテキス。ヒポカスターライロ

世ニ所謂野生七葉樹ノ嫩枝二年或ハ三年ナル者ノ剥皮ナリ此樹舊來亞細亞洲ノ北地ニ産ス林氏之ヲアスキュリスヒポカスターニ凶ト云○氣味甚タ苦瀟ニシテ且多少ノ香氣アリ主治楊皮ニ異ナラズ○矢納吳微子名嘗テ此

皮ノ加酸煎ヲ以テ。幾那ニ代用メ。疾ノ再發ヲ防グニ良ナル調理劑トス。予モ亦其說ニ適從シテ之ヲ用ウ。○散劑ニ錢ヨリ半ヲ至。○加酸煎ハ此皮一ヲヨリ三ヲ至ヲ以テ。煎メハヲヨリ十六ヲノ液ヲ取り。稀硫酸一錢ヨリ二錢マデヲ加注ス。

烏華烏爾矢ホリア、ユハ、イ、ウル、レ、アイ、ロ、ブ、ラ、イ。北歐羅巴洲ノ高阜ノ砂地ニ産スル灌木ノ葉ナリ。林氏此樹ヲ「アルビ」ト云ス。ユハ、ウル、レ、ト云

葉ノ形。卵圓ニメ。旃那葉ノ如シ。動モスレバ。イデア葉ト混シ易シ。○生葉ハ茶及ビ甘草ノ氣アリ。然レ之ヲ乾セバ其氣多クハ耗失ス。味ハ苦クメ。瀉ナリ。○名醫亞臣漢名密兒羅同等。泌尿器ノ諸病其因。結石。潰瘍及ビ其部ノ衰弱等ヨリ來ル者ニ用井テ良効アルヲ賞セリ。然レ真ニ碎石ノ効アルニアラス。只其收斂強壯ノ性ヲ推擴シ用井テ。能ク尿ノ分利ヲ變理シ。結石。碎砂。酷厲尿等ノ刺戟ニ由テ發スル知覺。銳敏ヲ減損ス。○尿血。小便失禁遺精。其他粘液



膜。水脉管等ノ衰弱ニ由テ起ル諸病ニ効アリ。故ニ疇昔既ニ粘液膜。水脉等弛縦ニ由テ起ル水腫ニ用井テ良効ヲ得タリ。○グニグリア諸厄利亞名國ノ醫魯別爾多ボルト火爾涅ホルネ始メテ肺癆其他骨蒸熱ヲ夾ム羸瘦病ニ此葉ヲ用井テ効アルヲ稱ス。爾后諸名家其說ニ從事メ試用スルニ全ク効驗ナキニアラズ。殊ニ和蘭ノ名家蓋的オランダ度ド各種ノ癆症ニ歷驗メ云。諸種ノ癆瘵中殊ニ肺ノ結核ヨリ起ル者。病症未全ク見レザル時ニ於テハ其素因ヲ治シ其發覺セントスル者ハ之

ヲ防キ既ニ發覺スル者ハ其増進ヲ防キ膿ノ化熟ヲ扶ケテ其ヲメ善性ナラシメ其過泌ヲ減却シ脉管ノ質ヲ強壯シ呼吸器ノ知覺過敏ナルヲ減メ酷厲毒ノ刺戟ニ任ヘ易カラシムルナリ。○クニク焮衝若クハ司處ノ多血等アル者ハ先刺絡ヲ施シ清涼劑ヲ投シ而後此葉ヲ用ウルニアラザレバ諸症ヲメ輒チ峻惡ニ至ラシム○散劑ヲ良トス半夕ヨリ一錢至ヲ用ウル一日ニ數次浸劑或ハ煎劑ハ一弓ヲ以テ六弓ノ液ヲ取り服ス

幾那コルヒヤス。ペルヒヤニト蘭

大凡往昔ヨリ無稽孟浪ノ説出テ或ハ賞譽雲漢ニ齊ク或ハ貶棄メ顧ミザルニ至ル者ハ何物ゾヤ即萬病ノ缺鋪ニメ百藥ノ首長タル幾那是ナリ○則爾云ト雖碩學ノ諸賢各自ニ潛思熟驗メ務テ其怪妄ヲ芟除シ幾那ノ疾醫ニ於ル一日モ缺クベカラサル聖藥ニメ自餘ノ品類絶テ之ニ代用スベキ者ナキヲ申明セリ○幾那ノ類數種アリ其中最モ藥用ニ供スベキ者三種ヲ舉ク○第一種ハ赭色幾那コルヒヤス

ス。ペルヒヤス。コルヒヤス。ヒュスキス。エックテ。ブロイ子。キナ。○コロオン。キナ。○ロキスキナ。蘭是ナリ。其上品ハ赭色ニメ薄ク筒卷シ。長サ大約一指計。大サ鵝翮管ノ如ク。或ハ小指ノ如シ。外面白苔アリ。質緻密ニメ重ク。破碎メ線状ニ分裂セス。又粉末ヲ成サズ。日ニ照メ光澤ノ細尖アリ。味美苦ニメ微瀼香氣アリ○第二種ハ黄幾那コルヒヤス。ペルヒヤス。ブト云。李露ニ産ス其状扁平ニメ材片ノ如ク。或ハ筒卷シ。前種ニ比ス。質厚クメ線條ヲナス。其色桂皮色強案ニ錫倫桂ニメ味苦ク。稍香氣アルヲ

以テ他ノ幾那ト異ナリトナス。又王幾那ナキレ  
ギア羅コナニト稱スル者アリ。是黄幾那ノ  
一種ニメ、黄幾那ト同シカラス。此物硫酸規尼  
掙ヲ製スルニ最良ノ品トス。○第三種ハ赤幾  
那コルテキス。ペルヒニアニト稱ス。此者黯赤  
或ハ赭色ニメ長大扁平。厚三四分許。質重ク華  
爾斯多クム。頗収斂スルカ故ニ其効力他ノ諸  
種ニ倍ス。○赤幾那ハ一片屑ニ就テ三形状ニ  
別ツベシ。外面ハ皺紋多クシテ破裂シ。且苔ア  
リ。中心ハ黯黑色ニメ華爾斯アリ。裏面ハ線状

本草綱目卷三

ニメ木質ノ如ク。赤色ニメ光輝アリ。○幾那ハ  
概メ保固。強壯。収斂。防腐。鼓神。活脈ノ効力アリ。  
是ヲ以テ又解熱ノ能アリ。其効力ニ因テ良驗  
ヲ奏スル諸病ヲ擧テ左ニ列ス。○第一  
間歇熱 夫幾那ハ殊ニ間歇熱ノ聖藥ニメ  
之ヲ捨テ更ニ他ニ求ムベキノ品ナシ。○幾那  
ハ或ハ偶。缺乏ニ遭ヒ。或ハ時ニ價金銀ヨリモ  
貴キ一アリ。此時ニ方テ諸醫頻リニ代用ノ藥  
品ヲ出シテ。紛々異説ヲ唱ヘテ。其美ヲ稱スト  
雖試ニ之ヲ用ウルニ及ンデハ。其町畦霄壤啻

本草綱目卷三

ナラザルナリ。○幾那ノ間歇熱ニ偉効アル。既ニ此ノ如シト雖亦復一途ニ膠柱スルコトヲ得ズ。若シ亂投スルニ至テハ、其害亦輕キニアラズ。因テ畧其病症ヲ區分メ左ニ列シ。臨機應變ノ妙用アルコトヲ示シ、且亂投胡措ノ弊ナカラシコトヲ要ス。

〔甲〕單純間歇熱ノ患者、消食器健カニメ、能ク幾那ヲ消化スルノカアラバ、先數發ヲ經過スルコトヲ待タズ、直下ニ其發病ノ初頭ニ就テ之ヲ用井テ効アリ。然レ消食器虛弱ナル者ハ、幾那

ニ因テ胃部壓迫、心中懊惱、惡心、嘔吐等ヲ發スルノ懼アルガ故ニ、必ス健胃ノ諸藥ヲ加ヘ、努メテ其害ヲ防クベシ。

〔乙〕歲首熱ニ幾那ヲ用ウルノ期ハ、歲抄熱ヨリ頗早シト雖、其害ヲ見ルコト太鮮シトス。是他ナシ、歲抄熱ハ胃腸ノ穢滯ヲ挾ム者多ク、歲首熱ハ其併症鮮キヲ以テナリ。丙症ノ最初ヨリ幾那ヲ用井ザルハ、蓋シ之カ為ナリ。

〔丙〕腸胃性ノ間歇熱ハ、先吐下解凝ノ諸劑ヲ用井、腸胃ノ汚物ヲ掃除シテ後、始メテ幾那ヲ投

スベシ。然レ腸胃ノ諸症熱ノ為ニ解セサル者。或ハ内臓ノ虚弱疲憊ニ因テ連綿タル者アリ。此症ハ其腸胃性ヲ慮ルナク。斷然トシテ幾那ヲ用ウベシ。然レ是亦各症相應ノ諸藥ヲ伍用スベシ。諭ハバ刺戟劑。下劑殊ニ大黃等ノ如シ。○粘液性ノ間歇熱既ニ稀釋藥鹹性苦味藥。粘液解凝藥等ヲ用片テ効ナキ者ハ。硃砂ヲ加ヘテ奇驗アリ。

〔丁〕間歇熱ヲ療スルノ法。既ニ上章ノ説ノ如ク。先其原由ヲ抜キ去テ。而後幾那ヲ用ウルニ非

レバ。其効逞シ難キハ固ヨリ論ナシ。然レ亦其原由ヲ抜キ去ルノ違ナク。直下ニ幾那ヲ用井ザルベカラザルノ位地アリ。即チ第一發熱最劇烈ニメ。第二ノ發熱ニ堪ルニ能ハズメ。死ニ至ラントスル怕アリ。是其直下ニ幾那ヲ用井ザルヲ得ザルノ一ナリ。發熱ノ時ニ方テ。嶮症ヲ兼併シ。次發復其症併出シ来ルハ。患者ノ生命臨淵ノ恐アリ。是其直下ニ幾那ヲ用井ザルヲ得ザルノ一ナリ。嶮症トハ何ゾヤ。搐搦。昏冒。劇甚ノ譫妄。諸失血。生力瞥地ニ脱衰スル等

是ナリ

〔戊〕間歇熱。假リニ中風。昏睡病。心痛霍亂ノ如キ  
 危嶮ノ病状ヲ發スルハ。他ノ藥劑ヲ用ウルヲ  
 待ズ。直下ニ幾那ヲ處スルヲ要ス。然リト雖切  
 ニ其病状如何ヲ診察シ。彼是の當ノ藥品ヲ配  
 伍シ。專ラ原由ニ注意メ。治ヲ誤ル<sub>レ</sub>勿ルベシ  
 〔巳〕間歇熱。轉ノ稽留熱トナルノ状アル者ハ。努  
 メテ幾那ヲ服セシメ。其轉變ヲ禦グベシ  
 〔庚〕原因巳ニ除クト雖。熱尚淹滯スル者アリ。又  
 却テ加重スル者アリ。或ハ原因顯ラカナラザ

ル者アリ。又截熱ノ後ニアラザレバ。其原因全  
 ク除クベカラザル者アリ。皆幾那ノ的症ナリ  
 〔辛〕妊婦ノ間歇熱。生力熱ノ為ニ大ニ疲憊シ。半  
 産ノ怕アル者ハ。頻ニ幾那ヲ用井。務メテ其熱  
 ヲ截除スベシ  
 〔壬〕間歇熱發作ノ序愈整然。免熱期愈判然タル  
 者ハ。幾那ヲ用ウルノ症タル<sub>レ</sub>愈確然タリ  
 單純間日熱ハ。幾那ヲ用ウル<sub>レ</sub>日發熱。三日熱  
 ヨリ早キモ害ナシ。何者日發熱及ヒ三日熱ハ。  
 大率内臟ノ壅閉ヲ夾ムガ故ニ。間日熱ニ比ス

レバ諸症頑固ニメ治シ難シトス  
二第 **稽留熱** 稽留熱中殊ニ腐敗熱神經熱及ビ此熱ヲ併發スル諸病ニ用ウ

**腐敗熱** 腐敗熱ヲ治スル藥劑中幾那ヲ以テ君藥トス然レバ間亦幾那ヲ用ウベカラザル症及ビ用ウレバ必ズ害アル症アリ其症ヲ區分メ左ニ列ス

**天** 脈甚緊實ニメ其他ノ諸狀皆熾衝ノ景況ヲ顯ス者或ハ肌熱灼ガ如ク血液頭胸或ハ他部ニ輻湊スル者ハ用ウベカラズ

**地** 神經ノ知覺甚々鋭敏ナル者ハ幾那用ウベカラズ故ニ發病ノ初頭ハ之ヲ既ニ時日ヲ經過シタル者ニ比スレバ用ウルヲ稀ナリ

**玄** 頭腦或ハ胸腹諸器ノ熾衝病ハ之ヲ禁ス故ニ甚々シキ謔言妄語顔面赤盈眼光閃發呼吸不利ニメ煩悶疼痛シ心窩疼痛肚腹膨脹等ノ諸症アル者ハ用ウベカラズ

**黄** 第一道汚物アル者ハ幾那ヲ用井難シ若シ此症ニ於テ漫ニ之ヲ投スルハ胃部壓迫煩悶危嶮ノ便秘或ハ泄瀉等ノ諸惡候迸發スル

了必然タリ。然氏血液渙崩。生カ脱衰等ノ如キ。  
幾那ヲ除テ復救活スベカラザルノ危証アル  
者ハ。速ニ緩衝動性ノ下劑等ヲ伍用スベシ。其  
品ハ特ニ大黃。荅麻。林度ヲ良ナリトス。○幾那  
ノ的症ニメ。右件ノ諸惡症一モ見ハル。了ナ  
キハ。断然トメ之ヲ用ウベシ。故ニ知覺鈍麻愈  
甚シク。血液渙崩ノ徵愈明カニメ。幾那加酸幾  
闕ベカラザルノ症愈顯然タラバ。症ニ從ヒ鑛  
酸亞アルニカセル。攝セル。爾扁荅利亞等ヲ加ヘ。努メテ熱  
勢減退ノ時ニ於テ。之ヲ用ウベシ

神經熱

夫幾那ノ神經熱ニ於ル。何ノ時期何  
ノ証徵ニ由テ之ヲ用ウレバ。其効ヲ奏スベキ  
ヤ。預メ確定スル。誠ニ難シ。蓋或ハ病末ニア  
ラザレハ用井難キ者アリ。或ハ病末ト雖幾那  
單用シ難ク。必ス香竈衝動ノ品ヲ加ヘ用ウベ  
キ者アリ。或ハ吐劑ヲ與ヘテ吐ヲトルノ後直  
ニ幾那ヲ用井テ死ヲ免レシムルノ要藥ト  
ナス者アリ。乃腸胃性ノ神經熱及ビ傳染弟扶  
思等是ナリ。○然氏前ノ二熱ニ於テ幾那及ビ  
規キ。尼ニ。捏ニヲ處スルハ。太稀ナリトス。○尋常經過

天高月夜生論 卷三

藥性論 卷三



整齊ノ聖京<sup>キヤウ</sup>屈性神經熱ハ、病末ニ至ラザレバ  
用ウル<sup>ト</sup>ヲ禁ズ。然<sup>レ</sup>モ熱勢大ニ減スルヲ見ハ  
先試ニ幾那ヲ取テ之ヲ投ズベシ。若シ之ヲ投  
メ胃部壓迫。心中懊惱。惡心等ノ症ヲ發シ。頭痛。  
灼熱等加重スル片ハ、速ニ後服ヲ停ムベシ。○  
自餘幾那劑ヲ以テ神經熱ヲ療スルノ法方ハ、  
毫毛腐敗熱ニ異ル<sup>ト</sup>ナシト知ルベシ。○痘瘡  
麻疹。赤斑熱等ノ如キ諸病ニ腐敗熱或ハ神經  
熱合併スル者ハ幾那ノ的症太多シ。

**痘瘡**

痘ノ根脚蒼白ナル者。膿液稀涼ナル者。

痘窠平塌ナル者。片ヲナシテ窠粒ヲ分タザル  
者。面部ノ痘黑陷スル者。生カ衰憊ナル者。脉細  
疾ニメ震惕スル者等。皆幾那ノ正証ナリ。

**麻疹**

劇烈ナル血液焔崩ノ衄血ヲ發スル者

**赤斑熱**

寒壞疽様ノ惡性咽喉焔衝ヲ兼發ス

ル者。病ノ初起已ニ生カ大衰。血液焔渙等ノ諸  
証アル者。皆幾那必用ノ確徵タリ。

**第三 羸瘦病**

羸瘦ノ諸病。謹慎メ幾那ヲ用ウル

氏ハ、其効太偉ナリ。殊ニ過度ノ亡液失血房勞

過度。經日ノ流涎。白帶下等ヨリ發スル者ニ良効アリ

○和蘭ノ名醫蘊<sup>オニテイド</sup>の度ノ細試精驗ニ據レバ肺癆ニ幾那ヲ用井テ偉効アル症アリ。乃其歴驗ニ因テ發明セル諸説ヲ左ニ枚舉ス

仁大病後譬ハ熱病。疱瘡。麻疹。赤斑熱等ノ後發スル癆瘵病ノ如キ是ナリ

義胃寒緩慢月ヲ經テ愈ヘズ。後粘液癆ニ陥ラントスルノ候アルカ。或ハ既ニ肺癆トナリ。粘膠ニノ膿ノ如キ痰ヲ咯出スル者

禮肺癆破潰シ。日々夥ク惡臭ノ稀痰ヲ咯出シ。身體是ガ為ニ羸瘦シ。生力是カ為ニ脱衰シ。枯瘦骨立日一日ヨリモ甚キ者

智癩瘵性ノ慢性肺癆。其未發覺セザル者ハ之ヲ預防シ。或ハ其既ニ癆トナル者ハ之ヲ癒治ス

信肺癆ハ間幾那關ベカラザル証候アリ。殊ニ病末ニ至テ口中鶯口瘡ヲ生ジ。衰耗下利。脱汗ヲ發シ。四肢浮腫シ。全軀枯瘦甚ク。多ク臭痰ヲ咯出スル者。皆是幾那ノ標的タリ。○癆瘵ノ諸

症ニ於テ、幾那ノ効アルト已ニ前説ノ如シト  
雖又或ハ之ヲ用ウルニ臨ンデ、必小心セザル  
トヲ得ズ、何者生力盛旺シ、呼吸器焮衝様ノ景  
況ヲ顯ス者ニ於テ、謬テ幾那ヲ用ウレバ、熱勢  
増加シ、咯痰障碍シ、呼吸不利、煩悶等ノ諸症ヲ  
發スルカ故ナリ○幾那ヲ嫌惡スル患者甚多  
シ、故ニ口必嘗メ易ク、胃必受易キノ劑ヲ製ス  
ルト甚、緊要ナリ、又亞爾答沙列布、依蘭、苦蜀羊  
泉、阿芙蓉、菲沃矢、亞密斯等、各其症ニ從テ加減  
スルト、是モ亦肝要ノ事件ナリ○内部外部ヲ

論セズ、樞要ノ位地ニ於テ、一箇ノ潰膿ヲ生ジ、  
之ニ由テ癆病ヲ將出シ來ル者ハ、幾那ノ効力、  
獨、骨蒸癆熱ヲ治スルノミナラズ、尚且兼テ生  
カラ補續シ、苛厲ノ稀膿ヲメ良善ナラシムル  
ナリ、然レ診切ノ間ニ臨テ、努メテ潛思熟察シ、  
焮衝刺戟ノ有無ヲ問ヒ、僅ニ其景況アルヲ認  
メ得バ、乃幾那ヲ禁ズベシ、否ラザレバ却テ害  
アリ  
第 四 失血虚症ノ失血ハ幾那ヲ必用トス、又實症  
ノ失血ト雖、病後ハ必ズ幾那ニアラズンバ、其

衰弱ヲ挽回シ難シ

五第慢性神經病過多ノ亡液若クハ久シク心機

ヲ費ス等ニ因テ身体大ニ虚弱シ神經病ヲ發

スル者ハ幾那偉效アリ殊ニ其神經病期ヲ刺

メ發歇スル丁明著ナル者ハ其効神ノ如シ

六第慢性惡液病 幾那ハ失苟兒倍苦ノ一良藥

タリ又癩癧病ニ飲食ヲ節シテ之ヲ用ウレバ

其將ニ發セントスル者ハ能ク之ヲ防キ本病

既ニ治メ後唯弛縱ヲ餘ス者ハ又能ク其弛縱

ノ部ノ主カヲ挽回ス故ニ特拔ノ良藥ト稱ス

ベシ○癩癧病既ニ諸症ヲ具全シ病毒深ク体

中ニ蟠居スル者腺既ニ著ク硬結腫トナル者

腺壅塞メ焮衝ノ模様アル者ハ皆幾那ヲ用并

テ害アリ○小兒ノ羸瘦病ハ幾那太用并難シ

宜シク寒性幾那越幾斯ヲ用ウベシ

水腫鼓脹衰弱ヨリ生スル者ハ共ニ幾那ヲ用

ウベシ○大病及ビ長病后就中間歇熱往來熱

ノ後發スル者ハ共ニ必効アリ

癩毒瀕劑ヲ長服スルニ由テ衰弱ヲ為ス者ニ

偉効アリ

第七 子宮粘液漏泄 白帶下 後麻局處ノ縦緩ニ由  
 テ生シ或ハ持久スル者ニ効アリ  
 第八 腸胃衰弱 腸胃ノ衰弱及ビ其衰弱ニ起因ス  
 ル諸病ニ用井テ驗アリ ○諸醫皆謂フ此症ニ  
 幾那ヲ用ウレバ害アリト 然ルニ予却テ其用  
 ウベキラ唱フ其言悖戾スルニ似タリト 雖特  
 ニ幾那ヲ單用スルハ實ニ害アリ 若シ的應ノ  
 劑ヲ製シ或ハ香竈苦味ノ品ヲ加ヘ用ウレバ  
 奇驗ヲ呈スルヲ甚多シ  
 第九 外用 外科ニ属スル諸病 纖維ノ衰弱ヲ兼ル

者ハ幾那ヲ内外ニ用井テ良效アリ 故ニ脱疽  
 腐骨疽 骨質軟脆或ハ經久弛緩ノ瘰癧瘍 矢苟  
 兒倍苦瘍 癩毒瘍及ビ癌腫ニ奇効アリ  
 第十 調理 熱性或ハ慢性ノ大病 回復ノ時期ニ至  
 リテハ諸藥劑中幾那ヲ君藥トス  
 ○幾那用ウ可ラザル徵候亦區分メ十件トス  
 第一 焮衝様ノ熱及ヒ局處ノ焮衝アル者ハ用  
 ウルヲ禁ス ○第二 熱アリト雖顧ニ其熱良能  
 病邪ヲ驅竄スル的ノ機能ヲ以テ結構スル者  
 ハ用ウルヲ禁ス ○第三 第一道汚物鬱積スル

者ハ用ウルヲ禁ス。穢歇蘭度云聖京<sup>シンキン</sup>倨性<sup>コウセイ</sup>、儂<sup>レウ</sup>麻質<sup>マシツ</sup>斯性<sup>シツセイ</sup>等ヲ挾ム者ハ、幾那ヲ用ウルヲ禁ス。何者病毒分離<sup>シキリ</sup>之カ為ニ防碍<sup>ブウ</sup>セララル、ヲ以テナリ。○第四内臟ノ閉塞<sup>ヘイサク</sup>或ハ硬結腫<sup>コウケツシュウ</sup>、經久頑固ナル者ハ用ウルヲ禁ス。○第五實症ノ失血ニハ用ウルヲ禁ス。○第六間歇熱ノ發熱時ハ用ウルヲ禁ス、間歇熱ニ幾那ヲ用ウルハ、必其免熱時ニ於テスベシ。然ルニ晝<sup>ヒル</sup>、夜<sup>ヨ</sup>、單純間歇熱ヲ療スルノ一新法ヲ創ム。其法、第一次ハ其發作前少時ニ於テ、幾那末半錢<sup>マツバシ</sup>或ハ一錢ヲ頓服セシ

メ。第二次ハ直ニ發熱時初頭、第三次ハ解熱時第四次ハ解熱後總テ幾那ヲ服スル。第一次ノ如クニメ、甚良驗アル。一ヲ稱セリ。然レ此方ノ世ニ稱セラル、所以ノ者ハ、必十全ノ効アルノ謂ニアラズ、唯其費ヲ省クガ為ノミ。○第七消食器衰弱<sup>シヤク</sup>太シキ者、或ハ消食器ノ知覺銳敏ナル者ハ用ウル。一勿レ。○第八患者一異質アツテ、幾那ヲ服シ得ザル者ハ、用ウル。一勿レ。○第九訶兒底<sup>カエジ</sup>冷云居恒ニ痔疾アル人ハ、幾那ヲ用ウルニ臨ンテ、更ニ慎戒ヲ加フベシ。○第十

本草綱目卷三

十人体成長ノ時期ニ方テ發スル熱病ニ幾那ヲ處スルモ亦必謹慎スルヲ要ス

○間歇熱ニ幾那ヲ用ウルノ時期諸名家各其說ヲ異ニス今其異說一二ヲ贅ス○或云疾ノ

發作初頭ニ於テ幾那ノ葡萄酒ニ浸出セル者

一錢ヨリ二錢至テ用ウレバ其効甚偉ナリ幾

ノ始メテ世ニ出ルヤ羅馬國先其藥用ニ供

スベキヲ知ル此方ハ是當時其國書ニ賞録ス

ル方劑ニシテ古方或ハ云前說ノ如ク發作初

頭ニ於テ幾那ヲ用ウレバ胃部膨脹煩躁等ノ

諸症ヲ發スルガ故ニ必其免熱時間ニ小量ニ

與フルヲ宜シトス或ハ云發作一二時前ニ服

メ其効太偉ナリト或云發作歇テ後強按ニ即

直ニ之ヲ用ウベシト或云發作前六時或ハ三

時ノ内ニ幾那或ハ規尼捏ヲ用井テ能ク其發

作ヲ截ルト此ノ如キ數說アリト雖凡通常免熱

時間適量ノ幾那ヲ以テ分テ數包トナシ半時

或ハ一時毎ニ服スルヲ最良トス若其症峻重

ナル者ハ發作前一二時ニ於テ大量ノ幾那即

一錢ヨリ三錢至テ用ウレバ其効驗最切實ナ

リ是他ナシ之ヲ小量分服ノ者ニ比スレバ其

能速ニメ且確ナルヲ以テナリ○夫幾那ヲ用  
ウルノ要ハ其方劑ト分量トヲメ參差増減メ  
患者ノ資質ト病患ノ輕重トニ相應セシムル  
ニアリ因テ其方劑ヲ次條ニ列メ以テ刀圭家  
ノ撰用ニ便ス

○幾那末 幾那ハ粗ニ研末メ効力最大ナリ服  
量一刃ヨリ三刃ニ至ル若シ已ベカラザルノ  
事故アリテ其効更ニ切實ナラレトヲ要セバ  
一錢ヨリ二錢至テ一貼トシ用ウベシ蓋幾那  
ハ能ク消食器ノ損害ヲ招クガ故ニ葡萄酒其

他苦味香竄ノ品ヲ伍シテ其弊ヲ極フベシ○  
幾那末ハ葡萄酒燒酒麥酒醋枸櫞汁砂糖等ヲ  
和シ服スベシ又丸劑挺劑錠劑ヲ製スベシ○  
規尼捏一タビ出シヨリ其稱用高ク幾那末ノ  
上ニ踰タリ然氏間亦只顧規尼捏ヲ執テ勝レ  
リトスベカラザルノ諸症アリ譬へハ純粹間  
歇熱些モ胃腸汚物ノ候ナク或ハ偶之アリト  
雖其症甚輕ク患者壯年資質強健ニメ始メヨ  
リ食機ヲ損セザル者等ノ如キハ幾那ノ効真  
ニ規尼捏ニ勝レリトス○赭色幾那ハ其線狀



質微ナルニ由テ。黄幾那。赤幾那ニ比スレバ消  
 化シ易シ。故ニ丸散。挺ニハ赭色幾那最佳ナリ。  
 又強壯ノ効ヲ要スルニハ赭色幾那。収斂ニハ  
 赤幾那。規尼捏ヲ製スルニハ王幾那ヲ勝レリ  
 トス。○散藥ニ堪ザル者此症多ク身体衰弱知  
 覺鋭敏ノ患者ニアリ  
 ハ浸劑ニ宜シ。浸劑ハ最消化シ易キヲ以テナ  
 リ

○幾那水浸 幾那一弓 冷水八弓或  
 右浸出スルヲ十二時時々振蕩メ滓ヲ去リ半  
 時毎ニ一食匙或ハ二食匙ヲ用ウ

○又方 幾那一弓 沸湯八弓或  
 製法前ニ同シ ○収斂ノ効前劑ヨリ稍烈ナリ

○奪酸幾那浸 幾那ニ含蓄セル没食子酸。太  
 幾那ノ効カヲ損ス。故ニ世人此酸ヲ制尅スベ  
 キノ奇藥ヲ求ムルヲ久シ。此ニ諳厄利亞ノ醫  
 華荅バタイ名人。矢厄德グイテ名人ノ二賢并ニ獨シノ骨布等繼  
 キ起リテ。始メテ煨製麻偃涅矢亞ヲ伍用メ善  
 ク其酸ヲ制スルノ効アルヲ称セリ 幾那一  
 煨麻偃涅矢亞 三錢

右二味精細ニ混和セシメ。沸湯八弓ヲ取テ。徐

々ニ灌キ能ク研磨シテ後温處ニ置テ一二時  
冷定メ硝子壘ニ入レ固封シ貯フ但此方ハ制  
酸ノ効切實ナラズトス

○又方 幾那 適宜

煨麻屈涅矢亞幾那ノ量四分

右ニ味能ク混和シ精製燒酒ヲ注キ能ク研磨  
スル一八分時ニメ微火ニ上セ熬乾シ硝子壘  
ニ入レ固封シ貯フ○此方ハ臥兎寧硬ノ大學  
者普度栗僧ノ製ニメ頗穩當ナリ○又幾那ノ  
性ト線條ノ質トヲ分離シ去リテ獨其解熱ノ

効分ノミヲ存スル最良方アリ之ヲ解熱散一  
名粗製規尼捏ト云其方鹽酸ト水ヲ以テ幾那  
ヲ煎シ放冷シ石灰水或ハ亞爾加里液ヲ加ヘ  
テ澱粉ヲ沈降シ刺水ヲ去リ澱粉ヲ乾シ硝子  
壘ニ固封シ貯フ

○酒浸劑方 水浸奪酸劑ノ二方ニ比スレバ

効力最峻ナリ加之消食器虛弱セル患者ニ用  
井テ害ヲナスト亦甚鮮シ 幾那一弓 列  
印設酒或是斑牙酒 右列印酒ヲ硝子壘ニ  
入レ幾那ヲ投シ暖處ニ置キ浸出スル一十

二時

○幾那煎

此方ハ幾那劑中ノ最常用ニ供ス  
ベキ者ナリ○當初幾那ヲ煎ズルヤ其効力ヲ  
メ尤峻烈ナラシメンカ為ニ武火ヲ以テ熟煮  
スルヲ數時間ニ至レリ近時分析家皆謂ラク  
幾那ヲ煎スルノ法古人ノ如キハ却テ其効力  
ヲ耗脱メ唯木質ノ纖維ヲ殘スノミト故ニ更  
ニ一新方ヲ製メ其効力ヲメ耗脱スルヲ十カ  
ラシム

幾那粗末者

水十四

右二味磁器ニ入



レ能ク蓋封シ徐々ニ煮ルヲ八分時許ニメ漉  
メ滓ヲ去リハ弓ヲ取ル○其滓ニ亦ホ全ク効  
力ヲ脱失セザル故ニ収メ貯ヘテ以テ調理藥  
トシ寒素家ノ病後ニ用ウベシ

○加酸幾那煎

斯スマラチンガ答羅新瓦トモホイス名人扭菟催斯名等

○加酸幾那浸

幾那煎及ヒ幾那浸ノ解熱ノ効ヲメ更ニ峻烈  
ナラシメンガ為ニ硫酸或ハ鹽酸ヲ加フ其方  
幾那煎或浸硫酸或鹽酸右混合シ用  
ウルヲ幾那煎ノ如シ○往來熱癆瘵シカハル矢苟兒ボイ倍

苦。百日咳等。鹽酸ノ方ヲ用井テ。屢良効ヲ得  
タリ

○煎浸合方 此方ハ一藥劑中。煎劑浸劑ノ性

効ヲ併有スル者ナリ 幾那粗末者 水六

右ニ味合シ。振蕩スル。數時。漉過シ。滓ヲ取リ。

又其滓ニ水十八弓ヲ加ヘ。煎シ。漉メ。前ノ浸劑

ニ和シ服ス

○幾那昆爾 幾那末一分 蜂蜜或砂糖 清

水或八十分 右幾那ヲ以テ蜂蜜ニ和シ。清

水ヲ注キ泡釀セシム。是蜜經斯名亞利別爾 薦

名般哥古 泊古斯名 等ノ製法ナリ

○幾那劑ノ藥局ニ製造スル者

○幾那軟越幾斯エキスタラク 去ム。コル幾那適

宜ヲ取リ。煎シ。漉シ。又其滓ニ水ヲ加ヘ。煎ス。此

ノ如クスル。數次ニメ。其煎汁ヲ集メ取リ。文

火ニ上テ。煎熬ノ水氣ヲ去リ。越幾斯ノ稠トナ

ス。○服量一乃ヨリ半弓ニ至ル

○幾那硬越幾斯エキスタラク 去ム。コルト。ベル

羅赭色 幾那或ハ赤 幾那ヲ以テ。上條ノ如ク

製シタル越幾斯ヲ尚煎熬シ。水氣盡キテ研末

スベキニ至ル

○寒製幾那越幾斯エキスタラクモ、フリギデ、ハラ

**補** 增補依百乙藥性論ニ曰寒製幾那浸シ

ナ蘭ハ幾那末一弓清冷水十二弓右混合時  
々振盪シ浸出スル一六時ニメ絞リ濾シ清  
定シ滓ヲ去リ其液ヲ徐々ニ煎熬メ越幾斯  
稠トナシ微火ヲ以テ熬乾ス之ヲ寒製幾  
那越幾斯ルエキスタラクモ、フリギデ、ハラトベ一ニ

合來氏ガライ名幾那鹽キナルキナカラインセライスカト名ク

○幾那丁幾チンキチラ、コルテキス、ペル楮色

幾那或ハ赤幾那ヲ以テ製ス幾那一弓

○半錢ヨリ半弓ニ至ル

○彫孤山クサン名複方幾那丁幾チンキチラ、コンボス  
キカ、シキシアミ羅  
幾那二弓 橙皮黄半一弓 攝爾扁荅里亞錢三  
雜腹蘭 四刀 燒酒 二十度者 右硝子壘ニ

入レ固封シ。浸出スル。四日ニメ。漉過シ。滓ヲ去リ貯フ。○間歇熱。神經熱ノ良藥タリ。服量一錢ヨリ三錢ニ至ル。強按ニ一名複方幾那。消毒飲是ナリ。

○ウツキチ複方幾那丁幾スチンキ。去ラ。コンボ。  
名複方幾那 橙皮 健質亞那各四 燒酒度十

者四 右浸出スル。四日。時々振蕩シ。放冷メ。漉過シ。刺賢堙兒精ハ。弓ヲ加フ。○主治同前。一錢ヨリ四錢ニ至ル。

○幾那華爾斯スレシナ。コルト。ベルヒア。 赤幾那

或ハ赭色幾那ヲ以テ製ス。○十二時間ニ一錢ニ至ル。

○幾那舍利別ベルヒム。アス。コルチキス。 幾那

赭色者 白糖六 右幾那一味ヲ以テ煎メ。十八弓ノ液ヲ取リ。白糖ヲ和シ。舍利別ノ稠

トナス。○服量一弓。  
 ○規尼捏キニイ子○聖叔尼捏ソキナ。ログ。 是モ亦幾那

製煉劑ノ一種ニメ。今時藥用ニ供スル者ハ。硫酸規尼捏イ子。鹽酸規尼捏イ子。硫酸聖叔尼捏イ子等ナリ。○規尼捏及ヒ聖叔尼捏ハ。李盧列室爾カシ。葛賢カシ。

名ノ兩家子細ニ幾那類ヲ分析メ得ル者ニメ、  
 共ニ植物ノ羅僭鹽ナリ。○規尼捏ハ白色疏鬆  
 ノ粉ヲナシ、味甚不佳ニメ、頗苦シ、水ニ溶化シ  
 難ク、亞兒箇爾及比亞底兒ニハ能ク溶化ス。○聖  
 叔尼捏ハ大抵白色透亮ニメ、晶葉ノ如ク、或ハ  
 砒鉞ノ如ク、味微苦水ニ溶解シ難シ、亞兒箇爾  
 ニハ溶化シ易ク、其温ナル者ハ殊ニ能ク溶化  
 ス。○既ニ前說ノ如ク、單製ノ幾那羅僭鹽ハ太  
 溶化シ難シ、故ニ酸物ヲ加ヘ製メ、中和鹽性ノ  
 者トナシ、水液ニ溶解シ易カラシメ、聽用ニ便

ナラシム  
 ○硫酸規尼捏キニイチズシルルパスス、キニイナルルキキヲナルル蘭  
 味苦ク、白色ニメ、結芒鉞状ヲナシ、或ハ真珠色  
 ノ如クニメ、細小葉ヲナス、冷水ニハ溶化シ難  
 ク、温湯ニハ溶化シ易シ、亞兒箇爾ニハ最能ク  
 溶化シ、亞的兒ニハ反テ溶化シ易カラス  
 ○鹽酸規尼捏キニイチトトナナスス、ソウウトトシシルルキキニニ  
 ナナ此物前種ニ比スレバ頗能ク溶化ス、故ニ  
 好ンデ賞用スベシト雖風ヲ見テ消化シ易ク、  
 且價ニ稍貴キヲ以テ、方今用ウルノ尚稀ナリ。

本草綱目卷之三  
 藥性論

此鹽溶解ノ藥用ニ供スベシ○輓近又磷酸規  
尼捏キニイ子醋酸規尼捏キニイ子青酸規尼捏キニイ子等ヲ製煉シテ醫  
藥ニ供ス

○諸種ノ幾那羅偃鹽ハ、共ニ諸名家經驗說ノ  
如ク其解熱ノ効大ニ幾那ニ優ルト雖

**本註**胃ノ知覺銳敏ナル者胃瘧或ハ嘔吐ノ  
徵アル者、尿管ノ刺衝機大過ナル者、血液頭  
部ニ灌漑スル者、自汗ノ徵アル者、衰耗下利  
ヲ發セントスル者等ハ、共ニ規尼捏ヲ用井  
テ害アリ

然ドモ幾那皮ニ具有セル収斂防腐壅閉強壯  
等ノ性能ハ、全ク之ヲ脱失ス故ニ唯其解熱ノ  
効ノミ、持リ幾那皮ニ倍徒セリ、加之少量ニ与  
ヘテ解熱ノ効頗ル烈ク、消食器大衰スル者ニ  
投メ、藥害ヲ見ルナク、一味地ニ幾那ノ氣味  
ヲ嫌惡シ、或ハ幾那ノ切ヲヒタスラ謬解メ、絶テ服シ得  
ザル者、及ビ幼兒ニ處メ太良ナリ○稽留熱ニ  
用井テ効ヲ奏ス、予又腸胃性ノ弛張、稽留神經  
熱ニ用井テ偉効ヲ得タリ、然ドモ其本分ノ主  
治ヲ言ヘバ、間歇熱ノ聖藥タリ、故ニ間歇熱ハ、



其尋常症及ヒ假扮ノ者ヲ論セズ。皆此鹽ヲ用  
井テ、其効尤モ切實ナリ。尚且慢性諸病。消食機  
ノ衰弱。白帶下。舞蹈病。顔面痛。百日咳。瘰癧病。齒  
齦<sup>シケツル</sup>。苟兒<sup>ボイ</sup>倍<sup>ク</sup>苦<sup>ク</sup>ノ模様アル者。熱病後ノ水腫等  
ニモ、亦屢良効ヲ見ル。然レドモ這般ノ慢性病  
ハ、酒製幾那越幾斯。規尼<sup>キ</sup>阿<sup>キ</sup>乙<sup>キ</sup>實<sup>キ</sup>涅<sup>キ</sup>。撒<sup>キ</sup>里<sup>キ</sup>矢<sup>キ</sup>控<sup>キ</sup>ヲ  
勝<sup>キ</sup>レリトス。○規尼<sup>キ</sup>控<sup>キ</sup>ヲ用ウル規範ハ、大約幾  
那<sup>キ</sup>ニ異ナルナシ。○服量ノ多少ハ、患者ノ年齢  
ト病ノ性ト勢トニ從テ、消息スル。最<sup>キ</sup>緊急タ  
リ。小兒ハ大約一日四<sup>キ</sup>分ヨリ六<sup>キ</sup>分至テ取リ。分

チテ每服四分<sup>キ</sup>分ノ一ヨリ半<sup>キ</sup>分ニ至ル。大人ハ  
大抵一時毎ニ二<sup>キ</sup>分ヨリ三<sup>キ</sup>分ニ至ルベシ。○歲  
首間歇熱ハ其服量歲抄間歇熱ヨリ微少ニシ。  
惡性間歇熱。假扮間歇熱。殊ニ疼痛ヲ兼ル間歇  
熱ハ、其量尋常善性ノ間歇熱ヨリ多量ニスベ  
シ。土病ハ流行病ヨリ多量ニスベシ。○方劑ノ  
製尤佳ナル者ハ、白糖。麻<sup>キ</sup>屈<sup>キ</sup>涅<sup>キ</sup>。矢<sup>キ</sup>亞<sup>キ</sup>等ヲ加ヘテ  
散トナシ。或ハ白蒸餅心。甘草膏等ヲ加ヘテ丸  
トナシ。或ハ香竈ノ藥品。酸味ノ舍利別等ヲ和  
シテ孟<sup>キ</sup>屈<sup>キ</sup>設<sup>キ</sup>爾<sup>キ</sup>トナシ。或ハ規尼<sup>キ</sup>控<sup>キ</sup>四<sup>キ</sup>分ヨリ六

氏至ヲ乳糖ニ和シタル者ヲ取テ、齒齦ニ塗擦  
シ、或ハ規尼捏六爪ヨリ八爪至ヲ、忽布滿鎮痛  
液半錢ニ溶解メ心窩ニ擦ス、後ノ二方ハ、小兒  
藥劑ヲ用ウルヲ能ハザル者ニ殊稱セリ、或ハ  
少量ノ灌腸劑トナシ用ウ、是モ亦小兒ニ効ア  
リ、或ハ又賢埵兒麻質斯法ヲ行フニハ、規尼捏  
六爪ヨリ十爪至ヲ蠟膏ニ和シ、外皮ヲ剥キ去  
リテ附貼スベシ

**補** 弗利設藥性論ニ曰、規尼捏ノ製法三方  
アリ、其一ハ王幾那或黃幾那粗末一千分、清水六

千分、硫酸二十分、鹽酸四十分、右混合シ、強キ  
火邊ニテ浸出スルヲ半時許、其液ヲ分チ取  
リ、其滓ニ又清水五千分、硫酸二十分、鹽酸四  
十分ヲ加ヘ、前ノ如ク熱浸シ、又之ヲ分チ取  
リ絞リ漉メ、又其滓ニ水酸ヲ加ヘ、浸スル前  
法ノ如クシ、液ヲ分チ取り、三液ヲ合シ、攪拌  
シツ、之ニ精生石灰百八十分ニ、些水ヲ注  
ヒテ粉トナシ、更ニ清水八百分、或ハ千分ヲ  
注ヒテ、毳布トナス者ヲ加ヘテ、澱粉ヲ沈降  
セシメ、冷水二千五百分ヲ以テ洗ヒ、水ヲ去

リ、布上ニ無膠紙ヲ敷キ、澱粉ヲ置キ、水盡キ  
 テ後絞リ乾シ、火酒二十五度ノ者五百分ヲ  
 注キ加ヘ、蒸餾器ニ入レ、酒氣ヲ蒸餾シ取り  
 貯ヘ、餘液ヲ絞リ去リ、又其澱粉ニ火酒三百  
 五十分ヲ加ヘテ、前ノ如ク蒸餾スル一二回、  
 此三蒸餾液ヲ合シ、八分ノ七ヲ蒸餾シ去リ、  
 其餘液ニ稀硫酸硫酸一分水ニ配合ノ者ヲ加ヘ、飽和  
 スルニ至リ、其ノ獸炭ヲ加ヘテ火ニ温メ、温  
 ニ乗メ漉過シ、枝ヲ分チタル芒ヲ結フニ至  
 ル○其二、王幾那或黃那細末二比、雨水ノ熱

湯十二比、鹽酸一弓半、右三味混合浸出スル  
 一二三時、或ハ四時ニメ漉過絞出シ、其滓ニ水  
 酸ヲ加ヘ前ノ如ク浸出漉過スル一二回、其  
 三浸液ヲ合シ、腐蝕加里ヲ加ヘテ、酸味ナキ  
 至テ飽和セシメ、水氣ヲ蒸散メ四比ノ液ヲ取  
 リ、放冷漉過シ、清澄ノ液トナルニ至リ、新煨  
 石灰一弓ニ水ヲ注キ、飽和セシメタル者ヲ  
 加ヘ、放置スル一日、其間時々振盪シ、漉過  
 シ、澱粉ヲ冷水ニテ洗ヒ乾シ、研末シ、火酒三  
 十二度ノ者八分ヲ加ヘテ、浸出スル一二回、

其三液ヲ合シ、蒸餾メ殘液四<sub>三</sub>ニ至リ、其殘液ニ稀硫酸五倍ノ水ヲ以テ稀薄スル者五錢以上ヲ注キ、規キニイ尼子掬ヲ飽和シ、火ニ上セ攪拌シツ、徐々緩々ニ水氣ヲ蒸散スレハ、凝塊ヲ得、此塊ヲ絞リ、蒸餾水少許ヲ加ヘテ、又絞ル、此ノ如クスル<sub>一</sub>三四ニメ、蒸餾水ノ熱湯九<sub>比</sub>或ハ十<sub>比</sub>ニ溶解シ、芒ヲ結ハシム○其三王<sub>幾</sub>那<sub>黃</sub>或<sub>幾</sub>那<sub>千</sub>分<sub>水</sub>六<sub>千</sub>分<sub>硫酸</sub>五<sub>十分</sub>右混合剪スル<sub>一</sub>小半時<sub>或</sub>ハ半時ニメ其液ヲ分テ貯ヘ、其滓ヲ前法ノ如ク煎スル<sub>一</sub>二回<sub>右</sub>三液ヲ合

シ漉過シ、又熱シ攪拌シツ、生石灰二百分ニ、先適宜ノ水ヲ和スル者ヲ加ヘ、煮テ沈澱セシメ、冷水ヲ以テ其澱ヲ洗ヒ乾シ、ホトナシ、火酒二十五度ノ者五百分ヲ以テ熱浸スル<sub>一</sub>小半時ニメ、浸液ヲ分テ貯ヘ、又其滓ニ火酒三百五十分ヲ加ヘテ、浸出スル<sub>一</sub>二回、其三液ヲ合シ、火酒ヲ蒸餾シ盡シ、慎テ殘液ヲ焦着セシムル<sub>一</sub>勿ク、其殘液ニ稀硫酸ヲ加ヘテ飽和シ、獸炭ヲ加ヘ、煮テ漉過シ、水氣ヲ蒸散シ、芒ヲ結ハシメ、能ク乾シ、固封シ貯

本草綱目卷之...

フ、強按規尼捏ノ製法ハ弗利設ニ載スル所  
 ノ三方精細明備ニメ復餘蓋ナシ然氏墨林  
 騏舍密書ニ載スル所ノ説ヲ参考スルニ又  
 大ニ發明スル所アリ故ニ左ニ掲ク  
 墨林騏舍密書ニ曰黃幾那粗末十二比強案  
ニ用ウル所ノ比、澄、坭、兒、蘭、土ノ水百比但  
新製藥量ナリ、文中以下皆同、其水中既ニ先硫酸七五半ヲ加ヘテ合メ百  
 比トナス者ナリ右冷浸スル一十二時ニメ  
 煎スル一一時絞リ濾メ又其滓ニ同量ノ水  
 ヲ加ヘテ第二煎ヲナシテ強ク絞リ漉ス但

硫酸ハ前方ノ半ヲ減スベシ○賢禮私ハ第  
 三煎ヲ作ル然氏上法ノ如ク煎スレハ第三  
 煎ハ剩冗ニ属ス縱令小量ノ規尼捏アルモ  
 其勞ニ稱ハズ○二煎汁ヲ合メ微温ニ乘メ  
 石灰乳強按ニ石灰乳ノ方未詳ナズ弗利  
ニ所謂石灰ニ載スル所ノ規尼捏製法第一方  
トナス者恐ラクハ是ナラシ布ヲ加ヘ姜黃  
 染紙稍色ヲ變スルヲ度トナン十二時間靜  
 定ス○爰ニ此ノ如ク加里ノ量ヲ過サシム  
 ルハ何ソヤ蓋シ石灰乳ヲ加ヘテ即時ニ試  
 ムレバ稍亞尔加里ノ過度ヲ徵スト雖翌日

ニ至レバ全ク中和鹽性ノ液トナリ。規尼捏  
 ノ沈澱速カナラザルヲ以テナリ。○世人皆  
 言、澱粉ヲ洗フニハ大量ノ水ヲ用井、徐々ニ  
 氣中ニ晒乾スベシ此ノ如クスレバ、未、溶化  
 セザル過剩ノ石灰、大氣中ノ炭酸ヲ引テ、結  
 麗トニ變スルヲ以テナリト。○此法ハ甚冗  
 雜ニメ、且時日ヲ費スノミナラズ、此ノ如キ  
 大量ノ水ヲ用ウレバ、一ニ規尼捏、水ニ溶  
 化スルヲ以テ、再此水中ノ規尼捏ヲ分離セ  
 ザルヲ得ズ、故ニ此冗長ヲ省クカ為ニ小

量ノ水ヲ以テ澱粉ヲ洗ヒ、強ク絞リ、炭酸ヲ  
 含ム水ニ撒入シ、再強ク絞リ、即時ニ火酒ニ  
 十度ノ者ヲ熱メ、澱粉ヲ浸出スルヲ數回、浸  
 液全ク苦味ナキニ至ルヲ佳トス。○賢禮ハ  
 此浸液ヲ蒸餾メ、其殘液ニ硫酸ヲ加フト雖  
 予屢之ヲ試ムルニ此殘液ノ上面ニ脂油様  
 ノ物ヲ生ズ、此物獸炭ヲ以テ色分ヲ去ル時  
 ニ方テ、消散メ復生セズ、予ハ此脂油物ヲ以  
 テ、未、硫酸ニ化刻セラレズメ、游離セル規尼  
 捏ニメ、即獸炭ヲ加フルルハ、消散スルハ、溶化

ニアラスメ。耗失スル者トス。故ニ之ヲ防グ  
 ガ為ニ直ニ浸液ニ適宜ノ酸ヲ加ヘテ。十分  
 蒸餾シ。其殘液ニ獸炭ヲ加ヘテ。色分ヲ脱シ。  
 十分水氣ヲ蒸散メ放冷スレバ。至美ノ芒ヲ  
 結フ。○尚殘ル所ノ滴液ヲ數回蒸散スレバ。  
 多量ノ鹽ヲ得ル。然レ其色潔白ナルトヲ得  
 ザルヲ以テ。再溶解メ之ヲ精製スベシ  
 ○規尼阿乙實涅 千八百二十五年及ビ二十六  
 年以還佛蘭西意太里亞。和蘭ノ醫及ヒ獨乙ノ  
 本涅西人北亞墨利加洲ノ醫迦布滿人規尼捏

ヲ製煉シテ。殘リタル母滴中ニ於テ。華爾斯ヲ  
 得テ。解熱藥トシ。一九二八ノ丸ヲ造リ。間歇熱  
 ノ免熱時間。一時毎ニ一九ヲ用井。或ハ叔斂亞  
 的兒ニ溶シ與フ。其効規尼捏ニ異ナルトナシ。  
 只惜ラクハ劇シク胃ニ感シテ。動モスレバ嘔  
 吐ヲナス。然レ價ヒ規尼捏ヨリ賤ナルヲ以テ。  
 寒家ノ治療ニ用井テ便ナリ。○設爾堞兒涅先  
 生此華爾斯中ニ於テ。亦一種ノ亞爾加羅乙甸  
 強按ニ亞爾加羅乙甸ハアルヲ發明シ。之ヲ規  
 尼阿乙實捏ト名ク。其解熱ノ効硫酸規尼ヨリ

武備見藥性論 卷三

優レリト云○此物華爾斯ト密ニ抱合メ分離  
 スルヲ甚難シ○佛蘭西ノ舍密家杭色爾篤人  
 賢禮同侄龍德兒同等ハ設爾丟兒捏君發明ス  
 ル所ノ規尼阿乙實捏ハ規尼捏聖叔尼捏黃色  
 華爾斯ノ三物ヨリ資成スル者ナリト云フ○  
 舍密家經驗ノ說已ニ此ノ如シ而メ醫モ亦曰  
 硫酸規尼捏製餘ノ母滴ハ其効尚硫酸規尼捏  
 ト同一般ノ一二物質ヲ含有ス故ニ之ヲ分析  
 スルハ勞費多シト雖其強壯解熱ノ効豈其勞  
 ニ稱ハスト云ンヤ

**補** 增補依百乙藥性論ニ曰規尼阿乙實捏  
 一名規餒的ト云其規尼捏聖叔尼捏ニ異ナ  
 ル所ハ亞爾加里質ノ甚キト草木ノ生葉ニ  
 點メ綠色ヲ變シ及ヒ酸液ト合スルニ因テ  
 明ナリ○截熱ニハ每服二匁ヲ用井十二匁  
 ヨリ廿四匁至ヲ以テ足レリトス但之ヲ規  
 尼捏ニ比スレバ胃ヲ害スルヲ多シ故ニ熱  
 全ク退カザル前ニ與レバ嘔吐ヲ發ス又規  
 尼阿乙實捏ハ胃液ヲ亞爾加里性ニ變シテ  
 胃ヲ害スルヲアリ熱病ニハ此害時ニ甚キ



醋少許ヲ飲マシムベシ  
 東方諸國ニ於テ設陀列羅百普里怖瓦皮及ヒ  
 亞而沕亞洛麻些葛皮詳未ノ二品ヲ以テ幾那  
 代用ス方今航輸ノ諸邦ニ販ス○伯西兒國名  
 厄僧別矢屈百普里怖瓦皮詳未ヲ代用シ墨是  
 可國名ハ牛亞固及ヒ扶亞白ヲ用ウ○輓近ニ及  
 シテ撒里矢捏必百力捏亞私鳩哩捏詳未必舍里  
 錫栗捏詳未等ヲ以テ規尼捏ニ代用ス  
 宓篤兒藥性論卷三終

宓篤兒藥性論卷四

和蘭 漢侄 宓篤兒 著  
 母沕 普勒歇 校補  
 小倉 洞海林疆健卿 譯補

強壯鮮熱劑トメギカメンタロボラフンチアエ  
ルケンヘンデエンコールン

保固強壯藥カレメチアトニボラセフルス  
ルケンヘンデエンコールン

天馬兒藥性論 卷四

苦味ノ質ヲ以テ腸胃ノ運営ヲ調理シ。消食機及ビ其機ニ關係セル諸般ノ官能ヲ勸發ス。故ニ或ハ健胃藥ト曰フ。此苦味殊ニ植物ノ品ニ多シ。又此苦味ノ多寡ニ由テ。區分ノ四種トナス

第一單苦味 アマロ、シラギ、ミササキ、ビツテレ、ミツデレ

第二粘滑苦味 アマロ、シラギ、ミササキ、ビツテレ、ミツデレ

第三鹹性苦味 アマロ、サリナ、ビツテレ

第四香竄苦味 アマロ、アロマチカ、ビツテレ、ミツデレ

此等ノ保固強壯藥。大率其主治ヲ舉クレハ。諸種ノ長病後。急性病諸器衰弱シ。官能遲怠スル者ニ用井テ。能ク其官能ヲ奮發シ。殊ニ消食器ノ衰弱ヲ鼓舞健運シ。間歇熱ノ輕易ナル者ヲ解截シ。惡液病論ヘバ水腫。矢苟兒

本草綱目卷之四  
鐵

倍苦諸腺病ノ如キヲ治シ。又能ク稀  
釋解凝ス。故ニ肚腹ノ閉塞ニ用井テ  
効アリ。外用メ經久弛緩ノ潰瘍寒脫  
疽ヲ治スル等ナリ。○多血ノ人。燄衝  
ノ徵アル者。血液局處ニ輻湊スル者  
ハ皆害アリ。

保固強壯藥ノ山物ニ出ル者

鐵ハル  
イ  
ス  
ル  
蘭

鐵ハ磁石ノ引カニ由テ。誘引セラレ、者ノ一  
種ニメ。天造ノ金屬中。此物最多キニ居リ。人家

日常ノ用器ヲ製シ。又醫療ノ用ニ供ス。○性。収  
斂ニメ有力ノ調血藥タリ。故ニ血液ノ運行ヲ  
獎進シ。其赤分ノ不足ヲ給シ。飲食消化ノ機ヲ  
變理シ。器械弛緩メ血液過多ナルヲ減シ。又官  
能遲急メ泌液缺乏セ、ヲ増進スル等。其効太  
碩ナリ。○上章ノ說ハ鐵劑効能ハ大綱ナリ。因  
テ其大綱ニ關係スル諸病ヲ掲ゲテ左ニ列ス。  
○大病癒テ後。身体ノ官能復故スルノ時。胃質  
ノ纖維縱緩スルニ因テ。消食機缺損セル者。虛  
性ノ失血。白帶下等ニ偉効アリ。○腹部或ハ陰

本草綱目卷之四

部ノ諸脉管弛緩スルカ。或ハ官能萎衰スルニ  
 因テ。經閉スル者ニ通經劑トシ用井テ効アリ  
 ○某部薄弱ナルニ由テ。冒寒荏丹月ヲ經テ癒  
 ザル者ハ。錢劑ヲ用井テ。其部ヲ收固スレハ即  
 治ス ○ 杙栗必篤名人肺癆ニ用井テ殊効アルヲ  
 賞ス。然レ發熱。焮衝。知覺敏捷。緊脹蓄膿等アル  
 者ハ。必ズ害アリ。戒慎ヲ加フベシ ○ 瘰癧癆ノ  
 恐レアル者ニ。預防劑トシ用ウル。太切要ナ  
 リ ○ 水腫ニ用井テ纖維ノ保固カラ回復シ。諸  
 腺病。諸厄利設病。萎黃病及ヒ神經弛緩或ハ知

覺敏捷等ニ因テ生スル。慢性ノ神經病ニ用井  
 テ良ナリ  
 ○ 錢屑マ羅エイズルヘルリ ○ ヘルリウム、ビルヘラト  
 錢屑ハ銅及ヒ自餘ノ金屬ヲ混ズルニ由テ藥  
 用ニ供スルニハ。磁石ヲ以テ純錢ヲ引キ他ノ  
 混ゼル金屬ヲ去ルベシ ○ 錢ハ胃中ニ入テ酸  
 化シ。而后自家ノ能ヲ逞クス。故ニ胃虛ノ酸敗  
 液ヲ兼ヌル者及ヒ全体ノ衰弱。子宮病。萎黃病  
 諸腺病。白帶下。諸厄利設病。水腫。蛔蟲等ニ用井  
 テ良効アリ ○ 患者ノ年紀ニ隨ヒ。一日二氏ヨ

リ二十匹至ニテ丸若クハ散トシ用ウベシ。鐵屑ハ  
 動モスレバ輒胃部壓迫。心下煩悶便秘等ノ如  
 キ藥害繼發ス。故ニ香竈苦味ノ品ヲ伍スベシ  
 ○此ノ如キ續症ヲ發スルハ。特リ鐵屑ノミニ  
 限ラズ。自餘ノ鐵劑ト雖長服スルトキハ皆然  
 リ。故ニ是ヲ防カント要セハ。腸胃汚物ノ有無  
 ヲ計較シ。少量ヲ用井テ大効アル製劑ヲ撰ミ。

香竈苦味ノ品ヲ配スベシ  
 ○越質屋布斯末兒扶斯プロト、オキシヂム、ヘル  
 ラ、エム、ニグリュム、エチオプス、マルチス、  
 エ、ル、ステ、エイズル、フルシールセル蘭

黑色ノ粉末ニノ性効鐵屑ト異ナルヲナシ然  
 氏之ヲ鐵屑ニ比スレバ。稍胃ヲ感動セザルニ  
 似タリ。故ニ或ハ之ヲ稱用ス。○丸若クハ散ト  
 ナシ。毎服一匹ヨリ六匹至○酸化鹽其餘酸味

ノ品ヲ配スルヲ忌ム  
 ○格碌屈斯末兒扶斯シブカルボナス、ヘルリ、  
 ルム、コロロスト、マルチス、ロゼム、ヘルリ、  
 エ、ス、オ、ド  
 鐵大氣ニ觸レ或ハ雨濕ノ地ニ在テ外面茶褐  
 帶赤色ノ物ヲ生ス之ヲ鐵鏽ト云即格碌屈斯  
 末兒扶斯是ナリ○此物他物ヲ混メ純一ナル

本草綱目卷之四  
 鐵屑

能ハザルヲ以テ醫藥ニ供シ難シ故ニ諸家  
種々ノ製煉アリ爰ニ白耳義局方ニ載スル所  
ノ一法ヲ掲ク其方新製ノ撒兒末爾秩斯溶液  
中ニ次炭酸遭達母油強按次炭酸曹達ハ名ヲ  
加フレバ忽雲脚ヲ生メ器底ニ沈着ス是即精  
製ノ格碌屈斯末兒秩斯ナリ○此物銕屑ニ比  
スレバ効力差強クメ藥害ヲ繼發スルモ亦他  
ノ銕鹽ノ多キガ如クナラズ○精製格碌屈斯  
末兒秩斯ニ沒藥ヲ加フレバ癆瘵ノ一種ニ稱  
譽スル所人傑栗必篤孟僣設爾強按二母湯普

外方叢沒藥條下第三方即是ナリ其方沒藥越  
幾斯一錢ヨリ二錢至格碌屈斯末兒秩私十二  
公橙皮一服晡時一服臨臥一服一日ヲ隔テ其餘  
早朝一服晡時一服臨臥一服一日ヲ隔テ其餘  
ヲ服ノ君藥トナル○全軀衰弱萎黃病及ヒ慢  
性ノ神經病乃顔面痛胃脘痛子宮病舞蹈病ノ  
如キニ用井テ驗アリ○腹内諸臟殊ニ肝脾ノ  
閉塞ニ用井テ頗良効アルヲ稱ス此閉塞病ハ  
方今殊ニ多ク間歇熱後ニ發スルナリ○諳厄  
利亞人曾テ此劑ヲ以テ癌腫ノ要藥トス此事  
全ク信シ難シト雖惡性ノ侵蝕瘍ハ獨リ此劑  
ヲ用井テ確効アリ○丸劑日ニ五公ヨリ二十

密傳 藥性論

卷四

六

氏至。顔面痛ニハ二十氏ヨリ三十氏至。散トナシ用ウ。足ラザル者ハ。尚加ヘテ多量ニ至ルヘシ。○外用散トナシ潰瘍ニ撒ス。○酸物ヲ忌ム

○前劑ニ同シ

○撒兒末爾扶斯ルハス。ヘルリ。サルマルチ

ルズ。エ。イ。ズ。ル。シ。ル。ハ。ト。リ。オ。リ。ム。マ。ル。チ。ス。ロ

色ニメ味収瀋。強壯。収斂。殺蟲ノ効アリ。○此劑ヲ用ウルノ標的。他ノ鉄劑ニ異ナルトナシ。故

ニ水腫ノ纖維衰弱ニ因テ起ル者。萎黃病。虚性ノ失血。蛔虫消渴等ニ用ウ。○外用ハ水ニ溶解

又侵蝕性ノ潰瘍ヲ洗滌ス。○散丸若クハ溶液トシ。毎服二氏ヨリ十氏至。日ニ二次或ハ三次。過服スレハ腹痛嘔吐ヲ發ス

○収斂鉄液

ルミ。ユ。リ。ア。ス。ヘ。ル。リ。キ。ユ。イ。ヅ。ス。ロ。ル。ソ。ウ。ト。シ。ル。エ。イ。ズ

ル蘭 鹽酸鉄ヲ水ニ溶化シ。更ニ鹽酸ヲ徐

々ニ注キ下シ。全ク溶化スルニ至リテ止ム。即

収斂鉄ナリ。○止血ノ良劑ニメ。内外共ニ供用

ス。故ニ虚性ノ諸失血殊ニ子宮ノ脱血。凝体ノ

大ニ弛縦スル者。流体溶崩セントスル者ニ効

アリ。○三十滴ヨリ六十滴ヲ以テ。粘滑ノ飲液

大驚見症生論

卷四

藥學

卷四

七

ニ和シ服ス ○炭酸羅倫鹽硫酸消酸及ヒ單寧  
ヲ含ム諸品ヲ忌ム

○開達鉄丁幾 チンキ ○チンキ タルタリス ○チンキ ポット ○チンキ アス

ルキ イタリ ○チンキ ペ子 ○チンキ エ ○チンキ ズル ○チンキ

ヲ以テ、白葡萄酒ニ浸出ス ○主治効用諸鉄劑

ニ同シク、禁忌モ亦異ナルナシ ○二十滴ヨ

リ八十滴至

○榎楂加鉄丁幾 チンキ ○チンキ ヘ ○チンキ シド ○チンキ ニ ○チンキ ア ○チンキ タ

鐵屑 適 榎楂實汁 新鮮者 ○三 倍

右ニ味混和シ、浸出スル一ニ日ニメ鉄壺ニ  
入レ、煮テ半ヲ減シ、放冷シ桂精十六分ノ一ヲ  
加フ ○主治諸鉄製劑ニ同シ、三十滴ヨリ六十  
滴至

○碓鐵華 ヘ ○チンキ ア ○チンキ モ ○チンキ ア ○チンキ カ ○チンキ レ ○チンキ カ ○チンキ レ

色橙黄味瀟ニメ差雜腹蘭ノ氣アリ ○

保固強壯開達ノ効アリ、故ニ慢性神經病、内臟  
ノ閉塞諸腺病ヲ治シ、又能ク經ヲ通シ蟲ヲ殺  
ス ○丸劑、毎服五瓜ヨリ十五瓜至、日ニ二三

大馬路生藥

卷四



弊點舎脬神經丁幾アルコルヘルシリ○チリコア  
チンキ子ルヒトベススセヒ羅セーニキ  
鹽酸鐵適ヲ以テ其量四倍ノ亞的兒ニ溶化ス  
レバ忽澱脚ヲ生メ器底ニ沈定ス其時上清ヲ  
傾ケ去リ澱脚ヲ乾シ更ニ八倍ノ亞爾固兒ヲ  
加ヘ硝子壘ニ入レ固封シ陰處ニ貯ノ強按ニ  
方ニ載スル者其製法稍異ナリ其方鹽酸鐵一  
分ヲ取リ亞的兒四分中ニ溶化シ後沈澱セ  
シメ澆過メ滓ヲ去リ液ヲ取リ亞爾固兒八分  
ヲ加ヘ合シ静定メ後細長ノ玻璃瓶ニ入レ固  
封シ日晒ナキニ至ル○強壯鎮痙止痛ノ効ア  
リ二十滴ヨリ六十滴ヲ以テ白糖或ハ孟屈設

爾ニ和シ服ス○禁忌収斂鐵液ニ同シ  
補 青酸鐵シアニレキムヘルリ○プロウト  
増補依百乙藥性論ニ曰藥用ニ供スル青酸  
鐵ハ二分ノ青素ト鐵ト相和スル者ナリ之  
ヲテウト、シアニレキムヘルリト云其製法ハ  
酸化鐵鹽即チ第二硫酸鐵ズワフルシエールテ  
ルセルヲ以テ精製血灰鹽ブルソウトヲ分  
析スレバ暗青色ノ物沈降ス此物尋常ノ洋  
龍ベレラレト異ナル所ハ其製法ノ純精

ナルノミナラズ尚且微シモプロトシヤニレ  
テムヘルリヲ含有セサルニ因ル○青酸鋳  
ハ天藍色ニメ氣味共ニナキ粉末ナリ水火  
酒稀酸ニハ溶解セズ至極ノ熱度ニテハ分  
析ノ酸化鋳ヲ殘ス腐蝕加里ヲ加フモ亦分  
析ノ酸化鋳ヲ餘ス○青酸鋳中微シモ洋靛  
ヲ雜ヘサルヲ徵スルニハ青酸鋳ヲ稀硫酸  
ニ熱浸シ加里溶液ヲ點滴シテ微シモ粘膠  
物或ハ白堊ヲ生セサル者ヲ純精ノ青酸鋳  
トシ之ヲ生ズル者ハ洋靛ヲ含ム或ハ之ヲ

加へ噴造スル者トス○青酸鋳ハ北亞墨利  
加ノ醫間歇熱ニ用井テ良効アリト云或胃  
ノ知覺銳敏ナル者ニ用井テ惡心嘔吐ヲ發  
セズ能ク之ヲ受ルヲ以テ幾那皮ニモ勝ル  
トアリト云其量十二時中ニ四匁ヨリ六匁  
ヲ用ウ○此故ニ時期ヲ定メテ發歇スル頭  
痛及ビ赤痢ノ數時稽留セル者ニ每服三匁  
ヨリ六匁ヲ取テ白糖ヲ加ヘテ散トナシ用  
井テ良効アリ○癩癩ニ甚タ稱用ス若夫癩  
癩發ノ後既ニ數年ニ及フト雖其因器械ノ

缺損ニアラザル者ハ之ヲ用井テ偉効アリ  
其量先半ハヲ日用シ漸々増量メ三ハヨリ  
六ハ尚大量ニ至ルベシ

**補**

炭素銕 カルビニヒトス、エイズル羅

増補依百乙藥性論ニ曰炭素ト銕ト天然相  
合スル者ヲ石墨トガト○プリト○ポト口ト名  
ク是即炭素銕ナリ此物近年醫藥ニ供ス○  
炭素銕ハ炭素九十六分銕四分ニナル一種  
ノ鑛石ニメ其質堅實氣味共ニナク黒色ニ  
メ鑛光アリ研末トナスベク指ニ捺メ蠟脂

ノ如ク覺ヘ墨ノ用トナスベシ○尋常坊間  
ニ鬻ク所ノ石墨粉ハ藥用ニ堪ヘズ塊片ノ  
者ヲ撰ミ用ウベシ其君別爾蘭土地ノボル  
ロウダーレニ出ル者至精ノ品ナリ○炭素  
銕ヲ内外藥用ニ供スルハ吻印福尔土名ヲ  
以テ初トナシ爾後稱用スル者漸多シ○炭  
素銕ハ慢性皮膚病其因ヲ全身ノ病況ニ取ル  
カ或ハ皮膚病ノ苛毒ヨリ全身病況ヲ誘發ス  
ル者ニ用井テ殊効アリ○炭素銕ヲ用ウレ  
ハ尿ノ分利増盛シ且塗渣ヲ生ズ其塗渣ハ

皮膚全治セントスルニ至リテ始メテ止ム。其他ハ一モ瞑眩ノ諸症ヲ發スルナシ○  
 每服半錢迄ヲ朝夕用ウ。但、皮膚全治ニ至ルニハ、一弓ヲ以テ足レリトス○煉。挺若クハ丸トナシ与フ。其方炭素錢一弓。蜂蜜四弓。右二味混合煉劑トナシ。每服一哥喜匙。朝夕二次。又方炭素錢杜松子末各等分。右調勻挺子トナス。又方炭素錢蜀羊泉越幾私安質母尼劑。右三味調勻シ丸トナス○外用ハ其効力大ニ内服ニ勝ル。軟膏ハ炭素錢二錢家猪脂

十錢右調勻シ。皮膚ノ知覺銳鈍ノ度ニ從テ。或ハ強擦シ。或ハ緩塗スル。一日ニ二次若知覺過敏ノ患者。或ハ皮膚未タ甚タ蔓延セザル者ハ、炭素錢一錢。右鹼硬膏二錢ヲ以テ。硬膏ヲ製シ。以テ之ヲ貼スル。一日ニ二次效アリ

○鐵泉  
 ア多子、ミ子、ラ子、レ子、エ子、ズ子、ル子、ホ子、ウ子、デ子、ア子、ワ子、

附録ニ出ツ  
 單苦味 アマラ、シンセラ、ス、ヒラ、羅、蘭

健質亞那ゲラチキス、ゲンチアアナ、ラアルテ、ル蘭  
 林氏ノ所謂ゲンチアナ、ミテ、アノ根ナリ、形圓  
 柱ノ如ク、大一母指、長一二尺許、横ニ緻密ノ皺  
 文アリテ、互ニ相輪環ス、外面黯褐色、内面黄色、  
 味甚苦、ノ微臭アリ、或ハ全ク無キ者アリ、牙而  
 白山獨ニト意、太里比勒、何山、佛蘭西ト是、斑  
 獨乙名國及ビ北米利幹洲等ニ産ス、○舍密家、此  
 根ヲ分析メ、峻苦ノ一元素ヲ得タリ、之ヲ健質  
 亜捏ト云、是健質亞那根ニ固有スル所ノ保固  
 強壯ノ效分サリ、此物黄色ニメ味太苦ク、臭氣

大シ、亞爾箇兒亞的兒、温湯ニ能ク溶解シ、冷水  
 ニ溶解シ難シ、○健質亞那ハ健胃ノ一良藥タ  
 リ、故ニ消食機ノ虚弱ヨリ生スル諸病、諭ヘハ  
 酸敗液、風氣膨脹、蛔虫、間歇熱等ニ効アリ、○瘰  
 癧病ノ初起、依剎昆垓兒、子宮病、脚氣及ヒ痛風  
 ノ發作後、劇病回復ノ時期等ニ偉効アリ、○散  
 劑、每服一カヨリ二カ至、日ニ一二次、水浸劑或  
 ハ酒浸劑ハ、半カヨリ一カ至、浸出メハカヨリ  
 十二カノ液ヲ取ル、一時毎ニ一匙ヲ服ス、○越  
 幾斯ハ、日ニ一錢ヨリ二錢至、丸或ハ孟屈設爾

トシ用ウ。此劑尤穩當ニメ用井易シ○自餘尚

健質亞那丁幾ゲンチナアナラ 健質亞那ゲンチナアナラ 宜適

燒酒者十五度 右二味浸出スル一三日○每

服一錢日ニ數次

○複方健質亞那丁幾ヒニム、ゲンチナアナラ、ヒニム、アマコシホ

橙皮ニ錢 白桂一錢 燒酒者十五度 白葡

萄酒是班牙產 右四味細ニ剉ニ燒酒ニ

浸出スル一昼夜次ニ葡萄酒ヲ加ヘ又浸出

スル一四日。漉過シ貯フ○健胃驅熱ノ良方ナ

健質亞捏チンキテラ、ゲ 健質亞捏五瓜

燒酒者二十四度 健質亞捏五瓜

○健質亞捏舍利別チンキテラ、ゲ 健質亞捏五瓜

舍利別一匕 健質亞捏五瓜

括矢亞グツシニア、ホウツシア 羅

林氏ノグツシア、アマラト 云者ハ修里諾シユリナメ 默名

加印子 捏同 伯西兒同 等ニ産スル灌木ノ材ナリ

材片グツシア、エキセルサ、ズワルト 山ト呼

フ者ハ、西印度（按ニ北米利幹洲ノ花地ト南  
米利幹洲北濱ノ間ニアル諸島  
 ノ総名ノ諸島殊ニ南亞墨利加ニ産スル喬木  
 ナリ材片○幹材根材共ニ藥用ニ供ス。幹材ハ  
 淡白硬固。根材ハ灰白味甚苦ク臭ナシ○保固  
 強壯ノ性健質亞那ニ勝レリ。故ニ健質亞那的  
 當ノ諸病ニ殊効ヲ奏ス。就中内臟衰弱ヨリ發  
 スル黃疸下利ヲ治シ。又歳首間歇熱ニ用井テ。  
 能ク其熱ヲ解截ス○劇病癒テ後平常ニ復セ  
 ントスル時之ヲ用ウル。他ノ苦味藥ニ先タ  
 ツト多時ナルモ其害ヲ見ル。ナク。反テ能ク

受容スルナリ○大約浸劑ハ一タヨリ半錢至  
 ヲ取り。浸メハ弓ノ液ヲ取り服ス。散劑ハ用ウ  
 ル。稀ナリ○括矢亞ノ浸汁ハ能ク蠅ヲ殺ス  
 ○括矢亞越幾私 日ニ服メ一錢ニ至ル。丸若  
 クハ孟屈設爾ニ和シ用ウ  
 ○括矢亞丁幾チンキア 括矢亞一弓 燒酒  
十五度 右ニ味合シ。浸出スル。三日○  
者六弓 每服十滴ヨリ六十滴至日ニ三次或ハ四次  
 珊篤里ハイルバ、セド、ギル、レイン、コロイド、蘭  
 世ニ所謂センタウレウム、ミニス草ナリ。林氏

大寫見藥生論 卷四

之ヲ「ゲンチアナ」セントリト云。砂壤ノ荒野  
林麓ニ生ス。宿根セス。○莖葉花杪共ニ採用ス。  
然氏花杪ハ苦味鮮シ。故ニ莖葉ヲ用ウルヲ勝  
レリトス。○性効健質安那ニ同シ。故ニ主治モ  
亦異ナルナシ。加之鮮凝ノ効最峻ナルヲ以  
テ。内臓ノ粘液閉塞ニ因テ發スル間歇熱水腫  
等ニ殊稱アリ。

○珊蔦里越幾斯ハ穂和ニメ最用并易キ劑ナリ。  
故ニ珊蔦里ヲ用ウルニハ大抵其越幾斯一錢  
ヨリ三錢至丸若クハ孟偃設ルニ和シ用ウル

ヲ良トス  
睡菜 ヘルバトリホリイ。ヒブリンニトトリホリム。  
アキアチキム グデリイブム。○ワド蘭

湟池卑湿ノ地ニ生ス。宿根草ナリ。林氏之ヲメ  
ニアンテス。トリホリアダト云。○生草ハ太多  
液ニメ單苦味ナリ。秋月花後ニ採収スル者最  
良ナリ。○和蘭ニ産スル苦味ノ一良藥ナリ。故  
ニ胃腸ノ衰弱及ヒ其衰弱ヨリ發スル諸症乃  
消化不良ノ者間歇熱依刺昆侄兒ニ殊効アリ。  
又内臓ノ虚弱或ハ閉塞ヨリ生スル黄疸水腫



ニ宜シ。矢苟兒倍苦ノ景況アル者之ヲ用井テ  
 奇驗アリ○多クハ越幾斯半錢ヨリ一錢ヲ取  
 テ丸或ハ孟僂設爾ニ和シ用ウ○煎劑ハ生絞  
 汁ノ如ク矢苟兒倍苦瘍ニ外用スルノミ  
 格綸僕コリユンボラヂキス。コリユンボ羅  
 麻鳥理黜斯マウリツス名島ニ産スル宿根草コクキリス。ハ  
 ルマモス。デカンドルリ。又「ニスペル」ム  
 パルマモム。ラマルキ」ト稱スル者ノ根ナリ  
 ○此根横断メ扁圓ノ片トナシ諸邦ニ輸ス其  
 切片外面黯赭色ニメ質海綿ノ如ク内面黄色

中心緑黄色ニメ其質粉末ヲ束聚スル者ノ如  
 ク味苦辛ニメ不佳ナリ○單苦味ノ保固強壯  
 藥ニメ兼テ粘液質ヲ具有シ多少緩和ノ効  
 リ胃及ヒ自餘内臓虚弱ニ其虚弱ニ由テ胆  
 液ノ分泌常調ヲ失フ者コ偉効アリ又下利ノ  
 荏冉タル者痢疾霍乱胆液ヲ吐スル者ニ用井  
 テ佳ナリ○癆瘵ノ患者其病末ニ發スル溶崩  
 下利ノ一良藥トス又小兒生齒ノ時下利ヲ發  
 シ後續テ常習トナル者ニ用井テ奇驗アリ○  
 此品ハ患者ノ形状ニ随テ香竈ノ品或ハ阿芙蓉

本草綱目

十七

蓉或ハ鉄劑ヲ配スルヲ宜トス ○散劑每服十五  
五ハヨリ三十ハ至日ニ三四次然レ之ヲ用ウ  
ル一稀ナリ太約酒或ハ水ヲ以テ浸劑若クハ  
煎劑ヲ製シ用ウ即半弓ヨリ一弓至煎或浸メ  
ハ弓ノ液ヲ取ル

○格綸僕越幾斯 日ニ一錢或ハ二錢ヲ取テ

尤若クハ孟屈設アルトナシ用ウ

○格綸僕丁幾 コレキ去ラ 此丁幾ハ和蘭ノ

藥局ニ記載セル者ニアラズト雖健胃ノ藥液  
ニ加ヘ用非テ屢效アリ服量一錢ヨリ二錢至

格綸僕根 半ニ弓 燒酒 二十度者 右ニ味

合シ浸出スルヲ十四日 此品ハ多量ノ粘液ヲ含蓄セルヲ以テ

粘滑苦味 アマロミシラギノサ羅

緩和粘滑ノ部ニ算収スル者アリ然レ

余ハ其保固ノ性ニ就テ強壯藥中ニ列

ス ○發熱或ハ局部焮衝ノ如キ脉管ヲ

刺衝スル景况アル者ニ之ヲ用ウレハ

自餘ノ粘滑藥ノ如ク相應セザルノミ

本草綱目

卷四

依蘭苔 エリセ、イスララドセ、モスキス 羅

歐羅巴洲ノ北方寒地ニ産スル所ノ木葉ノ如キ藓苔ナリ。依蘭地ニ在テハ、此苔ヲ以テ膏ニ醫藥ニ供スルノミナラズ、又日常ノ食料トス。故ニ依蘭地苔ノ名アリ。○味苦クメ粘膠シ臭氣ナシ。然レ老苔ハ苦味ナシ、亦濃煎スルモ苦味ヲ脱ス。○滋養強壯ノ効アリ。  
第一 生力脱衰及ビ羸瘦衰耗下利、失血、亡液等ノ後、荏苒回復ノ徵アリテ、生力沈衰シ、身体羸瘦スル者ニ殊効アリ。

第二 肺臟病 肺癆ノ一妙藥トシ、其稱太隆ナリ。何

トナレバ肺癆ニ用ウル諸藥、一モ不消慮得ニ用ウベキノ品アルナク、動スレバ輒チ害ヲ將出シ来ルト雖レ、獨リ依蘭苔ノミ、能ク戒慎メ之ヲ用ウレバ、害ヲ招クルナク肺癆ノ強壯藥中、其右ニ出ル者ナキヲ以テナリ。○胃腸ノ虚弱ニ起因セル癆瘵病ヲ治ス。○間歇熱或ハ聖京倔熱ノ後、屢遺留スル所ノ慢性咳嗽、兼テ多量ノ粘痰ヲ咯出スル者ニ奇効アリ。○粘液癆ハ疥ニ發セントスルヲ豫防シ、其已ニ發ス

本草綱目卷之九

卷之九

ル者ハ亦能ク之ヲ治ス○餘毒ニ因テ發スル  
 所ノ肺癆ヲ治ス故ニ痘瘡麻疹等ノ後咳嗽淹  
 滯シテ休ズ身体大ニ羸瘦シ多量ノ膿様痰ヲ  
 咯出スル者ニ用井テ烈功アル良藥トス○肺  
 瘍破潰シ瘍縁弛縦ノ藍縷ノ如ク稀膿夥ク流  
 出スル者ハ蘭苔缺クベカラサル病トス殊ニ  
 博學ノ黜私聖吉名類リニ大効アルヲ稱セリ  
 ○肺癆ノ末期ニ於テ幾那蘭苔ノ配伍最切要  
 タリ是ニ因テ生カヲ補續シ傍症ヲ寬輕シテ  
 速ニ死セザラシム○癆病仍ヲ微ク熾衝ヲ帶

ビ其熱尚肌膚乾燥肌熱等ヲ兼子呼吸器刺戟  
 ノ景況アリテ痰咯出シ難ク或ハ百日ノ咯出  
 スルモ其量至テ少キ者ハ共ニ蘭苔ヲ用ウベ  
 カラズ  
 三第百日咳ノ末期痙攣ノ状既ニ全ク退クト雖  
 呼吸器ノ衰弱ニ由テ咳嗽咯痰尚在冉トシテ  
 癒ガル者ニ良驗アリ  
 四第泌尿器病泌尿器ノ粘液脫亡及ヒ其器ノ衰  
 弱ヨリ粘液過泌スル者諭ヘバ膏麻ノ如キヲ  
 治ス

第五 飲服毒蘭苔ノ粘液能ク其苛毒ヲ包攝ス。然  
氏其毒胃中ニ在テ未タ苛勢ヲ振ハザルノ前  
ニアラザレバ益ナシ

第六 下利泄瀉腸瘍等ニ殊効アリ ○蘭苔ノ此諸  
病ニ効アル所以ノ者ハ唯ニ其粘液ヲ以テ苛  
毒ヲ包攝スルノ緊要タルノミナラス更ニ又  
苦味ト纖維依蘭苔纖維トヲ以テ腸ノ弛衰ヲ強健  
ニス故ニ殊ニ病末病慢性ニ轉セトスルトキニ用井テ偉  
効アリ

○蘭苔ハ煎用スルノ外餘劑ヲ製セズ粘液苦味

等ノ耗脱セザラン一ヲ要セバ半ヲヨリ一ヲ  
至水十二ヲヨリ止ヲ至ヲ以テ煎ズル一小半  
時ナルベシ。若唯粘液ノミヲ得ント要セバ先

水浸スル一八分時ニメ後之ヲ煎ズベシ

○依蘭苔依蘭苔傑列キゲラチナ乙ケレイセニスイスランドヂ

スセモス 依蘭苔半 清水ニ 煎熬

メ六ヲニ至リ白糖四ヲ和シ又煎ノ舍利別  
ノ稠トナス ○每次二錢ヨリ四錢至頻服ス

補 越見實吉醫事日札ニ曰依蘭地苔和胸  
錠ハ蘭苔方劑中ニ在テ肺癆ノ苦痛ヲ寛和

スル最良方トス。其方 蘭苔傑列乙半也

白糖四勺 亞羅比亞護謨一勺 右三味

調勻。坩鍋ニ入レ。微火ニ上セ乾シ。終ニ一塊

トナス。服量ハ日ニ一茶匙ヨリニ茶匙ヲ取

リ。初ハ冷乳ニ溶シ漸次ニ温乳ニ移ルベシ

○此製法ニ由テ。蘭苔ノ苦味殆ト脱ス。然モ

苦味ヲメ全脱セシメント欲セバ灰汁ニ漬

ス。一時許。新汲水ヲ以テ灰味ヲ洗ヒ去ヲ

最良トス  
鹹性苦味 アマロ。サリナ。羅ソウトア  
クナヘ。ビ。テレ。ミ。デ。レン。ウ。ト。ア  
蘭

味苦クメ且各種ノ鹽ヲ含ミ。強壯解凝

ノ効アル。單苦味藥ト中和鹽トヲ配

伍スル者ニ髣髴タリ○此品ハ能ク其

性カラメ粘液腺ニ達セシム。故ニ胃腸

ノ衰弱或ハ粘液。腸胃中ニ蘊蓄スルニ

因テ生ズル諸病ニ効アリ

葛兒儒カ  
ル  
モ  
イ  
ゲ  
カ  
ル  
デ  
セ  
ル  
デ  
ス。  
ベ  
子  
ヂ  
ク  
テ  
ル  
蘭

林氏ノ所謂「センタウレア」ベ子ヂクタノ屬ナ

リ。此草歐羅巴ノ南地ニ産シ。獨乙。和蘭等ニ在

テハ多ク藥園ニ栽植ス。藥用ニ供スル者ハ五

六月花未發セザル前ニ採収スベシ○味太苦  
 久。臭氣不佳ニメ或ハ間、惡心嘔吐ヲ發スルニ  
 至ル○保固強壯發汗解凝利尿ノ効アリ  
 間歇熱經久頑固ノ間歇熱或ハ其熱内臟彼是  
 ノ閉塞ニ由リ持スルヲ以テ幾那用ウ可ラ  
 ザルノ症ニ良効アリ  
 粘液熱及ヒ神經性ノ粘液熱ニ殊効アリ○興  
 奮解凝強壯ノ効ヲ合セテ一齊ニ之ヲ得ント  
 欲スル者ハ硝砂、續草、攝爾扁答利亞等ヲ配伍  
 スルモ其効未ダ十分ト稱スベカラズ

聖京屈病發熱咳嗽其他聖京屈ノ諸症概メ之  
 フ用ウレバ能ク蒸氣ヲ發シ痰ヲメ咯出シ易  
 カラシメ兼テ粘液膜ノ弛縱ヲ強壯メ經久緩  
 慢ノ病性ニ轉移スル一無ラシム  
 胃病胃弱ニ因テ發スル所ノ胃病ニ酸敗液風  
 氣等ヲ無ル者ニ良驗アリ  
 慢性諸病内臟及ヒ腺ノ閉塞或ハ衰弱等ニ由  
 テ發スル所ノ慢性病論ハ水腫黃疸依剥昆  
 垓兒月經不順等ニ治驗多シ  
 ○往昔是ヲ以テ諸癆瘵ノ聖藥トシ天幸草ノ

美稱ヲ命セリ○散劑ニ夕ヨリ三夕至煎劑或ハ浸劑ハ一弓ヲ以テ煎メハ弓ノ液ヲ取ル

○葛兒儒越幾私 日ニ一錢ヨリ四錢至

紫堇 ヒマリア。オヒシナリス。アールドローク。蘭

和蘭ニ在テハ多ク菜畦蔬圃ニ自生ス。味微鹹

苦ニメ臭氣ナク。性効自餘ノ鹹性苦味藥ニ同

シ○間歇熱。黃疸。水腫。依利昆垓兒等。内臓ノ閉

塞殊ニ門脈ノ閉塞ヲ合併セル者ニ稱用ス○

石淋及ヒ諸結石病等ニハ大黃勿擲祭亞石鹼

ヲ加ヘ用井テ。其効太峻ナリ○頑癩ノ皮病ニ

ハ蜀羊泉。水銀製劑。安質母尼製劑ト相配メ良効ヲ奏ス○新鮮絞汁ハ内服メ血質ヲ淨潔シ。外用メ角膜ノ星翳ヲ消ス

○紫堇越幾私 是最モ多ク用ウル劑ナリ○日

ニ一弓ヨリ一弓半ヲ服ス

蒲公英 ブラキキ。サキム。ゲラ子。パール。タ

林氏之ヲ「ホ」ズブルト云。或ハ「レ」オントドン

タラキサキムト云。和蘭ニ在テハ隨地皆生ス

○莖葉根共ニ乳汁ヲ含ム。殊ニ根ニ多シ。乳ノ

鮮ナル者ハ味微苦微鹹。甘ニメ粘滑アリ。効能



專此汁ニアリ○保固強壯ノ性ハ自餘ノ強壯  
 苦味藥ニ及バズト雖獨解凝ノ効ニ於テハ頗  
 烈ナリ故ニ腸及ヒ腸間膜腺門脈脾肝等ノ壅  
 閉或ハ其壅閉ヨリ生ズル諸病諭ヘハ間歇熱  
 消食機虛弱酸敗液黃疸水腫依刺昆垠鬼羸瘦  
 病等ニ良効アリ○新絞汁ハ能ク血質ヲ稀釋  
 淨潔スルノ効アリ故ニ能ク血中ヨリ滲出シ  
 タル豚肉様皮強按、燃衝後、滲出凝ヲ消散ス○  
 煎劑ハ根一弓ヲ以テ煎メ六弓ヲ取ル○新絞  
 汁ハ日ニ一弓ヨリ二弓至ヲ服シ或ハ直ニ其

生草ノ莖ニ就テ、齧齧メ其乳汁ヲ吸口服スレ  
 ハ、効力最峻ナリ

本註此ハ是輒近ニ至テ德爾綿結名ノ稱用  
 スル所ノ新法ナリ

○蒲公英越幾私 前條ノ新法ハ其効實ニ他劑  
 ニ勝ルト雖恨ムラクハ常ニ生草ヲ得ルヲ能  
 ハズ故ニ春間ニ生草ヲ採收シ此劑ヲ製メ以  
 テ其缺乏ニ備フヘシ○日ニ一弓ヨリ一弓半  
 至ヲ服ス

麻爾羅歌マールロロロロ、アルガレム○

此草歐羅巴ノ北地ニ産ス。味甚苦鹹ニノ竄透  
ノ香氣アリ。古昔ハ頻ニ通經ノ効ヲ褒スレド  
モ。今ハ之ヲ稱スル者鮮シ。然レ持鮮凝ノ功ニ  
至テハ。實ニ峻ナリ。故ニ善ク腹内諸臟ノ壅閉  
ヲ解釈ス。○粘液性ノ喘息ニ殊効アリ。○新絞  
汁殊ニ越幾斯ヲ賞用ス。○半夕ヨリ一錢ヲ服

矢枯列乙シコロム、イシコロイ子シコロイ蘭ス  
和蘭ニ産スル所ノ草根ナリ。形指圓ニノ大指  
ノ如ク。外面赤色。内面白色。味苦クメ臭ナシ。○

苦烈ノ乳汁ヲ含ム。蒲公英ノ如ク。主治効能  
モ亦異ナル。一ナシ。○矢枯列乙及ヒ蒲公英ノ  
生鮮嫩脆ノ莖葉ヲ食ヘバ。淨血稀釈ノ効アル  
一蒿苣ノ如シ

○矢枯列乙越幾斯 一錢ヨリ二錢ヲ服ス  
○矢枯列乙加大黃舍利別 往昔ヨリ此ヲ以テ  
小兒ノ下劑トシ用井テ良效アリ。一卵匙ヨリ

二卵匙至ヲ日服ス  
傑ニ私ニ陀ニケニトニリスニアニダニチニン  
タニニニス  
ヘニメニトニリニアニ○ニシニテニオニルニチニゲニン

和蘭ノ田野礮礮ノ地ニ多ク産ス。矮小ノ灌木ナリ。黄花ヲ開クラ以テ粲然トメ他卉ニ混淆セズ。○苦味解凝ノ効ハ必シモ他ノ強壯藥ニ勝ルニアラザレ氏。近今ニ至テ魯西亞ノ醫麻路攝質名之ヲ以テ恐水病ノ預防藥トシ。賞用セシヨリ以還其名漸ク世ニ顯ハレタリ。○麻氏ノ之ヲ用ウル法ハ。狂獸咬傷ノ後立地ニ傑ニ尼斯陀ノ幹枝或ハ花ノ濃煎汁一北半ヲ取テ日ニ服セシメ服メ七週許ノ久シキニ至ル而メ之ヲ服サシムルノ間頻々子細ニ患者ノ舌

下ヲ檢査シ。若シ舌下腺ノ管口若ハ下頰腺ノ管口ニ小疱アルヲ見バ直下ニ之ヲ破開シ。次ニ燒鍼ヲ以テ創口ヲ燒キ而メ後傑ニ尼斯陀ノ濃煎ヲ以テ努力メ屢含嗽セシムベシ。是此小疱ハ則咬傷毒ヲ含ムヲ以テナリ。○此方恐水病ノ預防藥トシ用井テ良効アリ。

牛膽モルセニガウリガルル蘭  
是牛ノ胆汁ナリ。綠色ニメ味甚苦粘滑ニメ嘔スベキ臭氣アリ。○生鮮ノ牛胆ハ甚腐敗シ易キヲ以テ煎熬メ水氣ヲ消散シ。越幾斯ノ稠ト

ナシ貯フ之ヲ熬稠牛胆ト云。五ルタウリニム。  
 ム羅<sup>ト</sup>フ<sup>ル</sup>ガ<sup>ル</sup>キ<sup>キ</sup> ○此ヲ以テ鹹性苦味藥中ノ  
 最良藥トスル所以ノ者ハ苦味強壯解凝ノ外  
 更ニ靜息鎮痙ノ効アルヲ以テトリ ○腹内諸  
 臟ノ病ニ宜シ故ニ胃虛或ハ粘液酸敗液風氣  
 膨脹便秘肝脾門脈腸間膜ノ壅閉黃疸依利昆  
 垓<sup>ハ</sup>兒<sup>ハ</sup>蛔<sup>ハ</sup>蟲<sup>ハ</sup>疳<sup>ハ</sup>癆<sup>ハ</sup>ア<sup>ト</sup>ロ<sup>ハ</sup>バ<sup>ハ</sup>イ<sup>ハ</sup>ノ<sup>ハ</sup>初起等ニ効ヲ奏  
 ス ○慢性ノ神經病乃癩癩舞踏病等ニ効アル  
 ヲ稱ス蓋牛胆ノ此症ニ効アルハ其原蛔虫壅  
 閉等ヨリ起ル者ノミトルベシ ○外用ノ腺ノ

硬結腫ヲ分解シ蜂蜜ニ和シ用井テ角膜ノ星  
 斑ヲ消ス ○新鮮ノ者ハ一錢ヨリ四錢至香竄  
 ノ水液或ハ葡萄酒ニ溶和シ用ウ ○熬稠ノ  
 者ハ日ニ一錢ヨリ二錢至丸トナシ或ハ孟僂  
 設爾ニ和シ用ウ ○灌腸劑トシテ生胆及ヒ稠  
 凝胆共ニ半錢迄ヲ取り一弓ノ液ニ溶和シ用  
 ウ ○塗藥軟膏等ニハ二錢ヨリ四錢至家猪脂  
 四弓ヨリ六弓至ニ和シ用ウ ○酸類酸化鹽鹽  
 酸加爾幾鹽酸重土硫酸麻屈涅矢亞金屬鹽及  
 ビ單寧ヲ含ム諸品ハ胆質ヲ分析メ其力ヲ脱

スルカ故ニ。必ス配伍スルヲ忌ム  
香竈苦味アマロ。アロマチカ羅ミッデレベセ  
蘭

味苦クメハルスス  
竈透油ヲ含蓄セル者之ヲ香竈苦味藥  
ト云○此品華爾斯樣質ト竈透油トヲ  
含ムヲ以テ揮發衝動劑ニ歸スリ○  
性太温ナルヲ以テ脈管刺戟ノ状アル  
多血質ノ者血液局處ニ輻湊スルノ症  
アル者等ハ用ウベカラス○身体虚冷

面色蒼白。脉遲ニメ軟。其他官能弛怠ノ  
粘液質ニ属スル者ハ能ク的應ス  
亞爾ア爾ル蘇セ羅ロ ヘル エト ス ニ ミ タ テ ス ア ブ シ ン チ ー

灌木様ノ宿根草ナリ。林氏之ヲアルテミシア。  
アブシン左ト云。莖杪共ニ藥用ニ供ス。未花  
ヲ開カザル前ニ採収スベシ○味苦烈。香氣最  
竈透シ。人ヲメ殆暈ヲ發セシメントス  
間歇熱。此品間歇熱ニ效アルヲ以テ。俗間多ク  
家ニ貯ヘ。以テ用ニ備フ。然レ謾リニ用ウベキ  
藥ニアラス○内臟虚冷シ官能萎衰スルニ因

又シク纏綿セル間歇熱ニ用井テ良効アリ  
殊ニ調理藥トシ用井テ褒稱アリ

**内臓壅閉**諸臓壅閉及ヒ其壅閉ヨリ生ズル所

ノ諸病諭ヘハ消化機虚弱酸敗液粘液鬱蓄黃

疸水腫月事不順及ヒ經閉白帶下腸蟲殊ニ虻

蟲等ニ効アリ而メ此品ノ虻蟲ニ効アルハ唯

ニ其現在セル者ヲ殺スノミナラス更ニ復タ

生育スルコトヲ得ケラシムルナリ

外用ハ蒸溺劑菴瀆劑トナシ湯乙腫羅斯様ノ

効衝ヲ分解ス○世好ンデ越幾私ニ製ス其量

一月ヨリ一錢ヲ以テ丸トナシ或ハ孟佺設爾

ニ和シ用ウ又浸劑煎劑トシ用ウ其量半弓ヨ

リ一弓至煎シ或ハ浸メ六弓ヨリ八弓ヲ取ル

○亞爾鮮アハルシム下ゲ幾チンキチュラ燒酒アハルシム者チンキチュラ六アハルシム弓アハルシム度アハルシム右浸出スルコト六日○母服

六十滴ヨリ八十滴至日ニ三四次

○亞爾鮮油アハルシムセアハルシムンアハルシムチアハルシム一アハルシム羅アハルシム學急症學急性ノ嘔

吐子宮衝逆ノ諸症ニ用ウ○半時毎ニ四滴ヨ

リ八滴至

○亞爾鮮愈創水アハルシムスアハルシムピアハルシムリアハルシム五アハルシムスアハルシムタアハルシムラアハルシムウアハルシムマアハルシムナアハルシムキアハルシムユアハルシムスアハルシム

是太多味ノ製劑ニノ。亞爾蘇之ガ君藥タリ○

刺創挫傷閃挫等ニ用井テ効アリ

杓亞哥ギアコニア、ヒアコ、ヒムブ○ヒアコ蘭ヒムブ羅

南亞墨利加洲ニ産ス。蘭草ノ属ナリ。亞墨利加

ニ在テハ、既ニ久シク有力ノ解熱藥ト為シ用

ウ。輓近ニ至テ歐羅巴諸國ニ於テハ、亞細亞霍

亂強按ニ、霍乱、羅向之ヲ、益シ、胆汁、和蘭、之ヲ、

リ、穆私、驚、學、府、益、胆、汁、和、蘭、之、ヲ、

方、則、真、霍、亂、類、霍、亂、濕、霍、亂、乾、霍、亂、因、癘、霍、亂、東

症、治、法、ハ、本、書、ニ、具、載、セ、リ、其、病、ニ、用、井、テ、良、驗、ア

リト云

忽布ホブ蘭ヒシリス、リユ、ヒリス羅

多ク白耳義名國ニ産ス。和蘭ニ在テハ僅ニ一二

處ニ産スルノミ○味辛辣苦烈ニノ、香氣猛烈

人ヲメ昏瞶セシム。故ニ或ハ麻酔藥ニ算収ス

ル者アリ。然氏其昏瞶ノ力、微ニメ腦ニ達スル

ニ至ラズ。但多具スル所ノ者ハ苦味藥性ナリ

是ヲ以テ消化機虛弱、内臟閉塞、蛔蟲、水腫、腺病

諸厄利病等ニ用井テ良効ヲ奏シ。或ハ解熱劑

トナシ用ウ○諸厄利國ニ於テハ慢性ノ癩麻

質斯或ハ痛風ノ發作ニ用井テ殊効アルヲ稱

セリ○麥酒ヲ釀スニ多ク此品ヲ加ス蓋シ以テ麥酒ノ腐敗ヲ防キ兼テ健胃ノ効ヲトル○蒸漏劑トシテ四肢ニ發スル痛腫咽喉焮衝脚ノ水腫狀ノ腫瘍ヲ治ス○散浸煎越幾斯丁幾ノ諸劑及ヒ麥酒ノ多ク忽布ヲ加フル者等宜ニ從テ之ヲ處スベシ○散劑半錢ヨリ二錢ニ至ル浸煎ノ二劑ハ共ニ一弓ヲ以テ浸シ或ハ煎メ八弓ヨリ十二弓ノ液ヲ取ル越幾私ハ一弓ヨリ二弓至丸或ハ孟屈設爾トシ用ウ丁幾ハ日ニ半錢ヨリ二錢ニ至ル○忽布實ノ鱗葉間

ニ黃色苦味ノ粉末アリ是忽布ノ効分ナリ之ヲ律怖カ捏ト云服量五匹  
 土木香アラビキスヘレニイ蘭  
 林氏之ヲイニラベレニト云其形螺旋狀ヲ成シ太ク纖維質ニメ生ナル者ハ外面茶褐色乾ケル者ハ淺茶褐色中心白色之ヲ齒メバ粘滑ニメ味苦烈竄透ナリ生ナル者樟腦ノ如キ不佳ノ氣アリ○輓近ノ舍密家此根ヲ分析メ一元素ヲ獲タリ之ヲ依留力捏又歇列尼捏ト云此元素ハ木香ノ効分ニアラズメ此根ニ固



有セル糊状ノ物質ノミ。○強壯。疏痰。殺蟲。通經ノ效アリ。○胸部ノ虚弱。若クハ粘凝。若クハ官能遲怠等ニ因テ。經久癒ザル所ノ胸病。又粘液熱ノ殊ニ肺ニ感動アル者ニ良ナリ。又冒感諸部ノ弛緩ニ因テ荏苒トメ癒ザル者ニ效アリ。故ニ蜂蜜ヲ加ヘテ冒寒ニ效アル有力ノ家常藥トナス。又粘液滯ノ初發。或ハ肺嫩衝癒テ後。肺臟麻痺メ咯痰防碍セラレ。者ヲ治ス。呼吸器真嫩衝ノ景況アル者ハ用ウル。一ヲ禁ス。○胃腸ノ粘液及ヒ其粘液ニ因テ生スル所ノ消

化不良。蛔蟲。緩慢ノ粘液下利。其他門脈ノ閉塞。及ヒ其閉塞ヨリ生スル所ノ水腫。萎黃病。經閉等ニ良效アリ。○痛風病。殊ニ運行遲怠ノ粘液質ノ者。此病ニ嬰リ。尚且内臟ノ官能萎衰ヲ兼ル者ニ偉效アリ。○慢性ノ皮病。殊ニ疥癬ニハ内外共ニ用井テ奇驗アリ。○散劑ハ用ウル。一稀ナリ。其量大凡一時半。毎ニ一刃ヨリ一錢至煎劑ハ一弓ヲ以テ煎メ。八弓ヲ取り服ス。越藥私ハ日ニ一錢ヨリ三錢至安堀斯點刺<sub>コルテキス。</sub>キス<sub>五ルラ</sub>羅

本草論 卷四

「マクノリア、プリミール」或ハ「プリセア、アンチ  
ヂセンテリカ」樹ノ皮ナリ。又欸母菩爾蔦名云  
「ポンブランヂア、トリホリア」樹ノ皮ナリト  
此樹ハ南亞墨利加洲ノ樹林ニ多ク生ス。○皮  
ノ形管筒ヲナシ。徑太約一寸半。長六寸厚半分。  
破碎スレバ色滑澤ニメ華爾斯ノ如シ。纖維條質  
ニアラズ。外面粗糙ニメ凹陷アリ。黃赭色。味苦  
ク香竄ニメ桂枝ノ如シ。研末スル者ハ大黃末  
ノ如シ。○曾テ一二年。前某國ノ姦商安僭斯黠  
刺ノ贗品ヲ輸セリ。之ヲ東印度様ト呼フ。此物

大害アリ。或ハ人ヲ斃スニ至ル。其質上好ノ品  
ニ比スレバ粗糙甚シク。幅濶ク肉厚ク。破碎  
スレバ華爾斯様ニメ纖維條質ナリ。外面鏽色或  
ハ灰色ノ斑點アリ。味苦烈ニメ嘔スベク。氣香  
竄ナラズ。研末スレバ吐根末或ハ藥刺巴末ト  
酷相肖タリ。○主治効能。加斯加栗刺及ヒ幾那  
ト同一般ナリ。殊ニ間歇熱ノ患者。消食器大ニ  
虚弱メ。幾那ニ堪ヘザル者。及ヒ暴瀉ヲ併發ス  
ル者ニ奇效アリ。○大病既ニ退キ。特リ全身ノ  
衰弱ノミヲ餘ス者。是平康ニ復セントスル期

本草綱目卷四

ナリ。此期ニ用井テ強壯ノ一良藥トス。○般哥  
 古云フ。熱國ニ流行スル慄悍ノ間歇熱。及  
 敗熱ニ用井テ。其效幾那ニ勝レリ。○散劑ニ刀  
 ヨリ二錢至煎劑。浸劑ハ半弓ヨリ一弓至ヲ以  
 テ。ハ弓ノ液ヲ取ル。越幾私ハ日ニ一錢ヨリ二  
 錢至丸或ハ孟倨設爾トナシ用ウ  
 葛斯加栗刺カウルラキス、カス  
 南亞墨利加洲殊ニ拔花瑪東岸。魯加。北米利幹ノ  
 ナリ名ニ産スル所ノ一種ノ灌木コロトシ。エラ  
 テリア。ズワルトシ一名「クリ」チアエレウト

リア。ペルソトトトノ樹皮ナリ。○此皮筒卷シ。厚  
 サ一分許。長サ一指許リニメ。太重ク。外面苔ノ  
 如キ糙皺白色無味ノ外皮アリ。此外皮ヲ剥離  
 スレバ。鍍銹色ニメ。味苦ク。香竄微辛ニメ佳香  
 アリ。火ニ投スレハ。氣龍涎香ノ如シ。○往古鎮  
 瘧ノ效アルヲ稱シ。又或ハ幾那ニ代用メ殊ニ  
 稱譽セリ。方今稱用スル所ノ諸病ヲ左ニ掲ク  
 稽留熱。粘液熱。胆液熱。神經熱。後精力虚脱シ  
 殊ニ腸胃衰弱セルヲ挽回スルニ用井テ效ア  
 リ

本草綱目 卷四

間歇熱諸醫。此熱ニ之ヲ賞スル<sub>1</sub>甚<sub>2</sub>誇大ナリ。然<sub>1</sub>氏其效。幾<sub>2</sub>那ニ比スレバ稍劣<sub>1</sub>リ。但腸胃虛弱弛縱<sub>1</sub>メ幾<sub>2</sub>那ヲ服シ得ザル者ニ殊效アリ。或ハ經久ノ嘔吐。暴瀉。壅閉等ヲ合併<sub>1</sub>メ。一直ニ幾<sub>2</sub>那ヲ用ウル<sub>1</sub>能ハザル者ニ用井テ。諸惡症ヲ排除シ。幾<sub>2</sub>那ヲ用ウルノ道路ヲ啓クノ效アリ。然レ<sub>1</sub>規<sub>2</sub>尼<sub>3</sub>捏<sub>4</sub>一タビ出シヨリ以還ハ復之ヲ用ウル者ナシ

下痢痢病ニ病共ニ末期ニ及ンテ。腸管ノ運營虚憊シ。泄利是カ為ニ綿々止マス。竟ニハ慢性

病ニ轉セントスルノ恐レアル者ニ用ウ

勞瘵諸種ノ勞瘵中殊ニ粘液勞ニハ頗自餘ノ強壯藥ニ勝レリ。假令他ノ強壯藥ニ過ル<sub>1</sub>十<sub>2</sub>キモ幾<sub>2</sub>那ニ比スレバ。受容シ易キヲ以テ勝レリト云フベシ

○腸管。泌尿器等ノ膿潰セル者ニ用井テ生カヲ補續スルノ要藥タリ

慢性腸胃病第一道虚弱ニメ發スル者。即<sub>1</sub>消食<sub>2</sub>機<sub>3</sub>疲<sub>4</sub>憊<sub>5</sub>酸<sub>6</sub>敗<sub>7</sub>液<sub>8</sub>風<sub>9</sub>氣<sub>10</sub>膨<sub>11</sub>脹<sub>12</sub>胃<sub>13</sub>瘰<sub>14</sub>吐<sub>15</sub>病<sub>16</sub>疝<sub>17</sub>病<sub>18</sub>等ニ良驗アリ

胸腔諸器慢性粘液病慢性ノ冒寒粘液咳粘液  
性ノ喘息百日咳ノ病末等ニ用井テ宜シ○散  
劑每服二十氏ヨリ一錢至日ニ三回浸煎兩劑

ハ一ヲテ煎メハヲ取ル  
○葛斯加栗刺越幾私カエキスタラク  
一錢ヨリ二錢至丸劑若ハ益低設爾トナシ用

○葛斯加栗刺丁幾  
皮極末者燒酒者八十度浸出スル  
日○一時半毎ニ三十滴ヨリ六十滴至

加密列花カフロレスカモミルラ

二種アリ一ヲ尋常加密列カフロレスカモミト  
云ヒ一ヲ羅馬設加密列カフロレスカモト云ス  
尋常ノ者ハ林氏之ヲマトリカリアカモミル  
ラト云和蘭ニ在テ多ク穀圃ニ雜生ス羅馬種  
ノ者ヲアンテミスノビリスト云歐羅巴ノ南  
地ニ産ス和蘭ニ於テハ藥局ノ後園ニ培植ス  
○花及ビ花球共ニ用ウヘシ性温ニメ味太苦  
ク芳烈香竄ノ氣アリ尋常ノ者ハ氣味共ニ稍  
劣レリ○強壯驅風鎮痙發汗通經ノ効アリ○

福爾氏ホル楞レ名名云、和蘭ニ産スル所ノ香竈苦味ノ  
藥品多シト雖カ加密列ノ如ク、無數ノ疾患ニ用  
井テ、普通緊要ナル藥品、他ニ一モアルナシ。  
故ニ又家常藥トナシテ、人家毎ニ多ク之ヲ用  
ウ○間歇熱ニ未幾、那ヲ用井ザル以前ハ、加密  
列ヲ以テ截熱ノ至良藥トナセリ、方今ニ至リ  
テモ依イ剥ボ昆コン垤テ兒レ家子宮病家等ノ間歇熱、未甚  
タ經久ナラズ、甚頑固ニ至ラズシテ、其熱シ聖シ京  
屈性ナル者ニハ、尚用井テ良驗アリトス○風  
氣膨脹ヨリ發スル内臟ノ攣急諸症、下利、痢病、

慢性ノ神經病即依イ剥ボ昆コン垤テ兒レ子宮病、又經閉及  
ヒ經時疼痛諸症ヲ合併スル者ニ偉効アリ○  
獨イ乙シ名名國國ノ名醫イ央シ名名人人云フ、大凡妊婦ノ諸患、産時  
ノ諸病ハ、溢血、瘀衝ヲ除クノ外、自餘百般ノ疾  
患ニ於テ、加密列一モ之カ、効能ヲ奏セザル者  
アルヲ見ズト、然イ氏シノ賞譽ハ、太過當ナル  
ガ如シ、世ニ所謂假陣痛ヲ鎮定シ、緩慢ノ陣痛  
ヲ興奮シ、子宮口ノ攣縮ヲ寬解シ、劇甚ノ兎枕  
痛ヲ鎮靜スル等ハ、共ニ其効切實ナルヲ、他藥  
ノ得テ比スベキニアラズ○灌腸劑、蒸漏劑、香

草囊毳布等ヲ造リ。内臟學急諸病。箱頓腸墜。經久潰瘍。脫疽。假煥衝等ニ用井テ良効アリ。○散劑ハ一時若ハ一時半毎ニ一錢ヨリ二錢至浸劑ハ六錢ヨリ一匁至ヲ以テ。浸メハ三ヨリ十ニ匁ノ液ヲ取ル

○加密列越幾私エキスタラク日ニ半錢

ヨリ二錢至

○加密列油モイルウ健胃驅風鎮痙ノ藥

品ニ加フ。一滴ヨリ五滴至

泥菖根ゲカラム子ス。カルマキスス蘭

林氏ノ所謂アコリス。カラミスノ根ナリ。其形長ク大サ指ノ如クニメ節アリ。黯褐色ニメ。質海綿ノ如ク。節下ニ無數ノ癩痕ノ如キ者アリ。是鬚根ヲ剪去ルノ痕ナリ。味苦辛ニメ。香竄ノ佳氣アリ。○菖根ハ刺戟強壯。温煖驅風及ヒ自餘ノ諸效。共ニ和蘭及ヒ海外諸國ニ産スル所ノ同効ノ諸藥ニ勝レリト云ニ非スト。雖又劣レリトセズ。且和蘭ニ産スルヲ以テ。藥用ニ便ナリ。故ニ此ニ列ス

惡性神經熱。腐敗熱。粘液熱。以上ノ三病。共ニ病

末ニ用井テ良効アリ。或ハ衰耗下利ヲ併スル者ニ殊效アリ。○肌熱著シク。脉疾ニメ。血頭腦ニ輻湊シ。腸胃汚物アル等ノ諸症ハ之ヲ用ウルヲ禁ズ。

**間歇熱**此熱殊ニ卑濕ノ方隅ニ流行シ。其熱經久ナルニ因テ。全身蒼白浮腫スル者ニ良効アリ。○此根ハ幾那ニ配伍メ解熱ノ一良佐タリ。故ニ**穢歇蘭度**ハ解熱劑ニ伍メ貧婁ノ患者ニ用ウ。

**腸胃ノ虚衰**粘液ノ**蕙蓄**酸敗液。風氣。蛔蟲依剥

**昆垚**兒子宮病等共ニ腸胃ノ虚衰ニ起ル者ヲ治ス。

**粘液性諸病**胸腔及ヒ其他ノ諸器。虚弱ニメ官

能萎衰スルヨリ發スル所ノ粘液病。乃經年ノ

粘液咳。聖京。偃咳。白帶下。膏麻等ニ效アリ。

**矢苟兒倍苦**泥菖ヲ以テ此病ニ稱用スルハ。忽

布滿名入ヲ以テ首トス。○後人殊ニ此根ニ於テ。

矢苟兒倍苦ヲ防治スル奇効確然タルヲ實驗

セリ。故ニ香竈藥中ニ於テ。其力卓然タル者トス。



腺病諸名家太稱用ス○蓋シ病ノ初發ニ於テ。解凝藥ヲ用ウヘキ時及ヒ局部ノ焮衝充血等アル者ハ用井難シ

水腫此根利尿ノ效ナキニアラスト雖其主能ハ水脈ヲ強固スルニアリ故ニ利尿劑ニ配スベキ一良藥タリ

外用經久弛緩ノ寒脫疽狀ノ潰瘍ニ用井テ佳ナリ○散劑每次半錢ヨリ一錢至ラ頻服ス浸劑ハ半弓ヲ以テ浸メ四弓ヨリ六弓ノ液ヲ取ル浸煎合方ハ先半弓ヨリ一弓至ノ苜根ヲ取

リ四弓ヨリ六弓ノ熱湯ヲ灌キ浸出スルテ四分時許漉メ滓ヲ去リ其滓ニ又八弓ノ水ヲ加ヘ煮テ四弓ヲ取り前液ト相合ス

橙皮コルテキスアウラシチオロム 東西印度及ヒ歐羅巴ノ南地ニ産スキウラカウ

也産是班呀産ノ二種アリモラカウセヲ良ナリトス○外皮黄ハ竄透ノ佳香アリ味苦ク温ニメ刺戟ス其温ト刺戟ハ橙皮ノ小蜂窠質中ニ含ム所ノ亞的兒様ノ油アルニ由ル此油太多量ナリ故ニ緩搾メ能ク得ヘシ○健胃興奮

驅風ノ效アリ。故ニ間歇熱消食機虚憊風氣膨脹胃瘳虚弱ヨリ生スル失血等ニ偉効アリ。又幾那ニ伍メ其藥害ノ胃ニ發スル諸症ヲ防護スル一良藥トス。○散劑每時一刃ヨリ半錢至ヲ頻服ス。浸劑ハ一ヲヲ取りハヲノ葡萄酒或ハ清水ニ浸出ス

○橙皮水 アラク、ゴルト、アラク、シト、アラク、シト

ニヲヨリハヲ至ヲ

孟屈設爾ニ和シ用ウ

○橙皮丁幾 チンキ、シラ、ゴル

橙皮 粗末者

燒酒 十五度

右ニ味合シ浸出スルヲ六

日○每服一錢ヨリ二錢至日ニ三四次

○橙皮舍利別 シリ、ピ、ス、コルト

砥劑孟屈設

爾等ニ加ヘ用ウ○一ヲヨリ三ヲ至

○橙皮油 オレウ、ム、コルト

散丸孟屈設爾等ニ

加ヘ用ウ○每服一滴ヨリ五滴ヲ加フ

○橙皮精 スピリ、チ、ス、コルト

橙皮 生鮮者

燒酒 四十度者

右ニ味合シ浸出スルヲ二

日ニメ之ヲ蒸餾ス○每次二錢ヨリ三錢至ヲ

頻服ス

枸櫞皮 シトル、テキ、シトル、シキ、ル、レム、蘭

枸櫞樹實ノ皮ナリ。林氏此樹ヲシトリス。メヂ  
 アト呼フ。西里牙及ヒ百爾西ニ産シ。勿搦茶意  
 太里亞等ニ多ク培植ス。以上ノ四國ヨリ出ル  
 者ヲ上品トス。○外皮ニ亞的兒様ノ油ヲ含ム  
 一。橙皮ノ如シ。此油即枸櫞ノ效分ナリ。○主治  
 効能共ニ橙皮ニ同クメ。苦味香竄ハ彼ヨリ微  
 ナリ。故ニ藥用ニ供スルモ。亦彼ヨリ差少ナリ  
 トス。○藥局ニ枸櫞水。枸櫞油。枸櫞精ト云者ア  
 リ。製法橙皮ニ同シ。○輓近別耳列印府ニ於テ  
 生枸櫞皮ヨリ油ヲ絞出シ。直ニ其油ヲ取リテ

眼中ニ點滴シテ。經久ノ儂麻質私性及ヒ聖京  
 屈性ノ眼焮衝。角膜翳。翅翳。角膜曇暗ヲ療スル  
 ノ奇藥タルヲ經驗シ得タリ  
 攝爾扁太里亞ニアチキス。セルペンタリア。ヒルギニ  
 トゲル蘭ニアチキス。セルペンタリア。ヒルギニ

善ク蛇咬毒ヲ解スル一種ノ效アリ。故ニ成ハ  
 名ケテ蛇根ト云。是非耳及泥亞國加羅利那同  
 等ニ産スル宿根草ヨメ林氏ノ所謂アリスト  
 ロシア。セルペンタリア正是ナリ。○根ハ其頭顱  
 ヨリ無數ノ長鬚ヲ生シ。錯綜屈曲メ一束ヲナ

本草綱目卷之四

シ。外面茶褐色、内面黄色ナリ。氣味苦辛香竄ニ  
 メ。少シク龍腦ノ氣アリ。○刺戟強壯。發汗。防腐  
 ノ效アリ。○惡性ノ聖藥。強熱腐敗熱。神經熱等。  
 生力沈垂。脉細疾ニメ震揚シ。呼吸不利メ呻吟  
 譫妄シ。腐敗ノ徴ヲ見ハス者ニ峻效アリ。○熱  
 性ノ皮病。已ニ焮衝ノ期ヲ經過メ。惡性熱ニ變  
 セントスルニ奇驗アリ。○幾那ニ伍メ其解熱  
 防腐ノ效ヲ佐ルノ一良藥タリ。故ニ經久ノ間  
 歇熱局處ノ脱疽等ニハ喜ンテ幾那ニ配合ス  
 ○蒸發氣ノ閉塞ヨリ生スル消食器ノ諸病ニ

用井テ良效アリ。○散。浸兩劑共ニ用ウト。雖就  
 中浸劑ヲ稱用ス。散劑ハ每服半夕ヨリ半錢至  
 ヲ頻服ス。浸劑ハ半夕ヨリ一夕ヲ以テ。浸メ六  
 夕ヨリハ夕ヲ取り用ウ  
 ○攝爾扁太里亞丁幾チンキヲ用ウセル  
 攝爾扁太里亞粗末者燒酒十五度  
 右合シ。浸出スル一六日。○每服三十滴ヨリ六  
 十滴至  
 桂カ子ルテキス。シンナモニ羅  
 瓜カ哇カ錫カ蘭カ同カ蘊カ門カ荅カ刺カ同カ及カヒカ東カ方カ諸カ國カニカ産カ

本草綱目卷之四

形薄ク筒卷シ、長ク一尺許ヨリ一尺半ニ至ル、  
 其質纖條ニシテ破碎シ易ク、赤色ニメ、竄透ノ  
 佳香アリ、味辛温甘ニメ、微瀋ナリ、支那ノ産ハ  
 錫蘭産ノ者ヨリ短厚楮赤色ニメ、喫後苦味ヲ  
 遺ス、故ニ下品トス、○保固强壮、興奮、驅風、微ク  
 収斂ノ效アリ、内臓ノ虚冷ニ因テ發シ、或ハ是  
 ガ為ニ持久セル下利ヲ止メ、妊婦ノ惡阻及ヒ

子宮病家ノ嘔吐ヲ治シ、經年ノ胃虚ニメ、惡心  
 嘔吐、風氣等ヲ兼ル者ハ、胃ヲ健運シ、風氣ヲ驅  
 リ、嘔吐、惡心ヲ鎮靜ス、○熱病、神經性、或ハ腐敗  
 性ニメ、殊ニ嘔吐、或ハ下利ヲ兼ル者ニ良效アリ  
 ○脈管虚衰及ヒ運動萎弱等ヨリ發スル所  
 ノ虚性ノ失血ニ奇驗アリ、故ニ尿血及ヒ産前  
 産後ノ子宮血ヲ療ス、○大病後ノ衰弱、或ハ諸  
 液ノ過亡ニ因テ残留セル全身ノ虚弱ニ驗アリ  
 ○桂ハ又他藥ニ加ヘテ、能ク惡心スベキ、不  
 佳ノ氣ヲ消シ、諸藥ヲメ胃ヲ害セシメズ、大抵

香竈有効ノ製劑中。桂枝最首稱スベキノ品タ  
リ○散劑ハ一錢至浸劑ハ半ヲ以テ浸メハ  
ヲヨリ十ヲ取ル

○桂水ナアタシシ桂水ハ始メ乳白ナリト雖

桂油漸水底ニ沈ムニ隨ヒ遂ニ變メ澄清トナ

ル○主治効能本條ニ同シ毎服一食匙

○桂精シハヒリモスシ桂粗末者燒酒十度

右合メ浸ス一四日ニメ蒸餾シ其精

十度ノ強ニ至ルヲ度トシ止ム○每次一錢ヨ

リ四錢ヲ頻服ス

○桂丁幾チシキ桂細末者燒酒十

度者ハ右合シ浸出スル一六日○每次二

十滴ヨリ四十滴至ヲ頻服ス或ハ一錢ヨリ二

錢至ヲ取リ桂水ニヲヨリ四ヲ至ニ和シ毎服

一食匙

○桂油シオレウムシ胃瘕神經虛衰風氣疝百

日咳等ニ殊效アリ○每次一滴ヨリ三滴至ヲ

頻服ス

家篤兒藥性論卷四終



