



衆篤兒藥性論

九

ヤ 5  
1029  
5



1029  
5

家篤兒藥性論卷九目次

疏利解凝藥

○解凝劑

食鹽

海鹽泉

海水

硃砂

醋酸加里

醋酸曹達

稀釋解凝藥

○醋酸加里液



91-2012



宸篤兒藥性論卷九目次

加爾剝亞里  
 木炭  
 海綿炭  
 刺戟解凝藥  
 鹽酸金鹽法  
 安質謨  
 結兒  
 含硫  
 越質  
 刺戟解凝藥  
 製鹽酸金鹽法  
 安質母尼酒  
 吐酒石  
 石炭  
 安荅刺古加里

宸篤兒藥性論卷十目次

刺戟解凝藥

解凝劑

加爾剝亞里  
 木炭  
 海綿炭  
 刺戟解凝藥  
 鹽酸金鹽法  
 安質謨  
 結兒  
 含硫  
 越質  
 刺戟解凝藥  
 製鹽酸金鹽法  
 安質母尼酒  
 吐酒石  
 石炭  
 安荅刺古加里



宗篤兒藥性論卷九目次

宗篤兒藥性論卷九



和蘭

漢侄 宗篤兒 著

母沕 普勒歇 校補

小倉

洞海林 彊健卿 譯補

解疑劑

オメデカメシタレシツルベシテ

夫藥石ハ大抵解疑ノ効アル者多クニ居

ル故ニ畫然トメ此名称ヲ定ムルト甚々

難シト雖氏今予姑ク其各自固有ノ衝動

性ヲ以テ喜シテ液ヲ含ムノ地及ヒ之ヲ



本草綱目卷之九

今泌スル部ニ走リ其部ノ機能ヲ奮發メ蓄液ヲ誘蕩シ能ク其ヲ健運融通スル  
一ヲ得セシメ又其漏泄排除ニ便ナル者  
ハ其漏泄排除ヲ得セシムル者ヲ撰テ以テ之ニ解凝藥ノ名ヲ命ス然レ此劑悉ク皆其功ヲ凝體ニ逞フスルノミニ非ス間亦其性好ンテ大ニ蓄液ニ走リテ其ヲ專ラ稀渙流利セシムル者アリ此故ニ此篇中ニ選入スヘキ品類特ニ蕃庶ニメ其性効モ亦異同アルヲ致スナリ乃其異

同ヲ區分メ左ニ列ス  
疏利解凝藥 チアソルベ オンチアペリエン  
ロセンドミ  
稀釋解凝藥 チアソルベ フルチアアツテ  
シロセンドミ  
刺戟解凝藥 チアソルベ ブンチアスチ  
ロセンドミ  
保固強壯解凝藥 チアソルベ トルベ  
ロセンドミ  
○疏利解凝ノ藥ハ大率近ク腸管ノ内面

本草綱目卷之九

ニ走り徐々ニ其内面ヲ刺衝ハ蠕動機ヲ  
 催起シ其粘膜ノ分泌ヲ勸發ス○之ヲ久  
 服スレバ其効力他ノ腹内分泌諸器ニ波  
 及メ其閉塞ヲ疏利開達ス○中和鹽類皆  
 之ニ属ス此鹽ハ瀉下ノ力能乏ニ  
 大量ニ用ウルキハ亦能ク快通セシムル  
 ナリ○稀釋解凝藥ハ能ク諸液調和ノ機  
 フ扶ケ其刺衝ノ峻カラテ以テ吸収管水脈  
 管腺等ノ官能ヲ催勸シ諸液ノ稠膠ヲ稀  
 釋シ義膜及ヒ腺ノ閉塞ヲ解キ兼テ滲出

液ヲ吸収スルノ効アリ○亞爾加里藥用  
 石鹼硫黃水銀等此ニ属ス

○刺戟解凝藥ハ前篇ノ興奮刺衝鎮痙麻  
 醉ノ諸藥皆之ニ属ス蓋シ分泌機若ク  
 吸収機ノ力能沈衰敗頽セルカ或ハ痙攣  
 ニ由テ妨碍セラル者ニ之ヲ用  
 其各自固有ノ性ヲ以テ其敗頽ヲ復  
 其痙攣ヲ鎮静メ能ク其蓄液ヲ開達疏  
 通セシムルナリ○吐藥峻下藥ノ如キモ  
 亦小量ニ頻服スルハ同効アリ○安質母



尼製劑。沃實。鹽酸重土。鹽酸加爾幾。如  
キモ亦共ニ今刺戟解凝ノ殊効ヲ稱ス。故  
ニ各本門ニ就テ之ヲ詳説ス。

○保強解凝藥ハ即強壯劑中ノ保固強壯  
藥條ニ列スル所ノ鹽性苦味ノ品ニ云  
故ニ此ニ贅セズ。其持ニ此ニ表出スル所  
ノ者ハ白屈菜。濱瞿麥等ノ如キ。一二較著  
ノ功アル者ノミ

疏利解凝藥

食鹽  
ウロ  
ダ  
羅  
ス  
ロ  
ウ  
ト  
シ  
ロ  
ウ  
ダ  
蘭

食鹽ハ鹽酸ト曹達トニ成ル者ニ多ク天然

鹽自生ス。疆按山鹽海類其形モ亦一ナズ。就中

海水最モ此鹽ヲ含ル。故ニ海水ヲ煎熬

スレバ結晶メ食鹽ヲナス。○醫藥トメ内用

供スルヲ稀ナリ。但外用ニハ緊要ノ品トス。○

灌腸劑ニ加用メ其下泄疏通ノ効ヲ助ケ。洗滌

罨貼。浴湯等ノ諸劑トナシ。肌表ニ供用メ能ク

腺ノ硬結ヲ分解シ。乾温罨貼劑トシテ用井テ水

腫。水。貌。倭。屈。包。強。按。三。陰。囊。挫。傷。或。ハ。血。頭。腦。ニ。輻  
湊スル者。中風等ニ効アリ。殊ニ中風症ニハ西

繆結耳名ノ寒菴方著効下リ此方ハ食鹽礞砂  
フ君藥トス、強按ニ西繆結耳寒菴方未詳ナラ  
俊徳林石人寒菴方アリ其方礞砂一條ヨリ食鹽ハ分  
右調勻研末シ布片若ク其方礞砂一分食鹽八分  
以テ緩絞ノ如クク水ヲ去リ其兩布間投粘  
 液性ノ咽喉欣衝三ハ含漱劑トシ用粘  
リ○若食鹽ヲ以テ内用セント欲セバ一及三  
リ一錢至水ニ溶化シ服ス○外用ハ二錢ヨリ  
一乃至○硫酸消酸銀水銀ヲ忌ム  
 海鹽泉熱泉○冷泉○ソウテ、ミ子ラレ  
 附録ニ出ツ

海水ア多、マリナ蘭○  
 海水ハ喫緊ノ一要藥タリ、其効多ク食鹽ニア  
リ○海水ノ質ハ時ト地トノ異ナルニ由テ、各  
同カラス、陪耳愚滿名刺裴齊兒其他諸家  
說各異同了リ、而メ今余ガ友勒的爾覃和蘭府  
醫繆爾德兒名入歇仁硬濱按ニ村名十リ  
頭アリ、漁家アリ、地ニ於テ、新三北海  
一部ニ、和蘭ノ西北ニ、私名ナリ、故ニ緯六十度  
北海ト云、蓋一國ノ西北ニ、私名ナリ、故ニ緯六十度  
海潮ヲ分析ス、其說ニ入歇仁硬ノ海水ハ鹽酸  
曹達食鹽酸加爾基鹽酸麻倔涅天亞硫酸麻倔

涅天亞<sup>瀉利</sup>炭酸<sup>カ</sup>爾基<sup>カ</sup>炭酸<sup>カ</sup>麻<sup>カ</sup>屈<sup>カ</sup>涅天亞<sup>カ</sup>麻<sup>カ</sup>尋<sup>カ</sup>常<sup>カ</sup>  
 亞<sup>カ</sup>天<sup>カ</sup>ヲ<sup>カ</sup>含<sup>カ</sup>蓄<sup>カ</sup>ス<sup>カ</sup>ト<sup>カ</sup>云<sup>カ</sup>ヘ<sup>カ</sup>リ<sup>カ</sup>○<sup>カ</sup>古<sup>カ</sup>人<sup>カ</sup>ハ<sup>カ</sup>海<sup>カ</sup>水<sup>カ</sup>ヲ<sup>カ</sup>以<sup>カ</sup>テ<sup>カ</sup>  
 良<sup>カ</sup>藥<sup>カ</sup>ト<sup>カ</sup>シ<sup>カ</sup>用<sup>カ</sup>ウ<sup>カ</sup>レ<sup>カ</sup>氏<sup>カ</sup>中<sup>カ</sup>葉<sup>カ</sup>廢<sup>カ</sup>メ<sup>カ</sup>用<sup>カ</sup>井<sup>カ</sup>ス<sup>カ</sup>今<sup>カ</sup>不<sup>カ</sup>和<sup>カ</sup>蘭<sup>カ</sup>  
 ノ<sup>カ</sup>沿<sup>カ</sup>海<sup>カ</sup>村<sup>カ</sup>落<sup>カ</sup>入<sup>カ</sup>歌<sup>カ</sup>仁<sup>カ</sup>硬<sup>カ</sup>及<sup>カ</sup>ヒ<sup>カ</sup>織<sup>カ</sup>土<sup>カ</sup>寶<sup>カ</sup>爾<sup>カ</sup>和<sup>カ</sup>蘭<sup>カ</sup>  
 連<sup>カ</sup>ニ<sup>カ</sup>華<sup>カ</sup>爾<sup>カ</sup>ニ<sup>カ</sup>於<sup>カ</sup>テ<sup>カ</sup>海<sup>カ</sup>水<sup>カ</sup>浴<sup>カ</sup>ノ<sup>カ</sup>偉<sup>カ</sup>效<sup>カ</sup>ヲ<sup>カ</sup>唱<sup>カ</sup>ヘ<sup>カ</sup>リ<sup>カ</sup>  
 再<sup>カ</sup>復<sup>カ</sup>大<sup>カ</sup>ニ<sup>カ</sup>世<sup>カ</sup>ニ<sup>カ</sup>行<sup>カ</sup>ハ<sup>カ</sup>ル<sup>カ</sup>是<sup>カ</sup>其<sup>カ</sup>用<sup>カ</sup>法<sup>カ</sup>宜<sup>カ</sup>キ<sup>カ</sup>ヲ<sup>カ</sup>得<sup>カ</sup>ル<sup>カ</sup>時<sup>カ</sup>  
 ハ<sup>カ</sup>善<sup>カ</sup>ク<sup>カ</sup>頑<sup>カ</sup>固<sup>カ</sup>ノ<sup>カ</sup>諸<sup>カ</sup>病<sup>カ</sup>ヲ<sup>カ</sup>療<sup>カ</sup>ス<sup>カ</sup>ル<sup>カ</sup>ヲ<sup>カ</sup>舉<sup>カ</sup>テ<sup>カ</sup>數<sup>カ</sup>フ<sup>カ</sup>ベ<sup>カ</sup>カ  
 ラ<sup>カ</sup>サ<sup>カ</sup>ル<sup>カ</sup>ヲ<sup>カ</sup>以<sup>カ</sup>テ<sup>カ</sup>ナ<sup>カ</sup>リ<sup>カ</sup>○<sup>カ</sup>内<sup>カ</sup>服<sup>カ</sup>ノ<sup>カ</sup>疏<sup>カ</sup>釋<sup>カ</sup>解<sup>カ</sup>凝<sup>カ</sup>開<sup>カ</sup>達<sup>カ</sup>刺<sup>カ</sup>  
 衝<sup>カ</sup>ノ<sup>カ</sup>効<sup>カ</sup>アリ<sup>カ</sup>故<sup>カ</sup>ニ<sup>カ</sup>能<sup>カ</sup>ク<sup>カ</sup>腺<sup>カ</sup>ノ<sup>カ</sup>閉<sup>カ</sup>塞<sup>カ</sup>ヲ<sup>カ</sup>消<sup>カ</sup>散<sup>カ</sup>シ<sup>カ</sup>吸<sup>カ</sup>収<sup>カ</sup>  
 管<sup>カ</sup>ノ<sup>カ</sup>力<sup>カ</sup>能<sup>カ</sup>ク<sup>カ</sup>増<sup>カ</sup>進<sup>カ</sup>ス<sup>カ</sup>○<sup>カ</sup>海<sup>カ</sup>水<sup>カ</sup>浴<sup>カ</sup>法<sup>カ</sup>ハ<sup>カ</sup>能<sup>カ</sup>ク<sup>カ</sup>肌<sup>カ</sup>膚<sup>カ</sup>

其<sup>カ</sup>他<sup>カ</sup>ノ<sup>カ</sup>今<sup>カ</sup>泌<sup>カ</sup>ト<sup>カ</sup>ヲ<sup>カ</sup>健<sup>カ</sup>運<sup>カ</sup>シ<sup>カ</sup>味<sup>カ</sup>ニ<sup>カ</sup>其<sup>カ</sup>波<sup>カ</sup>濤<sup>カ</sup>ノ<sup>カ</sup>拍<sup>カ</sup>動<sup>カ</sup>  
 ニ<sup>カ</sup>因<sup>カ</sup>テ<sup>カ</sup>神<sup>カ</sup>經<sup>カ</sup>弛<sup>カ</sup>緩<sup>カ</sup>シ<sup>カ</sup>感<sup>カ</sup>觸<sup>カ</sup>過<sup>カ</sup>敏<sup>カ</sup>ナル<sup>カ</sup>者<sup>カ</sup>ヲ<sup>カ</sup>強<sup>カ</sup>固<sup>カ</sup>シ<sup>カ</sup>  
 精<sup>カ</sup>力<sup>カ</sup>ノ<sup>カ</sup>沈<sup>カ</sup>衰<sup>カ</sup>セ<sup>カ</sup>ル<sup>カ</sup>者<sup>カ</sup>ヲ<sup>カ</sup>活<sup>カ</sup>潑<sup>カ</sup>ス<sup>カ</sup>但<sup>カ</sup>シ<sup>カ</sup>海<sup>カ</sup>水<sup>カ</sup>浴<sup>カ</sup>ヲ<sup>カ</sup>用<sup>カ</sup>  
 井<sup>カ</sup>ル<sup>カ</sup>ハ<sup>カ</sup>其<sup>カ</sup>時<sup>カ</sup>宜<sup>カ</sup>ニ<sup>カ</sup>從<sup>カ</sup>テ<sup>カ</sup>温<sup>カ</sup>浴<sup>カ</sup>ト<sup>カ</sup>冷<sup>カ</sup>浴<sup>カ</sup>ト<sup>カ</sup>ヲ<sup>カ</sup>撰<sup>カ</sup>ム<sup>カ</sup>ハ  
 シ<sup>カ</sup>  
**第一**腺<sup>カ</sup>病<sup>カ</sup>及<sup>カ</sup>ヒ<sup>カ</sup>之<sup>カ</sup>ヨ<sup>カ</sup>リ<sup>カ</sup>發<sup>カ</sup>ス<sup>カ</sup>ル<sup>カ</sup>所<sup>カ</sup>ノ<sup>カ</sup>諸<sup>カ</sup>病<sup>カ</sup>ハ<sup>カ</sup>殊<sup>カ</sup>  
 温<sup>カ</sup>浴<sup>カ</sup>法<sup>カ</sup>ヲ<sup>カ</sup>妙<sup>カ</sup>ト<sup>カ</sup>ス<sup>カ</sup>  
**第二**水<sup>カ</sup>脉<sup>カ</sup>管<sup>カ</sup>弛<sup>カ</sup>緩<sup>カ</sup>シ<sup>カ</sup>其<sup>カ</sup>官<sup>カ</sup>能<sup>カ</sup>萎<sup>カ</sup>衰<sup>カ</sup>ス<sup>カ</sup>ル<sup>カ</sup>者<sup>カ</sup>水<sup>カ</sup>腫<sup>カ</sup>  
 僻<sup>カ</sup>アル<sup>カ</sup>者<sup>カ</sup>及<sup>カ</sup>水<sup>カ</sup>腫<sup>カ</sup>病<sup>カ</sup>ニ<sup>カ</sup>効<sup>カ</sup>アリ<sup>カ</sup>但<sup>カ</sup>此<sup>カ</sup>病<sup>カ</sup>ニ<sup>カ</sup>之<sup>カ</sup>ヲ<sup>カ</sup>用  
 以<sup>カ</sup>ル<sup>カ</sup>ハ<sup>カ</sup>最<sup>カ</sup>謹<sup>カ</sup>慎<sup>カ</sup>ヲ<sup>カ</sup>加<sup>カ</sup>フ<sup>カ</sup>ヘ<sup>カ</sup>シ<sup>カ</sup>

尺馬見真生論 卷乙

第三感冒遷延久不經テ治セズ熱及焮衝十キ  
 者ハ冷浴法ヲ用井テ良ナリ  
 第四慢性皮膚病論其不疥癬惡性ハ禿瘡等ニ  
 効アリ但此等ノ諸病ハ冷硫黃泉飲硫黃泉浴  
 ヲ優レシトス  
 第五慢性ノ痺麻質斯即顔面痛膝痛腰痛等  
 奇驗アリ  
 第六神經弛緩及神經ノ刺衝機極大過ナルニ  
 因テ發スル所ノ慢性神經病即子宮病依剥昆  
 垓兒神經頭痛ノ如キハ直ニ外洋海瀕ニ浴シ

第七神經ノ官能常調ヲ失フニ因テ筋ノ運轉  
 モ亦常規ニ從ハズ或ハ妨碍セラルハニ由テ  
 起ル諸病論ハ顫振搐掣麻痺等ノ如キハ冷  
 浴法ヲ良トス但慎ニテ施サレバ害ヲ生  
 易  
 第八神識病乃神志鬱憂癲狂病ノ如キ直ニ  
 海濱ニ就テ浴スベシ  
 第九外表局處ノ疾患論ハ瘰癧瘍矢况兒倍  
 苦瘍腐敗瘍ノ如キニ効アリ

○海水浴ヲ用ウ可ラサル者ハ、内部ノ嫩衝真  
ノ多血質、血液内部論ヘバ、心肺ノ如キニ輻湊  
スル者、肺、心、大血管等ノ形質缺損アル者、腸管  
若クハ胃肝ノ經久閉塞、若クハ硬腫及ビ感觸  
過敏ノ人等ナリ。但、此等ノ症ニハ殊ニ、  
アリトス。○海水ハ内用ハ葡萄酒、乳汁或甘味  
ノ水液等ニ加フニ始メヨリ多量ニ用ウ  
バ、困悶、嘔吐、暴瀉等ヲ發スルコトアリ。故ニ必小  
量ヨリ用井始ムヘシ。初メ大約一麥酒蓋ヨリ  
二麥酒蓋、三麥酒蓋至ラ宜トス。○附録ヲ參考

スベシ  
**硝砂** ヒドロスロラス、アンモニア ○ミリアス。  
アンモニア 其質鹽酸ト揮發羅、ケムモニア キクウト蘭  
○藥舗ニ鬻ク者ハ堅硬ノ圓塊ヲ成シ、或ハ精  
製糖ノ形ヲナス。○味苦辛ニメ凉ナリ。能ク水  
ニ溶解ス。○藥用ニ供スルニハ、一旦溶解シ、水  
氣ヲ蒸散メ、清潔ニスベシ。○精製硝砂ハ緩刺  
戟解凝ノ性アリテ、其力能ク肺胃腸ノ粘液膜  
ニ達スルナリ。然レ之ヲ久服シ、若クハ大量ニ  
用ウレバ、消化器ヲ衰耗ス。○腸胃ノ粘液及ヒ

本草綱目卷之九

其粘液ニ因テ官能遲滯セル者ニ効アリ故ニ  
粘液ニ因テ起ル所ノ間歇熱。粘液熱。蛔蟲熱ニ  
苦味香竄藥ヲ伍用メ。屢卓効ヲ見ル。○聖京僭  
熱。僂麻質斯熱ニハ能ク稠痰ヲ咯出ス。○  
尿ノ兩道ヨリ能ク吉利濟ヲ促スヲ以テ。○  
アリ。然レ此諸病ハ民埵列利精ヲ勝ルヲ以テ  
○里布底兒名ハ焮衝熱ノ患者。胃虛弱ニメ消  
石ヲ服シ得サル者ニ賞用ス。然レ此物刺衝  
性アルヲ以テ。劇性焮衝ニハ用ケルヲ禁ス。  
又味甚不佳ナルヲ以テ。服スルニ堪ザル者屢

之アリ。此ノ如キ症ニハ予ニニクシク民埵列  
利精ヲ以テ之ニ代用セリ。○呼吸器。泌尿器等  
ノ慢性焮衝病及ヒ粘液性諸病。論ヘハ慢性  
胃寒。粘液性ノ喘息。粘液性ノ咽喉焮衝。膀胱尿  
道。子宮等ヨリ粘液漏泄スル者ニ良驗アリ。○  
痘瘡。麻疹。赤斑熱等ノ如キ急性ノ瘡疹。熱  
單焮衝性ニアラザル者。肌膚灰白。○瘡疹。熱  
齊セス。且舌苔汚穢ニメ大渴アル者ニ殊稱ア  
リ。但此症モ亦民埵列利精ヲ妙トス。○内臓ノ  
閉塞。腹腺ノ閉塞及ヒ之ニ由テ繼發スル所ノ

本草綱目卷之七

黃疸水腫子宮病依剥昆垓兒月經不順痔疾腺  
 病等ニ効アリ殊ニ此病者蒸氣閉塞肌膚乾燥  
 肌熱脉縮小其他熱病ノ光景ヲ兼併スルニ長  
 効アリ這般ノ諸病ニハ苦味解凝緩瀉ニ茶  
 品ヲ伍用メ良ナリ輓近又胃管ノ狹窄ニ此劑  
 トシ直腸ノ狹窄ニ丸劑トシ大量ニ用井見奇  
 驗ヲ見ル○含漱劑トシ粘液性ノ咽喉焮腫  
 用井洗滌蒸濕浴湯甚布硬膏等トシテ中風頭  
 創挫傷皮下若クハ關節間ノ血液溢出外表局  
 部ノ水腫乳ノ結核壞疽瘍ニ用ク○丸劑クハ

溶劑トシ五匁ヨリ二十匁一時若クハ一時  
 半毎ニ服ス孟佺設爾劑トナスハ一錢ヨリ  
 三錢至ヲ以テ孟佺設爾六匁ヨリ八匁至ニ和  
 シ甘草膏ヲ加ヘ每次一食匙ヲ用ウ○外用ハ  
 一錢ヨリ一匁至○硫酸消酸加里炭酸加里石  
 灰水枯礬明礬硼砂鉛糖水銀剥薦亞私  
 酸銀其他鹽酸酸化鑛鹽等ト伍ス  
 醋酸加里○アセチルホトリアス○カドミ  
 其質醋酸ト剥薦亞私ト相和メ成ル鹽ナリ形

小片ヲ成ス。或ハ鱗屑ヲ成ス。白色光輝下ノ風  
 ヲ見テ消化ス。味辛辣ニシテ且侵蝕ス。○水及ヒ  
 亞爾固兒ニ溶化ス。諸酸酸味ノ藥實亞爾固兒  
 鹽。鑛鹽等ハ共ニ其質ヲ分析シ。還元  
 緩和疏利解凝ノ効アリ。故ニ小量ニ  
 用井テ能ク汗ヲ發シ小便ヲ利ス。多量ニ  
 至ラ頻ニ用井テ緩和清涼ノ下劑トナル。○故  
 ニ胆汁性ノ間歇熱及ヒ稽留熱黃疸水腫殊  
 卒然トメ胃寒スルノ後或ハ熱性瘡疹病乃赤  
 班熱ノ後ニ發スル所ノ水腫ニ効アリ。又肚腹

閉塞ニ由テ繼發スル痔疾利昆侄兒ノ宮病

等ニ良ナリ

○醋酸加里液 アセタス、ボトアサ、リキイ、ギス、

ゼイン、シフル、イ、ト、ア、ス、蘭

此液ハ性效醋酸加里ニ同シクメ價廉ナリ○

單味若クハ孟屈設爾ニ和シ服ス。服量一

リ二錢至

醋酸曹達 アセタス、ソウダ、アセタス、

ス、リ、ア、タ、ア、セ、イ、ン、シ、ル、ソ、ウ、ダ、

醋酸ト曹達トヲ以テナル鹽ナリ。其醋酸加里



ニ異ナル所ハ、晶形稜角ニメ長キト。風ヲ見テ  
消セサルトナリ。氣味醋酸加里ノ如ク。性効モ  
亦同クメ差、劣レルノミ。殊ニ清涼利尿劑ト  
シ用ウ。○溶液トナシ用ウ。二錢ヨリ  
芒消、霸王鹽、純精酒石、孕鹼酒石、酒酸加里、  
曹達等ハ、皆清涼下劑篇ニ出セリ。故ニ茲ニ贅  
セズ

稀釋解凝藥

固性亞爾加里ハアルカリ、ヒキシア、羅  
酸性鹽、中和鹽、揮發灰汁鹽、類、藥用ニ供スル

一、其來歴巴ニ尚シ。然ルニ獨斷固性亞爾加里  
ニ至テハ、古人之ヲ蔑視シテ、用ウルコト甚稀  
ナリ。輒近ニ及ンデ、衆醫其諸病ニ殊効アルヲ  
發明シ、之ヲ蓬蒿ノ下ニ拔テ、大ニ登用ス。○固  
性植物加里ニ二種アリ。一ハ固形ヲナシ、  
水形ヲナス。共ニ草木燒灰ノ淪瀾ヨリ得  
味刺戟ノ侵蝕ス。能ク水ニ溶化シ、風乾テ能  
ク濕ヲ生ス。又能外縹色ヲ變シテ綠色トナ  
諸酸ヲ合スレバ鹽トナリ。脂油ヲ合スレバ石  
鹼トナル。○爰ニ舉ル所ノ固性亞爾加里ハ、刺

萬亞斯<sup>ト</sup>曹達<sup>ナリ</sup>。其剝<sup>ト</sup>萬亞斯<sup>ハ</sup>剝<sup>ト</sup>荅亞<sup>ト</sup>叟<sup>ト</sup>母<sup>ト</sup>  
ノ第二酸化ニメ。曹達<sup>ハ</sup>曹<sup>ソウ</sup>曹<sup>ソウ</sup>母<sup>ノ</sup>第二酸化ナ  
リ。新舍密ノ説ニ據レバ。水素第二酸化剝<sup>ト</sup>萬亞<sup>ト</sup>  
斯<sup>キ</sup>ヒドラ<sup>ス</sup>。ボ<sup>ト</sup>ア<sup>シ</sup>ト<sup>オ</sup>水素第二酸化<sup>ト</sup>剝<sup>ト</sup>萬亞<sup>ト</sup>  
デ<sup>ソ</sup>ウ<sup>ト</sup>オ<sup>キ</sup>ノ<sup>シ</sup>ト<sup>ナ</sup>リ<sup>ト</sup>。何者其質尚多少<sup>ハ</sup>ナ<sup>ク</sup>  
含ムガ故ナリ。○亞爾加里<sup>ハ</sup>殊效分<sup>ハ</sup>其腐蝕  
性ニアリ。故ニ内服ニハ多量<sup>ハ</sup>水<sup>ヲ</sup>以テ稀<sup>ク</sup>渾  
スルニアラザレバ用<sup>ク</sup>此<sup>ヲ</sup>能<sup>ハ</sup>ズ。其稀<sup>ク</sup>渾<sup>セ</sup>  
ル者ハ制酸利尿<sup>ニ</sup>効野<sup>ニ</sup>稀<sup>ク</sup>渾<sup>セ</sup>劑<sup>ノ</sup>効アリ  
○外用ニ供<sup>メ</sup>能<sup>ク</sup>腫<sup>ル</sup>亦<sup>ニ</sup>潰<sup>レ</sup>潰<sup>レ</sup>疣贅<sup>ノ</sup>息肉<sup>ヲ</sup>

腐蝕<sup>ニ</sup>狂犬咬傷<sup>ノ</sup>創傷<sup>ニ</sup>効野<sup>ニ</sup>稀<sup>ク</sup>渾<sup>セ</sup>劑<sup>ノ</sup>  
シ用<sup>キ</sup>非<sup>テ</sup>酸敗液<sup>及</sup>以<sup>テ</sup>稀<sup>ク</sup>渾<sup>セ</sup>劑<sup>ヲ</sup>消化<sup>機</sup>  
諸病ニ効アリ。○稀釋解凝劑トシ用<sup>キ</sup>非<sup>テ</sup>險惡  
ノ諸病ニ効驗アリ。即<sup>チ</sup>焮衝病<sup>ノ</sup>將<sup>ニ</sup>大<sup>ニ</sup>列<sup>レ</sup>印<sup>ス</sup>  
巴<sup>バ</sup>液<sup>ヲ</sup>滲<sup>出</sup>ヒシトスル<sup>ハ</sup>勢<sup>アル</sup>者<sup>論</sup>大<sup>ニ</sup>義<sup>ニ</sup>  
膜咽喉焮衝<sup>産</sup>婦<sup>ノ</sup>腹膜焮衝<sup>等</sup>ニ必<sup>ズ</sup>用<sup>ク</sup>  
リ。但<sup>シ</sup>焮衝<sup>ノ</sup>劇勢<sup>去</sup>テ後<sup>方</sup>纔<sup>テ</sup>之<sup>ヲ</sup>用<sup>ク</sup>  
否<sup>サ</sup>レバ害<sup>アリ</sup>。○碩學<sup>ノ</sup>訶爾的<sup>揚</sup>各<sup>種</sup>世  
間固性亞爾加里<sup>ヲ</sup>以テ痛風<sup>ノ</sup>奇藥<sup>ト</sup>ス。然<sup>レ</sup>氏  
固性亞爾加里<sup>ハ</sup>其利尿<sup>ノ</sup>性ニ因<sup>テ</sup>痛風<sup>ニ</sup>微

効アルハ知ルベカラズト雖其偉効アルニ至  
 テハ予之ヲ信セズ、夫亞爾加里ハ一異性ヲ以  
 テ分泌吸収二管ヲ刺衝シ善ク其機能ヲ催進  
 シ痛風若クハ慢性癩麻質斯ニ由リ其  
 諸液ノ壅閉ヲ解達シ滲溢液ヲ吸収  
 治スルハ諸家經驗ノ實跡ニ更ニ疑ヲ容  
 レザル所ナリ此ニ由テ之ヲ觀ルバ此品ニ固  
 有セル利尿ノ効ハ即痛風ヲ治スル所ナ者ニ  
 他ノ能力ニアラス故ニ唯利尿ノ効ノミト  
 ヲ蔑棄スヘカラズ○固性亞爾加里ハ分泌管

吸収管及ヒ腺系統ヲ刺衝故ニ閉塞病腺病  
 及ヒ之ニ繼發スル所ノ諸病即脾肝脾腸間膜  
 腺唾腺ノ硬結諸厄利亞病癩癩性ノ皮病ニ用  
 井テ一要藥トス○利尿劑トシ用井テ水腫ノ  
 一要藥トス殊ニ水尿管ノ機能萎衰若クハ腺  
 ノ閉塞及ヒ硬腫若クハ内臟ノ閉塞硬結ニ  
 起因スル水腫ニ驗アリ○亞爾加里ハ  
 ノ碎石諸藥ハ其力能ク泌尿器ニ毒ヲ去ル  
 其舊調ヲ一變シ尿管モ亦從テ其舊況ヲ變  
 シ或ハ壅閉ヲ疏通シ慢性焮衝ヲ消散スル自

然固有ノ性ニアリトス。余モ亦其碎石ノ効ハ  
 其自然固有ノ性ニ歸スベキト真ニ上説ノ如  
 シト謂ヘリ。然レ亞爾加里ハ唯其自然ノ性  
 ミナラス。已ニ血中ニ入ルキハ。血中ニ入ル  
 性ヲ分與シテ。以テ結石ヲ碎解ス。損害  
 ザラシムルニ至ル。○高名ノ究理家風敏白爾  
 度ド人ハ亞爾加里鹽ヲ以テ鎮痙ノ効アリトシ。試  
 ニ阿芙蓉ニ代用メ。筋ノ神經ノ痙急ヲ鎮靜セ  
 ヨリヨスワビセセ獨ニ地ノ名ノ醫藥蕪子名ノ劇勢ノ搖  
 痙病痙攣病ニ内用シ。兼テ鹽ヲ浴湯ヲ製シ。兼

九氣身藥性言

卷之四

十四

用メ奇効ヲ得ル。トヲ稱セ。其餘ノ諸家モ亦  
 角弓反張牙關緊急。妊婦着久。産婦ノ痙病。及  
 ヒ小兒ノ搐搦ニ用井テ。治驗ヲ得ル。ト太多  
 ト云。○輓近ニ至テ。依列矢私名人ノ亞爾加里浴  
 亞細亞霍亂ヲ治スルニ烈効アルヲ稱ス。然レ  
 爾來其稱漸ク衰ヘテ。酸液浴強按ハ収斂酸血  
 防腐劑篇。消酸条下ニ補ス漸ク之ニ行ハル。○全身浴半身浴手浴脚浴外用メ  
 麻痺不遂痙急搐搦慢性癱瘓質斯痛及ヒ腺腫  
 結核ヲ治シ。羅斯性ノ骨膜焮衝ヲ分解消散ス。

又略多ハ之ヲ膠疔ニ用并テ確効アリトス  
其法患指ヲ頻々加里滷中ニ蘸ス○真嗽衝病  
消食器ノ大衰弱生力真虛矢况兒倍苦及吐血  
液溶崩ニ向フ者ハ亞爾加里害アリ

剥<sup>ボト</sup>薦<sup>ト</sup>亞<sup>ノ</sup>斯<sup>ス</sup>ヘ<sup>ヘ</sup>ゲ<sup>タ</sup>ス<sup>サ</sup>○カ<sup>リ</sup>○ア<sup>ル</sup>カ<sup>リ</sup>○  
○<sup>ボト</sup>ア<sup>ル</sup>カ<sup>リ</sup>○

剥薦亞斯ハ草木燒灰ノ滷滷ヲ煎焚メ得ル者  
ナリ。歐羅巴ノ北地及ヒ魯西亞國ニ出ル者ヲ  
精製ト稱ス。然レ尚他ノ鹽類塵土ヲ混シテ其  
製精ナラズ故ニ再製セザレバ藥用ニ堪ヘズ

其再製者ハ腐蝕ノ峻性ニ由リ刺必斯加  
烏斯蟄屈斯<sup>ウ</sup>ス<sup>チ</sup>キ<sup>ユ</sup>ス<sup>ト</sup>タ<sup>ア</sup>カ<sup>カ</sup>○カ<sup>ウ</sup>ス<sup>チ</sup>キ<sup>ユ</sup>ス<sup>ト</sup>タ<sup>ア</sup>カ<sup>カ</sup>○カ<sup>ウ</sup>ス<sup>チ</sup>キ<sup>ユ</sup>ス<sup>ト</sup>タ<sup>ア</sup>カ<sup>カ</sup>○  
ス<sup>シ</sup>ル<sup>ゴ</sup>ル<sup>ム</sup>ス<sup>ト</sup>タ<sup>ア</sup>カ<sup>カ</sup>○カ<sup>ウ</sup>ス<sup>チ</sup>キ<sup>ユ</sup>ス<sup>ト</sup>タ<sup>ア</sup>カ<sup>カ</sup>○カ<sup>ウ</sup>ス<sup>チ</sup>キ<sup>ユ</sup>ス<sup>ト</sup>タ<sup>ア</sup>カ<sup>カ</sup>○  
ベ<sup>テ</sup>ル<sup>デ</sup>ロ<sup>グ</sup>蘭<sup>ト</sup>云<sup>○</sup>刺<sup>必</sup>斯<sup>加</sup>烏<sup>ス</sup>蟄<sup>屈</sup>斯<sup>ト</sup>タ<sup>ア</sup>カ<sup>カ</sup>○カ<sup>ウ</sup>ス<sup>チ</sup>キ<sup>ユ</sup>ス<sup>ト</sup>タ<sup>ア</sup>カ<sup>カ</sup>○  
屈斯ハ形圓柱ノ如ク質脆ニメ透亮ナラズ灰  
白色ナリ味峻烈侵蝕シ速ニ氣中ノ水氣ヲ引  
テ流動シ又能ク水ニ溶化ス○腐蝕ノ峻性  
ガ故ニ内用ニ供スルニハ水ヲ以テ其毒ヲ  
シ粘滑ノ液ニ和シ更ニ謹テ用ウ○腹病  
ニ聲響アリ又碎石ヲ稱アリ世久クシク知ル  
所ノ碎石劑シチキア<sup>ニ</sup>液<sup>名</sup>ト云者即是ナリ

本草綱目卷之六

卷之六

十六

○腐蝕劑トシ、外用メ確効アリ。又浴湯蒸漏劑トシ用井テ、瘰癧搗掣ヲ治ス。全身浴ニハ一弓ヨリ二弓至<sup>ニテ</sup>。蒸漏劑ハ一錢ヨリ二錢ヲ以テ、三十六弓ノ液ニ溶解ス。内用ハ四分ハ一弓ニ至<sup>テ</sup>。一弓ノ液ニ和ス。○諸酸諸鹽諸<sup>ニテ</sup>酸化鑛類ヲ忌ム。

酒石鹽 ポットブカルボナス、ポットアス、ポットオス、○サル、タルボナス、トアス、アルカリ、ミリス、○サル、タルタリ、トシ、ド、ル、コ、ル、ス、ア、ス、ル、ス、  
白色堅硬ニメ結晶セズ、臭<sup>ニテ</sup>、味侵蝕シ風ヲ見テ溶解ス。○性刺必斯加烏斯、蟄屈斯ニ同シ。

但、酒石鹽ハ炭酸ヲ含ム<sup>ル</sup>。腐蝕ノ力微ナルノミ。○主治効用ハ固性亞爾加里ノ条ニ説ク所ニ同シ。蘘<sup>キ</sup>子<sup>ツ</sup>ハ殊ニ之ヲ以テ阿芙蓉及ヒ其他麻酔藥ト互ニ用井。瘰癧搗掣ノ諸病ヲ治スト云。其方酒石鹽ニ夕ヨリ一錢至テ、青水四弓ニ溶化シ、一時毎ニ二食匙<sup>ニテ</sup>。片一瓜ト互ニ用井。阿芙蓉<sup>ハ</sup>漸ク其量<sup>ハ</sup>倍<sup>ス</sup>。ヘシ。但、患者之ヲ服スルノ間、刺必斯加烏斯蟄屈斯一弓ヨリ二弓至テ溶化セル温浴ヲ行ヒ、又石鹼水ニ霸王鹽或ハ炭酸<sup>ハ</sup>剝<sup>ガ</sup>薦亞斯ヲ溶化

本草綱目卷之六

卷之六

スル者ヲ以テ灌腸法ヲ施シ便秘スルヲ十カ  
 ラシムベシ○碎石ノ効ヲ取ラント要セバ攝  
 爾攝爾水或ハ藝爾納水彊索ニ共ニ温泉  
 ニ溶化シ用ウ之ヲ炭酸亞爾加里水カ  
 二錢ト云其方ハ酒石鹽二錢ト攝爾攝爾水  
 二カトヲ合スル者ナリ之ヲ一晝夜ニ用井盡  
 ス此炭酸亞爾加里水ハ高名ノカ歇露私鎮吐  
 飲ホナオ料中ノ君品ナリ○酒石鹽ノ服量  
 ハ十ハヨリ一錢至ラ粘稠液ニ溶化シ服ス○  
 酒石鹽ニ酸味ノ品ヲ加フレハ其質忽分析ス

故ニ諸酸ヲ伍用スルヲ忌ム然レ枸橼汁若ク  
 曹醋ヲ加ヘテ開歇熱稽留熱聖涼屈熱粘液熱  
 腸胃熱等ニ用井テ稀釋清凉鎮吐發汗ノ効効  
 ナリ是諸家ノ實驗スル所ナリ其方酒石鹽  
 一錢ニ枸橼汁或ハ葡萄酒醋ヲ灌キ飽熱メ沸滓全ク止  
 至ル是ヲ歇露私飲ト云清凉劑トシテ參  
 考スヘシ○諸酸石灰水硫酸鹽消酸銀吐酒石  
 硃砂鐵水銀等ヲ忌ム鹽類熱毒ノ効効  
 炭酸刺馬亞斯カトボナスカトボナス○ホト  
 羅トボナスカトボナス○ホト

斜角ノ晶ヲ結ビ風ヲ見テ變セズ味亞爾加里  
 如クニメ刺戟セズ○効用酒石鹽ニ同ク侵  
 蝕ノ性ナシ故ニ酒石鹽適應ノ病ニ内用シ其  
 効酒石鹽ニ優レリトス○此物多量ニ投テ  
 含有ス故ニ沸滾散ニ用ルルニハ注意ス  
 トナシ用井テ以テ能ク痙攣性ノ嘔吐ヲ鎮ム  
 ○禁忌酒石鹽ニ同シ○散劑若クハ溶劑十匹  
 ヨリ二十匹至  
 曹達ソダ及ヒ炭酸曹達ソダハ其性剝萬亞斯ソダ及ヒ炭酸

剝萬亞斯鹽類酒石鹽、炭酸大同小異ナリ然  
 比唯其風化セザルト効力緩ナルトヲ異ナリ  
 トスルノ故ニ散劑ニ大量ニ用ウ○酒石酸  
 ヲ配メ酒石鹽ト成リ或ハ沸滾散ト為ル清涼  
 劑焉酒石酸ノ條ヲ參考スベシ  
 曹達ソダ泉温泉○冷泉○ソダソダルベシ  
 附録ニ出ツル  
 勿テ搗茶石鹼サボヲ以テ製ス其質堅クメ脂ノ  
 曹達ソダト阿列襪油ヲ以テ製ス其質堅クメ脂ノ  
 如ク帶黃白色ナリ之ヲ硬石鹼ト云水或ハ亞



爾箇兒ニ溶化ス○輓近椰子油ト曹達トヲ以  
 テ製スル者アリ○性羅僞諸鹽ニ異ナラ者唯  
 阿列襪油ノ緩滑ヲ以テ羅僞ノ猛烈ヲ抑制ス  
 スルガ故ニ其効和適ナリ○久服スル者消化  
 器ヲ害ス○嬰兒ノ酸敗液ニハ苦味有ルヲ  
 加ヘテ佳ナリ○慢性ノ痲痺質私痛及ヒ痛風  
 痛ニハ内外兼用スベシ但衝動發汗藥即癒瘡  
 木脂羯布羅安質母尼劑等ヲ加スベシ○腹部  
 ノ壅塞及ヒ之ヨリ繼發スル所ノ諸病論ハハ  
 肝脾腸間膜腺等ノ壅塞黃疸水腫腺病等ニ驗

下リ○結石ニハ私的逆斯方尤効アリ其  
 方勿擲祭亞石鹼ト牡蠣灰ヲ配伍スル者ナリ  
 ○酷厲侵蝕性ノ金石毒殊ニ鉛毒疝ニ良ナリ  
 ○洗滌蒸漏灌腸劑トシ用井テ寒腫乳汁結腫  
 血液滲溢等ヲ消散ス皮病ニハ椰子油ヲ以テ  
 製シタル石鹼ヲ用井テ殊効アリ又尋常瘡色  
 ノ石鹼單味若クハ硫黃ヲ加ヘテ疥癬等ノ良  
 藥トス○丸劑若クハ溶液トシ用ウ一カヨリ  
 一錢若クハ二錢至○諸酸酸化鹽鹽酸加爾幾  
 鹽酸重土瀉利鹽酸化鑛及ヒ單寧ヲ含メル諸

成身藥性論

品ヲ忌ム

○拔爾撒母阿波德兒多古カシポ、アロマ 獨布

羅ノ條ニ出ツ

○石鹼膏エシ、ポラス、エム 若幾崙

石鹼加羯布羅羯布羅、出ツ 右ニ味

消散ノ效アリ

○謁多私列爾石鹼膏 白石鹼尋常者阿

列襪油五、羯布羅 以テ溶化スル者若

謁多私列爾此方ヲ以テ 養液強壯セシム

七其弛縱ニ由テ胃寒、腹、麻、痺、私病等ニ感シ易

キノ癖アル者ヲ根治スルニ一良藥ト稱セリ

○用法ニアリ、一ハ温湯ニ溶化シ、全身ヲ洗滌

シ、一ハ直ニ表皮ニ塗擦シ、乾枯セシム

硫黃ス、フル、フル、ル

火山ヨリ出ス、鑛石土類ヲ混スル者アリ

混セザル者アリ、○硫黃ヲ精製スル者アリ

煖メ泡沫ヲ抄ヒ去リ、長圓管ニ注入シテ、固

セシムル者ナリ、其質堅ク、色、拘、椽、皮、黃ニ、光

輝アリ、氣味共チナク、太氣ニ觸レテ變セズ、研

磨スレバ聲アリ。且硫黄臭ヲ發シ。火を得テ能ク燃エ。青焰ヲ發ス。其焰呼吸ヲ窒ス。其氣アリ。加里。瀘及口脂油ニ溶化ス。○醫藥ニ硫黄華ヲ用ルルハ。先ニ硫黄ヲ溶解シ。尖圓状ニ製スル法ハ。先ニ硫黄ヲ溶解シ。尖圓状ニ蓋フテ。其煙焰ヲ受レバ。精微ノ粉末トナリ。蓋ノ内面ニ昇リ着ク。是硫黄華ナリ。又其昇リ着ケル粉末ヲ温湯ニ洗テ。之ヲ洗淨。硫黄華ト云。○硫黄ノ効用大。許多ノ病。即下利。解凝。發汗。豁痰ノ効アリ。又熱結。殺蟲ノ効アリ。



○殊ニ能ク肚腹諸部ノ粘液膜及ヒ表皮ニ走リ。速ニ全身ニ瀰漫シ。硫黄臭ヲ蒸發シ。身ニ銀器ヲ帶ル者ハ。銀器變メ黑色トナル。其瀰漫スルノ如ク速ナル所以ヲ考フルニ。蓋是硫黄胃ニ入テ。硫水素瓦斯トスルニ因ルナリ。○門脉壅塞。門脉壅塞及ヒ之ニ繼發ス。依剥。昆。堙。鬼。消。食。機。失。常。肚。腹。膨。脹。舟。經。不。通。若クハ。經。閉。等ニ効アリ。痔疾。肚腹閉塞。若クハ。血液運行遲慢ヨリ發ス。

痔疾ニ良シ、殊ニ痔血閉塞由テ頭胸及ヒ其  
他ノ諸部ニ血液輻湊スル者ニ殊効アリ○熱  
若クハ刺衝ノ景况アル者ハ、荅麻林慶酒、  
芒消等ヲ配伍シ、運行遲慢官能衰  
ハ、他ノ衝動、解凝、強壯ノ品ヲ伍用  
疾劇痛ノ焮衝アル者ハ、硫黃極ノテ害アル  
慢性、痺麻質私及ヒ痛風皮表ノ官能愈萎衰ス  
レハ、硫黃ノ効驗愈著シ○硫黃泉水ヲ内服シ  
兼テ硫黃浴ヲ行フヲ最良トス  
經久ノ冒寒及ヒ粘液性  
テ焮衝ノ候

ナキ者ハ、共ニ硫黃効アリ  
浴法良効アリ  
皮膚諸般ノ皮膚病殊ニ疥瘡ニ卓効アリ○硫黃  
ハ皮膚ノ内陷セル者ヲ表發シ、又外表ニアル  
者ヲ痊癒スルノ妙効アリ、故ニ症ニ随テ内外  
兼用スルヲ佳トス○頑固ノ皮膚病  
癩病等ニハ、硫黃劑ヨリヒ泉浴ニ優  
中毒砒石、鉛項、其他諸礦石ノ毒ニ中ル者  
黃善ク其毒ヲ解ス  
○真焮衝實性ノ失血等ハ硫黃害アリ○多血

質衝動質ノ者ニ之ヲ用ウル者ハ謹慎ヲ加フ  
ベシ○散劑若クハ煉藥トシ用ウ。症ニ從テ一  
錢ヨリ二錢至

○沈澱硫黃シシルタルベシ 稀硫酸右ニ味先 硫肝ヲ温湯

稀硫酸ヲ加フ 管地ニ澱脚ヲ生メ 沈底人

○主治性効 硫黃華ニ同シ○散丸煉劑トナス

○硫黃亞麻油ルオレウム 羅ス

○硫黃ニ清淨者 ○亞麻油ニ至ル ○方

以テ硫黃ヲ煮ニ至ル 硫黃金ク消化 ○方

今ハ唯外用トシ、疥癬類ノ瘡疹ヲ治ス

○硫黃的列並油ヲオレウム ○バルサンテイトナ フリ

硫黃亞麻油ニ 的列並底油

○療癒性ハ硬結腺腫ニ 外用ス

○硫黃疥癬膏ニ 皓礬ヲ 老利兒油ニ

○家猪脂ニ 疥癬ヲ治ス

○家猪脂ニ 疥癬ヲ治ス





物ニ成ル○儂麻質私及ヒ痛風ニ特拔ノ效アリ  
 ル藥劑トス○稀澄無色トシテ太竄透ナル夜ナ  
 リ。火ヲ点メ熱ヘ易ク熱テ蘭墨耶私製ヲ産  
 名ノ如キ竄透ノ氣味ヲ生ズ。但味彼等ニ  
 シ峻烈ナラス○謁多設爾名百爾榜如西  
 試驗ニ據レバ。硫黃亞爾箇兒ハ諸脈管及ヒ其  
 關係密ナル部即皮表泌尿器陰部ノ内具等ヲ  
 刺衝スル。刺戟ノ峻藥タリ○遷延儂麻質私  
 病ニハ。内外併用ノ殊効アリ○毎次三滴ヨリ  
 五滴十滴ヲ取リ。亞的兒  
 服ス。其便秘症

ヲ兼ル者ハ。蓖麻油ヲ加テ服ス。日ニ二次若ク  
 ハ三次○脂油ニ和シ外敷メ痛風性ノ腫瘍ヲ  
 消散シ。禿瘡風癬等ヲ消除ス。又表皮ノ湯火傷  
 ニ外用メ効アリ  
**補** 硫黃亞爾箇兒ヲ製スル簡易法  
 墨林騏舍密書ニ云。葛斯土涅兒名曰。亞  
 爾箇兒製煉ハ。既ニ數年前般門修ノ著書  
 ルシヘ区中ニ。其試驗ノ說數條ヲ記ス。予  
 亦硫黃亞爾箇兒ヲ數回製シ試ルニ。天生ノ  
 硫黃安質母扭シルモニ。十チヒ。アヲ用ウルヨ



二十七日  
 一  
 リモ人工硫黄鍊リ、アルヒレヒシム、アルヲ用井  
 製スルヲ佳トス。其法、人工硫黄鍊七分、乾木  
 炭二分ヲ合メ極末トナシ、玻璃ノ列篤兒多  
 ニ盛リ、火酒燈上ニ安シ、受器ハ雪トシテ  
 合和シタル者ノ中ニ置ク。○列篤兒多  
 合藥漸々燐ルニ從ヒ、無色ノ液受器中ニ滴  
 ル。此液竄透ノ烈香アリ。○予又鍊屑極末ノ  
 者三分、木炭四分、硫黄末六分、三味ノ合藥ヲ  
 以テ、上法ノ如ク製シ試ルニ、合藥燐ケ易ク  
 メ、其温カニ因テ硫炭ノ合和ヲ助クルヲ以

精液受器中ニ滴ル。此液ノ者比ス  
 然レバ、稍黄色ヲ帶フ。是他ノ硫黄ノ量過度  
 ナルニ由ル。○又霸王鹽三分、木炭一分ヲ以  
 テ製スルモ、亦此物ヲ得ルト雖兼テ多量ノ  
 瓦斯ヲ生ス。般門斯既ニ之ヲ言ヘリ  
 水銀○ドラルギリスロム ○アルゲンシ  
 水銀ノ純ニメ他物ヲ雜ヘザル者ハ能ク  
 ス。是ヲ生水銀ト云。又硫黄ト混ズル者ハ或  
 至鍊ト混ズル者アリ。其質ハ流動ハ温氣多  
 少ニ因ル。故ニ寒氣ノ高度ニ會ハハ凍凝メ自

廣馬見録卷九  
 卷九

余ノ金屬ノ如ク、撓屈スベク、又延長スベキニ  
至ル。○氣味ナク、色白ク、微緑且、光輝アリ、能  
ク他物ヲ混和ス、殊ニ能ク金屬ト和シ、流動質  
ヲ失ス。○暗水膠等ヲ混メ、盃中ニ磨ク、  
彩變メ黒色トナル。無蓋ノ壺ニ入レテ、  
蕩揺スルモ、亦變メ黒色トナル。○生水銀ノ人  
体ニ於ル、唯器機ノ作用ヲナス。○生水銀ヲ以テ  
ニ他ノ作用ヲナス。故ニ往古ハ生水銀ヲ以テ  
殺蟲劑トシ、又腸位錯亂ヲ用ク。然レ近今ハ用  
ウルヲ稀ナリ。○水銀ハ諸酸ト合メ、酸化瀕鹽

トカシ用ウレバ、其効多ク、  
製劑ノ能力、古來諸家之ヲ究竟シ、ト要メ、異  
論紛出スト、雖、如今ニ至テ尚歸一ノ論ナシ、然  
レ數百年ノ歴驗ニ據テ之ヲ考フルニ、瀕劑ノ  
効用ハ、大率其途ヲ一ニス、唯其他藥ノ配伍  
法ノ異、分量ノ輕重、患者ノ體質、疾病ノ差  
ニ因テ、其成功ヲ異ニスル。○大瀕劑  
諸脈管ノ質ヲ刺衝スルハ、効アリ、故ニ瀕劑  
スレバ、脉動増進シ、繼テ分泌管吸收帶殊ニ唾  
腺ニ一異ノ感動ヲ起シ、其甚シキニ至テハ、汗

二便ノ通泄ヲ増加シ、持久シ用ウレバ、厭惡ス  
 ベキ危険ノ流涎ヲ發シ、精神竟ニ衰弱シ、身體  
 羸瘦ス。○瀧劑ハ癩毒ヲ治スル固有ノ妙劑ナ  
 リト雖、其効用ハ未タ其理ヲ究メサルハ、  
 間錯誤ヲ致ス。一アリ、故ニ繁冗ヲ省  
 ニ説テ其詳ヲ得ン。一ヲ要スルナリ。  
 癩毒病瀧劑ハ實ニ癩毒ノ妙劑ニシテ之ヲ措テ  
 更ニ他ニ代用スベキ者アルコトナシ。  
 本註瀧劑ハ癩毒ノ妙劑ニシテ代用スヘ  
 キ者ナシト雖、新染ノ癩毒ハ未タ及キハ、  
 經ザル者ハ

必シテ瀧劑ヲ要セス。本註瀧劑ハ癩毒ノ療法  
 ヲ行フテ、効ヲ収ムベシ。然レテ其ノ之ヲ經驗ス  
 ルニ、其毒已ニ全身ニ瀰漫スル者ハ、瀧劑ヲ  
 用ウルニ非ザレバ、根治ヲ得ルコトナシ。  
 ○瀧劑ノ癩毒ニ於ル、猶幾那ノ間歇熱ニ於ル  
 ガ如シ。之ヲ廢メ更ニ他ニ求ムルハ、其理  
 是、日常ノ經驗ニ由テ昭々タル所ナリ。然レテ  
 之ヲ用ウルノ法方ニ至テハ、其說ハ般般ニ古  
 往今來曾テ一定ノ成說ナラズ。或瀧劑ヲ用弁  
 テ、癩毒ヲ全治セシムルコト欲スルハ、其量ヲ大ニシ、其

癩毒ノ癩毒論 卷九 二十九

時ヲ持長シ。流涎十分ニ發スルニ至リ。其ヲメ  
壓止スルコト勿ルベシ云。或此劑ヲ用井ルノ  
際、流涎ニ注意スルヲ發セシムベカラズ。流涎  
ハ從ヨリ治療ニ益ナク却テ害アルヲ  
云。又輒近諸家ノ經驗ニ。此劑ヲ用井テ  
流涎セシメサレバ、切實ノ効ヲ収ム難シ  
但予ハ未此說ヲ試驗セズ。或纔ニ流涎ノ萌發  
ヲ見ルニ至リ。津唾ノ分泌増進シ、口中鑿味ヲ  
覺ヘ氣息惡臭ヲ生シ。齒齦動搖スル等ヲ見ハ。  
速ニ後服ヲ停ムヘシト云。是良ノ法方タリ

①毒ハニ冬ヲ經テ。全身ニ流涎スル者ハ、水銀  
ヲ大用シテ。十分流涎ヲ發セシムルコトハ、全功  
ヲ得難キ者ナリ。然ルニ醫家此病ニ瀕劑ヲ用  
ウルニ當テ。甚々勇斷ノ處置ヲナスコトヲ恐ル  
是予カ日常目撃スル所ナリ。夫十分ノ流涎  
ノ流涎ヲハ、害ヲ身体ニナスコトヲ恐ル。小  
量ニ久用スルト。小量ヨリ漸ク増シ長ク用  
ルニ至リ。終ニ慢性ノ瀕毒病ヲ發シ。身体衰弱為  
ニ敗類ノ本病ヲ猶自若シ以治スルコトヲ難シ故  
ニ瀕劑ハ其量ヲ大ニシ。長服セザルヲ貴フ。此

ヲ如クスレバ患者全身利濟私ノ興奮所  
謂華澀滿水銀熱ヲ發以テ体中ニ入所  
ノ鑛鹽即水銀驅馳併セテ本病ヲ全愈ス  
坐下間之アリ然此ハ是其病新舊  
ス其毒已ニ全身ニ瀰漫セル者施ス  
ナリ其新染ノ者ノ如キハ全ク瀕劑ノ内用  
要セズ唯創處ニ外敷其部ノ毒ヲ制伏  
スルヲ以テ足レリトス者間之アリ○往古  
ヨリ諸家瀕劑ノ優劣ヲ論ス乃甘瀕ヲ  
稱譽スル者アリ猛瀕又者アリ華澀

瀕名ノ方ニ據ル者アリ亦飲幾人ノ劑ヲ執ル  
者アリ時ニハ甲ヲ以テ優レトシ時ニ  
ハ乙ヲ以テ甲ノ上ニ冠ス見今ニ至テ略々尚  
然リ然レ疾ノ性質症狀新舊ノ異アリ患者  
ニ稟賦強弱ノ別アリ加之既往行ニシ所  
法モ如今ニ至ルマデ服シ来レル所  
亦各不同アルガ故ニ其時宜ニ從テ  
劑ヲ撰用セザル能ハズ是ニ途ニ拘ル  
方ヲ偏執スルヲ得ザル所以ナリ○之ヲ用并  
テ良効ヲ取ント要セバ攝生ヲ慎ムヲ一大緊









始<sup>レ</sup>テ癩毒病<sup>ニ</sup>内用<sup>ス</sup>、然<sup>レ</sup>モ藥性頗慄悍ナル  
 ガ故<sup>ニ</sup>、子細<sup>ニ</sup>注意<sup>ス</sup>、至<sup>ル</sup>分量<sup>ニ</sup>用<sup>フ</sup>、<sup>レ</sup>即  
 每服八分、以<sup>テ</sup>一日<sup>ニ</sup>四、五分、以<sup>テ</sup>一日<sup>ニ</sup>五、六次  
 若<sup>クハ</sup>二次、○此劑、唯病毒盤<sup>ニ</sup>自<sup>ラ</sup>頭  
 劑共<sup>ニ</sup>効ナキ者<sup>ニ</sup>内用<sup>ス</sup>、<sup>レ</sup>必<sup>ズ</sup>篤<sup>ク</sup>扶  
 多<sup>ク</sup>之<sup>ヲ</sup>丸<sup>ニ</sup>製<sup>ス</sup>、内用<sup>ス</sup>、其方  
 赤降頭<sup>五、六分</sup>、<sup>至</sup>醋酸模爾比<sup>一、二分</sup>  
 亞爾答亞根<sup>極末者</sup>、蒸餾水<sup>適宜</sup>、右<sup>ノ</sup>分  
 テ二十九<sup>トシ</sup>、朝發後<sup>一</sup>、丸<sup>ヲ</sup>服<sup>ス</sup>  
 補 穆私篤醫學韻府、經膺痛<sup>ニ</sup>神効

癩毒病

癩毒病

三十五

アル藥劑ハ赤降頭<sup>一</sup>、<sup>テ</sup>一男五十歳  
 此病<sup>ヲ</sup>得<sup>テ</sup>、已<sup>ニ</sup>四週<sup>ヲ</sup>経<sup>テ</sup>、<sup>者</sup>ニ、左ノ方  
 ヲ用<sup>井</sup>、八日<sup>ニ</sup>メ全治<sup>ヲ</sup>得<sup>タリ</sup>、其法、股<sup>ニ</sup>水  
 蛭二十頭<sup>ヲ</sup>貼<sup>シ</sup>、旃那浸<sup>ニ</sup>芒硝<sup>ヲ</sup>溶<sup>シタル</sup>  
 下劑<sup>ヲ</sup>用<sup>井</sup>、次<sup>ニ</sup>  
 赤降頭<sup>一、二分</sup>、白糖<sup>半、分</sup>、<sup>至</sup>羅比<sup>一、二分</sup>  
 四分、右三味<sup>ヲ</sup>研和<sup>シ</sup>、散<sup>ト</sup>、<sup>レ</sup>即  
 分<sup>テ</sup>、每朝晚<sup>ニ</sup>裹<sup>シ</sup>、大麥水<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>送<sup>ス</sup>、<sup>レ</sup>下

○越質屋布斯密涅刺列<sup>シ、ル、ニ、グ、リ、ム、○、ヒ、ド、ラ、ル</sup>

天馬記生介 卷九

ルギリウム、シユルヒ  
生ニグリュム、  
生ニグリュム、  
生ニグリュム、

生水銀 硫黃 石ニ味混和シテ

細ニ研磨メ、全ク星ヲ見ザルニ至ル  
ニメ、氣味ナク、水ニ溶化セス  
性ノ者ナリ、癩毒性若クハ瘰癧性ノ皮  
効アリ ○腺病殊ニ多血肥厚ノ小兒腸間膜腺  
壅閉メ、腹滿堅硬膨々タル者ニ卓驗アリ ○呼  
吸器ノ慢性癆瘵質私病若クハ聖京偃諸病ニ  
用ウ ○丸若クハ散トナシ目  
至 ○諸酸及ヒ酸性鹽類

○酒酸 瀕ギタル、エト、ポト 此方ノ濫觴

已ニ尚シ、近今ニ至テ、加  
ノニ氏癩毒ニ峻効アルノ劑トス ○性侵蝕セ  
ズ、流涎ヲ發セズ ○酸味ナキ舍利別ニ和シ用  
ウ、ニ瓜ヨリ十瓜十二瓜尚多量ニ至ル

○猛瀕ミドリ、アス、デウ、トオキ、シチ、ド

状ヲナス、臭ナク、太シキ酷烈侵蝕ノ鑛味アリ  
○性効頗ル猛烈ナリ、故ニ用ウルニ臨ンテ此

ニ注意セザレハ消食器是熱為ニ大害ヲ受ク  
服量極大ナレハ、忽腸胃燒カ如キ劇痛ヲ發シ、  
苦悶已甚シク、頭痛割ガ如ク、大渴ヲ欲シ、血液腦  
中ニ激衝シ、血便ヲ下利メ即死シ、  
蛋清ニ水ヲ和シ用ウルヲ最良トス、  
微旬名及ビ方今柁宋實名鳩爾名離爾名等、  
ニ之ヲ以テ癩毒ノ諸症ニ稱用シ、其効復ニ諸  
瀕劑ノ上ニアリトス、  
○猛瀕ハ其性猛ニ刺戟  
メ、速ニ全身ニ布達シ、唾腺ニ取入ルヲ却テ  
微ナルカ故ニ、症ニ随テ用スベキ者アリ○

諸官遲急ノ活動セザル者有スル者、癩毒已  
ニ深ク根ヲ全身ニ托シ、  
經久ノ疾患アリテ其氣力未甚衰ヘザル者ニ  
殊効アリ○  
○癩毒骨膜若ハ骨節ニ着ク者ニ内  
用シ、新癌腫ニ蒸漏劑トナシ、癩毒皮病ニ各湯  
トシ、外用メ殊効アリ○  
○猛瀕ヲ服スル  
嚴ニ攝生ヲ慎ミ、常ニ適度ノ温室ヲ開キ、  
味飽釀ノ飲ヲ禁シ、消化シ易キ食物ヲ食ス  
ベシ○  
○猛瀕ハ癩毒ノ外更ニ癩毒性ノ慢痺、  
麻質私足部ノ經久潰瘍、癩性皮病、風癩等ニ





ニメ之ヲ用ウルハ至大危嶮ノ法ナリト云。  
 夫世ノ産婦熱ト稱ス者其病一ナラズ。或  
 ハ真ノ腹膜焮衝ヨリ列印巴液滲出スル者  
 アリ。或ハ腸胃性弛張神經熱ナル者アリ。或  
 ハ悪性腐敗熱ナル者アリ。故ニ能ク  
 ニ注目メ法方ヲ下スベシ。○甘瀕ハ下劑  
 ナシ用ウルハ唯真ノ腹膜焮衝ニ効アルノ  
 又甘瀕ハ腹内臟腑ノ焮衝。肝焮衝。腸焮衝  
 ノ如キニ十分ノ瀉血ヲ後之ヲ用井テ偉

効アリ。其方ハ方而東。必ス阿芙蓉  
 ヲ伍用スベシ。○痘瘡。麻疹。赤斑熱等。其性弟扶  
 思ナル者ハ。屢虚性ノ焮衝ヲ生ス。甘瀕能ク此  
 焮衝ヲ抑制ス。又痘疹ノ遺孽病。乃僂麻質私痛  
 慢性皮病。水腫等ヲ豫防ス。大凡此水腫ハ。實  
 實性ノ者多シ。但ス々々々。エ水腫ヲ  
 ニ之ヲ用ウルヲ禁ス。第  
 二腸胃熱。胆液熱。腸焮衝。若クハ肝焮衝。又合併  
 スル者。輒近殊ニ腸ノ粘液膜。小腺焮衝。峻  
 効アルヲ稱ス。

本草綱目卷九







二滴

第三方

右調勻ス 糖二刀 幾那末 黎蘆根末 加耶布底油五滴

右三方、每劑各分テ二十包ト 時ニ第二方、晚ニ第三方ヲ用ウ

第十方 殺蟲瀉下共ニ葯刺巴ヲ伍又佳ナリ又蟻蟲

ニ殊稱アリ 服量半匁ヨリ十匁至 慢性病ヨリモ

急ニ由テ各差等アリ 慢性病ヨリモ

稍大量ニ用ウヘシ 論ヘ 若ハ一時半每

ニ一匁ヨリ二匁至ヲ以テ始メ 緩性病ニハ先

小量ニ用井、漸ク加ヘテ大量ニ至ル 小兒ハ大

人ニ比スレバ其量大ナリト 雖尚能ク久ニ堪

フ、又瀉下ノ効ヲ要セハ十匁ヨリ二十匁至

頓服セシム、若ハ兩度ニ分服セ

里、炭酸加里土類、鹽酸鹽、硫酸鹽、鑛酸、酒精、

石鹼ヲ伍スルヲ忌ム

○普洛多乙阿就列去母協度羅爾業利 登程滿

皮膚病ニ用井テ良効ヲ得タリト稱

皮膚多癬中言  
卷九

ス○散トナシ用ウ。毎服十二分ハヨリ一ハ至  
日ニ三次。又一刀ヲ以テ半弓ノ脂ニ和シ軟膏  
トナシ。腺上ニ塗擦ス。○此劑ノ制法ハ予カ著  
ス所ノ白耳義局方ニ詳説ス  
**補** 普洛多乙阿就列去母協度羅爾業利  
ヲルギユム。イオキム。クキ。ニ製法  
弗利設藥性論ニ曰第一沃陳頰ハ生頰ト沃  
陳各等分ノ研和ニ成ルナリ。其研和ノ紅色  
ヲ發スルニ至リ。亞爾固兒少許ヲ加フレバ。  
變ノ綠色微帶黃ノ者

○德宇多乙阿就列去母協度羅爾業利ハ性侵  
蝕ス。故ニ唯外用ニ供スル  
**補** 德宇多乙阿就列去母協度羅爾業利  
シシム。ロド。ル。ギ。リ。イ。オ。キ。ム。ニ。製。法  
ド。ラ。ル。ギ。ユ。ム。イ。オ。キ。ム。ク。キ。ニ。製。法  
クイオキ蘭製法  
弗利設藥性論ニ曰第二沃陳頰ハ生頰ト沃  
沃陳二分ニ少許ノ亞爾固兒ヲ加テ研和  
スルニ成ル。其色鮮明ノ猩紅ナリ  
○白降頰  
ム。ア。ル。ギ。ユ。ム。イ。オ。キ。ム。ク。キ。ニ。製。法  
ア。シ。リ。ア。チ。ム。キ。ム。ロ。ド。ラ。ル。ギ。ユ。ム。イ。オ。キ。ム。ク。キ。ニ。製。法  
ア。シ。リ。ア。チ。ム。キ。ム。ロ。ド。ラ。ル。ギ。ユ。ム。イ。オ。キ。ム。ク。キ。ニ。製。法

皮膚多癬中言  
卷九

蘭  
 本註此ニ掲ル所ノ白降頰、白耳義局方ニ  
 所謂<sup>三</sup>川<sup>ア</sup>ス、<sup>五</sup>下<sup>ハ</sup>ル<sup>ギ</sup>ル、又<sup>七</sup>下<sup>ニ</sup>カ  
 一ト云者ニメ、古人ノ所謂白降頰ハ、<sup>白</sup>耳<sup>義</sup>局<sup>方</sup>  
 ズ、古人ノ所謂白降頰ハ、<sup>白</sup>耳<sup>義</sup>局<sup>方</sup>  
 キリス、<sup>五</sup>ル<sup>キ</sup>ス、<sup>シ</sup>ケ<sup>リ</sup>リ、<sup>又</sup>、<sup>リ</sup>リ<sup>ス</sup>、<sup>又</sup>  
 ロトオキシヂ、<sup>ヒ</sup>ド<sup>ラ</sup>ル<sup>ギ</sup>リ、<sup>ペ</sup>レ<sup>シ</sup>、<sup>タ</sup>タ<sup>キ</sup>  
 凶ト稱スル者ナリ、謬リ認メテ錯雜スル  
 勿レ  
 純白ノ粉末ナリ、水亞爾<sup>ニ</sup>溶化セズ、

硫酸鹽酸ニハ能ク溶化シ、<sup>氣</sup>十<sup>ク</sup>、<sup>微</sup>シ<sup>ク</sup>、<sup>鑛</sup>  
 味アリ、昔浦爾花<sup>協</sup>名<sup>斯</sup>、<sup>御</sup>向<sup>名</sup>等、此猛劑ヲ  
 以テ内用ニ供ス、然レ<sup>比</sup>如<sup>今</sup>ハ、<sup>只</sup>膏<sup>ニ</sup>、<sup>白</sup>降<sup>頰</sup>膏<sup>ニ</sup>、<sup>シ</sup>ン  
 シ<sup>ビ</sup>ム、<sup>メ</sup>ル<sup>キ</sup>リ、<sup>ペ</sup>レ<sup>シ</sup>、<sup>ト</sup>ナ<sup>シ</sup>、<sup>癩</sup>毒<sup>若</sup>、<sup>公</sup>瘰<sup>癧</sup>質<sup>日</sup>  
 リ發スル慢性ノ皮病ニ外用スル<sup>ル</sup>、<sup>比</sup>膏<sup>ニ</sup>  
 ヲ塗擦スレバ、其部麻疹ノ如キ瘡疹ヲ  
 獨<sup>ニ</sup>醫<sup>骨</sup>布<sup>名</sup>、此膏ヲ導<sup>拽</sup>劑<sup>ト</sup>シ、<sup>用</sup>其<sup>方</sup>  
 効<sup>浩</sup>天<sup>利</sup>多<sup>名</sup>、<sup>吐</sup>酒<sup>石</sup>膏<sup>ニ</sup>、<sup>同</sup>、<sup>其</sup>方<sup>ニ</sup>、<sup>用</sup>其<sup>方</sup>  
 白降頰<sup>一</sup>錢<sup>至</sup>、<sup>實</sup>芟<sup>荅</sup>利<sup>斯</sup>膏<sup>一</sup>錢<sup>至</sup>  
 右二味、調勻<sup>メ</sup>膏<sup>ト</sup>ナシ、<sup>小</sup>量<sup>ヲ</sup>取<sup>テ</sup>皮<sup>表</sup>ニ擦

張鶴見藥生論 卷九

四十五



錢半ヲ取テ、体中數處ニ塗擦スル。其後此膏一錢或ハ一  
 錢半ヲ取テ、体中數處ニ塗擦スル。今日内股ニ擦スレバ、明日ハ腋  
 下、其後ハ腕、其後ハ手、其後ハ脚、其後ハ膝、其後ハ肘、其後ハ  
 肩、其後ハ頸、其後ハ頭、其後ハ背、其後ハ腰、其後ハ腹、其後ハ  
 胸、其後ハ膈、其後ハ心、其後ハ胃、其後ハ脾、其後ハ肺、其後ハ  
 肝、其後ハ胆、其後ハ腎、其後ハ膀胱、其後ハ大腸、其後ハ小腸、其後ハ  
 六日ニ至リテ大ニ發汗シ、上圍ノ度數ニ至ル。小便多利シ、流涎スル等ノ症ヲ發ス。此ヲ瘧  
 ノ分離ト云ス。此法ヲ行スノ間ハ、極メテ淡薄  
 ノ飲食ヲ少用スベシ。其飲ハ乃、清水、乳汁、哥喜  
 ノ類、其食ハ乃、淡薄ノ羹、腫小量ノ白蒸餅ノ類  
 ノミヲ用井、温室ニ閉居シ、風ヲ避クベシ。此

法ハ此ノ如ク大量ノ水銀ヲ用井、其減損攝生  
 法ヲ行フト雖、絶テ是ガ為ニ危害ヲ致ス。大  
 シ。然レ若シ此法ヲ行ハント欲セバ、必大謹慎  
 ヲ要ス。若其人薄弱ニシテ、元氣已ニ衰耗スル者  
 ハ、此法ヲ行フベカラズ。  
 ◎硝酸項膏  
 ヲ用ル。生水銀一匁、硝酸項膏一匁、  
 家猪脂六匁、阿列攪油四匁、  
 味先硝酸ヲ以テ水銀ヲ溶化シ、微温ニ乘  
 味ヲ加ヘ、攪拌シ、冷定スルニ至ル。○癩毒瘰癧

疥癬等ノ瘡疹ニ効アリ

○赤降瀕膏ラユンギリエント云ハルオキシチエト

赤降瀕半錢 家猪脂二 石硫磺末

ニ研和ス ○癩毒性瘰癧性等ノ慢性眼疾ニ効アリ

ニ其焮衝眼瞼ニアル者ニ偉効アリ又瘰癧性

ノ皮病ニ用井テ間効アリ ○眼ノ外部ニ慢性

焮腫ハ此膏麥粒大ヲ取テ朝夕眼背ニ塗擦ス

○蓮謨規吉丸一 ○生氷銀一 刺比亞蓮謨末

三錢 大黃舍利別適 白蒸餅心

右先上ノ三味ヲ合シ子細ニ研和シ星ナキニ

至リ白蒸餅心ヲ加ヘテ丸トナス ○布飲幾殊

ニ此丸ヲ以テ癩毒ニ稱用ス

○亞括ハ括的尼加 猛瀕ニカ 石硫磺末

右猛瀕ヲ以テ石灰水中ニ溶解ス ○癩毒瘰癧

癰瘍又下肢ノ經久侵蝕瘍ヲ淨潔シ浴スルニ

殊効アリ



唯安質母尼製劑金製劑沃實捏鹽

酸重土鹽酸加爾幾等ヲ撮必為ニ詳説

鹽酸金鹽

スロルレ去ム。アウリ。エト。キ。ヂ

ウトソレ。ウト蘭

金ハ古昔亞刺比亞國及ビ淘金戶輩藥用

供スレ氏爾來漸ク廢ノ復用井ス輓近ニ至ラ

設爾列震名再之ヲ稱メ醫藥ニ算入ス○設爾

列震名ノ説ニ曰金鹽ハ其効猛頑ヨリ峻ニシ

テ其齒齲ニ感スルヲ及テ微ク且汗尿ノ分泌

又増進ス○大ニ血管系ニ能ク奮發ス故

ニ大量ニ用カレハ熱及ヒ焮衝等ヲ發ス○設

爾列震名德私羯布名白爾設名等ノ説ニ云金

鹽ハ能ク經久癩毒ヲ治ス故ニ之ヨリ發スル

諸病即骨膿骨贅或ハ夜間骨痛堪ヘカラス

者經久眼焮衝經久潰瘍等ニ卓驗アリ

病ニ用井テ大ニ其症ヲ寛快ス○謁爾多

外乳癌奇宮癌結核外腫外腫外腫外腫

子宮癌ニ外腫外腫外腫外腫外腫外腫

家萬已藥生論

卷四



喜爾度名文名良名多名我爾阿多舍名涅兒名等名精  
力虛脫ノ水腫病ノ一良藥トス○金製劑ノ最  
佳ナル者ハ鹽酸金鹽加曹達即本ナリ其毒  
予カ著ス所ノ白耳義局方ニ詳説ス○金鹽ハ  
二匁ヲ以テ蒸餾水一匁ニ溶化シ毎服一匁  
ニ三回又丸トナシ用ウルハ二匁ヨリ五分  
ヲ取り玫瑰昆設爾布半錢ニ和シ分テ二十四  
丸トシ朝夕一丸ヲ服ス又散トシ用ウルニ  
一匁ヨリ二匁ヲ甘草膏末二錢ニ和シ分テ十  
二包トシ毎晩一包ヲ服ス○金鹽ハ大量ニ用

ウルモ日ニ一匁ニ過クベカラス若シ已ラ  
得スシテ更ニ多クスルモ一匁半ニ過ルコト勿  
ルヘシ○若之ヲ服メ胃ノ感動甚シキ者ハ内  
用ヲ停メテ齒齦ニ擦スベシ  
**補** 弗利設藥性論ニ曰鹽酸金鹽ハ金溶液  
ノ金三十六分ヲ含ミタル者ニ食鹽一十分  
ヲ加ヘ水氣ヲ蒸散乾涸セシム又法金一十分  
四分ヲ硝鹽酸一匁ニシテレギノ一匁ニ溶シ具  
溶液ヲ蒸散乾涸シ熬鹽十匁分ヲ加ヘ水  
溶シ漸々水氣ヲ蒸散スルニ至ルニ至ルニ至  
直角四稜ハ橙

黃芒ヲ結フ即金鹽ナリ  
 安質母尼スルニシテモガラシクスル  
 安質母尼スルハ純一ノ者ナシ多クハ砒石、鉄、諸  
 酸殊ニ硫黃ヲ混ス之ヲ生安質母尼スルニシテモ  
 ズム○シルニレズム、スチビ、スチビ、スチビ、  
 ズム、スチビ、スチビ、スチビ、スチビ、スチビ、  
 アル青白色ノ大塊ナリ質理恰モ東鐵ニ似  
 ニ、其鐵一齊ニ外ヨリ中心ニ向テ束聚ス故  
 ニ外面多クハ美麗ノ小星ヲ點シ質粗鬆ニメ  
 氣味共ニナク水ニ溶化セズ且指間ニ磨スレ  
 バ染テ青色ヲハス○生安質母尼ハ多ク獸醫

馬醫ノ用ニ供スルノ其他皆峻効ノ藥劑  
 ナシ○吐下發汗祛痰解凝ノ效アリ然レ其效  
 皆分量ノ多少患者ノ稟賦疾病ノ性質ニ從テ  
 各異同アリ小量ニ用井テ發汗祛痰解凝ノ效  
 ヲ奏シ大量ニ與ヘテ吐下ノ效アリ○安質母  
 尼製劑ハ最モ佳ナル者ハ安質母尼酒吐酒石  
 金硫黃等ナリ  
 ○安質母尼酒スルニシテモガチボン、スチビ、  
 ○吐酒石スルニシテモガチボン、スチビ、  
 吐酒石スルニシテモガチボン、スチビ、  
 吐酒石スルニシテモガチボン、スチビ、

本草綱目卷之十一  
 卷之十一

エインス

右兩種共ニ吐劑篇ニ出ス故ニ茲ニ贅セス

○金硫黄  
シニレ五ム、スチビ、ヒドロ、ナキ  
ル、シレ五ム、オキシ、ヒドロ、シ  
○シニレ五ム、スチビ、ヒドロ、ナキ

其質至微至細ニシテ、橙黃色、氣味共ニナシ○是

安質母尼劑中ニ一良品トス、少量ニ用ウレバ、

善ク發汗祛痰解凝ノ効ヲ呈ス、然レ大量ニ用

ウレバ暴吐瀉ヲ起ス

聖京佩儂麻質斯痛風 三病共ニ嗽衝及ビ刺衝

ノ状全ク已メテ、蒸氣ヲ發シ痰ヲ祛クニ要  
スル者ニ效アリ

呼吸器諸病痙攣性ノ者及ビ其部ノ衰弱ヨリ

發シテ、之カ為ニ持久スル者等ハ、熱ノ有無ヲ

問ハス、共ニ之ヲ用非テ一良藥トス、然レ其效

劇盛ナル者及ビ血、肺中ニ鬱積スル者ニ害アリ

リ用ウベカラズ、故ニ百日咳ノ第二期、痙攣喘、粘膠

喘等并ニ肺嗽衝後ノ、肺衰弱シ痰甚、粘膠ニ

ハ、咯出シ難キ者或ハ、氣管ニ粘液膜衰弱ノ痰

ヲ釀スヲ綿々トメ止ザル者ニ效アリ。又肺勞ノ痰極メテ咯出シ難キ者ニ用井テ能ク咯出シ易カラシム

熱性瘡疹病就中麻疹赤斑熱等皮膚ノ衰弱或ハ皮膚ノ官能遲怠ニ因テ能ク出齊セズ者及ビ其病治セントスル時繼發スル諸症殊々呼吸器ノ諸病諭ハバ咳嗽遷延ナラントスル者ニ效アリ。此咳ハ麻疹後屢發スル者ナリ。又金硫黃ト甘瀕ヲ配合メ赤斑熱ヲ預防スル効アリト稱ス。然レ葛葉下ニ舉ル所ノ華涅

滿ノ預防方ノ效驗切實ニシテ若カサルヲ以テ此劑復用ウルトナシ

粘液熱釜硫黃ニ他ノ解凝稀痰苦味強壯ノ品ヲ伍メ太良效アリ。又間歇熱ノ粘液若クハ内臟閉塞ニ由テ遷延スル者ニ良效アリ

内臟壅塞脾肝腸間膜腺等ノ閉塞及

發スル諸病諭ハバ黃疸水腫ニ效アリ。腺病何ノ症状ニ顯ルヲ論セズ皆效アリ。碩學ノ毘却兒ト大ニ之ヲ稱譽若クハ金硫黃微セハ吾其レ醫タルヲ云シト云諸

本草綱目卷之十

醫皆真ニ然ラトス  
 ○服量ハ年紀ニ長幼ニ從テ差等アリ丸若クハ散トナシ用ウ其時若クハ一時半毎三四分  
 氏ノ一ヨリ半氏ニ氏至○諸酸酸味ハ水酸  
 化鹽。亞爾加里。炭酸。亞爾加里。諸藥劑單ニ  
 諸品ヲ伍スルヲ忌ム  
 ○結兒。茂斯密。涅刺列。○  
 橘色或ハ紫色ハ粉末ナリ天鵝絨ハ如シ

臭氣ナク風日ヲ見テ色ニ溶化セス○  
 主治効用。金硫黃ニ同シ。惟此物鑛分ヲ孕ムト  
 多キト効用峻ナルトヲ異トスルノミ故ニ服  
 量モ亦小ナルヲ佳トス。即ハ分以ヨリ多キ  
 モ二以ニ過ギズ。或云粘液性ノ濕喘ニハ其效  
 金硫黃ニ勝レリト  
 ○含硫加爾。幾安質母。扭スルビア。○カル  
 色褐ナルト叔哥刺度ノ如ク味硫黃如キ粉  
 末ナリ。濕潤スレバ敗卵臭ヲ生ス○經久ノ儂

天爲色藥生論  
 卷四

麻質斯痛風癩毒瘰癧等之用也又經久頑固ノ  
 内臟閉塞キ良ナリ○丸ト用ルニヨリ六  
 爪至○諸酸酸化鹽亞爾加里酸化鑛鑛鹽ヲ忌  
 ム  
 ○越質屋布私安質母<sup>エチオピア</sup>扯<sup>アト</sup>シラル<sup>シラル</sup>ラ<sup>ラ</sup>チ<sup>チ</sup>  
 黑色ノ粉末ナリ氣味共ニナシ○瘰癧性癩毒  
 性ノ皮病ニ殊效アリ○丸若クハ散トナシ用  
 ウ五爪ヨリ十爪至○諸酸及ビ酸化鹽ヲ忌ム  
 海綿炭<sup>ポスポンギア</sup>マ<sup>マリ</sup>ゲ<sup>ゲ</sup>ラ<sup>ラ</sup>ス<sup>ス</sup>○カ<sup>カ</sup>ル<sup>ル</sup>ボ<sup>ボ</sup>ス<sup>ス</sup>蘭

沃實<sup>コ</sup>涅<sup>ネ</sup>未<sup>ミ</sup>世<sup>セ</sup>ニ出<sup>デ</sup>ザ<sup>ル</sup>前<sup>ヘ</sup>ニテ以<sup>テ</sup>瘰癧腫ニ  
 稱用セリ蓋シ海綿ハ沃實涅ノ效ヲ孕ムノ外  
 更ニ炭質<sup>カ</sup>燐<sup>リン</sup>加<sup>カ</sup>爾<sup>ル</sup>幾<sup>キ</sup>ノ如<sup>ク</sup>キ<sup>キ</sup>一<sup>一</sup>二<sup>二</sup>ノ効分<sup>ハ</sup>有<sup>ル</sup>セ  
 サルニアラズ然ルニ沃實涅出テ後其稱漸ク  
 衰フルハ何ゾヤ○瘰癧腫ノ静脈瘤ヲ兼併ス  
 ルトナク又痛ナキ者ニ效アリ此病諸國共  
 多ク之レアル所ノ土病ニ獨和蘭ニ在テハ  
 見ルト太罕ナリ又腺病ノ症状ニ從テ其效却  
 テ沃實涅ニ優ルトアリ○耶爾辣鬼<sup>ヤール</sup>名<sup>ナ</sup>曾<sup>ソウ</sup>テ  
 脊骨ノ偏倚愈着ヲ療ス此病初メ肩胛疼痛シ

其後脊骨偏倚癒着ス此疽癰癩腫ヲ含併スル  
症トナシテ後方ヲ處ス其方爾海綿炭一錢

炭酸曹達半ニ夕右二味散トナシ朝夕ニ

服ス○癰癩腫ニ外用ス模蘭土名海綿炭名

砂熬鹽三味等分ノ孟僂設爾名敷名癰癩腫

ヲ消散スルノ效ヲ稱ス

木炭カルホヘギタヒリス羅名

輓近巴爾滿名達比私名同斯底賢宋名同必多私名加

夫篤名同輩木炭ヲ以テ内用ニ供ス就中達比私

ハカ弓ヨリ一弓至ヲ與ヘテ瀉下ノ效ヲ稱シ

斯底賢宋ハ保固強壯瀉下ノ效アリトシ小量

ニ與ヘテ制酸ノ貴藥トス又遷延ノ肺病及ビ

肝病ニ稱用ス殊ニ此病不潔ノ粘痰ヲ咯出ス

ルト過多ニメ勞熱ヲ兼併セル者ニ效アリ○

不潔ノ潰瘍殊ニ膿多キ者ニ外用ノ制酸止腐

ノ貴品タリ又濕性風癬不潔ノ齒齦及之ヲ

リ發スル口中ノ惡臭ニハ含香錠名ヲ用テ佳ク

チ名蘭名トナシ又磨齒散トナシ用井テ佳ク

リ○諸家ノ經驗ニ云奉那夫烏兒名ノ止血散

其效甚偉ナリ其方名松脂名亞刺比亞

其護謨半分 木炭末半分 石散トナシ 外

加爾录カ 亞扭麻里ルボ 里リ 蘭ラン

勿乙設カ 名始イセ 人テ之ヲシ 癌腫ニ用井テヨリ後諸

家モ亦多ク之ヲ稱用ス。或ハ驗アリ或ハ驗ナシ  
○此品ヲ製スルハ、犢肉ノ肋骨ヲ連ル者ヲ

哥喜多コヒト 嶮シ 茂兒マシ 哥喜カキ ヲ焙ヒ ニ入ル 燒テ煙焰器外

ニ出ルニ至リ。尚燔ク一八分時ノ一ニメ止ム  
○二ハ 三ハ 至ル 足ザル者ハ更ニ倍蓰シテ  
亞爾ア 答ダ 亞末ア 或ハ甘草末ヲ加ヘ散劑トナシ朝

夕ニ用井テ其量ヲ倍加ヌ○外用メ創傷ノ破潰メ瘡狀ニ變シ不潔ナル者ニ效アリ。又能ク惡液ヲ淨潔ス○加爾录亞扭麻里ハ分離機能ニ由テ效ヲ奏スル止腐ノ一良藥タリ。故ニ醫家多ク茲ニ注意メ供用スベシ

**補**

石炭アンタラシト 羅蘭アンラン 錢癬アンセン ニ稱用

方ヲ作リテ癩病ニ用ウ  
安答刺古加里アンダカカリ 或カ 硫リウ 化カ 安答刺アンダカ



金硫黄三瓜子煖製麻楝溼矢垂或甘草末  
 右三味調勻三色トナシ。一晝夜ニ用并盡ス  
 ○此方ヲ用ウルト數日ニ至レバ。全身或ハ  
 一部ニ抗拒カラ發ス。此ニ至リテ其効ヲ見  
 ル。波禮亞ノ説ニ云。此方ハ安荅刺古加里  
 以テ血中ノ癩毒ヲ制シ。安質母尼ヲ以テ血  
 中ノ癩毒ヲ伏ス。盖此二毒相合。癩病ノ元  
 因トナレバナリ。○波禮亞ノ説ニ云。大凡慢  
 性ノ瘡疹諸病ハ皆錢癩ノ属ナリ。之ヲ單複  
 二種ニ別チ。其外貌ニ從フテ。又小疹状水泡

状ホイトト状鱗屑状潰瘍状ノ目ニ分ツ。其  
 單ナル者ハ深ク器成機中ニ盤根シタル。其  
 異ト德斯加羅舍ノ液病ニ稱ス。一種アリ。一ガ  
 志ト云。其德斯加羅舍ノ病。血中ニ稱ス。一ガ  
 病。痛風等ノ如ク病毒血中ニ稱ス。一ガ  
 調和常ヲ失フ。血質稠厚ト稱ス。一ガ  
 經病ノ属ヲ失フ。血質稠厚ト稱ス。一ガ  
 不遂。癩癰。播毒。癩癰等ノ病。血中ニ稱ス。  
 ト稱ス。癩癰。播毒。癩癰等ノ病。血中ニ稱ス。  
 者。其因。補給。消食。外服。養機。傾。其。變。異。  
 其。實。關。係。補。給。消。食。外。服。養。機。傾。其。變。異。  
 過。其。質。關。係。補。給。消。食。外。服。養。機。傾。其。變。異。  
 英。古。種。病。結。石。病。性。粘。液。出。消。疔。疾。出。血。  
 用。炭。素。大。過。病。病。慢。天。况。爾。倍。苦。疔。疾。出。血。  
 病。肝。臟。硬。腫。胆。結。石。萎。黃。病。消。毒。病。血。瘡。病。青

皮膚科諸病  
 卷之十一  
 十一

色病。慢性血。王。供皮表。發。以其複。九。者。  
 他。德斯。加。羅。會。癩。毒。相。合。力。故。疥。  
 瘡。性。癩。毒。性。癩。病。性。丹。毒。性。癩。腫。性。等。錢。癩。  
 丁。月。○。又。云。安。答。刺。古。加。里。錢。癩。妙。效。藥。  
 於。明。猶。硫。黃。疥。瘡。於。水。銀。其。癩。毒。於。  
 安。質。母。尼。癩。病。於。水。實。癩。癩。腫。  
 於。如。如。安。答。刺。古。加。里。炭。癩。腐。蝕。  
 加。里。如。如。安。答。刺。古。加。里。炭。癩。腐。蝕。  
 新。製。腐。蝕。加。里。炭。癩。腐。蝕。者。者。者。者。  
 溶。化。者。難。以。易。者。黑。色。者。者。者。者。其。

右。五。味。火。上。七。攪。拌。之。熨。乾。シ。火。下。  
 シ。温。乳。鉢。ニ。入。レ。研。末。シ。一。勺。量。ヲ。溶。ル。ヘ。キ。  
 小。玻。璃。瓶。ヲ。温。メ。安。答。刺。古。加。里。ヲ。入。レ。固。封。  
 シ。燥。地。ニ。貯。フ。○。硫。化。安。答。刺。古。加。里。ハ。上。方。  
 ニ。硫。黃。花。半。勺。ヲ。加。ヘ。褐。色。ノ。炭。末。ト。ナ。ス。製。  
 法。ハ。前。ニ。同。シ。○。安。答。刺。古。加。里。ハ。其。質。軟。キ。  
 メ。黒。色。ノ。粉。末。ナリ。其。味。苛。烈。ニ。メ。加。里。ノ。如。  
 ク。舌。上。燻。ガ。如。キ。ヲ。覺。ベ。能。ク。氣。中。ノ。水。氣。ヲ。  
 引。ク。然。レ。溶。流。ス。ル。ニ。至。ラ。ズ。再。ビ。乾。燥。氣。中。  
 ニ。移。セ。バ。其。水。氣。乾。キ。加。里。味。モ。亦。從。テ。失。

本草綱目卷之...

ス○亞爾箇兒ニハ溶カ難ク蒸餾水ニハ能ク溶化ス○精製安答刺古加里ハ水ニ投シテ之ヲ試ミルニ善ク和シテ水皆黒色トナル之ヲ蒸餾スルモ黒色尚存ス其製精ナラサル者ハ否ラス○健康ノ人ニハ食料ニ日三羹汁ト定メ安答刺古加里トハ五時中ニ用井盡セバ血液大ニ皮表ニ流レテ肌膚灼熱シ脉行速ニメ身体怠惰夜ニ及ンテ大汗淋漓淋シテ晨ニ徹シ翌日ニ至テ大ニ瀉スルト兩回二日ヲ經テ皮膚尚潤フ○慢性

皮膚ヲ患ヒテ消食機良ナル者ニハ左ノ方ヲ與ルカ  
安答刺古加里 甘草末五分  
右ニ味混和シ包トナシ毎服一包日ニ三次或ハ四次○此散ヲ服メ即夜已ニ脉實速トナリ全身發汗シ皮膚燔カ如キヲ覺フル者下火或ハ五日或ハ七日或ハ十四日或ハ二十日ニ至リテ此諸症ヲ發スル者アリ其甚キニ至リテハ三十日ニ發スル者アリ其汗多クハ温ニメ冷テ其初ハ時々發

本草綱目卷之十一  
皮膚病

歌終ニハ每夜發汗ハ晨ニ達シ微モ虚脱  
疲勞ハ徵ナク患者及テ健康ナルヲ覺ル  
○此發汗止シテ後モ尚一部ニ冷汗或ハ温  
汗ヲ發ス其部位ハ長短多少ハ始メテ一  
定ナク或ハ瘡瘍アル部ニ於テ或ハ腋下  
或ハ手或ハ脚或ハ尻或ハ陰部  
於テハ病毒全ク盡ルニ至リテ止ム此發汗  
ハ即藥ヲ普達シ微ナリ○又夜間始テ發汗  
スル時忽チ癩色廣大トナリ病毒ハ分離増  
盛シ皮膚痒クシテ更ニ新癩ヲ發シ或ハ麻

子疹ヲ發シ疥瘡性ノ者ハ疥性丹毒ヲ發ス  
ル者アリ○此局部ノ抗拒ハ其長短一定ナ  
ラズト雖漸々ニ夜痒減シ赤色消シ病毒ハ  
分離モ亦隨テ減シ單性ニ錢癩著ク輕快  
ス但此二様ノ發汗ハ熱ヲ發セザルヲ以テ  
癩毒ヲ掃除セザル能ハズ○病毒掃盡ノ抗  
拒力ハ必ス熱ヲ兼發ス此熱ヲ發シ令ルニ  
ハ安谷刺古加里ヲ長用シ藥力器成機中ニ  
飽滿シ發汗間断ナキニ至ルニ至ルニ初  
ノ發汗強按無熱發汗ハ藥力器成機ニ感スル尋常

馬己藥生論  
卷十

ノ抗拒ニノ後ノ發汗強發汗有一藥力ニ由テ  
發スル一異抗拒ナリ。此發汗、有熱ヲ以テ  
一異抗拒ノ正徴トナス。○此發熱汗、間ニ  
癰ノ景狀一旦惡候ヲ呈シ、諸症蜂起スルモ、  
熱去リテ後、患者ノ容貌大ニ佳トナリ、漸々  
全癒ニ至ルナリ。愚羅園名曰此惡候ハ藥力  
效ヲ呈シ、癰病全癒ニ向テ  
確徴 ○全身ノ抗拒大過ナル者、直ニ後  
服ヲ停メ、消石ヲ用井テ、其大過ヲ制スヘシ  
否ラザル者ハ休止スヘカラス。○消食機ハ  
唯抗拒發動ノ時、違和スト雖モ、其他ハ

始終害ヲ受ルナシ。○牀至倫次アハラ以  
テ、抗拒結局ノ徴トナシ、德斯加羅志ノ快復  
ヲ以テ、抗拒ノ操作十分ノ徴トス。○硫化安  
答刺古加里ハ、尋常ノ者ヨリ其效速ナリト  
雖、尋常ノ者ヲ良トス、何者其效速ナル者ハ  
根治ニ至リ難ク、其效徐ナル者ハ治癒至  
切實ナレバナリ。○大凡安答刺古加里ヲ服  
スル患者、其攝生食養宜ヲ得ルハ、少壯者  
ハ半年左右ニメ全治ヲ得、四十歳以上者  
ハ一二年内ニメ全癒ニ至ルベシ。○安答刺

萬應生論

卷一

古加里ノ療法ハ此如ク日ヲ積ミ月ヲ費  
スニ非レハ全切ヲ収メサレテ以テ其効著  
ク目指スルヲ能ハス恐クハ其効ハ緩慢ナ  
ルヲ以テ古昔ヨリ此病ニ稱用セシ諸藥ノ  
如ク是モ亦忽チ蔑視メ效ナシトスル者  
ル者アラン迷テ以テ廢棄スルヲ勿ル  
○石炭油オレウムニテアラン迷テ以テ廢棄スルヲ勿ル  
兒實チイ幾イ醫事日札ニ曰ク吾レ早ク名ヲ曰ク予レ二十年来  
石炭油ノ效ヲ知リテ醫用ニ供シ偉效ヲ得  
ルヲ百ニメ足ラズ故ニ之ヲ世ニ公セント

欲ス○痛風發歇アリテ遂ニ結節腫ヲナシ  
及ヒ骨節癒着スル者ニ石炭油ヲ用ウレバ  
其效世ニ痛風ノ奇藥ト稱スル諸劑及ビ温  
泉等ニ優ルヲ遠シ○痛風ノ為ニ生スル分  
泌液稍結石状ヲナシ病症ノ發歇及ヒ焮腫  
等全クナキ者ニハ其效微ナリ然レモ其効ナキ  
者亦アルヲナシ故ニ之ヲ用ウレバ縦令十  
分ノ效ヲ見サルモ必ス身体ノ榮養ヲ良ニ  
ス予頃者一患者ヲミルニ兩腕榮瘦ニ身體衰  
弱ニ飲食消化セズ石炭油丸ヲ用井テ其諸

醫藥生論 卷十

患大ニ寛快セリ。是其證ナリ。○痛風ノ景況  
大ニ慢性。痺麻質私ニ近似。尚具骨節焮腫  
シ。兼テ石灰質ノ物ヲ分泌スルニ用弁テ太  
偉效ヲ奏ス。方

石炭油

生安質母尼

鵝栗拔奴謨

蜀羊泉莖末

右四味調勻。二合ヲ一丸トナシ。甘草末ヲ衣  
トシ。每次一丸ヲ服スル。一日ニ  
三次。○石炭油ハ服後即效ヲ奏スル。少シ  
此丸ヲ用ウル。通常八日ヨリ十四日ニ

食氣旺シ。直ニ身体佳適ヲ覺フ。時トメハ上  
圍ノ度ヲ増ス。アリ。又下利スル。モ亦稀  
ニ之アリ。然レ便秘ノ辟アル者ハ。時々下劑  
ヲ加フヘシ。○強壯多血ニ。常ニ刺絡ニ慣  
レ。中風ノ恐アル者。此藥ヲ用ウル。大凡  
周ノ後刺絡メ。三茶碗ノ血ヲ瀉シテ可ナリ。  
○石炭油ハ熱性ノ者ノ如シト雖熱セス汗  
セス。又下スル。ナシ。故ニ刺衝大過ノ人ハ  
雖能ク此丸ヲ服用スル。得。俱時アリ。○  
此丸ヲ服ス

大正十一年  
醫學博士  
生安質母尼

ル初メ。石炭油味ヲ嚙出スル者アリ○石炭油ヲ用ウル長短ハ病ノ輕重新舊ニ從フ。縱令服用短キモ一季三個月過サレバ久遠ノ效ヲ見ルナシ。故ニ予多クハ長服セシメテ半年ヨリ一年ニ及フ○痛風ノ患者大ニ衰弱セル者此丸ヲ長用メ全治セハ年月ヲ經ルノ後又必ス此丸ヲ再服スベシ○骨節癒着スル者ニ毎日一回ツ、石炭油ヲ其部ニ塗擦スレバ内藥ノ效ヲ助ルナシ尤多シ○石炭油ヲ外敷スレバ全身少ク臭氣アリ

小疹ヲ發メ搔痒甚ク一二日ヲ經テ白屑ヲナス丸劑トシ内服スレバ絶テ此疹ヲ發スルノ患ナシ○飲食ハ常ニ酸味ノ品ヲ減シ薰烟肉鹽藏肉酪等ヲ禁ス○方今吾朋石炭油ヲ用井テ得ル所ノ效ヲ比較スルニ皆吾説ニ吻合ス故ニ予ハ上説ノ諸症ニ石炭油ノ效アルヲ猶幾那ノ間歇熱ニ於ルト異ナルヲナシトス

沃實ケル子○ヨ子五ハ羅  
千八百十三年哥烏而篤私初メテ華列私

本草綱目

卷一

十七



曹達 彊按亞愚論人蘭地列名字書論曰華列私  
 諸種 海草ヨリ得ル者華列私曹達中ノ最粗  
 巴里 斯書ノ醫哥烏而爲乙斯名曹達製餘ノ華  
 列私 母油ノ桶ヲ腐蝕スル物ヲ加フ非常ニ紫騰  
 起ス 其相此母油ヲ凝結シ一ル物ハ正海綿ニ由テ發  
 明セリ 又曰沃陳ハ凝結シ一ル物ハ正海綿ニ由テ發  
 海草 中量ヲ含ムトニ得シ元素ナリ 其色  
 灰黒ニメ石墨ノ如キ小片ナリ 亞的兒再留火  
 酒ニ能ク溶化ス 温ヲ得レハ紫色ノ彩烟ヲ發  
 ス ○弦歌 蘇亦齊極ノ醫 吳應多名初テ沃實涅  
 ヲ試用シ 瘰癧腫 其他腺ノ硬腫 乃耳腺腫 乳核

畢丸腫等々如キニ奇驗ヲ見 諸厄利亞醫  
 卵巢腺腫 子宮口腺腫ニ用井テ著效ヲ得タリ  
 爾來諸家又其說ニ據リテ歷驗セシニ皆效ア  
 リト云 ○右諸家ノ試驗ニ由テ考 大約  
 沃實涅、患者尚壯年ニメ病未久ヲ經ザル者  
 三ノ用井テ效アリ ○其後又革仁名露吳兒  
 名ノ輩之ヲ腺病ニ用ウ 然レ氏此症ニ之ヲ用  
 ウルハ切ニ慎戒ヲ加フベシ 患者若シ刺戟ハ  
 景況 嫩衝シ諸症 熱病 大衰弱等ニ見  
 用ウルヲ勿レ ○輓近致慢性 扁桃腺腫 咽

只馬記極生論  
 卷十

腫及咽喉内後面ノ經久潰瘍已ハ瀕劑ヲ用  
并テ治セサル者殊ニ流涎等ニ内外試用ノ始  
ト一種ノ妙效アリト稱ス但其外用ハ含漱劑  
トナシ用ウ○又云沃實涅ハ通經ノ效アリ  
或云效ナシト若其通經ノ效ヲ試シト欲セバ  
唯子宮ノ官能遲急萎衰セルニ因テ發スル經  
閉ニノミ用ウベシ○沃實涅ヲ内用スルニハ  
何ノ病ヲ論セズ必ス小心ナランコトヲ要ス何者  
若シ大量ニ之ヲ用ウルカ或ハ長服セシムル  
片ハ食道及ヒ胃ニ大焮衝ヲ發シ尋テ劇性ノ

神經症ヲ併發ス間又肺勞大羸瘦等ヲ致スノ  
原由トナレバナリ○大約焮衝ノ症狀アル者  
血管ノ刺衝機大過ノ者神經ノ刺衝機大過ノ  
者泄瀉胃虛ノ者胃痛疝痛ノ癖ヲ有ス者諸失血  
殊ニ肺血子宮血ノ恐アル者勞瘵ヲ病ノル者  
勞瘵ノ素質アル者及ヒ妊娠等ニハ共ニ沃實  
涅ヲ用井テ害アリ○丸若クハ亞爾箇兒溶液  
トナシ用ウ每服八分ハヨリ一瓜至日ニ二次  
外用ハ軟膏タル若クハ浴湯タルハ浴湯  
ハ敝度里屋タル私剝タル篤タル亞タル私タル劑タル沃實涅製ヲ用ウル

ヲ佳トス  
 補 彊按本文沃實涅ノ藥害ヲ論スルノ遺  
 漏ナシト雖其文約ナルヲ以テ或ハ草々者  
 過スル者アラシクテ恐ル故ニ依百乙藥性  
 論中ノ文ヲ抄出メ以テ藥害ノ忽ニスルカ  
 ヲ示ス○増補依百乙藥性論ニ曰沃  
 陳ハ較カメ藥品外猶他況然  
 通用スベカラザル性アリテ動モスレハ藥  
 害ヲ生ス故ニ之ヲ用井レト欲スル醫ハ此  
 ニ注意セズンバアルベカラス○沃陳ノ藥

害ハ便秘下利胃痛嘔吐疝痛腸胃良道胸臈  
 等ノ激衝等ヲ發シ爾後卒然トメ身羸瘦シ  
 婦女ハ乳房萎縮シ又神志鬱悶氣力倦怠ヲ  
 覺フ但シ鬱悶倦怠等ノ諸症ハ沃陳良效ヲ  
 奏スル時ト雖亦微々之ヲ發ス筋神經ノ感  
 動ハ麻酔藥ニ異ナラズ是ニ由テ之ヲ觀レ  
 バ沃陳ノ用ウヘキ所ト用ウヘカラザル所  
 トハ自ラ了然タルヘシ  
 ○沃實涅丁幾トハチンキチンキ羅ラ  
 燒酒者一十五度此劑久シク貯フベカラ

天壽記藥性論

卷十

バ、久ヲ經レバ速ニ分析ス。○丁幾二十滴中、沃  
實溼一瓜ヲ含ム。大人ハ每服十滴日ニ二三  
白糖湯一盞ニ和シ服ス。漸ク加ヘテ二十滴ニ  
至ルベシ。

○澈度里屋柁私剝篤亞私水  
蒸餾水一匁

右溶和ス。是ヲ澈度里屋柁私剝篤亞私水ト名

○澈度里屋柁私剝篤亞私軟膏  
ユレグエン  
スボトア

ク其效沃實溼丁幾ニ同シ

家猪脂半匁  
右ニ味○此膏少許ヲ取テ

朝夕瘰癧腫及ヒ腺ノ硬腫ニ塗擦ス。或ハ又緩

和ノ琶布ヲ貼スルヤリ○腺腫硬結ノ疼痛

アル者ハ水蛭ヲ貼シテ後此膏ヲ用ツルハ確

驗ヲ得ルヤリ

○瓦私篤魯澈度里屋柁私剝篤亞私軟膏  
ガストロ  
勝レリトス  
澈度里屋柁私剝篤亞私  
精製沃實溼  
溶化シ温處ニ置ク  
十二時ニメ家猪脂適宜

天壽記  
卷一

ヲ加へ、軟膏ノ稠トナス。○朝夕一、ヨリ半錢  
 ヲ取リ、硬結腺上ニ塗擦ス。○諸種ノ劑ヲ造  
 ○沃實涅鍊イオロニ燃シシ、必爾ニ窟英ノ名ノ之ヲ白  
 帶下ニ用井テ、其效諸藥ニ魁々リト云。又經閉  
 病、黃胖病、癭癰腫等ニ效アリ。○諸種ノ劑ヲ造  
 リテ之ヲ用ウ。浴湯ハ半ヲヨリ漸々加へテ二  
 三ニ至ル。灌腸注射、洗滌諸劑ハ四錢ヲ以テ水  
 二比ニ溶化ス。又叔格刺度トナシ用ウ。其方百  
 十五ハヲ以テ華ニ尼ニ利ニ叔ニ格ニ刺ニ度ニトナシ用ウ。其方百  
 初半ハ盞ヲヨリ後一盞ヲ服ス。疆ノ按設墨兒撈環

日、叔格刺度ハ芳香ノ諸藥ヲ配合ス。叔格刺度ハ  
 其方葛ノ華ノ實ノ箇ノ白ノ糖ノ半ノ比ノ合ノ埋ノ加ノ料ノ  
 適宜ノ右ノ七ノ味ノヲ以テ造ル。胃虚冷肺病ノ幾多  
 ナキ者ニハ叔格刺度ノ能ク胸ノヲ和シ、痰ノヲ咯ス。西  
 皇國ノ煎茶ヲ又丁ノ幾トナシ用ウ。其方アリ。  
 一ハ二錢ヲ以テ亞爾筒兒ニ弓ト水酒各半ノ  
 者ニ弓ニ溶化ス。一ハ四錢ヲ以テ勃爾ノ沽ノ吉ノ  
 斯酒ノ疆ノ按ノ勃ノ爾ノ沽ノ吉ノ酒ヲ出ス。一比ニ溶化ス。  
 二方共ニ大人ノ朝夕一食匙ヲ用ウ。  
 ○普洛多乙沃實列本母協度羅爾業利水銀

○德烏多乙沃實列去母協度羅爾業利

水銀

ノ條ニ出ツ

**補** 沃陳イオゲム ストム 羅ク ヲラ 製スル 法

沃陳ハ華列私灰ヲ淋洗シ其淋液中ニアル

所ノ結晶鹽ヲ去リ殘渣結芒セサルニ至リ

熬乾シ大盃中ニテ硫酸半量ヲ和シ初メ微

火ニ煮テ鹽酸瓦斯硫化水素瓦斯ヲ蒸散シ

鉛ヲ盛リタル列多兒篤ニ入レ蒸餾ス但通

常ハ黑酸化滿菴半量ヲ加ヘ蒸餾ス○曹別

蘭名ハ此母滴ニ硫酸銅一分硫酸鉄一分ト

四分ノ一ノ溶液ヲ加ヘテ沃陳銅トナシテ

沈殿セシメ硫酸ト黑酸化滿菴ヲ以テ之ヲ

蒸餾ス○沃陳ハ紫烟トナリテ蒸騰シ列多

兒篤ノ冷所ニ至リテ凝着ス之ヲ無膠紙間

ニ洗ヒ絞リ再升華メ精品トナシ緊口壺ニ

固封シ貯フ○華列斯ノ結芒セサル者ハ蘇

魯林硫黄沃陳 ス三金ヲ含ム緩火ノ微温ト

硫酸ノ和合ニ由テ鹽酸瓦斯硫化水素瓦斯

ノ一分ヲ發ス武火ニ煮ルト硫酸過量ヲ加

フルトニ由テ水素沃陳酸ヲ生ス此酸硫酸

沃陳酸ノ製法

卷十

二十三

二會フテ水素ヲ離析シ。沃陳及ニ亜硫酸ヲ  
 遊離ス。此時ニ方リテ亦沃陳ヲ含ム水素沃  
 陳<sup>ダ</sup>酸<sup>ゴ</sup>ヨ<sup>ム</sup>ホ<sup>ウ</sup>ウ<sup>デ</sup>ン<sup>ド</sup>。ア<sup>シ</sup>ヲ<sup>シ</sup>生<sup>ス</sup>ル<sup>ヲ</sup>以  
 テ。要品ノ耗失スル者少ナカラストス。○酸  
 化滿菴ヲ加フレバ。水素沃陳酸ノ水素ト黒  
 酸化滿菴ノ酸素ト相和メ水トナル器中ニ  
 アル所ノ沃陳悉ク遊離ス。○既ニ分析シタ  
 ル沃陳<sup>金</sup>ニ。稜<sup>魯</sup>林<sup>金</sup>ノ抱合ナキ時ハ。滿菴  
 シ<sup>ラ</sup>加<sup>フル</sup>ヲ<sup>毎</sup>ニ<sup>必</sup>利<sup>アリ</sup>ト<sup>ス</sup>。○硫酸ハ。板  
 支<sup>ス</sup>ト<sup>相</sup>和<sup>メ</sup>硫酸鹽トナル。○硫酸鉄硫酸

銅ノ合藥ヲ以テ母滴ヲ分析スレバ。溶解ス  
 ヘカラザル純沃陳銅ヲ生ス。其液ハ硫酸鉄  
 ヲ含ム。滿菴ハ熱度盛ナルニ至リテ沃陳銅  
 ヲ分析ス。故ニ器中ニアル所ノ硫酸<sup>和</sup>メ  
 復硫酸銅トナル。○沃陳ハ常度ノ温ニアリ  
 テハ。凝固メ鑛光アル黒灰色ノ葉片ヲナシ。  
 醋酸或ハ冰素沃度酸ニ溶解スル。稠厚ナ  
 シ。寸長ノ正方ハ面ニ。銳角アル芒<sup>ヲ</sup>結  
 ノ。強<sup>按</sup>。舍<sup>密</sup>開<sup>宗</sup>。卷<sup>六</sup>。晶<sup>晶</sup>。沃<sup>陳</sup>ハ。軟<sup>ニ</sup>。指  
 ニ<sup>テ</sup>。形<sup>圖</sup>。紫<sup>紫</sup>。其<sup>異</sup>。重<sup>心</sup>。兩<sup>又</sup>。九<sup>八</sup>。四<sup>ナ</sup>リ。○

沃陳記  
 卷六  
 晶晶

沃陳ハ列氏驗温器ハ十四度ニ溶流シ、百四十度ニ至リテ美紫烟トナリテ飛散ス。越列幾ヲ導カズ。臭氣蘊魯林ノ如クニメ緩味辣ナリ。○植物ノ色ヲ變スルヲ其微ナリ多ク褐色ヲナスモ、眼ヲ過ルルニ忍テ視ス。澱粉ハ縹色ニ變ス。燐ニ觸ルレバ青焰ヲ發メ燃ユ。○水十分ニ溶解シ、少量ノ火酒。亜的兒ニモ亦溶解ス。○沃陳ノ偽品ハ碎砂石墨生安質母尼石炭末等ヲ混ス。此等ハ皆亞爾箇兒ニ溶解セズメ、器底ニ沈ムヲ以テ其姦ヲ知

ルベシ  
 ○水素沃陳酸 アアシヂム、ヒドロヨヂキム  
 沃陳ハ大ニ水素ト親和ス。故ニ水素ト抱合スル諸物ハ、皆是カ為ニ分析セラレテ、水素沃陳酸トナル。○水素沃陳酸ハ燐素一分沃陳十六分ヲ合シ、硝子碎末ノ水ニ蘸シタル者ヲ以テ、其上ヲ被ヒ、ア子ウマチス器中ニテ熱スレ、瓦斯ヲ釀生ス。之ヲ頭上ニ受容スルニ由テ得ルナリ。又沃陳ト水氣ナキ水

沃陳ノ製法  
 沃陳ノ製法



素磷等分ヲ温メ之ヲ得其瓦斯ヲ受ルル前  
 法ニ異ナラズ○此酸ハ無色ノ瓦斯ナリ氣  
 鹽酸ノ如ク呼吸ニ害アリ勒法母斯染紙ヲ  
 赤色ニ變ス其異重ハ四又三四零ニナリ熾  
 熱ニテハ分析ス蒲羅密烏母斯魯林烏母  
二金共ニ含密開宗卷十一此酸ハ水素ヲ奪  
五、新金屬ノ部ニ出リステ水素蒲羅密烏母酸水素斯魯利烏母酸  
 トナリテ沃陳ハ游離孤立ス其他硫酸硝酸  
 モ亦此酸ヲ分析ス○第二酸化鋳鹽モ亦能  
 ク之ヲ分析メ水ヲ生シ沃陳ヲ游離メ硝酸

ハ亜硝酸ニ變シ硫酸ハ亜硫酸ニ變シ第二  
 酸化鋳ハ第一酸化鋳ニ變ス○此酸ハ金屬  
 ト合メ沃陳金ヲ生スルニ方リテ水素ハ離  
 析ス○彪扒南彪扒南ハガラスゴウ思可齊思可齊ハ  
 病院ニ在リテ沃陳剥多亞斯三百三十倍  
 酒石酸五百六十四倍ハ合藥ヲ以テ常法ニ  
 從順其水ヲ錢ニ沃陳五滴ヲ含ム者ヲ加ヘ  
 ツ水製シテ水素沃陳酸ヲ用テ其說云  
 沃陳胃ニ入リ必ク水素沃陳酸ニ變ス然レ  
 其變化ハ時ノ景況ニ由テ必ク同シキ事能ハ

天馬山先生論  
 卷十一  
 五十六

夫沃陳胃ニ合レバ其喜ブ所メ水素ヲ胃  
 液ヨリ取りテ抱合シ。飲食消化ノ間胃液自  
 ラ水素ノ一部ヲ離析シ胃質ヲ護シ沃陳ノ  
 腐蝕毒ヲ防テナリ。故ニ沃陳胃ニ合リテ沃  
 陳酸ヲ造ルノ變ヲ生スル事ナシ。沃陳酸ヲ  
 用ルルヲ良トス。何者胃中ニ其之ヲ造ルハ  
 容易ナラザルヲ以テナリ。○彪松南又云世  
 ニ沃陳ノ效トナス所ノ者ハ沃陳ニアラス  
 メ沃陳酸ノ效ナリ。然レ此酸ヲ製スル尋常  
 ノ法ハ其装置重大ニメ且酸力ノ強弱モ一

様ナルト能ハザルヲ以テ善美トセ。○彪  
 松南ノ沃陳酸ハ初數滴ヲ日服シ。漸々増  
 テ一劑中ニ沃陳十五ハヲ含ム者ヲ用井終  
 ニ毎服半ヲ日ニ三次ニ及フ。此ニ至リテ  
 日ノ量沃陳一錢ヲ含ム。○純厚ノ水素沃陳  
 酸ハ水或送藥ニ加ヘ用ウ。彪松南ハ澱粉溶  
 液ヲ撰ンテ送藥トナス。其說ニ云酸中ニア  
 ル所ノ游離沃陳澱粉ニ和メ沃陳乳トナリ  
 テ效ヲナス。○敞度里屋托斯剥多亞私アヨギムエンボト

二八  
 醫學  
 卷十

法  
去ム。ホドリアシ。カシム。ヨダ。五ヲ製スル

○敝度里屋陀斯剥多亞私一名沃陳剥多亞  
母ト云單炭酸剥多亞斯ト流動水素沃陳酸  
トヲ合シ中和鹽液トナシ之ヲ結芒シ或ハ  
熬乾スルモノナリ其法ハ佛蘭西國ノ新局  
方ニ載スル拔字府名ノ法ヲ良トス其法沃  
陳一分水三四分ヲ以テ溶解シ沃陳半量ハ  
鍍屑ニ合スレバ甚シク熱沸ス製藥ノ量大  
ナルトキハ此熱沸尤甚キヲ以テ其量ニ應

セザル大盃ヲ用ウベシ此熱沸ノ時沃陳飛  
散スルヲ以テ一頓ニ混スルヲナク漸  
少許々加ヘテ以テ其飛散ヲ防クベシ此  
法ハ酸化鍍ヲ分析スルニ多量ノ炭酸剥多  
亞斯ヲ必用トス故ニ此液ヲ試ミテ加里尚  
多キ徴ヲミハ水素沃陳酸ヲ以テ之ヲ中和  
スベシ或ハ亞爾箇兒ヲ以テ熬鹽ヲ精製シ  
テ過劑ノ剥多亞斯ヲ去ルモ亦良トス  
氏餘考ノ第三卷ニ依リ沃陳剥多亞私  
熬鹽ヲ火酒ニ溶化シ過劑ノ剥多亞私  
能ハ酒ニ溶器底ニ過劑ノ剥多亞私

本草綱目卷之...

...

依シテ法ルノ如ク火酒ヲ蒸○字漏生國新局方  
 二載スル所ノ法ハ新製腐蝕加里酒ノ絶テ  
 炭酸ナキ者ヲ微温シ漸々沃陳ヲ加ヘテ液  
 色復消褪セス漸々淡赭色トナリ加里ノ微  
 復試藥ニ現レサレニ至リ蒸散結芒セシム  
 此芒鹽ニ即沃陳酸剥多亞私ナリ之ヲ熾燥  
 又酸素絶テ出ガレニ至ル其殘鹵モ亦蒸乾  
 熾燥メ酸素游離セガレニ至リ二鹽ヲ合シ  
 熬乾シ緩々ニ熾メ泡起シ盡シ輕々ニ溶流  
 スルニ至リ酸ヲ加ヘ試シテ復褐色トナリ

ザルヲ見熱ニ乗メ水ニ溶和シ濾過シ緩  
 ニ蒸散結芒セシム○此鹽ハ白色ニメ  
 アリ瑩亮ニメ正方形ノ芒ナリ味ハ鹹辣  
 ニメ食鹽ノ如ク赤熾メ溶流シ放冷  
 真珠色ノ晶塊トナリ白熾スレバ分析セズ  
 ×蒸散ス○純硫酸純硝酸蘇魯利烏母蒲魯  
 密烏母ハ之ヲ分析メ沃陳ヲ分離ス大氣ニ  
 會フテ變セズ甚キ濕氣ニハ溶流シ水三分  
 ハ二ニハ大氣ノ常温ニテ溶解シ火酒ニ  
 甚メ溶ケ易シ強按沃陳ハ新出ノ金屬

本草綱目卷之...

...

本草綱目卷之...

卷之...

分○=粘ル溶和○叟ハ剥離ヲ沃此ノトニラ  
 追水壘溶濁シ液シ核母ガ多折混陳液水ナ剥レ  
 振ニ爾シ液ナ純宇ノ變亞メカ酸ヲニル多テ  
 蕩十浴テヲ分慮精府製メ斯沃ル剥蒸ア○亜其  
 シ分杜以濾ニ過鏡砂法食ト度ヲ多散ラ沃斯酸  
 瀝ヲ石ハテ過至シ屑ノ尚鹽ナ剥以亞シザ陳ト素  
 過加ノ芒シリ水半分ハアナ下亜一先量ガ剥和素  
 メハ法ヲテテ少分ハアリル尚叟田自減溶多ス沃  
 半テハ結煎半許ヲ少陳カ蘓母鎔ラス化亜ル陳  
 炭火沃ハ熬炭ヲ少許一カ魯一流結ルス斯所  
 酸ヲ陳シ乾酸加許一分シ林名爍芒ニルハノ幾  
 剥温四ム固剥ヘツ分○曹敝熾ス至下二種ト  
 多ノ分シ多テ、ニ沃達度ス此レ能三種ト  
 亞液ニ再亞稀加水度ヲ里芒バハ又ノ相  
 斯色純固斯薄ハ三剥溶屋ハ尚多ス四沃種  
 溶根鏡鹽ヲ加シシ分多爍酸他量故五陳シ  
 液去屑ヲ煮其ラ亞ハ類素鹽ノ三分酸共

陳酸斯一リ失方溶ニ化此レヲ融○○ノ毋尚者  
 ノトニヲテスリ液沃メ時バ着加カ敬參斯未多  
 幾ナ含沃ニ○テヲ陳鹽上白ルリ度考獨足シ故  
 分リハ度鹽餘鹽煎酸塊液鹽ヲ瀝コ里ニ爾以ハ  
 ト酸所剥ヲ考塊熬剥トヲ結見中ダ屋便弗トニ  
 相素ノ多生逆乾多ナ分芒則沃ム斯○剥密  
 和ヲ酸亞、沃飛固亞シチス之之陳○剥密  
 離素叟一陳シス斯玻取之ヲカ多ト密ニ里  
 或レ幾母ヲノテルヲ璃リヲヲカ多ト密ニ里  
 云タルヲ云陳融ヒア取ニ熬陳メ和ヒ私ス説重  
 中剥奪○酸如スリス固乾酸此シド司ヲ複説  
 ノ多取沃剥里レトル封固剥滴加リド註ヲヲ  
 水亜メ陳多ニハ雖下シシ多液里才ホシ厭補  
 分叟和ハ亜溶鹽其ナ貯固亞ヲ油ジト以ハ入  
 母メ剥斯ハ量煎直一ヲト蒸微キアテハス  
 析ハ沃多トニヲ熬直ニ法爍云ス色腐ハ初隆

本草綱目卷之...

三十

本草綱目卷之...

液ニサベノ能面ヲ溶度母ト硫新製ヲ鹽リ  
之中沃ルシ沃ク柱溶化ニハウメ化ハス稱ハテ  
ヲニ陳ガ何陳火芒カシ至晶凶剝或ベ贊色慮  
加溶ヲ故者酸酒ヲス易レ状トル多ハキス純過  
留レ加ナ沃剝ニ結此シバラ名五亜水ヲ何白シ  
母所フリ陳多溶フノ百飛ナクレ素以者ナ重  
沃ノレ○酸亜ク其如分散シ○左ト硫ヲ鹽リ湯  
度沃バ此剝斯故芒キノス真燦ハ硫酸ナ色合煎  
好陳液鹽多此ニ少醇水火珠鎔ガ化剝リ純藥ニ  
皆色ヲ亜法此モ厚能氣色シト水多澈白日ヲ  
剝變水斯ヲ鹽結溶クニノタア素亜度ニ録煎  
ト多メニハ以中晶液百會光ルシノ斯溶メ儲熬  
アニ點溶火テニ水ナ四フ澤沃ニ和ナ質且ノ乾  
ニ雙褐シ酒全殘ヲレ十テア度ト合リ温大作固  
ト母色其ニク留含ハ三濕リ剝トシト酸小者ス  
云トト溶溶精スマ直分ニ熱多シタ云剝隨ハ  
上相ナ液和製ルズ角ノ水ノ並ルル或多慮七鳥  
法和リ中セス所又四鹽ニ極變ニ者ハ並ニ去ノ

頗ハ取セ質加溶水○溶沃且ニヲ多瀝加  
ハ此用煎リサ温フ質器器燦陳瀝加加亞過ハ最  
ニ度法ウ熬蒸ル酸ニ温ニ德スノ過フヘ斯メ最  
溶洛ヲ然乾餾ニ剝ハ酸十依ル一洗ルテ蒸後  
液質改氏固ト至多液剝度ハ時分滌剝飽量發ニ薄  
ヲ温正鹽ス火リ亜色多ヨノ逆沈及多和過シ薄  
振酸ス色○酒沈斯變亜リ法散殿ニハスス鎊斯シナ面腐  
瀉剝其純伊ヲ殿ヲメ斯ニハスス鎊斯シナ面腐  
シ多法白太分也滴乳ヲ十沃ルルノノムル膜蝕  
溶亜沃ナ利チシ加白少五陳ニヲ酸量○時ヲ如  
液斯陳ヲ亜去メスト許度ヲ比以化稍此ハ生里  
清ヲニサ細リテトナツノ火ステス多法水ス滴  
澄少水ルノ餘上雖ハ者酒レ其ルキハ素ル數  
ト許五ヲ人液液其之此ニ防ハ耗時ニ沃沃ニ滴  
ナツ六以多ヲ液ニ丁溶點多失ニ過陳陳至ヲ  
分テク大瀝復故幾シ名ハシ固方キ鎊酸ル加  
ニカ華此盃過糖度液漱ノト鹽リ易溶少若ハ  
至ハ加鳥法申シ瀉浴ニ度驗スヲテシ液許剝又

本草綱目卷之...

本草綱目卷之...

本草綱目卷之...

本草綱目卷之十一

着鐵又瓦沃八メレ澤ノ擔一着色沃トヲ散ニ○  
クノ交斯陳十百、ア如圓田スニ陳合加ス煎此  
如七、度七其リ、八小此メ孤メ、其メ母  
、不瓦名、度氣味黠角蒸芒光立曹テ、後メ滴  
老葉、斯ノ熱ニ蘊辣灰ノ餹ヲリメ、達之母、ニ、  
虎ノリ類起ニ至魯十色芒器収ア水ニヲ滴硫純  
黃如冷中、至、林、リ、ナヲ拾ル蒸變煮ヲ化厚  
トキ體至所、バ、濕、メ、リ、以、メ、芒氣、シ、蒸水硫  
ナ形ニ重ナ、溶如氣結世、無ト、ト、硫、メ、餹、素、酸  
、ヲ觸、リ、紫流、中、芒、間、之、膠、ナ、共、酸、曹、器、瓦、ヲ  
極ナル者、肥、色、ニ、滿、賣、ヲ、紙、リ、キ、并、胃、ニ、斯、合  
微スレト、利、メ、白、メ、ア、卷、取、升、間、テ、蒸、溶、母、盛、硫、メ、  
量○、、齊、美、ヒ、少、リ、或、ノ、華、ニ、器、騰、化、ト、リ、化、無  
ヲ皮光其紫烟、ナ、ク、テ、ハ、者、ス、歷、ノ、シ、ス、滿、黑、鹽、蓋  
取膚澤異色、ト、五、異、之、石、メ、○、内、冷、是、登、酸、酸、ノ  
リ及、ア、重、語、ト、度、ナ、ヲ、墨、形、沃、乾、面、ヲ、ニ、メ、化、毛  
テ、紙、リ、ハ、裁、沃、ル、ヨ、リ、熱、ノ、鱗、陳、メ、後、於、酸、薄、野、草  
水ニテハ此是リ煎ス光片、高、疑、銅、メ、素、毫、龍、中

炭水數ヲル曹亞正ハ見○量量鹽注ヲ食叟沃ニ  
酸素回淋海達叟、海シ、沃ヲト、加發、母陳剥ニ  
曹沃ス洗草ノ母類草達陳知沈硝シセ鹽ハ、ヲ篤  
達陳レシ、燒種ト海及喜ハル、澱酸之、類、其、加、亞  
硫酸、其、灰、類、相、綿、ニ、似、十、ベ、シ、銀、ヲ、ト、食、價、フ、斯  
酸曹其淋、ニ、和、海、鱈、ハ、シ、タ、ヲ、蒸、ス、鹽、貴、ト、溶  
加達殘滴種、メ、種、岸、律、百、ル、加、餹、ル、等、キ、云、液  
爾ヲ餘ヲ類、メ、海、類、薩、十、角、ヘ、シ、ニ、ヲ、フ、ハ、ノ  
基、含、ノ、蒸、ヨ、ル、草、ニ、草、似、三、銀、試、列、ハ、混、以、此、色  
硫、メ、母、發、リ、ゴ、灰、含、呈、等、年、ノ、ミ、多、偽、メ、テ、理、ヲ  
酸兼滴、製、一、中、メ、シ、之、哥、量、升、兒、鹽、之、動、ナ、着  
剥テ沃結造、ニ、故、爾、龍、ヲ、鳥、ト、華、篤、ノ、ヲ、モ、リ、ル  
多食度芒、メ、ア、ニ、葉、翔、詳、而、ル、ヲ、シ、中、溶、質、ス、○、  
亞鹽曹、セ、其、レ、リ、曹、葉、明、篤、以、タ、ニ、液、ル、レ、沃、ヲ  
斯、硫、胃、シ、法、ス、○、胃、類、ス、乙、テ、ル、殘、ニ、故、バ、度、始  
化、母、ハ、海、ト、沃、母、ア、○、私、異、沃、ル、消、ニ、健、剥、ハ  
含、沃、ル、草、名、陳、利、ル、沃、名、ハ、鹽、陳、所、酸、此、胃、多、ル  
ハ、陳、名、ヲ、灰、メ、メ、ガ、陳、創、ノ、ノ、ヲ、毒、消、ニ、送

本草綱目卷之十一

本草綱目卷之...

卷之...

陳ナ々氣陳トル抱攬水此ヲヲ水○リレトニ硫  
 ヲリ黄味酸相者合拌素酸逐含素流ナバ相テ酸  
 稀水色共ト觸トシス瓦ヲヒマ瓦動ル此合モ硝  
 酸素トニ飽ル亦硫ル斯製去シス水者酸メ亦酸  
 中ノナ發和ト抱黄ニノスリメヲ素ナハ水水其  
 ニ一リ烟シ能合游ア侵ル瀝テ此沃リ同素ト他  
 溶分茶鹽タハメ離リ入ニ過後水陳量瓦沃酸  
 和ヲ褐酸ルガ遂シ否ス方メ此中酸ノ斯陳素  
 ス失色ニ水ルニ硫ラルリ玻水ニハ沃游ニト  
 ルスト同ハヲ硫黃サ時テ璃ヲ送沃陳離變緊  
 モ○ナシ無以化トレ手注瓶熱リ陳瓦ス密  
 亦此リ大色テ水沃バヲ意ニ過ニトニ類抱  
 得水終氣ニナ素陳水休メ銓化ノヲ水由ニ合  
 ベハニニメリ瓦ノ素メベ銓シ水水和素テ會セ  
 シ沃黯觸烟○斯變トスキシ水水素素  
 褐レヲ水ト化沃水ハ貯素素  
 色テ發素沃七陳液硫ヲ瓦瓦硫  
 ト漸シ沃陳サトラ化○斯斯化  
 ヲ觀物

瓦バ鹽○ニ七易解爾字姦坊ニウ異リ林水或  
 斯烟酸水殘火ノシ利知ハ沃陣共井シラ凡類ト火  
 ヲヲ瓦素此熱ア未久又陣十賣テ否不沃ト相酒  
 加發斯沃試メト陳相酸法ト玻溶之末璃中者分レ陳變ス酸  
 一メト陳相酸法ト玻溶之末璃中者分レ陳變ス酸  
 元室相酸法ト玻溶之末璃中者分レ陳變ス酸  
 熱息似爲瓦小沃管ス火墨内水者バヲ化ト其  
 ススス瓦斯量陳ノ非酒等面半偽試反醫和殆リ波  
 ンハ○トト底升ア又入混粘ヨア至害ト合ト又黃  
 水酸色狀雖升ア又入混粘ヨア至害ト合ト又黃  
 ト臭クナク大ス其施炭ニ沃發沃アヲ以混  
 陳リ大ス其施炭ニ沃發沃アヲ以混  
 ニ之氣其質ベシ管底入溶合之其品○術用  
 又素

本草綱目卷之...

卷之...



○沃陳鏡 リエイブルヨチテハルヨギムハル

蘇馬爾連 ルム 兒孤 グ 舍密 シ 曰沃陳鏡ハ水素

沃陳酸 素沃陳酸 流動水 = 鏡屑ヲ溶化シ。綠色ノ

液トナシ。蒸散放冷メ結芒セシム ○別爾入

略私名舍密韻府 = 曰沃陳鏡ハ水ニ溶化シ

易シ。其溶液淺綠色ニメ。之ヲ蒸散スレハ。蘇

魯爾列 ル 去母 = 同シキ鹽ヲ生ス

鹽酸重土 バリリアス。バテリタエ。○ヒドロサ。サリ

トス。ロレ。ズ。ロム。ル。アリ。ル。ソウ。テ。蘭。

晶形方板ノ如ク。味刺戟侵蝕ス。能ク四倍ノ清

水ニ溶化ス ○腺病ニ峻效アル一良藥也。高

名ノ穢歇蘭度 名篤麻梅名去聖幾名瓦刺烏福

爾度 名 等殊ニ稱用ス

腺病 腺病及ヒ之ニ繼發スル諸病。諭ヘバ頸腺

ノ硬結。瘰癧性ノ眼。焮衝胃管。硬結腺。腸間膜

腺ノ閉塞。羸瘦病 病強。私篤醫學韻府云。羸瘦

小兒疳疾ヲ以テ最大病トス。療法ハ初メ解疑

肺勞其因。腺病ナル者殊ニ其第一期ニ効アリ

本草綱目卷之...

然レ氏此症ニ之ヲ用ケルハ其必慎戒ヲ加ナル  
ヲ要ス

第一道粘液第一道粘液及ヒ是ヨリ繼發スル  
消化不良閉塞蛔蟲ニ效アリ

○鹽酸重土ヲ用ウルニハ其量ヲ小ニシ毎ニ  
慎戒メ之ヲ用ウベシ。否ラスメ若大量ニ之ヲ  
用ウル氏ハ忽其毒ニ中リテ劇吐腹痛神經  
諸症ヲ蜂起ス。藥力此ノ如ク悍烈ナルヲ以テ  
近今殆ト用ウルヲ稀ナリ。縱令之ヲ用井サ  
モ峻性ノ解凝藥沃實涅海綿炭加爾录

里海水鑛鹽泉等ノ如キ其撰品乏シカ  
ヲ以テナリ○若シ誤テ大量ヲ服スル者解  
凝ノ效アル硫酸中和鹽即芒硝瀉利鹽ノ類能  
ク其毒ヲ消解ス速ニ之ヲ用ウベシ○芳香藥  
水液殊ニ老利兒結爾斯水ヲ以テ溶劑トナシ  
用ウ乃一錢ヲ以テ老利兒水一弓ニ溶化シ年  
紀ノ少長ニ從テ一時半毎ニ十滴ヨリ五十滴  
ヲ服ス○穢歌蘭度云運行遲慢ノ弛緩質ノ者  
ハ鹽酸鐵ヲ伍メ大ニ效アリ  
鹽酸加爾录

天壽記藥註論

卷一

ソウロトシロム、カルキ羅  
ソウロトシロム、カルキ蘭

結芒シ難ク。風ヲ見テ即濕濡溶流スル鹽ナリ。  
味苦ク刺戟侵蝕ス。○效用ハ鹽酸重土ニ同シ。  
ク。腺及ヒ水脈ノ閉塞ニ用ウ。又發汗利尿ノ效  
アリ。然レ方今用ウルハ稀ナリ。○溶劑トナシ  
用ウ。半錢ヨリ一錢ヲ以テ。蒸餾水一匁ニ溶化  
ス。一時或ハ一時半毎ニ二十滴ヨリ三十滴ヲ  
用ウ。

固壯解凝藥

大約保固衝動劑殊ニ香竄苦味藥

以テ。固壯解凝藥トス。故ニ各其本篇  
就テ詳説セリ。此ニ掲ル者ハ唯白

屈菜、濱瞿麥、蜀羊泉ノ三種ノミ

白屈菜 セリドニム、マユス羅  
スチンゲンテ、ゴウ蘭

宿根草ナリ。葉根共ニ採用ス。籬間壁下其他荒  
蕪ノ田野ニ自生ス。○生鮮ノ莖葉ヲ搾絞スレ  
バ。黃汁多ク出シ。味甚刺戟ス。根大サ指ノ如ク。  
硬條アリ。生者ハ外面赭色。内面白色ニシテ。液ヲ  
含ム。生葉ノ如ク。乾ケル者ハ黑色。味苦稍刺  
戟ス。○厥初ハ生葉ノ絞汁及ヒ根ヲ用ウ。如余

多ク生葉ノ稠液<sup>エキ</sup>ヲ用ウ○腹  
 臟ノ閉塞<sup>セキ</sup>肝脾門脈腸間膜腺等ノ閉塞ニ效  
 リ故ニ之レヨリ發スル諸病論ヘハ頑固間歇  
 熱肝ノ硬結腫黃疸水腫内臟ノ粘液依剥<sup>ホコ</sup>昆<sup>コ</sup>堊<sup>テ</sup>  
 兒等ニ稱用ス○越幾斯ヲ以テ丸若クハ孟<sup>シ</sup>屈<sup>ク</sup>  
 設爾トナシ用ウ每服十氏ヨリ一乃至日二三  
 次

濱瞿麥

<sup>セ</sup>イ<sup>ホ</sup>ナ<sup>リ</sup>ア<sup>ロ</sup>イ<sup>ド</sup>蘭

羊泉、三蘇

林氏之ヲ「サボナリア、オヒシナリ」云根  
 藥用トス。大サ笛柄ノ如クニ夕屈曲以結節

リ多ク筋ノ如キ細根アリ。外面赭色内面白色  
 ニメ堅硬ナリ。臭ナク味苦クメ粘ス○緩解凝  
 ノ效アリ。能ク肺其他内臟ノ粘膜ニ走リテ分  
 泌機ヲ調理ス。故ニ呼吸器ノ慢性粘液病即粘  
 液咳。粘液喘等ヲ治ス。又百日咳ノ末期腹部閉  
 塞殊ニ肝門脈ノ閉塞。黃疸依剥<sup>ホコ</sup>昆<sup>コ</sup>堊<sup>テ</sup>ヲ治ス。  
 又慢性ノ皮病癩毒等ニ稱用ス○方今此ノ如  
 キ諸病症ニ遠志ヲ撰用スルヲ以テ濱瞿麥ノ  
 稱用漸ク衰フ○煎劑トナシ用ウ一弓ヨリ五  
 弓至煎メ十二弓ヨリ二十四弓ノ液ヲ取ル

蜀羊泉

テルカマラト蘭

林氏之ヲソラニユム、セルカマラト云、和蘭ニ産  
スル灌木ナリ、莖細ク長ク滑ニメ圓ク、外面淺  
灰色、内面綠色ノ嫩枝ヲ採テ供用ス、之ヲヌチ  
ピテス、セルカマラト云、味始苦ク後甘シ、生  
鮮ノ者ハ麻酔ノ氣アリ、大量ニ用ウレバ麻酔  
ノ效歴然トメ、目指スベシ、予カ師碩學ノ轉兒  
徳兒勃幾ハ、曾テ粘液性喘息ノ患者ニ蜀羊泉  
ヲ服セシメテ、舌癢、語言蹇澁等ヲ發スル者ヤ  
ルヲ見シト云、○蜀羊泉ハ粘膜ノ官能ヲ催進

スルノミナラズ、兼テ吸尿管、腺等ノ官能ヲ活  
潑シ、皮表腎臟ノ分泌ヲ増進ス、○肺臟ノ粘液  
病、經久胃寒、粘液性喘息、粘液勞、亦瘰癧質ヨリ  
發スル肺勞ノ初期ニモ殊稱アリ、○内臟粘液  
及ヒ閉塞、腺病、慢性ノ癩毒皮病、慢性ノ瘰癧皮  
病、慢性癩、麻質、痛風、脚痛風等ニ效アリ、○浸  
劑若クハ煎劑トシテ、錢ヲ一乃至煎シテ六  
弓ヨリ十二弓ノ液ヲ取ル

○蜀羊泉越幾斯<sup>エキ</sup>ス<sup>カ</sup>マ<sup>ラ</sup>ト<sup>五</sup> 丸若クハ  
孟佺<sup>メ</sup>設<sup>セ</sup>爾<sup>ニ</sup>トシ用ウ、日ニ一<sup>五</sup>刀ヨリ一錢至



