

宸篤兒藥性論

六

ヤ 5
1029
6



75
1029
6

衞篤兒藥性論卷十一

○吐劑

吐根

○吐石

吐酒

安質母尼酒

膽礬

皓礬

○禮

○惡

○散

○散

○散

○散

○散

○散

目次

私鎮

○散

○散

○散

○散

○散

○散

私鎮

○散

○散

○散

○散

○散

○散

○散

吐飲

○散

○散

○散

○散

○散

○散

○散

酒

○散

○散

○散

○散

○散

○散

○散

錠

○散

○散

○散

○散

○散

○散

○散



家篤兒藥性論卷十一目次

此處為卷十一的目錄內容，文字較為模糊，依稀可見一些藥名如：... 藥性論...



家篤兒藥性論卷十二目次

清凉下泄藥

剋封荅麻林度

阿没勒 ○梅肉膏

芒硝 ○瀉利煉膏

飛封孕礬酒石

瀉利鹽 ○苦鹽泉

酒石 ○酒酸曹達

孕鹼酒石 ○酒酸曹達

緩性下泄藥

滿那

○精製滿那法

蜂蜜

○屋施茂兒

強壯下泄藥

大黃

○酒製大黃根

○大黃舍利別

峻性下泄藥

青那

○瀉利煉膏

○青那舍利別

盧會

○水製盧會越幾私

葛那

○葛那水

○葛那舍利別

○水製盧會越幾私

○葛那舍利別

藥刺巴

○藥刺巴

○藥刺巴華爾私

格碌董篤

○格碌董篤丁幾

墨列僕里

○墨列僕里

藤黃

○瓦刺扶阿刺

蘇甘母扭

○蘇甘母扭

巴豆油

○小兒下劑方

加印加根

落葉松耳



家篤兒藥性論卷十二目次

蘇葉汁耳
 吐劑ハ唯其效ヲ
 胃及ヒ腸ノ上部ノ常動ヲ反戾シ腹筋横
 膈膜ノ如キモ亦隨テ逆運ヲ發シ以テ胃
 中在ル所之物ヲ又上湧セシムル性ア
 ル者是ヲ吐劑ト謂フ○吐劑ハ唯其效ヲ



家篤兒藥性論卷十二

和蘭 蘇葉汁耳
 吐劑ハ唯其效ヲ
 胃及ヒ腸ノ上部ノ常動ヲ反戾シ腹筋横
 膈膜ノ如キモ亦隨テ逆運ヲ發シ以テ胃
 中在ル所之物ヲ又上湧セシムル性ア
 ル者是ヲ吐劑ト謂フ○吐劑ハ唯其效ヲ



胃下腸ノ上端ニノミ達スルニアラス。尚
 其逆運ノ震蕩ニ由テ、胃及ヒ横膈膜ノ地
 界ニ近接セル諸器、肝、脾、肺、腎、子宮、如キ
 至ルヤデ、亦皆一齊ニ震蕩セラレ、諸部
 七ノ分泌是ガ為ニ催進シ、以テ害物ヲ排泄
 シ、閉塞ヲ開達ス。故ニ此震蕩ハ病ニヨリ
 テハ最緊要ノ事ニシテ、如キ嘔吐ノ
 蕩揺ニ由テ、血液ノ運行變況ヲ受テ、腸
 ト皮表トノ親和交通密ナルトニ由テ、能
 蒸發管ノ痙攣ヲ鎮定シ、其分泌ヲ増進

ス。是ヲ以テ吐劑ハ亦發汗ノ效アリトス
 ○嘔吐ハ大ニ腹部ノ神經殊ニ胃及ヒ横
 膈膜ニ絡纏セル大神經叢ヲ感動セシメ、
 以テ興奮ノ效ヲ逞シクシ、或ハ靜息ノ效
 ヲ奏シ、或ハ導洩ノ效ヲ呈ス。故ニ其症狀
 ニ從テ緊的切要ノ貴品タリ。○吐劑ノ用
 法ニ道アリ。一ハ其本功ニトリ、一ハ其傍
 功ニトリ、一ハ其本功ニトリ、一ハ其傍
 ○其本功ハ、吐劑ノ用、其毒尚
 第酷厲毒若クハ麻酔毒ヲ誤服シ、其毒尚

胃中ニ在テ未苛勢ヲ振ハザル者ニ效アリ凡ソ此ノ如キ地位ニ臨テ吐劑ヲ用ウルニハ毒物ヲ服スルノ後立地ニ速功アル峻劑ヲ大量ニ用ウルヲ要ス若否ラスメ既ニ數時ヲ經ルトキハ毒勢已ニ振發メ燃衝ヲ發ス此ニ至テ吐劑ヲ用ウレバ愈其燃衝ヲ増進シ却テ大害ヲ生ス

第二 胃中及上腸ノ上部ノ汚物及ヒ之ヨリ發スル諸病論ハ膽液熱腸胃熱粘液熱假肺燃衝膽液性肺燃衝假咽喉燃衝膽液

性咽喉燃衝假胸膜燃衝膽液性胸膜燃衝假眼燃衝膽液性眼燃衝胃痛胃瘰等ニ效アリ

○右件ノ諸病汚物上湧ノ徴アル者ニ殊ニ良ナリ但シ胃中ノ汚物其性苛烈ナル者若クハ燃衝ノ症状アル者ニハ必ス先放血シテ而後吐劑ヲ與フベシ

第三 單神經熱膽液性神經熱單腐敗熱神經性腐敗熱ニ效アリ

○此等ノ熱病ニ吐劑ノ最要藥タルヲ古今名家ノ經驗スル所ナリ若夫此等ノ熱病ニ吐劑ヲ用ウレハ

啻ニ其汚物ノ害ヲ奪除スルノミナラズ、其奪除スベキ者一モ此ニアルナシト雖、亦能ク病勢ノ峻地ニ進ムヲ攔住ス

○**第四** 下利痢病等、胃中若クハ十二指腸中ニ膽液性ノ汚物アリテ發シ、或ハ之ニ由テ其症持久スル者ニ效アリ

○其傍功ハ

○**第一** 腹臍ノ閉塞ヲ治ス ○夫吐劑ハ能ク内臟ヲ震蕩シ、又能ク初メ衝動メ後緩暢スルニ由テ、腹中ノ血運ヲ獎進シ、水脉及ヒ

吸収管ノ官能ヲ旺盛シ、更ニ分泌排泄ノ道路ヲ障碍スル者ヲ除去スルヲ以テ、膽汁其他諸液ヲメ分泌排泄シ易カラシム、是、黄疸閉塞、腺ノ硬腫等ニ吐劑ヲ用井テ、治驗ヲ奏スル所以ナリ

○**第二** 粘液、肺中ニ鬱滯スル者、及ヒ氣管ノ衰弱ニ由リテ、其中ニ在ル所ノ粘痰咯出シ難キ者ニ效アリ ○夫吐劑ノ功ハ、已ニ前ニ説クカ如ク、特リ胃腸ニ限ルニアラス、肺毛亦横膈膜ト共ニ震蕩サレテ、其運管

ヲ増盛ス。是各痰難澁粘液性喘息義膜咽
 喉焮腫等ニ喫緊ノ良劑タル所以タリ
 第三 速ニ蒸氣ノ鬱閉ヲ開發スルノ效アリ
 聖京僂儻麻質私痛風等ハ其有熱無熱
 ヲ論セズ皆用ウベシ又熱性ノ瘡疹病譬
 へハ痘瘡麻疹赤斑熱等ノ初起ニ用井テ
 善ク之ヲ出齊シ又其内陷スル者ニ用井
 テ速ニ之ヲ提發スルヲ屢之アリ
 第四 夫吐效ノ神經ヲ感動セシメテ胃腸ノ
 機能ヲ貴起セシムルハ固ヨリ論ナシ又

能ク其感動ニ由リテ胸腹神經又失常ヨ
 リ發スル痙攣搐掣病ヲ鎮靜スルニ用井
 テ屢良效アリ故ニ痙攣性ノ喘息百日咳
 子宮病依剥昆垤兒癩癩等ヲ治驗多シ又
 癩狂病鬱憂病亞細亞霍亂等ニ用井テ偉
 效ヲ奏シ間歇熱ノ發作前少時ニ用井テ
 截熱ノ效ナル等皆此理ナリ
 第五 頭創腦以震蕩腦隙中血液滲溢胸臟焮
 衝等ニ導泄藥トナシ用井テ效ナク就中
 胸臟焮衝ニハ方今意太里亞亞雪際亞同

等ノ醫之ヲ稱用ス。○獨乙ノ諸醫焮衝病
 ニ吐劑ヲ用ウト雖失誤ナシト云難シ故
 ニ此方ヲ用井ント欲セハ必謹慎メ安投
 スルヲ勿ルヘシ。猶吐酒石ノ條ヲ参考ス
 ベシ。

○吐劑ノ害アル者

一第 多血質ニメ天資卒中風若クハ血頭腦
 ニ輻湊スルノ僻アル者ニハ用ウベカラ
 ス。但シ已ムトヲ得スシテ之ヲ用井ハ先
 全身若クハ局處ノ放血ヲ施シ。又下導法

トメ手浴脚浴等ヲ用井而后之ヲ行フベ
 シ。

一第 真焮衝諸病殊ニ胃焮衝ニ害アリ

二第 他病ノ連感ニ因テ發スル嘔吐病ニ害
 アリ。此症多ク頭部ノ創傷孕婦并頸腸墮
 其他胃ノ近傍地位ノ病ニ併發ス

三第 心臟及大血管病患アル者ニ害ア
 リ。諭ハ大動脈弱候ノ如シ

四第 略血吐血共ニ害アリ。但シ兩症共ニ酷
 厲膽液ノ刺衝ヨリ發スル者ハ此例ニア

ラズ、
 第六 月經將ニ来ラントスル者ニハ必卒爾
 ニ用ウベカラス
 第七 子宮ノ脱出及ニ箱頓腸墮ニ害アリ
 第八 受胎ノ第一月ニハ之ヲ禁ス。但シ此劑
 ニアラザレバ、病除クテ能ハザル者ノ如
 作也。尚牢執メ用非ザルニアラズ。此ノ如
 症、預ニ其肚腹ノ位地ヲ順正扶持メ、
 繼發ノ惡候ヲ防キ、而メ後之ヲ用ウベシ
 第九 經久ノ便秘積年ノ閉塞ハ之ヲ禁ス

○胃痙攣若クハ胃ノ知覺大鈍ニ由テ吐
 劑效ヲ呈セサル者アリ。若シ其痙攣ニ由
 ル者ハ先ツ鎮痙藥加^カ密^ミ列^リ。續草等ノ浸劑
 ヲ温服シ。或ハ鎮痙ノ灌腸法ヲ施シ。而後
 之ヲ用ウレバ即チ吐ス。其知覺大鈍ニ由ル
 者ハ、通常寬々地ニ胃部ヲ摩擦シ。心窩ニ
 芥子泥或ハ芫菁膏ヲ貼シ。次テ揮發香竈
 ノ品即チ甘硝石精數滴ヲ用井テ。而後之
 ヲ用ウレバ即チ吐ス。○知覺過敏ノ人若
 クハ胃ノ知覺大敏ナルモノニ吐劑ヲ用

ウレバ、暴吐シテ鎮定シカクキアアリ。若
 此症ヲ發セバ、毎ニ栗歇留私名鎮吐飲ヲ
 用ウヘシ。其方 炭酸加里或ハ炭酸曹達
 ニ枸椽汁ヲ加ヘ、沸騰スルニ乘シテ之ヲ
 服ス。又白耳義局方ニ載ル所ノ吐瀉鎮嘔
 散モ亦良。其方ハ炭酸加里ニ酒石酸ヲ加
 フ福按此方一名沸滾散ト云、方萃草篇
 炭酸剥多亞斯第二方是ナリ、又麻屈
 失亞屈天亞ノ條第九方是ナリ此二方ハ
 酸ト加里或ハ曹達ノ配合ニ因テ、舍密ノ
 分析ヲ發メ、炭素酸氣ヲ生ス。此氣即チ鎮

嘔ノ效アリ。又攝爾攝爾水、華聖業爾水ニ
 録ニ出、ニ鎮嘔ノ效アルモ、亦此理ト等シ
 ○吐酒石ヲ服シ暴吐ヲ發スル者ハ、是吐
 酒石尚胃中ニ在テ刺衝スルナリ。舍密術
 業ヲ分析ニ因テ、其毒ヲ挫クベシ。乃、幾那煎
 没食子浸濃煎、哥喜等ヲ服スレバ、吐酒石
 毒ヲ分解メ、嘔即チ熄ム。○又些モ藥劑ヲ
 用ウルコトナク、獨リ小氷塊ヲ嚙下メ鎮嘔
 效ヲ呈スル所アリ。吐根
 プラゲキス、カルトコアラ、白胡椒、

藥肆ニ鬻ク者三種アリ。一ヲ白色吐根。一ヲ褐色吐根。一ヲ灰白吐根ト云。通常灰白ノ者ヲ藥用ニ供ス。是セハエリス。イペコアナ。チヌサクノ根ナリ。又一種アシコトリア。エメチカリシ。ヒリト稱スル者アリ。是吐根ノ種屬ニ。黑色吐根或ハ質吐根ト云。○セハエリス。イペコアナ。チヌサクハ南亞墨利加洲ノ樹林中ニ産スル宿根草ナリ。稍灌木ノ状ヲナス。吐根ハ即此根ナリ。根形螺旋メ蛇状ヲナシ。長一二寸大。一二分。手ニ觸レテ粗糙ナル密節横斜ニ

重疊ス。外面灰白色。内面黃白色。氣味微不佳。苦烈且粘稠ス。外皮ヲ剥ケハ褐色ニメ光輝アリ。華爾斯ヲ含ム。嘔吐ノ效此皮ニ在リ。中心ハ白色。木筋ニメ粘着シ。吐效ナシ。能ク外皮ト相分ル。○催吐ノ外又小量ニ用井テ祛痰。鎮痙。發汗。止瀉ノ效アリ。○吐劑トシテ毒物胃中若クハ腸ノ上部ニ在リテ。吐除スベキ諸症アルニ用ウ。吐根ハ其性緩ニメ。自餘ノ吐劑ノ如ク衰弱ヲ遺ス。少シ。故ニ虛弱ノ人。小兒。妊婦等ハ殊ニ之ヲ撰用ス。且其性下利ヲ發スルナシ。

故ニ下利過度オラントスルノ恐アル者或ハ
 下利過度トナルニ由テ惡症ヲ發スルノ恐レ
 アル者乃腐敗熱神經熱及ビ膽液性下利膽液
 性痢疾等ニハ其品位曼ニ吐酒石ノ上ニ在リ
 〇吐劑ニ用ウルハ外皮ノ新末ヲ撰用スベシ
 年紀ニ從テ二匁ヨリ十匁至ハ八分時若クハ四
 分時毎ニ服ス或ハ二十匁ヨリ三十匁至ヲ頓
 服ス〇小量ニ用ウルハ八分匁ヨリ四分匁半
 匁一匁至一時一時半若クハ二時毎ニ用井テ
 所謂祛痰鎮痙發汗止瀉ノ效アリ

祛痰聖藥性ノ咳嗽痙攣症ノ咯痰難澁等ヲ
 兼ル者肺ノ衰弱若クハ其官能萎衰ニ由テ咯
 痰難澁若クハ全ク遏止スル者粘液性喘息等
 ニ效アリ
 鎮痙痙攣性ノ喘息百日咳黃疸搐搦殊ニ小兒
 生齒ノ時屢發スル搐搦妊婦及ビ產婦ノ痙攣
 搐搦急痙子宮病依利昆垺兒ノ諸症癩癩等
 ニ效アリ此諸病ハ患者不断惡心ヲ覺ユルノ
 量ヲ用井以テ神經質ノ舊習ヲ變革セシムル
 ヲ要ス〇又此效ヲ擴充シ用井テ能ク出血ヲ

鎮止ス。就中崩漏ノ患者、煩躁メ穩靜ナラス。脉細ニメ緊小、便清白、四肢厥冷スル者ハ、吐根ノ量四分ハ、一ヲ以テ止血ノ功餘リアリトス。發汗阿芙蓉ニ伍用メ發汗ノ效アリ。所謂陀歇爾私散是ナリ。○聖京屈、癩質私痛、風等ニ效アリ。又瘡疹病、皮膚痙攣メ發出遲滯スル者、若クハ全ク内陷スル者ニ用井テ、太偉效アリ。又蒸氣鬱閉ニ由テ發スル水腫及ニ間歇熱赤熱等ノ後ニ發スル水腫ニ用井テ、諸家大ニ稱舉セリ。

止瀉吐根ノ初メテ世ニ出ル時、止瀉ノ效ヲ以テ專ラ之ヲ稱ス。故ニ人或ハ之ニ與フルニ治痢根ノ名ヲ以テス。○痢疾ニ效アリ。殊ニ其起ニ於テ、穢物ヲ排除セシメカ為ニ吐劑ニ用井。或ハ腸管ノ分泌ヲ皮膚ニ導洩セシメカ為ニ小量ニ用井テ共ニ良效アリ。故ニ其病腸胃性聖京屈性等ヨリ發スル者ハ、吐根殊ニ效アリ。但、焮衝性ノ者ハ、疼痛窘迫共ニ已甚シ。此症ニハ吐根害アリ。又聖京屈性、癩質私性等ノ經久下利、腸管ノ脆弱若クハ感觸過敏ヲ兼併ス。

ルニ用井テ殊ニ佳效アリ○近世ニ及ンデ霍亂性ノ下利膽液性ノ亞細亞霍亂ニ良效アルヲ稱ス

○刺衝ノ效鎮痙ノ效ヲ要スルニ四分ハヨリ量ハ至催惡心劑トメハ一ハヨリ三ハ至吐劑トメハ十ハヨリ三十ハ至テ散丸孟僣設爾等トナシ用ウ又半錢至浸出シ漉過メ一カヨリ三カノ液ヲ取り用ウ

補 越而實吉醫事白札ニ曰妊婦ノ惡咀ニ左ノ方ヲ用井テ偉效アリ

○胡椒根末十六ハ至二十ハ至 椒格剋度適宜

○右調勻百二十錠トナシ一時毎ニ一錠ヲ与フ○彊云予數此方ヲ試用スルニ奏效甚メ著シ惡咀ヲ治スル良方ト云ベシ

○吐根酒吐根一カ、白葡萄酒一カ、右浸出スル

○平旦用シ以漉過シ用ウ○吐效本條ニ同シ殊ニ小兒ノ吐劑トシ八分時毎ニ半錢至ヲ用井以テ吐ヲ得ルニ至ル

○吐根舍利別吐根一カ、水各適宜

○白糖 石吐根ニ水ヲ加ヘ煮次テ糖ヲ加
 へ水氣ヲ蒸散メ舍利別ノ稠トナス○吐劑祛
 痰劑トシテ小兒ニ用ウ
 ○吐根錠 トロキスシキイ 吐根 新末ニ
 白糖 三巧 達羅侃篤護母漿 適宜 右先
 ○上ノ二味ヲ混和シ護母漿ヲ加ヘテ一片十片
 ノ錠トナス○粘液性若クハ聖京屈性ノ呼吸
 器病及ビ胃ノ粘液病ニ祛粘劑トシ用ウ一服
 一錠日ニ三四次
 ○陀歇爾斯散 トルロス、イペカ、コシ、オビオ

○越黙知捏 エノナ子羅 阿片ノ條下ニ出ツ
 同ノ兩家吐根ヲ分析ノ越黙知捏ヲ得タリ是
 催吐ノ效分ナリ二種アリ一ハ赭赤色ナリハ
 赤色ノ者ハ形鱗屑ノ如クニメ透瑩臭ナク
 苦味アリ然氏嘔スヘキ味ナシ太溶流シヤス
 ク又能ク水ニ溶解シ結晶セズ白色ノ者ハ形
 散末ノ如ク風ヲ見テ變セズ水ニ溶化シ難ク
 亞的兒及ヒ亞爾箇兒ニハ能ク溶化シ味微苦

本草綱目卷之九 藥性論 卷上

トリ ○赭色越黙知捏ヲ吐劑トシ用ウルハ小
兒ハ半匁至大人ハ三匁至白色越黙知捏ハ僅
ニ十六分匁ヲ用井テ即嘔吐ス若吐劇甚ニメ
止ザル者ハ没食子浸ヲ与フヘシ善ク之ヲ鎮

○越黙知捏圓 赭色越黙知捏ニハ十 白糖

右ニ味合メ一箇九匁ノ圓トナシ半時毎ニ一
圓ヲ服ス ○聖京徭性ノ遷延胸病百日咳經久

○下利等ニ用ウ 吐酒石タルタリスス、エメチキス、スチ
グラークエイ

酒酸安質アン母ニト酒酸剥ト寫ト亞斯トノニ鹽相合
吐酒石トナル形三角或ハ八角ノ芒ニメ透亮
白色臭氣ナク嘔スベキ鑛味アリ ○効力表約
吐根ニ同シ然レ其性峻烈ニメ速ニ下利ヲ發
ス又大量ニ用ウレバ其酷厲毒ニ中リテ忽胃
腸ハ大燼衝ヲ發シ呃逆搐搦并ニ起リ以テ斃
ルニ至ル者亦少ナカラズ大凡吐酒石毒ニ中
ル者ハ脂油粘膠ノ包攝飲料ヲ用井水蛭ヲ貼
スベシ若シ醫ヲ招クテ速ニメ其毒未發動セ

ナルニ及バ、黄幾那煎ヲ用井テ直下ニ吐酒
石ヲ分析シテ、全ク其性能ヲ失セシムルヲ佳
トス。○吐酒石ノ性效ハ、其量ノ多少ニ隨フテ
異同アル。猶自餘ノ吐劑ノ如シ。○吐劑トシ
用ウルニハ、患者ノ年紀ニ隨フテ、一ハヨリ四
ハ至ヲ分ツテ數服、頻々ニ用井ツクニ
ベシ。然レ神識病乃、癲狂病ノ如キハ、患者通常
知覺鈍呆ニシテ、吐劑ノ刺戟ヲ恐レザルニヨリ、
六ハヨリ十ハ尚加倍ノ用ツベシ。其他概シ毒
物粘液、膽液其他ノ穢物已ニ胃中ニ融動メ、吐

除スベキ症ニ用井テ皆效アリ。殊ニ其除去ス
ベキノ毒、一ハ既ニ大小腸ニ下リテ、下テ亦
併行ハズンバ有ヘカラザル者ニ良ナリ。○小
量ニ与ヘテ諸般ノ病ニ效アリ。
腸胃熱腸胃熱ノ初起、穢物未、何レノ道路ヨリ
泄除スルキハ、分明ナラサル者ニハ、之ヲ一ハ
ヨリ二ハ至、他ノ解凝清涼劑ニ加ヘ用ウ。此ノ
如クヌルハ、穢物内ニ融動シ、或ハ上吐ノ症
ヲ見シ、或ハ下泄ノ徵ヲ呈ス、乃チ其趣ク所ニ
隨テ、或ハ吐劑トシ用井、或ハ小量ヲ取テ下劑

加用スベシ
粘液熱 蛔蟲熱 二病共ニ他ノ解凝藥ニ加ヘ用
井テ良效アリ ○夫吐酒石ハ無味ニメ服用シ
易キヲ以テ小兒諸熱ニ用井テ一良藥トス
聖京僂熱 僂麻質斯熱 二病ハニ腸胃穢物ノ候
アル時用ウルルニシテ乃又皮膚ノ官能萎
衰セル者或ハ病毒内部ノ要地ニ轉移スルノ
恐アル者ニ用ルル浮輪名羅而列名多名同麻僂
哩亞利名等僂麻質斯熱及ヒ急性僂麻質私ニ
之ヲ稱用スルル極メテ甚シ予モ亦其説ニ從


フテ之ヲ用井大ニ良效ヲ得タリ
開歇熱 諸厄利亞人火ニ之ヲ稱用ス殊ニ聖京
僂性膽液性等ノ開歇熱皮病ノ内陷ヨリ發ス
ル開歇熱或ハ開歇熱ノ肚腹壅閉ヲ兼ル者及
ヒ其壅閉ニ因テ病持久スル者ニ效アリ ○輓
近ニ及ンテ別耳列印名地大學師禮設名人間歇熱
ヲ治スルニ先刺絡ヲ施シ尋テ之ヲ多量ニ与
フルヲ奇方トシ太稱用セリ然レ此法效ヲ見
ルト鮮シ
經久僂麻質斯及ヒ痛風病吐酒石小量ヲ以テ

雙蘭菊越幾斯曼陀羅華等ニ伍用メ。顯然タル
奇效アリ

水腫之ヲ用ウル一稀ナリ。其之ヲ用ウル症ハ、
殊ニ蒸氣ノ閉塞ニ由テ起ル者。胸腹諸臟ノ粘
膠若クハ閉塞ヲ兼ル者。或ハ間歇熱ノ後發ス
ル者等ナリ。此症ニ值ハ。宜シク之ヲ小量ニ用
ウヘシ

慢性神經病 癩癩鬱憂病癩狂病黑障眼等ニ用
ウ○癩狂病ノ肚腹閉塞ヲ兼ナル者ニ。吐酒石
殊效アリ。夫吐酒石ノ此病ニ效アルハ。膏ニ解

疑ニ效ノミナラス。尚且導拽興奮ノ效ニアリ。
故用此病ニ之ヲ用ウルハ。其量常ニ惡心ヲ
覺ルヲ要ス。大凡狂病者ハ吐劑ニ於テ感觸
太鈍ナル者ナリ。故ニ其惡心ヲ要スルニハ。其
量ヲ大ニスヘシ。然レハ一頓ニ大量ヲ以テス
ルトナク。漸次ニ加増シテ其中毒ヲ慮ルベシ。
腦ノ動搖佛郎察^フ醫吐酒石ヲ稱用ス。其方
小量ノ吐酒石ヲ以テ一二弓ノ水ニ溶化シ。タ
タリ。エノチ^ニ。エン^ラ。用井テ。些モ吐ヲ發セ
ズ。反即吐酒石液ノ義。カ用井テ。些モ吐ヲ發セ
シハル。吐酒石液ノ義。カ用井テ。些モ吐ヲ發セ



片ハ、血液頭腦ニ輻湊ノ。大害ヲ生ス。切ニ慎戒
スベシ

肺焮衝。胸膜焮衝。義膜咽喉焮衝。後世此三病ニ

大量ノ吐酒石ヲ用井テ防焮劑トス。肺焮衝

ニ多量ノ吐酒石ヲ用井テ效驗アルル。說四十

年前武楞的兒^名私屈爾的兒^同里布底兒^同

諸家已ニ之ヲ唱フ。雖^レ任意太里亞^名國ノ業^名涅

弗^名地ノ醫羅曹里^名百私悉爾^同至テ最^名之ヲ

稱用ス。實ニ其魁^名タリ。百私悉爾^名吐酒石六
瓜ヨリ十二瓜。十五瓜至^テ以テ蒸餾水六^名可ニ



溶化^名。一時每^名食匙ヲ與フ。吐酒石ノ量ハ
毎日三瓜ヲ增加シ。十二時中^名十二瓜ヲ用リ。十
五瓜ニ至ル。而後此新法ニ從事スル者。獨^名七^名
及^レ其他諸邦ニ太^名居多ナリ。然^レ此子ヲ以テ之
ヲ觀^レル。其稱譽^名甚^名シキ。其實ニ過^名タルベ
シ。夫^名此大量^名吐酒石^名導^名搜^名機^名腸管ニ
起^名。兼^名胸腔及^レ胃^名絡^名纏^名セル神經ヲ直下
ニ壓^名。而^名胃^名因^名於^名焮^名。致^名ヲ致^名ス。疑^名ヒナ
シ。然^レ其能^名ヲナ^名ス。方^名リテ。胃^名ノ粘^名膜ヲ騷^名擾
ス。此^名已^名甚^名シキ力故ニ。終^名ニ亦是^名カ為^名ニ腸管

ノ慢性病ヲ將出シ來ルヲ屢之アリ此療法
ハ肋膜焮衝殊ニ腸胃性肋膜焮衝儂麻質私性
肋膜焮衝肺管義膜焮衝氣管義膜焮衝義膜咽
喉焮衝假肺焮衝ニ太的切タリ然レ單純肋膜
焮衝單純肺焮衝ニ此方切當外病ヲアラス就
中單純肺焮衝ニ必先刺絡ヲ施サ、此法
ヲ行フハ得ズ此ニ焮衝ハ共ニ吐酒石ノ量
日ニ六瓜ヨリ八瓜以上ニ至ルハカキズ、縱令
之ヲ用クルモ、晝夜ニ以テ消焮ノ效較著ナラ
ザル者、速ニ後服ヲ徹スベシ

此方切當

外用軟硬ニ膏ト作メ皮膚ニ擦塗スレバ其狀
殆ト牛痘ト向一般ノ疹ヲ發スル性アリ故ニ
引赤導拽ノ劑トナシ用ウベシ○浩天利多石
ハ百日咳ヲ治スルニ吐酒石膏ヲ鳩尾ニ摩擦
ス、是此膏ヲ稱用スル中興ノ人タリ、其方吐酒
石一錢ヨリ二錢至ス、黃蠟膏或ハ家猪脂一弓
ヲ以テ製シ、蠶豆大或ハ胡桃子大ヲ取リテ皮
上ニ擦スル、一日ニ一二回若クハ三四、此ノ如
クスル、多時ナラズメ、其部居多ノ疹ヲ發ス、
此時尚塗擦メ止マザレバ、其疹愈乘數シ愈長

皮膚科

大トナリ、或ハ紅血ヲ含畜スルニ至ル者アリ
 浩天利多ヲ距ル既ニ四十年前、英捏爾、
 乃同此膏ヲ用ウ、就中乃ハ吐酒石、
 二、家猪脂一、半、乃カヲ以テ製ス、
 吉、醫事日札ニ、華乃カヲ吐酒石、
 石、二、錢、猛、瀕、六、蒸、餾、水、
 皮、ラ、摩、メ、赤、色、ナ、ラ、シ、メ、此、水、
 捏、爾、名、其、他、ノ、衆、醫、ハ、頑、固、ノ、諸、病、ニ、此、膏、ヲ、用、
 井、テ、或、ハ、效、ヲ、得、或、ハ、否、ラ、ズ、其、諸、病、ハ、乃、胸、癆、
 胸、水、狂、病、癩、癩、内、外、諸、器、ノ、慢、性、焮、衝、經、久、ノ、閉、
 塞、等、是、ナリ、○時、宜、ニ、隨、テ、或、ハ、莞、菁、丁、幾、或、ハ、
 蕃、椒、或、ハ、自、餘、ノ、峻、烈、刺、衝、藥、ヲ、加、ヘ、用、ウル、
 ア、リ、○最、後、世、ニ、及、テ、巴、豆、油、ヲ、以、テ、此、膏、ニ、代、

用ス、此油ハ其効深ク肉中ニ侵入セシメテ要
 スル病ニ良ナリ、諭ヘバ鬱憂病頭水等是ナリ、
 下劑篇巴豆油ノ條ヲ參考スベシ、○吐酒石ハ
 其配伍スル品ニ由テ、己ガ質ヲ分析スル者ナ
 リ、故ニ能ク其當否ヲ審ニシ、其配伍ヲ撰、
 乃、鑛、酸、加、里、炭、酸、加、里、諸、金、屬、石、鹼、硫、肝、其、他、單、
 寧、ヲ、含、蓄、セ、ル、諸、液、等、ヲ、忌、ム、
 安、質、母、尼、酒、ス、ヒ、ユ、ム、ス、ガ、ラ、シ、メ、イ、ン、
 安、質、母、尼、酒、ノ、方、吐、酒、石、二、十、四、分、白、蒲、萄、酒、十、
 二、分、右、二、味、溶、和、ス、○催、吐、解、凝、發、汗、祛、痰、ノ、效、

本草綱目卷之九
 卷之九

アリ○吐劑トシ用井テ殊ニ小兒ニ妙ナリ用
 法五密扱篤或ハ十密扱篤毎ニ一茶匙ツ用
 井テ吐ヲ得ルニ至ル○鮮凝劑トシ用井テ粘
 液性ノ内臟壅塞及ヒ腺病ニ殊效アリ○發汗
 祛痰ノ劑トシ一十滴ヨリ一錢至ヲ取リ急慢
 二性ノ聖京屈病癩麻質斯病ニ用井テ殊效ア
 胆礬胆礬ルハス、キユ、ブ、ラ、リ、ロ、エ、ト、ワ、リ、ホ、ル、シ、ル、蘭、
 中和ノ金屬鹽ナリ、芒形四角或ハ八角長メ、尖
 銳リ、深綠色、味酸ニメ、侵蝕刺衝ニ能ク水ニ溶

化ス○是峻吐劑ノ最峻ナル者ニメ、侵蝕毒ア
 リ、故ニ慎戒メ用ウベシ、其之ヲ用ウル徵ハ胃
 大ニ感觸ヲ失フ者、誤テ麻毒ヲ飲服スル者ノ
 如キ、神速ニ吐效ヲ要スルノ外ハ、絶テ用ウル
 一ナシ○散、凡若クハ溶劑トシ用ウ、三爪ヨリ
 六爪至
 補 越而實吉醫事日札ニ曰、骨布骨布名云、忽布
 滿、丹礬ヲ以テ義膜咽喉焮腫ノ奇藥ト稱
 ス、故ニ予モ亦七年ノ間之ヲ試ルニ實ニ此
 病ニ必要ノ良藥タリ○丹礬ハ其效他ノ吐

大鶴見藥性論 卷上

レハ則此ノ如ク用ウルモ益ナシ
 府附録ニ曰義膜喉腫ニ膽礬半
 フ半時或ハ一初時毎ニ用井テ
 忽布滿ヲ用ウルニ爾來諸大
 凡膽礬ヲ用ウルニ先水大
 多シ強壯兒ノ如キハ殊外但
 瘰癧質ノ薄弱兒ノ及多兩等
 候煖衝ノ素因十者然此協
 吐劑ヲ用井テ害ナシ然此協
 如ク丹礬ノ此病ニ於ル全
 其能ノ異ニスト云ハ真十リヤ
 大凡丹礬療法ハ危嶮ノ諸症消
 金硫黃等ヲ用井テ遺留ノ聖京
 スルヲ除クノ外他ノ療法ヲ行
 ○氣管ノ所患ハ此病ニ最モ恐
 此病ニ最モ恐ルベキ症ニ

殊ニ夜中ニ暴發ス故ニ丹礬ノ如キ吐效
 最神速ナル者ヲ以テ無上ノ良藥トス
 患兒ノ寤覺シ來ル時病症最劇甚ナリ
 丹礬ノ吐此ノ如ク神速ナリト雖吐後絶テ
 胃ヲ害スルヲ見ス○病勢重クメ病形既ニ
 十分ニ發露スル者ハ局部ノ瀉血荒菁膏モ
 亦必缺ヘカラザル者ナリ然レ膽礬吐劑ヲ
 以テ此病ノ最良藥トシ且間ヲ隔テ小量
 ニ用井テ持抜ノ分解藥トナル○膽礬ノ此
 病ニ效アル所以ヲ考フルニ唯速吐スル能

本草綱目卷之...

ノミナラズ。此劑ヲ服スルニ方リテ。藥末喉
 頭ノ部分ニ觸ルレバ。其部甚。發溢ス。是。亦
 膽礬藥能ト算スベシ。故ニ劑ヲ作ルニ丸ト
 ナサズメ散トナス。理ナキニ非ス。○膽礬
 ヲ除クノ外。此病ニ此ノ如キ效ヲ奏スル者
 ハ。獨極末明礬ナリ。選歌列兒名ハ明礬ヲ口
 中ニ吹クヲ云ヒ。蒲列東涅浩名ハ義膜喉
 腫ノ口中ニ吹キテ。大ニ良效アルヲ稱ス。○
 彊云弗利設藥性論ノ說。稍此說ニ同シカラ
 サル所アリ。故ニ左ニ記メ以テ參考ニ備フ

金弗里設藥性論ニ曰。義膜喉腫ニ丹礬妙效
 實ニ新經驗ニ出ル所ナリ。匪爾秩
 列云。義膜喉腫ノ焮衝期ハ。瀉血發泡引赤法
 之ヲ行フ後ト雖直ニ丹礬吐劑ヲ与フレバ。患
 部ニ血液輻湊ヲ増ス。恐ラズ。故ニ大焮衝既
 ニ去リ。組織液滲出ノ期ヲ以テ。初テ吐法ヲ行
 フ。好時期トス。○聖武兒滿名ハ義膜喉腫
 藥末期ハ。瀉血甘頰等ヲ用井テ。效ナキ後。丹
 礬半片名ハ半時毎ニ用フ。○骨布名ハ十七年
 間。義膜喉腫ヲ丹礬ヲ試用ス。氣管喉頭ニ

天馬見藥生論
 卷上

妙效ヲ奏スル殊能ナル無二ノ要藥ナリト
 稱ス其方一歳ヨリ七歳至ノ兒ニ初ヨリ丹
 礬四分ハ加ヘ或ハ三分ハ一或ハ半ハ一
 乳糖五分ハ加ヘ八分時毎用井テ數吐ヲ
 得ルニ至ルバ室息既症減メ患兒安眠ス○
 次日吐至テ諸症全ク消散セズンバ丹礬
 同量ノ劑ヲ九十密扭篤或ハ一時毎ニ用ウ
 此ノ如ク用ルバ嘔吐容易ニ發セズ
 皓礬シニルハシハシキシキ 嘔吐容易ニ發セズ
 金屬鹽ナリ白色四角ノ片味侵蝕刺衝ス

○是モ亦膽礬ノ如ク麻毒ヲ誤用シテ立地ニ
 吐效ヲ要スル時用ウベシ然レ此物效ヲ呈ス
 ル一の實ナラズ且大毒ノ品タルヲ以テ近今
 之ヲ用ウル一太稀ナリ○丸散若クハ溶劑ト
 ス四ハヨリ十二ハ至

家篤兒藥性論卷十一終

家篤兒藥性論卷十二

和蘭 漢侄 家篤兒 著

小倉 洞海林 彊健卿 譯補

下劑 ツビルガ ンチグアベホルデクチカ
デレンルミ

夫下劑ハ之ヲ内服シ或ハ外敷シ或ハ直
先肛ニ就テ直腸ニ注射シ以テ大便ノ度
ヲ變メ腸中ニアル所ノ物ヲ下泄スル效

能ヲ具セル者ナリ。蓋其固有ノ性ニ從テ其效能モ亦各差異ナキヲ得ス。或ハ第一道ヲ滑利メ以テ效ヲ呈スルアリ。脂油類是ナリ。或ハ腸ノ筋纖維ヲ刺衝スルニ因テ蠕動機之カ為ニ獎進セラレ。以テ效ヲ奏スルアリ。或ハ腸液ノ分泌ヲ催促シ其舊物ヲ渙釋シ。其泄物ヲ増加シ。以テ效ヲ達スルアリ。又藥性ノ同シカラザルニ由テ。其效ノ達スルモ亦上下廣狹ノ別ナキヲ能ハズ。即盧會ハ大腸ニ達シ。格碌莖

驚々全腸ニ達スル以テ蠕動機ヲ増進シ。或ハ胃ヲ衝動シ。其感觸ヲ腸ニ波及セシメ。或ハ直ニ腸ヲ衝動シ。以テ腸ノ蠕動機ヲ提起スル等是ナリ。又其效ニ遲速緩急短長ノ別アリ。○下劑獨其用ヲ腸胃ニ專ラニスルノミナラス。更ニ其近密セシ諸部兼波及シ。胃液腸液胆液其他腸中流出スル諸液ノ分泌ヲ催進増加スル者アリ。或ハ峻カク衝動シ。因テ血液ノ腸管向テ流注スル勢ヲ増シ。以テ速隔諸

部ニ良善ノ感應ヲ起ス者アリ就中峻下劑ハ腎子宮及ヒ下腹ノ神經ヲ刺衝シ其運動ヲ勸發スルヲ以テ百般ノ疾病ニ偉效ナル藥劑トス

○下劑用ウキル症ヲ左列ス

一第 不消化ノ物粘滑ノ物胆液様ノ物有毒ノ物其他諸物腸中ニ在テ導泄セズニ有ベカラザル諸症ニ效アリ

二第 腸ノ官能遲慢萎弱及ビ之ヨリ發スル便秘粘液ノ閉塞及ヒ蓄積黃疸水腫等ニ

用ウキル

三第 滋養過盛及ヒ之ヨリ發スル多血多液肥胖等ニ驗アリ

四第 下劑ハ血ノ腸ニ向テ流注スルヲ促スヲ以テ頭胸等ニ血液輻湊スル症及ヒ之ヨリ發スル失血澹妄卒中等ニ導拽劑トシ用井テ索緊ノ要藥タリ又腦嫩衝咽喉嫩衝眼嫩衝ニ效アリ此效殊ニ峻下劑ニ在リ

五第 下劑ハ概々腹部ノ諸腺吸尿管水尿管

等ノ運營ヲ増進ス。故ニ此三器ノ運營萎
衰ヨリ生スル腺病水腫ニ宜シ

第六良能ノ機特、下利ヨリメ病毒ヲ分離シ
去ラント要スル諸症ニ用ウ。此症屢腸胃

熱胆液熱粘液熱ニ之アリ○下劑用ウヘ
カラザル諸症ヲ左ニ列ス

第一腸胃虚弱ニメ感觸太疾敏ナル者

第二腸ノ焮衝及ヒ將ニ焮衝ヲ發セントス
ルノ恐アル者ニ害アリ。然レ脂油性ノ下
劑ハ此列ニアラス

第三生得ノ便秘或ハ便秘已ニ固習トナル
者

第四嘔吐ノ症顯然ナル者至ルニ此症ハ喜シ
ク

第五身体極メテ衰弱羸瘦セル者殊ニ大病
後身体漸ク平復セシトスル時

第六器械病ノ腸中局處ニアル者諭ヘバ壞
瘍狹窄腺ノ硬結等ノ如シ

第七妊婦産後未日ヲ經ガレ者月經中痔疾
家等ハ戒心セザレバ用井難キ下劑アリ。

然レ清涼ノ緩下劑ハ妊婦ノ間殊ニ其最

初ト終末トニ在テ。通利遲急シ或ハ難ナ
ル者ニ用井テ可ナリ。用井テ難キ下
[第八]下劑ヲ用ウルヲ尤久シキ氏然。腸胃ノ
感觸大ニ疾敏トナリ。尋テ衰弱シ。終ニ慢
性下利ヲ發シ。或ハ腸ノ知覺此藥ニ習レ
テ鈍性トナリ。終ニ官能減少又惡ムベキ
便秘ヲ生シ。終ニ峻下劑モ亦十分ノ効
ヲ奏スルヲ得サルニ至ル。此症ハ喜シ
テ下劑ヲ用ウル者ニアル所ノ者ニ又。往
々經驗スル所ナリ。野路ヨニ固胃イキル

○下劑ヲ區分メ四種トス
一 重清涼下泄藥
二 緩性下泄藥
三 強壯下泄藥
四 峻性下泄藥
○清涼下泄藥
下利ノ效アリテ。兼テ脈管ノ運為旺盛

本草綱目卷之七十一

本草綱目卷之五

ヲ減却清涼ニスル能アル者ヲ清涼下
泄藥ト名ク故ニ熱病。焮衝病ニ用井テ
腸胃ノ汚物ヲ泄除シ兼テ熱勢ヲ制調
シ。脈管ノ運為強盛ヲ鎮靜ス

荅麻林度タマリクモテス。タマリンドロム。ム

林氏ノ所謂「タマリ」云ス。イシチ凶ノ實ナリ
此樹東印度。西印度ノ熱地ニ在リ。實ハ楕圓。扁
平ニメ長サ一指許ノ莢ナリ。莢ハ茶褐色ニメ
二重ノ硬皮ヲ以テ成ル。其皮間髓様ノ物ヲ含
ム。即荅麻林度ナリ。英中三核アリ。○印度ヨリ

諸邦ニ輸ス者ハ。形状毬布ヲ如ク。黒色ニメ其
中核ヲ混ス。味清涼酸美ナリ。東印度ノ品ハ西
印度ノ品ニ比スレハ黒色ニメ。酸味強ク且乾
燥セリ。西印度ノ品ハ腐壞ヲ防シカ為ニ。糖ヲ
混スルコト多ク且軟ナリ。○多液ニメ。瘴臭ナク
味甘澁ナラス。磨光綱ヲ以テ其中ニ置クト雖
毫モ銅色ヲ生セザル者ヲ上品トス。○胆液熱
其他熱性諸病ノ胆液性ヲ併スル者。腐敗熱ノ
初起下劑ヲ要スル者。胆液利失血。衄血。咯血。吐
血等共ニ胆液ノ刺衝ニ由テ發スル者。胆液性

本草綱目卷之五

假眼焮衝假肺焮衝假胸膜焮衝血液頭腦ニ
畜積スル者痔血閉ニ焮衝ノ症ヲ併スル者等
ニ下劑トシ用井テ效アリ○煎劑一弓ヨリ三
弓至ヲ以テ煎メハ弓ヨリ十二弓ノ液ヲ取ル
○能ク莢核ヲ撰ビ去テ純粹ニナシタル者ヲ
荅麻林度膏ト云フ日ニ一弓ヨリ三弓至ヲ以
テ孟蝕設爾昆設爾弗等ニ和シ用ウ

阿沒勒カスプカスシア蘭

林氏ノ所謂カスシアヒスモ巨ノ實ナリ此樹
印度國名阨入多同包社同等ニ産ス黒色ノ莢實

ニメ形圓長長サ一二武度ニ個人縫際アリ其
一ハ顯ニメ其一ハ微ナリ莢内横膈膜アリテ
許多ノ小室ヲナス每室黒色ノ肉ヲ充ツ軟ニ
メ琶布ノ如シ是藥用ニ供スル者ナリ琶布裏
ニ一子アリ形橢圓ニメ扁平ナリ○上好ノ品
ハ之ヲ振レ氏鳴ルナシ其鳴ル者ハ肉乾枯
スル徵ナリ用ウルニ堪ヘス又其量重キヲ良
トス蟲蝕ノ者ハ用ウルナカレ○藥用ニ供
スル者ハ莢内ノ肉ナリ味甘ク爽快ニメ粘着
ス清凉緩下ノ效アルナリ荅麻林度ノ如シ故ニ

主治モ又荅麻林度ニ同シ
 ○一弓ヨリニ弓至
 孟倔設爾若クハ昆設爾弗トナシ用ウ
 阿没勒ハ時ニ腹痛風氣ヲ起ス
 一アリ之ヲ防治セシ
 カ為ニ香竄樂或ハ中和鹽ヲ加用スベシ

○梅肉膏
ミルバ、ブルノミハ羅
 是尋常ノ梅實ヲ以テ製スル者ナリ

○瀉利煉膏
クエ、ク、ア、ク、セ、ニ、チ、ヒ、ム、○、エ、レ
 荅麻林度阿没勒梅肉等ニ旃那葉及ヒ他品ヲ
 配シテ之ヲ製ス
 清凉ノ一良下劑トス
 ○日ニ
 一弓ヨリニ弓至
 或ハ一時毎ニ一大茶匙若ク

一食匙ヲ用ウ

○中和鹽類モ亦清凉ノ下劑ナリ
ハカリ
 酸ト飽合メ成ル
是ヲ中性鹽
ソウツト云ハ
 亞爾加利土ト酸ト飽合メ成
 ル
是ヲ中和鹽
殺清凉ノ效アリ
 小量ニ用井テ稀釋解凝シ
 大量ニ用井テ下利ヲナス
 或ハ利尿發汗ノ效ヲ
 奏スル者アリ
 乃チ其常用スル者ヲ撫テ左ニ列

芒硝
ソウバク、ソウバク
ス
ハ
ソウ
ウ
ハ
カリ
ト
酸
ト
飽
合
メ
成
ル
ハ
時
ニ
一
大
茶
匙
若
ク
一
弓
ヨ
リ
ニ
弓
至
或
ハ
一
時
毎
ニ
一
大
茶
匙
若
ク

カロクベルス。瓦老別兒名嘗テ硫酸ヲ以テ海鹽ヲ分析シテ始メテ此鹽ヲ得タリ。是曹達ト硫酸ト親和メ成ル者ナリ。形六角ニメ線條ヲ束ヌルカ如ク。透亮白色大小齊シカラズ。味清涼ニメ鹹苦ナリ。水ニ溶化シ易シ。又風化シ白色ノ粉末トナル。○一錢ヨリ四錢至ノ少量ヲ用井テ鮮凝發汗。利尿ノ效アリ。故ニ腸胃粘液ノ鬱蓄腸若クハ腸間膜腺ノ壅塞及ヒ之ヨリ發スル消食機虚弱。小兒疳疾黃疸水腫。聖京屈病等ハ苦味ノ

越幾斯劑ニ配用メ良ナリ。但此諸病ハ芒硝泉水ヲ服スルヲ勝レリトス。○半弓ヨリ一弓半至ノ大量ヲ頻服メ良性ノ下劑トス。粘液。胆液。汚物等ノ腸中ヨリ下泄セザルベカラサル者。或ハ粘液性。胆液性。聖京屈性等ノ間歇熱及ヒ稽留熱又蛔蟲ニ良效アリ。○蒸漏劑灌腸劑トシテ外用メ清涼分解ノ效アリ。○此鹽已ニ風化シテ白粉トナル者ハ其效未風化セサル者ヨリ烈ナリ。其未風化セザル者ハ結晶水ヲ含ムヲ以テナリ。故ニ三錢若クハ六錢ヨリ多カル

へカラズ ○加里鹽酸加里醋酸加里炭酸加里
 硝酸加里石灰水鹽酸加里爾藥鹽酸重土等ヲ忌
 ム。又硝酸銀硝酸瀕醋酸鉛醋酸瀕モ配伍スベ
 カラズ
 ○芒硝泉 温泉 ○冷泉 ○ガロイベルソウト、ベ
 エン、
 附録ニ出ツ
 孕礬酒石 シルハ、ス、ポトアサ、タルタリス、ヒッ
 リカニム、デ、リカ、ヒッ、タルタリス、ヒッ
 ア、カ、ニム、デ、リカ、ヒッ、タルタリス、ヒッ
 レ、カ、ニム、デ、リカ、ヒッ、タルタリス、ヒッ
 ヒ、カ、ニム、デ、リカ、ヒッ、タルタリス、ヒッ
 硫酸ト剥篤亞斯ト親和メ成ル。白色微透亮ニ

六角ノ兩頭尖レル小品。相聚リテ一片塊ヲ
 ナス。味苦鹹ニメ刺衝ス。風化セズ。冷水ニハ溶
 化シ難シ。熱湯五六倍ヲ灌ケバ能ク溶解ス。○
 此鹽ハ溶解シ難キヲ以テ。下劑トシ用ウルト
 稀ナリ。但腹臍ノ粘膠或ハ閉塞及ヒ之レヨリ
 生スル間歇熱。消化不良。黃疸水腫等。如キハ、
 苦味解凝藥或ハ峻下泄藥ヲ加ヘ用井テ效ア
 リ。○解凝ノ效ヲ要スルハ一月ヨリ三月至散
 若クハ溶劑トシ与フ。下劑トメ二錢ヨリ半匁
 至ラ与フ。○硝酸硫酸酒石酸石灰及ヒ石灰製

大馬路生藥
 卷十二

劑鹽酸重土醋酸瀕鉛糖消酸銀硝酸瀕等ヲ配

スルヲ忌ム

瀉利鹽

セシルハス、マガ子シア○サル、エブサメン

テズソフウトルシエーレ、マダグ子シア○ソウト

硫酸ト苦土乃麻屈ト親和メナル、四角ノ結晶

ナリ、味苦クメ刺衝ス、能ク水ニ溶化ス、精製ノ

者ハ風化セス○其效孕礬酒石ノ如ク、小量ニ

与テ解凝利尿ノ效アリ、大量ニ用井テ下利ノ

效アリ、壅閉鉛毒疝腸痛、痙頓腸墜等ノ如キ速

效ヲ要スル者殊ニ此鹽ヲ良トス、就中箱頓腸

墜ハ諸下劑ヲ與フト雖直下ニ之ヲ吐出スル

トアリ、此時ニ方テ瀉利鹽ヲ小量ニ頻服セシ

ムレバ、味美ナラスト雖尚能ク容受ス○大量

ニ長用スレバ、及テ大ニ腸ヲ虚弱シ、腸ノ粘液

脱亡メ、竟ニ慢性下利或ハ頑固ノ便秘等ヲ發

ス○瀉利鹽稀溶水殊ニ苦鹽泉水ヲ某ノ主劑

ニ兼テ、時々飲服セシメ、閉塞ヨリ發スル慢

性諸病ニ甚峻效アリ○下劑ハ半ヲヨリニ

至、香嵐水ニ溶化シ頓服シ、或ハ分服ス、解凝利

尿ノ劑トメ、一日ヨリ三日至ヲ用ウ、灌腸劑ニ

ハ半ヲヨリニ至ラ加ヘ用ウベシ
 ○加里炭酸
 加里硝酸加里硝酸
 安謨尼亞鹽酸重土鹽酸
 加里爾幾醋酸安謨尼亞
 醋酸加里醋酸曹達醋酸
 頭鉛糖等ヲ配スルヲ
 忌ム

○苦鹽泉 温泉 ○冷泉 ○ビテル
 テレソウト、ベハテン

酒石 デコウ 附録ニ出ツ
ルシペルタル キリス ラス ボト アサ ケレ モル エ イ

葡萄酒ヲ釀造スル桶ノ裏面ニ生ヌ其精製セ

此者ヲ粗酒石ト云其粗ナル者ヲ温湯ニ溶
 化シ穢物ヲ去リ微火ヲ以テ結芒セシム是ヲ
 純精酒石ト云其形小ニメ白色微透亮味酸
 ヲ風化セズ冷水ニ溶ケ難シ○清涼下劑
 一良藥タリ故ニ胆汁熱ニ稱用ス○下利ノ效
 ヲ要スルニハ一弓ヨリ一弓半至散若クハ孟
 屈設爾トシ用ウ又半錢ヨリ二錢至ヲ用井テ
 清涼解凝利尿ノ效アリ○酒石ハ水ニ溶化シ
 難キヲ以テ一般ノ通用ニハ大ニ嫌ナリ故ニ
 世々此質ヲ變メ用井易カラシメシム欲ス是

於テ是鹽ニ蓬砂ヲ親和セシメ。孕礪酒石ヲ
 製シ用ウ。太風化シ易ク。又能ク水ニ溶化ス。下
 利解凝ノ外。更ニ利尿ノ峻效アルヲ以テ。多ク
 利尿劑トシ用ウ。故ニ利尿劑門ニ詳説ス。
 孕礪酒石タルトラス。ポトアス。タルタリ。サラス。タルタリ。
 酒石酸ト利尿亞斯ト互ニ相飽合メ成ル一種
 中性鹽ニメ。其形小粒ノ如ク。或ハ四面直角
 晶ナリ。味苦ク。爽快ナリ。風ヲ見テ流動シ。
 能ク水ニ溶化ス。○緩下ノ效アリ。旃那及ニ華

爾斯下劑ニ加用メ。之カ為ニ發スル所ノ腹痛
 ヲ防キ。且其效ヲノ迅速ナラシム。又疏利解凝
 ノ效アリ。故ニ腸胃熱。胆液熱。粘液熱等ニ殊效
 アリ。○痔疾殊ニ盲痔ニ用井テ。肛門ノ燒カ如
 キ苦楚ヲ減シ。焮腫アル痔囊ヲ薄クシ。腹中ノ
 煩悶飽滿及ヒ血液ノ頭ニ逼迫スルヲ減ス。○
 吐血及ヒ黒胆液吐病ニ驗アリ。又能ク嘔吐ヲ
 鎮靜ス。○非爾德武蘭度名ハ心氣抑鬱。諭ヘバ
 悲哀苦悶。忿怒等ヨリ發スル諸症ノ要藥トス。
 實ニ此ヲ如キ心氣抑鬱ノ時發スル口中ノ乾

燥ヲ速ニ消除シ、兼テ胃部ノ壓迫困重及ヒ煩悶ヲ去ル。○溶劑トナシ用ウルハ、半弓ヨリ一弓至○山酸、植酸、麻、濕、矢、亞、重、土、石灰等ハ皆此鹽ヲ分析ス、故ニ配伍スルヲ忌ム。
 ○酒酸加里曹達タルトサラス、ホットアス、エト、ソウト、アイ、ン、ス、テ、ソ、ウ、ダ、ル、ボ性效本條ニ同シ。
 ○燐酸曹達ホス、ハス、ソウ、ダ、ル、ボ性效本條ニ同シ。○西品共ニ味不佳カラザルヲ以テ、小兒及ヒ藥味ヲ嫌惡スル輩ニ用井テ

良ナリ
 緩性下泄藥
 效力緩ニメ下利ニ行アラシムルノミ、又能ク大便ヲ軟ニシ、腸ヲ滑ニシ、酷厲毒ヲ包攝メ其腸ヲ刺戟スルノ已甚ナルニ由テ發スル搐搦状ノ感傷ヲ靜定ス。○緩性下泄藥又之ヲ區分メ三種トス
 第一脂油質類 緩和劑ノ條ニ出ツ
 第二中和鹽類 清涼下泄藥ノ條ニ出

第三即本條ノ滿那蜂蜜ノ類ナリ

滿那羅蘭通名

歐羅巴ノ暖地ニ生スルコエスセン樹ノ一種林氏ノ所謂アラキシニス、オルミズ一名「フル、ロ」トシテホリ「樹」ヨリ取ル者ナリ○此物夏日自然ニ樹ヨリ流滴シ、或樹ヲ鑽刻メ其口ヨリ出ツル液ナリ、味甘ニメ日ヲ見テ乾固ス、其乾固セル者ヲ採収ス○滿那三種アリ、其第一種ハ粒狀滿那ラクリミス○ヘコルレデ、マンナ

其形粒狀ヲナシ、乾固白色ニメ樹皮ヨリ自然ニ滲滴スル者ノ如シ○第二種撰品滿那マンナハ、ペルクタ、マンナ○オイトゾノテ、マンナ○乾固輕脆片々相疊リテ一片ヲナシ、大小厚薄齊シカラス、大約白色淨潔光輝アリ、間々小筒ヲナス者アリ○第三種尋常滿那マンナハ、リセナ○カラフ、藥肆ニ鬻ク所ノ者ニメ、多ク穢塵ヲ交ス、黃色或ハ黒色、粘稠ナル大塊ヲナス、藥肆此内ニ就テ乾固白色精潔者ヲ撰ミ、命スルニ撰品滿那ノ名ヲ以テス、其穢塵アル

者ヲ粘膩滿那マシナカ○マシナカト名
 ク○一種蜜糖シロ甘沒シロ扭シロ三味ヲ合メ偽造ス
 ル者アリ之ヲ真品ニ較フルニ真好品ハ輕ク
 乾テ黃白色或ハ赤色嘔スベキ甘味且蜜ノ氣
 アリ冷水三倍若クハ温湯等分ニ溶解ス偽品
 ハ否ラズ○福烏フクウ而箇魯コ華烏カ鳩林ト同ニ彌ミ箇コ爾ル
 子ス同ニ底チ奈ネ而ニ度ド同ニ等ト滿マン那ナヲ分析シ甘素カンソ是レヲ滿マン
 云トト護ゴ謨モ狀トハ越ト幾キ斯ス分ント粘稠ニ嘔スベキ
 質トノ三ニハ者ヲ得タリ是ヲ此成分トス下泄
 ノ効蓋シ此三者ニアリ○緩和包攝下利ノ效

アリ故ニ腸胃ノ輕嫩衝腸胃熱シ聖シ京シ僣シ熱シ呼吸
 器ノ嫩衝妊婦產婦勞瘵及ハ小兒等ニ用非テ
 良ナリ○滿那ハ其性風氣膨脹苦悶等ヲ發シ
 易シ故ニ依シ神シ昆シ垓シ兒シ子宮病刺衝質ノ人虛弱
 質ノ人ニハ喜シテ用ウベカラズ強ヒテ之ヲ
 用非ント要セバ香竄驅風ノ品ヲ配スベシ但
 嫩衝ノ景况アル者ハ之ヲ配スルヲ禁ス又酒
 石ハ能ク滿那ノ害ヲ制ス故ニ滿那ヲ用ウル
 ニハ之ヲ加ヘテ良ナリ譬ヘハ旃那シ條シ下シ
 舉ル彬能齊シ瀉利水ノ方ノ如シ○孟シ僣シ設爾シト

本草綱目卷之九
 卷之九

シ。大人ハ日ニ一匁ヨリ二匁至。小兒ハ一錢ヨ
リ二錢若クハ一匁至。又舍利別ハ日ニ半匁ヨ
リ一匁至。

補 粘膩滿那ヲ精製スル法

墨林騏イリヤハ舍密書ニ曰。滿那ヲ攝氏ノ驗温器
六十度ノ温湯ニ溶シ。布巾ニ濾過シ塵穢ヲ
去リ。獸炭イヌコヲ加ヘ。靜置スルハ七時ヨリ十時
ニメ精密ニ上清ヲ分注シ。火ニ上ヒ。攝氏ノ
驗温器九十度至。煮沸シ。水氣ヲ蒸散シ。水面
厚膜ヲ結フニ至ル。厚板上ニ鎔注スレバ冷

水ヘテ晶塊ヲナス。○又法。滿那ノ粘膩甚キ者
ハ。稀硫酸水酸各者少許ヲ加ヘテ研磨シ。靜定
スルハ八分時ニメ。水ヲ加ヘ溶解シ。石灰乳
少許ヲ投メ。酸ト飽合ヒシムレバ。硫酸加爾
幾トナリテ沈澱ス。其時上清ヲ分テ取リ。獸
炭ヲ加フルハ法ノ如クスレバ。臭色共ニ脱
ス。是ニ於テ法ノ如ク煎メ。鍍錫葉板ヲ窪
メテ樋ヲ作り。之ニ鎔注スレバ。通常ノ管狀
滿那ノ如ク。一面ハ凹シ一面ハ凸ナル形ヲ
ナス。其質甚ク精美ニメ。研末シ易ク。下利ノ

效モ亦損スル下夫シト云

蜂蜜ホーニニフ蘭

蜜蜂ハチ花ノ蜜槽ヨリ精液ヲ吮ヒ採ル来リテ
蜜脾ノ内ニ貯ル者。是ヲ蜂蜜ト云○上好ノ
品ハ蜜脾ヨリ自然ニ流滴スル者ナリ。白色ニ
微透亮氣味甘美ニ糖ノ如ク。怡マトノ流
動シ能ク水ニ溶解ス。是ヲ白蜜又處女蜜ト云
○又一種蜜脾ヲ摘テ搾リ製スル者アリ。稠厚ニ
粒状ヲナシ茶褐色ニ不佳ノ氣アリ。能ク
水ニ溶解ス。是ヲ黃蜜又尋常蜜ト云○緩下解

疑痰效アリ故ニ粘液性聖京セント低性ニ焮衝性
ノ呼吸器病或ハ腹肚閉塞及心ノヨリ發スル
諸病論ハ黃疸。蛔蟲等ニ效アリ。又油類ト伍
用メ結石病ニ傍發スル堪ヘ難キ疼痛ヲ寛快
ス○外用ニハ撒爾ル菲亞ア沒藥等ヲ加ヘテ含漱
劑トナシ口中ノ矢シ况ケ爾ル倍ガ苦病ニ用井咽喉焮
腫ニハ緩和消焮劑ヲ加ヘ用井又毳布トシ用
井テ能ク腫瘍ヲ軟和釀熟シ又灌腸劑トシテ
大便ノ通利ヲ促ス○溶劑。舐劑。孟シ屈ル設爾トシ
用ク。半弓ヨリ二弓至含嗽劑灌腸劑等ハ一弓

ヨリニ至
○屋施茂兒オキシンオキシメルシ
蜂蜜 三勺 醋 一

右二味合シ煮テ適度ノ稠ニ至ル
清凉ニメ稀釋祛痰ノ效アリ故ニ呼吸器ノ癩
衝病ニ良驗アリ又諸孟屈設爾ニ加ヘテ味ヲ

佳好ニス ○一勺ヨリニ至

補 墨林イロノキ合藥舍密屋施茂兒ノ方

蒲萄酒醋 百四錢 白蜜清淨者 〇三

右重湯煎ニテ温メ蜜能ク溶解スルヲ度ト
ス煮沸スルヲ勿レ

強壯下泄藥

強壯下泄藥 下利ノ力前本諸篇ニ

掲ル者ヨリ多クメ加之腸胃ヲ連綿

強壯スルノ性アリ故ニ翅腸胃ヲ

弛緩セシメザル者ニテス尚且行

藥料ニ書物ヲ泄除スルノ後却テ腸胃ヲ強壯

大黃オウゴン故ニ腸胃弛緩ニ由テ下利スル者

及左下利連綿止ハル者ヲ停住ス

○此ノ如キ性效ハ獨大黃オウゴン有ス

ル所ナシ大學師オウゴン布涅爾オウゴン我

内地ニ産スル品ヲ以テ良代藥ヲ得
ント欲シ、ベクベリチス根、羊蹄根
ヲ試用シテ以テ同効ノ者トス

大黃

ラバダキス、ルイ、羅

藥肆ニ鬻ク者、一種アリ、一、印度産者、名、諸尼

利ト云、一、魯西亞産ト云、魯西亞産者、功効

○キム、○レウム、○シウム、○ロキム、○シキム、○者、上、品、ト、ス、○

ウム、アウストラビ、ドミ、又、ウム、音モチ、ワ

ルリシト、ト稱スル宿根草ヨリ採ル者、ラ良品

トス、此草東南亞細亞ノ牙、而白群山ニ産ス、之

ラ印度大黃ト云、大塊ニメ外皮ヲ削去レバ、外

面黄色ニメ、維腹蘭赤ヲナス、内面ハ黄赤錯綜

スル、一、殆、ト肉豆蔻ノ如シ、○魯西亞産ノ者ヲ

最上品トナス、其故ハ、大黃外國ヨリ魯西亞ニ

来レバ、莫斯科、舊都、或ハ、伯德、球、勃、爾、孤、新、都

ニ於テ、其良者ヲ撰ムヲ以テナリ、其形楕圓ニ

メ扁平、或ハ圓ナリ、其塊前種ヨリ大ニメ一孔

ヲ穿ツ、○兩品共ニ嘔スベキ苦味アリ、又一異

不佳ノ氣アリ、咀嚼スレバ、津唾黄色トナル、研

末スレバ、黄赤色ニメ、光澤アリ、經久ノ品ハ、效

カヲ脱ス。又其量輕ク其色淡白ニメ腐穢スル者蟲蝕アル者ハ用ウベカラス○大量ニ用井テ下泄ノ效ヲ要スル症ハ左ノ如シ

一第 只大便ノ通利ヲ増シテ衰弱ナカラシ
要スル者即虚弱ノ初生兒第一道粘液鬱蓄若クハ酸敗液アル者嬌脆薄弱知覺質ノ輩殊ニ腸胃虚弱ニメ大便秘結ヲ病ミ易キ者依剥昆垓兒子宮衝逆黃胖病等ニ用井テ良ナリ
二第 粘液熱神經熱等ニハ苦味強壯解凝驅熱ノ藥品ニ加ハテ良ナリ

三第 腸中ニ穢物アリテ下利或ハ疝痛ヲ發スル者或ハ其穢物ニ由テ前症持スル者及ヒ痢病霍亂等ニ良ナリ是單ニ下利ノ效ノミナラズ更ニ腸胃ヲ強壯スルヲ以テナリ故ニ痢病ハ其疼痛窘迫已ニ停ミ腸胃ノ衰弱ニ由テ下利尚住マザル者ニ殊效アリ
○小量ニ與ヘテ強壯ノ効ヲ奏スル症左ノ如シ
一第 胃虚腸弱及其ヨリ發スル食欲缺乏消化不良酸敗液風氣大便不利等ナリ

本草綱目卷之九

第二 黃疸ニハ苦味劑ヲ加用メ腸胃ノ官能怠慢
 ヲ治スルノミナラズ尚且粘液滯積ヲ預防ス
 第三 小兒諸病ノ腸胃ノ虚弱及ヒ官能萎衰ヨリ
 發スル者就中諸厄利病ノ初起腹軟ニメ膨脹
 シ大便次序ナク且惡臭アリテ貪食飽クナ
 ク酸敗液粘液鬱積等ノ諸症アリテ皆味解
 凝強壯藥ヲ加ヘ用井テ殊效アリ
 第四 腸ノ嫩衝及ヒ腸ノ感觸過敏ノ者或ハ痔疾
 ノ如キ局處ノ充血アル者又内臓ノ器械ノ缺
 損アル者即瘰癧性ノ硬結腫癌腫等ニ於テ用井

テ害アリ○下劑ハ患者ノ年紀ニ隨テ十以ヨ
 リ一錢至散九若クハ舐劑トナシ用ウ又浸劑
 ハ二錢ヨリ三錢至浸出メハ弓ノ液ヲ取ル若
 下利ノ效尚峻ナラン一ヲ要セハ霸王鹽酒石
 甘瀕等ヲ伍用スベシ○強壯劑トシ用ウルハ
 每服二瓜ヨリ四瓜六瓜至日ニ三四次
 ○酒製大黃丁幾サチンクレイ、ヒノ大黃ニ
 益智一錢 燒酒者十五度白葡萄酒是斑牙
 右四味混合シ浸出七日漉メ滓ヲ去
 ル○此劑及ヒ自餘大黃丁幾ハ共ニ強壯劑ト

シ用ウ。下劑トシ用ウルハ稀ナリ。○一錢ヨリ
四錢至

○大黃丁幾チンキ

大黃粗末者 燒酒者十五度

右浸出スル

一六日 ○一錢ヨリ二錢至

○水製大黃丁幾チンキ

シム、レイ、ア
キア、シム、ア

大黃 酒石鹽 沸湯

右大黃ヲ沸湯ニ

浸出シ。酒石鹽ヲ加フ。○大約強壯劑トシ用ウ。

但小兒ノ酸敗液ニ緩下劑トシ用井テ良ナリ

○大人 每次一ツヨリ一錢至ヲ頻服ス。小兒

ハ一茶匙ツ、與フ強按大劑利設藥性論ニ曰

神初大黃細イ仁羅ト云、藥局ト、各同シカラズ。

方漏載スル所イエ羅ト云、藥局ト、各同シカラズ。

酸加里三錢熱湯十者ハ大黃細到者一ツ半許

此藥液十ツ中ニ、桂枝水二ツ右浸出スル一ツ六時許

之大黃舍利別レシイレ羅ト云、藥局ト、各同シカラズ。

○大黃 舍利別レシイレ羅ト云、藥局ト、各同シカラズ。

殊ニ小兒ニ用ウルニヨシ。○二錢ヨリ一ツ至

ヲ頓服ス。或ハ二次三次ニ分テ服ス。林爾里

○刺萩爾板里混 増補依百乙藥性論ニ曰、一舍密家大黃ノ效

分ヲ植物加里ニ歸シ之ヲ刺萩爾萩里望
 名クセント欲シ硫酸ヲ以テ大黃ヲ分析ス硫
 酸刺萩爾萩里望ヲ得タリ硫酸刺萩爾萩里
 望ハ赭色ニノ光芒ヲ混ズ其氣大黃ノ如ク
 味瀟ニメ刺戟ス水ニ溶ケ易シ○此素ハ大
 黃ノ鹽分粘分ヲ除キ去ル者ナリ大凡大黃
 ハ其效カ各同シカラザルヲ以テ其量モ亦
 一定ナルヲ能ハズ故ニ子細ニ此素ノ性效
 ヲ檢査ス以テ醫用ニ供センヲ要ス
 ○刺萩爾萩里望ヲ製スル法

墨林騏舎密書ニ曰彌郎是地ノ合藥家奈
 侖硫酸刺萩爾萩里望子ヲ製ス其法支那大黃
 六匁ヲ極末シ常水八匁ニ硫酸四錢ヲ和シ
 タル者ニテ煮ルル一時許絞リ濾シ其滓ヲ
 又水六匁ニ硫酸二錢ヲ和シタル者ニ煮テ
 絞リ濾シ其滓ヲ乾セバ滓量五匁トナル○
 上ノ二煎液ヲ合シ放冷シ木棍ヲ以テ徐々
 ニ手ヲ休メス攪拌シツテ新製生石灰三匁
 ヲ加フレバ美黄ノ液忽變メ血紅色トナル
 之ヲ靜定スルル一日許ニシテ渣脚器底ニ沈

天馬見藥生論 卷三

殿ス、此時上清ヲ注キ去リ、日ニ晒シ乾セバ、
澱渣六ヲ得ルナリ。此澱渣ニ亞爾箇兒三
十六度者四七ヲ注キ、火温ニテ浸出スル
一時許、濾過メ又其滓渣ニ常ノ亞爾箇兒ヲ
加ヘテ再浸シ、濾過メ兩液ヲ合シ蒸餾シ、亞
爾箇兒五七ヲ受器ニ留受シ、鍋中ニ殘ル所
ノ液ヲ熬乾スレバ、赭色ニ光芒アル物ニ
錢ヲ得ルナリ。其氣大黃ノ如ク、味瀋ニ刺
戟シ、能ク水ニ溶化ス。○奈仁ノ說四アリ、其
一ニ云、諸種ノ大黃各大小ニ其狀ヲ異ニス。是

醫ノ大黃ヲ用井テ、每ニ其量ヲ定ハルコト能
ハザル所ナリ。其二ニ云、合藥舖ノ同方ヲ作
ル者、此素ヲ用ウル代ハ、皆同一ニメ差異ナ
カルヘシ。其三ニ云、大黃ハ初生兒ニ用ウル
コト能ハズト雖、此素ヲ溶解メ初生ノ胎糞ヲ
下スニ甚タ用井易シ、其量一二分ヲ以テ足
レリトス。其四ニ云、此元素ハ大黃ノ木分粘
分ヲ去ルヲ以テ良トス。此二分ハ縱令害ナ
キモ既ニ全ク無用ニ屬スルヲ以テナリ

峻下泄藥

大ニ腸ノ筋膜神經尿管腺等ヲ刺戟
衝動シテ蠕動機ヲ勸厲シ腸液分泌
ヲ增多シ血ノ腸ニ流注スル勢ヲノ
強カラシメ以テ水瀉溏泄ヲ發スル
者之ヲ名ケテ峻性下泄藥ト曰フ此
品窘迫腹痛ヲナシ時ニ攣急下血等
ヲ併發ス蓋シ其窘迫腹痛攣急下血
等ノ有無ハ藥性ノ寬猛分量ノ多少
及ヒ患者ノ資質ノ強弱等ニ由テ各
自差別アルナリ○大量ノ峻下藥ヲ

以テ感觸過敏ノ者ハ用カレバ猛
以腸ヲ刺戟シ次テ激衝ヲ發シ竟
斃ルニ至ル○峻下劑ヲ久服スル
ハ腸ノ刺衝機衰耗シテ頑固ニ便閉
ヲ生ス○此劑ハ特腸ノ筋膜ヲ刺衝
スルノ力ナラズ更ニ腹部ノ尿管神
經腺等ヲモ亦刺戟衝動スルハ故ニ
慢性ノ諸病殊ニ其因腹部ニ在ル者
ニ用井テ效アリ

衰弱及官能怠慢ヲ兼併セラル者ニ
 宜シ
 第二腸胃ノ粘稠液ヲ驅逐スル或各其粘
 稠液ニ由テ生スル所ノ諸病即消化
 不良。蛔蟲鬱憂病。依利昆垓兒。子宮病
 等ヲ治スル此藥ハ淋瀝ノ諸病ハ神速
 第三肚腹ノ神經血管等ハ運營怠慢
 萎衰及亡之ニ由テ生スル諸病
 即門脈。肝。脾。痔。脈等ハ壅閉。月經不順
 或ハ經閉。痔疾。慢性神經病。下肢麻木

膀胱。麻痺。直腸。麻痺等ニ之ヲ用ウ。但
 此諸病ハ都テ下利ノ效ヲ要セス。ハ
 多ク衝動ノ能ヲ貴フ。大約小量ヲ頻
 服スルハ。此故ヲ以テナリ。○一種肚
 腹ノ因ヨリハ發スル意識病ニハ。大
 量ヲ用井テ屢效ヲ見ル。アリ
 第四腺。水脈。吸。尿管等ノ。虚弱。若クハ官
 能。萎衰ニ因テ生スル諸病ニ效アリ。
 殊ニ腹水病其人強壯多液運行遲慢
 ナル者ニ用井テ效アリ。然レ始。先利

尿發汗ノ品ヲ用井テ絶テ效ナキ時
方纔テ下劑ヲ用ウベシ。又胸水。腦水
等ニモ亦效アリ

○小兒老人。刺衝質ノ入。神經知覺銳
敏ノ者。熱病。厥衝病。殊ニ内臓。厥衝。腹
部ノ充血。失血。殊ニ崩漏。妊婦。内臓器
械。缺損等ハ共ニ用井テ害アリ

旃那

旃那ホリア。セレン。蘭
旃那ハ。灌木ニメ阿没勒ノ属ナリ。小亞細亞アジヤ國
阿刺比亞アハリア同陀。入。多。同。等。ニ。産。ス。○藥局ニ販ス

ル者數種アリ。第一種ヲ亞歷山多兒旃那アレスサンダエ葉ト
云。葉形小長卵圓ニメ。末尖リ。灰白黃綠色。苦味
衝動。嘔スヘキ。一種不佳ノ氣アリ。是カスシア。
ランセオラタホル、カリト樹一名カスシア。
ス。パルソノ葉トリ。○第二種ヲトリポリタ
トンセ旃那ト云。葉ノ形大ニメ。尖ラズ。其質粗
糙ニメ。暗綠色。是カスシア。オブ左サタ。ハイニ
ト樹ノ葉ナリ。○第三種ヲ阿刺比亞アハリア又東印度
旃那ト云。最下品トス。形前種ヨリ長狹ニメ。尖
リ。氣モ又微サリ。是カスシア。アモチホリアタ

テリレ^レイ^レ樹ノ葉ナリ○大約旃那ハ多ク枝朶
 莖莢等ヲ混ス。或云旃那ノ腹中鑽痛ヲ發スル
 ハ。此枝朶莖莢ニアリ。子細ニ之ヲ撰去スベシ
 是杜撰ノ説ノミ。如何トナレバ佛郎西ノ醫
 家ハ莢ヲ以テ葉ニ代ヘ用ウルヲ屢コレアリ
 旃那ノ腹痛ヲ生スル所以ノ者ハ。輕々ニ浸劑
 トナスベキヲ。其法ノ如クセズメ却テ煎服ス
 ルノ惡習ニ坐スルニ^ミ○旃那ハ峻下藥中ノ
 最緩ナル者ナリ。故ニ適度ノ瀉下ヲ要スル
 者ニハ之ヲ用ウ。但動モスレバ腹痛ヲ發ス知

覺銳敏ナル者ハ。更ニ嘔吐ヲ發ス。故ニ茴香ノ
 如キ香竈藥ヲ加ヘ用井テ。其害ヲ防クベシ○
 散劑ハ一タヨリ一錢至。但喜ンデ浸劑ヲ用ウ。
 浸劑ハ一錢ヨリ四錢至。浸出シ。漉メ其液六
 寸ヨリ十二寸ヲ取^ル用^ス。孟^孟酒^酒始^始爾^爾ニ^ニ
 ○瀉利煉膏^エレ^レク^クト^トハ^ハ羅^羅ハ^ハ。靴^靴ヲ^ヲ去^去リ^リ。○
 ○旃那舍利別^セン^シ。ト^トハ^ハ。小兒^{小兒}ニ^ニ用^用井^井緩^緩下^下ノ
 一良藥^一タ^タリ○二錢ヨリ一^一寸^寸至^至
 ○複方旃那^複方^方旃^旃那^那。丁^丁幾^幾タ^タチ^チ○[○]キ^キヲ^ヲシ^シル^ル。コ^コト^トホ^ホシ^シ

本草綱目卷之三
 旃那

數方下就中安斯の爾の單の局方二記スル者。
 最簡便ノ方トス。故ニ此ニ揭ス。旃那葉二弓
 乾葡萄半北。木香者官園。胡荽子半過ア泥子子ス
 各一燒酒三北出。右六味合メ時々振蕩
 浸出スル一八日。漉過シ滓ヲ去リ貯フ。○一
 弓ヨリ二弓至。或ハ單用シ或ハ孟僮シ設爾ニ和
 シ用ウ一。○
 彬能齊シ瀉利水二アク。ラキ子シシシスノ羅ノ。長ノ隋ノ用ル。
 旃那葉三弓。乾葡萄半弓。胡荽子二錢。○
 純精酒石半弓。右四味常水ニ浸出スル

法ノ如ク。漉過メ其液一匕ヲ取リ更ニ上好
 滿那ハ弓ヲ加フ。○服量一弓ヨリ三弓至。
 葛カ荅ダ兒ル質ト捏セン子。近今ハ舍密家羅雜
 乙窟イ涅ノ名ト歌カ咨シ謁ル爾ノ列レ。同ク等ク旃ナ葉ヲ分シ析シテ
 下利ノ效分テ得テ。是ヲ葛カ荅ダ兒ル質ト捏セン子云ク。黃赤
 色ニメ結晶セズ。氣味不佳ニメ苦ク嘔ヲ發ス
 ベシ。
 盧ル薈ハアロエ
 數種ノ龍舌草ヨリ出ル華爾斯ノ樣ノ凝液ナリ。
 大塊ニメ茶褐帶綠色。氣味不佳ニメ峻苦。○藥

鋪ニ鬻ク者四種アリ第一種ヲ玲瓏盧薈アロエト云
クダ子ニテアロエルシケト云是最純精ナル者ナ
リ大塊ニメ黄赤色角端透亮破碎スレハ太光
滑ナリ研末スレバ黄金色トナル味酷苦氣没
藥ノ如シ○第二種ヲ平格多里島盧薈アロ
コトリナソト云平格多里島ニ出
ルヲ以テ名ク極テ純精殊ニ通用ノ品ナリ玄
紫色ニメ光輝アリ研磨メ黄金色トナル且光
彩アリ前種ノ如ク端角透亮ナラズ能ク尋常
燒酒ニ溶化ス氣味前種ニ同シ○第三種ヲ尋

常盧薈アロエ子コハミススヘハチカロト云
乾固暗黒色ニメ重ク光輝透亮ハ前ノ二種ニ
及ハズ氣味極メテ苦ク太不佳ニメ嘔スベシ
○第四種ヲ馬盧薈アロエト云カバルト云
是數種ノ盧薈中最麤惡ノ品トス黒色ニメ臭
氣極メテ惡ムベク更ニ多ク塵土ヲ交ス藥用
ニ堪ヘズ○盧薈ハ其效力遲ニメ胃ト小腸ト
ヲ通行スルノ間ハ其效カラ呈スルトナキト
殆ト溶化セサル者ノ如ク大腸ニ至リテ其感
殊ニ甚シ故ニ大腸ノ官能萎衰シ若クハ弛緩

セルニ因テ發スル便秘ニ殊效アリ。此症多ク
坐ノ業ヲ操ル者ニ屢之アリ。○腸ノ官能萎衰
及ヒ衰弱。血行遲怠。粘液鬱積等ヨリ發スル腹
部ノ閉塞ニ效アリ。又苦味解凝藥ヲ加ヘテ消
化不良。黃疸。水腫ニ用ウ。○粘液質ニノ皮膚蒼
白色。動作倦怠。肚腹ノ血行遲怠。粘液鬱積。子宮
虛弱。若クハ子宮ノ官能萎衰セル等ヨリ來ル
經閉ノ一良藥タリ。但其人強壯多血ニノ經閉
ノ為ニ他ノ貴要ノ部ニ失血。瘀衝。血液輻湊等
ヲ發スル者及ヒ妊婦等ニハ害アリ。○盧薈ヲ

久用スレバ絶テ痔疾ノ素質ナキ人タモ。尚之
ヲ將出スルヲアリ。況ヤ其僻アル者ヲヤ。故ニ
痔血閉止ニ因テ發スル諸病ニ用井テ一良藥
トス。○夫盧薈ニ發痔ノ效カアルヲ疑フヘキ
ニアラスト。雖然氏之ヲ用ウルノ地位僅ニ一
ニラ限ル。乃運_レ行遲慢ノ粘液質ノ人。痔疾已ニ
常習トナリ。後來他ノ病因ニ由テ。其痔閉塞ス
ル者。或ハ痔脈ノ官能萎衰ノ閉塞スル者ハ。共
ニ盧薈ヲ稱用スベキ一大的症ナリ。但壯年充
血衝動質ノ者ハ用井テ害アリ。又盲痔ハ之ヲ

用ウルヲ禁ス。何者此痔徒多ク焮痛アリ。今又
 盧薈ヲ用ウレバ、血液却テ此ニ逼迫シ、疼痛加
 重ノ危嶮ノ諸症ヲ誘發スレハナリ。又積年ノ
 痔疾ヲ病メル人、已ニ耆老ニ及ンデ血液ヲ釀
 成スルノ太乏ク、且尿管虚衰ノ其痔閉収スル
 者ハ用井テ害アリ。○外用ノ纖維弛緩シタル
 不潔ノ潰瘍及ビ腐骨疽ニ效アリ。○丸劑トナ
 シ用ウ。三ムヨリ三十ム至。外用ニハ散末若ク
 ハ軟膏トナシ用ウ。

○盧薈丁幾 チンキエス

盧薈 率格多里那產 者極末一 燒酒 十五度 者八 石浸

○出三日 一錢ヨリ三錢至

○複方盧薈丁幾 チンキエス 格碌莖 チンキエス 篤丁幾 チンキエス 分各等

○水製盧薈越幾斯 チンキエス 外用ノ矢況兒倍苦瘍ヲ淨潔ス

○石三味混合 ○二十滴ヨリ四十滴至ヲ服ム。又

○盧薈野 羅 水 各適 右盧薈ヲ水ニ溶

本草綱目卷之三十一 盧薈

化シ。温處ニ置キ浸出スルヲ三日。漉過シ滓ヲ去リ。火ニ安シ水氣ヲ蒸散シ。越幾斯ノ稠ニ至ル。○十氏ヨリ十五氏至○或云此劑ハ腹痛ヲ

起ス。盧薈ヨリ微ナリ

○哥西亞丸

盧薈越幾私シ。蘓甘沒ト。丁香油ニ錢。右研和シ。

格碌董薦一。丁香油ニ錢。

○蜂蜜ヲ加ヘ丸トナス

○律比丸

盧薈越幾斯ニ。沒藥ヲ。雜腹各蘭半。

舍利別適宜。右丸トナス。○每服十氏ヨ

リ二十氏至。日ニ二次

○盧胆驅蟲膏

盧薈越幾斯研末者。煉熟并膽石腦油。各

家猪脂仁。右煉合軟膏トナス

○臍圍ニ塗擦メ驅蟲ハ效アリ

藥刺

巴ヤ。チチ。キキ。スス。蘭蘭。○肚圍ニ塗

アナ。一一。名名。イイ。ホホ。ムム。アア。シシ。一一。デデ。アア。ナナ。トト。云云。宿宿。根根。草草。ナナ。リリ。花花。鼓鼓。下下。花花。如如。キキ。蔓蔓。草草。ナナ。リリ。牽牽。牛牛。此此。物物。默默。時時。科科。

本草綱目卷之三

卷之三

國ノ山中ニ生ズ。根ヲ藥用トス。此根及楸刺ハ
 是^名班^地和^名國^名歇羅屈縷斯。同^日リ吾邦ニ轉輸ス。林
 氏ノ所謂コヤホル^ル也。ヤト^スハ^強按^紫下
 稱スル者ニアラズ。○根ハ楮圓ノ塊ナリ。或ハ
 全根ナルアリ。或ハ斜断ナルアリ。乾固ニシテ重
 ク華爾斯多シ。外面ハ皺紋^ル暗茶褐ナシ。微
 シク黒色ヲ帶タル皮ヲ以テ覆ヌ。内面ハ灰白
 色ニシテ黒色ノ線條錯雜ス。氣味共ニ刺衝ノ嘔
 スヘシ。○藥刺巴ハ色黒ク量重キ者華爾斯尤
 多シ。下利ノ效分ハ此華爾斯ニ^アリ。故ニ華爾

斯多キ者效力愈烈ナリ。○下劑トシ用井テ運
 行遲慢ナル粘液質ノ人。久年腸ニ鬱蓄セル粘
 液ヲ泄除ス。故ニ腸蟲殊ニ饒蟲ニ甘瀕ヲ伍用
 ノ良驗アリ。又水腫ニハ孕鹼酒石ヲ配伍メ佳
 ナリ。○小量ニ用井テ衝動ノ效アリ。乃チ腸ノ運
 動怠慢及ヒ萎衰閉塞等ヨリ發スル諸病諭ヘ
 ハ經久ノ間歇熱腸間膜腺閉塞及ヒ之ヨリ發
 スル諸厄利病疳勞等ニ效アリ。○導泄劑トシ
 療癰性ノ經久皮病或ハ腦水腫ニ稱用ス。○緩
 下ノ效ヲ要セバ大人ニハ新研末八瓜ヨリ十

氏至小兒ハ五氏ヨリ六氏至峻下劑トメ二十
氏ヨリ三十氏至小兒ハ八氏ヨリ十氏至用ウ
ベシ刺戟導拽ノ效ヲ要セバ四氏ヨリ六氏至
小兒ハ一氏ヨリ三氏至用ウベシ

○藥刺巴華爾斯ヤレシナハ羅

根ヲ火酒ニ浸出メ之ヲトル其性效藥刺巴ニ
同メカ最烈ナリ或云華爾私ノ效根ニ優レリ
實ニ的說トス○散劑トシ用ウ五氏ヨリ十氏
至又丸劑乳劑等トナシ用ウルモ可ナリ

○藥刺巴丁幾ヤレシナハ羅

○藥刺巴ヤレシナハ羅

○燒酒者八十度

右浸出六日○服量半錢ヨ

リ一錢至

格碌莖篤スコロキンハ羅

格碌莖篤ハ林氏ノ所謂キキミススコロキンチ

ハ強按瓜ノ菓ナリ此草多兒格名國ニ産ス菓内

ニ沙瓢アリ質海綿ノ如クニメ色白ク味刺戟

ス此瓢即下利ノ效アリ○此菓和蘭ニ輸ス者

ハ乾固メ外殻ヲ剥去ル大小一ナラズ其量輕

ク白皮ヲ以テ包被ス瓢ハ此皮裏ニ在リ○格

碌莖篤ハ古來既峻下ノ藥品トス動モスレ

ハ暴瀉血ヲ混シ劇烈ノ腹痛搐搦ヲ起シ亦燃
 衝ヲ續發スルニ至ル之ヲ豫防スルニハ粘滑
 藥ヲ伍用スベシ故ニ腸機大ニ萎衰スル者ニ
 アラザレバ下劑トシ用ウルコトナシ○多ク峻
 刺戟導搜解凝ノ劑トシ用井テ腹部粘液ノ壅
 閉頑固ナル者水腫精神病下肢ノ麻痺ニ效
 リ○散劑浸劑トナス下利ノ效ヲ要スルニハ
 散劑三匁ヨリ五匁至刺戟ノ效ヲ要スルニハ
 八分匁ノ一ヨリ四分匁ノ一至
 ○哥西亞丸 ヒルコロキシアチエス 蘆薈ノ條下

出取並ニ用ヤ小藥備ハ大以蘆薈ヲ以テ之
 ○格碌莖篤ト幾 木茴香一錢 燒酒十度者
 與格碌莖篤一匁 右浸出三日○十滴ヨリ三十滴至
 墨列僕里ズワルト 通經劑篇ニ出ツ
 藤黃ヒルコロキシアチエス 東印度ニ産スル
 ① 芬迭樹ヨリ滴流ス 微赤色質透瑩ナラズ破碎

本草綱目卷之九

スレバ光輝アリ。研末ニ易シ。味甘クメ刺衝ス
 ○性效格碌董度ヨリ猛烈ナリ。故ニ謹慎メ之
 ラ用ウベシ。○特ニ峻下ノ效ヲ呈スルルナ
 ラズ。更ニ又身軀強實ナリト雖粘液質ニメ運
 行遲慢ナル者。腹中ニ粘液蓄滯セルヨリ發ス
 ル水腫ニ稱用ス。此病ハ先暫シ苦味ノ解凝藥
 ヲ用井。而後一二用ノ間藤黄ヲ以テ下劑トシ
 與フレバ。許多ノ瀦水兩便ヨリ漏泄スルヲ屢
 コレアリ。○條蟲ニ殊稱アリ。故ニ此頑固惡ム
 ヘキ病症ニ用ウル藥劑ハ。大約藤黄ヲ以テ之

カ君藥トス。○散丸。砥劑。溶劑トナシ用ウ。一ハ
 ヨリ六ハ至

本註輓近高名ノ條蟲ヲ治スル聖度舍名藥
 ト云者。即藤黄ヲ以テ君藥中ノ一品トス。其
 方予カ著ス所ノ袖珍方叢藤黄条ニ載ス

蘓甘母扭スカンモトシスカンモトリセカンモト井カンモトンカンモトテカンモト蘭カンモト

得ル所ノ蘓母華爾私性ノ凝液ナリ。○此物ニ
 種アリ。第一種ヲ牙而百名山蘓母扭スカンモトニスカンモトススカンモト。アスカンモトレスカンモトモ
 ヒスカンモトト云。灰白色ニメ其質輕。研末シ易シ破

碎スレバ光輝アリ、味酸、不ニ容化スレバ乳白
色ニメ微緑ヲ帶フ、水ニ溶ク易キ者ヲ以テ上
好品トス、第二種ヲスミルナスセ、蘓甘母扭ト
云、黒色ニメ重ク華爾私少ナク、塵土ヲ交フ、研
末シ難シ、○刺戟ノ峻下劑トス、其效殆ト、葯刺
巴ニ同ク、メ、腹痛攣急等ヲ起ス、トハ彼ヨリ速
ナリ、腸機大ニ萎衰スル者、腹水、條蟲等ニ用ウ
ル、下自餘峻下藥ノ如シ、小量ニ用井テ衝動解
凝ノ效アリ、能ク粘膠液腸ニ鬱滯スル者ヲ疏
解ス、○散、丸、舐劑、孟佺設爾等トナシ與フ、下利

ノ效ヲ要スルニハ八瓜ヨリ十二瓜至、衝動解
凝ノ效ヲ要スルニハ二瓜ヨリ八瓜至

○瓦刺扶阿刺ヒガラチオラ、オ

此草和蘭ニ産ス、根葉共ニ藥用ニ供メ、峻下ノ
效アリ、葉ノ形鉞狀ニメ鋸齒アリ、葉面滑澤
味苦ニメ刺衝ス、白色ノ唇花ヲ放ク、根ハ圓ク
メ大サ鳩翮管或ハ鶯翮管ノ如クニメ結節アリ、
白色味烈苦ニメ刺戟ス、主治、效用、藤黃、蘓甘
母扭ニ同シ、○葉ハ散トシ用、一ノ刀ヨリ二ノ刀
至、又浸劑トナシ用ウルニハ一ノ錢ヨリ二錢至

ヲ浸出シ。漉過メハ弓ノ液ヲ取ル。根モ亦散劑トス。ハ氏ヨリ十六氏至

巴豆油オレウム、チドリ○オ

搾油ナリ。黄色ニメ臭ナク。味粹ナリ。巴豆樹ハ

馬路古諸島及ヒ支那ニ産ス。○巴豆ガラナ、カ

ラナ、チクリアカ。歐羅巴ニ於テモ往昔巴

之アリ。又巴豆油モ峻烈ノ下劑トシ内外ニ用

ウル。巴ニ尚シ。然レ漸々廢棄メ用ウル者ナ

シ。輓近諸厄利亞名國ノ醫家之ヲ以テ峻下ノ一

藥トシ用井テ屢良效ヲ得シヨリ。其名再世ニ

噪クニ至レリ。○性效最峻烈神速ナリ。故ニ此

油四分滴ヨリ半滴ヲ用ウレバ。四分時ヲ出テ

ズメ大ニ泄瀉シ。腹絞痛ヲ併發スルトナシ。是

ヲ以テ方今峻下劑ノ一良藥トシ。見效神速ニ

ノ且ッ切實ナラントテ要スル症ニ稱用ス。殊ニ

頑固ノ便秘。鉛毒疝。腸機大ニ萎衰スル者。充液

質。血頭部ニ偏流スル者。卒中風。水腫。癩狂等ニ

頑固ノ便秘ヲ兼ル者ニ效アリ。又條蟲ニ用井

テ驅蟲ノ效アリ。○此油ハ通常一滴ヨリ二滴

ヲ取リ。甘美ノ舍利別ニ和シ用井。或ハ阿刺比

本草綱目卷之三

亞護謨白糖等ヲ配入。每錠四分滴ヲ含ムノ錠
 ヲ製シ。一時毎ニ一錠ヲ用井。以テ下利ヲ得ル
 ニ至ル。小兒ニ用ウルニハ左方ヲ良トス
 巴豆油 二滴 白糖 二錢 阿刺比亞護謨 極
 者半 復方益智丁幾 半錢 水適宜
 右四味混和メ一弓半ノ劑トナシ。五六歳ノ兒
 ハ一時半若クハ二時毎ニ二茶匙或ハ三茶匙
 ヲ與フ。○外用ハ巴豆油六滴ヲ以テ阿列襪油
 若クハ他ノ脂油一弓ニ混和シ。腹肚ニ塗擦メ
 内服ト效ヲ同フス。但輓近別耳列印地名ニ於テ

之ヲ經驗スルニ下利ノ效ヲナス。太切實ナ
 ラズト云。然レ慢性嘶嘎喉頭氣管等ノ慢性嗽
 腫百日咳等ニハ大人男子ハ巴豆油ヲ單用シ
 婦人小兒ハ阿列襪油等分若クハ二倍ヲ加ヘ
 用井テ。其効吐酒石膏瑞香皮膏串線法等ノ上
 ニ在リ。又急性痺麻質斯病劇發後ニ遺留スル
 所ノ骨節腫骨節彊直等ニ擦メ。大ニ奇效アリ
 加印加根カキス。カ
 印加根インダキス。カ
 シオコクカ。アンギイヒガ。マル子又林氏ノ所
 謂シオコクカ。ラセモサノ根ナリ。此物亞墨利

加洲ノ熱地殊ニ伯西爾國ノ肥潤砂地ニ産ス
 ○供蘭偃私度爾夫ノ説ニ曰ク予嘗テ伯西
 爾ヲ經過シテ加印加根ヲ鑽刻スル輩イシカ
 呼トヲ見ルニ此輩加印加ヲ以テ毒蛇咬傷ニ
 用井テ消毒ノ良藥トシ且水腫ニ用井テ良效
 アリト云○供蘭偃私度爾夫名此根ニ峻下
 ノ性アルノミナラス并ニ利尿通經ノ效アリ
 トス然レ嘔吐ヲ發シ易シ慎シテ之ヲ用ウヘ
 シ○加印加ノ最良方ハ煎劑ナリ加印加一錢
 ニ水十六弓或ハ加印加二錢ニ水十八弓ヲ加

煎メ半ヲ減シ一時若クハ一時半毎ニ一食
 匙ヲ用ウ○水製越幾斯エキスタラクハ十
 二瓜ヨリ二十瓜至○伯刺爾杜ハ板谷ア亞
 局方ノ驗水器二十度ノ火酒ニ之ヲ溶化スレ
 ハ能ク其氣ヲ溶出スルヲ以テ之ヲ此一良劑
 ナリト云○輓近ニ至テハ之ヲ瓦刺秩阿刺ニ
 代用メ水腫病外徹剥昆怪腸ハ墮閉殊ニ
 間歇熱ニ良効云ト云十五至
 落葉松耳ガリスアルス羅ニ發ル
 落葉松樹ニ生スル菌耳ノ内面白色粗脆ナル

者ナリ。此物前古已峻下劑トセリ。然氏如今
 此效ヲ稱スル者ナシ。○輓近澇瘵ニ發スル脱
 汗ヲ止ムル一要品トス。十人ヨリ十五人至。每
 晚一服ス。○下利ノ效ヲ要スルニ八半錢ヨリ
 一錢至。○此物其功甚速。大配ニシテ。一服
 之後。其功即出。大ハテ。以テ。一服。一
 日。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

密篤兒藥性論卷十二終



