



窠篤兜藥性論

七

ヤ 5
1029
7



15
1029
7

宗篤兒藥性論卷十三目次

○發汗劑

温湯

蒸氣浴

接骨木

加密列

山牛蒡根

癒瘡木

薩沙布羅私

○接骨木子舍利別

○癒瘡木脂丁幾
○癒瘡木脂揮發
○癒瘡木脂法



91-2014

撒爾薩巴里爾刺
○阿瑟那滿煎方根

土茯苓

攝爾扁太里亞

羯布羅

麝香

硫黃

硫黃泉

安質母尼製劑

挖布爾私發汗散

雙鸞菊

礪砂

醋酸加里

禮歌列私鎮吐飲

民埕列利精 ○補鏡

家篤兒藥性論卷十三目次

家篤兒藥性論卷十四目次

利尿劑

洋芹

海葱

格兒

杜松

實麥

彌筒葉

洋芹子

海葱醋

格兒

杜松實

實麥利私

的兒油

護海葱膏

格兒

杜松實

實麥利私

海葱酒

格兒

杜松實

實麥利私

彌筒葉

乙

複方杜松實精

格兒

杜松實

實麥利私

加印加

木賊

拔爾撒謨骨汗霍

華澄茄

拔爾撒謨加奈荅

的列併底那

○硫的列並底那

○光黃的列並底那

○光菁丁並油

孕礪酒石

鹽酸金鹽

○補評
○併軟膏
○奧蘭度碎石劑

亞斯律羅

亞斯律爾及私

拔爾洛荅葉

百魯羅葉

舍沒必羅

發汗諸藥性論卷十四目次

合其心...
百...
...
...
...



發汗諸藥性論卷十三

和蘭

漢臣 穴篤兒 著
小倉 洞海林 彊健 卿 譯補

發汗劑

發汗劑...
勝理ヨリ自然ニ發越スル所ノ蒸氣ヲ催
進スルト之ヲ又其...
名ケテ發汗劑ト曰フ○發汗諸藥其力各

如キ公共ニ皆此劑ノ害アル者ナリ○此劑ヲ用井テ其望ハ所ニ全效ヲ收メトト要セバ患者ノ調養ニ注意ノ之ヲ怠ラシムルヲ勿ルベシ即常用ノ飲料居室寒温衣食其他百般ノ物件ニ適度ヲ得セシム努力テ蒸氣閉塞ヲ回復シ遍体平等ニ良汗ヲ發セシムベキナリ○飲液ニ微温ニ熱ニ過キズ平生ヨリハ多量ニ服スベシ居室ハ廣潤ニシテ温度常ヨリモ稍増シトヲ要ス世人理ニ暗ク動モスレバ大ニ

居室ヲ熱メ窒息セントスルニ至ラシム惑ト云ヘシ衣衾ハ殊ニ大ニ被覆スルナク患者ヲメ困苦セシムルヲ勿ラシムベシ其他日常患者ノ身邊ニ纏絡メ患者ヲメ不平ヲ生セシメ或ハ發汗大過シ或ハ局處自汗ヲ發スル等皆是日後繼發ノ諸症ヲメ消慮ニ違ナカラスハルノ因ナリ謹マザルベケンヤ○又布羅涅兒ノ毛布ヲ以テ微温湯ニ漬シ之ヲ以テ輕々ニ局處ノ皮膚ヲ摩擦シ大ニ發汗ノ效ヲ扶ル

症アリ。此法ヲ行フニハ、布羅溼兒ヲ撰用
スヘシ。何者此物ハ大ニ温氣ヲ含ミ、結布
ノ如ク一回汗ヲ含メハ忽チ冷ヘ、反テ皮膚
ノ機ヲ壓スルノ害ナケレバナリ

温湯ワルク、カ、ワリ、ダ、ル

簡易ノ發汗藥トシ、或ハ單用シ、或ハ他ノ發汗
藥ノ礎トス。殊ニ皮膚緊張スルニ用井テ弛緩
ノ效アリ。但、白湯ハ味淡白ニメ、惡心嘔吐ヲ發
シ易シ。故ニ内服ニハ差便ナラズ、輒追加德篤
的花鳥幾私名痛風ニ大ニ稱用ス。其法六時ヨ

リ十二時中ニ、小麥酒盞十二盃ノ温湯ヲ飲服
セシム。此方健全強壯ノ人ニ在テハ、屢良効ヲ
見ルト雖モ之ヲ用井テ眩暈ヲ發スル者アリ。
又患者多クハ終リニ至ルマテ、此法ニ任フル
不能ハズ。故ニ概用シ難シ。○外用ハ數般ノ法
アリ。又數般ノ症ニ用ク。就中温浴ノ温度僅ニ
身温ニ過ル者ヲ殊稱ス。乃、皮膚ヲ淨潔緩和シ、
脉管痙攣狀ニ緊張スル者ヲ弛緩シ、血ノ内部
ニ激流スル者ヲ多ク外表ニ誘引ス。故ニ發
汗、靜息鎮痙導洩ノ效アリ。○蒸氣鬱閉ニ由テ

發スル熱病及ヒ其熱病瘧疾疼痛焮衝ノ症ヲ
兼子皮膚粗糙ニ乾燥灼熱シ脈細實ニ緊
ナル者ニ殊ニ效アリ又胃寒或ハ外藥ヲ用井
及ヒ其他ノ諸因ニ由テ皮疹内攻スル者痛風
脚痛風等内部ノ要器ニ轉移スル者月經閉塞
ノ良藥タリ又能ク常習ノ漏泄閉塞セルヲ回
復ス○脚浴手浴半身浴等ニ共ニ多クハ導搜
鎮瘧ノ為ニ用井蒸氣閉塞ヲ回復スルニ用ウ
ルト少シ故ニ血内部ノ要地ニ灌注スル者局
部ノ瘧疾疼痛病論へハ瘧疾急症瘧疾性ノ箱頓

腸墜并ニ頭部ノ胃寒聖京屈熱等ノ初起ニ驗

蒸氣浴 ダムプ バット 蘭

接骨木 サム ヒキス 羅

歐羅巴諸邦ニ産スル灌木ナリ林氏之ヲサム

ビキスニグロト云殊ニ花實ヲ採用ス○花外

能ク乾ク者ハ淡黄色氣佳好ニ差眩暈ヲ發

スベク味苦ク粘○實ハ黧赤或ハ赤黑色

ニ味微甘ナリ能ク熟スル新實ハ世間通知

スル野ニ接骨木子舍利別ヲ製スベシ○接骨

木ノ裡皮モ亦佳稱クル家常藥ニ、水腫ヲ治スルノ功アリ方今ニ葉ヲ根液ヨ亦水腫ニ良效アルヲ稱ス○接骨木花ハ普通常用ニ發汗藥ニ、諸種ノ感冒ノ初起ニ效アルト由夫野老モ能ク知ル所ナリ○聖京シキ屈性ク儂麻マ質私性ノ急慢諸病、焮衝性ノ皮膚病、粘液性、聖京シキ屈性ノ胸病ニ或ハ單用シ、或ハ他ノ發汗劑ニ配メ效アリ○外用ハ羅斯性ノ焮腫、聖京シキ屈性、儂麻質私痛等ニ藥囊トシ、粘液性ノ咽喉焮腫ニハ含漱劑トナシ與フ

○接骨木子舍利別ロズキサハ無害ノ發汗劑ニ、殊ニ熱病ニ良效アリ○一弓ヨリ三弓至○接骨木花水ト多クサハ花ノ蒸餾水ナリ發汗劑トメ孟シ屈セ爾ルニ和シ用ウ、又點眼水ニ加フ○二弓ヨリ八弓至○加密列カミルカフロレス、カモルララ羅ハ香竄苦味藥條ト出ル山牛蒡根シラギキスセ、タルダトナ羅ハ二種アリ、而シテモアルクモト共ニ和蘭ニ産ス、又

歐羅巴北方諸地ニモ多ク野生ス○根ハ長大
 圓シメ外面灰色内面白色質輕ク海綿ノ如
 久臭氣ナク味甘微苦ニ粘稠ス○發汗利尿
 解凝ノ效アリ故ニ聖京僞痺麻質私痛風病殊
 ニ呼吸器ノ聖京僞病蒸氣鬱閉ヨリ發スル水
 腫石淋腺病ニ效アリ○腺病ノ初起及ヒ輕症
 ニ效アリ已ニ經久ノ者ト重症ニ效ナシ○
 經久ノ癰毒ニハ瘡瘡木薩爾沙巴利爾羅等ニ
 配用ノ驗アリ○慢性ノ皮病殊ニ其瘰癧性癰
 毒性ノ者ニ古昔大ニ之ヲ稱用ス然レ今時ハ

用ウルト鮮ナシ○煎劑トシ用ウニヨリ三
 手ヲ以テ煎メ十ヨリ十二手ノ液ヲトル
 瘡瘡木^{ボリグニムギアイカ羅}
 牙埋加^{ボリグニムギアイカ羅}聖獨眠悟^{ホウト蘭}同等ニ産スル樹ナリ質堅
 硬ニメ華爾私ヲ含ム林氏ノ所謂^{ボリグニムギアイカモ}
 ムオロシナ^{ボリグニムギアイカモ}樹是ナリ諸邦ニ輸スル者ハ皆
 大材ナリ其質堅硬ナルヲ以テ鋸屑トナシ用
 ヲ之ヲ^{ボリグニムギアイカモ}云其色茶褐
 或ハ蒼綠味不佳ニメ刺衝ス氣微ク香竄ナリ
 ○此^{ボリグニムギアイカモ}林^{ボリグニムギアイカモ}效分ハ其中ニ含蓄セル華爾斯ナリ

衝動。鮮凝。發汗ノ效アリ。故ニ充液ニモ粘稠且
 運行怠慢質ノ人ニ發スル慢性病ニ殊效アリ
 ○往時此材癩毒ヲ治スルノ效ヲ稱スルノ頗
 誇大ニメ。瀕劑是カ為ニ一時其譽ヲ失フニ至
 ル○温暖ノ地方及ヒ患者調養ヲ慎ム者ハ。癩
 毒ニ良效ヲ奏スヘキノ理アリト雖諸家之ヲ
 歷驗スルニ吾和蘭ニ於テハ。之ヲ單用メ其效
 ヲ見レナシ。然レ瀕劑ニ兼用スレバ能ク瀕ノ
 效カラ唾腺ヨリ導キ去ル。故ニ瀕劑ヲ用ウル
 一尤久シクメ效ナク。或ハ瀕劑ノ用法粗暴ニ

メ效ナキ者ニ之ヲ加ヘ用ウレハ。其效ヲ見ス
 一。大ニメ且著シ。又瀕劑ヲ用ウル一此ノ如ク
 ニ。疾是カ為ニ發スル者強按ニ。水銀病。延年ノ癩毒
 病痛風ヲ合併スル者ニハ。共ニ殊效アリ○慢
 性ノ癩麻質私及ヒ痛風病慢性ノ皮病殊ニ癩
 癩性ノ皮病腺病就中運行萎衰急情弛緩質ノ
 人ニ發スル皮病ニ奇驗アリ。然レ此等ノ諸病
 ニハ。共ニ其效癩瘡木脂ニ及ハズ○煎劑大約
 一。一ヨリ三ヨリ至テ煎メ。十二ヨリ二十四ヨ
 一。液ヲ取ル。煎法ハ徐々ナルヲ宜シトス

○癒瘡木脂レシナギニアキアキナクハル此脂ハ癒瘡木ノ效分ナリ。老枝ヨリ自然ニ流出シ或ハ樹ヲ鑽刻ノ得ル者ナリ。風ヲ見テ乾固ス。其形大塊ニメ堅ク。太。破碎シ易シ。外面ノ色一定ナラズト雖。大抵茶褐ニメ綠色。内面茶褐色ニメ光輝アリ。黃粒若クハ白粒ヲ間錯ス。此塊ヲ破碎ノ光輝鮮明透亮ナル者ヲ以テ純潔ノ品トス。○其真品ハ能ク火酒ニ溶化ス。手温ニテ軟トナラズ。研末シ易クシテ。其末灰白色トナル。味苦辛ニメ舌燒カ如キヲ覺エ。火ニ

投テレバ一種ノ佳氣ヲ發ス。○脂ハ其效遙ニ癒瘡木以上ニ出ツ。稍多量ニ用ウルカ。若クハ長用スルカハ。大便ノ數ヲ増ス。○慢性癩麻質。私痛風等ニ用井テ最峻效アリ。就中熱已ニ退キ病已ニ年ヲ經。且其人官能萎衰運行遲急ノ粘液質ナルハ。的應ノ症タリ。之ニ及メ充血質。燼衝病。發熱。腸胃汚物。癆瘵。素因アル人。刺衝機大過ノ者ハ共ニ之ヲ用ウルヲ禁ズ。○發汗ノ效カラメ猛ナラシムルニ其時宜ニ從テ阿片。陀扶爾。私散。安質。母。扭劑。硫黃等ヲ加用ス。

へし ○ 黴毒ニ效アリ。殊ニ經年ノ症ニハ瀕劑
 ト相伍メ能ク其效ヲ扶ク。又黴毒ニ皮病痛風
 骨病骨節病等ヲ兼ル者モ瀕劑ニ伍用シ。或ハ
 浴湯ヲ兼用ノ大效アリ。○ 穢歌蘭度ハ大ニ腺
 病ニ稱用ス。殊ニ其人纖維弛緩運行怠慢官能
 萎衰ノ質ニハ腺ノ頑硬腫。皮膚病。粘液流出病
 等ヲ病者ハ尤良ナリ。粘液性ノ喘息水腫等。其
 因痛風若クハ皮病内攻ニ在ル者ハ偉效アリ
 ○ 散劑殊ニ丸劑ヲ良トス。毎服五匁ヨリ十二
 匁至。日ニ二回ヨリ四回。此物動モスレバ消食

器ヲ害ス。故ニ常ニ香竄苦味ノ品ヲ伍メ之ヲ
 預防スベシ

補 癒瘡木屑ヨリ脂ヲ得ル法
 弗里設藥性論ニ曰。癒瘡木脂ハ樹枝ヲ鑽刺
 ノ得ルノ外。又ニ法アリ。一ハ食鹽ヲ以テ木
 片ヲ煮テ之ヲ得一ハ亞爾箇兒ヲ以テ鋸屑
 ヲ浸出メ之ヲ得ルト。彊按ニ此脂ハ常ニ船
 齋ノ乏キニ苦ハ然ルニハ年前社友俊齋大
 槻氏試ニ癒瘡木屑ヲ火酒ニ浸メ脂ヲ得
 シヨリ。都下ノ藥舖皆脂ヲ製シ以テ醫用ニ

乏シカラザルヲ得タリ。其後五年ヲ經テ
 此書船齋シ。初メテ彼邦モ亦人エヲ以テ脂
 ヲ得ルヲアルヲ知レリ。大槻氏ノ功西賢ニ
 辱シズト云ヘシ。其法癒瘡木屑ヲ烈火酒ニ
 浸タス。數日。濾過。滓ヲ去リ。浸液ヲ蒸餾
 罐ニ裝シ。火酒ヲ餾シ去リ。酒氣盡ルニ至レ
 バ。脂忽チ凝リテ罐底ニ沈ミ。水面白沫ヲ泡
 起ス。是ニ至リテ温ニ乘シ。速ニ脂ヲ取り出
 シ。日ニ乾シ水氣ヲ去ル。其脂ヲ取ル間ニ湯
 冷ヘテ脂ノ器底ニ凝着スル者ハ。上液ヲ注

キ去リ。裂火酒少許ヲ加ヘテ溶化シ。小甕碗
 ニ入レ。火ニ安シ。水氣ヲ蒸散メ。凝脂ヲ得ル

○癒瘡木脂揮發丁幾

チンキエラギニア
アカ、ホヲナリス

癒瘡木脂 一弓

礪砂加石灰精 二弓

燒酒

者六十度
者六十弓

右先。脂ト燒酒トヲ合シ。能

ク溶解ナルニ至テ。礪砂加石灰精ヲ加フ。峻
 刺戟。發汗。解凝ノ效アリ。慢性ノ痺麻質私及
 痛風諸症。殊ニ痺麻質私性ノ頭痛ニ良驗アリ
 ○二十滴ヨリ六十滴至ラ。少量ノ水或ハ粘稠

液或ハ舍利別ニ利用ス。○大量ノ水酸類酸性鹽等ヲ禁ス。

○癩瘡木脂丁幾アチキキウキ燒酒者一十度右浸出スルヲ六日○慢性

、癩瘡質私及ヒ痛風諸病ニ良ナリ○每服三

十滴日四至日ニ三次

薩沙布羅私フリグス南亞墨利加洲ニ産ス林氏ノ所謂ラウリス

サフラズノ根材ナリ又根皮ヲ用ウルアリ之

ラ薩沙布羅私根皮ニコルテキスト名ク○

材片ハ大ニ厚ク彼是ニ皮ヲ着ク柔軟ニメ

灰白色或ハ褐赤色氣香竄ニメ苗香ノ如ク味

辛ニメ甘ナリ○根皮ハ柔ニメ質海綿ノ如ク

褐赤色ニメ氣味共ニ材片ヨリ裂ナリ○木皮

共ニ淡黄色ノ亞的兒重油ヲ含ム是殊ニ薩沙

布羅私ノ效分ナリ○衝動發汗利尿ノ效アリ

故ニ慢性ノ聖京癩瘡質私痛風病水腫瘰癧

性若クハ癩毒性ノ頑固皮病ニ安質母扭劑頑

劑等ヲ伍用メ殊效アリ○延年ノ癩毒病ニハ

世間傳稱スル所ノ癩毒ノ名方木類煎ニ加ヘ

テ佳ナリ○散劑浸劑トナス。但シ浸劑ヲ佳トス。散劑ハ一カヨリニカ至浸劑ハ半カヲ以テ浸

メハカヨリトニカノ液ヲ取ル

撒爾薩巴利爾刺

南亞墨利加洲ニ産スル藤本灌木ニム喬木其
他諸木ニ蔓纏ス林氏之ヲ「スミラキス、サルサ
ハリル」ト云。洪兵勃兒篤名之ヲ「スミラキス、
シロリチカ、ヒンビト」云。根ヲ藥用トス○根ハ
長クメ大サ西洋筆ノ如ク。皺縮シ茶褐色味甘
ク淡白ニメ粘着ス○根大ニメ白色ナル者ヲ

佳品トス。或云撒爾薩巴利爾刺ノ效分ハ殊ニ
根皮ニ含ミ皮中ノ苦味越幾斯ニアリト○古
人巴ニ之ヲ以テ癩毒ヲ治スル絶妙ノ品トス
ルトアリ。又其説ヲ駁スル者アリ。之ヲ以テ癩
毒ニ絶妙ト稱スルトハ未盡ザル所アルニ似
タリト雖モ大ニ奇效ヲ奏スルハ疑ヲ容レサ
ル所ナリ。殊ニ患者ノ體質頑劑ヲ用カヘカ
ザル者。頑劑ヲ長服スルニ由テ大ニ衰弱セル
者。夜發ノ頭痛骨痛等ヲ兼ル者ニ偉效アリ○
通常頑劑殊ニ猛頑ニ伍用カ大ニ其效ヲ扶ク。

是近世大ニ稱用スル所也。宋實名癩毒丸ノ療法ヲ以テ明證スベシ。又能ク瀕劑ノ消食器ヲ害スルヲ預防シ、多ク其效ヲメ皮表ニ達セシム。○頑固經久ノ慢性癩、麻質私病、痛風病ニモ亦良ナリ。慢性ノ皮病、浸蝕潰瘍、硬結腫、癌腫等ニハ殊ニ攝生食養ヲ慎ミテ、之ヲ用ウレバ奇效アリ。○散劑ハ每服一タヨリ一錢至、日ニ三四次、但散劑ハ用ウルヲ稀ナリ。煎劑ハ一タヨリ一タ半至ヲ以テ、煎メ十タヨリ十二タヨリ液ヲ取ル。

○悉多滿煎シトマンケン是往古ノ方ニメ、撒爾薩巴利爾刺ヲ以テ君藥トスル者ナリ。近世獨乙ドクイ國ニ於テ再大ニ稱用ス。○經久ニメ既ニ瀕劑療法ヲ經タル癩毒性ノ皮病、骨病等ニハ、食餌ヲ節シ、此方ヲ用井テ大効アリ。○此方ハ予カ著ハス所ノ白耳義局方ニ載ス。
補 穆私篤醫學韻府ニ曰、悉多滿煎ハ元來經久癩毒ニ稱用シ、方今ハ又慢性皮病、殊ニ錢癩及ヒ慢性痛風ノ骨腫、趨謨腫等ヲ兼子タル者ニ稱用ス。予モ亦是ヲ試驗スルニ、其

效每ニ甚夕偉ナリ 〇悉多滿煎ハ濃薄ノ二

方アリ濃煎方 〇風

撒爾薩根ヲニ 井水 廿四

右煮ルハ八分時 廿四

明礬糖 〇百禮羅 廿四

糖明礬糖ヲ名藥局ニ明礬糖論明礬糖ニ云

府明礬糖ヲ台明礬糖者明礬糖強按裴斯韻

加用ニ煮テ蒸ト餅ア母レハ稠内ト用ノ品ニアラ

混用ニ供ス 〇密開宗卷十四鹽

安質母尼朱 〇強按舍密開宗卷十四鹽

酸質ヲ安質母尼朱ト器ノ四十六章ニ曰鹽

右三味布囊ニ盛リ煎液中ニ入ル

胡蘆巴子各半 甘草半 過泥子

右四味ヲ加ヘ煮テ十六比ノ液ヲ取リ玻璃

瓶ニ比入リノ者ハ瓶ニ盛リ濃煎ノ二字ヲ

書セル浮帖ヲ貼ス 〇薄煎方 濃煎滓

撒爾薩根各六 井水 廿四

右煮テ人ハ枸椽皮味桂末益智各三

甘草六錢

...

...

右四味ヲ加ヘ煮テ十六比ノ液ヲ取り玻璃瓶ニ比入リノ者八瓶ニ盛リ薄煎ノ二字ヲ記セル浮帖ヲ貼ス

○用法 初日早朝ニ酒薬丸方強按。拔。唇。亞。局。方。酒。藥。丸。ノ。方。藥。

○藥錠三分。甘。酒。一。分。右。二。味。研。和。メ。丸。ト。ナ。ス。

○精製火。酒。二。十。度。者。適。宜。ヲ。加。ハ。溶。化。ス。ル。ヲ。

○稠ト。十。六。丸。ヲ。頓。服。シ。二。日。ヨリ。五。日。至。ハ。毎。

日午前ニ濃煎一瓶ヲ温服シ午後ニ薄煎一瓶ヲ冷服ス第六日又酒薬丸ヲ服シ七日ヨリ十日至又毎日濃薄二煎ヲ服スル初

如シ○此法ニ從事スル間ハ日々雜羔肉ニ弓小麥蒸餅ニ弓ヲ用非下劑ヲ服スル日ハ更ニ犢肉羹汁ニ大麥裸麥等ヲ加フル者ノミヲ用非卧床中ニアリテ蒸氣ヲ發越ヲ扶クベシ○既ニ一劑ヲ盡スノ後モ猶暫ノ間ハ一室ニ籠居メ飲食ヲ減シ木類煎撒爾薩根煎ノ類ヲ飲マシムヘシ○此方一劑ヲ盡スト雖正病未全治ニ至ラザル者更ニ一劑ヲ用クベシ○患者大壯實ノ者此方ヲ服スルニ第二日ニ今一田酒薬丸ヲ用クベ

天篤見極生論 卷三

シ○此法ニ從事スル者ハ微温湯ヲ以テ潰瘍ヲ洗滌シ乾綿撒絲或ハ緩和軟膏ヲ塗リタル綿撒絲ヲ帖スベシ○患者甚虚弱ナル者ハ濃薄ニ煎共ニ毎日唯半瓶ヲ飲マシムヘシ○總テ此方ヲ服メ惡心嘔吐ナル者其量ヲ小ニスレバ則止ム○予此方ヲ用タルニ速ニ流涎ヲ發スル者多シ流涎既發セバ後服ヲ停メ阿芙蓉金硫黃幾那等ヲ内服スベシ○近者予毎ニ此方中ノ甘瀕安質母尼朱ヲ去リテ與フルト廿四日其效驗古方ニ

異ナラス強校粒食ノ人ハ米一合鹽少許炒
麥水數杯 補 阿列那亞リラジキスカリシスアレナ
スルニブリ○ラシキスサルリトガラスヲ
ゲルニニリ○ラシキスサルリトガラスヲ
ル 增補依百乙藥性論弗里設藥性論及越而
實 實吉醫事日札ニ曰阿列那亞ハ撒爾薩巴
里 里爾刺ニ代用ノ其效甚々偉ナリ世ニ獨乙
撒 撒爾薩巴里爾刺ト稱スル者即是ナリ此者
蘆 蘆茅ノ類ニ林氏之ヲカレシスアレナリ
ア アト云獨乙和蘭等ノ海濱沙地ニ多生ス其

巴入馬見...

卷...

...

...

...

根外面赭色ニノ大稻稈麥稈ノ如ク。或ハ鵝
翹小筆ノ如ク。甚タ長ク。横ニ蔓延ス。處々ニ
節アリテ褐色ノ籜皮ヲ着ケ。節下ニ鬚根ア
リ。内面ハ白色ナリ。故ニ之ヲ横斷スレバ中
白クメ外邊褐色環ヲナシ。正中ニ空孔アリ。
味甘ニノ澱粉多シ。生鮮ノ者ハ氣板爾撒摩
ノ如ク。或ハ的列并底那ノ如シ。○此根ノ成
分ハ越幾斯分石鹼分澱粉華爾斯等ナリ。○
撒爾薩巴爾刺ハ直貴キヲ以テ贖品多シ。阿
列那里亞ハ其品得易クノ直モ亦貴カラス。



故ニ撒爾薩巴里爾刺ニ代用メ。其效劣ラス
ト云者多シ。或ハ之ヨリモ優レリト云者ア
リ。或ハ蘆根阿列那里亞根ハ清血藥中至緩
ノ品ナリ。故ニ其刀腹部諸器ノ外ニ踰ル
能ハズト云。○發汗利尿ノ效アリ。故ニ癩毒
癩癩麻質斯痛風諸病頑固ノ慢性皮病等ニ稱
用ス。○ニヲテ以テニ北ノ水ニ煮テ半ヲ取
用リ用テ。越幾斯モ亦同效アリ。○
土茯苓シラ特ニ對シ。トシナ。羅
林氏ノ所謂云ミラス。シオノ根ナリ。是東方

本草綱目卷之...

諸國就中支那ニ産スル灌木ニシテ根形大結塊
 土ノ如ク堅ク重ク外面茶褐色内面白黄色ニシテ
 微赤ヲ帶フ味粘メ甘シ○痺麻質私痛風等ノ
 要藥タルヲ其來已ニ久シ尚且獨乙帝加列兒
 第五世名ノ痛風此根ニ由テ治セシヨリ以來
 殊ニ名譽ヲ得タリ爾後又癩毒ニモ稱用ス然
 レ長ク其稱譽ヲ保ツテ能ハス○近今ハ時
 有テ自餘ノ發汗劑ニ加ヘ輕症ノ慢性痺麻質
 スニ用ウ○煎劑トシ用ウ一弓ヲ以テ煎メハ
 弓ノ液ヲ取ル

攝爾扁太里亞ニラチキスセルペギニヤアヒルスキ
 ランガ
 苦味香竄藥條ニ出ツ
 羯布羅カンホラ
 鎮痙藥條ニ出ツ
 麝香モスキス羅
 同前
 硫黄ニルニル羅
 鮮凝劑篇ニ出ツ
 硫黄泉温泉○冷泉○ミ子ラアルスコウデフル
 トルソウワルアルスコウデフル

附録ニ出ツ
安質母扭製劑
羅バラス
ピラ
ー
スト
ガ
ラン
チ
ス
モ
ベ
レ
イ
チ
ヤ

ン
蘭

解凝劑篇ニ出ツ

拖布爾私發汗散
ペ
カ
ル
コ
ア
ス
ド
ヘ
リ
○
ピ
ユ
ル
ヒ
ス
ド
イ

フ
ル
ス
フ
ー
ド
ル
ス
フ

已ニ阿芙蓉ノ條下ニ載セシガ如ク吐根阿片
孕礬酒石ノ配合劑ナリ○發汗ノ一良劑タリ
殊ニ皮膚痙攣メ蒸氣鬱閉シ肌膚冷テ慘澹萎
縮シ脈小ニメ緊實且疾ナル者又痙攣疼痛ノ

諸症ヲ兼發スル者ニ良ナリ故ニ慢性ノ痺麻
質私痛風腰痛膝痛顔面痛癩毒性ノ骨痛等ニ
殊稱アリ○下利痢疾等其性聖京偃若クハ痺
麻質私ニメ且腸ノ知覺増盛シ劇痛ヲ併スル
者ニ偉効ノ劑トス○水腫殊ニ皮水腫ニ良効
アリ是多クハ赤斑熱ヲ病ムノ后或ハ蒸氣鬱
閉ヨリ發スルナリ○一箇ノ焮衝病殊ニ咽喉
焮腫其性聖京偃ナル者ハ適度ノ瀉血ヲ行フ
ノ後是劑ヲ用井テ偉効アリ○散トナシ五爪
ヨリ十一爪至若其效切實ナラン一ヲ要セハ

卧蓐ニ在テ漸々温飲ヲ用ウベシ
雙鸞菊 アゴニクムナベルム 羅

麻酔劑篇ニ出ツ

硃砂 アムリアス、アキソウト 蘭

鮮凝劑篇ニ出ツ

醋酸加里 アセチン、ホトアス 蘭

同前

禮歇列私鎮吐飲 アルチオ、ハリス、タルタリ 羅

鮮凝劑篇酒石鹽ノ條ニ出ツ

民埜列利精 アピタス、アムニ 羅

安母尼亞 一名揮發羅 醋酸ト飽合メ成ル

稀澄ノ中和鹽液ナリ、味不佳ニ刺衝ス、臭ナ

シ○之ヲ服メ能ク温保スルハ、其效殊ニ皮表

ニ達シテ蒸氣ヲ發越ス、然レ調護ヲ怠リ、風寒

ニ觸ル氏ハ、其能之ニ反メ腎ニ走リテ、利尿ヲ

催進スル、猶自他發汗諸藥ノ如シ○輕症ノ

聖京屈熱、癩質私熱等ノ初起、又熱性ノ瘡疹

病乃痘瘡赤斑熱ノ如キ者、其嫩衝太劇ナラザ

時ニ偉效アリ○劇性ノ聖京倔熱神經性ノ
 聖京倔熱等ノ病末末竄透衝動ノ烈劑ヲ許ス
 下能ハズト雖蒸氣能ク發越スルハ病毒好分
 離ヲ得ヘキヲ見得ル者ハ之ヲ用井テ良效ヲ
 リ○所謂焮衝性水腫強按赤斑熱後及ヒ慢性
 水腫等蒸氣閉塞若クハ赤斑熱ノ消散早キヨ
 リ起ル者ニ太佳ナリ○外用ニ含漱劑眼水洗
 滌劑トナス乃輕症ノ咽喉焮腫ニ含漱劑ト
 シ、聖京倔性ノ遷延眼焮腫ニハ眼水トシ、羅斯
 性ノ焮衝挫傷癩麻質斯性若クハ聖京倔性ノ

頭痛ニハ洗滌劑トシ用ウルカ如シ○日ニ一
 弓ヨリ二弓至、孟假設爾ニ和シ服ス、外用ニハ
 一錢ヨリ二弓三弓至、或ハ單用シ、或ハ清涼解
 凝衝動等ノ液ニ和シ用ウ○諸酸加里、炭酸亞
 爾加里、石灰水、諸土、諸鹽、金屬鹽ヲ忌ム
 補 越而實吉醫事日札ニ曰、諸醫民垚列里
 精ニ能ク月經痛ヲ消鎮スル一異奇效アル
 ヲ稱ス○須多刺篤勃爾觚佛蘭西名醫麻須
 乙兒始メテ此病ニ此藥ノ效アルヲ偶然ニ
 發明シ、輓近ニ至リテ巴利私佛蘭西ノ醫設

天高見生論
 卷三

露鳩越篤度魯乙斯是此名ノ醫巴珍等其效
 一証ニサルヲ確定ス其方民埜列里精十二
 滴ヨリ三右一杯ノ糖水ニ和シ小半時毎
 十滴至之ヲ服盡ス通常疼痛ヲ寛輕シ月經ノ流
 出ヲ促スニハ二杯ニ足レリトス○民埜
 列里精ハ用非易ク惡ムヘキ氣味ナキヲ
 以テ此ノ如キ無數ノ病者ニ子細ニ試驗セ
 ントテ欲ス是ニ由テ之ヲ思フ兒枕痛及
 ヒ惡露ノ疼痛アル者ニ必用ノ品ナルモ亦
 未タ知ルヘカラズ○巴診ハ亦過多ノ月經

三稱用シ又子宮癌ニ用井テ姑息ノ效アリ
 ト云フ○又子宮出血月經過多ニ效アリ
 母ニ其第一魯西矢カ著中ニ經驗醫按ニ則テ註
 記ス婦人ニ惟娘第三月血塊ヲ下ス外方註
 テ崩漏ニ亦大ニ無數ノ尋常ノ血藥及此
 流ノ血ニ亦大ニ無數ノ尋常ノ血藥及此
 雪ノ法ニ亦大ニ無數ノ尋常ノ血藥及此
 症ニ之ヲ用非精ニ良ニ○此方ヲ知ル由テ
 遂ニ之ヲ用非精ニ良ニ○此方ヲ知ル由テ
 及ニ之ヲ用非精ニ良ニ○此方ヲ知ル由テ
 二事ノ復テ其後久クモ白ニ再發セリハ達
 車ニ乘リテ動ノ如クナリ由テ之ヲ再發セリハ達
 共ニ民埜列里精ニ用井テ之ヲ再發セリハ達
 良ニ民埜列里精ニ用井テ之ヲ再發セリハ達

家篤兒藥性論卷十三終

此處為正文內容，因字跡模糊，難以辨認。依稀可見一些零散字句，如「...」等。

家篤兒藥性論卷十四

和蘭

小倉

洞海林疆健脚

利尿劑

利尿劑之功效，其利泄之增多，其效之不同，乃利尿之效，以之單二之，一種者妙效，歸之者，下，或八吸

尿管ノ官能ヲ旺盛スルニ由テ切ラス者アリ。或ハ血中ニ入ルノ後尿ニ刺激性ヲ與ヘテ由テ以テ績ヲ致ス者アリ。或ハ一般ニ脈管及ヒ神経系統ヲ衝動シテ尿及ヒ諸分泌ヲ増加スル者アリ。○大凡小便ノ分泌及ヒ漏泄ヲ減少閉収スルノ因甚タ許多ナリ。故ニ其藥劑モ亦隨テ差異ナキ一ヲ得サルナリ。然レモ悉ク此ニ列舉セントスレハ甚タ廣博ニ涉リテ涯際ナク。緩和強壯。鎮痙解凝ノ諸劑及ヒ瀉血ノ

如キモ亦皆併セテ此ニ算入スヘキニ至リ。其論スル所モ重複シテ無用ニ属ス。此故ニ此篇ニ収ル所ノ者ハ持世ニ利尿劑ト稱スル者ノミ。○大約利尿藥ヲ用クベキノ症

一第 泌尿器ノ官能萎衰スルニ由テ發スル尿ノ減少障閉

二第 体中殊ニ血中ニ洩^エ乙液大ニ増息スル者

三第 洩乙液身体彼此ノ局處ニ瀦溜スル者

腎臟生理學 卷十四

即真ノ水腫殊ニ全身水腫ニ

○利尿藥ヲ用ウベカラサル症

一第 泌尿諸器ニ焮衝若クハ大ニ刺衝ノ景

况アル者

二第 泌尿器ニ血液鬱積スル者及ヒ將ニ出

血セントスルノ恐アル者

三第 小便非常ニ過多ナル者

四第 尿道閉塞器械ヲ用井サレハ除クヲ能

ハサル者

洋芹 ペートルセリニム羅

アヒユムヘトロセリニム子及ヒ根ナリ此
 物齊西里亞國撒而實尼亞同厄勒祭亞同等ニ
 野生スル傘粟花草ナリ○子實以小ニメ卵圓
 一方ハ平一方ハ圓ナリ。綠色ニメ四條山黃理
 アリ。氣味芳香峻烈竄透メ苦シ○根ハ長ク大
 指ノ如ク少シク筋條アリ。外面黃色。内面白色。
 味甘クメ少シク刺衝ス
 ○洋芹子水 アヒユムヘトロセリニム 洋芹子ヲ搗爛メ取
 タル水ナリ○利尿藥中ニ殊効アル者ナリ。四
 手ヨリ十ヲ以テ利尿孟傑設爾ニ和シ用ワ

○亞的兒性洋片子油アトリセオセリ其質凝固シタル亞的兒油ナリ○利尿劑トシ
用ウ殊々能ク髮虱ヲ消除ス
海葱セシキアラ○シキイラシキイラ羅

地中海諸島ノ海濱ニ多ク産スルシキルマ
リチマノ球根ナリ○根ノ大ナル者ハ小兒ノ
頭盧大ニ至ル者アリ嫩根ハ小ニメ外面白色
老根ハ大ニメ外面茶褐色ノ薄皮ヲ覆フ内面
ハ厚潤ナル綠色ノ肉瓣數片相抱疊ス其瓣辛
苦ノ粘液ヲ含ム○鮮根ヲ截斷スレバ香氣烈

ノ鼻嚏ヲ起シ眼淚ヲ流ス味苦烈ニメ嘔ス
ベシ乾固スル者ハ大半其辛辣ヲ耗脱ス○利
尿祛痰催吐解凝ノ殊效アリ
利尿 亘古ヨリ依ト加得ゴレム私シ同ノ輩既
ニ之ヲ水腫ニ稱用セリ就中水脈ノ官能萎衰
或ハ衰弱等ニ因テ發スル皮膚水腫腹水等腸
胃粘液鬱滯ノ症ヲ兼ル者ニ偉效アリ○大約
之ヲ用ウルハ病既ニ經久セル者ヨリハ初起
ノ者ニ良ナリトス○胸水ニハ用ウルト少シ
唯粘液性ノ喘息病ヲ兼ル者ノニ用井テ效アリ

リ○近世里布底兒名間歇熱、後屢發スル水腫、瀉劑ト配用メ大ニ效アリト稱ス、但此症ハ幾那規尼捏ニイ子ノ類ヲ兼用スルヲ怠ルベカラズ○海葱ノ諸病ニ要藥タルト實ニ此條ニ説カ如シ、然レ人或之ヲ服スレバ、能ク消食機ヲ害シ、直下ニ嘔吐ヲ發メ服シ得ザル者間之アリ、故ニ之ヲ用ウルノ際慎ンテ其害ヲ防クハシ、今茲ニ其則一二ヲ舉テ以テ考證ニ備フ**第一**發熱或ハ衝動ノ景況アリテ、脉堅實且神經症、痙攣症等ヲ合併スル者ニ害アリ**第二**

凝休ノ衰弱或ハ之ニ兼ルニ血液溶崩、若クハ酷厲ヨリ發スル者ニ害アリ、高名人露度布トイハ凝休ノ保固力、未全ク失亡セザル者ノ外、之ヲ用非ザルハ、此理ヲ以テノ故ナリ**第三**内臓殊ニ肝臟ノ閉塞或ハ硬結腫、經久ナク者ニ害アリ○大學師訶爾的楞ホルテレ名露度布トイ同等云、痔疾アル人ハ海葱ヲ用ウヘリテ、若ク之ヲ用非バ、須ラク慎戒ヲ加フベシ**第四**腎、膀胱、輸尿管等ノ疾病、論ヘバ、痙攣性ノ縮迫、潰瘍、膿潰、硬結、結石等ノ如キ者ハ用非テ害アリ**第五**胃、虛、若

クハ消化不良ノ人ニ害アリ **第六** 香竄苦味ノ品ヲ配メ藥害ヲ豫防スベシ。其品 生薑肉豆蔻桂薄荷苦味ノ越幾私類是 **第七** 腎臟瘵瘵ノ状アリテ海葱効ヲ呈スル下能ハズ。或ハ全ク用ウルヲ得ザルノ症ニ大學師云聖幾名ハ鹿角精ヲ伍用シ他醫固性揮發鹽強按揮發ヲ加用セリ **祛痰** 經久ノ肺臟聖疾候病其痰粘膠ニハ咯出シ難キ者粘液性ノ喘息病粘液勞ノ一種百日咳等ニ良ナリ。然レ呼吸器激衝ノ景況下ル者。

及ヒ肺ニ結節アリ。或ハ膿ノ聚積ナリテ恐ル者共ニ之ヲ用ウヘカラス **催吐** 海葱ハ殊ニ小兒ノ肺胃大ニ粘液ヲ生息スル者ニ吐劑トナシ用非テ良ナリ **解凝** 苦味解凝ノ越幾斯瀕劑錢劑等ヲ加用ノ第一道ノ粘液閉塞腸間膜腺ノ閉塞黃疸等ニ効アリ。殊ニ其諸病凝体ノ官能大ニ萎衰スル者ニ佳ナリ **散劑煎劑酒浸劑** トシ用ウ。就中散劑ヲ常用トス。半匁ヨリ二匁六匁至

○海葱醋五七シキルシキルラエ○アセ

○海葱乾根細醋四右硝子燻入

固封シ。微火邊ニ置キ浸出スル一八日。漉ノ滓

ヲ去リ。燒酒ニヲ加フ○一錢ヨリ二錢至ス。

桂枝水或ハ薄荷水四ヲヨリ六ヲ至ニ和シ。一

時若クハ一時半毎ニ一食匙ツ、用井テ。利尿

祛痰ノ效。大量ニ用ヰバ嘔吐ヲ發ス。

○蘧謨海葱膏蘧謨安母尼亞幾半ヲ海葱醋宜適

右蘧謨ヲ緩々ニ海葱醋ニ煮テ溶解セシム。硬

膏ノ稠トナシ。寒腫ニ塗擦メ分解ノ效アリ予

此方ヲ試驗スルニ。膝ノ慢性白腫左エル。アル

キス羅強按。穆私篤醫學韻府之度多倫ト甚

タルナキ口生ト云ク其症。獨母度多倫ト甚

タ相似テ。謬診シ易キ重病ヲ分解スル一良

藥タリ

○海葱醋蜜ルオキシムルシキ海葱醋

蜂蜜精淨右ニ味温メ和ス○諸家皆海

葱劑ニ於テ。尤此品ヲ撰用ス○殊ニ祛痰劑

シ用井テ。粘液性ノ喘息百日咳ニ效アリ○服

量年紀ニ從テ半錢ヨリ三錢至ヲ用ヰル一日

○海葱酒 リヒミムシキル 右硝子壘入固封浸

白葡萄酒 子ニ

出スル十二日 ○此物殊ニ利尿ノ效アリ

留依私健私云精烈ノ飲ヲ誤用スル由テ

類酒長飲ノ發スル水腫ニ屢佳效アリ患者ノ

胃能ク之ニ堪ルヲ見バ每次一食匙朝夕或ハ

日ニ數次用ウベシ

○海葱越幾斯 シキル 右先海葱ニ磁臼

水適宜

入レ水ヲ加ヘ搗テ毬布ノ稠トテシ綿布ニテ
絞搾シ其滓ハ再水ヲ加ヘ搗テ前ノ如クシ靜
定シ上澄ヲトリ二液ヲ合シテ微火ニ上セ水
氣ヲ蒸散シ越幾私ノ稠トナス ○性效本條ニ
同シ ○每服二匁ヨリ六匁至日ニ一次ヨリ三
次

○海葱丸 リヒミムシキル 海葱一錢

護謨安母尼亞幾二錢 石鹼者四錢

右三味 ○粘液性ノ遷延肺病ニ祛痰劑トシ用
井テ殊效アリ ○日ニ十匁ヨリ二十匁ヲ服ス

格兒矢屈謨ヘルシキム。アウテロムナセロ
 歐邏巴諸國卑平ノ地多ク自生ス。和蘭ニ於
 テハ藥圃ニ多植ス。根ヲ藥用トス。其根球形ニ
 メ。大ヤコセルヘン草ノ根ノ如ク。堅クメ筋條多シ。
 一方ハ圓ニメ一方ハ平ナリ。外面微黃内面白
 色。新鮮ノ者ハ不佳ノ烈臭アリ。味苦辛ニメ且
 粉ヲ紙ルカ如キヲ覺ス。藥用ニ供スルニハ六
 月ヨリ八月至ニ劊収スベシ。效力尤烈トス。
 有名ノ斯篤兒窟スドク水腫。粘液性喘急ニ大ニ稱
 用ス。後世脚痛風慢性儂麻質私ニ稱用シ殊ニ

慢性遊走儂麻質私病ニ奇稱アリ。世ニ高名ノ
 彪宋氏藥水エアウ、メヂカアリ。其方久ク秘
 メ傳ヘス。近者英吉利人其藥品格兒矢屈謨ヘルシキム
 ルトヲ發明セシヨリ。上件ノ諸症ニ格兒矢屈
 謨ヲ譽揚スルト愈益高シ
 ○彪宋氏秘方ノ藥品ハ、ヘルモタクナリ。ト
 名ル植物ヲ君藥トナスト云ノ説已ニ尚シ。然
 ルニ譜厄利人偶公斯當丁諾波兒ノボエ府名ヨリ、
 此藥水ノ君品ヲ得テ即格兒矢屈謨ナルヲ
 檢シ得タリ。是ニ於テ諸家皆格兒矢屈謨ヲ以

本草綱目卷之四
 卷之四

○格兒矢屈謨醋蜜コルキミ○蜂蜜精淨者

右二味○半錢ヨリ二錢ヲ服ス○大學師訶爾

的楞名ハ此劑ニ民埵列利精ヲ加ヘテ水腫ニ

奇特功アリ○民埵列利精

洋芥水ハ○右二味調勻シ

一時每ニ匙ヲ與フ○亞爾箇兒

○格兒矢屈謨實チンキ○亞爾箇兒

格兒矢屈謨實乾者細○亞爾箇兒

○格兒矢屈謨實酒コルキミ○亞爾箇兒

格兒矢屈謨實一○葡萄酒者ハ

右二味浸出○效力緩ニ味苦シ

杜松實ベツカリ○歐邏巴ノ北地ニ産スル

味苦辣ニメ微甘ナリ○利尿發汗温暖驅風

效アリ○此物胃ニ害ヲ為ハ却テ消食機ヲ

本草綱目卷之六

○杜松實傑列乙ハロブ、羅士、杜松實熟者搗トナス
 宜○滴、水適宜、右煮ル、四分時、篩ヲ以
 テ其液ヲ漉シ、又其滓ヲ絞搾メ液ヲ得リ、
 合メ其液四分一ノ白糖ヲ加ヘ、微火ニ上セ、煮
 テ傑列乙ノ稠トナス○一弓ヨリ二弓至テ、自
 餘ノ利尿劑ニ加ヘ用テ、香、味、性、効、用、法、論、詳、悉、セ、ン、カ、為、ニ、再、茲、ニ、細、説、ス
 實ガ、キ、タ、リ、私、ハ、利、尿、劑、ニ、加、ヘ、用、テ、香、味、性、効、用、法、論、詳、悉、セ、ン、カ、為、ニ、再、茲、ニ、細、説、ス
 形狀、性効、已ハ、麻、醉、劑、篇、ニ、詳、説、セ、リ、然、レ、モ、尚
 其利尿ノ効ヲ詳悉セシカ為ニ、再茲ニ細説ス
 ○夫實ガ、キ、タ、リ、私、ハ、利、尿、劑、ニ、加、ヘ、用、テ、水、腫、ニ、稱、用、ス、ル、ハ、諸、語

厄利亞名國ノ醫ヲ喘矢トス、而メ后諸家漸ク之
 ヲ試用ス、其效績勝テ言フヘカラス○或云實
 芟キ、タ、リ、私、ハ、利、尿、劑、ノ、効、大、ナ、リ、ト、雖、モ、其、害、モ、亦
 之ニ劣ル、トナシ、故ニ他ノ良善無害ノ利尿劑
 ノ右ニ出ツル、ト得ス、又云實ガ、キ、タ、リ、私、ハ、利、尿、劑、ニ、居
 恒單ニ良效ヲ奏スル、トシ、惡症ヲ發スル
 トナシト○或云實ガ、キ、タ、リ、私、ハ、利、尿、劑、ノ、効、ハ、豫
 メ之ヲ一定スル、ト能ハス、患者ノ資質ト水腫
 ノ原因トノ異ナル、ト由テ、各差等アリト、是説
 正ヲ得タリトス○大約面色慘澹、皮膚冷、脉弱

ニメ結且不齊身体浮腫ノ皮膚柔軟ナル者ニ
效アリ。皮膚緊張ノ堅キ者ニハ效少シ。又血ノ
運行虚弱或ハ不順ナルヨリ發メ閉塞ヲ併合
セル水腫ニ殊效アリ。胸水經閉ヨリ來ル所
ノ水腫赤斑熱後ニ發スル水腫等ハ共ニ實芟
荅利私效アルイ症ナリ。就中赤斑熱ヨリ來ル
者ハ甘瀕ヲ伍用スルヲ尤良トス。諸家實芟
荅利私ノ利尿ノ效ヲ論スルノ頗繁煩ニメ一
定サルノ已ニ上ニ説カ如ク。其用法ニ至テモ
又復數頭ノ分説アリ。或云實芟荅利私ヲ用ク

ルハ大ニ恐懼スベキノトナリト或云實芟荅
利私ハ大量ニ用井テ吐瀉ヲ發セサレハ可ナ
ラス。又或云只少量ヲ用井直下ニ倍加メ大
量ニ至ラシムル勿レ。何者其量若シ大過ナル
氏ハ胃腸其峻勢ニ堪ヘス。神經ノ感傷麻痺不
遂等ヲ發ス。故ニ全功ヲ收メント要スル者ハ
豫諸惡症ヲ防クベシト。是普通ノ論ニメ吾儕
ノ從事スル所ナリ。○散煎。浸子幾ノ諸劑トナ
ス。水腫ニ在テハ殊ニ浸劑ヲ良方トス。又或ハ
散末ニ脂ヲ和メ軟膏トナシ。皮膚ニ摩擦メ屢

水腫ニ效アリト云
弼筒葉ホリア、チオスマ、クレンナター羅

近時喜望峯極南、利加洲ヨリ吾和蘭ニ輸ス者

ニメ、チオスマ、セレナ一名「ボロス」マ、セレナ

ト稱スル灌木ノ葉ナリ○傳ニ喜望峯ノ土

人ハ此葉ヲ以テ家常藥トシ浸劑ヲ作テ内外

諸病ニ用井殊ニ泌尿器ノ諸症及ヒ霍乱ニ用

井テ良效アリト云又輓近里合魯西亞其他諸

方ニ於テモ亦霍乱ニ試用ス殊效ヲ見ル

トナシ○律聖布名之ヲ和蘭ニ轉諭スルニ由

テ和蘭ノ諸醫就中訶嶮地名ノ沃而律麻名輩

之ヲ用井テ效ヲ得ルヲアリト云予モ亦膏麻

ノ患者二人ニ久シク試用スレバ絶テ其效ヲ

見ス然レ泌尿器ニ殊效アルトハ許多ノ經驗

ヲ以テ確定スベシ故ニ膀胱衰弱ヨリ發スル

病及ヒ膀胱ノ聖藥トス又纖維弛

緩或ハ長病后ニ發スル水腫ニ屢良效アリ又

千八百二十六年ニ流行セシ卧兒寧硬病未詳

不〇彌按卧兒寧硬ハ和蘭ノ部名ナリ其病ノ

何病ナリト未タ詳ニセズト雖意ニ甚タ此部

中ニ流行セシルヲ以テ嬰リ幸ニ死ヲ免カレシ

本草綱目卷之...

卷之...

者後多ク水腫ヲ得テ死セリ其時ニ當テ弼箇
 大ニ稱用セラレシト云○卧兒寧硬國ノ督學
 多麻僧名人忝シキ聖シキ幾シキ同シキ等シキ常シキ弼シキ箇シキ葉シキニ就シキテ云シキヘル
 說アリ曰常弼箇ヲ喜望峯ヨリ轉輸セシ時ハ
 水腫粘液病殊ニ膀胱病膀胱聖京シキ偃等ニ然テ
 之ヲ用ウ然シキハ獨シキ水腫ニ至テハ其稱譽ノ如ク
 水液ノ排泄ヲ催進スルヲ見ス又曰卧兒寧硬
 ニ於テ多クノ水腫ニ此葉一弓ヲ浸シ十弓ノ
 液ヲトリ半時毎ニ一二匙ヲ與ヘテ腸胃ヲ強
 壯シ消食機ヲ健運シ下利ヲ静息ス然シキハ素此

葉ハ温性香竄ノ品ナルヲ以テ脉度ヲ増シ易
 キモ遂ニ之ヲ減スルヲナシ○卧兒寧硬ノ督
 學漢合而兒ハ弼箇葉ヲチオスマセレナクニ
 アラスチオスマセルヲチホリアナラント云
 又禮布舍府地名ナリノ碩學群舍ハ真ニ刊
 オスマセレナクニトスチオスマセレナクニ葉
 ハ卵圓ニメ縁圍細剪アリ柄太短クシテ殆無
 キカ如シチオスマセルヲチホリアノ葉ハ楕
 圓ニメ鉸鉞状ノ如ク邊ニ断然タル鋸齒アリ
 ○浸劑トシ用ウ一弓ヨリ二弓至ヲ以テ浸メ

藏藥性論 卷十四

八弓ヨリ十二弓ノ液ヲ取ル○大學師的私僧
 名ハ此浸劑ニ硝砂或ハ海葱醋蜜等ヲ加ヘ用
 井テ效アリト云予ハ六十歳ノ婦峻烈ノ飲液
 ヲ過服シテ水腫ヲ發スルニ用井テ效驗ヲ見
 ス但シ此婦其時ニ方テ肝臟ニ著シキ硬結ア
 ルニ由リ此劑ヲ久用スルコトヲ得ス是或ハ效
 驗ヲ見サル所以シカ概スルニ諸家ノ說皆云
 鬱積及ヒ不潔ノ膿液等内臟ニ發スル者ハ共
 ニ弼箇葉ヲ無益トス又炊衝ノ微微アルモ之
 ヲ用井テ害アリ

加印カカラインカスカイナエ
 カカラインカスカイナエ
 カカラインカスカイナエ

下劑篇峻下藥ノ條ニ出ツ

木賊エキイヒヒエハハ羅バールデン

往古嘗醫藥ニ供シ中古之ヲ廢シ近今再稱用
 スル所ノ藥品數多アリ木賊類モ亦其一ナリ
 ○物涅兒東拂里斯蘭ノ督學楞忽舍幾名三年
 前木賊類ヲ以テ醫藥ニ収入シ再利尿ハ殊効
 アルヲ稱ス蒙兒越而實吉名二君楞忽舍
 幾同カ木賊類ノ說ヲ翻譯ノ醫事日札記載

本草綱目卷之六
 木賊

七リ、夫木賊類ハ和蘭ニ於テ尤多ク生植シ直
 廉ニ且諸症ニ用井テ害ナシ故ニ予モ亦其
 説ヲ取リテ、以テ此ニ細説ス○木賊類ハ和蘭
 ニ於テ多ク卑濕ノ地ニ生ス、數種アリ、共ニ利
 尿ノ效ヲ奏ス、楞忽舍幾カ云ク、木賊類數種ノ
 中ニモイセキム、アルヘンセ、前問モイセキム
 ハ、リীগガ立ハエモイセキム、ハリステレノ三
 種ハ、效力緩ナリ、モイセキムハ、エマヒ木モ
 キイセキム、ハリモシハノ二種ハ、共ニ其效烈ニ
 メ少シク尿血ヲ顯スルニ至ル、故ニ慎ンテ用

外ルヲ要ス○世間之ヲ以テ木材或ハ有餘ノ
 器械ヲ磨琢スルニ用ウ、故ニ概々シキトシル
 一セシ磨琢ノ義ト呼フ、圃人之ヲ「ルム」ト或
 ハ「ルム」ト滋蔓ト呼フ○利尿ノ峻效
 アルニ外、更ニ保固収斂ノ效ヲ兼有シテ、血ノ
 運行及ヒ神經等ニ確著ク變動ヲ起ス、ナシ
 木賊煎、縦令保固強壯スルニ至ラサルモ、味
 苦ク、収斂スルヲ著ク、ナシ
 一第腎臟ノ筋力衰憊シ、官能之ニ由テ減却スル
 者、用ウ、ナシ

本草綱目卷之七
 卷七

第一腎臟ノ血管筋力衰弛シテ、黒血尿ト共ニ流
 泄スル尿血ニ用ク、
 第三腎臟ノ分泌機能疲憊メ、尿ヲ分泌スルノ能
 ハス是ヲ以テ尿ヲ泄利スルルカモ、亦減乏ス
 ルカ、或ハ全ク失亡スル等ノ症ヲ兼ル者ニ用
 ク。此症ニ在テハ、當ニ尿ノ分泌ヲ催進スルノ
 劑ヲ用ス。又共ニ腎臟ノ筋力ヲ發起シ、尿モ亦
 隨テ泄利シ、腸キヤ至ルルカ、
 第四腎臟輸尿管膀胱中等ニ粘液或ハ細石等鬱
 積スル者ヲ泄除ス。此劑ヲ以テ、結石病ヲ治

スルノ理ハ、尿ノ分泌ヲ増進スルノ甚シキヲ
 以テ尿ノ泄利モ亦隨テ大過シ。器内ニアル所
 ノ粘液結石ノ如キモ、之ト共ニ泄除シ、以テ大
 石ヲメ結成スルノ勿ラシムルニアリ
 第五諸分泌就中蒸氣ノ發泄減少スルカ、若クハ
 非常ニ増進スル者ノ要藥タリ。即蒸氣閉塞ス
 ル者ハ腎臟之ガ作用ニ代リ、体中ニ鬱滯スル
 所ノ多少ノ汚物ヲ尿ト共ニ泄除ス。故ニ皮膚病、
 慢性癩、麻質、私痛風等ニ驗アリ。又大汗淋漓身
 体是カ為ニ衰弱スル者ハ、腎ト皮膚トノ關係

腎臟生理論
 卷一
 一〇

大親密ナルノ故ヲ以テ木賊ヲ用非テ腎ノ官
 能ヲ増盛シ彼ヲ以テ此ニ導拽メ良效ヲ奏セシ
 ムル下アリ
 第六蒸發吸収ノ二管勢力衰憊ノ物乙液鬱積ス
 ル者ニハ其功諸藥ニ冠タリ又同因ニ依テ發
 スル所ノ諸般ノ水腫殊ニ麻疹赤斑熱ノ後發
 スル皮膚水腫若クハ内部水腫ノ要藥タリ○
 腦水腫ニ至テハ其效ナキヨ自餘ノ利尿藥ノ
 如シ
 第七焮衝性ニアラザル諸病好テ病毒ヲ尿ヨリ

分離器トスル者又其時ニ當テ尿ノ分泌各
 少ナル者ニ特ニ良ナリ
 ○焮衝病殊ニ腎焮衝腎ノ運動過大ナル者及
 ヒ其ヨリ發スル小便頻數尿血尿崩泌尿器ノ
 器械缺損即膿潰硬結癌瘡等大衰弱血液溶崩
 ノ症ノ如キハ皆之ヲ用非テ害アリ○散或ハ
 煎劑トシ用ウ但煎劑ヲ良トスニ錢ヨリ三錢
 至テ以テ淨水半比ニ煮テ漉過シ患者ノ年紀
 ニ隨ヒ之ヲ用ウ小兒ハ一匙或ハ二匙大人ハ
 半茶碗或ハ一茶碗ヲ一時毎ニ用ウ○外用ハ

本草綱目卷之九
 生論
 卷之九

乳汁ニ煮テ陰部ニ温菴ハク小便淋痛ニ效アリ
 拔爾撒謨霍拜骨ハルサルサム○バイ○バイ○バイ○バイ
セム西印度ノ海島ニ産スルココパイヘラオヒシナ
 リスヤクモト等ノ如キ骨拜霍樹ノ種類ヲ鑽
 刻メ得ル所ノ拔爾撒謨油ナリ是下品トス又
コパイヘララングスドルコパイヘラコ
リアセコパイヘラミルチユガ樹ヨリモ亦
 得之ヲ伯西爾秋爾撒謨セハラリア蘭ト云
 ○泌尿器ノ粘液膜ニ殊效アリ故ニ泌尿器者

粘液諸病就中淋病ニ偉稱アリ但シ淋病ハ初
 期ノ焮衝已ニ退散シ慢性トナルニアラズン
 バ用ウベカラズ何者陰莖勃起ノ時或ハ尿時
 ニ方リテ焮痛尚アル者ハ焮衝未去ラズ骨拜
 霍未投スベカラザルノ徴ナリ此時ニ於テ之
 ヲ投スレバ餘殘ノ焮衝再ニ増劇シ淋瀝忽止
 ミ小便秘閉シテ攝護セツ丸等ノ焮衝ヲ發シ後
 終ニ硬結腫ヲ遺シ或ハ尿道ノ狭窄ヲ餘ス是
 則拔爾撒謨コ處ル一尤モ早キニ過ルニ坐ス
 ルナリ然ルニ醫家此ニ注意セズメ之ヲ用井

本草綱目卷十四

害ヲ生スル一屢之アリ。謹サルベケンヤ。但次
條ノ草澄茄ハ。拔爾撒謨ヲ用ウルノ期ニ先々
チテ用井テ害ナシ。○粘液性ノ遷延肺病ニ之
ヲ用ウルモ。亦大ニ戒心スベシ。何者此病ハ多
ク輕々ノ焮衝隱伏スル者ナリ。然ルニ此辛温
ノ劑ヲ以テ慢ニ之ニ投スレバ。却テ焮衝ヲ增
劇シテ。惡症發スルノ媒トナレバナリ。○泌尿
器陰具等ノ諸病局部ノ弛緩ヨリ發シ。或ハ是
ニ由テ持久シテ毫モ焮衝ヲ兼サル者ニ効アリ。
諭ハ。腎ノ膿潰膀胱ノ膿潰攝護腺ノ膿潰

白帶下及ヒ慢性膀胱ノ聖京僭等是ナリ。○利
尿ノ效ハ格外ニ賞スベキニアラス。但火ノ説
ノ如ク肺臟ノ官能萎衰シ。或ハ虚弱シ。水液胸
中ニ蓄積シテ。胸水病ヲ發スル者ニ殊效アリ
○每次二十滴ヨリ三十滴至。日ニ三回。但白
糖若クハ香竄水ヲ加ヘ用ウベシ。然ラサレバ
輒胃ヲ害スルコトアリ。又乳劑ヲ作ルハ
ハ。阿刺比亞。護蛋黃等ヲ加フベシ。○
草澄茄。ハ。揮發衝動劑篇ニ
出ツ

拔爾撒謨加奈荅カナルサセ、ムカサナ、カサナ、カサナ、カサナ
 是林氏カナルサセ所謂カナルサセ純粹カナルサセ的列並底カナルサセ種類カナルサセ
 木節ヨリ得ル所純粹カナルサセ的列並底カナルサセ種類カナルサセ
 リ、太揮發ニメ白色或ハ黃白色、於罐透明香氣
 的列並底カナルサセ類味緩香竄ニメ微苦ナリ、性效
 主治用法、服量共ニ拔爾撒謨骨拜拔ニ同シ、然
 此近今用ウルハ太稀ナリ
 的列並底カナルサセ那カナルサセ種類カナルサセヲ鑽刻カナルサセシ、採カナルサセル所ハ華爾私油カナルサセナリ
 藥舖ニ驚ク者數品ナリ、就中尋常的列並底那カナルサセ

榻茶的列並底那カナルサセヲ以テ常用ノ品トス○尋常
 者カナルサセテレピンテイナ、コムニニス羅カナルサセ林氏ノ所
 謂カナルサセニミス、アビースカナルサセ類カナルサセニミス、シルヘストリ
 疆カナルサセ按ヨリトルナリ、黃色稠厚ニメ微透亮氣味
 共ニ不佳ニメ苦シ、是カナルサセ的列並カナルサセノ尤不潔ノ品
 トス、只外用ニ供スルノミ○榻茶ト稱スル者
 テレピンテイナ、ヘ子タ○ハ子ハ諸的列並中
 ノ最好品トス、林氏此樹カナルサセヲカナルサセニス、ラリキカナルサセ按
 落葉ト云フ、稀薄ニメ能ク流動シ、透明微黃味
 辛温微苦ナリ、其最上好ノ品ハ亞爾箇兒ニ全

ク溶化ノ殘餘ナク、靜定ノ渣脚ヲ生スルコトナ
シ○衝動温暖利尿ノ效アリ、大量ニ与テ能
ク大便ヲ下ス○泌尿器ノ諸病其官能廢頽衰
弱スルニ由テ發スル者、泌尿器内ニ粘液鬱畜
スル者及ヒ潰瘍ノ焮衝ノ微ナキ者、皆效アリ
リ又小便閉後淋等ニ良ナリ、但後淋ニ的列並
底那ヲ用ウルニハ、能ク焮衝ノ有無ヲ検査シ、
焮衝全クナキヲ見ハ、方纔テ之ヲ用ウベシ、焮
衝尚在ル者ニ用ウルハ、其害甚爾、撒謨骨、
霍ヲ誤用スルニ異ナルナシ○的列並底那

外用ノ能ク經久弛緩ノ潰瘍ヲ治スルヲ以テ、
此效ヲ推擴メ肺勞ニ試用スト雖、其成績能
ク外用ノ如クナリヤ否ヤ、甚疑フヘシ、何者大
抵肺瘍ハ焮衝ヲ挾有セルヲ以テ、其峻烈刺戟
ノ性、反テ焮衝ヲ煽動シ、以テ病ヲメ險地ニ進
マシメ易シ、故ニ今ノ醫家肺癆ニ之ヲ用ウル
ハ、多ク害アリトス○水腫其因諸器ノ器成ノ
缺損ヨリ來ルニアラス、全身ノ衰弱ニアリ
テ、泌尿器ノ官能萎衰ヲ兼ル者ニ、利尿劑トシ
用井テ殊效アリ、的列並底那ヲ服スレバ、小便

干莖菜臭ヲ發ス ○丸劑昆設爾弗乳劑等ヲ製
スルハ阿刺比亞護謨蛋黃等ヲ加フヘシ
見リ二十以至 ○外用ハ軟硬ニ膏ノ君品トス
○潰瘍拔爾撒謨シバルニサシム
的列並底那ニ行 阿列機油六子 黃蠟
板爾撒謨 薛爾比亞 尼 黑色者 龍腦 極末十
分 板爾撒謨 至 藥 藥 藥 藥
右六味調勻 ○是賢列氏ノ方ナリトス
的列並軟膏 的列並底那 蛋黃

右ニ味ヲ以テ製ス
○的列並底那油 テレビウム、テレピン、オリイナ、
尋常的列並底那ニ水ヲ和シ蒸餾スレバ亞的
見油ヲ得之ヲ的列並底那油一名的列並底那
水ト云。太輕稀ニメ透亮ナリ。火ヲ點メ能ク燃
ユ。氣悍烈ニメ味辛温 ○尋常的列並底那ヲ用
ウル諸病ニ皆用ウベシ。但泌尿器ノ諸病ニハ
注意メ之ヲ用ウベシ。何者若之ヲ與フルト過
量ナレバ直チニ消渴遺精尿血等ヲ發スルハ
ナリ ○水腫ノ患者内臓ニ器械ニ缺損アルヲ

本草綱目卷之十一

以テ之ヲ内用スルヲ能ハサル者ハ老利兒膏
 少許ヲ混和シ。腹上ニ塗擦メ良效アリ。○德謁
 斯人云兒生レテ未_レ十五月ニ滿タヌ。生齒ノ期
 已ニ過キテ。消渴ヲ病ム者ニ之ヲ以テ襪衣ヲ
 蘸シ。被覆メ以テ三人ヲ治セリ。○雙蘭度_名氏
 カ創スル所ノ藥劑ハ。此油ニ亞的爾ヲ伍スル
 者ナリ。此劑胆臟結石ヲ溶解スルニ用井テ效
 アリ。○的列併油ハ條蟲ニ用井テ大奇驗アリ。
 督學窟露_私更_私名_カ藥性論ニ云。予之ヲ條蟲
 ニ與ヘテ。屢偉效ヲ得タリト。○慢性ノ痺麻質

私痛風殊ニ腰痛膝痛ニ太_大褒稱ス。又腸ノ感觸
 大ニ頑麻スルニ由テ發スル所ノ頑固ノ便秘
 ニ稱譽ス。○特ニ產熱ニ稱用ス。京捏乙爾_名產
 熱ニ之ヲ用ウルノ法。先刺絡ヲ施シ。甘瀝下劑
 ヲ與ヘ。其後的列並底那油ニ錢ヨリ三錢ヲ以
 テ乳劑トナシ。或ハ舍利別ニ混和メ。一時半若
 クハ二時毎ニ與ヘテ。以テ腹痛及_レ自餘ノ症
 減スルニ至ル。但此劑ハ三劑ヨリ多ク用
 ルニ至ルヲ稀ナリ。○京捏乙爾_又的列並油
 温メ。下体ヲ蒸濕シテ。諸病ニ良效ヲ得之ヲ用

井テ諸症儼然輕快スル者勝テ數フヘカラス
 ○諸厄利亞ノ諸醫ハ一弓ノ大量ヲ用ウ。然レ此
 凉橙乙爾ハ過量トス○外用ハ衝動分解ノ塗
 擦藥軟膏等ニ和シ用ウ○内用ハ雞子黃ヲ加
 ヘテ香竄藥舍利別白糖乳劑煉膏等ニ和シ服
 ス○殺蟲劑及ヒ下劑ハ半弓ヨリ一弓至ヲ以
 テ二次若クハ三次ニ分服ス小兒ハ一弓ヨリ
 二錢至ヲ以テ護謨漿滿那舍利別ニ和シ用也
 利尿劑ハ五滴ヨリ十滴至射注灌腸ハ半弓ヨ
 リ二弓至ヲ以テ他液ニ加フ

○硫黃的列並油オレウム、テレピン、タイ

硫黃ノ條ニ出セリ

芫菁カンバンタリデ、ス羅

形、楕圓ニメ綠黃間錯セル小羽蟲ナリ。花勃里

屈私キリ名之ヲリタヘシカトリアト云林氏之ヲ

メルヘシカトリムト云往昔又「カンタリス

ヘシカトリアト云歐羅巴ノ熱地ニ多ク産ス

殊ニ是斑牙イタリヤ名國ニ産ス故ニ又是斑牙蠅ノ名ア

リ新鮮ノ者ハ氣味辛辣不佳軒メ浸蝕ス藥用

ニ供スルニハ大ハ九分許ニメ香氣烈シク形

碎ケサル新蟲ヲ撰用スベシ○性悍烈刺衝ス
故ニ皮上ニ貼スレハ焮熱赤腫シ宛火傷ノ如
キ水泡ヲ發ス此外用ノ效能ハ引赤劑篇ニ詳
説ス故ニ此條ハ獨テ芫菁ノ泌尿器陰具神經質
ニ達スル所ノ效能ヲ論スルノミ○悍烈刺戟
ノ性殊ニヨク泌尿器ト陰具トニ走ル故ニ之
ヲ誤用スレハ自餘ノ刺戟藥ヲ過用メ發スル
所ノ諸惡症ノ外更ニ小便難小便閉尿血陰具
ノ焮衝陰莖怒痛等陸續トメ發ス此時ニ方テ
尚自若トメ之ヲ停メサルハ困悶煩躁ノ終

ニ斃ルニ至ル○大ニ芫菁毒ニ中リ易キ稟
質ノ人アリ此人ハ僅ニ芫菁膏ヲ貼スルモ直
ニ小便蹇澁ヲ發ス故ニ此質アル者ハ羯布羅
少許ヲ取テ膏上ニ撒シ貼スベシ是羯布羅ハ
能ク芫菁毒ヲ消シ其性ヲ良ナラシムルヲ以
テナリ○諸醫芫菁ニ此ノ如キ一種性アルヲ
以テ泌尿器陰具諸病其因殊ニ閉塞或ハ衰弱
已甚ナルニアル者ニ供用ス即其病症ヲ左ニ
揭示ス

第一 只全身衰弱スルノミニメ絶テ他ノ因ヲ狹

ムナクメ發スル水腫膀胱ノ官能萎衰或ハ
麻痺ニ由テ小便秘閉シ以テ發スル水腫ニ效
アリ

第二膀胱麻痺メ發スル小便閉及膀胱ノ括約筋
麻痺シテ發スル小便失禁遺尿等ヲ治ス

第三纖維弛緩スルニ由テ頑固經久ナル後麻
良ナリ

第四精液ノ漏出過甚ナル者及其ヨリ發スル男
女ノ蓄息ヲ脫失及劇甚ノ白帶下等真ノ衰弱
ニ由テ持タスル者ニ良ナリ○夫芫菁ノ陰具

泌尿器ニ於ル殆ト妙效アリト云ヘシ其神經
ニ於ルモ亦復前效ニ亞スベシ故ニ神經熱ノ
知覺遲鈍ニノ神經諸症百出スル者ニ用井テ
效アリ○恐水病諸惡症未發見セサル前ニ用
井テ殊ニヨク豫防ノ效アリト稱ス○室咳百
日咳ノ病末ニ用ウ但患者知覺遲鈍ニノ粘液
弛緩質ナルニ佳トス○慢性神經病乃癩病癩
癩麻痺等ニ用井テ屢奇驗アリ○阿刺比亞護
母甘扁桃等ヲ加ヘテ丸劑乳劑ヲ製シ用ウ四
分瓜ノ一ヨリ半瓜一瓜至但多クハ丁幾ト十

ヨリ十弓至ヲ適宜ノ水ニ溶シ。晝間半時或ハ
一時毎ニ一食匙ヨリニ食匙至ヲ服ス。其利尿
下利ノ両效ヲ一舉ニ逞シクセント要スル者
ニハ、稍大量ニ用ウベシ。即一錢ヨリ二錢至ヲ
頻服ス。但之ヲ長服スレバ、腸胃衰弱ノ諸症ヲ
發ス。故ニ若シ多少又用セト要セバ、須ク保
固強壯藥ヲ加フ也。○鑛酸亞爾加里。炭酸亞
爾加里。土類。金屬鹽。石鹼類ヲ忌ム

補 弗里設藥性論ニ曰。硼砂一分。精製酒石
三分。熱湯二十分ニ溶和シ。十二日間冷所

ニ放置スレバ、澱脚沈降メ。上液清澄トナル
其液ヲ注キ去リ。降澱ヲ熬乾スレバ芒ヲ結
ハズメ透亮ノ石塊ヲナス。味酸鹹ニノ風ヲ
見テ溶流シ。等分ノ冷水半分ノ熱湯ニ能ク
溶解ス。火酒ニハ溶化セス。效能用法ハ酒石
ニ同シ。○此鹽甚タ分析シ易シ。故ニ諸酸亞
爾加里。土類。硫酸加爾基。重上。石鹼。硫肝等ヲ
忌ム。○服量ハ半乃至一乃至。但下利ニ效
ヲ要スルニハ、一弓ヨリ一弓半至ヲ溶劑
劑トナス

鹽酸金鹽ウスロルレモム。アウリ。エト。ワ。チ。ソ。ウ。

此モ亦山屬ノ利尿藥ニ算入スベシ○解凝劑

篇ニ出セリ

○輓近ニ至テ又一二ノ利尿藥ヲ出ス乃左ニ

揭トシク私アス百ハヤシ律アス羅ハヤシ

亞ア斯ス字ズ爾ル及キ私シ越ツ幾キ私シ及キ舍セ利リ別ベツ

拔ハ爾ル洛ラク答ト葉エフ

必ヒ魯ル羅ラ葉エフ

必ヒ魯ル羅ラ葉エフ

舍セ沒モ必ヒ羅ラ

右五品ハ近世出ル所ノ利尿藥ニシテ其一ハ和

蘭ノ樹林ニ生ス其二ハ魯西亞名國其四五ハ

北亞墨利加及ヒ諸邦ヨリ出ス之ヲ諸病ニ試

驗スルニ其效共ニ未十分ナラサルヲ以テ常

用ノ品ニ列シ難シ

