




增補

古方藥品考

三

武 9
64
3



門武9
卷3

齊氏

同書

藥品考卷之三目次

猪苓 一

通草 同

防已 三

木防已 同

桔蓐根 五

天花粉 同

桔蓐實 五

菖蒲 七

紫參 八

石韋 九

黃連 十

黃芩 十一

大黃 十三

竹筴 十五

竹葉 同

黃蘗 十六

乾漆 十七

葱白 十八

業山
原精

藥品考卷之三 目次

薤白 十九

大蒜 二十一

白頸翁 二十一

百合 二十二

敗醬 二十三

商陸 二十四

半夏 二十五

白前 二十七

紅藍花 二十八

艾葉 二十九

乾蘓葉 三十

蘓子 三十一

澤漆 三十二

菊花 同

土瓜根 三十四

蒲灰 三十五

敗蒲席 同

白薇 三十六

秦皮 三十七

柏葉 三十八

柏實 同

蜀漆 三十九

甘李根白皮 四十

古方藥品考卷之三

平安

內藤尚賢剛甫 著

勢州

小田惟弘元克 校

猪苓善燥泄利尿道。ハギホド。通名。南部方言。

本經曰猪苓味甘苦平主痃瘕利水道藥性論主腫

脹腹滿急痛案樹木之精液降于土中所化者味淡

薄質順降故善燥水溼引膈間水滿通利尿道

猪苓湯脈浮發熱渴欲飲水小便不利者○陽明病

汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗多胃中燥猪苓

湯復利其小便故也。

撰品猪苓。舶來者形如猪屎而小大不均。皮黑肉白。充實者為上品。又邦產與舶上者無別。出羽洲奥州者為勝。越後產形瘠薄。肉帶淡赭色者下品。

圖經曰舊說是楓木苓。今則不必。楓根下乃有生土底。皮黑作塊似猪糞。故以名之。本邦無楓樹而產

猪苓。未知何樹之精。

通草開竅通利水道。

アケビカツラ。通草即木通古名。

本經曰通草味辛平。主除脾胃寒熱。通利九竅。血脈

關節。案其莖有細孔。能通水氣。其味苦降。故能開九

竅。通利尿道。以治淋瀝。小便不利等。

當歸四逆湯。手足厥寒。脈細欲絕者。

撰品通草。即今木通。邦產舶來有二種。其舶來者皮

厚粗。黃褐色。徑寸許。細者似黃芪狀。偕一物也。凡肉

黃白。作車輻解。味苦者為良。物理小識所謂淮木通

是也。又邦產形如防己。皮灰色。截之作菊花紋。肉褐

色。味微苦者可用。藥舖此呼皮附。又去其皮。白乾者。

呼左良志。諸州山野皆有之。新編以木通為葡萄苗。

逢原以為蔓萸根者皆非。又後世方中稱通草者。此通脫木也。舶來絕無之。或充野木瓜者非。

義章 圖



○通草。蔓延繞竹木。每節岐二三枝。每一枝五葉。蔕生。夏發。淡紫花。秋結實。似扁豆。莢而肥大。皮淡紫色。瓢白。味甘美。核數十枚。形似決明子。而黑如漆。

防已。瀉尿。水腫當消。オホツバラフヂ。

別錄曰。防已味苦。溫無毒。療水腫。風腫。去膀胱熱。

案其根及莖俱貫細孔。能通水氣。其味苦涼。故能瀉

尿道。以支飲。喘滿。水腫等當消散。

木防已。湯膈間支飲。其人喘滿。心下痞堅。面色黧黑。

其脈沈緊。得之數十日。醫吐下之不愈。

防已茯苓湯皮水為病。四肢腫。水氣在皮膚中。四肢
聶聶動者。防已黃耆湯。風溼脈浮。身重。汗出。惡風者。

○風水脈浮為在表。其人或頭汗出。表無他病者。但
下重。從腰以上為和。腰以下當腫。及陰難以屈伸。

撰品防已有數種。邦產稱漢防已者佳。根形如木通。

而皮粗黑灰色。截之在菊花紋。肉黃褐色者真。其莖
為木防已。皮灰色。肉淡黃。亦在菊紋。藥舖販者。根及
莖相混。用者須辨識。陳嘉謨曰。漢防已是根。破之紋
作車輻解。黃實馨香。木防已是苗。皮皺上有丁足子。

青白虛軟。今從之。凡方書中用漢防已而不用木防

已。唯仲景氏用木防已以療隔間支飲者。蓋取其莖

之高也。又用防已以治四肢及腰下水腫者。取其根

之卑也。其可見用藥之精切。又舶來稱漢防已者。形

如蕃薯。皮淡赤色。肉白堅實。無細孔。味極苦。有益智


氣。原始所謂瓜防已是也。古方所用之漢防已。與此

不同。又有一種木防已。蔓生其葉似牽牛莖
中虛不作車輻解或謂用


木防已。則以都豆良布尼為可者。誤。

○防已。藤蔓易長。莖如木通綠色。葉似楓葉而厚。根

粗皺如南燭幹截之作菊花紋



根



在謙

萹根涼好生津潤燥。キカヲスウリノ根

本經曰枯萹根味苦寒主消渴身熱煩滿大熱補虛

安中續絕傷案其根結塊連連漸長味苦微甘質涼

降滋潤故有生津液潤燥渴之能

芘胡薑桂湯傷寒五六日已發汗而復下之胸脇滿

微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩

者云芘胡去半夏加枯萹湯治瘡病發渴者

枯萹瞿麥丸小便不利者有水氣其人若渴

撰品枯萹根形如甘藷大刮去其皮肉白滑澤中心

有花紋者真。藥舖此呼伊毛樣。出土州豫州豐州筑州等者為勝。紀州和州丹州諸州皆有之。凡形瘠小而滑澤者非真。或土人以土瓜根充枯萋者誤。

花粉潤燥。同萋根。効。通名。

案天花粉。冬月採括萋根為粉。此故潤燥渴之効。畧同。製法與葛粉同。出筑前豐後等者為佳。

撰品其色潔白。性滑澤。重不粘。匕頭者真。

萋實專療結胸氣勞。一名黃瓜。キカラスウリ。

別錄曰。括萋實主胸痺。悅澤人面。案其瓢滑。味甜微

苦。其子味淡甘微苦多脂。俱滑澤順降。故善療胸痺。結胸。泄滯氣勞倦等。

括萋薤白白酒湯。胸痺之病。喘息效唾。胸背痛。短氣。

枳實薤白桂枝湯。胸痺。心中痞。留氣結在胸。胸滿脇

下逆。搶心。小陷胸湯。寒實結胸。無熱證者。云云。

撰品。括萋實形似王瓜而黃色。其子似方柿核而扁。

小皮褐色。肉綠色者真。藥舖此呼比良。括萋或奴又

形如絲瓜子。有緣者呼利无。樣為次。俗總稱括萋仁。

又京舖以王瓜實稱實。括萋者繆。又其子呼多麻豆。

左此充栝蒌仁者並非

仲景氏曰栝蒌實一枚或曰一個而不言分量由是

觀之古子瓢借明矣圖經曰治胸痺痛方取大實

一枚切薤白半升以白酒七升煮云證治準繩肥


大結實連子皮細切用云後世唯用仁而無用實

者今也從古法用實冀有效驗矣

○栝蒌春生苗蔓延葉似苦瓜而有光澤夏開白花

似瞿麥而大後結實如王瓜而大ニカウリ晚秋熟黃橘色抱

核數枚形似方柿核オテレコ秋冬掘根形如甘藷而連生サツニモ



栝蒌

菖蒲氣導。開心利竅。即石菖蒲根。

別錄曰菖蒲味辛溫。主風寒溼痺。效逆上氣。開心孔。

補五臟。通九竅。明目。案其性生清水石上。經年不朽。

味辛氣芳香。故能導達鬱氣。以開心孔。通九竅。

菖蒲屑尸蹙脈動而無氣。氣閉不通。故靜而死也。治

方菖蒲屑。內鼻兩孔中。吹之。案生用最良。勿炒。

撰品菖蒲形如竹根。皮青肉白。味辛香者佳。又花戶

出數品。是依種藝而變。若栽之濕地。則漸歸同物。

○生深山溪水。葉細長尺許。青色光澤。四時不凋。春

生花如鼠尾狀。綠色。根多節。若蜈蚣背。



紫參通竅。降氣利尿。ハルノトラノヲ。

本經曰紫參味苦辛寒。主心腹積聚。寒熱邪氣。通九

竅利大小便。案其味苦涼降。故能通竅。下逆氣。利尿。
 紫參湯。下利。肺痛。澤漆湯。脈沈者。圖經云。治肺效。上氣。脈沈者。
 撰品紫參。形似地黃。而紫黑色者是也。



○紫參生深山溪側。葉似蛇苒草而小。莖三四寸。至春出穗。開水紅花。似蓼花而小。根紫黑色。橫生作連珠。又有圓葉及細葉者。根形色皆同。

石韋熱消。通利尿道。ヒトツバ

本經曰石韋味苦平。主勞熱邪氣。五癢閉。不通利。小便水道。癢音隆。小便不利也。案其性生幽谷石上。味淡澀。下降。故用此。則邪熱消散。能通利尿道。

鼈甲煎丸。病瘡。以月一日發。當以十五日愈。云

○石韋一莖一葉。形如桃葉。而厚硬。面青背淡赭色。

若皮革故名。秋採之，陰乾。出藥舖者可。



奇峰



黃連寒長。解熱，心臟。和名鈔カグマダサ。今通名一名王連。

本經曰黃連味苦寒。主熱氣目痛，背傷泣出，腸癖腹痛下痢。元素曰其用有六：瀉心臟火一也；去中焦溼熱二也；諸瘡必用三也；去風溼四也；赤眼暴發五也；止中部見血六也。張仲景治九種心下痞，五等瀉心湯皆用之。案其為性生寒陰溼地，根經年不朽，味極苦寒降，故其能勝血熱瀉心臟實火，以治譫語煩亂，吐血衄血。○解附子巴豆熱毒。

黃連湯傷寒胸中有熱，胃中有邪氣，腹中痛，欲嘔吐。

黃連阿膠湯少陰病得之二三日以上心中煩不得
卧瀉心湯心氣不足吐血衄血

撰品黃連邦產有數種其形似殭蠶而皮淡綠色肉

深黃味極苦者為最上藥舖此呼殭蠶樣或呼加賀

黃連其葉似菊故名出加州越州等又丹波黃連形色同上

瘠小其葉似水荊故名出丹州若州紀州等凡堅實肉黃色

味極苦者俱可用又有製黃連下品是取其細根以糊衣黃粉剉者

又有松針黃連或呼都留黃連形纖細味甚苦亦可

用其葉似五加故名出越前若狹等又有三葉者細葉者又



胡黃連即別種

其形似地黃而堅味極苦者本邦方書以世无部利充之者非

文翁

○黃連高五七寸。葉如菊葉。如水芹。而有光滑。經冬不凋。立春發莖。開細白花。根黃色。多鬚。秋冬採根。

黃芩清涼。宜利膀胱。延喜式ヤ、ヒ、ラ、ギ。今通名。別錄一名黃文。

本經曰黃芩味苦平。主諸熱黃疸。腸癖洩痢。逐水下血。閉別錄曰大寒無毒。療痰熱胃中熱。小腹絞痛。消

穀利小腸。女子血閉。案其根性自下降。氣味苦寒。故其能清涼實熱。通利膀胱。以治下利。

葛根黃連黃芩湯。太陽病。桂枝症。醫反下之。利遂不止。脈促者。表未解也。喘而汗出者。

黃芩湯。太陽少陽合病。自下利者。云云

撰品黃芩。邦產舶來有數品。其漢渡者。形如茈胡。而重實。皮茶褐色。肉黃綠色。苦味厚者為良品。呼為唐黃芩。又朝鮮黃芩。形色如唐黃芩。而肥大。肉深黃。苦味不厚者次之。藥舖分其緊實者。呼尼久樣。所謂條芩。或子芩是也。又分其老根及中虛者。呼比良樣。所謂枯芩。或片芩是也。今俗好朝鮮黃芩。之肥大深黃者。是以市人取唐黃芩肥大者。偽呼為朝鮮黃芩。其倒置虛妄。如此。大抵不拘根大小。肉黃綠色。味極苦。

者。可。擬。用。又。邦。產。者。總。稱。真。黃。芩。形。如。唐。黃。芩。而。長。五。七。寸。不。去。粗。皮。者。呼。加。波。都。幾。出。薩。州。上。州。遠。州。者。可。用。此。呼。唐。種。或。江。戶。黃。芩。又。長。尺。許。刮。去。粗。皮。色。鮮。黃。者。呼。也。末。武。幾。出。和。州。伊。州。等。此。為。次。凡。多。脂。膩。色。易。變。黯。黑。者。不。堪。用。是。皆。享。保。中。所。傳。之。漢。種。然。以。不。應。風。土。與。舶。來。者。不。同。又。舊。說。以。南。燭。根。及。博。落。回。根。贗。作。云。今。無。之。

○黃芩。春。生。芽。方。莖。高。二。三。尺。叢。生。葉。似。千。屈。菜。而。兩。々。相。對。秋。發。穗。開。紫。花。根。如。桔。梗。而。黃。色。

本草綱目卷之十三
 黃芩
 華陽
 圖




大黃良將。蕩滌。二腸。今通名。一名將軍。又黃良。

本經曰大黃味苦寒主下瘀血血閉寒熱破癥瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致新利水穀調中化食安和五臟東垣曰如定禍亂以致大平所以有將軍之號案其根之性自致下降氣味苦寒有毒故能蕩滌大小腸間實熱其功最可比良將矣

大承氣湯二陽併病太陽證罷但發潮熱手足熱熱汗出大便難而譫語者下之則愈
小承氣湯傷寒不大便六七日頭痛有熱者○陽明病譫語發潮熱脈滑而疾者

撰品大黃舶來有新舊甲乙之別大抵肥大充實深黃或黃紫斑紋者稱錦紋剉之黃色者為上品或色黑或帶白色輕虛者下品又有紅毛大黃形似漢產色黃黑亦可用舊舶有穿眼大黃良品又有牛舌片為次此二品近年不載來又邦產形如舶來而色黃黑氣厚而蕩瀉之能薄此呼種大黃今出和州是享保中傳漢種者而以不應土地與漢產不同又有土大黃形狀相似而葉微狹此呼真大黃又有羊蹄大黃葉長根黃色上二種不堪用或為外藥耳



雷竹

○大黃春生芽於宿根葉似桐葉而潤滑澤夏抽莖三四尺莖頭發細綠花如羊蹄花根似商陸而黃色

竹筴靖涼痰火逆上ハチクノアマハダ

別錄曰淡竹皮筴微寒主嘔啞溫氣寒熱吐血云云

案竹之性不畏暑不斃寒青青直上體中虛含氣刮

取其青皮稱竹筴味淡苦靖涼故能降瀉痰火逆上

橘皮竹筴湯噦逆者

竹皮大丸婦人乳中虛煩亂嘔逆安中益氣

竹葉降涼虛火上行ハチクノ葉

別錄曰淡竹葉。味辛平大寒。主胸中痰熱。欬逆上氣。案其葉即生竹上。故主上焦。氣味辛。發涼降。以治虛火上行。氣逆等。

竹葉石膏湯。傷寒解後。虛羸少氣。氣逆欲吐者。

竹葉湯。產後中風。發熱面正赤。喘而頭痛。


撰品竹種類甚多。而入藥。惟用篔簹竹。淡竹。苦竹三種。

今用淡竹為佳。竹葉竹筴及竹瀝皆須用新竹。○後

世方中別有淡竹葉。與古方竹葉不同也。

○淡竹。穀雨後生。筴漸長。二三丈。體圓正直。互生枝。

葉似苦竹不勁。



北從文石感



藥皮專掌。肌熱身黃。黃藥俗作黃柏。即

本經曰藥木味苦寒。主五臟腸胃中結熱。黃疸腸痔。

止洩利。別錄曰療驚氣在皮間。肌膚熱赤起。目熱赤。

痛。口瘡。案其樹生寒冷地。其精力皆在皮。故主肌膚。

氣味極苦寒。降以治皮間鬱熱。黃疸。除二腸中結熱。

梔子藥皮湯傷寒。身黃發熱者。大黃消石湯黃疸腹。

滿。小便不利而赤。自汗出。此為表和裏實。當下之。

撰品黃藥邦產唯一種。大抵皮厚深黃色。味苦者佳。

藥舖此呼美濃皮。出木曾山谷信州江州等。



黃藥

乾漆

素

○黃蘗高二三丈其幹皮白色裏面深黃春生葉似吳茱萸而狹夏枝上開細黃花後結小實圓有五稜乾漆益陽療諸內傷。カレタルウル。

本經曰乾漆味辛溫無毒主絕傷補中續筋骨云云案其質大溫故益陽氣療諸內傷○炙搗碎用

大黃蠱蟲丸五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食食傷憂傷飲傷房室傷饑傷勞傷經絡榮衛氣傷內有乾血肌膚甲錯兩目黯黑緩中補虛

撰品乾漆邦產者佳漆桶中自然乾枯如蜂巢而深

藥舖呼伊波乾漆者即石炭也

黑色燒之有漆氣者真又有硫黃氣者是石炭非真○漆木直上一二丈葉如椿斫其幹皮則漆汁自出夏枝梢開黃白細花似膏木花後結實扁圓下垂



孝一寫

周

乾漆

葱白

葱白通暢滋補五臟。子ギノシロ根。

別錄曰葱白平主傷寒骨肉痛喉痺不通安中利五

臟案其莖中虛含氣薰臭透達味辛甘大溫故有通

暢腹內滋補五臟之能○即去青取白

白通加猪膽汁湯少陰病下利脈微者與白通湯利

不止厥逆無脈乾嘔煩者

擬品葱有數種四時可食者曰常葱佳品生城州者


為勝又有岩附葱葉短莖肥大多白莖味甘溫亦可

用武州有之又有樓子葱如常葱而莖上出岐生根

移下可時又冬葱夏枯漢葱冬枯此三種不入藥用

○葱二月下種甚易生漸長如麥葱夏月掘根日曝

而栽之乃至冬能繁茂又八月下種則至夏長生



柘園

薤白溫腸善散結妨。ラツケウ。

別錄曰薤白味苦溫除寒熱去水氣溫中散結云

案其根久在土中不朽日曝而不死味辛甘性大溫

故能溫導腸胃以散結毒也○去葉用根

枯萐薤白桂枝湯胸痺心中痞留氣結在胸胸滿脇

下逆搶心枯萐薤白酒湯胸痺之病喘息欬唾胸

背痛短氣云

撰品薤白二月八月採根洗土炒乾者佳又生者可
最用藥舖販者偽雜不少或陳久者不堪用

○薤人家多栽葉似野蒜長柔軟根白作塊如石蒜



批唯漁昌信


大蒜益陽殺毒療瘡別錄一名葫

別錄曰葫味辛溫有毒主散癰腫蠶瘡除風邪殺毒
氣案其性不厭炎暑不畏酷寒味辛甘溫熱極葷臭

故其能益陽氣散寒淫殺毒氣療惡瘡

蜀椒閉口者有毒誤食之戟人咽喉氣閉欲絕云

換品論中稱蒜者即大蒜俗呼爾无爾久者是也



法核球文 蒜

○大蒜葉長薄綠色夏莖頭開花根白似水仙而大

白頭翁攻腸癖毒痛本經一名野丈人

本經曰白頭翁味苦微寒一本作苦溫主溫瘧狂陽寒熱

癥瘕積聚癭氣逐血止痛療金瘡衛生易方痔腫痛

野丈人以根搗塗之逐血止痛案其根入土甚深味

淡苦辛辣有毒故其功用專攻腸癖毒痛

白頭翁湯熱利下重者○下利欲飲水者以有熱故

也白頭翁加甘草阿膠湯產後下利虛極

撰品邦產唯一種形似桔梗而褐色蘆頭有白毛生

信州及諸州原野藥鋪以此充秦苳者非用者詳之



其同符野苳茶

引

○白頭翁春生苗葉似益母草而有毛茸晚春叢中發莖開一花似貝母而裏紫赤色花謝後生長藥如白頭老翁狀故名秋採根又烏有白頭翁同名

百合主用百脈一宗。サ、ユリ。

本經曰百合味甘平主邪氣腹脹心痛利大小便補


中益氣案其根味苦甘能逐邪氣主百脈一宗之病

論曰百合病者百脈一宗悉致其病也意欲飲食復不

能食常默默欲卧不能卧欲行不能行欲飲食或有

美時或有不欲聞食臭時如寒無寒如熱無熱口苦

小便赤。諸藥不能治。得藥則劇吐利。如有神靈者。
 百合知母湯。百合病發汗後者。百合滑石代赭石湯。
 百合病下之。後者百合雞子湯。百合病吐之後者。
 百合地黃湯。百合病不經吐下發汗。病形如初者。
 撰品百合。形似貝母。味苦者真。其苗呼左々由利。是
 四邊山谷皆有之。藥舖售者皆卷丹根。而非真。其他
 天香百合。山丹等種類甚多。皆不入藥用。
 ○百合葉如竹葉而厚。光澤夏抽一莖三四尺。莖頭
 開花如卷丹而白色。或淡紅色。根作塊如貝母。




五季

敗醬消腫能治腸癰。和名鈔才トコヘシ。

別錄曰敗醬味鹹微寒無毒除癰腫浮腫結熱風痺
 察其根味甘苦帶敗臭故能利水消腫治腸中癰毒
 薏苡附子敗醬散腸癰之為病其身甲錯腹皮急按
 之濡如腫狀腹無積聚身無熱脈數此為腸內有癰
 膿撰品敗醬根形似苕胡而褐色氣味帶敗臭者真
 別錄八月採根曝乾云而或去根而用莖葉者非
 ○敗醬葉畧似萊菔而多毛茸秋起莖三四尺梢頭
 開細白花根白如鼠尾近株出細蔓施四邊尺許其
 末生苗下根易繁盛

暢聖臨



商陸降攻專瀉毒腫一名當陸

別錄曰商陸味酸有毒療胸中邪氣水腫痿痺腹滿
洪案其性生溼地根至肥大氣味辛發有毒故能下
行攻毒氣以專療水腫脹滿等

牡蠣澤瀉散大病差後從腰以下有水氣者

擬品商陸有赤白二種其根色白肥大者為佳生用

有最功其帶赤色者有大毒是可貼毒腫

○蘭溪小林曰一男子年二十三患脚氣忽焉毒氣
衝心眾醫謂必死之候矣病者聞之卒然云吾命期
在旦夕乃我亦欲盡意焉即取商陸生汁一大盞服
之不移時煩悶吐利遂此毒血翌日煩悶稍減而不
死經數日復故云所謂若
藥不瞑眩厥病不瘳宜哉



精高 商陸

○商陸春生苗高二三尺葉似烟草柔嫩夏出穗開
細白花又赤色者有毒秋深莖葉枯根白肥大

半夏利喉除欬逆嘔カラスビシヤク

本經曰半夏味辛平有毒主傷寒寒熱心下堅胸脹
欬逆頭眩咽喉腫痛腸鳴下氣止汗案其味辛莖有
毒質滑降故能瀉水氣利咽喉以除欬逆嘔吐古人
與生薑乾薑同用者速其功也或謂加薑以殺之毒
則不可○生者刺人喉舌故散服者須炒用如肘後
方救卒死法者非生則無効也取半夏末以吹鼻中即甦

小半夏湯諸嘔吐穀不得下者

半夏瀉心湯嘔而腸鳴心下痞者

撰品半夏邦產形如兔屎大而潔白者為佳不拘其

大小俱可用圖經所謂羊眼半夏是也出豐後肥後

薩州者為勝西方州郡皆有之又有江州半夏質硬


皮褐色者下品又有大半夏形似天南星而白色味

若本條所謂齊州半夏是也藥舖此呼天南夏又花

戶有稱漢種者稱蠻產者皆苗葉相類而短小聊足為識耳

○半夏春生苗高三五寸一莖三葉類由跋而狹小

花亦相似。根結圓塊。如兔屎。大而白。半夏生採之。



乾品

白前順收。下氣止嗽。スバメノヲゴケ。

別錄曰白前味甘微溫。主胸脇逆氣。欬上氣。云云。

案其根下數條。氣味甘苦。收降。故能利逆氣。止欬。

澤漆湯脈沈者。圖經曰。治肺欬。上氣脈沈者。

撰品白前。根形似杜衡。而味微甘微苦者真。其苗有蔓生草生二種。今用蔓生者為佳。


○白前春生。苗葉似紫金牛對生。一根叢生。莖長。作

蔓。夏開細黃花。又草本者高一尺三五寸。葉長綠色。

夏開紅花。又有白花者。俱根形似杜衡。而不細。

紅藍潤渴止痛行血

ハナ。ベニノハナ。古言ヌヘツム
ハナ。紅藍花即紅花古名



孝禮
[Seal]

開寶曰紅藍花味辛溫無毒主婦人月經不調腹中

結塊崩中淋露產後諸血病案其性經冬而至夏開

紅花氣味甘溫故有潤燥渴止腹痛行氣血之能

紅藍花酒婦人六十二種風及腹中血氣刺痛

搨品紅花唯一種修治有二法其一採花搨扁之曝

乾者稱錢花可作燕脂又採花曝乾者呼散花可為

藥用凡色鮮紅新者為良其種有二品稱南部種者

莖高二尺許其瓣短小美紅為勝又稱紀州種者高

三四尺其瓣微長而不如南部種此種流傳出勢州

伊州和州等。又間有舶來。形色如邦產。濃紅有咱夫蘭氣。亦可用。又番紅花。即別種也。



紫魚園圖

○紅藍。晚秋下種。生苗。經冬不凋。從春暖抽莖。二三尺。其葉似小薊。而光澤。夏至發黃紅花。花下作抹彙。有細刺。猶薊花。採花者必侵晨乘露採之。

艾葉療症也。止妄血。古名サシモグサ。ヨモギ。症音薛。即薊也。

別錄曰。艾葉味苦微溫無毒。止吐血下利。下部蠱瘡。婦人漏血。案其性生於冬至。春夏氣味苦收。斂芳達。故取療症。痢止妄血之能。

芎歸膠艾湯。婦人有漏下者。有半產後因續下血。都不絕者。有妊娠下血者。假令妊娠腹中痛。為胞疽。

撰品艾。田野處處有之。其生陽地者。葉背多毛茸。氣芳發此為佳。三月五月採之。洗土曝乾。用藥鋪販者多老莖。或陳舊黑色者勿用。又有蘄艾。是享保中所傳漢種。而淡路與此畧同者有之。氣味與漢產無別。又有萋蒿。野艾蒿。白蒿。此三種不入藥用。

○熟艾。五月採艾葉。曝乾而搗之。盛竹籬。篩之去青滓。則熟艾自成。又稱伊吹熟艾者。以萋蒿製之云。
○艾自冬生。苗如初生菊葉。春夏漸長。至二三尺。秋發細絲花。結子。○蘄艾。苗葉都相似。而氣味苦且芳。

毫湯寫

雷澤



蕪葉芳發。下氣開鬱。一名香蕪。通名。

別錄曰紫蘓。味辛溫無毒。下氣除寒溫中。

案其為性。非陽地則不紫色。氣不厚。其味微辛芳烈。

故有下降逆氣開發鬱結之能。

半夏厚朴湯婦人咽中如有炙臍。

撰品紫蘓。表裏皆紫色。其氣芳發者可用。俗此呼知

利綿紫蘓。所謂花紫蘓是也。宜家製。凡用葉者。須去

蛛網蟲子。其出藥舖者甚粗劣。或香氣脫者。不任用。

又面青背紫者。名片面紫蘓。又面背共不紫色者。為

野蘓。此二種不堪藥用。

蘓子氣達。專散鬱結。レソノミ。

案蘓子。其味辛。氣芳發。故能降氣。專散鬱結。解毒。

食蟹中毒治之方。紫蘓煮汁。飲之。三升。紫蘓子搗汁。

飲之亦良。

撰品蘓子之能。專在芳香氣達。然今用其子而去殼。

是去其殼。則味淡薄而無香氣。故家說連子殼用之。

有最効矣。藥舖販者有二種。其稱本樣者。粒極細。赭

色者為真。其稱阿良樣者。粒微粗。淡黑色。此野荏子。

非真。燒試之。其氣香者真。或帶油臭者。贗也。

○紫蕪春下種生苗葉圓鋸齒粗似野荏而紫色夏
月長生高一二尺秋結子亦如荏子宜洗土曝乾



連山子位

澤漆退熱解肺欬疾

平トウダイグサ

東垣雜錄曰

本經曰澤漆味苦微寒主皮膚熱大腹水氣四肢面

目浮腫日華子曰冷微毒止瘡疾消痰退熱

案生平澤苦辛有毒故能退溼熱專解痰飲逆氣等

澤漆湯脈沈者

圖經引此方曰張仲景治肺欬上氣脈沈者云

撰品澤漆出藥舖者即止字陀伊具左唯一種可用

莖葉日華子陶隱居皆此為大戟苗不穩

○澤漆秋生濕地至春漸長高一尺許其葉及花類

大戟而短小斷之則白汁出



山陽齊持野水信 訓信

菊花涼質善除風熱古名カラヨモギ。一名家菊。

本經曰菊花味苦平無毒主諸風頭眩腫痛目欲脫

淚出時珍曰菊春生夏茂秋花冬實備受四氣飽經

露霜葉槁不落。花枯不零。味兼甘苦。性稟平和。昔人

謂其能除風熱益肝補陰云云

候氏黑散治大風四肢煩重心中惡寒不足者

撰品菊花有數百品但稱甘菊者可最用其花色黃

瓣長味微苦者真宜家製藥舖販者甚多偽雜須擇

用且陳久者不堪用又有野菊一名苦蕒其花色黃瓣短

小味苦氣臭芳此與甘菊功用不同

○甘菊自冬生苗葉如艾葉而綠色夏秋漸長二三

尺。秋深開黃花。瓣長而無心。採之日曝乾。

薑黃



土瓜散結逐瘀和血。即カラスウリノ根。

別錄曰土瓜根味苦寒療諸邪氣熱結婦人帶下不

通日華子曰通血脈天行熱疾消瘀血案其根入土

深結塊味苦涼降故能散熱結逐瘀血和氣血

土瓜根散帶下經水不利少腹滿痛經一月再見者

○陰癩腫亦主之

撰品土瓜根邦產唯一種其形似蕃藷瘠小皮灰色

肉白者是藥舖販者可用或以之為枯藁者非

○土瓜春生芽葉似枯藁有龙茸蔓延累竹木晚夏

開白花似瞿麥而濶大秋結瓜如雞子大熟赤色內

有黑核。形似結書。故名多末豆。左根結數塊。如蕃薯。



華堂寫

蒲灰尿泄。且逐瘀血。○ガマノ灰。

蒲灰散。小便不利。

敗蒲席質。同蒲灰說。○フルキガマシロ。

治馬墜及一切筋骨損方。


外臺秘要。治墜下瘀血在腹肚。取蒲灰二錢。酒服。

案其性生澤水中。故能利水氣。以逐瘀血也。

○蒲生池澤。葉似菰而厚。長四五尺。可織席。夏抽莖。

梢頭發花。似蠟燭狀。花中蕊屑細。若鬱金粉。謂之蒲

黃。又葉狹者。呼比女蒲。又俗呼末留蒲者。莞也。



邨田俊 四四

白薇降泄。清涼鬱熱。フナハラ。

本經曰白薇味苦平。主暴中風身熱。肢滿忽忽不知人。狂惑邪氣寒熱酸疼。溫瘡洗洗發作有時。

案其根之性自下降。味苦涼。故能泄水氣。清鬱熱。

竹皮大丸。婦人乳中虛。煩亂嘔逆。安中益氣。○方後

曰。有熱者倍白薇。


撰品白薇。邦產唯一種。根形似杜衡。而氣不香。藥舖

呼布奈波良根者可用。或妄以薔薇花充之者非。

○白薇春生。苗高一二尺。葉似柿葉。而有毛茸。夏開

花似白前而紫黑。或有紅花白花。後結角。根細作叢。

秦皮固滑瀉腸除熱。別錄作岑皮。



文氏櫛聞

本經曰秦皮。味苦寒。主風寒溼痺。洗洗寒氣。除熱。目
 中青翳白膜。好古曰痢。則下焦虛。故張仲景白頭翁
 湯。以黃蘗黃連秦皮同用。皆苦以堅之。案其皮味苦
 寒。收瀉。故其能固有滑瀉。除腸間結熱。
 白頭翁湯。熱利下重者。下利欲飲水者。以有熱故也。
 撰品秦皮。邦產有二種。其皮不厚。白綠色。裏面褐色。
 浸水便碧色。畫紙青色者真。今藥舖鬻者。可用。出丹
 州若州等。又有小葉者。高四五尺。枝葉相似。瘠小。其
 皮浸水淡綠色。味畧同。而下品。生城州天台山谷等。



黃華松

○秦木高一二丈。幹枝皆絲白色。春出葉一條五七葉排生。夏月枝梢開花結實。形薄片似松子而長大。

柏葉固脫止衄吐血。柏作栢者非。

別錄曰柏葉味苦微溫無毒。主吐血衄血。痢血崩中。

赤白。案其性能耐暑熱而不凋。酷寒氣味苦芳。瀉降。

故其能固有滑脫止吐血衄血。

柏葉湯治吐血不止者。

柏實降泄喘氣煩熱。即柏子仁。

本經曰柏實味甘平。主驚悸安五臟。益氣除風溼痺。

案其實。味苦辛，氣芳達。故能降泄，喘逆煩熱。

竹皮大丸方後曰：煩喘者，加拍實一分。

撰品拍葉，即側柏葉。形如扁柏而細美，味苦，氣芳者

真。陰乾，色青者良。或陳久，氣味脫者，不堪藥用。

○拍實，即側柏子。舶來者有之，形似胡麻而粗，淡黃

色，味苦辛，氣香者真。藥舖但稱拍子仁，邦產者與此

同。未出藥舖，又拍種類甚多，今皆畧之。

○側柏樹，高丈餘，葉如扁柏而不橫，譬如側手，故名。


秋結綠實，有尖不圓，其內在細子，似胡麻而多脂。



東寅



仁



蜀漆敗結，療瘧寒熱。漆コクサキノ葉同。

本經曰：蜀漆，味辛平。主瘧及欬逆寒熱，腹中癥堅痞。

結積聚。別錄曰微溫有毒。療胸中邪結氣。吐出之。常山苗也。藥性論曰味苦有小毒。主療鬼瘡。多時不差。去寒熱瘡。○治溫瘡寒熱不可多進。令人吐逆。云云。牡蠣澤瀉散。大病差後。從腰以下有水氣者。

蜀漆散。瘡多寒者。名曰牡瘡。牡蠣湯治牡瘡。

撰品蜀漆。當用茗葉常山苗。圖經曰常山蜀漆根也。

又五月採葉。八月採根。云先哲皆為常山苗。今從之。

舊說以海州常山苗充之。不穩。是其味淡甘而可作

蔬菜。何有療瘡疾之能乎。又有土常山不入藥用。



東園圖

○蜀漆。即茗葉常山苗。木高五六尺。葉似茗葉而濶大光滑。

觸之臭氣滌手。春發細黃花。根屈曲色淡黃。即為常山

李根止渴除逆煩熱。スモ、ノ根

別錄曰李根皮味苦大寒。主消渴止心煩逆奔氣。

案李根皮味苦瀋寒降故能止消渴除上逆及煩熱。

奔豚湯奔豚氣上衝胸腹痛往來寒熱。

撰品甘李根白皮其實味甘故曰甘李其根皮紫色。

似桂根而味苦澀者真案諸本草無白字恐傳寫誤。

○李樹高丈餘葉似櫻而狹有細鋸齒春開白花。花後結圓實。季夏熟赤。又有黃白紫數品。



新刊
音義
卷之二
三

