



金匱要略國字解

中編

卷三

下

中武9
76
4



門 76
新 76
卷 4

金匱要略國字解卷之三

後編上

醫官 平安

古野了作編輯

門人浪華鈴木定寛校正

卷中

此本書ノ
卷數ナリ

五臟風寒積聚病脉證并治第十一

論二首

脉證十七條

方二首

五臟
風寒
肺



肺中風者

肺ハ手大陰ナリ中ハ當ナリ此レ風ガ肺ノ臟ニ中
證ヲ言ナリ肺ハ大腸ト表裏シリ風ガ肺ニ中ハ

相連ッテ大腸ノ氣モ逆ス大腸ハ津ヲ主ル逆スレバ
則チ津液ガ上ミロヲ潤ス一能ス故ニ 口燥而肺氣逆

喘風ハ上行ヲ主リ又辨難
主ル上盛ニ下虛ス故ニ 身運運動而重

金匱要略國字解

卷之三

氣鬱ノ冒昏
行ガレハ冒

スル而腫脹肺脈ハ中焦ニ起リ胃口ヲ衝テ上テ肺ニ屬ス

肺中寒此腫脹スルハ胃虛スルニ因ナリ○昏胃ハ傷寒論國字

吐濁涕濁涕ヲ出スナリ涕ノ

浮之虛上下輕浮テ軟ナルヲ肺平ノ脈トス此浮ハ虛ニ

按之按ハ強キテ葉ノ如クニ下ニ根ナキハ上ニ浮ク氣

肝中風者肝脈ハ督脈ヲ衝テ巔ニ會シ

頭目暈肝ハ動ナリビク

兩脇痛邪ト正ト相

肝中寒者肝ニ寒

兩臂不舉肝脈ハ臑脇ノ後ヲ循テ

舌本燥然モ肝鬱スレハ

不得轉側肝木

胸中痛肝ノ經絡自ラ

食則吐而汗出也脈經千金

肝死臟肝ハ木ニ屬ノ温ヲ主ル其臟血ヲ藏マ

浮之弱是レ陽氣不足陰邪有餘ナリ

按之如索微陽カ脈ヲ鼓動スルノ能ス故ニ

或曲如蛇或ハ曲テ

行者皆臟氣絶スルニ垂ト

死肝着

肝着氣分ニ邪ヲ受

寒ヲ受ク此肝着ハ肝虛ノ寒ヲ受ク胸痺ノ痛ニ較ハ甚シカ

肝

其性上搖故ニ

行常偃偃樓ノ狀ナリ肝ハ筋ヲ主リ膝ハ筋ノ府トス肝ノ臟

今人嗜甘肝ハ熱ヲ苦故ニ甘ヲ

舌本燥然モ肝鬱スレハ

不得轉側肝木

胸中痛肝ノ經絡自ラ

食則吐而汗出也脈經千金

肝死臟肝ハ木ニ屬ノ温ヲ主ル其臟血ヲ藏マ

浮之弱是レ陽氣不足陰邪有餘ナリ

按之如索微陽カ脈ヲ鼓動スルノ能ス故ニ

或曲如蛇或ハ曲テ

行者皆臟氣絶スルニ垂ト

死肝着

肝着氣分ニ邪ヲ受

寒ヲ受ク此肝着ハ肝虛ノ寒ヲ受ク胸痺ノ痛ニ較ハ甚シカ

ラズ肝脉ハ肝絡膽ニ屬シ上ニ膈ヲ貫テ脇肋ニ布 喘逆ヲ循ル 邪氣が經ニ隨テ胸膈ニ注逆メ氣血利セス鬱閉ノ 脹疼故ニ

其人常欲踏 沈氏曰恐是拍字ト從フ 其胸上 其胸上ヲ指

テ痺着ヲ舒ナリ然モ其邪舉止時々アリ或ハ 先未苦時 即チ

陽明燥勝ハ發シ或ハ厥陰風勝ハ則チ息故ニ 其胸胃ノ陽ヲ助ケ肝

トシ又ハ發セサルノ時ニ邪ガ 胃ニ凌ト欲ス故ニ 但欲飲 其胸胃ノ陽ヲ助ケ肝

痛脹 少レ 旋覆花湯主之 臣億等按諸本旋覆花

億ナリ旋覆花湯ノ方ハ下ノ婦人雜療ノ中ニ見ユ此旋覆花ノ鹹 温ヲ用ヒ堅ヲ軟ケ結ヲ散シ葱ヲ以テ陽ヲ助其風ヲ驅飲逆ヲ下

新絳ハ引テ血分ニ入り血ヲ宣血ヲ行シムレハ則チ風滅テ 着自開 新絳ノ説ハ下ノ婦人雜療ノ中ニ於テ參考スベシ ○心

中風者 心ノ經絡ニ風ヲ受ナリ心ハ君火タリ風ガ經絡ニ 合翕發熱 翕翕ハ短羽ノ鳥ノ凡ハタルガ如キナリ已ニ傷寒論

明ナラマナニ官 不能起 風ト火ト胃ニ合セ擾キハ 心中饑 氣逆 食即

嘔吐 ○心中寒者 心ノ經絡ニ寒ヲ受ナリ心ハ君主 眞心痛ヲ為シ頃刻ニメ死ス此 後寒ガ經絡ニ 其人苦病

心如噉 示 狀 胸中麻痺 劇者 邪氣盛ニメ鬱ノ痛ヲ為

心痛徹背 徹ハ通 背痛徹心 若シ緩ナルハ邪正 辟言

如虫注 綿 其脉浮者 乃チ風邪ヲ受テ致ス所ナリ風

故ニ 自吐 即チ邪 乃愈 ○心傷者 心傷ハ主明ナラス

其人勞倦 心既傷ヲ受ハ神氣攝ス 即頭面赤而下

重 下部重着スルナリ 心中痛而自煩 然モ心虚スレハ則チ

内鬱スレハ 火反上升ス故ニ 心中痛而自煩 火カ外ニ越ユ故ニ

發熱

心虛ノ治ス水ガ上ラ陵ト欲ス故ニ

當臍跳其脉弦此為心

此レ心氣内傷多ノ風寒少キヲ辨スナリ

臟傷所致也

此レ心氣内傷多ノ風寒少キヲ辨スナリ

○心死臟

心ハ脉ヲ主ル而モ

麻豆

乃チ潤澤ノ氣ヲ失フ總ラ是レ狂陽躁急ナリ

按之

重手ニテ診ヲ言フ

益

躁疾

者

陰モ亦急烈ニ陰陽凡ニ邪ガ盛ニノ正氣敗絶故ニ

死

○邪哭

沈氏曰恐是入字心ハ君

主官

タリ神明出ツ但シ氣ヲ陽トシ血ヲ陰トス氣血虛ノ六淫感入レハ則チ癲狂ヲ為ス或ハ外邪侵入ルノ無即チ是レ他ノ臟ノ氣

病

逆ノ心ニ乘ンモ亦能ク病ヲ為故ニ總テ邪入ッテ

使魂魄不安者

血氣少也

故

心ハ血ヲ主ル

血氣少者

屬於心

心虛ニ屬ス

心氣虛

者

神識斂ス

其人

一本ニ有リ則字

畏合目

欲眠夢遠行

而精神離散

魂魄妄行

皆心ノ血虛ニ因ッテ陽

神守ラズ散越ル故ナリ

氣衰者為顛

心陰ノ虛ニ他臟ノ陰ガ血分ニ乘シ陰

陽氣衰者為狂

心陽ノ虛ハ則チ他臟ノ陽カ氣分

乘

シ陽邪熾盛ニ暴烈

陽氣衰者為狂

躁急ニ垣ヲ踰屋ニ上リ妄言罵詈ス所謂陽

陰

氣衰者為顛

陽氣衰者為狂

躁急ニ垣ヲ踰屋ニ上リ妄言罵詈ス所謂陽

中風者

中ハ當ナリ此レ五臟ノ中風中寒ノ中ノ字ハ邪ガ裏ニ

證

ヲ現ラ言フナリ風痲中風ト作フ無レ此レ火ト土トハ

發熱

脾ハ四波ヲ主リ又困ヲ主ル風ガ脾ニ入レハ

形如醉人

子母タリ賊邪ガ脾ヲ傷リ火邪カ土ニ乘ス故ニ

然

外風内濕相合

腹中煩重

氣虛ノ肌肉ニ

皮目

疑

然

外風内濕相合

腹中煩重

氣虛ノ肌肉ニ

皮目

疑

脾

肉人字 潤 動貌也 而短氣 短氣ハ息遠ニキル甚ク言

臟 脾脈ハ浮ナラズ沈ナラズ疾ナラズ 浮之ヲ大堅 是レ陽邪ノ過強ナリ

按之如覆瓦 謂邪モ亦盛ナリ 經ニ潔潔 流レテ動クカクニ

如搖者 乃チ邪盛ニ正虛ス陰陽奔進テ脱セント欲スル 死

臣億等詳五臟各有中風中寒今脾具載中風腎中風中寒 俱不載者以古文簡編極多去古既遠無文可以補綴也

○況氏曰但脾中寒腎中風中寒乃チ脱簡ニ因テ文ノ補フベキ 陰黃連阿膠湯ノ證ヲ補テ中風トス通脈四逆

湯ノ證ヲ補テ中寒トス識ス以テ何如トカ為 ○跌陽

脈 脾胃脈ナリ此レ跌陽ヲ診テ 浮而濇浮則 胃陽邪盛ナルニ

屬ス 胃氣強濇則 脾胃ニ邪ヲ受テ下モ膀胱ニ逼ル故

小便數 然モ脾血既ニ衰陽氣過盛ニノ胃中ノ 浮濇相

搏 大便則堅 脾ノ結約ニ因テ其脾為約 故ニ

麻子人丸主之 一名脾約丸

麻子人丸方 ○入ト仁ト古字通ス

麻子人 二升 芍藥 半斤 枳實 一斤

大黃 一斤 厚朴 一尺 去皮ラ○鹿皮ヲ去ルナリ

杏仁 一升 去皮以火熬別作脂ト ○杏仁ヲスリツレ指為ナリ

右六味末之煉蜜和丸梧桐子大 出前ニ飲服

十九日三以知為度 麻仁芍藥脾ヲ生養ノ腸胃

大黃枳實厚朴

腎

杏仁氣ヲ下ノ陰分ノ結ヲ宣行ス陰虛シ津涸ニ因ツテ峻將
ニ宜カラズ故ニ丸藥ヲ以テ緩ニ攻ナリ○吳昆曰必ス胃強
能ク用之ヲ若シ胃強ニ非ハ則チ
承氣ノ物禁ズル所ニ在リト ○腎着之病 此寒濕ガ腎

ノ經絡ニ浸淫ノ病ナリ腰ハ腎ノ府タリ寒濕ガ腰ニ浸
淫シ腎ノ經絡ニ痺着テ氣血ガ轉運ヲ得ズ故ニ 其人

身體重^{下モ帶脈ニ連ハル} 腰中冷如坐水中形如水

狀^{腰ノ空ル形ガ水ノ冷ナルガ如キヲ腎着ト云} 反不渴小

便自利飲食如故病屬下焦^{下焦腎ノ部ニ屬ス}

此身勞汗出衣裏^{一作表}冷濕^{ヒユシ}久^ニ久^ニ得^テ之^ヲ 腰

邪ヲ為^シ下焦ニ痺陽鬱^シ輕^ク 腰以下冷痛^{邪カ内ニ應} 腰

重如帶五千錢^{腰重キ一錢五貫} 甘薑苓亦湯主之

甘草乾薑茯苓白朮湯方^{一名腎着湯}

甘草 二兩 白朮 二兩 乾薑 四兩 茯苓 四兩

右四味以水五升煮取三升分温三服腰

中即温^{甘草白朮乾薑茯苓ヲ以テ經ヲ温メ脾ヲ健ニ濕ヲ導テ其源ヲ清ラスレハ則チ腎ヲ治セザレモ痺着}

腎死臟^{腎ハ精血ヲ以テ體トス脈沈實ニ滑ニ宜シ反テ} 浮之堅^{乃チ陰水カ全ク}

按之亂如轉丸^{按之ヲ得ベカラザレバ云フ則チ陰陽邪正雜迫散脱トスルナリ}

益下入尺中者^{尺部ハ陰トス此陰絶シ陽陷テ至ラズ故ニ} 死○問曰

二焦竭部^{竭ハ盡ナリ衰ナリ物ニ着セ} 上焦竭善

三焦^{ラレテ其氣衰竭スルナリ}

意十六難ニ善怒本義ニ

何謂也師曰

經ニ謂ル食胃ニ入テ氣ヲ陽ニ長

氣若シ中焦胃病 味和不能消穀

氣ヲ上焦ニ長ス 上焦受中焦

故能噫耳

宣明五氣論曰五氣病所ハ心ハ噫ヲ為類註ニ噫ハ伊隘ノニ音釋

義日飽

下焦竭

食息ナリ

胃中濁濕下モ腎間ニ流レ 即遺溺

失便其氣

不和不能自禁制不須治

上下ノ二焦ヲ治スルヲ須ス中焦ヲ調ヘ

久則愈

焦胃ヨリ致スナリ 經云上焦心霧ノ如ク下焦ハ瀆ノ如ク中焦ハ漚ノ如シ相連ッテ一タリ誠ニ陰陽

分チアリ泡ハ陽トス水ハ陰トス泡ノ下タ水ノ上即チ是ニ中焦ニテ上ノ二焦ヲ分チ出シ陰陽平半ナリ ○此條上下二焦ノ病モ中

焦ノ氣和セザルニ因ッテ致スナリ故ニ上下ノ二焦ヲ治スルヲ須ス中焦ヲ調ヘ中焦ノ氣和ヲ得テ病自愈ベシトナリ若シ中

焦ノ不和ニ因ラス上焦下焦ニ自ラ病ハ症ニ隣ッテ 師曰

熱在上焦者 心肺上ニ居スルヲ上焦トス邪熱上ニ因

效為肺痿熱在中焦者則為堅 中焦ハ乃チ脾胃ノ主ル所ナ

邪熱ガ中ニ在ッテ燥屎ト痰飲ト相結ッテ 熱在下焦

者 下焦ハ肝腎膀胱大小腸ノ主ル所ノ 則尿血亦

今淋閉不通 淋病ナリ 大腸有寒者

大腸ニ寒ヲ受ケ傳道職ヲ 多致為澇 大便水ノ如クニ其

乾糞ナリ水ノ厭ト相雜ル故ニ 有熱者 若シ邪熱力大

ナリ驚ハ音目乃チ鴨ナリ鴨ハ乃チ一生

乾糞ナリ水ノ厭ト相雜ル故ニ

ナリ驚ハ音目乃チ鴨ナリ鴨ハ乃チ一生

腸腸之津液為蒸便腸垢腸之垢小腸腸之

有寒者小腸受寒其人下重即後重便

血有熱者濕熱火大必痔痔之積積之

何謂也師曰積者臟病也積之

聚者腑病也聚之終不移也一本也

發作有時展轉痛移無形為可治治之

氣者胃氣脇下凝積為可治治之

痛按之氣散則愈復發

為繫氣諸積大法臟氣

脈來細而附骨者乃積也然積

在胸中微出寸口積在喉中關

在心下微下關積在少腹尺中積

積在氣衝五寸脈出左氣左應積

積在氣衝五寸脈出左氣左應積

積在氣衝五寸脈出左氣左應積

積在氣衝五寸脈出左氣左應積

積在氣衝五寸脈出左氣左應積

積在氣衝五寸脈出左氣左應積

在左脉出右積在右脉兩出

兩ノ手ニ出レハ乃チ營衛氣血中ニ交會シ

虛邪積在中央各以其部處之

此積脉ノ部位ヲ分テ治

ヲ定ルナリ蓋シ素問靈樞ニ痺癰腸覃伏梁息奔肥氣奔弛痞塊アリテ名狀悉ク具ル此書ニ復テ重テ出ス但其脉ヲ補フニ

痰飲欬嗽病脉證并治第十、二

論一首 脉證二十一條 方十九首

痰飲

問曰夫飲有四何謂也師曰出前有痰飲有

懸飲有溢飲有支飲此四飲ヲ以テ飲病ノ大綱ヲ為テ痰飲

腑表裏其懸處ニ隨テ病ヲ受ク僅ニ痰飲懸飲溢飲支飲ノ其名ヲ盡ベキニ非ス故ニ下ニ諸條ヲ出ノ互ニ明スルナリ

○問曰四飲何以爲異師曰四飲殊ナリト雖氏其源ハ同ク胃ニ出ツ内

經ニ總テ謂フ溢飲ハ渴ノ暴ニ多飲メ肌皮腸胃ノ外ニ溢入ナリ又謂ク飲ハ胃ニ入テ精氣ヲ游溢シ上ニ脾ニ輸シ脾氣精ヲ散ノ

上ニ肺ニ歸シ水道ヲ通調ノ下モ膀胱ニ輸シ水精四ニ布テ五經並行是ノ如クナレハ則チ津液周身ニ佈氣血ガ肌肉ニ充テ痰

病ナシ脾虛シ其常度ヲ失ノ脾精ヲ散ゼズ肺通調セズ水精布バ津液水飲化メ痰飲ト爲ハ則チ五臟ガ胃ノ際ヲ受ルテ失ノ真氣

ガ肌肉ニ充テ故ニ其人素盛今瘦若シ痰飲ガ水走

腸間水ノ腸間ニ瀝瀝有聲經ニ謂溢

之痰飲標ヲ痰トスイマダ飲後水流在脇下乃チ

胃ニ積テ糜理密ナラズ汗ノ藜ガ出ルカク横ニ胃ノ外ニ溢脇下ニ流ル脇ハ乃チ陰陽ノ道路ナリ懸飲カ往來ノ氣ヲ阻抑テ痰

脇ニ動シテ痰飲引痛謂之懸飲物ガ其處ニ

飲水流行歸於四肢脾肺ノ氣ガ轉運シ能ガサレバ飲

汗即チ汗出テ 當汗出而不汗出 經逆ニ身體疼

重謂之溢飲 經逆溢テ肌皮ニ入ル是レナリ若シ溢テ胃コ

遇メ上逆ス 欬逆倚息 倚音倚依ルナリ又音意モ義同此

短氣不得臥 外カ皮モニ應レ肺 其形如腫 水腫ノ

謂之支飲 飲水カ胸膈ニ 〇水在心 心包絡膻中宗

心下堅築 痞氣ノ類ノ如シ呼吸ヲ 短氣 息遠シキノ甚キヲ

惡水不欲飲 〇水在肺 肺ハ呼吸ヲ主リ營衛

宣不津化ノ痰ト為氣ニ 〇水 吐

延沫 涎沫去テ肺熱シ 欲飲水 水ヲ飲ニ潤

在脾 脾ハ乾健ノ陽ヲ具テ生化ノ源タリ胃ト共ニ其津液ヲ

五臟賴テ無ハ則チ 少氣 陰濕鬱テ陽 身重

水在肝 肝ハ兩脇ヲ經布テ膈ト表裏タリ肝虚スレハ則チ

テ脇下ニ流ル虚損スレハ則チ 脇下支滿 支ノ充

氣升ラズ痰ガ經隧ヲ阻テ 痛 〇水在腎 腎ハ胃ノ関タリ相火寄レ之ニ

利セガルトラ致シ飲反テ腎ニ流レ腎陰盛ニ 心下 悸

夫心下有留飲 心下ハ即チ胸膈ノ間ナリ 背ハ胸ノ

胸中ニ溢テ偏ニ背ニ着腎督ノ二脈張ラサレハ則チ胸背温ナラズ

中ヲ癭シムルヲ 大瘧ノ如シ其ノ或ハ氣虚スレハ則チ心下ノ留飲ガ

金匱要略國字解 卷之三

其人背寒如手大掌ノ字一本ニ○雷飲者飲

脇下ニ流レテ鬱遏ハ脇下痛引缺盆廉陰ノ經氣宣ス故ニ

ノ傍四寸ニカイサウモト子氣往テ上ニ提テ通ズバ此復鬱

アリ然モ効嗽則脇下ノ氣ヲ提テ通ズバ○胸中有雷飲飲ガ胸中ニ雷偏ニ

短氣而息遠シキノ甚ヲ云此心火下降スルヲ○膈上病痰此支飲ナリ甚

逆周身ノ氣宣テ痰飲四肢關節ニ攪流故ニ此ハ變ノ溢飲ヲ

為蓋レ雷飲乃チ氣鬱ノ水攪故ニ脈沈者有雷飲○膈上病痰此支飲ナリ甚

滿喘欬吐大陽ノ氣ハ上ニ胸膈ニ貫大陰ノ氣ハ下傍臑ニ

膈ニ雷テ以テ陽腰ガ密ナルヲ致シ内飲ニ外邪ヲ招テ襲入

内外邪ヲ合セ肺氣ヲ壅逆則チ膈上痰滿喘欬吐ヲ病但レ傍

臑外カ其邪ヲ受テ發則寒熱背痛腰疼目泣自出邪ヲ

發スル病ハ乃チ痰濕陰勝ニ因ツテ衛陽ノ氣洩テ致ス故ニ其人振振身瞤劇瞤ハ動

必有伏飲伏メ出ザル○夫病人邪熱カ脾ニ乘スレハ

飲水多轉輸職ヲ失則チ水ガ必暴喘滿脾虛ニ胃

則チ食少飲凡食少飲多水停心下甚者氣弱

多シ故ニセス反テ腎陰則季微者但肺氣阻テ短氣息遠ノ

者強ハ減ナリ乃チ胃寒也此レ飲ニ屬セズ乃チ脾陽ヲ傷

急トスベシ故ニ飲比白大下後裏虛脈偏弦者飲カタク

言ズノ寒ト言フ

金匱要略卷之四

也 乃チ不ト火ト燼ニ旺スルニ屬ス火ガ土ヲ炎シ燥テ

飲ハ木ヲ抑メ脾ニ乘ノ飲ヲ致スニ因ズ故ニ脈不レ弦

散スルヲ能ハズ化ノ痰飲ト為胸膈ニ貯呼吸ヲ阻抑肺氣升降スルヲ得ズ故ニ

氣前ニ支飲 上焦ノ宗氣虚ノ脾土温ナラザルニ因リ津液化ノ痰飲ト為リ虚ニ隨フテ上ニ胸

中ニ溢宗肺胃ノ氣ヲ壅逆升降ヲ得ザレバ亦喘而不能臥加短氣

由ズ故ニ其脈平也 以上ノ二條ハ此レ肺飲支飲脈弦ナラザ

ヲ指ス支飲ハ即チ水ガ心ニ在ル是ナリ ○病痰飲者 脾健運ヲ失シ水濕

ニ屬ノ陰邪タリ濕ガ内ニ淫スレハ治スルニ當以温藥

之 即チ陽ヲ助ケテ脾ノ濕ニ勝チ陽ヲ運化セシムレバ濕自ラ除ク

○心下有痰飲 清陽ガ運ラザルニ由テ肝腎陰ガ及テ上ニ溢津液カ痰ニ化ノ胸膈ニ貯

胸脇支滿目眩 苓桂朮甘湯主之

苓桂朮甘湯方

茯苓 四兩 桂枝 三兩 白朮 三兩

甘草 二兩

右四味以水六升煮取三升分温三服小

便則利 此支飲ノ方ヲ出スナリ 桂枝ノ新温ヲ用テ營衛ヲ

ノ風眩ヲ治ス水ト濕ト類ヲ同ラス故ニ茯苓腎邪ヲ泄ノ痰飲ノ

源ヲ伐故ニ方後ニ云ク服スレバ小便則チ利ト

○夫短氣 前ニ有微飲 當從小便去之 肺

金匱要略

卷之三

十一

出ツ吸ハ腎ト肝トニ入ル若シ心肺陽虛ノ運ス微飲ガ心下ニ盛
ハ呼氣ガ源ニ歸クヲ得ズ短氣ニハ桂苓ヲ用ヒ陽ヲ通シ濕ヲ
滲ホ甘ハ脾ニ培轉運ヲ輸ハ桂苓朮甘湯主之
微飲自ラ小便ヨリ去ル故ニ

方見
腎氣丸亦主之
方見脚氣中△少陰ハ樞タリ
肝腎陽虛ノ開閉ノ職ヲ失

水飲ガ下モ腎ニ流レ吸氣ヲ阻抑テ腎ニ歸セズ短氣ナルハ腎氣丸
ヲ以テ火ノ源ヲ益ベシ陽ノ機ヲ健運シムレハ開閉權アリテ清濁
分テ微飲小便ヨリ去ル故ニ腎氣丸モ亦主之ヲ即チ水ガ腎ニ在ルノ
正方ナリ○喻氏ノ説ニハ呼氣ノ短ニハ桂苓朮甘湯ニテ以テ其ノ陽ヲ
通シ陽ガ氣ヲ化スレバ則チ小便能出ツ吸氣ノ短キニハ腎氣丸ヲ用テ以テ
其陰ヲ通ス腎氣通スレバ則チ小便ノ開閉利スルナリト

○病者
雷飲ガ心下ニ壅積陰靈陽鬱ヲ以テ
營衛利セザルヲ致シ經隧通セザレバ則チ
脈伏然モ
ガ陰邪ノ阻ヲレラ被ト雖凡或ハ時々ニ
伸舒シ伏飲ガ容聚ル所ナレ故ニ
其人欲自利
痰飲去ル故ニ
反快陽氣偶伸舒ヲ得テ自ラ利ス然レモ
心胸即チ終ニ恒ニ其陰ニ敵スルヲ能ズ故ニ
雖利

雷飲去ルト雖レ盡ク
除ク下能ス仍復
心下續堅滿此爲雷飲欲去
故也
雷飲去ラント去ルヲ能ルナリ故ニ
其陽氣轉動ノ機ニ乘スベシ
甘遂半夏湯
主之

甘遂半夏湯方
甘遂 大者 三枚
半夏 十二枚以水一升
芍藥 五枚
甘草 如指大一枚炙
○無甘草者非ナリ

右四味以水一升煮取半升去滓以蜜半
升和藥汁煎取八合頓服之
此伏飲ノ方ナリ半
夏ヲ以テ飲テ滌シ

芍藥陰ヲ收但レ甘草ト甘遂ト相反ス用之ヲ何ッヤ蓋シ痰飲
結伏心下堅滿故ニ反ッテ亂ノ勢ヲ借ッテ正ヲ撥ノ功ヲ居ヌ

分爭伏飲ヲノ地ノ容ベキ無ラシメ堅壘ノ根ヲ剋盡ノ胸中
即ノ曠ヲ得ルナリ此方急引ナル故ニ真氣ヲ傷テ致スヲ恐ル故ニ
蜜ヲ以テ和之ヲ

其毒ヲ制スルナリ ○脉浮而細滑 津液飲ニ化ノ血ニ化セ
脉浮細滑蓋シ滑ハ陰氣有餘ニ屬ノ水象
タリ浮細ヲ見ノ中ニ滑ヲ帶ハ此

飲ニ傷ラル、コヲ知ラス淳古飲 ○脉弦數者 木火過盛ニ
病論ニ詳ニ説ク參考スベシ 土鬱ノ伸ス

水濕流ズ化ノ飲ト為ル飲ハ 有寒飲 若シ冬月ノ脉ハ沈靜ナル
乃チ陰ニ屬ス故ニ謂フ

陽氣旺ノ反テ水濕ノ飲ヲ 冬夏難治 ○脉沈 水ガ内ニ
得ハ脉證ト時ト違フ故ニ

弦者 衛氣行ラザルコヲ主ル津液凝滯 ○懸飲 飲ガ陰陽道路
化ノ飲ト為リ脇下ニ流注故ニ

則チハ内痛 ○病懸飲者十棗湯主之

十棗湯方

芫花 熬

甘遂

大戟

各等分

右三味搗篩以水一升五合先煮肥大棗

十枚取八合去滓內藥末強人服一錢匕

羸人服半錢平日温服之不下者明日更

加半錢得快下之後糜粥自養

王方ナリ十棗脾胃ヲ調ヘ固テ水濕ヲ運シ大戟芫花甘遂

共ニ臟腑經絡ノ痰飲ヲ逐シ飲ヲ去ラシムレハ元氣自ラ復ス故ニ

其峻ヲ畏ス○十棗トハ大棗十枚ナルガ故ニ名ク然ルニ當時杜

撰ナル醫書人十棗湯ヲ細末ニシテ白湯ニテ用ハリ製方ノ本

目ヲ失フト謂フヘシ○此ノ方壯實ノ人ニ
用ユ虚羸ノ人ハ輕シク與ベカラス
病溢飲者 風寒
膈ヲ傷リ表裏ノ氣鬱ノ宣サレハ飲水流行キ四肢ニ歸ノ皮
膚腫滿ス蓄汗スベク汗セザレハ身體痠重シ此表裏風寒

兩十カラ傷ル表ニ偏ニ
寒多者ナリ故ニ
當發其汗ニ大青龍湯主之

麻黃桂枝ノ二湯ヲ以テ芍藥ヲ去リ石膏ヲ加ヘ大青龍湯ト
為ノ並ニ表裏ノ邪ヲ驅石膏以テ風化ノ熱ヲ清メ陽氣ヲ
通セシメテ邪ガ汗ヨリ解シ飲ハ下モヨリ滲ス或ハ寒邪ニ因ッテ偏
ニ内ヲ傷リ脾胃ノ氣逆ノ痰飲軀殼肌肉ノ間ニ溢出テ浮腫疼
重キハ當ニ小青龍湯ヲ以テ逐表ヲ
解シ内外ノ飲ヲメ地ノ容ベキ無シム故ニ
之

大青龍湯方

麻黃 六兩

桂枝 二兩

甘草 二兩

生薑 二兩

杏仁 四十箇

大棗 十二枚

石膏 碎如雞子大

右七味以水九升先煮麻黃減二升去上

沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升取微

似汗汗多者溫粉粉之粉ノ字傷寒論ニ撲ニ作ル

○溫粉方明理論ニモ本
事方ニモ出ツ白朮 芎藭 本川芎 白芷 各等分 右搗羅為細末
每末一兩ニ入米粉三兩和令勻 粉撲周身止汗 無芎藭本

小青龍湯方

麻黃 三兩

芍藥 三兩

五味子 半升

乾薑 三兩

甘草 三兩

細辛 三兩

桂枝 三兩

半夏 半升

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上

沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升大小青龍ノニ

方ノ義既ニ傷寒論國字鮮ニモ出ツ○成氏曰青龍ハ東方

甲乙木神ナリ春ニ應メ肝ヲ主ル發生ノ令ヲ專ニメ榮ヲ敷

テ木ノ葉ニ應ス青龍ト謂フ所以ハ榮衛兩傷ノ邪ヲ發散ス

ルヲ以テ是レ肝木ノ體ニ應スルノ三桂枝湯ハ中風ヲ主ル麻黃

湯ハ傷寒ヲ主ルニ者發散ノ純ナル者ナリ大青龍湯ニ及ハ則

然ズ發汗ノ劑タリト雖氏主トコロ又一チガアル必セリ中風ニテ脈浮

緊ヲ中風ニ寒脈見ト是レ風寒兩傷ナリ傷寒ニテ脈浮緩ヲ傷

寒ニ風脈ヲ見ト是レ風寒兩傷ナリ風ニ寒ヲ兼テ寒ニ風ヲ兼

乃チ大青龍湯專ラ主レ之ナリ茲脈證ヲ見桂枝湯ヲ與テ肌解

以テ風ヲ祛ト欲スト雖氏其寒ヲ已ラ能ガレハ則チ病去ラス或ハ麻

黃湯ニテ汗ヲ發ノ以テ寒ヲ散セント欲スレハ而モ其風ヲ去

能ガレハ則チ病仍ラ在リ茲仲景特ニ大青龍湯ヲ處ノ以テ兩解

スル所以ナリト又曰惟其表且鮮セガルニ又加フルニ心下水氣アレ

麻黃湯ノ能ク發スル所ニ非ズ桂枝湯ノ能ク散ズル所ニ非ズ乃チ

小青龍湯ヲ須テ始テ表裏ノ邪ヲ祛除シ可ノ三

○**膈間支飲** 風寒内ニ入り脾肺ノ氣ヲ阻遏津液行ス化

其人喘滿寒ガ心下 心下痞堅腎邪ガ上ニ應スレハ其

微黒ハ水氣アルノ 面色黧黒黧モ黒ナリ寒ガ 其脉沈

義ナリ故ニ甚キハ 緊得之數十日 邪ガ内ニ向フ而ラ醫者

不愈單ニ 木防己湯主之防己味辛氣溫能雷飲結

主ル石膏辛甘寒心下逆氣喘急ヲ主ツテ風化ノ熱ヲ清ス人參

膈飲ヲ消シ心肺ノ不足ヲ補フ桂枝ノ辛熱ヲ以テ血脉ノ間ノ結

氣ヲ通シ風ヲ驅此但 其風ヲ治ス若シ風邪ガ 虛者風去ルヲ

氣分ニ壅逆者ハ服之風去テ即チ愈ユ故ニ 即愈若シ寒邪ヲ挾三血分ニ入り深ク下焦ニ連リ穀風去テ

金匱要略卷之三

疾一之三

實者寒實ヲ指ス 二日復發復與湯ヲ與テ 不愈

者 就テ此湯ヲ以テ石膏氣分ノ藥ヲ去テ芒硝ヲ加ハ陰ニ入テ以テ痰結ヲ開キ病根ヲ驅逐茯苓以テ腎邪ヲ伐兼

テ心下ノ痞ヲ瀉ス故ニ 宜木防已湯去石膏加茯苓芒硝

湯主之

木防已湯方

木防已 二兩 石膏 雞子大十枚 桂枝 二兩

人參 四兩

右四味以水六升煮取一升分温再服已防

ニ二種アリ 汪昂曰漢中ニ出ツ根大ニ虚軟ニ心ニ花ノ紋アリテ色黄ナルヲ漢防已ト名ク黒點黄腥木強ナルヲ木防已ト名ク陳藏

器曰風ヲ治スルニ木防已ヲ用ヒ水ヲ治スルニ漢防已ヲ用ユト凡ソ使ニ酒ニテ洗フト和名ツラフヂ

木防已去石膏加茯苓芒硝湯方

木防已 二兩 桂枝 二兩 茯苓 四兩

人參 四兩 芒硝 三合

右五味以水六升煮取一升去滓內芒硝

再微煎分温再服微利則愈

○心下有支飲 心脾ノ陽氣振ス津液ト水濕ト混化

ハ胸ヲ苦ム水流レテ肝ニ入レハ則チ眩故ニ 其人苦冒眩 冒ハ鬱冒ナリ傷寒

暈ナリ 澤瀉湯主之

澤瀉湯方

澤瀉 五兩

白朮 二兩

右二味以水一升煮取一升分温再服此水

カ心ニ在ルノ主方ナリ白朮脾ヲ健ニシ濕ヲ燥シ水ヲノ聚ヲサラシ
痰ヲ化メ上逆セザラシム澤瀉味鹹ク腎ニ入テ以テ水飲ノ源ヲ
瀉シ支飲去ツテ
眩冒自ラ止ム
○支飲胸滿者厚朴大黃湯主

厚朴大黃湯方

厚朴 一尺

大黃 六兩

枳實 四枚

右三味以水五升煮取二升分温再服

○喻氏曰支飲ノ胸滿ハ夫レ支飲ノ胸滿ニ至ル仲景ニ在テ自ラ
大小陷胸湯ヲ用テ治之ラ此方ハ乃チ承氣ノ法ナリ止傷寒無
形氣分ノ熱結ニ施スベレ乃チ以テ實アルノ痰飲ヲ治スルハ仲景
絲絲貫貫ノ法ニ非ス其書ヲ編者ノ誤ハタル更ニ復何疑
○沉氏曰此胸滿ハ上焦ノ病ナリ厚朴大黃ハ即チ小承氣湯
ニテ原傷寒ノ氣分ヲ疏滌シ無形ノ熱結ノ為ニ設ク此支飲胸
滿ハ性濁陰ニ屬ノ上焦ニ溢當ニ温藥ヲ以テ和スベシ設ク誤テ
小承氣中焦寒潤ノ藥ヲ以テ上焦ノ滿ヲ治セバ則チ無過ヲ疑
代ノ害ヲ増フ淺カラズ或ハ外感ノ熱邪ニ因テ胃腑ニ傳ヘ津液
ヲ燥燥シ飲水過多ニシ支飲胸滿ヲ成スニ用ヒハ其熱結ヲ通シ
支飲ヲ自ラ化セシム若シ脉雙弦ナルハ用ユベカラス竊ニ思フニ仲
景ノ本意ニ非ス書ヲ編者ノ誤ナリト○以上ノ三説信從スベシ故ニ
表出
○支飲 胸膈ニ貯灌上ニ肺ニ注氣逆
スレハ則チ呼吸以テ通徹シ難故ニ不得息
然モ急ナレハ則チ
標ヲ治ス故ニ
葶藶大棗瀉肺湯主之方ハ見肺
癰中ニ此
方支飲偏一肺ニ溢ヲ治ス大棗胃ヲ養ヒ中ヲ和シ葶藶以テ
肺ノ實ヲ瀉シ肺氣ヲ通調セシムレハ脾ガ轉輸ヲ得テ則チ支

飲下ニ滲即チ水ガ
肺ニ在ルノ方ナリ
嘔家
前ニ出ツ凡ソ外邪上逆ノ嘔ヲ傳
必ス津液ニ傷ル應ニ渴ヲ假ベシ

故ニ本渴
渴スルハ則チ病ヒ
嘔ヨリ去ル故ニ
渴者爲欲解
若シ心下支飲アリテ胸膈ニ停

蓄ハ燥ヲ制スル故ニ
嘔ノ渴セズ故ニ
今反不渴
心下有支飲故也

則チ飲ヲ治スベシ
小半夏湯主之

小半夏湯方

半夏 一升

生薑

半斤

右ニ味以テ水七升煮取一升半分温再服

此支飲上ニ溢テ嘔スルノ方ナリ生薑
邪ヲ散シ半夏飲ヲ滌メ嘔自ラ止
○腹滿
大腸ノ氣虛

先ハ則チ飲ガ腸間ニ走テ腹滿ヲ作ス蓋シ大腸ハ津ヲ主ル
津ガ飲ニ因ツテ滯ハ亦化メ飲ト爲ツテ上ニロニ供ス故ニ
口舌

乾燥此腸間有水氣
然モ大腸ニ飲ヲ受レハ肺ノ氣モ

已椒蘆黃丸主之

已椒蘆黃丸方

防己

椒目

葶蘆

大黃

各一兩

右四味末之蜜丸如梧子大一出先食飲服

一丸日三服稍增口中津液
口中ニ津

者熱アル故ニ加苾硝半兩
此水ガ腸間ニ走り瀝々トシ
聲アルノ方ナリ葶蘆ヲ用ヒ先

肺ノ壅ヲ瀉シ氣ヲ下ニ通ゼシムレハ則チ傳道職ヲ得大黃椒
目ヲ合テ以テ腸間ノ水ヲ逐下ヨリメ出ス防己ハ風濕並驅

共ニ飲ヲ滌スルノ功ヲ成スナリ
○卒嘔吐
若シ他病ニ因テ中上ニ焦ノ氣
ガ虚スルヲ致シ水ガ臆間ニ蓄

テ外邪ヲ挾ニ上逆スレハ水モ亦隨テ出ニト欲ス心下痞
故ニ卒ニ嘔吐ス邪ニ痰飲ヲ挾ニ心下ニ持スレハ則チ心下痞
膈間有水氣心ニ溢レハ則チ悸シ
肝ニ流レハ則チ眩多シ眩悸者小半

夏加茯苓湯主之

小半夏加茯苓湯方

半夏 一升

生薑 半斤

茯苓

三兩 一法 四兩

右三味以水七升煮取一升半分温再服

此凡嘔吐ノ主方ナリ生薑邪ヲ散メ嘔ヲ止メ半夏以テ上逆
膈間ノ飲ヲ消シ助ルニ茯苓ヲ以テ飲濕ヲ滲シ導テ下行

スレハ則チ痞結開テ嘔自止ム ○假令瘦人 瘦人ノ積飲ハ肥人ト同シカス
ヨリ旺ニ脾陰必ス虚ス火ガ土ヲ燥シ燥熱氣壅胃閉熱
閉テ轉輸ヲ得ズ胃濕下ニ流レ以テ腎邪ニ合スレハ反テ心ヲ陵故ニ

臍下有悸

胃中ノ津液水飲化シ痰飲ト為リ逆上ノ口舌ニ振故ニ

吐涎沫而

飲鬱

氣下ニ達スルヲ得ズ反テ顛眩顛一本ニ作癩此水也水ガ下焦ニ蓄ハ

必ス下ニ出ラシムルヲ順トス故ニ 五苓散主之

五苓散方

澤瀉 一兩 一分

猪苓 三分 去皮

茯苓 三分

白朮 三分

桂枝 二分 去皮

右五味爲末白飲服方寸匕前二日三服多

飲煖水汗出愈

五苓ヲ以テ水濕ヲ宣導小使ヨリメ去
ラシムレバ腎水自寧一ヲ得此水ガ腎

ニ在ッテ心下悸スル方ナリ ○五苓散方義已ニ傷寒論國字鮮ニ出

附方

外臺茯苓飲 外臺ハ前ニ出ツ 治心胸中有停痰宿

水 脾虚ノ胃ト凡ニ津液ヲ行サズ水蓄飲ヲオツカラ 自吐出水

後 邪去テ正虚シ虚氣上逆ス故ニ謂フ 心胸間虚氣滿不能食消

痰氣令能食

茯苓 三兩 人參 三兩 白朮 三兩

枳實 二兩 橘皮 二兩 生薑 四兩

右六味以水六升煮取一升八合分温三

服如人行八九里進之 人參白朮大ニ脾氣ヲ健カニ新飲ヲ聚ガラシメ生薑

欬

橘皮枳實以テ胃家イマダ盡サルノ飲ヲ驅ツテ痰氣ヲ消シ能ク食セシムルナリ ○八九里ハ今日本ノ五十町バカリ ○喻氏ノ日積飲既ニ去テ虚氣其中ニ塞滿テ食ヲ進ムル能ハサルヲ治ス此證最モ多シ金匱ニ蚤ニ外臺ノ一方ヲ附シ後人ヲ啓誘シ天民ノ先覺ニ非ズノ誰ソ

欬家 家ノ字ハ前ニ出ツ此肺脹肺癰肺痿ノ欬 其脉弦

此懸飲脉弦欬ヲ致ス當ニ水ヲ治スナリ木盛ナレハ則チス 爲有レ水

水飲ガ肺ヲ射ハ則チ欬ス 十棗湯主之 ヲ方見上ニ○十棗ヲ以テ脾胃ヲ安和

シ大戟芫花停蓄ノ水ヲ峻瀉テ水去 夫有支飲家

支飲ニノ欬スルハ陽ヲ按ラシ上焦ハ乃チ清陽主之ヲ陽微ナレハ則チ支飲ガ胸膈膈中ニ上溢心火ヲ抑鬱メ下ニ通スルヲ得ズ反

テ肺ニ淫ス 欬煩胸中痛者 欬ガ胸間ニ振ハ清陽氣亂陽傷陰盛ナル故ニ當ニ卒

未敗絶ニ至ガルハ 不卒死 或至一百日或丁歲

金匱要略國字解 卷之三

宜十束束湯

方見上○勢必入陰邪陽氣ヲ擊テ散脱スレハ則チ死ス故ニ十束束湯ヲ用ヒ急ニ其邪ヲ逐陽ヲ

ノ修寧ヲ得セシムレハ則チ效

○久效數歲

是虚勞ノ效嗽ニ非ズ乃チ脾

肺素ヨリ不足シ肺氣滯テ利セズ津化ノ飲ト為リ胸中肺葉空ノ處ニ上リ溢即チ支飲伏飲ノ類ナリ内ノ伏飲風寒ヲ招テ襲入り内

外邪ヲ合テ發ス世俗ノ謂レ痰火屢發ト是ナリ

然モ久效ハ必ス邪正兩ナカラ衰故ニ

其脉弱者

證

脉虚者

乃チ上焦腫中ノ宗氣布ズ痰飲濁陰必苦胃

即チ

其人本有支飲在胸中故也

則チ其支飲ヲ治

不得臥

肺ハ聲ヲ主リ變動スレハ效ヲ為胸中素ヨリ支飲ヲ積ニ邪ヲ招テ内ニ入り肺氣ヲ壅逆ハ則チ效逆倚

○效逆倚息

出前

治屬飲家

飲病ニ依テ

○效逆倚息

出前

之方見上文肺癰中○麻黃桂枝甘草ヲ用ヒ腠理ヲ開キ發

散シ痰飲ヲ逐テ下行シ乾薑肺ヲ温テ陽ヲ行シ裏寒ヲ散

シ五味子白芍以テ肺氣ノ逆ヲ收シ表風内飲齊鮮セシム此乃チ

寒風飲ヲ拔效

嗽スルノ主方ナリ

○青龍湯下已

飲下ノ後表邪退ク雖内飲未消ズ

胸間ニ拒格ノ心火下ニ達スルヲ

多唾口燥

肺痿ノ類ノ如キナリ但飲

ハ陰邪ヲ内ニ倚ハ

寸脉沈

下焦ノ陽

尺脉微手

足厥逆

青龍ノ散劑ヲ服スルニ因テ下焦ノ虚陽ヲ

氣從

少腹上衝胸咽手足痺

痺テ用ヒラレガハ至リ眞陽

其面翕熱

翕ハ羽ヲ合テ温ムル如クボカクスルナリ

如醉狀

衝氣復因

復下流陰股腎ノ間ニ歸小便難中ノ留飲ヲ擾動

則セハ時復冒者ハ冒ハ前ニ與茯苓桂枝五味甘

草湯治其衝氣一本ニ作氣衝此下モ皆小青龍湯ヲ

擾動スル

桂苓五味甘草湯方

桂枝四兩去皮 茯苓四兩

五味子半升 甘草三兩

右四味以水八升煮取三升去滓分温三

服桂枝茯苓以テ衝氣ヲ逐テ源ニ歸シ五味子肺氣ノ逆

乃今逆ヲ救ノ變方ナリ ○衝氣即低肺中伏匿ノ寒ガ飲ノ為ニ滯

草五味子ヲ服ノ而反更欬胸滿者用桂苓五味

甘草湯去桂桂枝ハ表ニ加乾薑細辛ニ味ハ氣雄

散肺ニ入り寒ヲ治其欬滿走ル故ニ去ル

苓甘五味薑辛湯方

茯苓四兩 甘草三兩 乾薑三兩

細辛三兩 五味子半升

右五味以水八升煮取三升去滓温服半

升日三一本服ノ ○欬滿即止肺ノ風寒而更復

渴衝氣復發者以細辛乾薑為熱藥也細辛即

乾薑熱藥ヲ以テ推之若痰飲ガ内ニ蓄ル無ニ細辛服之

當遂渴遂ハ因ナリ而渴反止者為支飲也是内飲

喉間ニ上溢テ燥熱ヲ浸潤ス故ニ渴ヲ支飲者法當胃

胃家ハ陽氣上逆シ飲胃者必嘔者前ノ去桂茯苓五

復内納半夏以去其水其水ヲ消去ハ嘔

茯苓五味甘草去桂加薑辛夏湯方

茯苓 四兩 甘草 二兩 細辛 二兩

乾薑 二兩 五味子 半夏 各半

右六味以水八升煮取三升去滓温服半

升日三服一本ニ服ノ水去區止前藥ヲ服ノ其人形

腫者肺虚ノ疲瀆腫ヲ致スナリ屢衝氣奔逆ノ肺ヲ傷ルニ

苓去桂五味甘因ッテ通調職ヲ失ヒ肌表氣滯ッテ行ス其ノ人形腫遂テ茯苓湯ニ於テ加杏仁王之杏仁肺氣ヲ利ノ其腫ヲ退

水ヲ為ト義ヲ同フス當ニ青龍湯ヲ用テ汗ノ散ズベレ故ニ其證應内麻黃以其

人衝氣數擾陰ヲ傷リ病因ッテ遂痺遂ノ字前ニ出ツ故

不内之若逆而内之者則チ陽氣必厥厥逆ス

所以然者此痺ノ不仁スルハ血虚レ氣滯ルニ因テ陽ガ附

以其人血虚麻黃發其陽故也所ナレ汗スレハ陰ノ傷ルベキ無ク反テ陽氣ヲ傷ル

金匱要略

卷之三

三

茯苓甘草五、味薑辛、夏仁湯方

茯苓 四兩 甘草 三兩 五味子 半升

乾薑 三兩 細辛 三兩 半夏 半升

杏仁 半升 去皮尖

右七味以水一斗煮取三升去滓温服半

升日三一本服ノ○若面熱如醉足ノ陽明胃ノ經絡ハ面ヲ循テ鼻

熱上衝薰其面即チ茯苓五味甘草湯ニ於テ少シ加大黃以利

之微々ニ潤下シテ胃火ノ逆ヲ瀉ス

茯苓甘草味辛夏仁黃湯方

茯苓 四兩 甘草 三兩 五味子 半升

乾薑 三兩 細辛 三兩 半夏 半升

杏仁 半升 大黃 三兩

右八味以水一斗煮取三升去滓温服半

升日三各一本有ニ○先渴後嘔水カ心下ニ停テ心火

乾ノ先ツ渴ヲ為ス然カモ渴ハ必ス飲一ヲ欲ス飲ニ内ニ入レハ新ト舊

トノ水ガ膈ニ俵聚テ勢ヒ必ス上逆ノ出ツ故ニ後ニ嘔ヲ為ス則チ

為水停心下嘔ニ因ツテ此屬飲家其飲ヲ治ノ必

故ニ小半夏加茯苓湯主之方見上ニ○半夏茯苓

嘔ラ止テ
逆ラ下スナリ

消渴小便不利淋病脉證并治策十三

脉證九條 方六首

消渴

厥陰之為病

此條ハ傷寒論中ノ邪ガ厥陰ニ傳ヘ縦横病ヲ為ナリ邪カ厥陰ニ居シ木邪ニ火ヲ

挾ニ縦横忌ム無ク乗ノ胃中ノ津液ヲ吸兼テ日月水ヲ耗シ上ニ渴シ下モ消ス故ニ飲水多ク小便少キヲ消渴ト謂フ此

消渴氣上衝心 心中疼熱 胃ノ氣ヲ拒格ノ 飢而不欲食 食即

吐ス木邪盛ナレハ土氣必ス衰フ若シ下ス法ヲ施シ乃チ無過ヲ誅戮スレハ徒ニ胃氣ヲ傷リ木邪肆ニ逼胃中ノ水

穀下リ奔ハ則チ下之不肯止 傷寒論ニハ食即吐下利ノ止ス故ニ

吐レ蛇下之ヲ利不止ノ九字ニ作ル今傷寒論ニ從テ吐ノ字ノ下ニ蛇ノ字ヲ加見レシ不肯止ト利不止ト同意ナレハ何レニテモ

通ス肯アテウケカフガニスナド讀字ナリ蓋シ傷寒論厥陰經ノ文ヲ引テ雜證消渴ヲ彰著スルハ適チ木ニ火邪ヲ挾テ胃中ノ

津液ヲ消耗スルト是同シキニ因テナリ當テ消渴ヲ見ルニ舌上黑胎眼睛テ死者ハ水絶木枯自ラ焚テ滅スルト知ルベシ

寸口脉 氣ヲ主ル先ツ營氣竭ニ因ッテ而 浮而 是レ風ニ因後ニ衛虛ノ飲サルヲ致ス故ニ

營氣竭テ衛獨リ遲 虛寒ニ因ラスノ遲ナリ此 浮即為虛 行ラサレハ則チ脉 乃チ火熾ニ營虛スル故ニ

勞ノ營氣ヲ傷レハ衛 遲即為勞 虛則衛氣不 氣ノ行カ滯故ニ

足勞則營氣竭 正ニ營衛皆虛レ病ヲ致スラ耶ス此營衛 兩竭ト雖モ五臟皆虛ノ惟腎精更ニ不

足ヲ為シ木火制スル無ク乘ノ胃 跌陽脉 出 浮而數 浮ハ

中ノ津液ヲ吸テ枯燥故ニ 故ニ 浮即為氣數即 熱トス熱ハ即チ 胃ヲ燥ノ能ク 為消穀而 燥

主ル 故ニ 浮即為氣數即 熱トス熱ハ即チ 胃ヲ燥ノ能ク 為消穀而 燥

金匱要略國子解 卷之三

結不熱熱ガ中ニ一緊大堅一作氣盛氣盛ニ逼迫テ則チレウ澀數澀

澀ハ小便即チ澀數澀即チ堅腸胃ノ熱結愈堅堅數相搏ノ津液愈竭故ニ

前ニ即チ為ス消渴此レ呻吟ニ營竭衛虛スルヲ言フナリ治法ハ

男子此ニ字房勞腎消渴火旺ニ水虧テ消渴ヲ成ス蓋

無レ胃關大ニ開ケ但陰ヲ消スルノ勢アツテ水ヲ攝ノ能ナク木ニ

故ニ小便反多以飲一斗小便一斗亦並ニ胃腎

液盡皆游耗及フ然モ腎虛スレハ腎氣丸主之方見脚

○八兩ノ地黄二兩ノ桂附ヲ如テ腎氣ヲ上騰シ地黄山茱萸山

引レ牡丹皮ハ心腎ニ入テ血中ノ伏火ヲ瀉ス時珍曰伏火ハ即チ陰火

ナリ陰火ハ即チ相火ナリ世人專ラ黃柏ヲ以テ○脈浮小

便不利微熱消渴者是傷寒ノ經邪傳テ膀胱ノ

消渴ヲ為ス是レ五苓散ヲ以テ宜利小便府發汗ヲ

經ト腑トノ邪ヲ兩解スレハ則チ五苓散主之方見上

見レ此レ真ノ消渴ニ非ス若シ内傷ノ○渴欲飲水水入則チ

吐者名曰水逆五苓散主之方見上○此レモ亦

寒大陽腑熱ノ胃ニ入リ渴ノ水ヲ飲ニ欲レ裏邪拒格ノ入ル所ノ水

枝表ヲ發シ四苓ヲ○渴欲飲水不止者文蛤散

主之此傷寒外邪裏ニ傳堅固ニ散セガレハ則チ渴ノ水ヲ飲ニ

欲レ止不是レ文蛤味鹹ヲ以テ堅ヲ軟テ燥ヲ潤シ熱ヲ除ス

文蛤散方

文蛤 五兩

右一味杵為散以沸湯五合和服方寸匕

前二出○以上ノ三條ハ書ヲ編入傷寒論ヨリ撰入ル

淋之為病小便如粟狀小便滴瀝トシテ出ルニ艱ニ痛ニ苦テ難キ忍テラ淋ト

小便不利

謂ノ但シ淋ハ乃チ胃中ノ濕熱膀胱ニ流レ氣滯ッテ津液行ス致ス所ナリ然モ陰虛シ火熾ニノ濕熱ト津精ト凝結テ互ニ蒸テ石ノ如キラ小便粟ノ狀ヲノ如シト曰フ若シ熱カ下焦血分ニ在レハ則チ尿ニ血ヲ為氣分ナレハ則チ淋瀝ノ通セス然モ火鬱ノ氣閉反テ膀胱ヨリ小腸ニ上逆ス故ニ小腹弦急痛引臍中此レ砂石淋

跌陽脈出數數ハ熱トス胃中有熱胃熱必ス津液ヲ傷ハ上即

消穀コクヲ下モケシレクモ大便即堅然モ穀ヲ消シ大便堅テレハ乃チ胃中下ニ流レ偏ニ膀胱ニ滲ニ氣化ノ急速ナリ故ニ

小便即數此條消渴ニ屬スベシ○淋家不可發汗熱下焦ニ在レハ淋ヲ為下焦ハ腎ト膀胱トノ主ル所ナリ若シ

發汗化則チ醜邪熱壅閉ハ

則一本ニ則ノ字ナシ必便血小便ニ血ヲ出ス○此條已ニ傷寒論ニ出○小便不利者

寒濕下ニ流レ膀胱ノ氣ヲ抑鬱ノ有然モ寒濕ガ下ニ壅化セザレハ則チ小便利セズ故ニ水氣真氣反テ肺胃ニ逆

其ノ人若渴用栝蒌瞿麥丸主之シ化ノ熱ヲ散ハ

栝蒌瞿麥丸方

薯蕷 三兩 栝蒌根 二兩 瞿麥 一兩

附子 一枚 茯苓 三兩

右五味末之煉蜜為丸梧子大前二飲服

三九日二服不知前二增至七八九以小便

利腹中温為知括萋根專浮上ノ熱ヲ清シ薯蕷脾

宿水ヲ通利シ附子ヲ以テ寒ヲ驅陽ヲ行シ○小便不

氣ヲ化ノ○小便不利此風熱下ニ鬱スナリ風熱ガ下焦氣分ニ壅鬱化ノ火ト

能ク諸為涼滑ノ藥ニ非ハ則チ邪ガ除ス故ニ蒲瀉ヲ用テ灰ニ燒

之若シ濕熱血分ニ在ラハ白魚ノ鱗ヲ以テ胃ヲ開キ氣ヲ下シ善

引テ陰ニ入リ小便ヲ利シ夫濕熱カ膀胱ニ

然モ腑ヲ傷リ夫濕熱カ膀胱ニ其濕熱ヲ除クナリ故ニ引テ陰ニ入リ小便ヲ利シ

茯苓戎鹽湯並主之堅ヲ軟テ陰火ヲ除ク故ニ

蒲灰散方

蒲灰 半斤一本作七分 滑石 一斤一本作一分

右二味杵為散飲服方寸匕日三服

滑石白魚散方

滑石 一斤 亂髮 一斤 白魚 一斤一本作各二分

右三味杵為散飲服方寸匕日三服

茯苓戎鹽湯方

茯苓 半斤 白朮 二兩 戎鹽 彈丸大一枚

右三味先將茯苓白朮煎成入鹽再煎分

温レ二レ服ス 戒鹽ハ即チ青鹽ナリ西羌ヨリ出ツ煎煉ヲ

○渴欲飲水口乾燥者乃チ上焦肺胃ノ氣熱盛ニ

白虎加人參湯 人參粳米ヲ以テ肺胃ノ元ヲ補養シ

臨テ津液ヲ生シ甘草以テ中氣ヲ和ス蓋シ此レ傷寒陽明ノ

證ノ的藥ニ消渴ニ用ルハ病同ク肺胃ノ氣熱津枯ハ則チ

故ニ王レ之ヲ方見中○脉浮發熱渴欲飲水ヲ

此レモ不真ノ消渴ニ非ス傷寒大陽陽明熱邪イマダ清カラス

故ニ脉浮ニ發熱レ渴ノ水ヲ飲ト欲ス胃熱下ニ流レハ則チ

便不利者猪苓湯 熱ヲ導乾キヲ滋メ胃

猪苓湯方 邪ヲ驅テ下モ此ス故ニ王レ之ヲ

猪苓 去皮 茯苓 阿膠

滑石 澤瀉 各一兩

右五味以水四升先煮四味取一升去滓

膠レ烱レ消温服七合日二服 以上ノ二證ハ消渴ニ

水氣病脉證并治第十四

論七首 脉證五條 方十首

水氣師曰出前病有風水有皮水有正水有石水

有黃汗 此レ浮腫ハ則チナリ但表裏陰陽虛實風寒濕

熱ノ殊ナリ故ニ五名ヲ立テ大綱ヲ爲其脉證

金匱要略國字解

卷之

三

標本變化ノ ○風水 風ガ衛ヲ傷リ衛盛ニ風微ニ氣強フ
微ハ次ニ出ラ 腫ヲ致スヲ風水トス邪ガ氣分ニ居ス

故 其脉自浮 衛ニ風ヲ受テテ外證 身腫 骨節疼
ニ 邪ガ肌表ニ 營ト和セズ故ニ

痛 邪ガ肌表ニ 惡風 ○皮水 肺ノ皮毛ヲ受テ肺衛
在レハ則チ 柳ノ利ニ身腫

ラ皮水トス邪 其脉亦浮外證 附腫 足跗ノ字ト同シカ
カ皮毛ヲ傷ハ

ラズ則皮 按之 沒指 乃チ氣ガ皮膚層ニ凝テ腫ヲ為ス但軟
膚腫アリ

不惡風 其腹如鼓 滿ノ甚キ 不渴 表ニ病ヲ受ル故
言

氣強シ然モ風皮ノ 當發其汗 ○正水 房勞汗出ルニ
水ハ邪皆表テリ俱ニ

寒感ノ腎間ニ入リ 鬱遏ノ眞陽宣サレハ胃關利トス外 胃ニ
聚リ氣逆シ溢テ皮膚腫ヲ結ナリ寒盛ニ陽虛ス故ニ

其脉沈犀 裏氣上逆 外證自 乃チ腎虛ヲ本トシ
スレハ則チ

○石水 脾胃濕盛ニ内ヲ眞陽ヲ傷リ土濕ガ小腹ノ間ト
肝腎トニ流レ陰氣凝結テ堅硬一石ノ如ク石水

トス陰邪下リ結テ 其脉亦自沈 故ニ 外證腹 僅 滿
上リ邪ス故ニ

而 不喘 黃汗 乃チ水ニ入テ心營ヲ傷ル一ラ致シ 其脉
營衛兩ナガラ痺故ニ

沈 遲 陽氣壅 身發熱 邪ガ上焦ニ 胸滿 陽氣運
逆ハ則チ 鬱スレハ

波頭面腫 營血ニ邪ヲ受ケ濕熱相蒸シ 久不愈 營衛
營氣外ニ越ニ故ニ 黃汗出ツ

必致癰膿 以上ハ四水ト黃汗ノ 脈ト證トヲ分ツナリ ○脉浮
ハ惡瘡ヲ發

而 洪 浮ハ風邪表ニ在リトス 洪ハ 浮則爲風 洪則爲
裏氣有餘トス故ニ

氣 鬱 氣有餘便チ是レ火ニ外風ガ衛ヲ傷リ風火ガ肌肉ノ間ニ相
鬱ス故ニ脉浮ニ洪ナリ 但シ浮洪ノ脉ハ風氣ノ強キト弱キ

トラ辨ズ 風氣相搏 出前 風強則 病ヲ主ル一ラ爲故ニ
別テ

為癰疹 濟世全書曰癰疹多ハ脾ニ屬ス隱々然トノ皮

病不風ノ性ハ輕ク揚テ動ララモルニ 身體為癢 癢ハ膚腠

氣疎泄汗出テ 瘡者為泄風 素問風論ニ曰久風中入

理ニ在レハ久 愈ザレハ氣血兩ナガラ癩 瘡為癩癩 瘡ハ入門音

瘡瘡退シ所ノ癩ナリト癩ハ癩ト同レ此癩風ニ變スナリ若シ内

氣ガ風ニ強ラノ火ニ化スレハ是レ氣ガ病ヲ主ルヲ為然モ氣強シト

雖氏則チ邪ト正ト合メ去ラズ以テ風ト火ト相ヒ搏ラ致シ癩癩

決瀆ノ道行ズ水即チ皮膚ノ間ニ横行シ肺氣鬱化ノ水ヲ為故ニ

氣強則為水 難以俛仰 風氣相

愈 惡風則虛 汗出乃

此為風水 不惡風者 是風強

多涎 此為黃汗 寸口脈前

沈滑者 乃風邪ニ水ヲ合シ麻ヨリ肌肉胃脘 中有水

氣 是裏水ノ課ニ非ズ恐ハ人 面目腫大有熱 此レテ

別之ヲナリ正水ハ發熱ス 名曰風水 蓋濕氣ハ脾胃ニ通

ハ上行ス土濕コレニ從フ 視人之目窠上 胃ノ屬所ニテ

鼻通精明ノ穴ノ處ナリ 微擁 擁腫ト熟シテ 如蠶

相家一謂ハ風蠶是ナリ

故ニ 此為風水 若レ脈浮ニノ洪 是レ風強

ニ非ズ乃チ水濕壅逆ノ致ス所 小便通利 是水ガ上焦ラ

ナリ衛氣邪ノ為ニ阻ラレズ故ニ 故ニ 上焦有寒 胸ニ既ニ寒アリテ津液利チ

ラ主ル 故ニ 上焦有寒 胸ニ既ニ寒アリテ津液利チ 其口

新臥起狀頸ハ乃手足ノ陽明人迎ノ脉ナリ風カ其頸

脉動邪ガ肺ニ時時欬然モ風水肌肉ニ逆スレ按其

手足上陷而不起者風水若腹大ニノ按之

在ツテ軀殼ニ非ズ若シ皮急凡ツ病ニ表ニ在ハ皆大

氣ノ証所 脉浮而緊此大陽ノ脉證ヲ見ス當ニ風邪ヲ衛

ヲ侵ラ皮水トシ水ニ入テ心屬ノ營ヲ傷ルヲ黃汗トシ風寒ガ傷ツテ肺氣

脉浮緊法當頭疼此骨節疼痛此反不疼身

體反重而痠是極寒經ヲ傷ル正傷寒ニ非ズ此浮ハ風

邪氣抑鬱スレハ氣強風ヲ按テ營衛利セス水ヲ合スレハ則テ體

其人不可渴汗ヲ發汗出即愈此為風水惡寒

者乃他病ヲ治メ汗ヲ發シ為極虛發汗得之虛ニ

治スベシ風水ノ常法ヲ以テス可カ乃チ寒ガ皮毛

此為皮水然モ皮ニ寒鬱身腫而冷真氣用ヒラレズ

狀如周痺若前ノ脉證ヲ見ノ或ハ水ニ入ルニ胸中空

胃ノ氣ニ痺不能食反聚痛營血傷ラ暮躁

不得眠邪ガ營衛ニ居レ鬱此為黃汗若前ノ脉

痛在骨節欬而喘不渴者即チ形寒テ冷ヲ飲風寒

渴セズ氣鬱宣ス其狀腫ガ如キヲ此為脾脹沈氏曰

金匱要略卷之三

二肺ニ作ルベシト從フベシ 其狀如腫 皮毛ニ邪ヲ受ク故 發汗則愈然

諸前ノ脉證ニシテ 病此者 渴而下利 小便數者 邪已ニ

裏氣虛ヲ告テ津液已ニ傷ル故ニ 皆不可發汗 ○裏水者 此風邪

濕ヲ合スルノ證ナリ 風邪ガ表ヲ傷ツテ 一身面目黃腫

裏ニ入リ 濕ヲ合メ 鬱蒸スレハ 則チ 汗出ルヲ無レハ 黃汗ヲ為ス夫

風濕鬱蒸シ 衛陽羈滯テ 決瀆ニテ 能マ故ニ 其脉沈 小便不利 故令病水 假令

小便自利 邪氣胃ニ入ルヲ責 此ハ津液 津液内ニ

故令渴也 越婢加朮湯 王ル之 方見下 ○麻黃ヲ以

胃中風化ノ熱ヲ清シ 甘草中ヲ和シ 桂枝薑棗ヲ以テ 營衛ヲ

宣通ノ風驅テ外ニ出シ 白朮ヲ加ヘ 脾ヲ健ニシテ 濕ヲ燥ナリ

兼本自有寒 疝瘕腹中痛 又他病ニ醫及下之

疝瘕ノ氣ヲ 即胸滿短氣 出前 ○跌陽脉腫

當伏今反數 本自有熱 消穀 消食ヲ 小便

數 若シ消穀フ疝瘕ハ 今反不利 乃チ胃中ノ濕熱下ニ流

膀胱ノ氣化利セザルヲ 此欲作水 蓋腫誤テ汗下ヲ施

致シ水ガ皮膚ニ泛ル故ニ 其標ヲ治スベシ 慎テ一槪ニ腫ヲ見テ 逐治スルヲ

○寸口脉浮而遲 脉經ニ云 浮ニ遲大ヲ 虛脉トス 然モ

即チ知ル血虛シ 氣熱ノ邪ヲ受ルヲ寸口ハ肺ヲ主ツ 浮脉則

熱 衛邪が營氣ヲ拒格ノ和セズ衛ガ獨リ行スノ脈遲ナリ風氣

脈ヲ爲ハ則チ 遲脈 則チ 潛 風ガ外熱ヲ爲ハ陰ガ自ラ内ニ潛没

合ノ 熱 潛 相搏 出前ニ 名曰 沈 乃チ 衛邪ガ拒格シ營氣

非 跌陽 脈 跌陽ハ胃ヲ主テ地ニ法ル胃 浮 而 衛盛ニ營

數 然モ邪氣熱ニ化スルヲ浮脈ハ即チ熱トス 浮 脈 即チ 熱

數 脈 即チ 止 是レ 衛氣熱ノ上ニ浮ニ營血沈ニテ下モニ此ル 熱

止 相搏 名曰 伏 乃チ 陽孤リ自ラ化シ熱ヲ爲シ陰孤リ伏

蓋シ 衛陽拒格シ營氣下ニ潛ヲ沈トシ營氣内ニ 沈 伏 相

搏 名曰 水 衛氣邪強ノ營血ヲ運轉セズ伏化ノ水ト爲

テ 強ク 眞ガ 絡ニ 沈 則チ 絡 脈 虛 營ガ 衛ニ 附ズノ 行リ 伏化

小 便 ヲ 行ラサ 伏 則チ 小 便 難 然モ 陽ガ 絡ニ 充サレハ 絡 脈

溢レハ 水道 行ラズノ 小 便 難シ 虛 難 相 搏 水 走 皮 膚

即チ 爲 水 矣 ○ 寸 口 脈 弦 而 緊 乃チ 肝 臟ニ 風ヲ 受テ

故ニ 偏ニ 弦 則チ 衛 氣 外ニ 不行 即チ 惡 寒 三焦 決 瀆

飲ガ 衛氣ニ 隨ズ 小腸ニ 走リ 傳テ 膀胱ニ 水 不 沾 流

滲ハ 則チ 波 膚ニ 泛 濫セサルヲ 得ズ 故ニ 走 於 腸 間 漉クトノ 腸 間ニ

即チ 腎 緊 而 沈 緊ナレハ 寒邪カ 正氣 緊 則チ 爲 痛 沈

則チ 沈ハ 衛氣ガ 鬱シノ 宣スニ 焦 爲 水 沈 瀆カ 權 小 便

金匱要略卷之三

卷之三

九

即難小便通難ハ即チ絡空ノ便難ノ謂ナリ此 脉得

諸沈沈ハ水トス 當責有水責ハ求ナリ沈ハ氣鬱ノ表ニ行サレハ絡脉虚ス虚スレハ水ガ皮

膚肌肉ニ但レ沈ハ正水トス正水ハ乃チ陰盛ニ陽 身體腫重鬱ノ脉必ス沈極ナリ若シ浮起ラ見

セハ是レ真氣ガ根ヲ離テ脱スルノ象ナリ故ニ 水病脉出者死若シ風水皮水ノ脉浮ニメ洪ナルハ

此例ニ在ラ ○夫水病人水病脉伏沈絶ナルハ陽ヲ救ラベ 若シ水ガ外ニ起テ皮膚肌肉

ニ溢シ胃脉ニ相隨テ上ッテ面ニ注 目下有臥蠶蠶ハ

蠶ヲ臥タル 面目鮮澤水ハ明潤ヲ主テ光亮ナル故ナリ

陽微ニ陰盛ニ因ッテ脉伏胃中ノ津液水飲カ外カ皮膚 其

人消渴真消渴ニハ非ス若シ 病水腹大小便不利其脉

沈或 絶者乃チ陰盛ニ陽鬱ノ決瀆 有水可下之

元氣自復水去テ陽ガ回ハ ○問曰病下利後傷寒差テ後ニ水

下利ノ後ニ因テ渴ノ水ヲ飲一ヲ欲ノ腫ヲ致スナリ 渴飲水

飲テ胃ニ入レハ脾氣ガ精ヲ散シ乃チ常度ヲ為此下利ニ因テ

脾胃ヲ傷ル一ヲ致シ脾虚ノ運ス日ニ飲ノ水ガ膀胱ニ循ス皮

膚ニ横 小便不利當ニ水ヲ 腹滿因腫者何也

答曰問ノ通リノ 此法當病水若元氣ガ復テ健ニ

衛氣ガ病狀ナレハ 小便自利水ガ 及或ハ 汗出者當自愈

此利後ニ腫ヲ致スハ元氣復シ易シ ○心水者暴喜或

陽虚陰結治シ難キノ比ニ非ス 畏寡木ガ脾ニ乘スルヲ挾テ肌肉ニ從譫スレハ則チ 其

金匱要略

卷之三

第六

身重而少氣 脾虛ノ胃ノ氣モ亦逆ス故ニ 不得臥 陰邪上逆ノ神

煩而躁 陽鬱行ス水ガ下ニ凝故ニ 其人陰腫 陰ハ連ナリ○此以下共ニ五條ハ水腫ハ五

臟ニ屬スルヲ有ルヲ明カニスルナリ七情内チ五臟ヲ傷リ風寒侵入テ經隧ニ閉塞水氣泛濫テ腫ヲ為故ニ先ツ何レノ臟ガ傷ラ

受ルヲ察メ病ヲ治スルノ本ト為ハ則チ險證モ治スベシ若シ概ニ脾肺腎ヲ以テ通套ノ方ヲ成バ則チ外邪侵襲ニ氣闔テ開

○肝水者 暴怒鬱遏ノ傷ルニ因テ外邪侵襲ニ氣闔テ開 其腹大 水ガ肝經ニ逆スレハ兩脇凡ニ 不能

自轉側 氣ガ少腹ニ連ル故ニ 脇下腹痛 蓋シ肝ハ疎泄ヲ主ル水淫ヲ被ルト雖凡生

機尚未タ全ク息ズ 故ニ上ニ疎スレハ則チ 時時津液微生 下ニ泄スレハ則チ 小便續

通 滲ニ似サルナリ ○肺水者 夏思氣結テ傷ルニ因ツテ邪

逆シ寒水以テ木勢ニ乘メ皮肉ニ横ニ流ル故ニ 其身腫 肺ガ通調セザレハ則チ 小便難

水者 思慮ノ傷ラレ或ハ飲食節ナラザルニ因テ氣虛ノ邪ヲ受ケ水反テ肌肉四肢ニ攪 其腹大四

肢苦重 苦一本作若蓋シ脾ハ生化ノ源タリ水ガ脾ニ泛テ生機轉セス故ニ 津液不生

但苦少氣 然モ母病ハ子モ亦病テ肺氣下モ膀胱ニ輸一能ス故ニ 小便難

○腎水者 驚恐房勞ニ因リ或ハ濕地ニ坐シ腎ノ腎水ヲ傷致スベシ蓋シ少陰ハ樞タリ腎傷レハ則チ開關ノ職ヲ失ヒ胃

関利セス胃中ノ津液水飲行ラズ皮膚肌肉ニ泛濫故ニ 其

腹大 蓋シ臍ノ内丹田ハ眞氣ノ居ル所ナリ但シ眞陽傷テ氣ガ收攝ガレハ則チ 臍腫腰痛

不得溺 陽ガ下モニ鬱シノ濕熱鬱蒸津水ガ陰囊ノ外ニ滲故ニ 陰下濕如牛

鼻上汗 晝夜寐 其足 陽力足ニ 逆冷 營血モ亦上

則 面反瘦 ○師曰 諸有水者 腰以下

腫 腰以下ハ陰ヲ主ル水モ亦陰ニ屬ス陰ヲ以テ陰ニ從フ故

者 腰以上ハ陽ヲ主ル風寒ガ皮毛ヲ襲陽氣ガ風皮ニ水ニ屬

當發汗乃愈 此腰上下ヲ以テ陰陽ヲ分ツナリ即チ風皮止

者ハ其變ヲ施 一ヲ審ニスベシ但シ變ヲ治スルノ法ハ汗セント欲スル

者ハ當ニ兼テ陽ヲ補フベシ即チ麻黃附子湯ノ類ナリ小便ヲ利

或ハ括葉瞿麥丸ノ類ナリ然モ獐ヲ開キ陽ヲ通

小便ヲ利スハ必ス變法ヲ兼ルノ乃チ第一義也 ○師曰

前 寸口脈 前ニ出ツホロハ 沈而遲 沈ハ陽氣内ニ鬱ス

虛ニ陰水皮膚 沈則為水 元陽ノ氣虛ス虚遲 具為

寒 寒ナレハ則チ陽 寒水相搏 搏ノ字前ニ出ツ即チ寒水相搏

跌陽脈伏 跌陽ハ前ニ出ツ跌陽ノ脈伏ス 水穀不化

脾胃氣衰 脾胃ノ陽虚ノ健運 則致為唐 釋ニ音

胃氣衰 胃陽衰テ化セザルハ即チ胃

則身腫 又先天ノ腎氣ヲ以 少陽脈卑 傷寒論

營氣弱 名テ界ト曰フ王守泰 沈ニ無カ是

少陰脈細 細ハ微ニ損マ水ノ虚ノ病ヲ為ナリ 二脈同下

水邪溢

二云營氣弱

焦ニ屬ス

陰虛陽盛

陽ヲ受テ氣血ニ侵シ遂ニ病ヲ為ス故ニ少陰ハ陰ヲ主リ少陽ハ陽ヲ主テ陰陽風寒虛實ノ兩途ヲ別ツ若シ病ハ

子則テ精血流レズ凝化ノ水ヲ為ノ小便不利婦人則テ胞門血寒經水凝

化シ水ト為テ經水不通經為血血不利則為水男女

陽鬱ノ宣ガルニ屬故ニ名曰血分○問曰病

者苦水水腫ナリ面目身體四肢皆腫小便不

利乃チ水腫ニ本レ脈之ラ師ガ不言水反言胸中痛

氣上衝咽テツキノ狀如炙肉當微欬喘審如師言

然レ水病ニ有ルニレキ然レ水病ニ有ルニレキ其脈何類師曰寸口脈氣ヲ

氣虛スレハ則チ沈而緊沈ハ則チ水沈為水寒邪ガ營ニ入リ邪

故ニ緊為寒此陽虛スルニ因テ以テ腎間ノ積寒ヲ挾テ病

納レテ沈緊相搏邪ガ結在關元即チ任脈ノ穴臍下三寸

ニ非ズ唯臍下ト見ルニ乃チ邪ガ關元一本當ニ作

微年成血不始ハ病モ微少ニ年モ陽衰之後始テ

營衛相干營衛ヲ陽衰一本陰盛結寒微重カ

然チ積寒獨リ自ラ上分スルヲ能ハズ腎陰ガ心色ニ衝

ハ則チ胸中痛ム衝脈ニ逆スレハ則チ氣上テ咽ニ衝任脈ヲ侵

ハ上ニ咽喉ニ至テ狀チ宛肉ノ如肺ニ入レハ則チ欬喘ノ疾塞壅

腎氣上衝咽喉塞噎脇下急痛内ニ善

以為雷飲而大下之反テ中氣ヲ氣

以為雷飲而大下之

傷ル因ツテ

氣

繫一本ニ擊手ニ不去胃ノ氣ヲ攻ノ擊セラレテ其病不除作ル是ナリ

復一本ニ後ニ重吐之カサニテ胃家虛無過ヲ謀伐テ津

煩家ノ字前ニ出虚煩ハ咽燥欲飲水此水腫陰病

小便不利水穀不傷寒論國字解ニ出

犯面目手足浮腫又與葶藶丸下之此水腫陰病

過度飲食常度腫復如前胸脇苦痛象若但水腫ノ標ヲ下ノ水ノ

奔豚出前其水揚溢則欬喘逆字アリ

新病先ツ衝氣ヲ止病當在後病ハ舊邪ヲ指ス即衝

出惡風者汗アルハ更ニ汗防己黃芪湯王之氣

防己二兩黃芪二兩白朮三分一本三兩

甘草半兩腹痛者加芍藥

是風寒火濕兼テ言フ此脈浮水カ分肉ニ身重表虚

兼テ謀治スル變ヲ示スナリ○風水前ニ云フ脈浮ニ

乘ノガ脾ニ腹痛者加芍藥以テ脾中

防己黃芪湯方

防己二兩黃芪二兩白朮三分一本三兩

甘草半兩腹痛者加芍藥

是風寒火濕兼テ言フ此脈浮水カ分肉ニ身重表虚

兼テ謀治スル變ヲ示スナリ○風水前ニ云フ脈浮ニ

乘ノガ脾ニ腹痛者加芍藥以テ脾中

防己黃芪湯方

甘草半兩

黃芪二兩

白朮三分一本三兩

腹痛者加芍藥

防己二兩

防己二兩

右剉キツミ每服スル五錢一本ヒノ匕字ナシ生薑四片大棗一

枚一本ニ三枚ニ作ル水盞半煎ハ一分去滓温服良

久再服此風水濕ヲ挾ニ風多ノ表虚スルガ爲ニ出ス方ナリ防已ハ勝理ニ通ノ周身ノ風濕ヲ祛黄芪ハ衛ヲ固ノ表

ヲ實スレハ即チ是邪ヲ散ズ白朮甘草ヲ以テ脾ヲ健ニシ濕ヲ除防已カヲ助テ更ニ倍ス生薑大棗ハ營衛ヲ和ノ表裏邪ヲ送テ外

ニ出ス ○風水風多ケレハ表ヲ傷テ外カ肌肉ニ應シ内チ連ッテ胃ニ及ブ故ニ惡風一身

悉腫脉浮謂ノ氣熱蒸ハ其機カ外ニ向フ故ニ不渴續自汗出無

大熱者則ニ表ニ微熱アリテ實スルヲ知故ニ越婢湯主之

越婢湯方

麻黃六兩石膏半斤生薑三兩

大棗十五枚甘草二兩

右五味以水六升先煮麻黃去上沫内諸

藥煮取三升分温三服 ○惡風者加附子

一枚 ○風水加朮四兩古今錄驗○此風多水少ノ證ニ出ス方ナリ麻黃ヲ以テ

陽氣ヲ通ノ表ヲ散シ石膏ハ四月ニ入テ能ク氣強ク風化ノ熱ヲ塞

逆ヲ治ス甘草生薑大棗以テ營衛ヲ和ス若シ風ヲ惡者ハ陽

録ノ衛虚トス故ニ附子ヲ加フ錄驗ニ ○皮水爲病邪ガ

正ト相搏テ風ニ在テ腫ナリ風ガ衛四肢腫水氣在皮膚中邪

虚内ニ鼓故ニ 四肢聶聶聶ト同シ聶々ハ振動者ハ表

二因ルナリ蓋シ肺ハ三焦ノ氣ト同ク膀胱ニ入テ決瀆ヲ行ス此肺

虚抑鬱テ膀胱ニ入ラスノ水モ亦行ザレハ則チ小便ヲ利ノ病除

二在テ腫ナリ風ガ衛 四肢腫水氣在皮膚中 邪

金匱要略原方解 卷之三
防已茯苓湯主之

防已茯苓湯方

防已 黃芪 桂枝 茯苓

甘草 三兩

右五味以水六升煮取二升分温三服

茯苓ヲ用テ風濕ヲ除テ水道ヲ宣黃芪ヲ以テ衛ヲ補ヒ表氣ヲ實ス表實スレハ邪ガ容テ能ズ甘草脾胃安ノ水邪ヲ制レ桂枝以テ營衛ヲ和シ又陽ヲ行シ氣ヲ化ノ四末ヲ實スレハ風ハ外ヨリ出テ水ハ内ヨリ洩ナリ

○裏水ハ風水深ク肌肉ニ入レハ則チ一身面目黃腫臍ノ裏ニ非ザルナリ裏水ハ乃チ表裏相連テ胃熱内ニ向ヒ臍實ノ汗ナレ故ニ越婢加朮湯主之

黃湯 陽ヲ通ノ表ニ達シ中ニ培テ營衛ヲ和レ陽ヲ通セ

亦主之

越婢加朮湯 見上於内ニ加白朮四兩又見脚氣中○友上ニ見タリ其方内ニ白朮ヲ加フナリ

甘草麻黃湯方

甘草 二兩 麻黃 四兩

右二味以水五升先煮麻黃去上沫内甘草

草煮取三升温服一升重覆汗出不汗再

服慎風寒 風寒ヲ避ナリ此方但汗ナク面目黃腫ニ與テ宜シ若シ自ラ汗レ津液ヲ止スル者ハ輕レク

○水之爲病其脉沈小

試ハカラス汗アリ汗ナキノ分テ識テ治スベシ

卷之三

氣鬱鬱水聚トス小ハ陽虚シ陰盛トス邪カ 屬少陰腎

腎中ニ鬱シ精血流レタル故ニ脉沈小ハ 浮者

ナリ此寒ガ正水ヲ結ノ脉ナリ麻黄附子湯ノ證ナリ 若シ小ニノ浮ナルハ乃チ腎間陽分ニ風ヲ受ク故ニ

爲風 或無水虚腫者 腫一本作脹即肺氣 爲氣

水 經ニ皮水ト謂フナリ蓋シ氣 發其汗即已 此杏子 湯ノ證ナリ

脉沈者 乃少陰陽虚シ陰盛ニノ水ヲ 致シ水源腎ニ在リ故ニ 宜麻黄附子

湯 浮者宜杏子湯

麻黄 二兩 甘草 二兩 附子 一枚

右三味以水七升先煮麻黄去上沫内諸

藥煮取二升半温服八合日三服

杏子湯方 未見恐是麻黄杏仁甘草石膏湯 ○一本ニ 未見ノ上林億日ノ三字アリ是ナリ ○沈氏曰

蓋シ麻黄附子湯ハ今人置テ講セズ余特ニ舉ケテ明之ヲ 藜水 病始テ得ノ源ハ未腎虚ヨリノ風寒ヲ受ケ衛氣ヲ鬱住ノ

胃関利セズ水邪泛溢テ以テ通身腫滿ヲ致サルハ有ズ故ニ 補陽ノ中ニ輕浮ニ陽ヲ通シ鬱鬱ヲ開キ 藜ヲ利スルノ劑ヲ兼

用レハ則チ眞陽宣テ邪自ラ去ル正ニ謂フ水ヲ治セズノ水自愈故 二麻黄附子一散一補本ヲ固レ陽ヲ通ズレバ則チ病去テ陽氣ヲ

傷サルノ妙ナリ 今人陽ヲ通シ竅ヲ開クヲ知ラズ惟腎氣湯 丸陰重陽輕ノ劑ヲ用ヒ其内ヲ壅補陽氣愈益宣ス轉

補轉壅テ邪カ出ル路ナク水腫日ニ増藥ニ因テ誤事 凡幾ト云 一ヲ知ラス蓋シ脉浮ハ邪ガ氣分ニ居ノ肺ニ屬ス杏子湯ヲ詳ニ

スルニ必ス杏子ヲ以テ君ト爲而モ杏ハ乃チ喘肺氣ヲ瀉レ肺氣ヲ ノ通調セシムレハ邪去テ腫自退カ遺失スト雖凡意想テ知ルベキ

ナリ ○厥而 手足厥冷 皮水者 風熱カ皮毛ノ氣ヲ壅抑 邪正内ニ鬱ノ機外ニ

向不故二并足厥ノ身腫乃チ皮水ノ實證ナリ

蒲灰散

然モ氣壅ハ陽ヲ補フテ再ヒ其氣ヲ壅ヘカラス故ニ

主之ヲ方見消渴中○蒲葦ヲ以テ灰ニ煨滑石ノ涼滑ニ合

退○問曰黃汗之爲病根ナリ衛虛ニ營弱ク汗出

テ、水ニ入り水心主ノ營ヲ傷テ三焦主ル所ノ氣ヲ壅滯シ

營衛兩ナカラ傷レ邪ト正ト相合ノ氣ガ表ニ滯ル故ニ

身體腫重發熱濕熱内ニ蒸レ營氣外ニ越レハ則チ汗出而乃チ

汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ

汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ

汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ

汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ

汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ

汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ

汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ

汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ

汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ

汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ

汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ

汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ

然モ氣壅ハ陽ヲ補フテ再ヒ其氣ヲ壅ヘカラス故ニ

主之ヲ方見消渴中○蒲葦ヲ以テ灰ニ煨滑石ノ涼滑ニ合

退○問曰黃汗之爲病根ナリ衛虛ニ營弱ク汗出

テ、水ニ入り水心主ノ營ヲ傷テ三焦主ル所ノ氣ヲ壅滯シ

營衛兩ナカラ傷レ邪ト正ト相合ノ氣ガ表ニ滯ル故ニ

身體腫重發熱濕熱内ニ蒸レ營氣外ニ越レハ則チ汗出而乃チ

汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ

汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ

汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ

汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ

汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ

汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ

汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ

汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ

汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ

汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ

汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ

汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ

汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ汗出而乃チ

自去ル汗ヲ治セ
○黄汗之病
汗出テ、水ニ入り水ガ心ヲ傷ハ
主ル所ノ營ニ屬ス然モ水氣ハ

腎ニ通ズレハ腎水セ應ニ接ベケレバ亦其邪ヲ受テ水ガ腎陰ヲ
挾テ心脾ニ上逆シ營衛ノ氣ヲ下ニ達セザラシム故ニ

脛自冷
即チ難經ニ腎ハ濕ヲ主ル心ニ入り汗ヲ為ハ足脛冷ニ
ト是レナリ腎濕ガ心脾ニ上逆シ濕熱鬱蒸營氣外

傷ハ則チ黄汗ヲ為シ汗營血ヲ
假令發熱
若シ脛ガ冷
此

屬歴節
蓋シ飲食胃ニ入テ穀ト邪氣ト
食已汗出ツ

邪ガ營ニ
又身常暮盜汗出者此營氣也
營氣

若汗出已
反發熱者
正

其身必甲錯
魚ノ鱗ノ乾キ枯夕
必

發熱不止者
邪氣肉理ニ逆シ
必

生惡瘡若身重汗出已輒
輕者
邪ガ汗ヨリ

即胸中痛
衛虛
又從腰已上必汗

下無汗
腰臆
弛痛
弛ハ字書ニ施

如有物在皮中狀
堅硬ノ不仁
劇者
胃ノ氣ヲ

能食身疼重
因テ邪氣ガ心ニ上逆ス故ニ
煩躁小便

不利比爲黄汗
桂枝加黄芩湯主之

桂枝加黄芩湯方

桂枝 二兩

芍藥 二兩
甘草 二兩

生薑

三兩

大棗

十二枚

黃芪

二兩

右六味以水八升煮取三升温服一升須臾飲熱稀粥一升餘以助藥力温服取微汗若不汗更服

○師曰寸口脉

遲而瀯遲則為寒瀯則為血不足

跌陽脉微而遲

微則為氣

則手足逆冷

營虛陰盛則手足逆冷

利營衛不利

相逐氣轉

即身冷

陽前通

則痺不仁

其氣則行

乃散實則失氣

則遺尿

名曰氣分

水化ノ精血痺ヲ為故ニ

金匱要略國字解

卷之三

四十六

○氣分 心胃膀胱陽虛

心下 即胃脘上焦宗氣虛ノ佈スト雖氏誠ニ

中虚ニ氣饑ニ因テ衛氣虚ノ運不_レ以テ外_レ飲ノ水ヲ挾_レ津液瘀凝ガ中ニ膠結_レハ則チ

邊如旋不血 勢必ス外_レ腫_レ内_レ脹_レ一_レ寫_レ水飲所作_レ一本ニ水飲所_レ作_レ四_レ字ナレ從

桂枝去芍藥加麻辛附子湯 主之

桂薑甘棗麻辛附子湯方

桂枝 三兩 生薑 三兩 甘草 二兩

大棗 十二枚 麻黃 二兩 細辛 二兩

附子 一枚

右七味以水七升煮麻黃去上沫内諸藥

煮取二升分温三服當汗出如蟲行皮中

即愈 此氣分外腫内脹テ出ス方ナリ桂枝湯ヲ以テ營衛ヲ調和_レ酸收_レ芍藥ヲ去テ附子細辛ヲ加_レ上中下三焦ノ

陽ヲ温補シ兼テ水濕ヲ逐テ下行_レ麻黃ヲ以テ腠_レ開テ表裏ノ陽ヲ通_レ汗_レ出_レ一_レ盡_レ皮中ニ行ガ如クナレ_レ則チ飲濕ノ邪去テ胸中_レ堅_レ大盤ノ如クナルモノ空_レ

○心下堅大如盤 息凌如旋盤

水飲所作 沈氏云乃_レ上_レ條_レ内_レ證_レハ同_レ似_レテ但_レ身腫ガ_レルヲ異_レト_レ脾胃ノ氣虚_レシ風邪カ_レ土_レニ乘_レノ風濕相搏_レハ氣虚ノ統_レ不_レ津液水飲化_レノ痰飲ト_レ為_レテ痞滿ヲ成ス經ニ謂_レハ大陰ノ所_レ至_レ飲積_レ中_レ滿スト是_レナリ仲景遠ク後_レ人_レ誤_レテ桂甘薑棗麻辛附子_レ熱劑ヲ用_レテ_レ慮_レ所以_レ長_レ水湯ヲ出_レ示_レ別_レナリ

主之

枳朮湯方

金匱要略

卷之三

四十七

枳實 七枚

白朮 二兩

右二味以水五升者取二升分温二服腹

中粟即當散也

一本ニ散也ノ二字ナレ沈氏云此方枳實ヲ以テ痰飲ヲ驅リ逐テ其實熱

ノ滿ヲ瀉シ白朮脾ヲ健シノ濕ヲ燥シ正ヲ補フナリ蓋シ心下ノ堅大盤ノ如キヲ見ルハ當ニ虛實寒熱脉ノ浮沈遲數大小異ト為テ審ニスベレ方ヲ執テ得テ誤用ルルト

附方

外臺防已黃芪湯 治風水脉浮為在表

其人或頸汗出表無他病者但下重從

腰以上為和腰以下當腫及陰難以屈伸

方見風濕中○此レ乃チ濕ヲ下ヨリ受テ濕多ク風少レ故ニ黃芪ヲ用ヒ表ヲ實シ水ヲ上ニ瀉シテ得ザラシム防已ヲ以テ風濕ヲ驅除シ白朮甘草脾ヲ健シ生薑大棗以テ營衛ヲ宣營衛和ノ濕自除シム

金匱要畧國字解卷之三終



