



金匱要略國字解
後編
卷四
上

76
5
紙 9



田極スレハ脾ノ真脾色必黃其ノ熱ヲ披テ以テ肌膚ニ行故ニ肌膚ノ色黄ナルハ

痰熱痰ハ痰ノ壅ト熱ス以行此レ風濕ニテ黄瘡ヲ成スラ辨スルナリ○疔瘡ト同シ

陽脉脾胃ヲ候ナリ疔病ハ脾胃ニキニシテ始ル故ニ跌陽ノ脉ヲ以テ辨ス緊而數數ハ風邪ガ衛ヲ傷リ胃

ニ入テ化ノ熱ト為ル故ニ數則為熱然モ胃風熱ニ化ス故ニ熱則消穀穀ヲ米ヲ消化ス緊ハ寒邪ガ營ヲ傷テ脾ニ入ルトス故ニ

為滿脾濕ガ下ニ流レ腎水ヲ傷テ致ス故ニ尺脉浮脾熱壅逆テ正氣ガ宣行レテ能サレハ

為傷腎然モ外寒ガ傳テ脾胃ニ入レハ寒ハ陰ニ屬ス陰ヲ以テ陰ニ從フ故ニ跌陽脉緊若レ脾

為傷脾乃チ脾ニ寒ヲ受ケ胃ニ風ヲ受ケ表裏ヲ通ス故ニ風寒相搏若レ脾

寒ヲ受ケ胃バカリニ風ヲ受テ内濕ト相合バ皆黃疸ヲ成ス盡シ風寒ノ受ニハ非ズ但レ穀ヲ食ノ胃ニ入レハ風熱互ニ蒸テ上ニ目ニ

衝食穀米穀即眩寒邪ガ脾ヲ傷ハ穀氣不消津液ガ胃ニ停滯故ニ

胃中苦濁濁氣下流熱壅開ハ則チ小便不熱壅開ハ則チ

通若レ脾ノ寒濕カ腎ニ下流レテ陰被其寒或ハ胃中ノ風濕ガ熱流或ハ胃中ノ風濕ガ

膀胱氣鬱レ熱蒸テ黄色ガ身體盡黃此レ酒食穀麵ニ因テ内チ

脾胃ヲ傷ハ邪ヲ格テ病ヲ致ス故ニ名曰穀疸然モ盡ク風寒兩チカラ受テ致ス所ニ屬ニ非ズ乃チ

或ハ寒ガ侵テ脾胃ニ入り内濕ニ合ノ疸ヲ成スコトヲ明ニスルナリ

額上黑微汗出此レ房勞ニ由テ腎ヲ傷リ陰水虧テ陽火盛ニ外邪カ籠入り胃閉ニ雍遏脾胃ノ濕熱ガ聚テ化セズ相火邪ヲ披テ胃ニ上逆レ脾胃互ニ

熱蒸ハ則チ額上黒ノ微汗出テ脾胃互ニ蒸ハ則チ手足中熱ガ聚テ化セズ相火邪ヲ披テ胃ニ上逆レ脾胃互ニ

熱肌膚黃黒益申酉ノ時ニ陽明自旺薄暮即發薄暮即發

金匱要略卷之四

卷之四

發熱惡寒ヲ顯ス此經ノ病ヲ
顯スナリ若レ腑症片ハ則チ
膀胱急 臆急ナリ陰精邪ヲ
受テ氣分邪ノ阻ヲ

為ズ小便自利名曰女勞疸
日久ラノ必ス脾腎ノ氣
血兩痺ヲ致セハ則チ腹

脹満 腹如水狀 不治
喻氏ハ其小便自利レ大
便黒時ニ溏スルハ又是

胸臑 蓄血ヲ驗ナリ水狀ノ如キハ實ニ水ニ非ス
正ニ蓄血ヲ指ノ言ナリ故ニ治セズト云フ歟考スベシ
○心中懊

懔而熱 傷寒論釋音ニ懊懔ハ痛ニ懔ノ聲トアリ此酒濕ニ傷ラ
ノ上ニ心傷陽火帝カラザレハハリ則チ
不能食 邪ガ上ニ時欲吐

乃チ吐セント欲ノ 名曰酒疸 若レ肌膚ダ黄オラズ此證ヲ見サハ
吐スル能サルナリ 即チ是レ酒瘴ヲ發セント欲スル徴ナリ

傷陽明病脉遲者食難用飽飽則發煩
傷寒

論ニ微 煩ニ作ル 頭眩小便必難此欲作穀疸雖下之

腹滿如故所以然 脉遲故也
此條ハ已ニ 傷寒證

國字解ニ 於テ解ス ○夫病酒黃疸 酒ハ熱穀ノ滯タリ其毒カ
胃ニ入レハ先ニ陰ヲ傷リ濕熱

互ニ蒸ノ黃疸ヲ為ナリ然モ 母ノ病ハ子ニ移ナレハ肺モ
亦熱ヲ受テ水道ヲ通調スルヲ得ズ下モ膀胱ニ滲故ニ 必小

便不利 或ハ胃熱カ膀胱ニ流ルモ亦 其候心中熱
利セザルナリ 邪熱ガ心ニ衝ハ則チ

下モ腎水ヲ 足下熱 若レ酒瘵他ノ病ニ在テ小便利セス心熱
耗スレハ則チ 足熱ヲ見サハ即チ疸證ヲ成スヲ知ルベシ

是其證也 ○酒黃疸者或無熱 濕熱ノ多シラ分
テ治スベシ外カ

惡寒發熱ナク 藪ニ懊懔 靖 沈氏曰恐ク
謹妄ナク神思昏セズ熱ナク 是レ清字 言了了 一本作

少シ濕多キハ邪ガ 腹滿欲吐 風ガ津液ヲ消シ上ニ
脾ニ鬱ス故ニ 肺竅ヲ薰レハ則チ 鼻燥

脉ノ浮沈ヲ審 吐下ヲ施スベシ 其脉浮者 乃チ風多ノ病
則チ誤治スルノ患ナレ故ニ

性輕揚邪先吐之沈弦者陰ニ屬テ裏ニ在リ乃チ濕上逆ス故ニ多ノ病ヲ主ル濕ノ性ハ濁テ

下ニ流故ニ先下之邪熱ガ胃ニ滿テ上ニ酒疸胸膈ノ間ニ鬱ハ則チ心中

熱風多ク濕少キニ因ッテ欲嘔者嘔一木ニ吐ニ作ル即チ其ノ上行ノ勢ニ乘ノ高ナリノ越ハ

則邪吐之愈胃腎ノ津精血去ル故ニ酒疸下之氣ヲ傷動濕熱

久久變為黑疸腎傷レハ陰目青腎傷レハ陰面

黑陰水既ニ虧テ陽光獨リ心胃ノ間ニ心中如噉蒜齏是雜色

薑薤但レ腎傷レハ陰火煎燥ス大便正黑相兼ル

皮膚爪之不仁皮膚ノ皮膚

夫濕熱ノ疸ヲ成ス脉沈洪數大ヲ得ハ若レ酒疸ガ其脉浮弱黒ニ變ス

乃チ正氣虧ストス此レ陰血ヲ傷ハ反テ黒ニ變ス其脉浮弱若レ酒疸ガ

レ凡其色必ズ微レ黄ヲ相兼レテ女勞雖黒微黄故知ル

ノ腎ヲ傷ル純黒トハ同ジカラズ故ニ雖黒微黄故知ル

之酒疸ヲ安ニ下ノ黒師曰前ニ病黃疸此條ハ他病

黃疸ヲ致スナリ火熱ガ外邪ヲ挾テ裏ニ入リ發熱煩喘

内濕ト相合レ表イニ夕鮮セズ裏熱熾盛ナリ故ニ發熱煩喘

胸滿口燥者以上ノ以病發時火劫其汗火ニテ熱ノ法ヲ

兩熱火熱ト所得然黃家所得然レ凡此

病家ノ病ヲ得ル所ハ從濕得之一身盡發熱熱

面一本黃蓋レ大陰ハ腹ヲ主ル外邪ガ壯熱壯ハ腹ナリ熱ガ

熱在裏當下之湯ノ意ナリ○脉沈渴欲飲カハキ

金匱要略卷之四

水 邪熱カ裏ニ傳フ故ニ脉沈ニノ渴レ水ヲ飲ト 小便不利

者 熱蒸テ 皆發黃 此他病カ變ノ黃ヲ 腹滿舌沈

日疑ハ是身ノ 痿 此熱ガ内ニ鬱レ邪ガ大陰ニ傳ヘ濕熱鬱

外ニ越ニ故ニ 黃燥 濕熱ガ心ヲ 不得睡 是屬黃家

家ノ字 前ニ出 ○黃疸之病 陽病ハ陰和レ陰病ハ陽和 當以

十八日為期 乃チ三六ノ十八日陰數ノ期ナリニ五ノ十日ハ陽

極テ脾陰 治之 一六ニ六三六ノ陰氣ガ來リ復テ火ヲ制 十日

以上 土陰ノ氣ガ 瘥反極 沈氏ノ本ニ反テ極ヲ及劇ニ作ル

陰機カ化レ減 為難治 ○疸而渴者其疸 邪ガ外ニ 越ト雖

氏胃中ノ濕熱ガナリハ内ニ居ノ津液ヲ耗竭セハ則チ 難治疸

而不渴者 熱邪ニ表ニ越ヘ裏ニ餘 其疸可

治 然モ邪ガ胸膈胃ノ 發於陰部 内逆 其人必

嘔 其邪ガ盡ク皮殼ニ表ニ 陽部 乃チ大陽ノ主ル 其人

振寒而發熱也 此表病ハ治シ難キ裏 穀疸

之為病 邪ガ大陽ノ表ニ在レハ寒熱ヲ發シ能ク食スベシ

寒熱不食即 胃ノ邪ガ 頭眩 濁氣内ニ 心胸不

安 即チ懊懐熱痛ノ類ナリ濕熱已ニ自ラ鬱 久久發

黃為穀疸茵陳湯主之 一本ニ茵陳蒿湯 二作ル是ナリ

茵陳蒿湯方

茵陳蒿 六兩 梔子 十四枚 大黃 二兩

右三味以水一斗先煮茵陳減六升內

味煮取三升去滓分温三服小便當利尿

如皂角汁狀色正赤一宿腹減黃從小便

去也茵陳之苦寒ヲ用ヒ毒表裏ノ濕熱ヲ解シ梔子ノ性涼能ク屈曲ハ火ヲ瀉シ下行シ大黃ノ微利ヲ以テ

施子ヲ鬱鬱ヲ開キ熱ヲ解ス○黃家 家ノ字前ニ出ツ此レ女勞疸モ亦濕熱ニ因テ成ル故ニ概

黃家ト謂フ必ス房勞ニ因テ先ツ腎水ヲ傷リ並ニ日一晡膀胱モ亦虚スルニ及ビ火カ下焦ニ起テ女勞ヲ為ナリサレトキ

所所ハ許ト同レ所ト讀ハ非ナリ此レ腎関カ鬱鬱ノ胃ノ氣カ轉ザレハ日晡許陽明旺ナル時ニ濕熱カ腎ト膀胱ト下流

故ニ發熱而反惡寒此為女勞得之膀胱急

脹急ナル故ニ少腹滿膀胱ハ周身ノ陽氣ヲ主ツテ濕熱ノ鬱蒸ヲ受テ皮膚ニ達スレハ則チ身盡

黃腎水虚ノ陰火額上黑陰火カ足下熱ス黄ハ土ノ色タリ

黑ハ腎ノ色タリ脾腎ノ濕火盛ニ相蒸熱スレハ因作黑

疸但レ女勞カニテ腎ヲ傷レハ胃関利ヒズ濕熱ガ下モ膀胱ニ趨ハ相火ハ則チ胃ニ上逆ノ濕火ガ互ニ蒸故ニ

其腹脹如水狀水腫ノ狀ノ如キ入瀉溼溼ヲ通迫テ下ニ奔故ニ大

便必黑時澹此女勞病非水也此レ女勞傷ヲ致ノ精血ノ兩

痺卒ニ解散シ難是腹滿者難治消瘳散主之

一本作用後方

消礬散方

消石

礬石

燒等分 即明礬石

右二味為散

一作末

大麥粥汁

和之 本作以大麥粥汁無和字

服方寸匕

前出

日二服 病隨大小便去 小便

正黃大便正黑是其候也

消石 鹹寒 用其 慄悍 疾 病所 趨

テ濕熱ヲ清シ又熱瘀ノ血ヲ逐ニ取ル本草ニ謂フ礬石ハ能ク 痲熱ノ骨體ニ深キヲ除ク以テ腎ト膀胱トノ濕熱ヲ清フノ瘀結

ヲ消ス大麥ノ汁ニ和シ服シ藥ヲ引テ胃ニ入り先ツ濕熱ノ源ヲ 清シ瘀熱ヲ腎ニ流シ患ヲ為ラザラシム日ニ三々服スルヲ

以テ藥カラ繼續シノント欲スナリ小便黃ニ大使黑ク病ハ大小 便ニ隨テ去ルナリ

本讀岐ノ國ニ採之 ○酒黃疸 一本ニ黃ノ字ナシ此酒熱ノ毒ガ胃ニ 積テ胃ヲ傷リ心膈ノ間ヲ薰蒸ハ則テ

心中懊懣 或熱痛

其勢輕ニ痛ス若シ時日ヲ 緩スレハ必ス心血ヲ傷ル故ニ

梔子大黃湯主之

梔子大黃湯方

梔子

十四枚 一本作十二枚

大黃

一兩

枳實

五枚

鼓

一升 即豆豉ナリ

右四味以水六升煮取一升分温三服

子豆豉ヲ用ヒ上ニ在ルノ邪ヲ宣發其ノ標ヲ清ラス 大黃枳實ハ胃熱ヲ瀉滌ノ其ノ本ヲ下シ

病黃家

家ノ字前ニ出ツ熱テ黃疸ヲ病ム家ハ乃チ胃中ノ 濕熱ガ釀成レ而モ濕ノ性ハ下ニ流ル下ヨリ

但利其小便

此法トス

假令脈浮

濕少ク 風多シ

風ノ性ハ輕揚ナレハ邪カ表ニ在リ故ニ當以汗解之ヲ拘テ小便ヲ利スルヲ常ト茲ヘカラス故ニ宜

桂枝加黃芪湯主之方見水病中○桂枝湯ヲ用ハ表塵ヲ為故ニ黃芪ヲ加テ腠理ヲ實シ熱稀薄ヲ散テ助ケ

ヲ為シ周身微汗セシムレハ肌表ノ邪去テ裏濕アリト雖氏亦下ヨリ滲

○諸黃寒濕ガ血分ニ入り鬱蒸ノ氣血利セズ證ハ津枯血燥皮膚黃ニ暗晦ヲ顯ス即チ陰黃

猪膏髮煎主之

猪膏髮煎方

猪膏半斤 亂髮如雞子 ○亂髮ハ燒テ灰ト為テ大ニニ枚 用ベシ枚ノ子ハ分量考ニ解ス

右二味和膏中二味ノ内亂髮ヲ猪膏ノ中ニ和合 煎之髮消

藥成分再服病從小便出此黃疸血分通治ノ方ナリ猪膏ヲ以テ

燥ヲ潤シ髮灰ハ血ニ入り陰ヲ和ス脾胃ノ陰ヲ其ノ和ヲ得セシムレハ則チ氣血滯スノ濕熱自ラ小便ヨリ去ル蓋シ痺病ハ皆濕熱

鬱蒸ニ因ル相延テ日久ケレハ陰血必ズ耗氣血ノ二分ヲ論ビズ皆蒸テ其陰ヲ滋ニ宜シ故ニ諸黃主之○俞氏白肘後方云女勞疸身

目盡黃發熱惡瘡小腹滿小便難ク以テ大熱ス大勞ノ交接シ水ニ入テ致ス所ノ者此方ヲ用ト ○黃疸病

胃中ノ濕熱相蒸一ハツトレ但シ氣血風寒ノ分チアリ故ニ後入陰黃陽黃ノ別アリ蓋シ胃ハ水穀ノ海營衛ノ源タリ風ガ胃家ノ血分

ニ入ハ風濕相蒸是ラ陽黃トス濕熱カ茵陳五苓散主

茵陳五苓散方

茵陳蒿末十分 五苓散五分

右二物和先食飲方寸匕 出ツ前ニ 日ニ二服此黃疸小

○方見痰飲中

便閉塞ノ氣分實證通治ノ方ナリ五苓散ヲ用ヒ表裏ノ邪ヲ宣通茵陳鬱ヲ開キ濕熱ヲ清フスレハ黃自ラ退ク

○黃疸 濕熱カ中州ニ壅 腹滿小便不利而赤

自汗出 但シ自汗スレハ乃チ表氣一面ニ開キ通ス此爲表和裏實

奪ベシ 當下之宜 大黃消石湯主之

大黃消石湯方

大黃 黃蘗 消石 各四兩 前ニ出 梔子 十五枚

右四味以水六升煮取三升去滓內消石

更者取一升頓服 大黃消石ヲ用テ濕熱カ癉發

焦ノ濕熱ヲ清ラレ梔子ノ輕滲能ク上焦ニ屈曲ノ火ヲ下行ノ助ヲ爲シム乃チ邪ガ裏實ニ居スル通治ノ方ナリ

○黃疸病 小便黃赤如金ノ如ハ小便色不變欲

自利 肌表必ス淡黃ニ枯燥ス乃チ濕鬱ノ熱微 腹滿而

脾濕ガ肺ヲ喘 喘逆スルナリ然レモ 不可除熱

寒ヲ以テ胃ノ陽ヲ傷レ則チ陰濕行ス 熱除必噦 噦ノ字ハ

化ノ痰飲ト爲テ上逆ノ噦ヲ作故ニ 熱除必噦 傷寒論

國字解ニ 噦者小半夏湯主之 方ハ見痰飲中ニ

テ痰ヲ滌シ 飲ヲ除テ噦ヲ止ム噦止ムヲ俟テ再ヒ其ノ疸ヲ治ス小

半夏湯ハ黃疸ノ專方ニ非ス小半夏加茯苓湯ニ擬ヘシ

○諸黃 小柴胡湯ハ原傷寒傳ヘテ少陽ニ入り邪高ク痛

蒸ノ黃 腹痛而 嘔者宜柴胡湯 小柴

胡湯方見嘔吐中 小柴胡湯ヲ以テ單ニ少陽厥陰ノ風熱

上行ヲ提土中ニ陷入テ患ヲ爲シノザレハ則チ痛モ嘔モ自ラ已テ再

風濕ヲ清ラレ滲ノ
藥ヲ以テ和シ可ナリ ○男子黃 凡ソ黄疸ヲ病ム小便極ノテ

黄 小便自利 外邪壅滯ノ致ス所ナレ其ノ人必ス飲食ニ

陰ヲ傷リ數ニ其ノ陽ヲ擾相火ガ脾胃ニ衝キ濕熱合テ蒸シ脾陰

傷ノ致ス所ナレハ表ヲ發シ 當與虛勞小建中湯 方ハ見ニ

中○小建中湯ヲ用ヒ胃中ノ營衛ヲ補ヒ營ヲ腎水ヲ生レテ

陽光ヲ鎮相火ヲノ土ニ乘セザラシムレバ則チ黄ヲ治マスノ黄自

附方

瓜蒂湯治諸黃 方ハ見暍病中○瓜蒂湯ハ吐藥ナ

懷吐セント欲メ他病ナキハ此湯ヲ用ヒ吐ノ黄水ヲ去ルニ其ノ高

淺ノ及易レ此湯ヲ用テ以テ其黄水ヲ吐レ去レハ正ニ内經ニ其

高ニ因テ越之ヲノ旨トナリ然レ此レ亦仲景傷寒ヲ治スルノ正

方ナリ易瘴證ヲ治スルノ方ナリ但レ後ニ

千金麻黃醇酒湯治黃疸

麻黃 三兩

右一味以美酒五升煮取二升半頓服盡

冬月用酒春月用水煮之 外カ風寒ニ感ノ濕熱表

或ハ脈自ラ浮ハ汗ヲ以テ解スベシ麻黃一味ヲ用ヒ酒ニ煮テ其ヲ

ノ微上ニ徹下ニシテ陽ヲ行シ腠ヲ開テ營分ノ邪ヲ驅片黄

ガ表ヨリ解スナリ ○醇酒ハ即チ清酒ナリ

驚悸吐衄下血胸滿瘀血病脉證治第

驚悸吐衄血滿

寸口脈動而弱

動脈陽屬外邪心包入

相搏則動

動即為驚

弱脈陰屬心氣不足

驚悸或心氣虛外邪心包絡火以テ外邪ヲ按ハ搏動ノ則チ

弱則為悸

悸ハ心神恍惚跳動テ自ラ發タル能ハサルノ

實トス弱ハ則チ血病ヲ悸ラ驚トスルナリ

師

曰師ノ字ハ前ニ出ツ肝ノ竅ハ目ニ開キ腎水ハ

尺脈浮

目睛暈黃

暈ハ旁氣ナリ即カ、リモノヲ指ス一本ニ無ニ黃

害レ血ニ進テ

未止

風氣ハ肝ニ通ノ肝風

暈黃去

乃チ邪氣解散レ

目睛慧了

知血今止

此レ外カ風熱

致ス又曰從春至夏血少者

春夏ハ諸陽ノ氣ガ

陽ノ經絡モ亦外ニ在リ手ノ太陽小腸ハ火ニ屬シ足ノ太陽膀胱

太陽ヲ瀉スベシ故ニ

太陽

從秋至冬

血少者

秋冬ハ陽カ内ニ伏ス手足ノ陽明ノ經絡内ニ居ス手足ノ陽明太

陽明ヲ瀉スベシ故ニ

陽明

秋ヨリ冬ニ至テハ

傷血家不可發汗

汗出

必額上陷

脈緊急直視不能眴不得眠

此條已ニ傷寒論

病人面無色

即チ面テ白フノ神氣ナキノ蓋シ

註ニ於テ

血ハ氣ニ隨テ轉ス氣行ハ血

モ行ル氣虚ノ血ヲ統テ上ニ面ヲ榮リ
能ザレハ面テ色ナシ邪ガ内ニ入レハ外カ
無寒熱故ニ脉沈

弦者氣虚シ鬱ヲ蒸ルニ為テ弦ハ中虚シ衛氣ニ屬ス然
モ衛ガ血ニ陷リ血カ陰火ニ隨ヒ經絡ノ虚スル處ニ上

行ノ出ツ故ニ 芤若シ面
無色脉 浮弱浮ハ陰虚トス
弱ハ陽弱トス 手按之絶者若シ陰火カ上ニ陽道ニ衝擾ニ

氣ガ血ヲ攝スノ血ガ垂降テ腸胃ニ聚ハ則チ 下血若シ陰火カ上ニ陽道ニ衝擾ニ

心ヲ淫スレハ則チ煩シ肺ヲ淫スレハ則チ 煩效者效スレハ則チ氣カ上ニ逆ノ
血モ亦隨テ上ル故ニ

必吐血此芤下血吐血 夫吐血心包血分ニ邪ヲ受
レハ則チ氣逆ノ血

既ニ逆シ並ニ陰火ヲ挾テ上ニ肺金ヲ刑スレハ則チ效逆上氣

然モ陰虧レハ則チ火其脉數而有熱 乃チ真陰已ニ竭テ

逆ノ上升 不得臥者此陰氣素ヨリ虧テ外邪ガ
裏ニ傳フルノ吐血ナリ

夫酒客效者酒ハ熱穀ノ液タリ其性大熱ナリ内經ニ
謂ル因テ大ニ飲ム片ハ則チ氣逆ス逆スレハ

則チ濕熱胃ニ蓄聚下流ノ腎ヲ傷リ相火ヲ挾テ上薰ノ肺ヲ傷ル肺傷ルハ則チ效スレハ則チ氣亂テ血ヲ攝リ能ハサレハ則チ

必致吐血此因極飲過度至極大飲スルノ所致
度數ニ過ルナリ

也先酒毒ヲ清ラスベシ
其血ヲ治スルノ勿レ 寸口脉弦而大弦則為

減大則為亢減則為寒亢則為虛寒虛相

搏此名曰革婦人則半產漏下男子則亡

血失精此條已ニ虛勞
論中ニ註ス 傷亡血不可發其表汗

出則寒慄而振此條傷寒論國字解ニ
註ス一本ニ此條無シ 病人

設氣分ニ邪ヲ受テ痰飲ヲ蠶逆搏結テ胸滿ヲ致ス者ハ煩
躁氣逆喘滿ノ唇痿スベカラス此胸滿テ唇痿スルハ乃チ血カ

金匱要略國字解

胸滿唇ヲ紫胸滿唇ヲ紫唇痿乃チ淡白ニシテ燥サルナリ舌青血ガ上焦ニ凝ルハ則チ

氣滯テ熱ニ口燥但欲漱水不欲嚥音宴吞ナリ邪ガ血ニ居ス

故化スレハ則チ無寒熱氣虛ノ血ヲ統ルノ能ズ内ニ癢ツテ脉微大スレバ則チ

血滯テ氣來遲即チ孔虛ノ狀ナリ假令氣分腹不滿熱盛ナレハ則チ腹脹滿ス今

其人言我滿乃チ外カ滿スト雖内臟為有瘀血血滯氣滯テ脹ル故ニ

此瘀血ノ脉證ヲ辨スナリ病者如有熱狀一本有字ナレ直ノ

煩滿口乾燥而渴此熱アル狀ノ其脉反洪大數

無熱但ニ脉ト證ト寒熱合ス是氣分ニ邪ヲ受此為陰

伏一本作狀ニ是瘀血也既ニ瘀血當下之即チ犀角地

黃ノ類或ハ抵當丸ノ類ナリ

傷火邪者桂枝去芍藥加蜀漆

牡蠣龍骨栲逆湯主之

桂枝栲逆湯方

桂枝三兩去皮甘草二兩炙生薑二兩

牡蠣五兩熬龍骨四兩大棗十二枚

蜀漆三兩洗去腥

右為末以水一斗三升先煮蜀漆減二升

內諸藥者一本取三升去滓温服一升此方

論國字解於テ註ス今此條ニ但火邪ト曰テ邪ノ證候ナレ傷寒論ニハ驚狂ノ文アレ凡一本ニ此條ヲ削ル從フヘシ

○心下悸者、悸ハ心虚ニ屬スト雖凡然モ病ヲ致スノ因ハ水腎水心ヲ陵者アリ痰飲上逆ノ者アリ各補瀉同カラス今此條ハ外ノ微邪ガ心包ヲ襲ニ因テ以テ内飲ヲ挾テ致ス所ナリ故ニ

半夏麻黃丸主之

半夏麻黃丸方

半夏 麻黃 等分

右二味末之煉蜜和丸小豆大飲服三丸

日三服半夏ヲ用ヒ飲ヲ滌テ麻黃陽ヲ通シ邪ヲ散ス老痰此ニ非レバ開竅ヲ能ズ故ニ用ユ○吐

血不止者外寒傳テ心包ニ入り經絡ノ血ガ經ニ歸ラテ得セバ則チ吐血止ズ故ニ栝葉湯

主之

栝葉湯方

栝葉 三兩 乾薑 三兩 艾 三把

右三味以水五升取馬通汁一升合煮取

一升分温再服干薑艾葉ノ辛熱ヲ用ヒ寒ヲ散シ瘀血ヲ行ラシ邪去ラレムレハ則チ血自ラ經ニ歸ク然モ

血ガ止サレハ則チ血七ヒ火カモテ故ニ栝葉ヲ以テ陰ノ正ヲ養ヒ馬通ノ沈降ヲ以テ浮逆ノ火ヲ瀉メ助ラ為此寒邪ガ内ニ傳テ吐血スル

ニ出ス方ナリ ○下血 夫レ人ノ五臟六腑ノ血ハ全ク脾氣統攝テ健運流行ハ肺氣通調テ血ガ氣ニ隨テ轉

レ旁命ニ會ノ統テ臟腑周身ノ經絡ニ分テハ是レ瘀逆ノ患ナレ其或ハ瘀運ノ常ヲ失ヒ胃ノ氣和セズ逆ノ上行シ血ガ氣ニ隨テ轉スレハ

則チ吐血ス若シ胃ノ氣下陷ハ則チ血モ亦隨テ下降シ便血ヲ為ス此便ヲ先テ血フ後ニスルハ乃チ饑飽ニ因テ先ツ脾胃ヲ傷リ氣虚ノ

下陷虚ニ因テ寒濕ヲ受ケ小腸ニ流レハ血瘀氣滯リ物ヲ化スルノ氣ニ隨テ傳テ大腸ニ入り渣滓ハ前ニ行テ下リ血ハ繼テ後

ニ行テ 出ツ故ニ 先便後血此遠血也 即チ小腸ニ寒アレハ其ハ 後重ノ便血ス是ナリ故

黄土湯主之ヲ亦主吐血衄血

黄土湯方

甘草 乾地黄 白朮 附子

阿膠 黃芩 竈中黄土

右七味以水八升煮取三升分温二下服

白朮ヲ用ヒ脾ヲ健ニレ胃ヲ養ヒ竈中ノ黄土ト附子ト以テ寒 濕ヲ燥ノ脾氣ヲ温ム脾ヲ温シレハ健運ノ常ノ如ク腸胃ノ

邪去ラテ得レハ則チ便血自ラ止ム地黄阿膠以テ陰血ヲ養フ 但レ附子ノ辛熱過テ金ヲ傷ラニテ慮リ黃芩ヲ以テ保護テ

其腸熱ヲ 除クナリ ○下血 大腸ハ乃チ傳道ノ職ヲ主テ濕熱ノ邪 大腸ニ蓄聚テ血瘀行ラズ小腸傳

ノ渣滓ガ大腸ニ入レハ大腸ニ瘀 トコロノ血ガ前ニ行テ直腸ニ至ル故ニ 先血後便此近血也 此

腸濕熱ノ蓄 血ナリ故ニ 赤小豆當歸散主之 方見狐惑中 ○赤小豆ノ味酸

氣寒ヲ以テ耑ラ血分ノ濕熱ヲ清フレ當歸血ヲ養ハ則チ血ガ 經ニ歸ラテ得ル兼テ其風ヲ驅ニ將水ノ酸寒ヲ以テ熱ヲ清フ

レ收斂シテ 血ヲ止ナリ ○心氣不足 心氣素ヨリ不足スルニ非ス此心 氣ニ邪ヲ受テ不足ヲ為ナリ即チ

心下ノ邪ヲ瀉スルヲ以テ瀉心ト名ツクルノ意ナリ心ハ君火タリ血ヲ主ル 風火感ニ襲ヒ營血ヲ擾亂即チ心熱ノ絡脉溢然モ心火カ亢極

ハ血熱妄ニ行テ肺氣ガ 血ヲ攝フ能ス故ニ 吐血 或ハ 衄血瀉心湯主之

瀉心湯方 一本有亦治霍亂之四字

大黃 黃連 黃芩

右三味以水三升煮取一升頓服之 大黃 黃連 黃芩

統テ三焦ノ實火ヲ瀉シ邪去テ血自ラ寧カラシム火ヲ制スルノ方ナルガ故ニ名ヅケテ瀉心湯ト云フナリ

嘔吐噦下利病脉證治第十七

論一首 脉證二十七條 方二十三首

夫嘔家有癰膿不可治嘔膿盡自愈此條傷寒論

嘔吐噦

國字解厥陰篇ニ註ス ○先嘔却渴者此他病因テ傳ハ来ルノ嘔ナル故ニ嘔スレハ則チ津液去テ邪モ

亦嘔ニ隨テ去ル但レ胃腸乾燥スレハ此爲欲解若レ邪氣ガ内ニ入り痰

飲ト中ニ賤積テ腸氣ヲ阻抑テ噦ヲ熾テ渴スレハ則チ渴ノ先

渴却嘔者爲水停心下此屬飲家家ノ字前ニ出ツ夫レ嘔ス

レハ則チ必ス津液ヲ傷ル故ニ嘔家本渴今嘔反不渴者是レ飲ガ胸膈ニ

停テ其ノ内燥ヲ制ス故ニ反テ以心下有支飲故也此

屬支飲此嘔ノ後ニ渴スルハ邪解スト渴セサルハ停飲ト爲ノ辨ナリ支飲ハ痰飲ノ中ニ註ス ○問曰

病人脉數數爲熱胃熱スレハ則チ當消穀引飲一本リ作レ食

而反吐者何也師曰乃チ他病ニ因テ以發其汗胸膈ノ陽ヲ傷

致令陽微膈氣虛膈氣既ニ虛スレハ邪反テ去ス客熱狂起故ニ脉乃數

數爲客熱然モ中焦ノ元氣モ傷ル胃中ノ正虛ノ不能消穀此レ胃中

虛冷故也脉弦者虛也胃虛ナリ火ト木トノ邪ガ旺ナルニ因テ則チ土ノ氣衰弱

胃氣無餘脾ガ健カニ運ス胸膈ノ氣虛ノ食ヲ化ス朝食暮吐

變爲胃反若シ寒在於上醫反下之徒ニ胸胃ノ氣ヲ傷リ水

ガ土中ニ 令脉反弦故名曰虚 胃膈ノ氣虚スルナリ此 條外感汗ヲ發メ陽ヲ

傷リ誤リ下メ胃ヲ傷リ皆 胃反ニ變スルヲ辨スナリ ○寸口脉 氣ヲ 微而數

微脉カ寸口ニ懸ハ是 微則無氣 氣虚スレハ則チ邪火妄ニ行 脉即チ數ナリ蓋シ血ハ氣ニ

隨テ轉ズ氣行ハ則チ血行ル此レ衛 無氣則營虚 營ハ陰ナレハ 營虚スレハ

血調ラス 營虚則血不足血不足 氣モ虚ノ 則チ 胸ガ煖ナラス

胸中冷 胸冷ハ穀ヲ化セズ故ニ胃反ス此條 胃ノ 浮而漻浮則為虚 血虚 漻則 傷脾

瀆ハ氣滯トス血虚レ氣滯故ニ脉浮ニ漻ナリ而ノ浮ハ虚トス 虚ハ乃チ脾ノ營虚ス虚スレハ則チ脾ヲ傷ル然モ營虚ノ衛氣モ亦虚

スルヲ致シ氣 脾傷則不磨 穀ヲ消磨セザルナリ 脾既ニ傷 獨リ行ス則チ

ラ傷ル故ニ宿食化ナズ津液聚リ結レ 化ノ痰ト為中宮ニ留滯レハ則チ 朝食暮吐 胃氣稍

旺ニ能食スレハ脾虚ノ 暮食朝吐 暮ハ脾氣稍旺ニ能 運サレハ則チ暮ニ吐ス 食スレハ胃氣ガ納サレハ

則チ朝 宿穀不化名曰胃反 脾胃陰陽ノ虚實ヲ分テ 緩ヲ平 脉緊而漻 其病難治 此レ跌陽ヲ診

トス今 病人欲吐者 不可下之 氣ノ虚實ヲ 知ルナリ ○病

嘔而腹滿 嘔ハ傷寒論國字解ニ詳ニ註ス此 嘔ノ二便通セザル故ニ腹滿即チ 視其

前後 前後ハ小便 知何部不利利之 通利 即愈

此實嘔ノ 傷 嘔而胸滿者 茱萸湯主之

治ヲ明スナリ 傷 嘔而胸滿者 茱萸湯主之

此實嘔ノ 傷 嘔而胸滿者 茱萸湯主之

治ヲ明スナリ 傷 嘔而胸滿者 茱萸湯主之

治ヲ明スナリ 傷 嘔而胸滿者 茱萸湯主之

吳茱萸 一分 人參 三兩 生薑 六兩

大棗 十二枚

右四味以水五升煮取三升温服七合日

三服

傷乾嘔吐涎沫頭痛者茱萸湯主之以上ノ二條ハ

傷寒論國傷寒邪ガ裏ニ傳ヘ痰ヲ搏リ結テ痞ヲ成レ心下ニ居ス然モ痞ハ陰邪ニ屬ス○嘔而風木清陽ノ氣ヲ壅逆ノ和セス反テ胃ニ逆スレハ則チ嘔ス胃逆ノ腸ニ下リ注ハ則チ腸鳴寒邪ガ裏ニ入ツテ痞ヲ

致ス故ニ心下痞者半夏瀉心湯主之ツカヘ

半夏瀉心湯方

半夏 半斤 黃芩 三兩 乾薑 三兩 人參 三兩

黃連 二兩 大棗 十二枚 甘草 三兩

右七味以水一斗者取六升去滓再者取

三升温服一升日三服人參甘草大棗ハ胃ヲ補ヒ中ヲ和シ半夏以テ痰ヲ飲

ヲ滌シ干姜ハ中ヲ温メ寒ヲ散ス黃芩黃連以テ○乾嘔

氣逆ノ熱ヲ清ラスルナリ瀉心トハ心下ノ邪ヲ瀉スルナリカラエツキ

而木邪ガ胃ニ乘ン上逆スレハ則チ嘔ス下利スルハ外ノ風

飲ヲ相合ノ搏結ヲ利者利者寒ガ胃中ノ痰

黃芩加半夏生薑湯方 黃芩 三兩 甘草 二兩 芍藥 二兩

一本三兩作ル

半夏 半升

生薑 二兩

一作四兩

大棗 二十枚

一本作十二枚

右六味以水一斗煮取三升去滓温服一

升日再夜

一本有服字小柴胡湯ノ内表ニ走ルノ柴胡ヲ去テ半夏生薑ヲ倍レ中ヲ和ノ飲ラ

芍藥ヲ加フ是レ土中ノ木ヲ平ニスルナリ

○諸嘔穀不

得下者

外邪内ニ入テ嘔スレハ必ス自ラ飲食稍進此痰飲多ク外邪少レ胸胃ノ間ニ拒氣逆ノ穀入ラ

得ス小半夏湯主之

方見痰飲中○此痰飲多ク嘔故ニ小半夏湯用ヒ邪ヲ散

レ半夏以テ痰飲ヲ消ノ嘔逆ヲ止ム

○嘔吐而

痰飲ガ胸膈ヲ噎抑テ邪ヲ挾テ上逆ノ嘔吐ス故ニ病

在膈上

後

思水者

乃外邪ト胸膈ノ痰飲ト已ニ去ル故ニ即チ病ヒ

解

猶ラ恐クハ餘邪内ニ伏メ胃熱膈燥ヲ成テラ則チ

急與之

一本有思水者之三子之トハ猪苓散ヲ指ス

與テ以テ胃中ノ津液ヲ救ハ是レ膈消ノ患ヲ杜故ニ

猪苓散主之

猪苓散方

猪苓

茯苓

白朮

各等分

右三味杵為散飲服方寸匕日三服

白朮胃ヲ安レ

中ヲ和レ猪苓茯苓胃家内ニ伏スリノ邪ヲ通シ滲シ胸膈ヨリ去ラシム

傷

嘔而脉弱小便

復利身有微熱見厥者難治四逆湯主之

四逆湯方

附子

生用

乾薑

一兩

一本作二兩半

甘草

二兩

右三味以水三升煮取一升二合去滓分

温再服強人可大附子一枚乾薑三兩

此條

傷寒論國字解ニ註ス傷嘔而發熱者小柴胡湯主之

小柴胡湯方

柴胡 半斤 黃芩 三兩 人參 三兩 甘草 三兩

半夏 半斤 生薑 三兩 大棗 十二枚

右七味以水一斗二升煮取六升去滓

煎取三升温服一升日三服

○胃反營衛ノ兩虚ニ本ツク木氣カ脾ニ乘ノ健ニ運ガ

上ニ溢ハ嘔吐者此偏ニ痰多レ故ニ大半夏湯主之

胃反不受食入即多吐外臺云治嘔心下痞鞅者

大半夏湯方

半夏 三升洗完用 人參 三兩 白蜜 一升

右三味以水一斗二升和蜜揚之

百四十遍煮取二升半温服一升餘分再

服人參ノ甘温ヲ用ヒ脾胃ヲ滋潤補養シ蜜ニ合ノ燥ヲ潤ノ營衛ヲ生シ半夏ハ飲ヲ滌逆ヲ下ノ其標ヲ退ク水ト蜜ト和レ揚ル

二百四十遍ハ其ノ性柔以テ胃ヲ養テ燥サルニ取ル○食已即吐者

木火ノ邪カ腸胃血分ニ結氣反テ胸膈ニ逆ス故ニ食レ已テ即チ吐ス大黃甘草湯

經ニ謂ル血ノ生スル所ノ病ヲ主ルナリ故ニ主之外臺方又治吐水

大黃甘草湯方

大黃 四兩

甘草 一兩

右二味以水三升煮取一升分温再服大黃

以テ血分ノ熱ヲ破リ甘草以テ胃ノ氣ヲ調ヘ腸胃通ノ食下レ
ハレハ則チ吐セズ此方脾胃乾結者ハ宜シ上ニ出タル不可下ノ條上反
覆ノ互ニ看ハ始テ仲景
前後ノ意ヲ得ベシ
○胃反 此レ外風ガ胃ニ乘レ脾虛
ノ飲ヲ成ス然モ風氣

肝ニ通スレハ木盛ニノ土ヲ制レ脾胃ノ氣鬱ノ反テ上逆スレハ則チ胃
反ヲ為シ吐スレハ則チ痰飲去テ風火盛ニノ胃ノ津ガ枯燥故ニ

吐而渴欲飲水者但肝木ガ旺ニノ脾土カ衰ラレハ水ガ
剋レ腎水反テ溢飲ヲ為治法ハ

脾胃健ニノ以テ伏邪
宿飲ヲ除クベシ故ニ
茯苓澤瀉湯主之外臺云治消渴脉絶胃
反吐食又有小麥一分

茯苓澤瀉湯方

茯苓 半斤

澤瀉 四兩

甘草 二兩

桂枝 二兩

白朮 三兩

生薑 四兩

右六味以水一斗煮取三升内澤瀉再煮

去滓取二升半温服八合日三服生薑桂枝
白朮甘草

○吐後
ヲ以テ脾胃ヲ健ニシ營衛ヲ和ノ邪ヲ驅テ外ニ出ス

此モ亦風邪ガ胃ニ入ルノ證ナリ木火内ニ熾ニ乘ノ胃ニ入テ痰飲ノ
相扶了無ク風火上升ノ吐レ其ノ津液ヲ傷リ餘風イダ散セズ故ニ

後ニ渴欲得水而貪飲者乃チ外水其ノ胃ノ燥ヲ
制スル丁能ス因テ 文

蛤湯主之文蛤ノ鹹ク寒ヲ用ヒ熱ヲ清フレ堅ヲ軟ケ結ヲ散レ
麻黄杏仁甘草石膏ヲ以テ裏ニ在ル餘邪ヲ清

散レ熱鬱ヲ通シ生姜大棗以テ營衛ヲ和ス蓋シ
脉緊ハ寒壅頭痛ヲ為麻黄寒ヲ散ス故ニ
兼主微風

風微ニ寒多ク脉緊
ヲ見ス故ニ微風ト云フ
脉緊頭痛

文蛤湯方

文蛤 五兩

麻黃

甘草

生薑

各三兩

石膏 五兩

杏仁 五十箇

大棗 十二枚

右七味以水六升煮取三升温服一升汗

出即愈

乾嘔吐逆吐涎沫
此胃寒ナリ肺胃
氣虚スハ則チ寒シ

腎陰反テ胃ニ乗ス故ニ乾嘔吐逆ノ涎沫ヲ吐ス即チ難經ニ腎邪
ガ脾ニ入レハ涎ヲ為シ邪ガ勝ツ所ヨリ來者是ナリ但木邪カ高
竈ニ上逆スル無レ故ニ頭痛
セス胸滿ス其病尚淺シ

半夏乾薑散方

半夏乾薑散主之

半夏乾薑

各等分

右二味杵為散

古ハ細ニ坐ムヲ通ノ散ト云細末ニスルヲ末
ト云後世ノ散藥ト稱スルト同レカラス

取方寸匕出ツ漿水一升半煎取七合頓服

之ラ半夏飲ラ漿ノ嘔ヲ止ノ乾薑胃ヲ温ノ漿水引テ陰中ニ

條下ト同シ脚氣門
禁石湯ノ條ニ解ス

病人

形寒冷ヲ飲テ肺ヲ
傷テ痰ヲ挾ニ乃チ

胸中似

喘ニ喘息

不喘似嘔

不嘔似噦

不噦喘ナラス嘔ナラス
噦ナラザルナリ

徹ノ通ニ心中憤憤然

慣ハ悶ナリ即チ
惡心ノ義ナリ

無柰者

肺ニ寒ヲ受ケ
内ニ痰飲ヲ挾ニ

胸膈ノ間ニ
標聚故ニ

生薑半夏湯主之

生薑半夏湯方

生薑 五兩

半夏 五兩

水 一斗

煮取 六升

分三服

生薑 一斤 一本作生薑汁一升 半夏 半升 一本作半斤

右二味以水三升煮半夏取二升内生薑

汁煮取一升半小冷分四服日三夜一嘔

止停後服 生薑肺ヲ温ノ寒ヲ散シ半夏飲ヲ瀉シ寒散

止ム蓋シ生姜半夏湯ト小半夏湯ト同レケレハ小半夏湯ハ痰飲

ヲ瀉スルヲ主ル故ニ半夏君トス此ハ形寒テ冷ヲ飲テ肺ヲ傷

ニ因テ生姜汁ヲ以テ再ヒ煎レ肺ヲ温メ ○乾嘔 歲 此肝

寒ヲ散スルヲ君トス故ニ生姜半夏湯ト名ツリ 胃ニ臨テ嘔ヲ致スナリ内チ痰飲相摺ム丁無ク木邪ガ胃ニ

乗ジテ胃ノ氣ガ伸ス故ニ乾嘔ヲ作胃邪ガ肺ニ衝ハ則チ嘔ス 若ノ

氣ガ鬱逆ノ四散ニ 佈ザレバ則チ 手足厥者 厥冷スル然レハ此證脉必ス沈

非ノ地ニ 橘皮湯 主之 實ニノカラアラス是レ沈遲虛無

橘皮湯方 橘皮 四兩 生薑 半斤

右二味以水七升煮取三升温服一升下

咽即愈 橘皮生姜味辛ク氣温ヲ用ヒ胃ノ癰逆ノ氣ヲ散ス

ルヲ主トレ胃ノ氣ヲノ四肢ニ佈行シムレハ則チ嘔噦止テ

厥自ラ退ク經ニ謂レ ○噦逆者 此胃虚ニ邪ヲ受ケ噦ヲ致ス

木鬱鬱達之ヲ是ナリ 噦逆一非ス但是胃中邪氣散セズ故ニ 橘皮竹

茹湯主之 橘皮竹茹湯方 橘皮 二斤 竹茹 二升 大棗 三十枚

生薑 生斤 甘草 五兩 人參 一兩

右六味以水一斗者煮取三升温服一升日

三服人參甘草以テ胃ヲ養ヒ中ヲ和シ生姜大棗胃ヲ補テ中上ノ二焦營衛ヲ宣通ノ中氣ヲ和シ肺氣自ラ能ク

逆ノ氣ヲ散ス如ハ風邪胃熱ヲ清フレ能ク熱痰ヲ消レ橘皮以テ胃

證アリ殊ニ大病中胃絶セントノ噦ヲ發スル者ハ大ニ危予補中益氣

湯ニ生脉散黃栢附子ヲ加ヘ驗ヲ得ル多シ此方ハ乃チ回春ニ出

下利

夫六腑氣絶於外者六腑ハ陽タリ氣カ外ニ行ハ蓋レ胃ハ衆腑ノ源タリ源氣衰ハ陽カ四

五臟氣絶於内者諸臟ハ陰ニ屬ス藏ノテ瀉セス然モ五臟ノ中チ腎ハ衆陰ノ主タリ

眞陽ノ寄ル所ノ地ナリ但レ眞陽衰ハ微ナレハ則チ

五臟ノ氣皆不足レ胃關閉ス瀉ノ藏ノザレハ則チ

不禁而下甚者陽氣脱ノ陰血痺着テ行ス故ニ手足不仁此レ下

治スル必ス脾腎ヲ以テ要ト為リヲ示スナリ○不仁ハ前ニ出ツ

重脉大者爲未止脉微弱數者爲欲自止

雖發熱不死傷下利手足厥冷無脉者灸

之不温若脉不還反微喘者死傷少陰負

跌陽者爲順也傷下利有微熱而渴脉弱

者令自愈一本作令若下利脉數有微熱汗出

令自愈設脉緊爲未解傷下利脉數而渴

者令一作今自愈設不差必清膿血以有熱

故也傷下利脉反弦發熱自汗者自一作本

自愈以上六條ハ已ニ傷寒論國字解ニ註ス○下利氣者此即チテ利ノ失氣ヲ

ナリ肝邪ガ胃ニ乘ノ邪正兩實ノ氣ガ膈間ニ陷滯下ニ通テ氣ヲ失スラ下利氣ト謂フ内結ニ風カ内ニ淫レ後ト氣トヲ得

レハ則チ快然トノ如衰フノ義ナリ然モ腸當利其小便肺

間ノ氣ガ鬱ノ上行ヲ得ズ故ニ氣ヲノ下モ膀胱一通ゼシムハ大腸ノ氣則チ肺胃ニ上リ行ラテ氣ガ下ニ迫ズ利氣自止故ニ其小便ヲ利スベキナリ此條

出タル訶梨勒散ニ附ケ見ル傷下利寸脉反浮數

尺中自濇者必清膿血傷下利清穀不可

攻其表汗出必脹滿傷下利脉沈而遲甘

人面少赤身有微熱下利清穀者必鬱冒

汗出而解病人必微熱所以然者其面戴

陽下虛故也傷下利後脉絶手足厥冷昏

時脉還手足温者生脉不還者死傷下利

腹脹滿身體疼痛者先温其裏乃攻其表

温裏宜四逆湯攻表宜桂枝湯

四逆湯方見上

桂枝湯方

桂枝三兩芍藥三兩甘草二兩炙

去皮一本作三兩

生薑 三兩

大棗 十二枚

右五味以水七升微火煮取三升去滓

滓適寒温服一升服已須臾啜一本熟稀粥字アリ

一升以助藥力温覆令一時許遍身皦皦

微似有汗者益佳不可令如水淋瀝若一

服汗出病瘥停後服以上五條ハ已ニ傷○下利寒論國字解ニ註ス

脈來寸數ナラス遲ナラス浮ナラス沈ナラス和緩三部脈尺

皆平按之手ヲ以テ心心下堅者脈ト證ト符ズ是レ風

當食カ胃中ニ填ラ責ベシ未ダ血急下之宜大承氣湯氣ヲ傷ラザレハ脈ニ形ガル先キニ

方見瘕病大承氣湯ヲ用ヒ形アルノ滯ヲ峻攻レハ下利自止

此傷食下利ナリ經ニ謂土鬱奪之ヲ通因通用ノ法ナリ

○下利 食ガ胃ニ壅テ 脈遲而滑者 脈遲ナリト雖死

但レ遲ハ氣ノ壅トス滑ハ血ノ實トス血 實也 實ト為ナリ内ニ滯

利未欲止 漸ク停ノ患ヲ成ヲ恐ル故ニ 急下之宜

大承氣湯 此モ亦食 滯ノ利ナリ ○下利 若シ風寒ニ因テ下利シ

屬ス者ハ脈必ス 脈反滑者 乃有餘屬ス 當有所去

遲濇微弱ナルニ此 除キ去ベキ 下乃愈宜大承氣湯 此モ亦食壅テ

利已瘥至其年月日時 復發者 是

年ノ下利ノ餘邪ガ腸間ニ隱僻シ今年ノ臍臍司令ノ期ニ值テ

舊邪ヲ觸レ動レ復發ス然モ隱僻ノ根イダ除サレハ終ニ愈

能_ス以_テ病_ヲ不_レ盡_キ故_ハ也_ハ當_ニ下_ス之_ヲ宜_ニ大_ニ承_ニ氣_ニ湯_ニ見_方
痙病中此舊積タル邪ガ復スル病ナレハナリ傷_レ下_リ譫_セ語_ス者_ハ有_ニ燥_ニ屎_ニ也_ハ

小承氣湯主之_ヲ

小承氣湯方

大黃 四兩 厚朴 二兩 枳實 大者三枚

右三味以水四升煮取一升二合去滓分

温二服得利則止傷下利便膿血者桃花

湯主之_ヲ

桃花湯方

赤石脂 一斤半 乾薑 一兩 粳米 一升

右三味以水七升煮米令熟去滓温七合

内赤石脂末方寸匕日三服若一服愈餘

勿服傷熱利下重者白頭翁湯主之_ヲ

白頭翁湯方

白頭翁 二兩 黃連 二兩 黃栢 三兩

秦皮 三兩

右四味以水七升煮取二升去滓温服一

升不愈更服傷下利後更煩按之心下濡

者為虛煩也。梔子、鼓湯主之。

梔子鼓湯方

梔子 十四枚

香鼓 四合 緹製

右二味以水四升先煮梔子得二升半內

鼓煮取一升半去滓分二服温進一服得

吐則止。傷下利清穀裏寒外熱汗出而厥

者通脉四逆湯主之。

通脉四逆湯方

附子 大者一枚 生用

乾薑 二兩 強人 可四兩

甘草 二兩 炙

右三味以水三升煮取一升二合去滓分

温再服。以上五條ハ已ニ傷寒論國字解ニ註ス。○下利肺痛。風木ガ火

ヲ刑シ肺氣癰ニテ利ヒス即チ胸中痛ニ氣ガ利ヒサレバ水ガ後

陰ニ走リ臟邪ガ肺ニ移ル故ニ肺痛テ下利ス猶ラ肺癰ノ類

紫參湯方

紫參 半斤

甘草 二兩

右二味以水五升先煮紫參取一升內甘

草煮取一升半分温二服。疑非仲景方。○丹波

和名知々乃波久佐味苦辛寒无毒二月採根火炙使紫色ト

謂ハ心腹ノ積聚寒熱ノ邪ヲ主ルト好古謂ハ血痢ヲ治ス此レヲ以テ瘀ヲ散シ痛ヲ止ムト甘草以テ中氣ヲ調ハ熱ヲ清ニスレバ則チ痛利自ラ止ム疑ラクハ仲景ノ方ニ○氣利ハ此條ハ前一出非ストハ醫理ヲ知ラサル者ノ説ナリ

者ハ瀉利其小便ノ條ト連子見ルベシ

訶梨勒散主之

訶梨勒散方

訶梨勒 十枚燻ス ○即チ訶子ナリ

右一味為散粥飲和頓服

小便ヲ利スベシト此レ訶子ノ味瀋性温ヲ以テ及テ肺ト大腸ト氣ヲ固フスルハ何ゾヤ蓋シ大腸ノ氣ガ後ヨリ洩ザラニテ欲スレハ則チ肺旺ニ木平テ氣ガ膀胱ニ走ツテ小便ヲ自ラ利セシム正ニ此ノ通ヲ為ハ則チ彼ノ塞ハ淡滲スノ藥ヲ用ヒズノ小便自ラ利スルノ妙法ナリ醫理ヲ知ラザル人ハ此方仲景ノ方ニ非ズト疑フ傷寒論金匱要畧ノ二書草々トシテ看過シ妄リニ議スベカフズ字々法ニ非ハ無ク毎ク妙ニ非

無し尊信スルノ深ニ非ニハ豈ニ能ク其妙處ヲ窺得シヤ

附方

千金翼小承氣湯 治大便不通

テ大便通ゼザレハ胃エツ滯セシ數シ言ハ語ヲ方見上○小承氣湯ヲ用ヒ輕ク邪ヲ壅逆ノ上行シシ利ノ中ヲ和シ熱ヲ滌カシ結ヲ開ク

ニ宜シ○千金翼ハ孫真人作ナリ近比和刻成ル

外臺黃芩湯 治

木火盛ニノ中焦ニ橫コ邪ノ氣ヲ上逆スレハ則チチ乾嘔

黃芩 三兩

人參 三兩

乾薑 三兩

桂枝 一兩

大棗 十二枚

半夏 半升

水一斗下ニ奔ハ則チ

下利上

外臺ハ前ニ出ツ

○廿九

右六味以水七升煮取三升分温三服
大棗ヲ用ヒ脾胃ノ氣ヲ和養シ半夏干姜痰ヲ滌シ中ヲ温テ嘔逆ヲ止シ黄芩ヲ以テ專ラ風化ノ熱ヲ清フレ桂枝ハ營衛ヲ宣驅ノ風ヲ

瘡癰腸癰浸淫病脉證并治第十八

論一首 脉證三條 方五首

諸浮數脉外感ノ風熱ガ表ニ在ルニ似タリ然モ風邪ハ應當發熱而反灑

浙惡寒且若有痛處乃チ營氣ガ從ズ邪氣ガ肉裡ニ逆シ氣血ヲ凝滯ス故ニ

當發其癰 ○師曰前ニ諸癰腫陰陽ヲ知テ能ク治ラ定ヘレ膿アルヲ陽

陰證トス乃チ欲知有膿無膿以手掩腫上熱證トレ膿ナキヲ陰證トス乃チ

者邪熱ガ氣ヲ壅テ成ス所ニ陽屬シ火熱ガ血肉ヲ腐化故ニ為有膿不熱者

陽氣衰微ニ陰寒ガ氣血ヲ凝滯レ肌肉瘳為無膿 ○硬不仁ス陰屬レ血肉ヲ腐潰ス則チ

腸癰之為病風寒感ノ軀殼ノ裏ニ入り大小腸ノ間ニ氣血ヲ壅逆營衛利セサレ則チ腸癰ヲ成ス若シ

婦人產ラ經テ瘀血盡サルモ亦成之ヲ然モ其身甲錯前ニ

肌膚猶ヲ風乾魚鱗ノ狀ノ如キナリ癰ガ腹皮急腸癰ハ軀ヲ腸ニ成テ内氣壅逆ハ則チ腸脹滿ノ

故按之濡如腫狀腹中素ヨリ血痕癥瘕ニナク内疾ノ變ニ由ラサルガ故ニ腹無積

聚積聚ノ義ハ五十五難ニ詳ニ身無熱但シ脉數則チ内

此為腸內有癰膿若シ此ノ證ヲ見セハ腹中必ス痛テ堪ズ即チ此腸癰ノ徵ナリ意

以附子敗醬散主之

薏苡附子敗醬散方

薏苡仁 十分 附子 二分 敗醬 五分

右三味杵為末取方寸匕以水二升煎減

半頓服小便當下薏苡以ヲ用ヒ腸中濕ヲ清ク燥ノ壅腫ヲ破リ敗醬ハ善ク瘀血ノ膿ト

為ラ排テ結熱ノ標ヲ利ス外感ニ邪スノ膿ヲ成スニ因ル故ニ附子陽ヲ行シ寒ヲ散シ其壅滯ノ本ヲ破ルナリ○敗醬即チ苦

菜ナリト又藤田某曰敗醬ハ和ラミナヘシヲ當トスト今從之又丹波康賴和名抄曰味苦醜平微寒无毒和ラフツチ又女久佐ハ

月採根○腸癰者必ス風寒カ内ニ入テ氣血ヲ壅逆ノ其形ヲ成ス然モ腸ハ小腹ニ居ス故ニ

少腹腫痞少腸ハ乃チ多血少ク氣前陰ニ通ス故ニ按之内ヲ癰ニ着故ニ即痛

氣ガ小便ヲ攻レハ則チ如淋但レ内癰ハ血ノ結ニ成テ膀胱ノ氣分ヲ犯サス故ニ小便自調然モ心ト

小腸ト表裏タリ小腸ニ癰アリテ心火逆鬱ノ散セザレハ則テ時時發熱自汗出熱ガ内ニ收ム故ニ

復惡寒若シ寒邪ガ未ダ隨ス其脉遲緊者膿未

成可下之竊ニ謂フ大黃牡丹湯主之ヲノ七字ヲ此ノ處ニ移見ルベシ此例身ヲ傷寒論太陽篇小青龍湯ノ條

ニモアリ此レ脉ノ遲緊ナルハミダ邪ガ隨ス元氣モ能キ故ニ早ク下スベシ當有血瘀血ガ下ルベシ若シ脉洪

數者邪熱ガ已隨ヒ血ガ變化シ膿已成不可下也下ノ再ヒ腸胃ノ氣ヲ傷ムベカラズ

大黃牡丹湯主之此レ七字ヲ膿未ダ成可下之ヲノ下ニ移見ルベシ○予竊ニ謂フ下ニ出ラタル排膿散湯

ノニ方ニ證ナレ膿已成不可下也ノ證ニハ排膿散排膿湯ナラシムハ令積ニテ成ルハ薏苡附子敗醬湯ニ脉數トアリ爰ニ脉洪數トアリ令

積ニテモ内ノ結熱ニテモ數脉ハ内ニ癰膿アル故ヘナリ○或曰膿未成不可下也膿已成可下ノ說モアリ參考スベシ

大黃牡丹湯方

大黃 四兩 牡丹 二兩 桃仁 五十枚 ○枚ノ字一本 個ニ作ル

瓜子 半升 ○即チ冬々瓜子ナリ 王昂曰凡ソ藥 中ニ所用ル瓜子皆冬々瓜子也

芒硝 三合

右五味以水六升煮取一升去滓內芒硝 再煎沸頓服之有膿當下如無膿當下血

牡丹皮 桃仁ノ辛涼ヲ以テ血ヲ破リ瘀ヲ行シ大黃芒硝ニ 合メ其ノ血分ノ結ヲ破ル冬々瓜子熱ヲ散メ氣ヲ下ス若シ膿アリハ 大便ヨリ去ラレム無膿則チ下血 ○腸癰臍ヲ遊ツテ瘡ヲ生レ或ハ 臍ヨリ膿出ルハ必ス死ス大便ヨリ膿血ヲ出スモ古人死證トスレ正是

問曰寸口脉 浮微而澁法 治スルモ 問アリ

當亡血 澁一本作瀼澁ト瀼ト同シ浮ヲ血虚トシ微ヲ氣 弱トス血虚シ氣弱ハ脉則チ浮微ナリ然モハ血陰虧

氣ガ獨リ行ラヌ 故ニ脉瀼ナリ 若汗出 蓋レ汗出レハ液傷レ氣 滯テ脉モ亦瀼ヲ見ス 設不汗出

者 若シ汗出ラズン 云何答曰 是レ金瘡ニテ血ヲ 去ル故ニ脉瀼ナリ 若身有

瘡 金瘡 被刀斧所傷亡血故也 此ハ血ト汗家ト 金瘡ト皆瀼

脉アリ當ニ證ヲ以テ 別ツベキノ辨ナリ ○病金瘡 此レ金刃ニテ皮肉筋骨ヲ 傷ル故ニ金瘡トス乃チ不

内外因ニ屬ス金刃ニ傷ラルニ因テ血去リ氣滯テ血ヲ統テ皮 肉脉絡ニ灌テ能ス故ニ脉瀼ス然モ氣血行テ得ハ則チ瘡口

合ニヤスレ 故ニ 王不畱行散主之

王不畱行散方

王不畱行 八月廿二 朔藿細葉 七月七日

桑東南根 白皮各十分 三月三日 採 黃芩 二分

川椒

三分除目及閉口者汗ス○一本ニ去汗ニ作ル

甘草

十分

厚朴

乾薑

芍藥

各二分

右九味桑根皮以上三味

王不留行ト蒴藋ト桑白皮ト燒

灰存性

性ヲ存ス

勿令灰過

各別杵篩合

治之爲散服方寸匕

小瘡卽粉之大瘡

但服之產後亦可服如風寒桑東根勿取

之前三物皆陰乾百日

王不留行ノ苦平ヲ用ヒ血

ヲ止テ痛ヲ逐フ蒴藋折傷ヲ主リ肋骨ヲ續血脈ヲ通ス但

金瘡ハ生氣ヲ取ルヲ本トスベシ故ニ肺氣ヲ利スレハ卽チ諸氣長ノ

血自ラ生ス血生レシレハ則チ脈絡ニ灌續テ瘡口能ク斂易

改ニ桑東南根ヲ用ヒ乃チ生氣ヲ得テ氣血ヲ生ス燒キ灰ニシ性

ヲ存シ黑色ヲ取テ能ク血ヲ止ム甘草脾胃ヲ補テ營衛ヲ和シ

椒干姜氣血ヲ温養ノ煖ヲ得ハ則チ諸經ノ筋脈ヲ行ス厚朴

ヲ以テ内鬱ノ氣ヲ疏導黃芩芍藥以テ氣滯ノ熱ヲ清シ温

補宜行ス故ニ產後ニモ亦用ユ若シ風寒ハ乃チ經絡病ヲ爲ス發

散ヲ以テ主トスシ桑根ハ下降ス故ニ勿ク取之ヲト○本草ニ桑白皮

風寒作嘔者慎用ト○王不留行ハ本草ニ花如鈴鐸實如燈籠

手殼五稜取苗子蒸漿水浸用味甘苦平性行而不住○蒴藋

ハ丹家名抄曰味酸温无毒和名曾久津春夏採葉秋冬採

莖根野村中多有之唯陸英一物也ト○川椒ハ本草ニ秦立產名秦

椒俗名花椒實稍實大蜀產肉厚皮皺子光黑者爲川椒閉

口者殺入微炒去汗搗去裡面黃殼

○排膿散方

排膿散湯ノニ方ハ大黃牡丹湯ノ

枳實

十六枚

芍藥

六分

桔梗

一分

右三味杵爲散取雞子黃一枚以藥散與

雞黃相等揉和令相得飲白飲和服之日

一服一本ニ三服ニ作ル腸癰ハ必ス邪ガ氣血ヲ壅ニ起テ成ル氣ヲ壅ハ熱ヲ為シ血肉ヲ蒸腐ノ膿ヲ成ス故ニ雞子

黃芍藥ヲ以テモウラ陰血ノ正ク補ヒ桔梗ハ肺氣ヲ開提テ下

行シ枳實以テ腸胃ヲ宣氣ヲ利セムレハ則チ膿成リ毒化ス故

ニ排膿散ト為ナリ○桔梗別錄ニ血ヲ養ヒ膿ヲ排枳實ハ大明云敗血ヲ散ス芍藥能ク血ヲ治ス雞子黃モ亦膿ヲ去ル肌ヲ起スナリ

排膿湯方
甘草 各二兩
桔梗 一本作三兩
生薑 一兩
大棗 枚

右四味以水二升煮取一升温服五合日

再服手足ノ陽明ニ走リ諸氣ヲ開提テ宣行シ毒ヲ解ス生

姜大棗ヲ以テ營衛ヲ通調ノ血ノ膿ト為ルヲ排蓋シ此兩方

○浸淫瘡 入門云浸淫瘡初生寸甚小先瘡後痛汁

ロヨリ發出シ四肢ニ流散者ハ輕ク四從口流向四肢

者可治此黃連一味ヲ粉ト為ノ外ニ麩從四肢流

來入口者不可治此熱毒先ツ經絡ニ走リ四肢ニ

○浸淫瘡黃連粉主之方未

○黃連一味方未

跌蹶手指臂腫轉筋陰狐疝跣蟲

病脉證治第十九

論一首 脉證一條 方四首

跌蹶

師曰病跌蹶

跌一本ニ作ル非ナリ字書ニ跌ハ音字大坐ナリ跌ハ音經ニテ足失據ナリ蹶ハ音

厥跌ナリ僵ナリ此跌蹶ヲ病ハ經絡ヲ辨メ治スベシ人身足ノ陽明ノ脉ハ腿ノ外側ノ前ニ絡フ大陽ノ脉ハ腿ノ外側ノ後ニ絡フ少陽ノ脉ハ腿ノ外側ノ中ニ絡フナリ夫レ跌ノ蹶ヲ致ス者ハ足行不能然レ凡行ク一能ハサルモ其ノ前後ヲ辨メ治スベシ故ニ

其人但能前

能前ハ陽一不能却ルナリ此大陽ノ經

刺腠入

一ニ一寸一腠ナリ本陽明ニ屬ス乃チ大陽

經絡ノ過ル所ノ處ニテ陽明ノ經氣ト蒸筋ノ間ニ會合ス故ニ之ニ針ヲ刺メ大陽陽明ノ氣血和メ滯ナカラ使レハ則チ前後常ノ如シ

此大陽經傷也

針法ヲ示スナリ

病人常以手指臂腫動

手ノ五指ハ乃チ肺大腸心胞三焦心ト小腸トニ

屬ス臂ハ統テ手ノ六經ニ屬ス但シ臂ノ外ハ三陽ニ屬シ臂ノ内ハ三陰ニ屬ス陽經ハ指ヨリ頭ニ走り陰經ハ胸ヨリ手ニ走ル若シ手ノ

手指臂腫

搦腫動ハソレクノ經ニ依テ治スベシ臂腫テ動クハ手足ノ大陰陽明ノ經ニ素ベレ乃チ風痰ヲ被リ搏擊テ致ス所ナリ蓋シ足ノ大陰脾

ハ濕ヲ主テ痰ヲ生スルノ源タリ風邪内ニ襲此人身體

潤者

潤ハ肌肉蠕動スルナリ肺ハ痰ヲ貯ノ器タリ脾ノ風痰

手ノ搦臂腫邪正搏擊

氣搖ハ則チ動ズルナリ

菖蘆甘草湯主之

方ハ味見ト雖凡詳ニスルニ甘草中ヲ和シ菖蘆善ク風痰ヲ吐レ痰ヲ去ラシムレハ則チ經氣疏通ノ腫動自ラ愈ユ此痰飲經隧ニ

走ルノ味補ヲ補ナリ後世ニニ水湯或ハ清濕化痰湯ノ症此ニ類スルアリ知ラスニハ有ベカラス○菖蘆ハ本州毒州部ニ出和名志

乃久比岐ニ蝦根ト云是ナリ俗多ク万年青ヲ和ノ菖蘆トス非ナリ万年青ハ於毛止ナリ和漢三才圖會ニ能ク辨ス

轉筋之為病

風邪ガ脾胃ニ乘メ風濕相搏ハ表裏皆病若レ風濕ガ經表ニ盛ナレハ則チ

其人臂脚直

強直ナリ脉上下行テ相引ク言フ微弦謂ニ

轉筋

金匱要略國字解

卷之四

廿五

諸暴強直皆風ニ屬スルノ義ナリ此ハ雞屎ノ症ニ非ズ或ハ中氣虛ノ木邪ガ内ニ逆シ直ニ臟ヲ攻テ則チ

轉筋

入腹者雞屎白散主之

雞屎白散方

雞屎白

右一味為散取方寸匕以水六合和温服

別錄云雞屎白ハ轉筋ヲ治ス雄雞屎乃チ白アリ臘月ニ收之

陰狐疝氣

陰狐疝氣者

此外腎氣九ノ病ナリ乃チ陰陽ノ氣ガ偏ニ虛ノ邪ヲ受ク故ニ

偏有小

大時時上下

即チ兩ノ跨ニ縮入テ狐ノ行ク狀ノ如シ陰ニ出濕ノ注グ所ノ處ニ感シ受テ病ヲ為ナリ丹溪纂要ニ曰ク狐疝ト訶ハ其狀ヲ瓦ノ如シ卧セバ則チ小腹ニ入り行キ立テハ則チ小腹ヨリ

出テ囊中ニ入ル狐ハ則チ晝ハ穴ヲ出テ溺シ夜ハ則チ穴ニ入テ通セズ此ノ疝ト狐ト相類スト

蜘蛛散主之

蜘蛛散方

蜘蛛 十四枚 熬焦

桂枝 半兩

右二味為散取八分一匕飲和服日再服

蜜丸亦可

蜘蛛ノ少腹絲ヲ抽者ヲ用ヒ能ク肝ニ引キ入レ經ニ通シ毒ヲ攻テ風濕ニ勝ツ桂枝ハ陽ヲ行シ

氣ヲ化シ以テ肝腎ノ邪ヲ伐チ陽氣ヲ盛シテ陰狐自ラ退シ

○問曰病腹痛有蟲其脉何以別之師曰

腹中痛

風寒ニ感スルニ因ルモノ多シ若シ寒邪ガ裏ニ入レバ脉沈緊ナリ風邪ガ腹ニ在テ衛氣内ニ結ハ脉

沈弦ナリ

其脉當沈若弦

反洪大

即チ肌表發熱スベク反テ腹

蜘蛛

痛_ム是_レ脉_ト證_ト合_ズ風寒_ニ故_ニ有_レ蚘蟲_ヲ若_シ四時腹痛ノ

非_{ザル}ナリ蚘蟲ノ致_ス所_{ナリ}○蚘蟲之_レ爲_ル病_ニ脉_ト反_テ共_ニ

大_ト乃_チ胃_中ノ熱_濕蒸_化ノ蟲_ト爲_リ若_シ風寒_痛ヲ致_スハ即_チ連_綿ト_ノ絶_ズノ涎_ヲ吐_セザル_{ベシ}此_レ蚘蟲_ガ上_脱行_クニ因_ツラ氣_道ヲ壅_塞テ_通

令_ム人_ヲ吐_レ涎_ヲ心痛_ニ發_作有_リ時_ニ或_ハ下_脱ハ

腹痛_ム下_知ル_{ベシ}然_モ風寒_ヲ攻_擊ノ猛_烈ノ峻_峻ニ_ノ毒藥_ヲ爲_スハ蟲_ヲ殺_スノ品_ニ非_ズ故_ニ痛_止ス_仍テ

止_ム甘草粉蜜湯_ヲ主_ル之_ヲ

甘草粉蜜湯方

甘草 二兩 粉 一兩 蜜 四兩

右_ニ三味_ヲ以_テ水_ニ三升_ヲ先_チ煮_ツ甘草_ヲ取_リ一升_ヲ去_リ滓_ヲ

内_レ粉蜜攪_レ令_レ和_セ煎_シ如_ク薄_ク粥_ニ温_ク服_ス一_升差_即

止_ム白_粉ノ蟲_ヲ殺_スラ用_ヒ甘_草ヲ蜜_ニ合_ノ中_ヲ安_シ甘_草蜜_ノ味_甜蚘_ノ口_ヲ誘_テ開_テ其_ヲノ藥_ヲ得_セシ_ノ蟲_ノ頭_ヲ下_ニ向_ハ則_チ痛

自_ラ止_ム○本_草曰_ク鉛_粉一_名胡_粉亦_云白_粉氣_味辛_寒無_毒主_治伏_尸毒_螫殺_ス二_蟲ト_李時_珍曰_ク胡_粉即_チ鉛_之變_シ黑_ク爲_ル白_者ナ_リ又_有豆_粉蛤_粉雜_シ之_只入_テ氣_分不_能入_血分_也按_ス今_ノ藥_店ニ_出ス_尋常_ノ胡_粉ヲ_以テ_粉蜜_湯ヲ_調合_シ無_功ヲ_藥ニ_寃ス_宜精_詳ナ_リ

傷_ル蚘_厥者_當吐_ス蚘_ヲ令_ム病_者靜_シ而_復時_煩此

爲_レ臟_寒蚘_上入_レ膈_ニ故_ニ須_ク更_ニ復_シ止_ム得_テ食_テ而_嘔

又_煩者_蚘聞_テ食_臭出_テ其_人常_ニ作_レ當_ニ自_ラ吐_ス蚘_ヲ

蚘_厥者_烏梅_丸主_ル之_ヲ

烏梅丸方

烏梅

三百枚
一枚一本作箇

細辛

六兩

乾薑

十兩

黃連

一斤

當歸

四兩

附子

六兩
炮ス

川椒

四兩
去汗

桂枝

六兩

人參

六兩

黃蘗

六兩

右十味異搗篩合治之以苦酒漬烏梅一

宿去核蒸之五升米下飯熟擣成泥和藥

令相得內臼中與蜜杵二千下丸如梧子

大先食飲服十九日

一本無日字

二服稍加至二

十丸禁生冷滑臭等食

此條已傷寒論國字解ニ註ス

金匱要畧國字解卷之四終

村田嘉言画

女四書藝文圖會

上紙彩色入上仕左

全初四冊

一曾大家女誠圖會

一曾大家女論語圖會

一鄭氏女孝經圖會

此書の右にありて五書の

一女子の教訓ありて五書の

女子の教訓ありて五書の

中村揚齋先生著

姫鏡

全部

十六冊

浪華書林

宋榮堂藏版

此書の中村老人の教訓より仁義礼智
信の五事の道をつとむる女子の教訓と
成るをこゝろに一名通鑑といふ女子
漢に手ひくかなる虎ありてのまじり

