



金匱要略國字解

後編
卷五
下

中武 9
76
6 止



武門
76
8

民家萬

寶日用

重法書

大福節用萬寶藏

十三門部分引西點附

年中用文章

此節用集ハ天地の間のちゆ文字を集め字畫もつひを引傍に真字を附せ凡初音とまじりて或手形證文類年中用文章を頭書に商賣往來諸職往來單歌字儘く七つろは天神經和漢名家の傳來異國人物も三世相塵劫紀及石家日用取らるる重法を増益し卷尾に至るまで繪抄といふ幼學兒女の見やゆいひも其このひ所の能五輪五帝の女述し此書ふり小圖に燈火を得るごとく實博學多才の名を得り一家万寶隨一の書をかり此中御覽之に俗に曰く節用集とも成りたる云

大阪心齋橋通安堂寺町

秋田屋 太右衛門

板元

金匱要略國字解卷之五

後編下

醫官

平安

古野了作編輯

門人浪華鈴木定寛校正

卷下

此本書ノ卷數ナリ

婦人妊娠病脉證并治第三十

證三條

方八首

妊娠

師曰 前ニ婦人得平脉六脉左右ノ皆和スルヲ平脉ヲ得

平脉ノ中ニ畧陰脉異ツラ見ス陰脉ハ即チ関尺 肝腎ノ脉ナリ是脉微弦濡滑ナルベキニ反テ 陰脉小弱 且病證ナキハ則チ厥陰少陽胎ヲ廢氣血不足スルノ故ヲ知ル經ニ 云土ハ木ヲ得テ達スト此廢胎テ厥陰肝木カ不足スル故ニ土ヲ疏



金匱要略國字解

卷之五

通スルニ暇アラズ過チ胃ノ氣
自ラ壅氣化ノ火ト為ハ則チ
其人渴不能食 表症ナシ
故ニ 無

寒熱 六十日ニ在ツテ病ナシニ
是ノ足ノ厥陰少陽應胎ノ
致ス所ナリ此レヲ
名

妊娠 然モ已ニ妊娠ナレハ補瀉ノ
法ヲ用テ益ナレ惟
挂枝湯主之 下方見

中ニ挂枝湯ハ營衛ヲ調和シ以テ肝膽ノ源ヲ濟但シ此湯ハ
表ニ用ユレハ營衛ヲ和ノ表邪ヲ去リ裏ニ用ユレハ營衛ヲ和ノ氣

血ヲ生シ臟腑 於テ法六十日 即チ
血海ヲ充溢ス 於テ法六十日 即チ
當有此證 渴ノ食

指ス 設有醫治逆者 醫此妊娠ヲ識ス反テ病トノ治
却一月加吐下者 吐下ヲ止ラ急
則絶之 妊娠ヲ

却一月加吐下者 吐下ヲ止ラ急
則絶之 妊娠ヲ

○挂ハ隋去胎ト云ヲ以テ妊娠ノ禁藥トスレモ故アレハ損ナレ子モ
亦損ナキノ意ニテ營弱ノ衛強キヲ調和スルノ意ナリ凡ソ藥ヲ用ユ

ルニハ權ヲ知レベレ挂ニ膠スベカラズ本草綱目發明ニ
好古能ク 仲景師ノ挂枝ヲ用ユバノ意ヲ辨ス参考スレ

人宿有癥病 癥音征此婦人經産ノ後血室空虛ニ
餘血ミタ滯カラズノ風寒ヲ受ケ或ハ飲食生

冷ニ因テ凝血塊ヲ成スラ則チ癥瘕トス瘕ハカメバト云フ是レナリ
若シ其血塊ガ偏滯ニ結テ正レク子ノ宮ニ居サレハ仍ラ能ク經ヲ行シ

孕ヲ受ツ此ヲ宿ヨリ 經斷 胎ヲ得
癥病アツテ謂フ此レ 經斷 胎ヲ得

スル 而得漏下不止 經水ニ似テ經水ニ非ラ見ハス胎ト
時ニ 而得漏下不止 經水ニ似テ經水ニ非ラ見ハス胎ト

妊娠ハ臍ニ當テ臍腹ノ地ニ居ルベレ却テ 胎動 反テ動ク
癥塊ガ臍腹ノ地ニ移ラントス故ニ 胎動 反テ動ク

上者 癥ハ偏有ニ居ス故ニ能ク胎ヲ受ケタリ但シ經血ヲ
害ノ胞胎ヲ廢ス半途ニ出テ漏下止サル 此

爲癥瘕害 瘕ハ字書ニ久病 妊娠 動スル時ハ六月ノ間ニ
爲癥瘕害 瘕ハ字書ニ久病 妊娠 動スル時ハ六月ノ間ニ

就テ動クモ亦 癥瘕ガ善テ其血ヲ去ルニ因テ胎乾テ女カラズ
魚ノ無キゴトクナレバ跳躍テ定不然モ胎カ胚カ其確實ヲ定ル

能ズ故ニ其經水マダ斷サル前ノ三月ヲ推ノ驗トス若シ經水マダ
斷サル前ノ三月モ月々ニ節ニ準ノ前後參差ナキハ乃チ氣血ガ

和平ナレバ孕ヲ受ケベシ斯レニ
タルハ胎ナリ血ニ非ズ故ニ謂フ
六月動者前二三月經

水利時胎也 若レ前ノ三月モ月々ニ經水遲發アリテ節
ニ準セス淋漓閉塞スルハ乃チ氣血乖離ナレ

ハ孕ヲ受ケズ今經斷下血者後斷三月不血也
胎ニハ非ズ血ナリ故ニ謂フ

不血ニ字ラ一本ニ血ノ一字ニ作ル從フベシ血ハ説文ニ凝血ナリ
即チ敗惡凝聚ノ血ヲ謂フナリ然モ前ノ三月經水利シ既ニ是

胎ヲ爲一何ニ因テ所以血不止者 蓋シ其癥不去
カ漏血止サルヤ

故也 其癥去ラザルニ因テ廢胎ノ血ヲ 當下其癥
阻礙テ胞ニ入ズノ漏下ル故ニ

ヲ下ノ胎ガ始テ安キ 桂枝茯苓丸王レ之
ヲ得ハ則チ血自止ナリ

桂枝茯苓丸方

桂枝 茯苓 牡丹皮 去心ヲ

桃仁 去皮尖熱 芍藥 各等分

右五味末之煉蜜和丸如兔屎大每日食

前服一九不知加至三九 桂枝ヲ以テ陽ヲ行シ
芍藥陰ヲ收テ營衛

ヲ調和ス然レ癥病ノ始テ成ル必ス風寒痰濕ニ因テ氣血凝
結テ塊ヲ為故ニ茯苓ヲ以テ濕ヲ滲シ牡丹皮桃仁血ヲ破リ癥

ヲ行ノ癥ヲ消ス但牡丹皮桃仁ハ胎氣ノ為ニ忌ム所ナルニ此レ過サルハ
經ニ謂ル有故無殞亦無殞也ノ法ナリ胎ガ腹ニ在ニ因テ其癥

ヲ去ト欲セハ則チ一九ヲ服ノ漸ク消 ○婦人懷娠六七
磨セハ胎ヲ動スヲ致サルナリ

月 六七月ハ肺胃胎ヲ廢ノ際ニ當テ肺胃ノ氣虛ノ胎ヲ廢ニ
暇アズ其胞門ノ氣モ亦虛セシメ寒風襲入テ肺胃ニ相連

故 脈弦 邪ガ表陽ニ發熱 邪ガ脾胃 其胎愈脹 邪
ニ鬱スレハ

深ク胞宮ニ入レハ則チ 腹痛惡寒者 少腹如扇 扇團
冷氣傷シ

ニテ弱コトク 所以然者 子臟陽虛ノ斂ス因テ玉門閉ス
寒風ガ胞宮ニ襲入ルニ因テ所謂

子臟開故也當以附子湯温其臟 方未見
○附子ヲ用

胞宮ノ陽ヲ温ノ起メ煖ヲ得ハ則チ子臟閉テ風冷自ラ散ス方ハ
慰スト雖凡但附子ヲ湯ト為シ詳ナリ必ス是レ寒ヲ驅陽ヲ補

ラ主トスナリ或ハ曰傷寒論
ノ附子湯ヲ用テ可ナリト ○師曰婦人有漏下者

漏下ハ即チ崩漏ナリ崩ハ木火ガ脾ニ乘ノ 有半產後因

致スアリ胞宮ニ風寒ヲ受テ致スアリ或ハ 續下血都不絶者

或ハ脾胃ノ氣虛ノ致シ或ハ胞宮 妊娠下血者 此血ヲ下スルハ則チツナレハ
其因ハ各異ナリ 假令

下血腹痛ス然モ其因ハ異ト雖凡治法ハ 妊娠 腹中痛為胞阻

氣ヲ行シ血ヲ止メ陰ヲ和スルニ同シ故ニ 膠艾湯主之

假令ノ下ノ妊娠ノニ字ハ衍文ト見ル説アレハ 今俗ノ臆見ヲ爲セカラス此書ハ取テ文章家ニ與サル故ニ古文法ノ
例ハ此ニ 芎歸膠艾湯方 一方加乾薑一兩 胡氏治婦人
胞動無乾薑○指ス胡氏ハ胡洽カ

芎藭 二兩 阿膠 二兩 甘草 二兩

艾葉 三兩 當歸 三兩 芍藥 四兩

乾地黄 六兩

右七味以水五升清酒三升 一本作五升 合者取

三升去滓內膠令消盡温服一升日三服

不差更作 阿膠艾葉ヲ用テ血ヲ養ヒ血ヲ調ヘ血ヲ止メ氣血ヲノ經脈
ニ歸セシムレハ則チ漏下止テ痛自愈ニ縱風寒内ニ襲

○婦人懷妊 脾胃ノ氣滯テ胞宮
寒ヲ驅リ散ラス一具ニ其中ニ在リ

アリ氏膠艾ニテ經ヲ温レハ則チ風

腹中疝痛 コウツウスハ 疝絞絞共三同シ急ナリ疝痛ハ綿紗トシ痛テ止ス 當歸芍藥散主之

當歸芍藥散方

當歸 三兩 芍藥 一斤 茯苓 四兩

白朮 四兩 澤瀉 半斤 芎藭 半斤 一作三兩

右六味杵為散取方寸匕酒和日三服藥

芎藭當歸ヲ以テ胞宮ノ氣血ヲ宣和シ兼テ土中ノ木ヲ疏シ白朮脾ヲ健ニシ營衛ヲ生化シ以テ諸臟ノ虛ヲ濟茯苓澤瀉ハ濕ヲ導滲木ト土ト相和シムレハ胞宮ノ氣血流利スレハ則チ痛止テ胎自安シ ○妊娠 脾胃ハ生化臟六腑皆其濟ヲ受テ胞胎モ脾ニ繫賴之ニ以テ總陰トス此脾但陰胎ノ能アツテ水ヲ制スルノ暇ナシ水泛テ無シト雖凡乃チ寒濁ノ氣ガ木ニ乘シ勢及テ土ニ衝ハ脾胃ノ氣逆ノ津液化ノ痰飲ト為テ上リ溢故ニ 嘔吐不止 乾薑

人參半夏丸主之

乾薑 人參 半夏 方

乾薑 一兩 人參 二兩 半夏 一兩 一本作二兩

右三味末之以生薑汁糊飯ノ糊ヲ生薑ノ絞汁ニ

梧子大 出前ニ 飲服十丸日三服 元ヲ補養シ乾姜

以テ胃中ノ氣ヲ煖メ脾胃ヲメ温テ健運常ノ如クオラシムレハ則チ水陰ガ敢テ上逆セス半夏ヲ以テ痰ヲ瀉シ逆ヲ下メ嘔吐ヲ止ム蓋レ半夏乾姜ハ乃チ胎氣ノ忌ム所ナレ凡是レ病アレハ則チ當之ニ況ヤ丸ヲ用ユルハ其緩メ胎ヲ動カスヲ致サザルニ取ル

○妊娠 小便難 飲食如

下焦ニ邪ヲ受テ

邪ガ上焦ヨリ傳

來ルニ非ス故ニ

飲

故乃邪ガ陰戸ヨリ入り胞宮ニ襲氣ガ膀胱ニ連テ鬱鬱ノ化ヒズ故ニ小便難シ 當歸貝母苦

參丸主之ヲ

當歸貝母苦參丸方男子加滑石半兩

當歸 貝母 苦參 各四兩

右三味末之煉蜜丸如小豆大飲服三九

加至十九苦參味苦氣寒ヲ以テ濕ヲ燥シ風ヲ驅ル本草謂其陰入テ能ク大風ヲ驅リ結氣ヲ開キ伏熱

治ス蓋シ肺ト膀胱トハ子母タリ故ニ貝母ヲ以テ肺氣ヲ利スレハ即チ是レ膀胱ノ氣ヲ利スルナリ膀胱ノ氣ガ利スレハ胞宮ノ氣モ亦利ス氣利スレハ則チ邪除テ小便難カラズ

○妊娠 五六月ハ胎ガ脾胃ノ氣ヲ壅テ運ス七八月ハ手ノ大陰ノ氣逆ス九十月ハ膀胱ニ焦ノ氣鬱ス皆水ヲ致

スナリ此ニ焦ノ氣ガ鬱スルニ因テ 有水氣身重小便

不利三焦ノ氣ガ内ニ鬱ノ外ニ達 麗浙惡寒胎ガ下ニ居

レ木火ノ氣ヲ通メ身軀ヲ起シ動セハ則チ起即頭眩此證

火氣ヲ擾動ノ上ニ搖ハ則チ 葵子茯苓

苓散主之ヲ

葵子茯苓散方

葵子 茯苓 各一斤

右二味杵為散飲服方寸匕日三服小便

利則愈葵子ヲ以テ諸竅ヲ滑利シ三焦ノ氣ヲ通ヒシメ茯苓水ヲ滲シ下行メ膀胱ノ鬱ヲ宣下焦ヲ

ノ通ヒシムルハ則チ上焦氣轉シ小便利ノ腫自ラ退ク但シ葵子胎ヲ滑ニス而ニ忌ガルハ乃チ病ニアレハ則チ病ハ當之ニ功水ヲ利シ壅ヲ宣ニ在テ胎ヲ滑ニセザルナリ○弘景曰以テ秋種葵覆養經冬至春作子者謂冬葵

○婦人妊娠 脾胃ハ乃チ營衛ノ源タリ胎必ス賴之ヲ以テ總廢ヲ為肝ハ血ヲ藏スノ室タリ衛任通

賴テ以テ滋故ニ妊娠全ク肝脾ノ氣和ヲ欲スハ則チ子宮廢ヲ受テ胎動スルノ憂ナシ 宜常服當歸

散主之

當歸散方

當歸 黃芩 芍藥 芎藭 各一斤

白朮 半斤

右五味杵為散酒服方寸匕日再服妊娠

常服即易產胎無疾苦產後百病悉主之

芎藭窮當歸專ラ肝血ヲ養ヒ能ク肝氣ヲ疏ノ壅ス白朮脾ヲ補ヒ濕ヲ燥シ芍藥陰ヲ收ノ土ヲ賊ノ木ヲ平ケ黃芩ヲ以テ能ク木火ヲ清ラシ胎氣ヲ涼メ氣壅血滯一ラ致サレハ則チ胎無疾苦ノ産易然モ氣血平調ノ方ナル故ニ常ニ服スルニ宜シク又産後ノ百病悉主之

○妊娠養胎ヲ養鎮攝ノ主タリ故ニ白朮ヲ

白朮散方 見外臺 ○此方八千金方ニモ見ユ

白朮 芎藭 牡蠣 各二分

蜀椒 三分去汗 ○蜀椒前ニ解ス

右四味杵為散酒服一錢匕日三服一本有夜

一一本有但苦腹痛レ加芍藥ヲ以テ土中ノ心下毒ヲ

痛乃チ氣ガ心ニ滯倍加芎藭ヲ以テ肝氣心煩吐痛ハ

不能食飲獨リ肝氣ノミ抑鬱スルニ非ス且密加細

辛一兩半夏大者二十枚服之後更以醋

漿水ヲ前ニ服之若嘔レ以醋漿水服細辛ヲ加テ寒

復不解者客寒ニ非ス乃チ心痞不已後渴者大

小麥汁服之小麥汁ヲ用テ心液ヲ已後渴者大

麥粥服之大麥ヲ用ヒ以テ病雖愈服之大麥粥ヲ

勿置此藥性平和ナル故ニ胎ヲ養フニ常ニ服ス此血藥ヲ

上逆ス故ニ但其氣ヲ調フ
レハ則血自和スナリ
○婦人妊娠七月ハ手大陰肺氣

氣アツテ水ヲ生スルノ暇ナシ水虧心包絡傷胎即即陰胎ヲ

懷身腹滿肺金ガ傷ヲ受ルニ因ツテ氣不得小便傷ノ謂ナリ

從腰已下重乃チ肺氣壅如有水氣逆ナリ水ノ

狀蓋シ懷身七月大陰當養心氣ノ制ヲ受テ胎

不養養ハサレ此心氣實心氣ノ實ヲ當刺瀉營

宮即チ心包絡ノ穴ナリ中指ト無名指及關元任脈ノ穴

三寸ニアリ刺テ腎ト膀胱トノ氣ヲ宣通膀胱ノ氣ヲ通セシ小便

微利則愈見玉逐脈經云婦人懷胎一月ノ時足ノ

手ノ心主ノ脉養フ四月ハ手ノ少陽ノ脉養フ五月ハ足ノ大陰ノ脉養フ六月ハ足ノ陽明ノ脉養フ七月ハ手ノ大陰ノ脉養フ八月ハ手ノ陽明ノ脉養フ九月ハ足ノ少陰ノ脉養フ十月ハ足ノ大陽ノ脉養フ

婦人產後病脉證治第二十一

論一首 證六條 方七首

產後

問曰新產婦人有三病一者病瘕二者病

鬱冒三者大便難何謂也師曰新產血虛氣熱

血兩虛アリ虚ニ邪ヲ搖ハ三病アリ乃チ新產血虛

汗出筋燥シ故ニ喜中風變ズ故令病瘕

若ハ血復汗則内火上逆レ復外カ寒ニ感ノ寒多

故令鬱冒鬱冒ハ血厥ナリ入門ニ鬱ハ乃チ氣舒サルナリ

上ノ二條ハ虚ニ因テ邪ヲ受テ病ムヲ説ク以下ハ產後氣血虚ノ邪

ヲ受ルニ因ズノ便難ヲ説ク凡ソ大腸ハ津ヲ主リ小腸ハ液ヲ主ル

然モ津液ハ乃チ陽ニ屬ス氣虚スルニ因テ則チ津液虚ス津液虚

ノ血モ亦虚スレハ胃間腸ヲ潤サズノ亦燥ク故ト謂フ

吐津液胃燥故大便難蓋シ三病ハ綱タリ只此ノ三

虚ノ風寒ヲ感シ受ルト大便難フノ無キ邪トノ三法ヲ提テ諸病ノ大綱ト為ナリ

○產婦鬱冒中氣不足

其脉微弱木火盛盛ニ脾胃ノ氣ヲ嘔不能食

大便反堅血虚スレハ陽火但頭汗

出所以然者血虚而陽氣上逆スル厥ス厥逆スル

而外カ寒邪ヲ挾ニ上ラ必冒胃家前ニ欲解必大汗

出ツ則テ内外ノ邪ガ散ズルヲ得ナリ又謂フ

以テ血虛下厥孤陽上出故ニ

頭汗出所以產婦喜汗出者以陰血虛陽

氣獨盛故當汗出汗出ニ因テ其陽ヲ損ス以テ陰陽損スレハ則チ陰長ス故ニ

陽乃復フクス大便堅ホ火ガ胃ニ乘ス故ニ嘔不能ハ

食小柴胡湯主之方見嘔吐中○小柴胡湯ヲ用テ表裏ヲ和解シ表裏ノ氣和シレハ

病解能食此レ即チ大便堅ク嘔食スルヲ能ス小柴胡湯ヲ

承氣湯主之大承氣ヲ用ヒ胃中ノ堅壅ヲ峻攻無形ノ邪相隨ヒ有形ノ滯一掃テ盡出シムレハ

七八日更發熱者為胃實是胃邪ヲ瀉滌ラ主トスル故ニ大

則チ病ヒ失スルガ如シ此レ產後ハ氣血ノ虛ヲ主トスレハ若シ實證證

即チ實ヲ治スベキヲ示スナリ○此條大承氣ヲ用ユル場ハ輕シク腹

中腹痛疝絞痠比ニ牀ニ是レ屬スルナリ故ニ氣血兩虛或ハ微寒ガ當歸生薑

羊肉湯主之併治腹中寒疝虛勞不足氣血ヲ阻滯ス腹中

當歸生薑羊肉湯方見寒疝中○當歸ヲ以テ血ヲ養テ血滯ヲ

行シ生薑客寒ヲ温散ノ氣滯ヲ行シ羊肉味厚ク氣温ナラ

以テ氣ヲ補テ血ヲ生ス正ニ謂ル形不足スル者ハ補ニ味ヲ以テ氣

血温ヲ得シムレハ則チ邪自散ノ痛自止此レ○產後中

但レ温補宜行故ニ並ニ寒疝虛勞不足ヲ治スナリ

必ス虛ス虚スレハ氣滯テ食モ亦滯ル故ニ腹痛煩滿不得臥枳實芍

藥散主之

枳實芍藥散方

枳實

燒令黑勿太過

芍藥

等分

右二味杵為散服方寸匕日三服並主癰

膿以麥粥下之

此氣滯ノ腹痛ナル故ニ枳實ヲ以テ氣ヲ破リ滯ヲ行シ芍藥陰ヲ收テ脾ヲ

和ス此劑ハ氣ヲ行シ血ヲ和スル故ニ癰膿ヲ主ル麥粥ヲ以テ送下スレハ乃チ肝氣ヲ和メ心脾ヲ養フナリ

師曰

產婦腹痛

此條ハ上條ト互ニ相ヒ發明スルナリ前ハ氣ニ因テ食モ阻滯テ腹痛故ニ

法當

以枳實芍藥散

食ヲ行シ氣ヲ下シ陰ヲ收メ正ラ歛ム乃チ至當不易ノ治ナリ然レモ施之

假令不愈者

氣分阻食ノ痛ニ非ズ

此為腹中有瘀血

一本ニ乾血

著臍下宜下瘀血湯主之亦主經水不利

利

下瘀血湯方

大黃

二兩

桃仁

二十枚

蟅蟲

二十枚熬去足○蟅蟲前ニ餅ス

右三味末之煉蜜和為四九以酒一升煎

一丸取ハ合頓服之新

猶更ニト

血下

如豚

肝ノ大黃桃仁蟅蟲ヲ用ヒ血ニ入レテ瘀ヲ攻メ瘀去ラシムレハ則チ痛自ラ止ム○產後ノ腹痛ニ氣分アリ食滯アリ一概ニ瘀血ヲ

攻之產後七八日無大陽證

是レ大陽陽明ノ表證ナキナリ

少腹堅痛

ハ乃チ陽明ノ邪鬱スルニ因テ

此惡露不盡

但レ津液ヲ亡メ胃燥

ハ邪熱ガ胃ノ腑ニ傳ヘ以テ宿食行サルヲ挾ム故ニ

不大便

胃熱ガ上リ衝ケハ

煩燥發

熱然モ産後ハ氣血兩虚スル切脉微實再倍發熱ハ

明是レ外邪傳テ陽明ニ入り氣壅日晡時前ニ煩躁出ツ

者不食食則其邪熱ヲ助ケテ譫語設レ惡露盡ガルノ瘀血ガ

發熱ス至夜即愈此瘀血ヤ血虚ノ故ニ非ズ必ス拘テ産後ノ瘀血カト疑ハノ常法ヲ施シ胃中

燥熱食滯ラ除ベシ瘀血アリト宜大承氣湯主之蓋

雖圧熱食去テ瘀血自ラ行ル故ニ熱在裏熱鬱ノ行セ

結在膀胱也方見瘕病中○此産後モ亦邪熱氣壅テ胞宮血瘀ヲ致スラ有レハ則チ其胃中邪熱

ラ治スベシ端瘀血ヲ攻ラ訓ト○産後風續之一本ニ産後中風續

續ニ作ル從ベシ之ハ々ノ寫誤ナラシ數十日不解頭微痛一本ニ惡寒疼ニ作ルサムケク

時時テ有熱以上ハ乃大陽ニテ風ガ衛ヲ傷リ心下悶乾モ心カ

區是レ外邪ガ胸膈ノ裏ニ入ル故ナリ汗出表症ニダ鮮雖久大陽ノ表

アルヲ陽且ノ證ト謂フ故ニ曰ク陽且證續在耳故可與陽且

湯即チ桂枝湯方見下利中○沈氏曰桂枝湯ヲ以テ黄芩ヲ加テ陽且湯ト為然モ風邪表

アリ故ニ桂枝湯ハ肌ヲ鮮シ邪ガ胸膈ノ間ニ入ルハ正ニ清凉ヲ

以テ其内熱ヲ解スベシ故ニ黄芩ヲ加フ正ニ謂ル其虚ヲ犯ス是

其餘ヲ益正ヲ補ハスノ正自ラ補ヒ邪ヲ驅スノ邪自散ス斯レ産

後ノ感冒ニ神ニ入ル妙方ナリ千金方ニ此湯ヲ以テ飴糖當歸ヲ

加ヘ當歸建中湯トス産後ノ諸虚或ハ外感ノ病ヲ治ス深ク仲

景ノ意ヲ得タリ余嘗テ此湯ヲ以テ加減出入ノ産後ノ諸病ヲ治ス屢神効ヲ得タリ

○産後中風發熱風ガ大陽ノ表ヲ傷リ兼テ陽明ニ面正赤喘而

傳邪熱上逆スル故ニ發熱シ

頭痛スル 治之桂枝湯ニ加減スルヲ離ズ故ニ 竹葉湯主之前ニハ太陽ノ表ヲ謂ヒ此ハ陽明ノ證ヲ兼ナリ

竹葉湯方

竹葉 一把 葛根 三兩 防風 桔梗

桂枝 人參 甘草 附子各一兩 一枚

大棗 十五枚 生薑 五兩

右十味以水一斗煮取二升半分温三服

溫覆使汗出桂枝湯ヲ以テ營衛ヲ調和シ其内芍藥ハ酸收ナレハ去ル但シ産後ハ氣血凡ニ虚ス故ニ人參附子ヲ用テ陰陽ノ正ヲ固攝葛根防風桔梗ハ太陽陽明風熱ノ邪ヲ升發ノ表ヨリ出シ竹葉ヲ以テ端ヲ風邪ヲ清シ

肝膽ヨリ胃ニ乘スル熱ヲ通ス ○頸項強産後最モ變ノ柔 用大

附子一枚破之如豆入前藥一本ニ入前ノニ 揚字ヲ大煎ニ作ル

去沫嘔者胃虚ノ痰ヲ生スルナリ故ニ 加半夏半升洗婦

人乳沈氏曰當有閉字此婦 中虚産後邪ヲ受ク中氣虚ノ風邪ヲ傳

通テ胃ニ入り邪ト正ト抑鬱ス故ニ乳閉ノ 嘔火亂スレハ

逆安中益氣竹皮大丸主之乳房ハ陽明ノ經ナリ此即チ前條

方モ亦變スナリ

竹皮大丸方

生竹茹 二分 石膏 二分 桂枝 一分

甘草 七分

白薇 一分

右五味末之棗肉和丸彈丸大以飲服

丸日三夜二服有熱者倍白薇煩喘者

ノ字ナシ 加栝實一分 竹茹甘草石膏ノ甘涼ヲ以テ風

枝營衛ヲ和ノ風ヲ驅リ白薇甘寒能ク血海ノ風ヲ驅テ外ヨリ

出シ邪去ラシムレハ煩亂嘔逆止テ胃氣宣行テ乳閉モ亦

通ス正ニ補ハズノ自ラ補フ故ニ中ラ安レ氣ヲ益ト為熱アル者ハ乃チ

陰分ノ熱盛ニノ肌表ニ浮フ故ニ白薇ヲ倍ス昔賢謂フ其能ク

浮熱ヲ去ルト喘ニハ栝實ヲ加テ心ヲ清ラレ肺ヲ寧メ風木ノ盛ナル

ヲ制スナリ○竊ニ按スルニ乳中トハ總テ婦人子ニ乳ヲ與ル中ラ產中

乳中ト云ナリ然レハ此乳中ハ乳房ノ中ト見ルアレハ中ラ中氣ト見

テハ方中ノ石膏摠ナラス唯乳中ヲ產乳中ト見テ產後イニタ子ニ

乳ヲ與フル中 虛煩亂等ノ症出タル

ト見ハ摠ナラシカ猶ラ後賢ヲ俟

○產後 血虛ノ火盛ニ風

ガ腸胃ニ乘シ濕

熱相蒸シ津液

化ノ膿ト為ル故ニ 下利虛極 此血虛ニ風襲テ下利ス即チ痢

モ是レ瀧ノ能ク此ニ非ス此風熱ヲ 疾ナリ然モ虛スル一至極ナレハ然

清スレハ則チ利自止ム故ニ 白頭翁加甘草阿膠

湯主之

白頭翁加甘草阿膠湯方

白頭翁 甘草 阿膠 各二兩

秦皮 黃連 藥皮 各三兩

右六味以水七升煮取一升半內膠令消

盡分温三服 白頭翁黃連秦皮藥皮ノ味皆苦寒ヲ以

テ能ク風邪ヲ清ラノ腸胃ノ濕熱ヲ除ク甘草

中ヲ和シ阿膠陰血ヲ養テ血海ノ風ヲ驅リ邪去ラシムレハ即チ是虛

ヲ補テ利自止蓋ニ產後氣血ノ虛アリト雖ハ風寒ヲ感シ受テ

内病ハ則チ邪ヲ驅ルノ中ニ兼テ虚ヲ補ヲ用テ病ヲ退クベキ一ヲ示スナリ後世ニ至テ産後ノ邪氣ヲ發散スルニ必ス芍藥ヲ加フルモ亦此ノ意ナリ

附方

○千金三物黃芩湯 治婦人在草蓐生

産坐草トテ漢人モ産スル時ニアラコモヲ敷テ産ナリ蓐ハト子トテ敷モノトナリ草蓐ニ在リトハ今ノ産臺ノ内ニ居ラ云フ草蓐ニ在ル内ニ風ヲ受タルヲ褥風勞云フナリ 自發露 著物ヲ吸テ此産後血氣イダ本ニ復ラザルニ

得風四肢苦煩熱 但レ其ノ上下邪ヲ受ルヲ辨メ分テ治ス

頭痛者與小柴胡湯 風氣ハ肝ニ通スルニ由ル故ナリ

若シ胞門氣血虚ノ風ガ陰戸ヨリノ傷ノ血海ニ入り 風化ノ熱ヲ為シ上ニ心脾ニ衝故ニ四肢煩熱ヲ爲ス 頭痛但

煩者此湯主之 此レ上下邪ヲ受ルヲ分テ治スルナリ

黃芩 一兩 苦參 二兩 乾地黄 四兩

右三味以水六升 煮取一升 温服

一升多吐下 蟲 地黄ハ其陰血ヲ補ヒ風ト濕ト蒸シ氣血化ノ蟲ト為ル故ニ苦參ヲ以テ濕ヲ燥

ノ蟲ヲ殺シ又伏風ヲ去ル 黃芩ヲ以テ能ク風化ノ熱ヲ清フス服ノ多ク吐スル者ハ乃チ逆上ノ風ガ上ヨリ出ツ蟲ヲ下ス者ハ胞門濕盛ナルナリ即チ下ヨリ出ナリ ○大腸ガ吐タリ又ハ蟲ヲ下スモアリトナリ蟲ヲ吐下ストノ舊点非ナリ 蟲ヲ吐スル症ニ非ス

○千金内補當歸建中湯 治婦人産後

産後ノ體ハ病ナシト雖ハ血海必ス虚ス若シ中氣尅盛ナレハ氣血虚スト雖ハ能ク復 易レ或ハ後天血ヲ生セズ血海ニ充ルヲ能サズ 則チ虚羸不足 但シ血海虚スレハ經絡ノ虚スルヲ知 腹中

刺痛不止 脾胃ノ氣 虚スレハ

吸吸少氣 任督ニ衝テ内ノ 虚ヲ帶ハ則チ

或

苦少腹中急 千金ニ中ノ字ナレ 拘急ニ作ル

摩痛 千金ニ摩ノ 字を從フベシ

引

腰背 脾胃ノ氣 虚スレハ

不能食飲產後一月日得 此ノ

證

服 得

四、五劑為善令人強壯宜

當歸 四兩

芍藥 六兩

生薑

桂枝 各三兩

甘草 二兩

大棗 十二枚

右六味以水一斗煮取三升分温三服一

日令盡若大虚加飴糖六兩湯成内之於

火上煖令飴消 飴糖ヲ加テ脾胃ヲ 補テ氣血ヲ生ス 若去血過多

崩傷 崩漏崩 中皆同シ

内血 吐血ノ別名ナリ 要訣ニ出

不止 乃チ血海ノ真 陰大ニ虧故ニ

加地黄六兩阿膠二兩 以テ 合八味湯成

内阿膠若無當歸以芍藥代之若無生薑

以乾薑代之 桂枝湯ヲ用ヒ營衛ヲ調和シ當歸ヲ加ヘ 血ヲ補フノ功多カラシマフ欲スナリ方後ニ云

生薑ナケレハ乾薑ヲ以テ代之乃チ温補ノ中ニ兼テ血藥ヲ引テ 血分ニ入レ血ヲ生ス其義更ニ妙ナリ

婦人雜病脉證并治第二十二

論一首 脉證合十四條 方十六首

婦人 雜病

傷婦人中風七八日續來

傷寒論ニ得ニ作ル古 人ノ文ニ而ノ字ノ所ニ來

字ヲ用ル 例アリ

寒熱發作

有時經水適斷

傷寒論ニ者 ノ字アリ

此為熱入血室其血必結故使如瘧狀發
作有時小柴胡湯主之方見嘔吐中傷婦人

傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譫語

如見鬼狀者一本此為熱入血室治之傷寒

論ナレ無犯胃氣及上二焦必自愈傷婦人

中風發熱惡寒經水適來得傷寒論ニ七八

日熱除脉遲身凉和胸脇傷寒論ニ滿如結

胸狀譫語者此為熱入血室也當刺期門

隨其實而取之傷寒論ニ傷血弱氣盡滕理

開邪氣因入與正氣相搏結於脇下正邪

分爭往來寒熱休作有時默默不欲飲食

臟腑相連其痛必下邪高痛下故使嘔也

小柴胡湯主之一本ニ此條傷陽明病下血譫

語者此為熱入血室但頭汗出傷寒論ニ當

刺期門隨其實而瀉之傷寒論ニ汗出者

愈以上ノ五條ハ已ニ傷寒婦人咽中血室ノ邪ガ任

挾氣逆ノ噎塞吞如キハ炙癰炙癰ガ咽ノ中ニ半夏

厚朴湯主之

半夏厚朴湯方

千金作胸滿心下堅咽中怏怏如

半夏 一升

厚朴 三兩

茯苓 四兩

生薑 五兩

乾蘇葉 二兩

右五味以水七升煮取四升分温四服日

三夜一服

厚朴半夏ノ辛温ヲ用ヒ痰ヲ消シ結ヲ散ノ逆

生薑ト同シク以テ營衛ヲ宣テ外ヨリ入ルノ邪ヲ散シ茯苓

婦人臍燥

臍トハ子臍ヲ指ス五臟ノ臍トスルハ非ナリ燥

臟燥一ヲ爲メ風ヲ受テ熱ニ化シ相隨フテ任脉ニ滯上テ心包ノ火ヲ

悲傷欲哭

悲傷ノ上ニ

象

如神靈所作

附キ物ニテモ

ナリ此肺金虚シ肝盛ニ

數

欬

神

即チ憂鬱悲傷多嘔

邪が胃腎ヲ犯ス故ニ

甘麥大棗湯主之

甘麥大棗湯方

甘草 三兩

小麥 一升

大棗 十枚

右三味以水六升煮取三升分温三服亦

補脾氣

甘草ヲ以テ緩ニ心包ノ火ヲ瀉シ小麥心ヲ益シ肝ヲ和

和シ以テ子宮ノ燥ヲ濟衝任ガ養ヲ得ハ是レ肺氣ガ陵犯ヲ魚ハ則チ

婦人

血寒積テ胞門ニ結レ復レ新ニ外風ニ感スルヲ挾テ任脉

爲痰ト

吐涎沫

然モ外邪ハ表

殺酉反下之

無過ヲ攻

爲故ニ

散スベキニ

中氣ヲ傷

傷

フヲ致セハ則チ陰邪ガ心下即痞チヒスガ若シ延ラ治セザレハ餘ノ涎モ盡シ上逆ノ涎ト相併セテ痞ニ併セテ卒ニ分解シ難シ故ニ

當先治其吐涎沫小青龍湯主之以テ邪ヲ散シ飲ラ滌

風寒擅ニ長スル新ト舊トノ邪ヲ去ラシムレハ涎沫自ラ止ムテ其或ハ痞結マダ消セサ交乃チ

治痞痞ヲ治スルニハ瀉心湯主之ラ

小青龍湯方 見肺癰中

瀉心湯方 見驚悸中

婦人之病 女子ハニ七十四歳ニノ天癸至リ一月ニ經水一モ

ノ後ヤ新産ノ後ヤ胞宮氣血虛弱ニシテ外邪以テ陰門ヨリ侵襲

則チ病變窮ナシ但稟氣ニ強弱アリ陰陽ニ偏勝アリ氣血ニ虛

實アリ風寒ニ多少アリテ五臟六腑十二經絡ニ傳ハ乘ズ故ラ以テ證

ヲ懸トツナラス然モ婦人ノ病ハ氣血ノ虛ニ因テ風寒ガ子宮ラ

行ズ故ニ謂フ因虛積冷結氣爲諸經水斷絶且ツ

至有歷年血寒積結胞門千金翼曰胞門者関元左

邊ニ寸右邊ラ名子戸ト乃チ虛ハ病ヲ受ルノ本ナリ風寒ハ病ヲ致ス

ノ標タリ日久キニ至テ諸經臟腑ニ傳ハ氣血陰陽表裏上下神

志ノ諸病變化測ズ但シ邪ガ胞中ニ宿テ寒傷經絡凝

上焦氣虛ノ處ニ相隨ヒ厥ソ上行シ

堅在上或ハ脾胃ヲ侵セハ則チ嘔吐延唾肺ノ臟ニ逆ノ營衛宣セハ久成

肺癰 然モ骨蒸欬嗽モ皆括テ其ノ刑體損分分ナリ若シ

在中盤結衝脉ニ淫繞臍寒疝臍ニ淫兩脇

疼痛 然モ經ト臟トハ表裏ヲ相爲ス但シ與臍相

連 若シ風邪ガ本宮ニ淫スレハ鬱化ノ或結熱中邪正相搏

則チ痛在關元在臍下三寸夫風ハ善行テ數變シ鬱

シ脉數ナリ瘡家ノ脉數陰血耗テ軀殼ニ充脉數無瘡陰血耗テ軀殼ニ充

肌若魚鱗或ハ交合ニ逢テ其邪ガ傳ヘテ時着男子若シ感シ受ル日淺クマダ

非止女身他經ニ傳ザラ即チ謂フ在下未多下字

下トハ非ナリ在上トハ上焦ヲ指ス在中トハ中焦ヲ指ス在下トハ下

焦ヲ指ス即チ上中下ノ三焦ト為ノ見ルベシ未多トハ未日數ヲ經サルヲ

云フ經候時候ノ候ナリ不勻經行同シ不勻經行同シ少腹即チ抽掣テ陰戸ニ相引テ

令一本ニ冷ニ陰掣痛即チ抽掣テ陰戸ニ相引テ少腹即チ抽掣テ陰戸ニ相引テ

惡心寒邪ガ督脉ニ隨フテ或引腰脊若シ衝脉ニ依ハ則チ氣

氣衝邪ガ督脉ニ隨フテ或引腰脊若シ衝脉ニ依ハ則チ氣

則チ氣衝邪ガ督脉ニ隨フテ或引腰脊若シ衝脉ニ依ハ則チ氣

則チ氣衝邪ガ督脉ニ隨フテ或引腰脊若シ衝脉ニ依ハ則チ氣

則チ氣衝邪ガ督脉ニ隨フテ或引腰脊若シ衝脉ニ依ハ則チ氣

則チ氣衝邪ガ督脉ニ隨フテ或引腰脊若シ衝脉ニ依ハ則チ氣

則チ氣衝邪ガ督脉ニ隨フテ或引腰脊若シ衝脉ニ依ハ則チ氣

則チ氣衝邪ガ督脉ニ隨フテ或引腰脊若シ衝脉ニ依ハ則チ氣

則チ氣衝邪ガ督脉ニ隨フテ或引腰脊若シ衝脉ニ依ハ則チ氣

則チ氣衝邪ガ督脉ニ隨フテ或引腰脊若シ衝脉ニ依ハ則チ氣

則チ氣衝邪ガ督脉ニ隨フテ或引腰脊若シ衝脉ニ依ハ則チ氣

則チ氣衝邪ガ督脉ニ隨フテ或引腰脊若シ衝脉ニ依ハ則チ氣

則チ氣衝邪ガ督脉ニ隨フテ或引腰脊若シ衝脉ニ依ハ則チ氣

必ズ審ミ脉ヲ陰陽虛實緊弦ラ則チ邪ノ風寒氣血ヲ行ハス其ノ

鍼藥治危得安コト以上ノ病ト同ク胞門ニ起ルト雖モ凡レ風寒ノ

二隨フテ症ヲ現シ脉ヲ現ス其雖モ同ノ病ト脉各異源ラ婦人ノ

科切要ノ子當辨記勿謂不然ラ此レ上ノ數段ハ皆胞宮ノ

邪ガ五臟六腑氣血ノ虛スル處ニ隨フテ證ヲ現ス故ニ無キ窮リ○問テ

日婦人年五十一所所猶ラ許ノ如シ日晡所ノ所ト同シ

病下利數十日不止ニ即チ血ガ山ノ崩倒ガ如ク崩漏ト謂フ

是ナリ大便ノ下利ハ非ズ金鑑ニ下利ヲ下血ニ改ム今人ノ為ニ聞ク

ナルニ反テ血ガ大ニ下ルハ先年ニ半產ナトニテ寒ガ凝テ血ヲ瘀テ胞宮ノ

ルラ得ザレハ則チ陰虛火盛ナリ故ニ暮即發熱ハ血ガ少ク

少腹裏急ハ蓋シ心經ノ脉絡ハ下モ胞門ニ通シ上ニ中指無名指

虛シ火盛ナンハ手ノ掌ノ煩ハ腹滿テ手ノ掌ノ煩熱脾ノ營ノ化ハ唇ノ

口乾燥ハ病ト血室ニ在リ何也師曰此病屬帶下ハ本ニ

ノ所為ナリ何ヲ以テ故ヲ曾テ經ニ半產ノ瘀血ニ在テ少腹ニ不レ

去ラ何以知レ之ヲ何ヲ以テ其ノ血ガ少腹ニ其證唇口乾ハ

燥ス此レ乃チ血瘀ノ故ニ知之ル之ヲ此レ血寒積テ胞門ニ結ル病ナリ當以テ温經ヲ

湯ヲ主ス之ヲ

温經湯方

吳茱萸三兩 當歸 芍藥

人參 桂枝 阿膠 牡丹皮

生薑 甘草各二兩 半夏半升

麥門冬一分

右十二味以水一斗煮取三升分温三服

○亦主婦人少腹寒久不受胎兼治崩中

崩漏崩 去血或 或月水來過多及至期不

來川芎當歸人參芍藥生薑桂枝吳茱萸甘草營衛ヲ調

和ノ氣血ヲ益シ寒結ヲ温散スルヲ為シ半夏逆ヲ下レ痰

ヲ消シ牡丹皮血ヲ散シ麥門冬阿膠肺ヲ保シ通調ス但レ經

ヲ温メ邪ヲ散メ瘀血ヲ行シムレハ病根去リ血が宮ニ歸得ハ則

下血下 帶下經水不利胞門ニ風ヲ受ケテク日數ヲ

ナリ經ガハ故ニ秘經水利セサル 少腹滿痛經一月再見者此下ニ在ハ味多ク

リ金鑑ニ再ノ字ヲ 土瓜根散主之

土瓜根散方陰癰腫 芍藥 桂枝 麩蟲各三

右四味杵為散酒服方寸匕前ニ 日二服土

根即チ 土瓜根ナリ味苦ク氣寒能ク風化ノ熱ヲ清フス又瘀血

月閉ヲ治スト塵蟲血ヲ活シ瘀ヲ行ス桂枝芍藥以テ營衛ヲ調

陽氣ヲ宣テ風ヲ外ニ出シ酒ニテ寸口脈此條ハ胞門ニ邪

乘スルノ脉ト證トヲ挾ナリ血海ノ邪カ肝ノ木ニ弦テ而大弦ヲ傷ハ則

通ズレハ則テ木氣過盛ニノ脉弦ナリ故ニ胃虚ス弦則爲減脉ニ既灌テ空大ナル故ニ大則爲

乳ノ胃ノ氣虚弱ニ減則爲寒ト血ガ經ヲ循テ乳則爲虚

胃寒ハ脉虚シ寒虚相搏此名曰革脉狀ハ傷寒論脉法ニ於

胎ヲ攝ラ能ズ故ニ婦人則半產則漏

下其病源ヲ推ニ乃チ胞ニ風寒ヲ受テ致ス所ナリ旋覆花湯主之

旋覆花湯方

旋覆花 三兩 葱 十四莖 新絳 少許

右三味以水二升煮取一升頓服之

旋覆花ヲ用ヒ風ヲ驅テ寒結ヲ散シ葱ヲ以其ノ行散ノ力ヲ助ケ

新絳絳絹引テ血海ニ入レテ邪ヲ散ズ邪カ散スレハ則チ正氣自ラ

復此正ラ養フノ方ニハ非ズ蓋シ前ノ虚勞論中ノ革脉乃チ木火カ

胃ヲ制ス此ハ胞官ニ邪ヲ受テ木ニ傳ル同シカラサルニ因ル參考スベ

シ○或曰新絳ハ新ナル紅花ナリ下ニ出タル紅藍花酒ノ紅藍花モ

宋ノ開寶本草ニ始テ出タリ故ニ仲景ノ方ニ非ズト據ナラス

○婦人 諸經血盈ハ則チ血海ニ灌海滿テ復テ經ニ溢經ト海

邪ヲ受テ新血ヲ拒格ノ海ニ歸サレハ則チ新血降テ漏下ル然モ

經血ガ陷テ升ス故ニ陷經トス若レ血寒ハ則チ黒シ此

漏下黒不鮮 即チ血海ニ寒ヲ受テ致ス所ノ漏下ナリ故ニ 乾姜ヲ以テ寒邪去ラシムレハ瘀黒自ラ鮮ス阿

膠血ヲ養テ伏風ヲ驅ハ膠薑湯主之 臣億等校諸本ヲ 則チ漏下止ヲ得タリ 無膠薑湯方想

是前妊娠中膠艾湯○原方未見ト 婦人 經後血室虚 雖一尺但阿膠乾薑ヲ以テ蒸之其義知シ

水ト血ト内ニ少腹滿如敦狀 敦ハ字書ニ大ナリ厚ナリ人敦 療スレハ則チ

小便微難而不易生後者生後ヲ沈氏ハ

說ハ小便難淋ノ如ク通シテ通シタル後ニテモ通氣ヲ此レ

爲水與血俱結在血室也此有形水ト血ト血室ニ結ル

破大黃甘遂湯主之峻攻ヲ以テ其堅壅ノ結ヲ

大黃甘遂湯方

大黃四兩 甘遂各二 阿膠各二

右三味以水三升煮取一升頓服之其血

當下大黃血ヲ攻ノ甘遂以テ蓄積ノ水ヲ逐テ雷ヲ

利ス沈氏曰血分ニ風ヲ受ルニ擬テ水腫ヲ致ス婦人胞門ニ風

散入血凝テ散マテ故ニ經水不利下抵當湯主之婦人寒カ驚

抵當湯方 亦治男子膀胱滿急有瘀血者

水蛭三十箇 去足 虻蟲三十枚 去足

桃仁二十箇 去皮尖 大黃酒浸

右四味爲末以水五升煮取三升去滓温

服一升此血寒積テ胞門ニ結ルニ非ズ或ハ痛テ利セス或ハ火腹

堅ノ形ノ微トスベキ有リ故ニ血ヲ食ハ蟲ト水蛭トヲ以テ血ノ結ヲ

破リ桃仁大黃以テ其瘀ヲ攻ハ則雷滯一無レ此方傷寒論ニ出ツ

乃傷寒論國字解 ○婦人經水閉不利臟即子宮

堅癖今人血塊ト云フ是ナリ 不散一本ニ止ニ作ルハ非ナリ蓋シ子宮ノ氣ハ

衝任ノ氣ハ上ツテ咽喉ニ至テ肺ニ會通ス然モ肺ハ諸臟ノ氣ヲ通調スルヲ王ツテ子宮ニ連リ及フ故ニ肺ト大腸ト邪ヲ受クハ通調傳道ノ職皆失ス以テ脾胃ノ濕熱ヲ致シ津液ヲ凝滯ノ白物ト成リ淫ノ胞宮ニ入リ内血ヲ阻滯シ流スノ乾血ヲ成ス是レ白帶ガ胞宮ニ阻閉ニ因テ乾血ヲ結ナリ故ニ謂フ

中有乾血下白物

礬石丸主之

杏仁一分

右一味末之煉蜜和丸棗核大內臟中

臟ニ入リ刺者再內之
經云病ヲ治スルハ必ス其本ヲ求ムト故ニ

仁獨リ肺ト大腸トノ氣ヲ利ノ助ヲ為ス蓋シ肺ト大腸トハ表裏裏タリ藥ヲ大腸ノ臟ニ納テ藥氣ヲ以テ大腸ノ氣ニ從ヒ上ニ肺ニ行シムレハ肺氣則チ下行ヲ得テ子宮ニ通調ノ濕熱津液凝テ白物ト為テ得シムレハ則チ白物止テ乾血自ラ散ス此他臟ヨリ子宮ニ淫ノ病ヲ受ク胞門ニ受ルト治ヲ同セズ正ニ謂ル其

婦人
皆血海ニ邪ヲ受テヨリ

起テ六十一種風
六十二種ノ數未詳
 及腹中血氣

刺痛
咸血海氣血虛ノ風ヲ格ニ因テ以テ衝任督帶五臟六腑皆病ヲ致ス故ニ
 紅藍花酒

主之

紅藍花酒方
疑非仲景方
 紅藍花ハ宋ノ開寶本草始テ出ル故ニ後人疑

紅藍
一兩
 即紅花ノ古名ナリ

右一味以酒一大升煎減半頓服

止再服
紅藍花一味ヲ以テ酒ニ煎シ其色紅ニ血ト相類スルヲ取ル味苦辛温ニ能ク心肝衝任血海ニ入テ血

ヲ養ヒ血ヲ和シ血ヲ行シ專ラ血海ヲ理ノ舊ヲ去リ新ヲ生ズ酒ガ血ニ入ルヲ得テ宣行ノカラ更ニ佳ナリ正ニ謂ル血足テ風自減スナリ

婦人

血海ヲ以テ主ト為ト雖氏實ハ脾胃資テ生スルノ化ニ
賴テ血ヲ海ニ統ハ則チ諸病ナレ此脾ガ健ニ運サルニ

因テ濕氣ガ胞中ニ下
流ノ血瀦リ氣滯ル故ニ

腹中諸疾痛

脾虛ヲ責テ
治スベシ

當歸

芍藥散主之

當歸芍藥散方

方見妊娠中

川芎當歸ヲ以テ血ヲ養テ血中ノ氣滯ヲ行ラシ芍藥陰ノ正ヲ收メ
白朮茯苓澤瀉瀉脾ヲ健ニ濕ヲ滲シ脾ヲ健ニセシムルハ則チ血生ノ
濕ガ下ニ流レズ衝任氣行リ血利スレハ則チ諸病自ラ止ム此又脾ヲ
重ノ胞ヲ責ヘカラス此モ亦同病ト雖氏脈各ノ源ヲ異ナリ

婦人

胃ハ五臟六腑ノ海タリ胃虛スレハ穀ヲ納ラズ少フノ營
衛モ亦虛シ血海濟ナク胞門血虛シ氣滯ル故ニ

腹中痛

是風寒ノ致ス
所ニ非ナリ故ニ

小建中湯主之

小建中湯方

見前虛勞中

小建中湯ハ中氣ヲ健ニレテ營衛ヲ生シ血海ニ充灌テ陰陽
和ノ氣血流利セシムルハ則チ痛ヲ治スレテ痛自ラ已設風寒
ガ痛ヲ致スニ因ラハ湯中ノ桂枝以テ邪ヲ驅ルニ足邪ヲ此ノ
上下ノ二條ハ後天脾胃生化ノ源ノ不足ヲ以テ累テ血海ニ病
ヲ受ルニ及ホス故ニ脾胃ヲ健ニスルヲ以テ主トス四物湯ヲ悞テ陰
血ヲ養ナカレ諸臟皆然若レ胞門ニ邪ヲ受ケ累テ臟腑ノ諸
病ニ及バ當ニ胞門ヲ
治スルヲ主ト為ベシ

問曰婦人病

表裏上中ノ二焦
ニ病ヒナレ故ニ

飲食如故

煩熱不得臥而反倚息者

物ニ倚
カツテ

息スレ

何也師曰

下焦陽虛ノ氣ヲ聚肺ニ統一能サル故
ニ胞系了戾ス即チ紐轉シ溺スルヲ得サ
ルナリ然モ胞系既ニ轉シ上ノ氣シ
下ニ通スルヲ得ズ心肺ニ逆衝

此名轉胞不得溺也

以胞系了戾故致此病

是真陽虛ノ氣ヲ胞
ニ統一得サルニ因ル

但

利小便則愈

此胞門陽虛ノ
病ヲ致スナリ故ニ

宜腎氣丸主之

腎氣丸方

乾地黄八兩

薯蕷

山茱萸

各四兩

澤瀉

牡丹皮

茯苓

各三兩

桂枝

附子

各一兩

右八味末之煉蜜和丸梧子大前酒下十

五九加至一十五九日再服

六味丸ヲ用ヒ以テ左腎ノ元陰ヲ滋桂附

端ラ右腎ノ眞陽ヲ補テ陽ヲ行シ氣ヲ化メ直ニ胞中達シ胞系滿直ノ開闔ヲ權アレハ則チ小便利ノ煩熱倚息頓一愈若シ

五苓散ハ正散ヲ以テ一概ニ淡滲ハ元陽頓ニ削及テ溺スルヲ得サルナリ

○蛇床子散温陰中坐藥

坐ノ藥ヲ陰中ニ納ラ以テ此レヲ坐藥ト名ツ猶

服スルヲ以テ服藥トスルガゴトレ坐ハ對ト通ス同音ノ假借ト見ルハ非ナリ

蛇床子散方

蛇床子

一本子作仁

右一味末之以白粉少許白粉ハ胡粉ナレ此ハ

和一作本合作令相得

相得トハ能ク和合スルヲ謂

如束大綿裹内

之陰中ニ自然温

此陰ヲノ掣痛シ少腹惡寒ス方ナリ胞門陽虛ノ寒ヲ受レハ現證一ツナラス惟

少腹惡寒ノ一證ニ非ス但シ寒ヲ陰戸ヨリ受レハ表ヨリ出サス其邪ヲ受ル處ヲ温ムベレ則チ病愈ルヲ得ルナリ故ニ蛇床子一味大

熱能眞陽ヲ補フヲ以テ陰中ニ納ノ入子宮ヲノ燬ヲ得セシムレハ邪去テ病自愈

○少陰脉

左尺二居

血ノ地ニ應シ外カ陰戸ニ通ス但シ脉

滑而數者

滑ハ陰氣ノ有餘トス數ハ熱盛ナリトス此風熱胞中ニ感シ入ル

二因テ濕熱熾盛ニ陰中ニ流注シ營氣ガ從ズ肉理ニ逆ノ邪熱鬱蒸ノ蒸化ノ蟲下為遍陰尸ヲ蝕スルヲ陰蝕瘡トス乃チ此陰中蝕瘡爛者此風ト濕ト合メ胞門ニ乘シ陰尸ニ流テ狼牙湯洗之蟲蝕ヲ成ナリ

狼牙湯方

狼牙

三兩○狼牙本草毒草部根味苦寒有毒治邪氣熱氣疥癬惡瘍瘡痔去白蟲治浮風癢痒煎汁洗惡瘡和名古末豆奈木和漢三才圖會ニ詳ニ見ユ參考スベシ

右一味以水四升煮取半升以綿纏筋如

繭蚕所作也浸湯瀝陰中日四遍狼牙ヲ以テ煎シ湯ニシテ薰洗本草ニ謂フ其

苦寒毒アリ善ク浮風癢瘡ヲ治シ一切ノ蟲ヲ殺スト但苦ハ能ク濕ヲ燥シ寒ヲ以テ熱ヲ除キ濕燥熱除カシムレハ化ノ蟲ヲ

為ザレハ則チ蝕瘡自ラ愈ユ蓋シ後人陰瘡ヲ論スルノ數種此ノ論ノ最ニ詳ナルニ若ス當ニ類ニ觸テ苟ラニ通ノ證ヲ治シ妙ヲ為ヘシ

胃氣下泄

○胃氣下泄此胃ノ氣ガ胞門ニ走ツテ前リ大腸ト胃中トノ津液枯燥穀熱壅滯テ下ラズ胞門氣虛ノ胃氣後陰ニ往ズ及テ胞門中ニ陷リ以テ前陰ヨリノ出ツ故ニ胃氣下泄ト謂フ乃チ實ヲ移メ虛ニ就ノ義ニテ胞腸胃ヨリ胞門ニ及フノ病ナリ氣泄テ聲響ク吹ガ如シ故ニ謂フ

陰吹而正腸胃ノ氣ガ胞門ニ乘ス故ニ謂フ此穀氣之實也膏

髮煎方

膏髮煎方

方見黃疸中○即猪膏髮煎ナリ猪膏ヲ以テ腸胃燥ヲ滋潤シ髮煎以テ胞門ノ血ヲ養ヒ腸間ガ潤フヲ得ヤシムレハ穀食下ツテ氣ガ後陰ニ轉ズ此ガ通スレハ徳ガ塞ナリ益シ大便結セズ中虛シテ陰吹者ハ中ヲ補ヒ并提スベシ一概ニ胃實ト為ベカラス

○小兒疳虫蝕齒方 疑非仲景ノ友 穩ナラス

雄黃 葶藶

右二味末之取臘日 十二月ヲ臘月ト謂フナリ 二月八日ヲ臘日ト謂フ 猪脂

鎔之 一本ニ烙ヲ炤ニ作ル烙ハ燒灼ナリ 炤ハ照ト同シ 沉氏曰小兒ノ疳病ハ乃チ内ヨリ發ス先ツ肺金ノ虛ニ因テ肝木力畏 以槐枝綿裹頭四五枝 一本ニ枝ヲ 枚ニ作ル 點藥

濕蒸膏化ノ蟲ト為テ齒ニ浸淫ス故ニ疳虫蝕齒ト為ナリ方ハ

雄黃ヲ用ヒ善ク臟腑ノ風ヲ驅リ又能ク虫ヲ殺ス葶藶以テ肺ノ實

ヲ瀉シ肺氣ヲ通調セシムレハ金風一名動キ濕熱全ク消スレハ則チ蟲ニ

化セス齒ヲ蝕ノ患除クナリ蓋シ此方ヲ婦人ノ證後ニ附ス想ニ昔シ

幼科アレヒ而モ遺失ノ傳ナク古ヲ去ル一既ニ遠シ敢テ妄ニ贅セズ

○醫學入門ニ張仲景其門人衛沈小兒顛顛經方ヲ撰スト見タリ蓋シ幼科ハ小兒顛顛經ニ備タリ即チ此方後ニ顛顛經

雜療方第二十三

論一首 證一條 方二十三首

○是ヨリ以下ノ方法ハ後人ノ附録ナリ取ルベキト取ルベカラザルト

アリ本經ト撰括スルアリ故ニ妄ニ解セズ然レモ間亦試ニ良驗

○退五臟虛熱四時加減柴胡飲子方

冬三 柴胡 八分 白朮 八分 陳皮 五分

大腹楨榔 四枚并ニ皮子モ用 生薑 五分

桔梗 七分 ○以上六味柴胡飲子ノ方ナリ 冬三月ハ柴胡ヲ加倍スルナリ

雜療

春三月加枳實減白朮共六味○白朮減去ナリ白朮ホラ去枳實加共六味トナル

夏三月加生薑三分枳實五分甘草三分共二

秋三月加陳皮三分共六味○秋三月ハ冬ト同唯陳皮ヲ加倍スルナリ

右各咬咀前分為三貼一貼以水三升煮

取二升分温三服如人行四五里進一服

如四體壅添甘草少許每貼分作二小貼

以水一升煮取七合温服再合滓為一服

重煮都成四服疑非仲景方二

○長服訶梨勒丸方疑非仲景方

長ト常ト近似音ナレハ華人通シ用ユ常夜燈ヲ長夜燈ニ作ル
類ナリ此訶子痰ヲ開キ大腸ヲ固フス陳皮厚朴脾ノ滯ヲ
化ス常ニ服スベキヲ以テ名ツク

訶梨勒煨陳皮厚朴各三兩

右三味末之煉蜜丸如梧子大酒飲服二

十九加至三十九丸

○三物備急丸方

見三千金司空裴秀為散用亦可先和成汁乃傾之
口中令從齒間得入至良驗裴秀ハ裴頰カ

大黃一兩 乾薑一兩 巴豆一兩去皮心熬外研如脂一本二泥二作丸

右藥各須精新先搗大黃乾薑為末研巴

豆内中合治一千杵合セ治テ用為散ト蜜和丸ニ

亦佳密器中貯之風ノ入ラサル器ヲ莫令歇レ氣ヲ藥氣ヲ指ス

主心腹諸卒暴百病若中惡客忤中惡天吊ハ惡氣ノ氣ニ

中ラレ兩目上攢吊起ノ目ヲフサグ心腹脹滿卒痛如錐ニ

刺氣急口噤停尸卒死者以煖水苦酒煖水

酒ヲ以テ服スルナリ一本ニ煖水若酒ニ作ルハ非ナリ服大豆許三四丸或不可カ苦

下咽ニ下ラザラ云フ捧頭起灌咽ニ令下咽須臾ニ

差如未差更與三丸當腹中鳴即吐下便

差若口噤亦須折齒灌之

○此方證ニ對スレハ誠ニ神驗アリ常ニ貯置ベレ若シ證ニ對セザレハ及テ大ニ害アリ宜ク審詳ニスベシ○醫方集解ニ曰崔氏干姜ヲ桂枝ニ易テ備急散ト名ツク

治傷寒令愈不復常ニ平復セサルナリ

紫石英 白石英 赤石脂

鍾乳礪鍊一本ニ煖作ル 枯薑根 防風

桔梗 文蛤 鬼臼

太乙餘糧各十分燒 乾薑 附子炮去

桂枝去皮各四分 ○去皮ハ傷寒論國字解桂枝湯ノ條ニ註ス

右十三味杵為散酒服方寸匕

○巢元方カ病源候論卷六ニ寒食散ヲ服スルノ法アリ熟煎見スベシ
 ○丹家名撰曰紫石英味甘辛温无毒日本伯耆国无時採之
 白石英味甘辛微温无毒日本近江国備中因太宰二月採之○赤石
 脂味甘温出備後国太宰○鍾乳味甘温出洞穴中石液凝成下垂
 如冰柱○文蛤味鹹平无毒和名伊太也加伊无時採之○鬼臼味
 辛温微有毒和名奴波乃美二八月採之○太乙餘糧和名ッホイシ中ノ
 空ナモノナリ其中ニ黄水或ハ麩ノ如キモノアリ出太宰○其餘ハ
 尋常ノ藥品畧ス

○救卒死方

△韭搗汁灌鼻中

又方

△雄雞冠割取血管吹內鼻中

△猪脂如雞子大苦酒酢一升煮沸灌

喉中

△雞肝及血塗面上以灰圍四旁立起

△大豆二七粒以雞子白并酒和盡以

吞之

○救卒死而壯熱者方

礬石半斤以水一斗半煮消以漬脚

令沒踝

○救卒死而目閉者方

騎牛臨面騎牛ヲ卒死ノ人ノ面ニ臨牛息ヲ以テ生氣ヲ通スナリ荒牛ハ柔和ナラサレハ自由ニナラ

又故能養得タルヲ用ユベトテ騎牛ト謂フ千金方ニ率生
臨鼻上ニ百息牛故必瘥トアリ率牛ト云フモノ養得タル牛ヲ
指スナリ騎牛ニ率牛ヲ
ナド、讀ハ非ナリ

末英ハ英ニ作ルベシ
一本ニ角ニ作ル鼻中立効

○救卒死而張口反折者方

灸手足兩爪後十四壯了了テ飲以五

毒諸膏散方未見或曰
有巴豆者也

○救卒死而四肢不收收用セラレズト云手
足覺ナク遂サル云失便

者方失便ハ二便ハニ覺ズ通スル云
即チ遺尿遺屎ナリ

馬屎一升一本ニ斗ニ
作ル是ナリ水三升煮取二斗

以洗之洗フ又取牛洞稀糞也一升温

酒灌口中灸心下一寸臍上三寸臍

下四寸各一百壯差

○救小兒卒死而吐利不知是何病方

狗屎一丸絞取汁以灌之無濕者水

煮乾者取汁本草白狗屎附方曰小兒霍亂卒
起者白狗屎一丸ヲ用汁ヲ絞テ服之

○尸蹙其狀尸如シ脉動而身脉動テ筋
傷肉瞶スルナリ無氣氣

閉不通昏憤ノ如
無キナリ故靜而死也治方

菖蒲屑內鼻兩孔中吹之今人以桂

屑着舌下

又方

剔取左角髮方寸一本方一寸燒末酒和

灌令入喉立起此方元素問繆刺論二出名古屋氏素問ヲ引テ解ス參考ス

○救卒死客忤死還魂湯主之

千金方云主卒忤鬼擊飛尸諸奄忽氣絕無復覺或已無脈口噤撮不開去齒下湯入口不下者分病人髮左右足

踏肩引之藥下復增取一分須臾立甦

麻黃三兩去節 杏仁七十箇

甘草一兩炙 千金用桂二兩

右三味以水八升煮取三升去滓分令咽

之通治諸感忤客忤人ニオビエ〇卒忤ハニハカニオビエ〇鬼擊ハ鬼排ト同シ鬼屬ノ氣人ニ擊着スル

リ〇飛尸ハ尸病ノ一種ナリ蜚尸トモ云飛走ノ如ク急疾ナリ

又方

韭根一把 烏梅二十枚 吳茱萸半升

右三味以水一斗煮之以病人擲內中

沸ホツレ擲浮者生沈者死者取三升去滓分飲

之

○救自縊死旦至暮雖已冷必可治暮至

金匱要略國子孫

旦小難也小シ治シ難シ恐此當言陰氣盛故也然夏時夜短於晝又熱猶應可治又云心下若微温者一日以上猶可治之方方術ナリ

徐徐抱解解ニキ不得截繩上下安被安被ニテ着

類臥之一人以脚踏其兩肩手少挽

其髮當一本ニ常ニ作ル非ナリ弦弦勿縱之一人以

手按據胸上數動之一人摩拊臂脛

屈伸之若已殭一ニ僵ニ作ル但漸漸強屈之

并按其腹如此一炊頃米米ヲ炊ク頃氣從口

出呼吸眼開而猶引按莫置亦勿苦

勞之須臾可少挂湯挂湯ニテ榮衛ヲ和調スルカ及粥

清瀉清瀉ノ上含與之令濡喉漸漸能嚥吸

一本ニ及ニ作ル非ナリ稍止若向令兩人以管吹其

兩耳一音釋ニ莫兮切深ナリ此法最善無不

活也一本也作レ者

○凡中暍死暑中不可使得冷得冷便死療之方

屈草此草ヲ屈テ輪ノ如クスルナリ瀦外ニ流レヌ為ナリ屈草ナリト謂フ非ナリ中暍死

八道路窮テ卒ナル場ニテ屈草ハ在ル此草ヲ屈テ輪ノ如クシテ帶繞オビテ喝人オホシ臍使オビテ

三、四人溺其中令温温臍ノ法ナリ亦可下用熱子ツ

泥和屈草亦或ハ屈タル草亦可下扣瓦下椀底テイラ

按及車釘亦或ハ瓦ノ椀ノ底ヲ扣ワツテ按ベシ亦ハ車ノ釘モ可ナリ何レモ輪ノ如クニテ小便ノ流レ去ラヌ

以着喝人臍臍本

字ナレ疑クハ須ノ字ノ上ニ不ノ字アラシ令溺須得流去此溺レテ不須得流去

此謂如此謂フ道トハ温ナル溺カ草ヲ屈タル輪ノ中

路窮卒無湯喝人ハ左傳ニモ喝人ヲ概下ニ蔭ト有

當令溺其テ卒ニ煎湯モ無キ故ニ急ニ草テモ藥

中欲使多人溺多人數ニ小取令温若

大湯便可與之不可泥及車釘若シ煎湯

恐此物冷泥モ車釘モ冷喝既在ヤスキ物ナレハ

夏月得然レハ喝ハ既ニ夏月ニ熱泥土煖車

釘亦可用也夏月ナル故ニ泥土モ熱車釘モ煖ナル

救溺死方溺奴歷反

取竈中灰兩石餘以埋人從頭至足

水出七孔即活

右療自縊溺喝之法並出自張仲景為之

其意殊絕殆非常情所及本草所能關本

トハ廣ク醫者ヲ指スノ稱ナリ此ニテハ本草綱目ナトノ書ヲ指ニ非ズ
醫藥ハ草根樹皮ヲ本トスル故ニ華人醫家ヲ指ノ廣ク本草家ト云

實救人之大術矣大術モ鴻術モ同シ
醫術ヲ鳩術ト云フ傷寒家數

有喝病非此遇熱之喝見外臺肘後
此條ヲ見テ

雜療方第二十三柴胡飲子ヨリ以下ハ後人ノ雜錄ナルヲ明ナリ
一本ニ右療自縊溺喝ヨリ非此遇熱之喝ニテ五十一字ナシ○傷

寒家ノ喝ノ義於傷寒
論國字解ニ參考スベシ

○治馬墜及一切筋骨損方見肘後方

大黃一兩切候湯成下ス
一本ニ候ヲ浸ニ作ル非ナリ緋帛如手大
燒灰

亂髮如雞子大
燒灰用久用炊單布一尺
燒灰

敗蒲一握三寸
即蒲席ナリ桃仁四十九枚去皮尖喫
一本ニ喫ヲ熬ニ作ル

甘草如中指節
炙坐

右七味以童子小便量多小煎湯成內酒

一大盞次下大黃去滓分温三服先剉敗

蒲席半領猶言半枚煎湯浴衣被蓋覆斯須一本

史ニ作ル通利數行痛楚立差利及浴水赤勿怪

即瘀血也

禽獸魚虫禁忌并治第二十四

論辨二首 合九十方 方二十三首

禽獸
蟲魚

凡飲食滋味以養於生食之有妨反能有

害一本有自非服藥煉液仙家煉液焉能不飲

食乎切見時人不閑調攝攝言攝疾痰詩

競起莫不因食而生苟全其生食命本

須知切忌者矣スルニ因テ生サルハ莫クモ禁忌ヲ知ラザレハ

所食之味有與病相宜有與身為害若得

宜則益體害則成疾以此致危例皆難療

凡煮藥飲汁藥汁以解毒者雖云救急不

可熱飲諸毒病得熱更甚宜冷飲之

肝病禁辛心病禁鹹脾病禁酸肺病禁苦

腎病禁甘春不食肝夏不食心秋不食肺

冬不食腎四季不食脾辨曰春不食肝者

為肝氣王旺ト同シ脾氣敗若食肝則又補肝

脾氣敗尤甚不可救又肝王之時不可以

死氣入肝恐復魂也復一本若非王時即虛

以肝補之佳餘臟准此肝病以下ハ人ノ五臟ノ病ヲ云フ春不

○凡肝臟禽獸自不可輕噉自死者彌甚○

凡心皆為神識所舍勿食之使人來生復

其對報矣一本作報對○凡肉及肝落地不着塵

土者不可食之○諸肉落水浮者不可食

○諸肉及魚若狗不食鳥不啄者不可食

○諸肉不乾火炙不動見水自動者不可

食之○肉中有如朱點者不可食之○六

畜肉馬牛羊豕犬雞熱血不斷者不可食之熱血出テ、此ス

○父母及身本命肉子年ノ人ハ鼠ヲ食ハサルノ類ナリ食之令人

神魂不安○食肥肉及熱羹不得飲冷水

○諸禽獸五臟及魚投地塵土不汚者不

可食之○穢飯餒肉臭魚食之皆傷人○

自死肉口閉者不可食之○六畜自死及

一本作皆疫死則有毒不可食之○獸自死北

首及伏地者食之殺人○食生肉飽飲乳

變成白蟲血蟲作ル○疫死牛肉食之令病洞

下亦致堅積宜利藥下之其牛肉ヲ下スベシ○肺藏

米雍モクヒ中有毒及經夏食之發腎病

○治自死六畜肉中毒方

黃蘗屑搗服方寸匕

金匱要略卷之五 雜論第五

○治食鬱肉食漏脯中毒方

也漏脯茅屋漏下沾着者是也○肉ヲ風ノ通ス器ニ蓋シテ置テ一宿ヲ隔タル鬱肉食ト云脯ニ雨ノ漏ノ沾着タルヲ漏脯ト云

燒犬屎酒服方寸匕每服人乳汁亦

良飲生韭汁一升亦得

○治黍米中藏乾脯食之中毒方

大豆濃煮汁飲數升即解亦治狸肉

漏脯等毒

○治食生肉中毒方

掘地深三尺取其下土三升以水五

升煮數沸澄清汁飲一升即愈

○治食六畜鳥獸肝中毒方

水浸豆豉絞取汁服數升愈

○馬脚無夜眼者

駿馬肉不飲酒則殺人

○馬肉不可熱食傷人心○馬鞍

下肉食之殺人○白馬黑頭者不可食之

○白馬青蹄者不可食之○馬肉狍肉共

食飽醉臥大忌○驢馬肉合猪肉食之成

霍亂 ○馬肝及毛不可妄食中毒害人

○治馬肝毒中人未死方 未當

雄鼠糞二七粒末之水和服日再服

屎尖者是乃

又方

人垢取方寸匕服之佳

○治食馬肉中毒欲死方

香豉 二兩 即豆豉 杏仁 三兩

右二味蒸一食頃熟拌之服日再服

又方

煮蘆根飲之良

蘆根本草二味甘鮮魚肉河豚毒

○疫死牛或目赤或黃食之大忌 ○牛肉

其猪肉食之必作寸白虫 ○青牛腸不可

合犬肉食之 ○牛肺從二月至五月其中

有蟲如馬尾割去勿食食則損人 ○牛羊

猪肉皆不得以楮木桑木蒸炙食之令人

腹内生蟲 ○噉蛇牛肉殺人何以知之噉

蛇者毛髮向後順者是也

○治噉蛇牛肉食之欲死方

飲人乳汁一升立愈

又方

以泔洗頭飲一升愈

牛肚細切以水一斗煮取一升煖飲

其飲之大汗出者愈

○治牛肉中毒方

甘草煮汁飲之即解

○羊肉其有宿熱者不可食○羊肉不可

共生魚酪食之害人○羊蹄甲中有珠子

白者名羊懸筋食之令人癩○白羊黑頭

食其腦作腸癰○羊肝共生椒食之破人

五臟○猪肉共羊肝和食之令人心悶○

猪肉以生胡荽牛山翁曰和俗呼古惠年同食爛

人臍○猪脂不可合梅子食之○猪肉和

葵食之少氣○鹿肉不可和蒲白作羹食

之發惡瘡○麋脂及梅李子若妊婦食之

令子青盲男子傷精○麋肉一本作麋不可合

蝦及生菜梅李果食之皆病人○痼疾人

不可食熊肉令終身不愈○白犬自死不

出舌者食之害人○食狗鼠餘令人發瘦

瘡瘡或作漏又作痛凡癰疽久不愈者宿膿府肉其

瘡間二停畜穴ヲ穿一必深ク缸瓦漏孔アルガ如シ故ニ漏ト名

肺癆蠶瘻心浮疽瘻臍瘻癰瘻腎轉脉瘻小腸以上九種アリ又三

十六種ノ瘻アリト云

○治食犬肉不消心下堅或腹脹口乾大

渴心急發熱妄語如狂或洞下方

杏仁一升合皮右一味以沸湯三升和取汁分三服利

下肉片大驗

○婦人妊娠不可食兔肉山羊肉及鰲雞

鴨令子無聲音○兔肉不可合白雞肉食

之令人面發黃○兔肉着乾薑食之成霍

亂○凡鳥自死口不閉翅不合者不可食

之諸禽肉肝青者食之殺人○雞有六

翻四距者不可食之○烏雞白首者不可

食之○雞不可共胡蒜食之滯氣雞子云

金匱要略卷之五

山雞不可合鳥獸肉食之○雉肉久食之

令人瘦○雞卵一本作鴨卵不可合鰲肉食之○

婦人妊娠食雀肉令子淫亂無耻○雀肉

不可合李子食之○燕肉勿食入水為蛟

龍龍類所吞一本吞作噉

○鳥獸有中毒箭死者其肉有毒解之方

大豆煮汁及鹽汁服之解

○魚頭正白如連珠至脊上食之殺人○

魚頭中無腮者不可食之食之殺人○魚

無腸胆者不可食之食之三年陰不起女

子絕生○魚頭似有角者不可食之○魚

目合者不可食之○六甲日勿食鱗甲之

物○魚不可合雞肉食之○魚不得合鷓

鷄肉食之○鯉魚酢不可合小豆藿食之

其子不可合猪肝食之害人○鯉魚不可

合犬肉食之○鯽魚不可合猴雉肉食之

一云不可合猪肝食之○鯉魚不可合鹿肉

食之令人筋甲縮一本不可二字作食之生食二字○青

本草經卷之五 雜論

魚酢不可合胡荽及生葵並麥中食之○

鱈魚不可合白犬血食之○龜肉不可合

酒菓子食之○鰲目_{即子腹}陷者及厭下_{即子腹}

有王字形者不可食之又其肉不得合雞

鴨子食之○龜鱉肉不可合莧菜食之○

蝦無鬚及腹下通黑煮之反白者不可食

之○食膾飲乳酪令人腹中生蟲為瘕

○膾食之在心胸中_{一本作間}不化吐復不出

速下除之久成瘕病治之方

橘皮 一兩 大黃 二兩 朴硝 二兩

右三味以水一大升煮至小升頓服即消

○食鱠多不消結為瘕病_{瘕音征即瘕瘕音ナリ}治之方

馬鞭草

右一味搗汁飲之或以薑葉汁飲之

升即消_{即一本作亦}又可服吐藥吐之

○食魚後食毒兩種煩亂治之方

橘皮濃煮汁服之即解

○食鱖魚中毒方

蘆根煮汁服之即解

○蟹目相向足斑目赤者不可食之

○食蟹中毒治之方

紫蘇煮汁飲之三升

紫蘇搗汁飲之亦良

又方

冬瓜汁飲二升食冬瓜亦可

○凡蟹味遇霜多毒其熟者乃可食之

○凡蜂蠅蟲蟻

等集食上食之致瘦前詳

菓實菜穀禁忌并治第二十五

菓實
菜穀
禁忌

菓子生食生瘡○菓子落地經宿蟲蟻食

之者人大忌食之○生米菜停雷多日有

損處食之傷人○桃子多食令人熱仍不

得入水浴令人病淋瀝寒熱病○杏酪不

熟傷人○梅多食壞人齒○李不可多食

令人臃脹○林檎不可多食令人百脉弱

○橘柚多食令人口爽不知五味○梨不

可多食令人寒中金瘡產婦亦不止食

櫻桃杏多食之傷筋骨○安石播不可多

食損人腹一作肺○胡桃不可多食令人動

痰飲○生棗多食令人熱渴氣脹寒熱羸

瘦者彌不可食傷人

○食諸果中毒治之方

猪骨 燒過

右一味末之水服方寸匕亦治馬肝漏脯

等毒○木耳赤色及仰生者勿食○菌仰

卷及赤色者不可食

○食諸菌中毒悶亂欲死治之方

人糞汁飲一升土漿飲二升

大豆濃煮汁飲之服諸吐利藥並解

○食楓柱菌而哭一作笑不止治之以前方

綱目楓菌有毒食之令人笑不止○誤食野芋煩

地漿解景弘今按スルニ加豆良乃歧○誤食野芋煩

毒欲死治之以前方其野芋根山東人名魁芋人種芋三年不收亦成野芋並

殺人和ニクハスノ○蜀椒閉口者有毒誤食之戟人咽喉氣

病閉本作閉欲絕或吐下白沫身體痺冷急治

之方

肉桂煎汁飲之多飲冷水一二升或

食蒜或飲地漿或濃煮豉汁飲之並

鮮

○正月勿食生菜葱令人面生遊風即游面風

生濃○二月勿食蓼傷人腎○三月勿食

小蒜傷人志性○四月八月勿食胡荽傷

人神○五月勿食韭令人乏氣力○五月

五日勿食一切生菜發百病○六月七月

勿食菜萁傷神氣○八月九月勿食薑傷

人神○十月勿食椒損人心傷心脉○十

一月十二月勿食薤令人多涕唾四季勿

食生葵令人飲食不化發百病非但食中

藥中皆不可用深宜慎之○時病差未健

食生菜手足必腫○夜食生菜不利人○

十月勿食被霜生菜令人面無光目澁心

痛腰疼或發心瘡瘡發時手足十指爪皆

青困委即チ困葱韭初生芽者食之傷人

心氣飲白酒食生韭令人病增生葱

不可共蜜食之殺人獨顆蒜彌忌棗合

生葱食之令人病生葱和雄雞雉白犬

肉食之令人七竅經年流血食糖蜜後

四日內食生葱韭令人心痛夜食諸薑

蒜葱等傷人心蕪青根多食令人氣脹

薤不可共牛肉作羹食之成瘕病韭亦

然蕪多食動痔疾野苜不可同蜜食

之作內痔白苜不可共酪同食作蠶蟲

黃瓜食之發熱病葵心不可食傷人

葉尤冷黃背紫莖者一本紫勿食之胡荽

久食之令人多忘病人不可食胡荽及

黃花菜正月七種芋不可多食動病妊

婦食薑令子餘指蓼多食發心痛蓼和生

魚食之令子奪氣陰效疼痛芥菜不可

共兔肉食之成惡邪病小蒜多食傷人

心力

○食躁或躁方

食躁ノ躁ノ字疑クハ躁ノ字オラニ字書ニ躁ハ蘇カ反糸膏臭トアリ此アアラクサキ物ヲ食ノ煩躁スルナラニ一本作噪ハ呼ナリイヨ一通

鼓濃煮汁飲之

即チ豆鼓ナリ飲之ヲ吐出セシムルニ取ルカ

○鈎吻

和名大ヅワリ和漢三才圖會ニ詳ニ辨ス參考スベシ

與芥菜相似誤

食之殺人解之方

肘後云與菜莢食芥相似一本此十字ナレ是ナリ

薺茺

ハ兩○丹家和名撰ニ和名佐支久佐二八月採根乾ス人參ニ似タリ汪昂日奸賈多用乱入參時珍日即甜桔梗ナリ

右一味以水六升煮取二升分温二服

生地ノ有毛者以他草其莖別之

○菜中有水蓑若

和名撰ニ日味苦寒有毒和名於仁比留久佐五月採實四月開

花紫色苗莖有白毛有殼如石榴

葉圓而光有毒誤食之令人

狂亂狀如中風或吐血治之方

甘草煮汁服之即解

○春秋二時龍帶精入芥菜中人偶食之

為病發時手背腹滿痛不可忍名蛟龍病

治之方

硬糖

ニニ升 水砂糖堅白如水故曰硬糖

右一味日兩度服之吐出

如蜥蜴 蜥ハ先的及蜴羊益反多識

篇ニヤト 二一五枚瘡

○本神綱目苦蘗ノ條下二時珍云芥菜水涯ニ生ス蚊蚋ノ變化測ナシト

云トイヘ其精ナシ此ニ入テ得ニ大抵是ハ蠍蝎虺蛇ノ類春夏ノ交精ヲ此ニノコス故ノ三且ツ蛇喜テ芥ヲ嗜ム尤證スベシト

○食苦瓠中毒治之方

梨穰一本作梨煮汁數服之鮮

○扁豆寒熱者不可食之○久食小豆令人

人枯燥○食大豆屑忌噉猪肉○大麥久

食令人作癰○白黍米不可同飴蜜食亦

不可合葵食之○苽麥麵蕎麥多食之令人

人髮落○鹽多食傷人肺○食冷物冰人

齒○食熱物勿飲冷水○飲酒食生蒼耳

令人心痛○夏月大醉汗流不得冷水洗

着身及使扇即成病○飲酒大忌灸腹背

令人腸結○醉後勿飽食發寒熱○飲酒

食猪肉臥穰穰中則發黃○食飴糖飲

酒大忌○凡水及酒照見人影動者不可

飲之○醋合酪食之令人血瘕血瘕ハ婦人ハ瘕ノ一種ナリ病源候論

○食白米粥勿食生蒼耳成走症走症ハ注病ノ一種ナリ邪氣血ニ隨テ行キ或ハ皮膚ニ淫奕

ノ去來擊痛シ遊走ノ常ノ處ニアルナシ故ニ名ツク

○食テ甜ニ粥ヲ已ハ食ハ鹽ヲ即チ吐ス○犀角筋攪ニ飲食ニ沫ヲ出テ及テ澆レ地ニ墳キ起ス者ヲ食ハ之ヲ殺ス人ヲ

○飲食中ニ毒ニ煩ニ滿ス治ス之方

苦參 三兩 苦酒 一升

右二味煮ニ三沸ヲ三上ニ三下ニ服ス之ヲ吐レ食ヲ出テ即チ

差イ或以テ水ヲ煮ル亦モ得ル○又方犀角湯モ亦モ佳シ

○貪ム食ヲ多ク不レ消ス心腹堅ク滿チ痛ム治ス之方

鹽 一升 水 三升

右二味煮ラ令ニ鹽ヲ消ス分テ三ニ服ス當ニ吐シ食ヲ出テ便チ差イ

○礬石生ニ入レ腹ニ破ル人ノ心ノ肝ノ亦モ禁ス水ヲ○商陸

以テ水ヲ服ス殺ス人ヲ○葶藶子丹波康賴和名撰曰味辛苦大寒有毒和名波末太

加奈又安之奈川奈又末世利立夏後採實陰乾傳ツ頭ツ瘡ニ藥ニ氣ヲ入レ腦ニ殺ス人ヲ

○水銀入レ人ノ耳ニ及テ六畜等皆死馬牛羊豕犬雞謂之六畜

以ニ金銀着ラ耳邊ニ水銀則チ吐ス○若ク練川練

即チ金鈴子ナリ無キ子者殺ス人ヲ○凡ソ諸毒多ク是ハ假ラ毒ヲ

以テ損ス元ヲ知ル時ニ宜ク煮テ甘草薺ノ花ノ汁ヲ飲ム之ヲ薺花前ニ解ス

通治諸毒藥通治一本作除

金匱要畧國字解卷之五終 大尾

金匱要略國字解跋

知非齋先生嚮者寓居浪華

著傷寒論解金匱要畧解傳

以國字使童兒輩易曉焉其

傷寒論解全部金匱要畧解

初編刻成予嘗於橋本氏一

金匱要畧國字解

金匱要畧國字解

卷之三

三三

讀之則取理解於先醫做氣
 脈於古文未嘗睥睨於程尺
 之內今也盛行於海內則震
 耀鏗錡堂無所用予之讚述
 矣噫雖起方成二子面與之
 讎問莫能難也其方術精良

亦可以概見焉定寬夙聞劉
 李朱三家說而以未得長沙
 氏之旨趣為恨前輩有云鑿
 而不讀傷寒金匱五書則不
 能深知經方之妙也方今得
 先生之此解且暮讀之疑網

金匱要略原字解

跋

氷釋條分縷析其思亦過半
矣。嗚呼先生博涉古今而其
用意於醫也自有高一等工
夫而猶笑之不可階而升也
尤於長沙氏術得其宗矣蓋
學軒岐之道者必熟讀吾先
生之解而入其門升其堂則
不翅救世之病者自正粗工
庸手之錯認後世雜說而誤
治者也亦多矣然定寬嘗憂
此書之不完今茲安永戍戍
歲請刻中後編而後先生聽

之今也得其全焉定寬雖不
敏謹加一語干簡端焉恭惟
先生此解猶渴飲饑食夏葛
冬裘之不容已必不待擬議
也覽者宜辨知焉予先為其
證云

安永戊戌孟夏

門生浪華鈴木定寬謹跋



安永九年庚子四月

書林

同	浪華	同	同	同	京師	江府
同	鳥飼市兵衛	同	梅村三郎兵衛	山本長兵衛	出雲寺文次郎	須原茂兵衛
同	系舍市兵衛	同	中野宗左衛門	山本平左衛門		

三都

發行

書肆

江戸芝神明前
岡田屋嘉七

全淺州茅田二丁目
須原屋伊

全日本橋二丁目
山城屋佐兵衛

全京寺町森原下九丁目
須原屋茂兵衛

大改心後橋通壹丁目
秋田屋太右衛門

勝村治右卫門

