





門中武  
第 177  
卷 3

叢桂亭醫事小言卷之三目錄

脚氣

水腫

轉胞

痢

癰

霍亂

淋

痔

積聚

諸瘡內攻

泄瀉

中暑

下血

奔豚

伏瀼

虫積



醫事小言卷之三

叢桂亭藏



心痛  
疝 寸白

叢桂亭醫事小言卷之三

南陽原先生口授

門人

東毛

本田

恭筆記

北總

大橋

信 校正

脚氣

脚氣ハ中世治療ノ法ヲ失ヒテ唐ニモ其沙汰ウスクナリ  
タリ隋唐ノ頃ハ其名モ多ク載テ脚弱又緩風或風毒脚氣  
ナト、云千金ニ頑弱名緩風疼痛スルヲ爲濕痺ト見ユ皆  
古名ニ非ス左傳ニ韓獻子曰郇瑕氏土薄水淺其惡易覲易  
覲則民愁民愁則墊隘於是乎有沉溺重腿之疾ト是ハ脚氣



ノナラン又陸遜上疏曰鬱霧冥其上鹹水蒸其下善生流  
腫轉相洿染胡三省註曰流腫者謂毒氣下流足爲之腫古人  
謂之重腿今人謂之脚氣ト見ユ流腫ノ名ハ皇甫謐傳浮氣  
流腫四肢酸重ト有又古今錄驗ニ水氣病ニ入ハ非也素問  
刺瘡篇曰風痺瘡發則汗出惡風刺三陽經背愈之血者筋痠  
痛甚按之不可名曰附髓病以鑱鍼鍼絕骨出血立已是ハ瘡  
ニモ云通リ瘡後脚氣ニナル者多シ附髓病モ脚氣ノナ  
ラン何故後世此名ヲ唱ヘサルヤ此病水腫ト混雜ニナリ  
其療法モ不詳トニ至レリ金匱ノ痲飲篇ト水氣篇トニテ  
見合テ治法ヲ運用スヘシ何故痲飲ノ藥ニテヨロシキナ

レハ留飲モ胸腹ニ水ヲ畜ルノ病ナルカ故ニ同方ニテ有  
驗ナリ一方ニテ數病ヲ治スルノ使樣是等ニテ味ヘシル  
ヘシ内經ノ厥論ハ大半脚氣ニ似タリサレ氏適當セサル  
所有厥ノ義ハ偶記ニ詳ニ考タレハ是ヲ讀テ見ルヘシ衝  
心スルトコロ此病ノ持前ニテ治方ニモ目利ニモ骨ノ折  
ル所ナリ千金外臺ニ其門ヲ分テ治方モ多ク載タレ氏病  
候ハ一々ニトリキマリナシ江戸ニ松井材庵ナル者脚氣  
論ヲ著シ諸書ノ論ヲ輯メ評註シタルモノアリ又源養德  
ナル者脚氣類方ヲ著シ廣ク脚氣ノ方ヲ輯メタリ二書ニ  
テ療治ノスムト云ニハ非ス此二人ノ本邦ニテ脚氣ヲ



唱へ始タルニ非ス脚氣ノ世ニ唱ル人ノ多キ故ニ思付テ  
著述シタルナラシ脚氣ヲ説キ初テ其治ニ妙ヲ得タリト  
云シハ東洋先生ナリトツサテ又脚氣ハ公侯富貴人常ニ  
膏粱ヲ食シテ身ヲ勞セヌニ作ルト云是モ一因ニハアレ  
又貧賤ノ人ニモアリ必膏粱ノミテ作ルトカキルヘカラ  
ス傷寒ノ後或ハ瘧疾又ハ痢ノ後産後ニモ作ル又下疳ヲ  
患テ後ニ多ク作ル骨疼ナリトテ治ヲ誤ルコトアリ意ヲ付  
テ見ルヘシ其因ハ瘀血アル人食ニヨリ又脛ヲ風寒ニサ  
ラシ濕ヲ合セテ發ス壯實肥態ノ人ナニトナク腹滿シテ  
長座ナトスレハ麻スルコト有リ一體麻スルコトハ久シク居

シケハ順流スル氣ヲ留メテシビレルモノナレト夫レト  
違ヒテ少ノ間座シテモシビレ小坂ヲ登リテモ息切レル  
カ又少シ動テモ息切レ足ハ遠行シテ草臥タル心地シテ  
何トナクタルク覺或ハツマサキノカヘリ惡キ故ニ少シ  
ノ物ニモ躓ツマキ又草履ヲ着ルニ手傳ナクテハナラス又ハ  
ヌクルヲ不覺甚ハ脚疼テ起コ不能是其候ナリ此時脛ヲ  
按シテ見レハ指ノ跡ツクモノナリ腫ノ少キハ外面ヨリ  
ハミヘス強ク按シテ後輕ク撫テミレハ指頭ノ跡皮下ニ  
凹テアルモノナリ水腫モ始ハ如此是レ其催シニテ四五  
月ヨリ八九月ニ多ク寒來レハヤム一二年モ催シテ夏ニ



ナレハ癰セナリナト、云ハ脚氣ナレ氏幸ニ夫ナリテス  
ム人モアリ終ニ脚氣ノ形アラハレルコト有リ以上ノ容體  
脚氣ノ初起ニハ千金ニモ外臺ニモ載タル八種ノ灸ヲス  
ヘシ氣根届テ日灸或ハ月々ニ灸シテ一二年ヲ過テ其候  
ヤム人アリ數々試テ効ヲ得タリ又年々腫ル人ハ八味丸  
ヲ連服シテ食モ梁肉ヲ省テ淡薄ニスヘシ是亦數々試験  
ナリ何レ夏月ニ多キ病ニテ是全ク瘀血濕ニ逢テ發スル  
所ナリ凡足ニ無力草臥タル心ニテ微腫ヲ帶タルハ猶更  
微腫ナクトモ常ニ灸スヘシ熱ヲ不覺ハ毒深シハ種皆灸  
輕キハ八種ノ内三里風市承山等ヲマキノ、ニ灸スヘシ灸

シナカウ三因方ノ六物附子湯ヲ用足ノ不自由ニ專ニ用  
又腹攣急シテ痺レルニハ桂枝加苓朮附湯足ニ腫ナクト  
モ初ヨリ氣急ナル有最可懼ノ候ナレハ油斷ナク診スヘ  
シ即衝心ノ兆也其初ハ何故モナク遠行シテ草臥タル心  
地ヲ初症トスル故ニ第一ニ問テ案ニ備フヘシ脾胃虛ノ  
候ノ四肢倦墮トナシテ補フヘカラスサテ夫レヨリ脛ノ  
内廉腫レテ重ク腓肉ノ真中ノ筋ガ引ツリ痛ム夫レヨリ  
引テ腹ノ兩傍攣急シテ起居ニモ息切レシテ冉々ニ腫氣  
モ増ス時ニ其腫ノ堅キハ治シ難ク軟ナルハ治シ易シ是  
ハ水腫モ同シコトナリ如何ト考ルニ堅キハ肉ノ間ニ水ヲ



畜ルトミヘ軟ナルハ皮下ニ水ヲ畜フトミヘタリ其膚ノ  
色水々トシテ潤澤ナルハ此レ皮水ノ腫故ニ治シヤスシ  
其腫平身ノ肌ノ如クニテ肥タルカ如ク膚潤ナキハ治シ  
難シ是ヲ腫ノ看法トナス醫書ニ軟ハ虚腫鞭ハ實腫トナ  
スハ理窟ハカリ也微寒熱ヲ帶舌上ニモ胎アリテ渴シ小  
便不利咳喘脚弱ハ形ノ具リタルナリ是越婢加朮湯ノ証  
ナリ越婢ハ咳渴ナクトモ脚弱ハカリニモ用ユルヲアレ  
氏胡洽方ニ從テ加附子ニスルヲ良脚ニメクリヨソケル  
爲ノナリ又熱毒内ニ鬱タルニ加犀角用テ度々驗ヲ得タ  
ルヲ有氣急衝心ノ勢ハケシキハ平水丸甘遂丸ノ類ヲ三

四五分見計ニテ用テ其急ヲ救ハ子ハナラズ一旦下リテ  
モ亦前狀ヲナスハ再ヒ下ス其時ハ目方ヲ増サ子ハ藥力  
ナシ是ハ急ヲ救ノ權道ニテ下シテ腫ノ引タルハ日ヲ經  
テ又立歸ルモノ多シ小便快通シテ腫ノ引ニ非レハ真ノ  
治ニアラズ下スハ是非ナキ術ト思フヘシ下サレタ張合  
ニテ小便順利スルヲモ有ルナリ是ハ前日ヨリ目利ハナ  
シ用テ知ル也又項頸或ハ手足胸間ナトニ小サキ瓜ニテ  
モ押付タル如ク別ニムツクリト腫ノ有ルヲアリ是水腫  
ノ偏ニ腫ノ多キト似テ異ナリ大ニ可懼其筋如何ト云ニ  
一體ハ滿タズニ如此ニ聚ルハ毒ノ結タルナリ衝心急ナ



ルモノナリ小便赤澁大便難服藥効ナクハ難治トスヘシ  
衝心スルハ次ノ間ニ居タル人ノ馳付モ間ニアハヌホト  
ニ急ナルモノアリ椶椰子ノ末ヲ童便ニテ服スヘシ椶榔  
子ハ兼テ製シタルハ無効臨時ニ製スヘシ大抵一度ニ一  
錢半モ用ユヘシ黑豆煎汁ニ童便ヲ和シ用ルモ良又生姜  
汁モ加又黑豆湯モ用ユヘシ桃花ハ心下一寸ハカリ下ニ  
動悸アルニ用十棗湯ハ胸膈ノ痛ムヲ目アテニ用ユ皆衝  
心ヲクキクヘシ凡小便黃赤ハ不利ノ兆清ノハ快通ノ候  
トス故ニ便量少クトモ清便ニナリタラハ不日ニ通シノ  
付ト思フヘシ又米泔ノ如ク白キ小便ナルハ虫積ノ候ト

ス脂ノ如キハ失精家ニ属スハ味丸ヲ煎服スト芟凶湯ナ  
リ是ハ水腫モ同候ナリ夫レ心下ニ堅ク塊ノ如ク凝リ小  
腹ナトニハ格別ナルヲモ不見或ハ手足ニモ腫ナキ所モ  
アリテ常ニ異ナルヲ有ハ先水腫ニハ稀ナリ木防己加  
茯苓芒硝湯ナリ本方ニハ去石膏トアレ氏熱渴ナト有ハ  
去ニモ不及周身軟ニ腫テ呼吸ニ礙ウスキハ防己黃耆湯  
ナトニテヨシ黃耆ハ水道ヲ通皮水ヲ散シ表ヲ温メルユ  
ヘニ皮膚ノ不仁スルニヨシ風水脉浮身重汗出惡風者ト  
アルハ肌表ニカケテ用ユルノヲナリ微寒熱シテ氣血凝  
滯シテ腫レタルハ九味椶榔湯ナリ咳ノツヨク出タルハ



豁曾湯犀角ヲ用ユル腫ハ痰毒内ニ鬱シテ熱胸膈ヨリ肩背ヲ牽シメル如キニ用一角ハ上衝スルニ用又衝心ニモ用ユヘシ水腫モ同又周身腫テ足重ク氣急シテ平臥ナラス腫色潤ナク見ユレモ腫軟ニテ皮水ニシテ胸間ニモ腫満シ膚色ハ如常見ユルニハ相皮湯ヲ用ユヘシ吳茱萸ハ中脘ノ處ニ見所アルヘシ鯉魚湯ヲ脚氣ニモ用ユルヲアリ俄ニ足ノ痿テ起歩スルヲナラヌハ痿痺ノ症モアレハ諸候ヲ診シテ治シアヤマルヲナカレシカシ痿痺ニモ脚氣ヲ帶フアルモノナリトウシテモ無驗ニ化毒丸ヲ少々ツ、兼用スヘシ方ハ下疳ニ見ユ

胸ヨリ喉ニモ腫アレハ音聲物ヲフクンテ言フカ如シ凶兆ナリ水腫同シク凶トス○腫少々數日ノ不利ニテ甚堅ク腫煩渴スルハ是水毒内ニ伏スルナリ衝心甚急ナリ○平臥スルヲナラヌハ衝心ノ候ナリ肩息スルハ衝心○胸間動氣強ク人迎ノ脉アラハニユルハ衝心ノ候○腹候ニ心得テ衝心ヲハカルヘシ呼吸ノ應ニテ知ルヘシ○言語ニ息ノ不足トタノイキスルノ類ハ皆衝心ス○手足心ノ平ニナルホトニ腫タルモ缺盆ノ平ニ腫タルモ惡症ナルハ水腫ト同シ煩渴黑胎ハ白虎ニモ承氣ニモナルヘシ熱ヲ帶タルハ水腫ニハ少シ大半脚氣ニ屬ス承氣ハヤハ



リ本方證ニテ腹滿ヲ第一トスヘシ白虎ハ一時ノ渴ニ用  
ユ小便不利ノ渴ハ其方多端ナレハ爰ニ語盡カタシ産後  
ノ水腫ハ常ニ多キ症ナレハ是ニ脚氣多キナリ多クハ脚  
弱ニナル又脚氣ノ人年高ク壯實ナルハ中風ノ姿ヲ兼テ  
ルアリ中風ノ中ニ脚氣ヲ兼タルアリ皆急ニ衝心セス緩  
風ノ名ニアタルナレハ一體脚氣ハ衝心スルヲ本証ナレ  
ハ必意ヲ加フヘシ附子ノ証多シ腎氣丸ニ脚氣入腹少腹  
不仁ト云フ有ルハ強キハ臍上マテ弱キハ臍下ヲ按スル  
ニ麻痺シ他人ノ肌ノ如クナルモノナリ全快ハルニ隨テ  
段々ニ覺出ルナリ又水土ニ服セスニ患ルアリ東門隨筆

ニ叡山御修履ノ普請小屋ノ人夫共一般ニ風毒腫ヲ病タ  
ル事ヲ記ス是ハ軍國ノ時ニハ必スアルヲニテ大人數ヲ  
動ス時此手當ヲ心得ヘキヲナリ後魏武帝大通三年侯景  
圍建康閉城之日男女十餘萬擐甲者二萬餘人被圍既久人  
多身腫氣急死者什八九棄城者不滿四千人皆羸喘橫尸滿  
路又同年東魏攻潁川長社城中無鹽人病攣腫死者什八九  
又隋煬帝大業元年劉方征林邑士卒腫足死者什四五方亦  
得病卒於道後梁紀晉王曰劉剽長於襲人短於決戰計彼行  
纔及山下亟發騎兵追之會陰雨積旬黃澤道險堇泥深尺餘  
士卒援藤葛而進皆腹疾足腫死者什二三又燕王守光奔滄



洲涉寒足腫醫宗金鑑ニ青腿牙疳ト云病門ヲ出セリ北路  
隨營醫官陶起麟其治方ヲ云内地人初居邊外得此證者十  
居八九蓋中國人不耐邊外嚴寒更坐臥濕地致腿青腫内體  
頑硬步履艱難又緣缺少五穀多食牛羊等肉胃火上熏致牙  
疳トアリ粵蝦夷地ニ長ク居ル人氣急脚腫レテ死スルモ  
ノ多ト是即脚氣也金鑑ノ説ニ似テ牙疳ノ事ハ未聞及加  
味ニ妙湯等ノ方ヲ出セ凡皆脚氣ノ手段ニテ互シ  
一婦人十七八鬱々トシテ人ニ對スルコトヲ忌ミ夜睡ルコ  
トナラス及曉睡リ食乏ク其他苦ム所ナシ起步スルトキハ  
氣急ナリ花月ノ時ニ遊行ヲ勸ムレ凡不出一二醫皆鬱滯

或ハ言フ勞ノ催シト因テ藥ヲ投ス四華ニ灸スルコト二三  
千壯一佳處ナシ人々不治トナシ其身モ勞ナリト思テ一  
日増ニ元氣モナク余ヲシテ治セシメント乞フ脉不數寒  
熱モナシ腹部兩脇ニツキテ二道ノ大絡張リテ有月信モ  
常ニ不異外ニ考フヘキ証モナケレハ右ノ絡ヲ強ク按シ  
タレハ脚ニ引テ痛ム仍テ脚カヲ尋ヌルニ毎朝起ルトキ  
ニ雙脚麻木シテ急ニ起ルコト不能暫ク按摩シ屈伸數篇ニ  
テ能ク起步スト云是ヲ第一ノ主証ナリ速ニ承山三里へ  
灸ス痛ヲ不知脛モ腫ハナシ是ヲ脚氣トイハ人誰カ是  
ヲ信セシ六物附子湯ニテ數十日ヲ經テ治シタリ遊行ヲ



嫌ヒシハ脚力ノ惡シキ故ナラシニ兒女子故ニ明辨セヌ也

一商痢後浮腫脈洪大數醫ヲ經腫消シ飲食モナリ既ニ百日ニナラントスレ氏兩脚痿弱シテ起歩スルヲナラズ脛ノ表ニ堅ク結タルカ手掌ホトニナリテ有按セハ痛ムト云予診脈スルニ平ナレ氏ヤ、モスレハ一止ス呼吸ハ何ノヲモナシ腹ハ急ニテ脊ニツキタレ氏極メテ惡シキハカリニナシ圍碁或ハ彈弦ナトシテ居ル予桂枝加苓朮附湯ヲ與フ一夕俄ニ足ノ凝タルモノ散シテ兩脚自由ニナリタルト歡フ及暮ト乍ニ呼吸塞迫シテ轉倒煩躁シテ死

タリ是ハ一向ニ衝心スルノ急ナルヲハ見付サリキ

一婦人常ニ脛ニ凝結シタル肉有リ腫物愈タル跡ノ核疣ノ如キ手サハリニテ長ク小判ホトナルカ左右ニアリテ夏月ニナレハ年々周身微腫脛モ不利ナルヲ四五年ナリ予即チ八種ノ灸ヲ教テ凡千餘壯ス腫レテ結シタルモ軟ナリ明年又凝リテ靱シ腫ヲ催スヲ前日ノ如シ又灸ス是レヨリ三里ハ痕ヲシテ愈ヘサラシム終ニ全愈セリ前條ノ商人ヲ見タルハ十年前ニテ予カ技猶未及ノ時ナリキ今再考シテ灸セサルヲ思ヘハ氣將昏

一商脚氣ヲ患フ咳嗽甚シ一身皆腫呼吸迫シテ衝心ノ兆



アリ越婢加朮附ヲ與フ無驗豁胸湯ニ轉ス又無驗甘遂丸  
 ヲ與フニ下利セス一日俄ニ嘔逆シ水藥共ニ不受氣息急  
 迫平臥スルヲ不能坐シテ脊ヲ按摩スルニ陰囊腫脹シテ  
 寸時安キヲ不能其嘔甚ヲ以テ小半夏加茯苓ヲ投ルニ飲  
 受タリ次日依然タレ氏嘔吐少シヤム故ニ連服スルヲ三  
 日許嘔逆止ミテ粥ヲ食ス小便清利スル故猶前方ニヨル  
 追日快利腫モ隨テ消シ呼吸穩ニ平臥スルヲ得タリ餘  
 リ其功アル故ニ前方ヲ守ル三十日許ニテ全快シタリ  
 鯉魚湯 療脚氣上氣引湯脉大者水腫ニモ用ユ何レモ腫  
 ニ光リテ艶アルヲ治ス

生鯉魚一尺者去腸洗淨

右以水六合煮至三合去鯉服一合日二夜一凡服用漆器

生柚皮獨活芽山椒等隨好入之爲避腥臭故也

九味栝榔湯 理脚氣氣血凝滯者

栝榔 橘皮 桂枝各五分 木香 大黃

紫蘇 厚朴 枳實各四分 生姜五分

右九味煎服

黑豆湯 治脚氣衝心周身洪腫者

黑豆八錢 去皮 桑根白皮五錢 栝榔五錢 郁李一錢 去皮

右四味以水四合先煮黑豆減二合內諸藥取一合日三劑



豁胸湯 理脚氣衝心方

吳茱萸 桑白皮 茯苓 犀角

右四味以水二合煮取一合分服

桃花散並湯見水腫大承氣湯 十棗湯 防已湯以上湯寒論

越婢湯 腎氣丸以上金匱要略六物附子湯方平水丸見轉胞

紫圓見小門桂枝加苓木附湯桂枝湯中加三味也方相皮湯 甘遂丸

灸 八種 三陰交 承山 風市 三里

伏兔 八種ノ灸法ノ外ニ一穴ツ、スユルヲモ有病

ノ輕重ニヨレリ八種ハ風市伏兔膝眼犢鼻三里上廉下

廉絶骨ナリクハシクハ經穴彙解ニ出セリ

水腫 諸瘡内攻

水腫ノ名ハ水熱穴論ニ出テ又水病トモ水氣水脹。胛腫。浮

腫。腫脹。風水。涌水。徒疔。石水等ノ名素靈ニ出又金匱ニ皮水。

正水。裏水。氣水。心水。肝水。肺水。脾水。腎水等名ヲ出シテヨリ

病源論千金等ニ至リ五腑水アリ又五水十水十二水十八

水二十四水八十種ノ水氣等種々ノ名目多シテ數カタク

又覺ヘルヲモナラス例ノ通唐ノ人ノ文華ニテ思イ思イニ

名ヲケテ今日ノ治理ニ一向ニ用ニ立タス皆其病因ヲ

ハ擊スシテ外候ニテ名ヲ付タルモノ多ケレハナリ其委

キハ此所ニテ語リ盡スヘカラス一通リハ諸書ヲ讀子ハ



ナウス猶奇驗ノ良方モ見付<sup>ク</sup>吾業ノ第一ナリ素問靈樞ノ  
論ハ水腫ト鼓脹ト混雜ニナリテ有レハ其場ニテ見分ヘ  
シサテ水腫ハ夏月ニ多シ小便イワトナク不通ニナリテ  
ソロク浮腫ス是ヲ治シヤスキ一通ノ水腫トス素問ニ諸  
有水氣者微腫先見於目下也トアリ又靈樞ニ水始起也目  
窠上微腫如<sup>ニ</sup>新臥起之狀其頸脉動時咳陰股間寒足脛腫腹  
乃大其水已成矣以手按其腹隨手而起如裏水之狀此其候  
也トアリ手ニテ按セハ凹ニ指ノ跡見ユレ氏間モナク起  
リテ初ノ如ニナルハ實ニテ吉イワマテモ凹ニナリテア  
ルハ虚ニテ凶ト云フ古來ノ說ナリ指ニテ推セ氏一向ニ

指ノ跡ツカヌハ水腫ニハアラス何ニ病ニモセヨ肥立カ  
子テ腫ニナルハ本病ノ輕重ニテ水ノ治モ驗不驗アリ先  
ハ痲病ヲムリニ止或脱血癰瘡潰膿虚損失精産後ナトノ  
氣血不調シタルヨリ發スルモノ多シ飲酒過度ニテ常ニ  
痰喘ナトアリテ終ニ腫ルヲ酒腫ト名ツク痰飲ニ属スレ  
氏水腫ナリ一旦ニ發セヌハ治シカタシト思ヘシ心下ニ  
コリヲ催シ有モノ乃毒ナリ是ニハ四君子湯ニ犀角吳茱  
萸ヲ加テ用ユヘシ又心下ニ堅支結シ塊ノ如ニテ縁ニハ  
指ノカ、ルホト際タツアリ金匱ニ出タル氣分心下堅  
大如盤邊如旋杯水飲所作桂枝去芍藥加麻黃附子湯主之



ト云モノナリ此症下スヘキニ似タレモ腹滿急痛ナトノ  
証ナキヲ以下サス是ヨリ漸々ニ周身浮腫スルニ至ル又  
枳朮湯モ同症ニ用テアリ虚實ノ分ナリ肘后ニ氣分ト名  
ク今見ル所皆酒客ノ病ニテ此病ヲ發シテ以來酒氣鼻ニ  
近クモ忌ム十二七八ハ難治ナリ傷寒熱解既肥立ニカ  
リ足ノ甲ニ浮腫アリ夫ヨリ周身浮腫スルハ附子ノ主  
トル所ナリ熱毒内鬱シテ腫ルハ大黃ノ主ニテ傷寒篇論  
辨ス混スルヲナカレ長病ニテ足ノ腫ルハ虚候ナレモ其  
本病ノ善惡ニヨル外ニ看法ナシ何ホト皮水ニテモ皮膚  
コソクトシテ垢ヲキタルハ治惡シ津液ノ枯タル形也大

低附子ノ腫ナリ其脉取ニクキホト沉ミカクレナトスル  
ハ不治ナル者多今日半身腫タルモノ明日ハ半身へ移ハ  
軟ナル腫多シ禹切湯別テ効アリ皮水ニハ防已黃芪湯ヲ  
用ユルヲ脚氣ト同場ナリ腰以下及陰腫ニ用ユ是ニ腰以  
下腫テ以上ハ瘦衰へテ骨立スルハ大虚ノ証ナリ防已黃  
芪ノ場ナレモ八味丸或壯原湯方景敏ヲ用ルヲ有多ハ不治也腰  
以下腫テ瘦ノナキハ疝ニ属スルモアリ烏苓通氣ヲ用テ  
一二服ニテ快利スルヲアリ又陰腫レ火泡ノ様ニナリ或  
屈曲シテ蟻螺ノ如或囊中ニ引込小便分流ス如吹水キハ  
通利ノ勢アル也又囊如瓠或如藥罐或爛レテ火傷ノヤウ



二痛楚スルアリ婦人ハ玉門大ニ腫レ雙脚ヲ合ス不能  
大ニ取扱ニ困ルモノ也其水幸ニ漏出テ消ルモ有又三稜  
針ニテ輕々ニ刺シテ水ヲトル玉門ハ左右ノ皮ノウスク  
見ル所ニテトル管ヲ入テ流ルヤウニスル仕方モアリ  
囊腫ハ惡症ニハスレ氏皆必死ニハ非ス腹以下大腫シ股  
陰ナトヘ吹切自然ニ水漏テ夫ニテ拾別腫ハ減スレ氏元  
來不利ヨリ發セシナレハ又腫滿ス偶ニハ多分ニ水モレ  
全愈シタルモ見タリ又吸瓢ニテ吸セテ愈タルモ見タリ  
千金方ニ水病忌腹上出水者一月死大忌之トアリ予  
先キニ見タル小腹陰股ニテロシ生タリキサテ療治耻辱

天地ニ面ノムケヘキ無シ命ノ盡ル故ニ手段殘ル姿也吹  
切所ヨリ水泄レテ愈ホトナラハ藥ノ驗ナキハ云ワケモ  
ナキ次第也

小便ハ清シ以佳トス濁ハ不利ノ兆也又白濁ニテ白粉ヲ  
マシヘタル如キハ虫積ニ屬ス其候ハ虫積ニ語ル通リ常  
ニ異ナル味ヲ好カ又嫌ナ酒ナトヲ好カ常ニ白沫ノ唾ヲ  
吐カ吞酸スルヤ時々惡心ノ氣アルヤ此惡心ニハ食傷ト  
云ホトニナク味アシクト覺テ喰セシト云位ノ停食ニモ  
有モノナレハ能問ホシテ若ヤ停食ノ惡心ナラハ中正湯  
ナリサテ又虫積ハ唇ノ色朱ヲヌルカ如ト眉目ノ間蒼黃



色ヲ隱々ト帶フ第一ハ心下テ見覺ヘシ是ニテハワレヌ  
モノナリ先<sup>或接門</sup>芟凶湯ヲ用虫ヲ下シ後本症ヲ治スルナレド  
直ニ通シノ付<sup>方</sup>モ有又本症ノ方中ニ鷓鴣ヲ加ヘテ用ユ  
ル<sup>方</sup>モ有唇赤腹至テ堅熱アルニ消毒退熱散ヲ用テ見ヘ  
シ虫積ノ候モ有ニ似又無ニモ似烏梅丸ナトヲ煎服シテ  
無効ニ小便赤溢ナラハ<sup>方</sup>淨府湯ヲ用見ルヘシ小便黃濁如  
煎茶ハ不利ノ常式ナレド是ニ瘀血疝塊ニ属スルモ有又  
如<sup>レ</sup>脂ハ腎虚ノ候トスハ味丸ヲ煎服ス金匱ノ痰飲篇及水  
氣篇ヲ合セ見テ治スヘシ留飲ト水氣トハ同體ニシテ咳  
喘悸等ヲ帶ルモノニ隨テ方ヲ按スルナリ

水腫ハ五味變ナク食ヲ進モノ也胃中ニ邪ナキ故也又堅  
キ腫ハ寒熱シテ食ヲ不<sup>レ</sup>欲是ニハ脚氣アレハ意ヲ留テ誤  
<sup>レ</sup>ナカレ膈間水氣アルハ十棗湯滾痰丸桃花湯撰用ス  
水蠱ト云ハ水氣ニテ腹ノ脹ニテ別義ナシ叢桂偶記ニ辨  
タリ香祖筆記ニ絲瓜ト巴豆二味ノ方アリ至テ能水ヲ下  
ス奇方ナリ用ユヘシ又赤小豆ハ水ヲ利スルノ奇品ナリ  
買藥ノ禹水湯ハ赤小豆一味ヲ人ノ知ラヌヤウニ黒ク炒  
タルマテ也ト或ノ傳ナリ赤豆炒トキハ其効益良ト云又  
林一鳥ト云醫ノ水腫ヲ治スルノ奇法アリ時々用テ奇驗  
ヲ取ル先病人ノ飯ヲ禁シテ不食尤汁モ菜モ一切ニ禁ス



只赤小豆ヲ煮食セシム夫ニハ砂糖醬油塩何ニテモ好ニ  
マカセテ和シ朝夕ニ食セシム至極厭<sup>アキ</sup>テ食兼ルハ麥ヲ間  
ニ一度ツモ食セシムナウハ赤豆計ヲ食スヘシ始ノホト  
ハイヤカリテモ頃テ通シツケハ自ラ進テ食ス腹内赤豆  
ニ成大便ニ赤豆計出ルニ至テ快利スル也若穀食スレハ  
立所ニ不利ニナルモノ有林氏ハ是ヲ脚氣ニ用タル也其  
藥方ハ三百金ニ換ント好ノトモ秘テ不許故ニ人間ニ不  
傳ト鹿門ノ又玄餘草ニ見ユ山脇先生一烏カ奴ヨリ浪華  
一隱士ニ傳タル方ヲ得テ遙ニ寄書傳來是亦偶記ニ詳ニ  
記スレハ見ルヘシ三輪神庫ノ方モ記シオケリ水腫ハ塩

絶ツシテ通ルモノ也故ニ塩カウハ猶更厚梁魚肉ヲ禁シ  
麥飯梅ヒシホナトカ昆布ノ煮出ニテ仕立タル物ヲ食ス  
タトヘハ麥麵ヲ食トモ右ノ煮出ニテ喰スヘシ

千金方ニ水ニ有十種不可治者有五第一唇黑傷肝第二缺  
盆平傷心第三臍出傷脾第四背平傷肺第五足下平滿傷腎  
此五傷必不可治トアリ予按スルニ手掌平滿モ惡候也腫  
看法ナレハ心得置ヘシ五候共ニ先ハ違ハヌ候法也臍ノ  
凸出スルハ鼓脹々滿共ニ凶候也小兒ハ必不然

煩渴シテ咳スルハ越婢湯黑胎アウハ少ク承氣ヲ投ス大  
便秘セハ猶更ナリ大便ヲ利シテ小便通スルハ誰モ常ニ



行フ事ナレ氏自下利スルニモシフルト云ニハ用ユヘシ  
白胎ヲ薄カケテ潤ノ有ハ實腫ノ輕症也若カウクトスル  
ホト乾クハ虚候ナリ胎ナクシラケ乾燥甚ハ極虚ニテ先  
ツハ不治ノ舌也又帶黄テモ潤アルハ實腫ナリ

水腫ノ内ニ脚氣ニ似タル所アルハ合病ナルヤ何レ脚氣  
ニモシカタク又水腫トハカリモ云カタキ症導水茯苓湯  
ヲ用ユヘシ症ニヨリテ郁李仁ヲ加フ郁李ハ穀ヲ去リテ  
仁ハカリヲ用能下水何藥ヘモ加ヘ用ユルヲ有又下血後  
浮腫微寒熱婦人ハ全ク血ノミチノ形ヲナシ或惡心ナト  
ハ巫神湯ナリ又脫血ノ後虚腫喘悸スルハ黄胖アリ心得

ヘシ水腫ニモ黄胖ノ候ヲ尋求テ針砂湯ニテ心外ノ効ヲ  
取ルヲアレハ心ヲ留テ診スヘシ黄胖ト見タラハ皇盤丸  
モ兼用スヘシ

婦人産前ノ腫ハ不苦<sup>ト</sup>雖ナキニハ不若胎ノ成長スルニ  
隨テ鎮帶<sup>ヲ</sup>ニテシノ切ル故自然ト胎下エ下リ膀胱ニ逼ル  
故不利ニ成引續産後水腫ヲ患ル有早夕腰湯スル者ニ多  
禁スヘシ血熱ヲ帶テ渴スルハ巫神湯脉浮數ナレハ別テ  
驗アリ洪腫シテ無熱禹功湯治水散ヲハ諸湯ニ兼用スル  
モ良瘀血凝滯子宮モ塩梅アシキハ琥珀湯何ホト藥ニテ  
モ飲水ノ多ハ損ニナレハ仙受散ヲ用ユヘシ大奇驗アリ



産後ノ腫ハ子宮下垂シ口ヲ不斂尿孔ヲ塞テ不通ニ頻ニ  
閉テ一滴モ不泄様ニナラハ洩閉術ヲ行ヘシ方ハ琥珀湯  
也新ニ産シテ兼テ有合癥ノ居所ヲカヘ膀胱ニ逼テ尿道  
ヲオセハ不利シテ腫ニナルアリ此二ツハ産後ノ腫ノ病  
因ニナルヲ多シ即轉胞ニテ巴豆膏ノ類臍下ノ傳藥ノ功  
アル所ナリ物ニ塞カレテ閉タルハ知易ケレ氏少ツハ  
小水通スレ氏血氣俄ニ動タル跡ハ腫ルモノナレハ乍ニ  
水腫トナル素ヨリ内因ノ不利ト違故ニ始ノホトハ寒熱  
ナク一通ノ水腫ニ病陰内ノ障ト云フヲ辨テ鎮帶ヲ去テ  
腹ノ平和ナラントラ欲又産難痔疾ニ響テ腫痛シ便道ヲ

妨ルヲ有乙字湯ヲ以痔ヲ治スレハ快利ス又全ク瘀血ノ  
因ニ係ハ甲字湯ナリ是等ノ事ハ婦人門ニ語ルヘシ  
諸瘡内攻シテ腫タルハ水腫ノ形ナレ氏治法ハ異ナリ是  
モ衝心急ニシテ脚氣ト同大病トス外候ヲ極ノサレハ内  
攻ト水腫ト混シヤスシ内攻ノ腫色モ脚氣ト同シニ肉ノ  
間ニ腫タル多シ呼吸迫ス寒熱渴胎モアリテ急ニ治セサ  
レハ死ニ至ル瘡痕未滅ニアルハ治シヤスシ平身ニ成テ  
日ヲ經タルハ治シ難又寒風ニ逢或夜行或雨水ニヌレト  
トシタルハ瘡所ヨリハ膿汁ヲ出シ或ハ新ニ發スル瘡モ  
有ルガ中ニ内攻スルアリ火ニアフレハ瘡ノ痒キ所甚快



ヲ覺ヘテ頻ニ烈火ニ迫ツケ或藥湯或ハ温泉方ノ藥湯ニ  
入或傳藥ニテ治シタルハ別テ内攻ス常ノ湯ヲ浴タルモ  
内攻スルト死生ヲ以テ論ス瘡疥ハ皮上ノ病ヲ以セザルニ  
至慎ムヘシ發表ヲ帶テ通利ノ方ヲ用ユ赤小豆湯或琥珀  
湯煩渴セハ越婢湯熱勢アラハ加犀角凡諸藥効無キモノ  
ニ聖壺湯奇驗アリ反鼻ノ入タル方ハ瘡ヲ再ヒウミカヘ  
サセンノ主意ニテ大事ノ目ノ付處ナリ猶通ジワキカ子  
ハ小瘡ノ摺藥ヲスヘシ表ヘ吹出セハ立トコロニ小便快  
利スルナリ或傳フ衣ヘ巴豆ヲ燒込テ掛香ノ如シテ着セ  
シムレハ周身ニ瘡ヲ發シテ快通スト是モ一法ナリ呼吸

急迫心下結滯スルハ甘遂丸紫圓ノ類ニテ下サ子ハナラ  
ス下サレテ乍瘡ノ發スルヲアリ氣急ノハケシキハ遠慮  
ナク下スヘシ内攻ニ一種水氣ナシニ只氣ヲ塞テ氣癰ノ  
様ニ憂愁細慮織思ニ至テ有是モ發散シテ再瘡ノ出ルヲ  
ヲ要トス又頭瘡ハ傳藥ニテ眼ニ入テ赤痛或翳シナスハ  
速ニ治セサレハ盲ニナル鉛丹膏ナリ又小兒ハ常ニ小疹  
ヲ發スルモノナレハ浴スルニヨリテ内攻シテ腫ヲナス  
小兒ノ腫ハ多ハ内攻ヨリ發ス外候ヲ詳ニスヘシ又疔ヲ  
患テ後ニ水腫ヲ煩フヲ疔水ト云治方大人ト異ナルヲナ  
シ疔藥ヲ帶テ用ユルナリ



禹功湯 療水腫

赤小豆四錢 商陸三錢 木通 猪苓 冬葵子各一錢

右五味以水二合煎一合日二劑或三劑氣急者先與甘遂丸備急圓葷而後用此湯

桃花湯 治水腫逆滿方

桃花二錢未開者佳 大黃二分

右二味以水二合煎取一合日二劑或三劑瀉水如注

桃花散 下停飲方

桃花未開者佳

右一味為末空心白湯頓服二錢後溫酒任性頃刻當瀉水

患宿酒立驗

琥珀湯 理產后水腫或諸毒生腫者方

琥珀一錢 商陸 鷄舌三分 反鼻五分細判 猪苓七分

右五味以水二合煎取一合去滓溫服日二劑或三劑

摺藥 肥前瘡任再者數摺肌表速發慎莫近眼胞及陰所

巴豆 大黃 厚麻子 黑胡麻各等

右四味細判絹袋盛酒漬數摺禁洗浴候毒盡而浴

赤小豆湯 治諸結毒內攻腫滿方

赤小豆五錢 雞舌三分 大黃二分或三分 麻黃八錢

反鼻五分細判 猪苓七分 商陸根二分生用



右七味以水三合先煮赤豆減一合內諸藥者取一合去滓  
溫服日二劑或三劑

木防已湯 以上傷寒論 越婢湯 以上金匱要略 腎氣丸

平水丸 見轉胞 導水茯苓湯 方 鉛丹膏 見痘瘡 方巫神湯

治水散 仙受散 聖壅湯 甘遂丸

香祖筆記曰元鮮于伯機記杭醫宋會之者善治水蠱以乾絲

瓜一枚去皮剪碎入巴豆黃色為度去巴豆用絲瓜炒陳倉米

如系瓜之多少候米黃色去絲瓜研之為末和清水為丸如桐

子大每服百丸皆愈 宋言巴豆逐水絲瓜象人脈絡去而不

子大瀉如頃巴豆ノ分量ヲ不説  
予ハ試ニ一錢ヲ以テ製タリキ

轉胞

轉胞又胞轉トモ見ユ金匱要略ニ出タリ用八味腎氣丸サ

テ水腫ニナルハ段々ニ小便不利ニナル此轉胞ハ俄ニ閉

ル其故ハ膀胱マテハ小便例ノ通ニ溜レ氏血塊疝癥或ハ

瘀血絡脉ニ結滯スルモノ尿道ニ逼リ壅ル故ニ通シ心ハ

有レ氏不通也譬へハ德利ノ口ヲシタルカ如シ其口不開

ハ小便胞中ニ滿テ脹痛スルホト尿道益壅テ不通五七日

ニシテ死ニ至ルモ有テ配早ク救テ專務トスへシ因此病

産後ニ多シ子宮産ニ困シテ腫ルヤ又子宮下垂シテ便道

ニ塞テ不通ニナル故ニ度々見受タリ洩閉術ニテ乍ニ通ス



男女氏ニ此術ニテ通レ氏産後轉胞ホトニハ無効金匱ノ  
胞系了戾シテ病ナリト云フ俗醫誤讀テ胞衣帶ニテ尿道  
ヲ塞ニテ妊婦ノ病ト覺ユル有此轉胞ハ男女共アル病ニ  
テ臍下ノハリ藥ノ効アルモノハ藥力内ニ通徹シテ癥塊  
ノ尿道ニ害スル物ヲイツモノ處ヘ動カシ返スノ意也不  
飲込ノモノハ水腫ヘモハリ藥ヲスルハ小便ノ閉ル意味  
ヲ知ヌ也轉胞ハ小便膀胱マテハ無滯メクテ來レ氏尿口  
塞リテ不通水腫ハ小便ノ分利惡クテ膀胱マテメクテ來  
ラス膀胱ノ外ニテ溜ル故ニ一身エ水氣マハリテ腫満ス  
ル故幾日モ生テ居也此故ニハリ藥ニテハ用ニ不立轉胞

ハ小便ヲコウヘ過或仆倒シ或房中精ヲ洩サス或高ヨリ  
墮ナトシテ病ツクモノナレ氏其因ハ少腹ニ疝瘕瘀血ニ  
テ絡ノ張タル人加ルニ多欲ニテ下部ノ虚シタル人ニア  
リ是ヲ治スルニ千金方ニ薤葉ヲ尿口ヨリ指込法アレ氏  
紅毛カテイテルト云器ノ便利ナルニ不如銀ニテ造ルモ  
ノ也此器ナクハ紙コ卷クヲ指入ルヘシ義濃紙ヲ元結ノ太サ  
ニヨリテ燈火ノ焰ノ上ニテ之ヲ二三篇温メルヤウニス  
ル是ハ紙ノヨリメヨリ毛羽ウヲチテアルヲ燒ク爲也煙管  
ナトヘハヨリハシメノ所ヨリ指入レ氏尿口ヘハヨリ留  
ヨリ指込ム是ハヨリメ逆サハグレニナラヌ爲也サテ右



ノ紙卷へ琥珀油子若無ハ換ヲ塗無殘サシコム横骨ノ上ノ  
アタリニテ了戾スルナレハ夫ヲ衝越ツキ様ニスル存ノ外痛  
ナキ者也カテイナルハ爰ニテ吸出ノ勢アル故是ニハ似  
モセヌ事ナリ又薤葉ヲ尿口へ指込人ヲレテ向へ一吹フ  
イテ又吸へハ利スルナリ此筋合故ニ藥ハオビヤカシテ  
通スル權道ヲ專ニス猪澤ノ類ハ筋ニ違ハナケレ氏柔ニ  
テ件ノ癥塊工響ヲモタス故ニ先巴豆膏ヲ貼シテ甘遂丸  
平水丸ノ類ニテ一時ニ大便ヲ下ス張合ニテ尿道モ開キ  
テ通ス木防己去石膏加茯苓芒硝湯ナヨシ又虚人ニハ  
桂枝加苓朮附湯モ八味丸ヲ煎服スルモ見合次第ナリ又

塊ノ圓ナルハ治栲ノ核ノ如ハ不治也ト云説アレ氏彌然  
ヤ否ヲ未知一種少腹如鞠丸ク脹出スモノ有是ハ内損ノ  
人ニアリ治シ惡シ老人ハ必死也一人栲ノ有處ニ尻餅シキヲ  
ツキ二陰ノ間ヲ強クウツニ因テ腫痛甚クテ尿道閉塞シ  
點滴モ不通膏藥蒸藥スレ氏彌腫出シ小便頻ニ滿テ發熱  
煩渴シ飲食モ減シ百方無効七八日ニシテ死ス是ハ轉胞  
ニハアラサレ氏尿道ヲ腫塞キタル故便閉シタルハ同意  
ニテ轉胞モ通ツカ子ハ其死期早キモノ也

巴豆膏

巴豆 五分 田螺肉 一錢



右二味共搗成膏和勻一寸半ハカリニ紙ヲ圓ニ切膏ヲ  
傳臍下一寸五分ニハルヘシ外ニ三寸ニ紙ヲ圓キリテ  
蓋ニハルヘシ痛劇者ハ尤驗アリ

又方 田螺麝香少許ヲ和シ貼スルヲ巴豆膏ノ如ス  
平水丸 吳茱萸 硝石 芫花略三 商陸四兩

甘遂一兩 右五味糊丸

木防己去石膏加茯苓芒硝湯 桂枝加苓朮附湯以上傷寒論

腎氣丸金匱要略方 藏甘遂丸

丹田氣海水分ノ邊ヘ針スヘシ此他絡ノ脹タラント  
覺ユル所ヲ按シテ針スヘシ

痢 泄瀉

痢ハ古名ニ非ス滯下ト云ト有レ氏左ニモ非ス素問ニ腸  
澼ト見ユ難經ニ大瘕泄ト云モノ痢ナリト云既ニ金匱ニ  
下利篇アリ桃花湯白頭翁湯ヲ見ルヘシ夫痢ノ字ハ二便  
ノ下ルヲ利ト唱テアルヲ後世ヲ加ヘテ大便ノ下ル病  
ニ用ルヲニナリテケルト見タリ腹ノ下ルノ名種々ニシ  
テ不暇辨アラハ裏急後重シテ赤白ノ物ヲ下スヲ痢トシ熱多キ  
ハ皆舌上黃白或ハ黑胎ニモナル引渴モアリ讖語嘔逆自  
汗ナト有是ヲ疫痢ト云只サワト下ルヲ泄瀉ト云如水ニ  
下ルヲ水瀉ト云コトノ外過分ニ下ルヲ洞泄ト云不斷ニ



腹ノ惡イヲ腸滑トモ又鴨瀉トモ云左傳ニ河魚腹疾ト云  
モ腹ノ下ル病ノ事也ト云曉ニ及テ腹ノ冷タル様ニ便心  
ヲ催シ夜々下ルヲ五更瀉或ハ脾胃瀉トモ云是ハ虚損ノ  
人或ハ老人ハ不治ニナル古人モイヤカリシ也其久シキ  
ハ腫ニ變シテ足ナトカウ催ス故ニ時々心ヲ付テ見ルヘ  
シ書籍ニ赤ハ熱白ハ寒ニ属ストテ痢病ニ寒熱ノ見分様  
アリ然レ赤白皆熱ナリサテ又白キハカリモ赤キハカリ  
モ無シ赤白雜下ス若シ誤テ温藥ヲ用ヒハ腹痛増シ小便  
澁滯或ハ熱勢加リ大病ト成ル貴高ノ人其質弱キヲ見テ  
澁ラス藥ヲ用テ死スル人時々見受タリ最初ハ何如ニモ

發散ヲ專トス疫痢ハ猶更葛根湯ヲ用テ表ヲ達スヘシ下  
利スル者主之ト云句ハ仲景ノ法ナレトモ世人輕々シク看  
過シ神驗ノ方ヲ不用<sub>レ</sub>宜常ニ用テ其効ヲ知ルヘシ平人モ  
偶ニハ食物ノ不消<sub>レ</sub>トモ有ナラニ常ニ改ムル物ニ非ル故  
其人モ不知ニスムヲ痢ヲ患レハ一々ニ改メル故消化セ  
サルヲ見テ傍人ノ騷クニツレテスハヤ不消ハ寒ニ属ス  
トテ誤ルヲナカレセ八十行以上ノ痢ハ食シ罷メハ即時  
ニ下ル故完穀色モカワラズ下ルヲモアリ不可驚消スル  
間ノ無キニテ真ノ不消トハ違フ又寒トナスヘカラス能  
外候ヲ見ルヘシ一種冷痢ト云アリ是ハ久虚ノ人或ハ食



滯ノ治セサルニアリ或ハ舊痢久不愈腹微脹シテ冷痛シ  
瀉下ス是ハ寒ニ属ス食物モ消セス即仲景ノ清穀下利ト  
云ナリ附子ノ主ル所也然レ氏多ハ疝ニ属スルモノアリ  
腹中雷鳴生姜瀉心湯ノ症ニ似タリイワモノ疝ヲ候フ處  
ヲ按シテ見ルヘシ白色ノ便ニカキルコトハ非ス赤色モ  
アリ何程赤シトモ熱ニ属セス又休息痢ト云アリ最初ヨ  
リ此症ニハナウス常ノ痢ヲ病テ一タヒ治シテ未タ日ヲ  
經サル中ニ冷ニカ又ハ食ニカ傷ラルレハ又前ノ如ニ下  
ル夫カ癖ニナリ少シノコトモサハル故ニ終ニハ治シソコ  
子テ五日モ止リテ又五日モ下ル小兒ニハ別テ多シ是ハ

寒ニ属ス禁口痢ト云アリ毒ノ強キハ熱モ強ク仍テ嘔吐  
ヲ帶テ甚シキハ水飲共ニ吐逆ス是ハ甚難治ニテ小兒ハ  
九死一生ニ至ル此ニ論スルノ外ニ數名アリ諸方書ヲ讀  
テ知ルヘシ以上ノ症小兒ニモ皆アルノ外ニ疳痢ト云モ  
ノアリ外候皆疳ノ形ニナルノミニテ痢ハ痢也爰ニ至レ  
ハ急症ナキ故ニ十二七八ヲ救ヘシ是亦初起ニハナシ經  
日テ此疳症ニナル口鼻ノ氣ニ冷意アラハ錢氏ノ益黃散  
至驗アリ此疳利ハ疳ヲ治スヘシ晏ク小兒門ニ記ス又驚  
ヲ兼タルアリ食ヲ兼タルアリ暴卒ニ發熱發驚一二日ニ  
テ死スルコト夏月ニ多シ是ハ痢ニテ見分様ハナシ脉候腹



部面色ノ目利第一ナリ常ノ痢ニ比シテ治スルト足元ヨ  
リ鳥ノ起ツト云目ニ出逢フ痢ハ一二行ニテモ熱強ク煩  
渴シ數脉時々タノ息シ音聲細ク高クカナキルト云聲ニ  
テ眼勢ナク或ハ吐逆發驚シテ半眼ニナリ熊胆或ハ紫圓  
ヲ與或ハ多分灸ヲシテモ更ニ氣ノツカヌナト一二時ニ  
死ス是ヲ無畢病ト云ヘケレ氏疫痢ナリ皆死病也能々意  
ヲ付テ見ルヘシ小兒俄ニ一二行下利シ陽厥シテ手足ノ  
冷ル有附子ノ症トナスヘカウス一體陽症ニテ在モノ十  
リ如何ニモ毒ノ強ナリ其毒伏結シテ厥冷スル也虚脱シ  
厥冷スルトハ違ナリサレ氏至テ惡症也紫圓ヲ用テ一時

ニ厥ヲ開キ効ヲ取テアレ氏危篤ノ症トスヘシ厥カヘリ  
シ後ハ世人三黃湯ニスル所ナレ氏葛根ヲ用ユ微驚ノ氣  
アルトモ先表ヲ解シテ見合セル内ニ順候出ハ救テモ有  
リ小兒ノ痢ハ至テ六ヶ敷也輕ク見ユルトモアナルヘ  
カウス惡症ハ搖頭ト弄舌ト小便不利或ハ小便ニ白濁ヲ  
帶テ陰頭ヘ白ク乾ツクモノ毒深シ早ク止メシハ救得ル  
モアリ又白濁スルハ虫積ノ候ナリ小兒ノ痢ハ難治多シ  
死症ト極テ置テヨキ位ナリ大人小兒共ニ熱強キハ血痢  
ニナリ純血ヲ下ス凡下ル物ノ色カ惡シキトテ難症トハ  
セス諸症ニヨキ所アレハ夫ヲ佳兆トス諸症アシケレハ



下ル物ノ色モ凶ト爲シ吉ト爲ス故ニ是又心ヲ付テ看ル  
ヘシ  
痢ハ快下セス裏急後重シ小便モ大便ノ度々ニ通スル故  
少許ヲ、通シ或ハ不通大便通シテモ何時マテモ廁ヨリ  
歸ル氣ノナキモノナリ小便通スレハ夫ニテ便心止テ歸  
大便ヨリ前ニ小便ノ通スルヲ佳兆トス又大便心ハ無ク  
小便心有テ小便ハカリ通スルハ甚ノ佳兆也始終此容體  
ヲハ問ヘキ也何レ小便ノ快通ハ吉兆也赤白痢數行ノ内  
ニ常ノ大便ノ通スルハ佳兆也シカシ其通スル時腹痛難  
堪ホト甚モノアリ晝夜數行腹痛後重甚シキモ無熱ハ佳

兆食味ノ進ムハ佳兆晝數多ク夜少ハ佳兆晝ヨリ夜ノ下  
リ多キハ惡シ嘔氣ノアルハ凶兆小便閉ハ凶兆下利ハ少  
ク熱ノ多キハ凶兆熱ノサメヲ先ニ下ノ止ムハ不順初起  
ニ嘔セハ葛根加半夏湯ヲ用テ解熱ヘシ必早ク方ヲ轉ス  
ヘカウマ痢自然ニ減シテ快キモノ也  
葛根湯ヲ用テ度數減スルハ何方マテモ葛根湯也後重強  
クナラハソコテ毒ヲ疎條スヘシ合璧飲ニテヨシ傷寒ノ  
方法ニテ引風モヨクナルト同意ニテ泄瀉モ痢ト同方ニ  
テ宜也金匱ニ氣痢ト云ヲ出セリ是ハ大便心俄ニ催テ取  
物モ取アヘス走リテ廁ニ行ケハ頻ニ肛門ヘハリテ不通



一快下ヲ得タラハ此苦ハ有マイトイワマテモ居ニ纔ニ  
一点ノ糞汁ヲ下ス又夫モ無ク一滴ノ小便通スレハ腹痛  
便心止ム是ハ合璧飲去大黃加木香檳榔子用ユヘシ是モ  
疝ニ属スルモノ有夫ハ心得テ居ルヘシ彌疝ト見タラハ  
痢ヲ捨テ疝ヲ治スヘシ又血痢トテ裏急後重シテ純血ヲ  
下ス又膿血ヲ雜下スルモ有先合璧飲ヲ用テ後ニ桃花湯  
ヲ用ユ熱ノ甚キ中ニ用テハ無驗熱ノサメタル時ニ用ユ  
ヘシ夫故ニ傷寒論ニ二三日四五日ノ字見ユ味ヘシ用ユ  
レハ血止テ水瀉ノ様ニナル勢甚ハ血色薄ナルナリ是赤  
石脂ノカナリ赤石脂ハ白湯ニテ散服シテモヨシ又血痢

諸症多モノニハ赤石脂ハカリニテナラヌヲモ有フハ主  
方ニ用ユル諸湯ヘ赤石脂ヲ兼用ニスルヲモアルヘシ  
五更瀉ハ虚症ニテ實ニ不属又寒ニ属スヘキナレ氏最初  
ノ治ヲ失シテ此症ニナル故ニ其ノ元ヲ治シテ効ヲ得モ  
ノ有リ元ヲ治ストハ後重ノ氣味アラハ合璧飲ニテ疎滌  
シテ見ルヘシ然トモ虚ニ属スルモノナレハ一帖キリニ  
病體ヲ着無効ハ早方ヲ轉スヘシ寒疝ニ属スルモノ多ケ  
レハ其証候ヲ尋テ烏苓通氣ヲ用ユルニ意外ノ功ヲ取ル  
ヲ有少々ハ症候ナシトモ用見テヨシ  
嘔ヲ兼テハ禁口痢トナル故ニ甚凶證トス嘔ヲ惡症トス



ルハ此故也黃芩加半夏生姜湯半夏瀉心湯六物黃芩湯外  
ニモ柴胡湯ナト見合次第也鯉膾ノ法有時々効ヲ得タリ  
其法常ノ膾ニ製スルナリ久痢ニ烏梅ノ効アリ虫積ニテ  
嘔吐ノ出ルハ猶更烏梅圓ヲ煎服スヘシ痢病ニ不攝後重  
甚トキニ芟凶湯ヲ用テ奇効ヲトルコ有是ハ久痢ノコニ  
ハ非如何ニモ藥ヲウケヌハ小半夏加茯苓湯ヲ用ユ夫モ  
ウケヌハ伏龍肝汁ヲ以テ藥ヲ煎服スヘシ十人カ十人飲  
モノ也飲ウケタラハ粳米ヲ加ヘ胃氣ヲ助クルノ手段ヲ  
メクウスコモ有サテ夫トモ吐逆不止ニハ一奇方アリ諸  
嘔逆水藥ヲ吐スルニ用鼠尾艸穗ヲ插花未開時五六寸ニ

切り陰乾シテ莖葉トモニ連テ煎服ス神驗ナリ伏龍肝汁  
ノ煎法ノコハ婦人惡阻ノ處ニ詳也又五苓散ノ場モ有ヘシ  
瘧ヲカ子タルヲ瘧痢ト云是モ葛根湯ナリ後ニハ柴胡加  
芍薬トヲ用ユルコナリ病因考ニ瘧痢同因ニ論シタリ瘧  
ノ奇怪ナルハ痢ノ因ト異ナラント思ヒシニ後ニ考レハ  
下利スル人初起ノ時鯉膾ヲ噉ヘハ即時ニ痢ヤミ却テ秘  
結ヲ患ル者アリ乾柿ヲ味噌ニ煮或ハ炮食ス東海ノ人ハ  
京ノヒモト云海艸ヲ味噌ニ煮食ス皆痢ヲ治スル奇品也  
又蒜ヲ煮食ト寒中ノ餅並ニ雞卵ヲ食粟殼ヲ煮服シテ  
痢ノヤムハ其理モ可解ナレ氏山民魚ニ乏地ニテハ茄子



冬瓜類ヲ酢味噌ニテ食シテ痢ヲ治ス外ニモ奇藥アルヤ  
未聞見サリナカウ漫リニ行フヘカラス小便不利シテ腫  
シ催スヲアリ酢ニテ止ルヤト思ハル又瘧ハ酢ニテ再復  
ス瘧ノ巫祝或ハ奇藥ニテ截ルト同意ト見ユ先年岩城ノ  
湯本村へ招カレタリシトキ里醫曰此地ノ人瘧ト痢ヲ病  
マスト因テ知ル艮山ノ說可信ト頃讀張果鑿說曰盧井  
甫因道中冒暑得泄痢疾夢至一處類神仙居一人被服如仙  
官延之坐視壁間有韻語藥方一紙讀之其詞曰暑毒在脾濕  
氣連脚不瀉則痢不痢則瘧獨煉雄黃蒸餅和藥甘艸作湯服  
之安樂別作治療醫家大錯夢回如方服遂愈蓋シ是等ニ據

テ考タルモノ歟

痢病ニ熱ノ有無モ不問天樞ニ灸スルモノ有冷痢久痢別  
テ疝痢ナトニハ捷法トス

毒盡テ下モ減タラハ黃芩湯ニスヘシ其後調和ハ桂枝加  
苓朮湯小兒ハ弄玉湯下ノシマリ塩梅ニテ加附子ニモス  
ヘシ又大便イツマテモシマリカ子ルニハ青陽丸ヲ兼用  
スルヲモ有又幾日モ腹冷痛シテ一二行下ルハ桂枝加苓  
朮附湯ニテヨケレモ是ニハ痢瀉アリ烏苓通氣ヲ用テ速  
ニ有効

下利數行ニテ脱肛スルヲアリ跡ニテ治スレ氏乙字湯ニ



シテ痢中ニ治スルヲモアルヘシ痢モ止ミ脱肛入カタキ  
ハ補中益氣湯ニスヘシ此外ニ益氣湯ヲ痢ニ用ユルハ張  
氏醫通ニ裏急登圍頻汚衣者脱氣也益氣湯去當歸加木香  
甚更加附子或四君子湯加附子木香ト有是ハ大便心有ト  
直ニ下リテ衣ヲ汚ス途中ニテ無調法ノ出來タル也又  
痢病ノ肛門シマラス如筒ニナリテ居ルハ脱氣ノ候ニテ  
小兒ニ多シ惡候ナリ腹ノ俄ニ背ニツキ腹勢削去カ如キ  
ハ死ス小兒ハ一夜ノ内ニ如斯ナルヲアリ必泣聲細高二  
テ常ノ音ニ變スル也  
小兒痢不治ニ無熱清穀スルニ至リ肉脱シテ難治トスル

モノ建理湯ヲ用テ得功、時々見タリ疳痢ハ烏梅丸ヲ煎  
服シ腹ニ灸ラスル熱痛ナク幾日モスルナリ壯數ハ三  
五十壯ヨリ百壯ニモ至ヘシ弄玉湯又ハ雞肝丸佐々羅丸  
山脇ノ新榮丸兼用スヘシ疳痢ニナリタラハ下スヘカウ  
ス温補スヘシ委ハ小兒門ニ語ル又小兒ノ大便ニ青菜ノ  
絞汁ノ如キ色ヲ下スハ冷ニ属ス驚ヲ催ス也ト醫書ニア  
ハ是ニハ弄玉湯ヲ用テ天樞ト不容ニ灸スヘシ又附子  
ヲ加ルヲモ有母少年ニテ夜中小便ノ手入惡テ冷タルノ蓍  
ニ臥サシメタルナトニモ青キ糞ヲ下スモノアリ弄玉湯  
加附子ニテヨシ



青陽丸 理老少陳久下利不止方

黃蘗 熟二兩 燒一兩 生二兩

右糊丸每服一錢數服以大便黑為知止後服

葛根湯 柴胡湯 黃芩湯 半夏瀉心湯

烏梅圓 桃花湯 以上傷寒論 芫凶湯 見虫積 建理湯 理中湯建中湯合方ナリ

烏苓通氣湯 方藏 合璧飲 乙字湯 弄玉湯

灸 天樞 關元 不容

瘧

瘧ハ古來ヨリ有病ニテ書經ニ武王邁厲虐疾周公金縢之冊ヲ匱中ニ納テ祈シ翌日乃瘳タルヲ有此時瘧ヲ知ウス  
二期ハ驚キ玉フヤ不審也瘧ハ此時代ニ詳ナリ禮記月令ニ寒熱不節民多瘧疾周禮疾醫職云秋時有瘧寒疾又左傳定公四年荀寅曰水潦方降疾瘧方起又疢ト云キ瘧也襄公六年疢作而伏杜預曰疢瘧也ト見素問瘧論ニ瘧瘧皆生於風註ニ瘧猶老也亦瘦也楊上善曰二日一發名瘧瘧ト見ユ素問ニ寒瘧温瘧風瘧痺瘧又十二瘧ヲ出セリ是ハ十二經ノ瘧也瘧瘧ハ但熱而不寒也金匱論註曰瘧者火毒也小兒



熱結之毒曰瘧。又黃瘧之病亦此瘧。皆熱盛于裏之義也。又金匱云：牝瘧、牡瘧。名ヲ出ス。吳崑方考云：牝陰也。無陽之名。故多寒。名牝瘧。金匱附方云：柴胡、姜、桂湯ヲ載テ治瘧寒。多微有熱。或但寒不熱トアリ。牡瘧モ附方云：牡蠣湯ヲ載テ外臺ヲ引ケトモ外臺云：ハ傷寒論ヲ引テ作牝瘧。金匱ノ瘧多寒者名曰牡瘧トハ牝ノ字ノ誤ニテ又千金ニモ出ツ。温瘧ハ素問ニ先熱而後寒。名曰温瘧。岐伯曰：温瘧者得之冬中。於風寒氣藏骨髓之中。至春則陽氣大發。邪不能自出。因遇大暑。腦髓燦。肌肉消。云々。金匱云：温瘧者其脉如平。身無寒。但熱。骨節疼煩。時嘔。白虎加桂枝湯主之。吳又可云：温瘧胃ニ傳ルノ説有

リ。按スルニ温瘧モ瘧瘧モ無寒ト云ヘハ是モ牡瘧ト同證ナリ。古論ハ日發ヲ輕トシ間一日ハ重ク二日ヲ間スル猶更重トス。今ノ見ル所ニ不合サテ瘧ノ寒熱ノ休作アルハ不可悟。表裏ノ氣ノトウカ成タル時ナラシ此形ニ似タルモノハ婦人産後ノ血症ニ振々トシテ寒慄鼓頷シ發熱後自汗スルモノアリ。又流産セントシテ如此ニフルフアリ。傷寒戰汗モ全ク瘧ノ發スル時ノ形ニ不異。俗疝氣フルヒトテ此症ヲナスモアリ。以上ノ證皆驚クニ不足押付置テ皆治ス。瘧モ如何ニ強クトモ大病ニ不至。古論濕ニ屬シ昔時ヨリ秋ニ多トス。又瘧瘧ト云アリ。瘧氣ヲ受テ病ム嶺



南衛生方ニ詳也如何ノ事ニヤ府下八九年追年テ瘧多ク  
寛政三四年寒暑ノ分<sup>テ</sup>モナク四季共ニ多ク頰白以上赤子  
ニモ瘧アリ赤子ハ思ノ外ニ困セス小兒モ順シテ輕ク中  
年以上ノ人ノウイ瘧ニハ或ハ絶粒食<sup>テ</sup>疲弊シテ起居外候  
トモニ危篤ニナル人多ク見ユレ氏必死ニ不至病因考ニ  
瘧痢同因ト論シテ有<sup>リ</sup>トクト案スルニ痢ハ裏ニ入ル故  
ニ死ニ至リ瘧ハ表ニ病ム故死セスト見ユ瘧ヲ病時ニ元  
來積塊ノアルハ截カタク病モ強シ瘧ヲ截ルニ鼈甲主藥  
ナリ是塊ヲ破ル故ニ治スルナリ塊ノアル人ハ諸熱氏ニ  
塊ヘ熱ヲ結フ故何日モ解カ子勞熱ノ如ニナルモ鼈甲ニ

テ治スハ塊ヲ削タル也塊ヲ結フ瘧母ト云是ハ瘧ニ因テ  
成長ハスレ氏今新ニ出來タルニハ非ス有來ノ塊ノ太リ  
テ現ハレタル也鼈甲ヲ諸病ヘ用ユル爰ヨリ考ヘ用ユヘ  
シ又重積ノアル人嘔逆ヲ兼テ苦ムアリ是ハ柴胡加鷓鴣  
ニスヘシ諸方ニ九味清脾湯ナトヲ用ユレ氏瘧ニカウカ  
ウ<sup>テ</sup>惡シ只寒熱ノミヲ治シテ一時ニ瘧ヲ截ルヘシ然モ  
勢ノ強ウチ截リテハ一日ハ忘タレ氏其次日ニ再發シ有  
來ノ發日ニハ猶更ニ發シテ終ニ日發ノ瘧ニナル<sup>ト</sup>アリ  
或ハ柴胡姜桂湯<sup>仲景ノ方ニ非小柴胡湯ニ加乾姜桂枝也</sup>寒熱ノ多寡ニ應シ  
テ加減スルノ類アレ氏最初ニハ葛根湯ヲ與テ其表ヲ發



シ四五日モ經テ小柴胡湯ニスヘシ若渴セハ去半夏加枳  
薑湯也金匱附方ニハ治勞瘧トアリ瘧ハ何藥ニテモヨキ  
一ニテ小柴胡ヲ用タレハトテ格別ニ其驗モ見エ子氏柴  
胡ヲ用ルニ勝タル一ハ瘧ニ不構置處ヲ良トス瘧ヲ誤療  
スレハ種々シ變症ニ至テハ恐ルヘキ也偶然ナレハ瘧ノ  
愈タル後ノ事故ニ別病ナリトシ病者モ醫者モ瘧ノ災ナ  
ル一ヲ不知終ニハ癰瘡ノ人ニナルモアリ瘧ハワナクト  
振テ後ニ發熱シテ大汗出テ小便通シテ解スヲ平和トナ  
ス小便頻數ニナリテ淋ノ形ナルアリ是ヲ素問ニ足厥陰  
之瘧令人腰痛少腹滿小便不利如癰狀非瘧也ト有一種鬼

瘧ト云有是ハ病狀怪ク如狂或物着ノ如躁亂スルノミニ  
テ瘧ハ瘧ナリ惡寒ウスキアリ又惡寒無キモ有即牡瘧瘧  
瘧也嘔スルアリ煩渴スルアリ汗無キアリ皆常ニ異ナル  
トスレ氏終ニハ初ニ如説ヲナクト惡寒發熱ノ瘧ノ形ニ  
成テ治ス冷物ヲ食スレハ熱強ク頭痛ナトシテアシ、可  
禁也熱食スレハ熱モハヤク解テ跡輕爽也病勢弱ク成タ  
ル時可截ハヤク截ハアシ、小便不利ニテ足ヘ浮腫ヲ催  
シ手足共ニ力ナク草臥タリト心得テ居一有大ニ可懼其  
人必心下ニ痞タルト云是水氣也起臥歩行ニモ呼吸セハ  
シキモノハ終ニ是脚氣腫滿ニ變スル也速ニ治スヘシ瘧



論ニ是ヲ筋痠痛甚按之不可名曰附髓病以饒鍼鍼絕骨出血立已トテリ古モ此證アリトハ見ユレ氏附髓病ノ名ハ後來不唱諸證備リテ脚氣ニナリテハ死スルモノ多シ瘰ノ沙汰ニハアラス又截テ後再發シタルカ影ノサス也トテ連日ニナリソロク嗽カ出テ肉脫盜汗ス是ハ勞瘰ト名ツク久瘰モ勞瘰ト呼トモ夫ト違テ真ノ勞咳ト同ク必死ニナル是ニハ瘰母ノアヲハ見ルモ有油斷シテ如此ニスヘカラス勞瘰ノ名ハ素問ニ不出外臺ニ引經心録是ハ治療ノ誤ニモアウ子氏病者瘰ヲ輕視シテ保護不宣或早ク陰陽ヲ合セ如此ナルト十二八九也ヨク禁忌ヲ守ラシ

ムヘシ又一體胎毒固有ノ人發勞セントシタル折柄ニテ病ムモ有ヘシ他醫治シカ子タル跡ナラハ猶更先瘰ヲ治スルヲ第一トスヘシ乃爰カ小柴胡ノ瘰ニヨキト云所ナリ瘰甲ノ類ヲ加ルヲモアルヘシ治ソコ子タル久瘰ニハ補中益氣湯加知母瘰甲ヲ用ユヘシ又柴胡四逆モ運用スヘシ一通ノ瘰ノ截藥ニハ瘰勢柔カニ成タル時ニ小柴胡ニ加瘰甲反鼻テ截ル夫ニテ截ヌニハ可加附子コノ手當ニテ截サルニ常山ニテ截ルト有又常山ニテ截ヌニ前ノ加味ニテ截ルトモ有何レ腹ニ馴ヌ藥ニテ截也又發後湯ニテモ截ヘレ此藥ハ發日ノ朝ヨリ藥ヲ斷シテ瘰ノ發シ



テ解タル時ヨリ二貼ハカリモ服シ夫ヨリ翌日モ其次ノ  
發日ニモ如常ニ用レハ截ナリ此他截藥ハ種々アルモノ  
ナリ簡便奇驗ノ方二三ヲ示ス

一士人ノ子十六七患瘧甚輕シ四五發ニテ愈其父ス、メ  
テ水ヲ游カシム翌日再復シケレト重テ不發又水ノ替古  
ニ出タリ又一日發シテヤミケルニ其父モ其子ノ壯健ナ  
ルヲ頼ミ戰場ナトニハ如此ナラスンハ用ヲナサストテ  
夜中川邊ニ携行テ漁スルニ細ヲカケタリ即水底ニ没入  
シテ之ヲ取ラシム次日微寒熱爾來飲食不進黙トシテ人  
ノ言語モイヤカル段々ニ臥床スルト頻ニ物スゴキ様ニ

テ傍人ノ手ナトヲ握リ人ヲ便リニス追日甚シク一人ニ  
テハ廁へ行フモナウス至テ果敢ノ若者ナリシカ臆病ニ  
ナリ纒ノ音ニモ耳ヲフサキ白晝ニテモ人ト對サ子ハ臥  
スヲナウス終ニ發狂シテ不治ノ廢人ニナリタリ

一婦人患瘧愈テ後寢ニ着ケハ息迫スルヲ覺フ仍醫治  
スルニ飲食モ如常是積ナリトテ數服ノ藥効ナク着坐ス  
ルヨリモ腰ヲ掛テ居レハ快キト其他苦ム所ナシ後數日  
ニ足跗浮腫ス醫ノ曰是レハ足ヲ垂テ居タル故ナリトテ  
治シケルニ次第ニ腫滿シテ兩乳房一ツニ腫レ連リテ長  
瓢ヲ横タヘタルノ形ナリ其異ヲ見テ一醫ヲ引ク分心氣



飲ヲ與テ乳腫減シテ一身ニ滿チ寒熱嗽嗽呼吸迫シ起步  
スルヲ不能煩渴シテ絶食ナリ予ニ診フ乞脉細數伏両脚  
弱ニテ屈伸スルヲ不協余曰是脚氣ナリ只其日久ク疲夕  
ルヲ如何トモスヘカラスト辭スレ氏頻ニ乞藥余オモヘ  
ウク今日マテノ治理大ニ誤レハ真ノ治ニテ萬一モ効ア  
ラニカト九味栴榔湯ニ甘遂丸ヲ五分與タルニ寸効ナシ  
又七分ヲ與ルニ小便益少ク一下ナシ心下滿シ堅ク熱益  
甚シ因テ辭スルニ不聽木防已加茯苓芒硝湯ヲ與テ其次  
日ニ死ス  
一士人ノ子年十六七一夕寒熱ス次日輕爽ナルヲ以テ瘧

ナルヲ不知翌日仙湖ニ泛舟遊歸テ頭痛甚乃卧スルニ  
熱ヲ加フ時一丈人來テ砂ヲ握テ口中ニ入トテ起走スル  
傍人夢ナラシ静ニセヨトイヘ氏聽ス抱留ル人ヲ擲狂亂  
シテ烟盤茶碗ヲ踏散シ如何トモスヘカウス是ハ邪祟ナ  
ラントテ予ヲ延クニ六脉弦大流汗衣ニ徹ス是鬼瘧ナリ  
暫シテ睡ヲ催シ次日解タリ之ヲ問ヘハ明ニ覺テ異人來  
テ口中ニ種々ノ物ヲ入ントセシヲ告其後發ス毎ニ同  
狀ナリ三發シテ後之ヲ截ル此鬼瘧ハ可怪證候アルモノ  
ニテ治法ニハ異ナルヲ無シ

五八霜爲丸一錢發日早旦空心服

獨參湯 發日



頓服 木一湯濃煎一夜露シテ星ヲウツシ發日平  
 明空心ニ頓服 硫黄一味或禹餘糧一味發日平旦  
 空心水服五分藏柴胡四逆湯 發後湯  
 灸 大椎三四十壯是古法ニテ素問ニ出タル灸也  
 八關ヲ刺出血真關ハ兩手ノ指間赤白肉際ノ真中ヲ刺スナリ素問ニ出タリ  
 正曆三年春源賴光瘡病治療千萬不驗諸醫束手儒師舟橋  
 大納言來杜子美カ詩ヲ授テ愈其句云子璋髑髏血模糊手  
 擲捉還崔大夫多田是ハ此句ヲ書シ水服ス世ニ黑札ニ  
 テ截法ハ是ヲイヤカ上ニ書タルナリトツ瘡ヲ截ノミニ  
 非ス狐狸モ畏ルト云陸放翁ノ詩ニモ作レリ

霍亂 中暑

霍亂ハ暈也ト雖暈ハ傷暑也是ハ耕夫旅客ナト炎天金モ  
 鑠スホトノ大暑ニ力行シテ眩暈暴熱シテ倒レナトスル  
 ノコニテ史記ニ禹扇暈ト見ユ又淮南子ニ武王蔭暈人于  
 越下左擁而右扇之トアリ皆傷暑ノコナリ霍亂ハ素問ニ  
 出病形ノ有様ヲ以名付タリト諸書ニ見ユ其形ハ腹痛甚  
 ク手足逆冷大汗出煩渴乾嘔轉筋六脉細伏ス是ハ老壯ノ  
 別ナク一晝夜ホトニ死生ノ有コニテ俗ニ大霍亂ト云數  
 刻苦メハ顔色瘡目上陷リ半眼直視シテ速ニ死ス皆一面  
 如斯ハ病ムナレ氏カクイ其活ル人脉細伏ト雖有胃氣腹急迫ス



レ氏腹勢アリ嘔スル内ニ宿物ヲ吐シ又ハ白汁如米甘者  
瀉下ス惡症ノ霍亂ハ藥水共ニ吐スレ氏乾嘔シテ快吐セ  
ズ吐瀉ノ無キヲ乾霍亂ト云テ重トス必死ニハ非然トモ  
惡症ナレハ救カタキヲ多脉腹ヲ考合セテ吉凶ヲ云ヘシ  
其因ヲ考ルニ皆食傷ナリ食ノ塩梅宜ケレハ霍亂ハセヌ  
ト心得ヘシ暑傷ニハアラデ食傷ナル故ニ吐瀉ノ有ヲ貴  
フナリ故ニ心腹卒痛スルニ先ヲ備急丸ヲ先鋒トナスヘ  
シ快吐下アレハ忽ニ手足ノ冷モ返リ脉モ出ワ死症ハ備  
急紫圓ノ力ニモ不崩或藥ヲ吐シ自然ニ手ノツケラレヌ  
様ニ病ムモノ多シサテ此症ハ冷熱混食シ不時或ハ深夜

ニ飽食シ或餒タル物或ハ押付味モ變セントスルモノヲ  
食スルノ類皆此症ヲ病ム夏ハ萬物餒ヤフルノ時故腹  
内ニテモ消化シテ大府へ行カヌ中ニ餒ル也元ヨリ如斯  
ハ胃中ニ納置ヘキニ非ル故即痛ヲ發シ件々ノ形ニ病ム  
也夫ユハ霍亂ハ快吐下シテハ一二日ニ全快ス内發ノ病  
ニアラサル故ナリ中正湯ニテヨシ下リ過ルニハ去大黄  
ヲモアリ惡心嘔逆止ヌハ加烏梅トモ有暑ニ傷レタルト  
云氣テ寒冷ノ藥ヲ不可與甚渴スレ氏白虎ノ渴ニテナシ  
如何ニモ平和ヲ貴フ金匱ニハ人參白虎ヲ用タレ氏此句  
傷寒論ニナシ是ハ喝ノ治法ナリ先理中湯厥冷セハ附子



ヲ加真武四逆見合次第也嘔逆不止水藥口ニ入レハ直ニ  
吐スルハ五苓散ナリ夫モウケヌハ增損白朮散ヲ小服ニ  
合セテ與フヘシ若夫モウケヌハ小半夏加茯苓湯ナリ附  
子ヲ加ルコモアリ一口切りニ効ヲ取リタシトアセル不  
可嘔吐煩悶止ミテ睡ヲ催ストヤカテ四肢温々脉ニ復ス  
ナリ腹痛ハケシキニハ天樞神闕ニ灸スヘシ味噌ナトヲ  
敷テ温ルコモアリ見合次第ナリ霍亂ニ灸ハ至テ道具也  
關元氣海モヨシ又手ニモアリ轉筋ノ強キアリ無キモア  
リ寛政壬子盛暑久旱人々困極スル時痛風ヲ患ル人多ク  
又ハ攣痛スルモノ有輕キハ藥用ニモ不及暫ク宛患タリ

轉筋ト同因ナルヤト思ハル、河間曰熱氣燥燥于筋則攣  
瘕而痛ト云モノ是ナリ又夏月中暑シタルト云テ頭痛四  
肢掌熱惡心スルニ田間ノ人小麥藁ヲ煮テ其湯ニテ浴ス  
又蓼ヲ揉テ足心ニ塗ルノ法ヲ行フハ所縁アリ萬病必愈  
曰霍亂轉筋用大蓼一握煎湯盪洗北人以麥糠代之使滕理  
開洩陽氣和則愈トアリサテ中暑ニハ藿香正氣散香需散  
ナトヲ用來ナレト是藥ノ利クニ非ス三黃湯桂枝湯ナト  
ノ症多キモノナレト晚來新涼ニナレハ不藥モ治ス不換  
金ナトニテ置ヘシ盛夏ノ時ニ飢ヲ不覺頻ニ飽滿ノ心地  
スルハ停食シタルナリ早ク中正湯ヲ用ユヘシ惡心ナト



スレハ停食ト心モ付トモ大暑ニ困リタル也トテ補藥ヲ  
用ユル中ニ霍亂スルコト有又注夏病トテ煩フコトハ是ト異  
ナレ氏猶意ヲ加ヘテ診スヘシ注夏病ニハ方彙ノ參歸益  
元散ヲ用ユ其筋大ニ懸隔ス高貴ノ人ヘハ夏ニナレハ御  
補藥ト号シテ清暑益氣湯或ハ生脉散ナトヲ用ユルハ誠  
ニ佞諂ノ至リ可惡コナレ氏亦勢如何トモスヘカウス寒  
暑ハ天地ノ正氣ナリ人ヲ破ルノ氣ニ非ス修身スレハ自  
ラ安全ナリ不保養ナレハ寒暑ノ氣ノミ中ルニ非ス夜氣  
雨露温涼ニ至ルマテ人ノ崇<sup>タカ</sup>シナス修身成徳ノ事ハ一言  
モ不言ニ補藥ヲ以テ其人ヲ壯健ニセントスルハ如何ノ

有識ノ人ヲ不恥ヤ

霍亂シタルヲ救ニ人ヲノ尿セシムルコト金匱ニ出ツ途  
中ナトナラハ左モアルヘキコトナリ是ハ腹ヲ温ルノ主意  
ニテ即灸法ト同意ナリ艾ハ不時ノ備一身邊ヲ放ス不<sup>可</sup>  
霍亂吐利腹痛シテ多ク米泔汁ノ如キヲ下スヲ見テ一醫  
大黃牡丹皮湯ヲ用テアルヲ人參湯一貽ニテ治シタルコ  
アリ全ク腸癰ト形ヲ同クシ食滯ヨリ因モ同シニアレハ  
必誤タリトテ無理ナウスサレ氏如此スレハ乍二人ヲ殺  
ニ至ル故兼テ意得ヘキナリ

- 人參湯
- 真武湯
- 桂枝湯
- 四逆湯



三黃湯

附子理中湯

小半夏加茯苓湯

五苓散

以上傷寒論

備急圓

紫圓

見小兒門

增損白朮散

錢氏白朮散中加乾生薑簡易方出

藏中正湯

灸 天樞

神闕

關元

氣海

清冷淵

淋病

是ハ壯實ノ人ニ多シ先ツ五淋ト云フ諸書ニ舉タル内ニ石淋ハ小便ノ中ニ石ノ形ヲナシタル物通ス齒塩ノ様ナルモノ也大抵血淋ト合病ス痛甚シク忍兼テ寒熱モ有或絶食ニテ疲レルモ有血淋ハ血ノ内ニ如魚腸凝タルモノ雜下シ尿孔ヲ塞ク故痛苦モ強ク數十日ヲ經面色青經月ニ至レハ唇舌青白膈間ニ悸ヲ生シ吸呼迫シテ終黄胖病ニナリ淋家ノ主治ニテハ治セヌモ有是ニナルハ治シヤスク命ニハ不拘針砂湯皇盤丸主之黄胖門ヲ見ルヘシ黄胖ニナラヌハ連延シテ死ニ至ルモ有淋也ト油斷スヘカ



ラスサレ氏皆元來ノ虚實ニ係ル氣厥論ニ胞移熱於膀胱  
則癰溺血ト云モノ是也丙字湯ヲ用テ再造散ヲ兼用ス夫  
ニテ治セス猶血多疼痛スルニハ如意湯ニ亂髮霜ヲ多加  
ヘシ筋ニヨリ黃連阿膠湯中ニ加ヘテモ用ユ久來ノ血淋  
ニハ猪苓湯モ用ユ連綿トシタルハ腎氣丸ヲ兼用スヘシ  
氣淋ト云ハ血モ白濁モナク小便心許ニテ不通頻數シテ  
痛ム是ハ虚脱ノ人ニ多ク又婦人ニ多シ俗ニ是ヲ消渴ト  
覺テ居ル也丙字湯ナレ氏無効ハ附子ヲ用ヘシ疝候ヲ尋  
テ疝ヲ治スヲモ有一婦人此症ニテ腰痛立テ不能ニ甲字  
湯ヲ用テ二貼ニテ全快セシヲ有膏淋ト云ハ小便ノ内ニ

脂ノ如キモノ交リ下リ消渴ノ便ノ如ニテ通利ノ後ニモ  
猶便心有ハ多房失精家ニ属ス腎氣丸ヲ用ユヘシ瘦テ力  
ナク盗汗ナトスルニ至レハ水腫ヲ催シナトシテ大病ニ  
至ル又膏淋ヲ病シ人ノ後ニ發背セシヲ二三入見タリキ  
苦痛甚ハ平臥不能起小便ノ痛ニテ痔ヲ兼ヤミ脱肛ナト  
スルモノ定例也甚シキハ肛内腫脹益小便ヲ秘澁ス痔門  
ト見合セテ痔ヲ兼テ治スヘシ乙字湯ヲ用テ却テ効ヲ取  
ルヲ有赤白如膿ヲ下スハ常式ニテ欲通時ニ尿孔ニ件ノ  
如膿モノ乾着スル故此ヲ押ヤフリ通スルマテノ苦楚甚  
シ尿孔中ニモ腫ヲ催スト着ユ又一種囊ノ後ニ結核ヲ夫ヨ



リ脹起シ懸癰トナルアリ大キニ苦ム疾ナリ夫ニナラス  
氏爰ニ疑所ナレハ心ヲ付テ問フヘシ膿ヲ爲シ口ヲ開ク  
ト小便此膿口ヨリ通ス故ニ瘡口塩氣ヲ受テ白ハゼニナ  
リ數年ヲ經テモ不治病ト偕ニ老果ル人モアリ是ハ其小  
便セントスル時ニ指ニテ瘡口ヲシツカト押ヘテ後ニ通  
スレハ傷口ニシミス痛モカルク瘡口モ治スル初起ノ節  
慎テ醫藥ニ從ヘハ如斯ニハ不至也輕々シク心得テ強歩  
房室飲酒食臑ヲ不慎經年ノ病トナル慎マズレハ有ヘカ  
ラス龍膽瀉肝湯ナリ又凝ヤウノ強キハ五物解毒湯ヲ用  
ユルモ有又莖ノ中コロナトニ發口シテ膿ノ出ルモア

リ其只腐爛ノ形ナク痔疾ノ漏ヲ作タルト同形ニテ四邊  
ハ生肉ニテ誠ニ針ノ穴ノ如クナリサレハ小便其穴ニ泄  
ル故染ニテ痛又經久テモ治シカ子ルモノ多シ壯年ノ人  
ハ存ノ外早ク自然ニ愈モアリ何レ性命ニサハリナシ是  
モ龍膽瀉肝湯加土茯苓モ有藤嶋丸化毒丸ヲ兼用スル  
モ有若其口腐爛シ陷凹ニナリテ終ニハ下疳ニナルモ  
アリ夫ナレハ全下疳ノ筋ニテ治スヘシサテ淋病ヲ治ス  
ルノ要ハ甘艸ヲ主トナス痛甚キホト効アリ丙字湯ニテ  
五淋共ニ皆治ス滑石礬甘散ヲ兼用スヘシ虫積ノ候モ不  
問ニ芟凶湯ヲ用テ甚奇効ヲトル人アリ奇ナル事也久年



ノ淋並ニ爲腫、モノハ輕粉丸少々、用ユヘシ總テ下症  
ノ丸散運用ニマカス腰部ノ灸モヨシハ膠ナト選用ス可  
痛劇ニ雞卵ニ砂糖ヲ入テ飲ムヲ奇方トナス又砂糖斗モ  
飲トヨク通ス流水ニ小便スレハ痛ノ薄ハ下ノ不堅故也  
愈後猶強歩力作梁肉酒ヲ禁ヘシ小便膠濁ハ淋トハ異ナ  
レ氏心得置子ハナラヌヲアリ邪熱氏ニ膀胱ニ入レハト  
ロクト濁ル熱ハカリ入レハ赤クハカリ濁五苓散ニスヘ  
シコトノ外黄色ハ茵陳五苓散ノ症ヲ尋ヘシ膠濁ハ滑石  
ノ主治ナリ五苓散ヘ加テモヨシ猪苓湯ナト用ユヘシ又  
小便餘瀝モ淋ニ似タルモノ也是ハ小便通シ切テ後ニ又

少ツ、漏ル也清心連子飲ニ宜シ是ハ方考ニハ勞淋ヲ  
治ストアリハ味丸モ用ユヘシ  
一人患淋三年頃ニ至テ苦楚シテ氣絶セントス如麵モノ  
尿孔ヲ塞紙シカケテ引出セハ三寸許ニテ葛切ノ如シ其  
物出レハ小便ヲ下ス丙字湯礬甘散ヲ兼用シテ愈其人曰  
某患淋數年ツキタテノ温ナル餅ヲ食スレハ膳モ片付サ  
ルニサハル三日モ過タルハ少シサワル二十日餘モ經タ  
ルハ猶更去冬ノカビモチナトハ少モサワラス又桃花飯  
ヲ食セハ忽ニサワル翌日茶湯ニテシメシ温ノ食スハ終  
ニサワルヲナシ數年ノ患故度々試タル所也ト云予始テ



其毒モ新舊ニテ優劣有ラ知況藥ノ陳久ナルハ其効ナキ  
モ可知

再造散 治厲風及諸血毒無療久淋方

反鼻六錢 鬱金二錢 白牽牛六錢 皂角刺六錢 大黃五錢

右五味爲末每服一錢空心白湯飲下隨性多少

滑石礬甘散

滑石

礬石各六分 甘艸三兩

右三味爲散每服五分日夜三四

龍膽瀉肝湯方

猪苓湯

黃連阿膠湯以上傷寒論 輕粉

丸見下

腎氣丸金匱

藏丙字湯

如意湯

乙字湯

灸 八髎腰部脚部

### 痔 下血

痔ハ肛門ノ病ニテ素問ニ出後世名稱甚多酒客ニ多故酒  
痔ノ名アリ肛肉脱出スルヲ脱肛ト云寒氣ノ節ニ多シ鞭  
キ大便ヲ下時ニ翻出ルヲ癖ニナリテ肛内ノ肉ユルミテ  
ホツレテ綻花瘡ノ如ニ出ツ出レハ軟肉故痛モ有レ疝出  
ルホトノヲナレハ腫モ催テ痛ムナリ甚シキハ坐スル  
ナラス側臥シテ百藥無効日月ヲ經テ自然ニ汁ヲ流シ腫  
消シテ愈ヲ待ニ至ルモ有又輕キハ手入シテ納ル又常ニ  
大便ノ毎ニ脱シテ其度ニ押入ル人モ有治療ノ法ハ服藥  
シテ外ヨリモ蒸シテ痛苦ヲ去腫消シテ早入ルヲ互ト



ス大便秘シテハ入レテモ又押出ス故ニ朱明丸ヲ諸湯ニ兼用シテ滑便ニシテ置ヘシ一切ノ痔強ク痛ハ猶更乙字湯主之蒸藥ハ蒙吾莖葉ヲ連テ煎洗痛ヲ去納リヤスシ又無花果葉柿葉モ効アルモノ也又煙艸煎汁熱ニ乘テ洗又薤葉モ奇驗アリ又外科正宗ニ大田螺一ツニ龍腦五厘ヲ蓋シ挑テ入置ハ水ヲ出スヲ雞翎ニテ腫上ニヌル奇効有又熊膽ヲ塗モヨシ其外奇藥種々也艾葉ヲ煎醬油樽ニ入テ孔ヲ開肛ヲ蒸ス又礬石湯ニテ蒸モヨシ外科正宗ニ出タル枳殼湯ニテ蒸モ奇効有大人小兒痢病ニ脱肛スルハ痢門ニ語通ナリ或人每便ニ必脱肛ニ坐スルヲ不能伏

而沉吟數刻ス早朝晝間臨臥ト三度ツ、日々腰湯ヲスルヲ三年斗ニテ全愈シタリキ便前ノ下血ヲ近血トシ便後ヲ遠血ト云近血ハ惡ク遠血ハヨシト云是ハ堅糞ニテ肛内ヲスリヤフリ下血スル也又肛内小瘡ヲ生シ其頂ヲ堅糞ニテスリ傷テ下血スル有腹内ヨリ出ルニ非夫故遠血ハヨシト云也下血ノ多ク腸風下血藏毒下血腸澀便血ト云腸澀便血ノ名モ素問ニ出腸澀ノ論ハ多端ナレ氏腸内ヨリ下血スルニハ非肛内ニ小孔ヲ發夫ヨリ瀉血人如系ニ射ル有至テ細ハ中間ハ絶テ不見下へ溜タル所ヲ見テ知レル厠ニテ居住居ニヨリテ肛内ノ小孔ヲ左右ノ肉ニ



テ押ヤウニヨリテ心外ノ方角ハハシリ出横ニハシルト  
テ怪フニ非是ハ夏月小兒ノ玩具或石花菜店ニテ水車又  
ハ燈籠實ヲ吹セル水ノ吹出ス管ハ些ノ物サハレハ左右  
心外ノ所ハハシル即此理也サテ下血スルヲ六七合或升  
餘ニ至ルモ有暈倒セントスルモノハ三黃湯主之是ハ神  
氣不定ノ様ニナルニハ猶更用ユヘシ如此ヲ數十日ニ及  
ハハ肌膚青蒼唇舌刮白ニテ虚悸胸間ニ鼓シ人迎ノ動脈  
甚ク耳内ニ及ハハ響キテ如蟬鳴眩暈シ手足ノ爪モ不榮  
シテ反カヘリ折ナントシテ黃胖病ト不異地榆槐花ノ類  
一切ノ藥無驗是ハヤハリ黃胖病ニ取扱テ針砂湯ナリ此

事ハ偶記ニモ詳ニ記ス元來腹ノ六ヶ敷人ハ痔ニサワワ  
レテ兩脇ヘ引釣或夜間眠ニクハナトニ至ルハ大柴胡湯  
ニスヘシ又肛邊ニ瘡ヲ生痒ヲ不可忍或ハ黃汁ヲ流シナ  
トスルヲ有是ニハ蒸藥ハ惡キヲ有見計肝要也又枯藥ヲ  
塗一時ニ瘡愈ヤ乍ニ眼目通赤スルモ有耳聾スルモ有又  
口中ニ發瘡モ有又氣ヲ閉終日默然トシテ不樂細慮纖思  
如氣癰是故ニ蒸藥ハ其瘡ノ姿次第ニテ行フヘシ悉乙字  
湯主之又心腹痛ヲ作モ有是ハ下血ノ俄ニ止タルニモ有  
心痛ニ語ル通也肛外ハ物ヲ生如指頭緊痛スル是ヲ俗ニ  
イボ痔ト云牛奶痔ナト云モノナラン又肛内頻ニ痛ヲ内



痔ト云是モ氣ヲ塞キ甚キハ心氣不定ニナル此類ハ長強  
ニ數千壯ノ灸ヲスヘシ都テ痔ニハ灸ノ効有モノナリ諸  
痔共ニ灸スヘシ又肛外へ孔ヲ生シ膿汁ヲ流ス其孔幾ツ  
モ發シ終身不愈モ有是ヲ痔漏瘡ト云近時之ヲ割テ肛門  
ト一ツニシテ内ヲ洗去テ療スルヲ外科ノ熟セル人ニ行  
フハ蠻法ナルヤ又脱肛ヲ藥線ニテ切ルヲ有是ハ睫毛倒  
衝ニ眼胞ヲ挾テ治スルト同意也何レ上手ノ外科ニ委ヘ  
シ痔ニ化毒丸ヲ用テ効ヲ取ルヲ有淋ニモ下疳瘡ノ治ニ  
テ治ルト同意也又膿血ヲ雜下スルニハ大黃牡丹湯ヲ用  
ユルヲハ實症ノ人ニカキルヘシ舊下血ニテ乙字湯ヲ用

テ無驗脉浮大ニテ無カト見タラハ一モ二モ無益氣湯ニ  
スヘシ又小兒肛門痒小細蟲ヲ生ルヲ有陰蝕蟲ト云ノ名  
ニ似タレ氏蝕スルニアラス又蟲痔ト云名ニアタレ氏は  
ニモ非ス痔ニハ屬セス疝ニ屬ス濁浪湯ニテ洗テ背腹へ  
灸スルヲ如疽法弄玉湯主之又女人陰所甚痒之ヲ搔ハ如  
火モノ痔ニ屬ス濁浪湯ニテ洗ヒ乙字湯ヲ服腰ニ艾灸ス  
ヘシ方書ニ女人陰所ノ病ヲ暗疾ト云ヘリ  
一婦人下血數十日及數升地榆槐花醫王湯粟米湯乙字湯  
ノ類寸効ナシ肛邊腫痛少シノ處ヲマタギテモ流血シ少  
モ股ヲ開ヲナラス虚悸膈ニ動耳鳴眩暈如黃胖與針砂湯



少快ニ似タレ氏下血ヤマス盛夏一日腹痛シテ手足微冷  
夜間予シ延其下血ハ常事腹痛是中暑也人參湯ヲ與テ加  
茯苓次日腹痛ヤムノミニ非氣力甚快經二三日下血止猶  
用テ數日ニテ全快ス後年又下血ス先乙字湯ヲ與不愈仍  
前年ニナラツテ人參湯加茯苓ヲ與フニ速ニ得効久下血  
ニ理中湯ヲ用ルハ是ヨリ覺タリ鑿說ニ腸澼ニ人參散ヲ  
用テ効アルヲ記セリ暗合也又外科正宗ニ加味四君子  
湯治痔瘡痔漏下血不止面色痿黃心忪耳鳴脚弱氣之云云  
又便血不禁ヲ治スト有是モ人參湯ト同意ニテ面色萎黃  
耳鳴脚弱ハ黃胖ニナラントスルニテ詳ニハ黃胖門ニテ

孰得スヘシ針砂湯ノ所主ニテ皇盤丸ヲ兼用スル所也又  
脚氣ヲ帶テ微腫スルハ九味栴榔湯ナトニスルヲモ有ヘ  
シ然トモ血ノ俄ニ脫シテ氣ト鈎合ハサレハ浮腫スルモ  
ノ也是ハ小便快利シ水腫トハ異ナレハ能々診シテヤハ  
リ主症ノ治法ニテ氣血相復シテ腫ニカ、ハラスニ腫ハ  
引モノ也吳又可カ所謂氣復ト云モノト同シ若シ小便微  
澁ノ氣アウハ猶更左無トモ腎氣丸ヲ煎服スルヲ佳ナリ  
朱明丸 治大人小兒大便秘閉

大黃 三兩 蕎麥 一兩

右二味丸梧子大每服十五六丸白湯送下



礬石湯 治脫肛腫痛

礬石一大握

水三升許者一二沸乘熱入醬油樽開孔蒸其肛為瘡而收  
又燒石通紅包漉酒巾浸湯中熨之

洗痔枳殼湯 治痔瘡腫痛肛門下墜母論新久洗之腫自消

枳殼二兩 癩蝦蟆草二兩

右河水三瓢ニテ煎ルヲ暫シテ薰ス後ニ洗又間ヲ置再  
熱シテ薰洗者三次後ニ五倍散ヲ傳ヘシ

五倍子散 治諸痔舉發堅硬疼痛難忍或臍毒肛門泛出腫  
硬不收亦効五倍子大者一小孔ヲアケ乾癩蝦蟆草ヲ揉

碎内ニ入テ紙ニテ孔ヲ塞濕紙ニ包煨シ去紙細末シ一  
錢輕粉三錢冰片五厘ヲ加極末ニシテ痔上薰洗ノ後ニ  
ヒ子リカケ睡リテ勿動此二方ニテ外痔ハ皆治スト正  
宗ニ詳ナリ

大黃牡丹湯金匱 大柴胡湯 三黃湯 理中湯以上

傷寒論 益氣湯或加地榆槐花 化毒丸見下

藏方 乙字湯 針砂湯 濁浪湯 弄玉湯

灸 長強 八髎



積聚

奔豚

伏梁

虫積

五積六聚ト云ヨリ病目種々ノ字ヲ冠セシメテ通用ス疝積氣積食積血積肝積ノ如キハ醫俗トナク唱ルヲ見ルニ酒ヲ飲テ後腹痛スレハ酒積ト云ノ類ニテ一向ニ心得アリテ云ニ非ス痰ヲ吐キ咳嗽スル人胸下ナトシ痛ムハ痰積ト云又腰腹股脚ノ痛ヲ疝積ト云ヘトモ是ニモ痰嗽ナトスレハヤハリ痰積ト云何ワケモナク何積ト云ヘハ病者モ合點シテ治療ヲ任ス積ノ字ハ病ノ字ノ如ク二見ナシ上ノ字ヲ要ニ取扱フ可笑ノ甚キナレ凡此病ニ限ラサレハ今責ムルニ不足積ハ物ノツモリタルヲ云ナレハ



自然ト出來ルヲ云即音モ恣ニナリテヨケレ氏セキニ取  
 サバク又形ノアル積ノ名ナリ聚ハ氣ノ聚リタルニテ形  
 ノアルニ非ス或ハ散或聚ルノ一ニテ癥ト瘕トノ如シ癥  
 ハ塊ヲ結ヒテ爰ニアルト云ホトニ徵ノ見ユル積也瘕ハ  
 形アリト見ユレ氏假ノ形ニテ散スル時モアルノ名也塊  
 ハ手ニアタリ或ハ稜角有モノモアリ按シテ痛ムモ有如  
 何ニ按シテモ不痛モアリ土ノカタマリテアルツチク  
 レト云ノ形ニ似タルニテ塊トハ云即癥ト同シモノナリ  
 元來ノ字ヲ設タル如此ナレ氏中世來ノ醫書ニハ混雜シ  
 テ有サテ長談ナレ氏爰ニ人身ノ一體積ノトノ起ル所ト

中年ヨリ病ムワケヲ語ウン此意ヲ理合スレハ上下左右  
 萬病ノ變化詳ニ胸中ニアリテ何病ニモ病形ヨリ病因ヲ  
 知ルヘシ諸醫籍ノ論ニアハヌ故ニ其人ニ非レハ無用ノ  
 ミナラス老子ノ下士者聽テ笑フ意也説キカタキ一也五  
 積六聚ハ五臟六腑ニ配スルヨリ起ルナレ氏其積ノ形ハ  
 分リ兼且又藥モ分テアレ氏又ハ五積六聚共ニ治スルノ  
 方ナト、アリ夫ナレハ五積六聚モ分ルニ及ハヌニ似タ  
 リ五積ノ名ハ肺ヲ息貫ト云難經曰息貫在右脇下覆大如  
發肺癰以春脾ヲ痞氣ト云難經曰痞氣在胃脘覆大如盤久  
甲乙曰得之肝ヲ肥氣ト云難經曰肥氣在左脇下如覆杯  
不爲肌膚以冬任癸曰得之難經曰任癸在左脇下如覆杯



瘧連歲不已以季夏戌巳日得之腎ヲ奔豚ト云難經曰貴豚發於少腹上至  
久不已令人喘逆骨疼心ヲ伏梁ト云難經曰伏梁起臍上大  
少氣以夏丙丁日得之今按スルニ伏梁ハ梁ヲ伏シタルト云義ナ  
今人病煩心以今按スルニ伏梁ハ梁ヲ伏シタルト云義ナ  
秋庚辛日得之今按スルニ伏梁ハ梁ヲ伏シタルト云義ナ  
ラシ拘急シテ腹ノ両脇引張テアルヲ云トシユ即芍藥ノ  
主スル所ニテ急ナレハ痛モアリテ甘キモノニテ治スル  
即建中湯ノ主ルモノシヤ云フナラシサレ氏一面ニ急迫  
シテ痛心下悸モノ建中ノ症ナレハ伏梁ノ主方ト覺テハ  
ナラ子氏引張タルハ甘ニテ治スル也奔豚ハ腎積ノ名ニ  
ハアレ氏奔豚氣ト云テ腎積ニ拘ラスニ説タル所多クア  
リ奔豚氣ノ病ハ胸ニ上塞トアレハ胸下ニセマルモノナ

リ豚ノ走タルカ如クニテ俄ニ動悸ノ胸ニ上テ昏倒スル  
モ有此病ハ金匱ニ恐怖アリ火邪アリト説ケリ驚怖ヨリ  
發タルモ灸アタリヨリ病シモ見タリ苓桂朮甘ヲ用ル所  
ニテ又針砂湯或鎮神丸モヨシ又貴豚湯存ノ外効アル方  
也息責痞氣肥氣ハ如覆杯トアリ少シ宛ノ別有レ氏是ハ  
枳朮湯ノ主ナリ金匱ニ氣分心下堅大如盤邊如旋杯水飲  
所作桂姜朮黃辛附湯主之トアルハ誤謬ナリト金匱箋註  
ニ見ユ事長ケレハ本書ヲ見ルヘシサレハ如斯ハ何ヨリ  
起ト云根元ハ皆瘀血ニ屬ス是ヲ飲込テ萬病ヲ通考ス可  
血氣ノ流注一身ノ貫通惡クナレハ何ノ處ニテ結滯スル



モ定ル處ナシ其瘀血ニナルト云ハ折傷打撲ニ因ウス其  
因遙ニ父母ノ血液受胎ノ時ニアリ胎毒ノ一ハ詳ニハ小  
兒篇ニ説初生ノ兒ニハ胎毒ト呼テ瘀血トイハス胎毒内  
ニ畜ヘ血氣是カ爲ニ瘀滯シテ成長ニ及テ見ハルハ多  
端ノ形ニ變ス初生ノ内アウハルハ頭上ニ發シ或口中  
眼目ニ發ス甚キハ聲啞シテ泣啼スルヲ不能是ミナ同シ  
毒也此ニ發セヌハ疳トナリ驚トナリ馬脾風トナル又腹  
痛ヲ作シ哭泣晝夜ヲ不分アリ痘疹ニ至テモ其輕重知ル  
ヘシ中年ニ至リテ發スルハ此毒冉々ニ滿新血ヲ榮セス  
大絡中ニ結シテ形ヲ見ス時ニ外邪ニヨリ或ハ食物ニ動

サレテ夫ヨリ持前ノ形ヲ現スハ人々ニテ多端ナリ内ニ  
畜ヘタルハ皆積トナリ塊ヲ結フ食ニ因テ發シタレハト  
テ食塊ニ非ス上衝頭痛偏痛スルモ臂痛スルモ脚痛スル  
モ此塊ノアル所ノ絡ニヨリテ上下左右ノ分ナク痛ム温  
散ヲ主トスルノ理ヲ知ルヘシ中風痛風又此因ナリ其外  
噎膈ヨリ諸癰疥鼓脹脹滿勞瘵等ニ至ルマテ此因ニヨレ  
氏其形異ナル故名目モ分レリ其名目ニ泥ム故ニ積ハ治  
セスト云人多シ癥モ瘕モ伏梁モ外見ニテハ異ナレ氏實  
ハ同シニテ絡ニ節ノ出來テ血ノ流レヲ留タル所ヘ流來  
テ其所イヨク太クナリ絡張テ如瘤故ニ其邊雙筋トモニ



此絡ニツサレテ順流不爽再々ニ流ヲ留テ皮膚上ヨリ按  
スレハ塊トモ癥トモ云ヘキ形ニナル此時物ノ爲ニ動サ  
レテ發動シテ痛ヲ爲スモアリ流注ナウスニ極リテソコ  
ニ溜リシ瘀血絡ニ結テ堅塊スル也又ハ天氣寒涼ナトニ  
ヨリテ流注ヲ留タルハ服藥針刺ニテ頓ニ流テ筋絡モユ  
ルム是ヲ聚トモ癥トモ云フヘシ立筋ノ大小絡一ツニ引  
シメテ急ニ張タルヲ拘急或ハ伏梁ト云此絡ノ通スル所  
ニヨリ腹中ニサハラスニ背脊或ハ手足ヘ引テ痛ヲ作ス  
モアリ腰部ニ凝テ寒涼時氣ニ因テ痛ムヲ疝ト云ヘ氏亦  
同因也一體疝ノ字ハ積ノ大キナルノ名ト見ユ山ニ从フ

ニテ知ルヘシ血氣順流シテ調榮スル人ニハ此積ハナク  
則胎毒ナキ故ニ血モ瘀セス順流スルナリ痘疹モ輕ク無  
病ノ人トハ云ナリ血瘀スル人瘡ヲ疾テモ截カ子作塊瘡  
母ト云ニナリ傷寒痘疹等ニ至ルマテ皆重シ婦人ハ爲之  
ニ經水不行或ハ孕スルヲ不能鼓脹脹滿ニナルモアリ爰  
ニ意ヲ用テ病因ヲ考フヘシ内發ノ病ニナ是ヨリ起ル腹  
候ノ心得第一也東門隨筆ヲ見テ味ヒヨ又世ニ肝積ト云  
ハ手足ヲ引シメルモ口眼ナトヲ引ツルモ癰ノツキテ目  
マタキ繁ク鼻ヲシカメルモ脇腹ヲ痛メルモ筋ノツルモ  
氣シモムモ氣ニチカニテ怒ルモ泣モ肝積ト唱フ上ニ說



タル肥氣トアツカウス清心抑膽湯柴平湯ナトヲ用ユル  
ニ至テハ其因ヲモ不考又精神不安ハ多ク心氣不定ノ症  
ニ屬シテ三黃湯主之夜眠ルヲナラヌハ亂心ノ兆也油  
斷スヘカウス心神不暢シテ亂心モセント云ニハ柴胡加  
龍骨牡蠣湯甚効アリ又氣ヲイラツハ人參所主也又痔瘡  
或ハ頭上ナトニ發タル疹ヲ傳藥シテ俄ニ治シテ夫ヨリ  
前症ヲナスモアリ皆大便燥結スルモノ也漫ニ肝積ニタ  
マサレマシ又腰背部ヘ灸治ナト大効アリ疝積ト稱スル  
ハ別ニ説クヘシ氣疝ト云モノト氣積ト呼ナスハ積ト云  
ウチニ癖疾ニテワケモノナキヲ氣ニヤシ或ハ萬物ヲ不

淨ニ覺エ夜寢ルヲナラヌノ類癩ニ屬スヘキモノト雖是  
ハ素問ニ心氣痿ト云モノニテ心ノナヘタル如ニテ訣モ  
ナク取越苦勞スル何事モ心ニカ、ル方書ニ怔忡驚悸門  
ヲ立タル所ニシテ是モ柴胡加龍骨牡蠣湯ナリ多ハ膽略ノ  
無キ人志願ヲ不遂神ヲ傷テ病ム是ハ動悸處々ニ有ルモ  
ノ也其動ハ何レヨリ出タルト言フ味ヒ求テ且又如何  
ニシテモ治セヌヲ考見レハ胎毒久積シテ起ルノ別モ可  
知食積ト云ハ食傷ノ治シツコ子タル也消食散タチニテ  
オフコツト仕テ終ニ食積トナリ血液不榮骨立シテ廢人  
ニナルモ有是ハ嘔吐ノ處ニテ論ス可是ニハ癖囊ト云一



田ノ話アリ痰積ハ留飲ニテ見ルヘシ血積ハ甲字湯鼈甲湯ニテヨシ或ハ反鼻ヲ用ルコトモアリ附子ニテ温散スルモアリ婦人ノ積ハ皆爰ニ限ル其形ハ背脊椎骨ノ左右ノ脊肉ヲ痛腰冷足寒上衝耳鳴頭痛眩暈スルノ類ミナ瘀血ニ係ル猶婦人篇ニテ詳論スヘシ積ノ形ヲ見ハスニ心下痞シ時々痛ヲナスモノ多シ乾姜黃連黃芩人參湯嘔スルモノハ小柴胡ニテ互キモノ多シ背脊部腰脇ナト灸スヘシ絡脉流注シテヨシ太平日久人氣鬱スル故ニ大柴胡或抑肝散ノ類ニテ其鬱ヲ去ヲ好ト云説アルハ尤ノコナリ心煩スル積ニハ半夏瀉心ナトヲ用テヨシ又灸痕膿ヲナ

セハ瘀血此ヨリ發泄シテヨシ然レ血液枯燥スル故灸痕モ乍ニ痂脱シテ外ニ癩癬疥疹ナトモ發セヌモノ也生漆五十錢和味淋酒一升七日飲盡一身發疹如癩癬濁外泄宿疾頓治ス舊年ノ血枯腹痛等ニ用テ妙也赤丸モ同意味也麻痘後忘痼疾人有ハ瘀血外泄シテ治ス也又食物ニ嫌ヒ多ク味噌ナトヲイヤカリヤ、モスレハ頭痛惡心南風ニテモ吹キ或ハ陰雲催雨ノ時ニハ必兼テヨリ頭痛惡心或ハ吞酸ス其面色曇リテ眉間兩目ノ間ニ隱々ト微黃色ヲ帶常ニ唾ヲ吐ク白沫ニテ痰ニ非或眼皆ニ爛ノアルモアリ如斯人ハ心下中脘ノ處ムツクリト高クヤハラカニ手



掌ノ下ニ溜ルト云様ナ手サハリニテ凝ツタルト云ナス  
ホトニモ見ヘスニアリ即虫積也是ハ度々見レハ自然ト  
悟リテ知レル芟凶湯正面ナリ兼テ紫圓ヲ用ルモアリ  
此虫積ノ害ヲ爲ス百端也ヨク見分ヘシ虫ヲ吐下スル  
マテ知ラスニ居テハ大負ト云モノナリ虫積ノ原ハ胎毒  
ニ起ル故此虫穢ヲ去リテ思ヒカケナキ容體ノ治スル  
多々ナリ腹候ニテ識ヘシ又俄ニ積ト稱シテ急痛スル是  
ハ心下ノ物ノ上衝スルハ少ク只急迫シテ痛ムモノ多シ  
氣ノ聚リタルマテニテ一時ニ解散スレハ驟雨ノ晴タル  
カ如クニナル香氣ノ高キ藥品ニテ散スルモノ多シ奇應

丸今壽丸甚シキハ熊膽ナトニテヨシ婦人ニ多シ絡中痰  
滯絃急シテ背脊ニ引キ痛モノ足部ニ針ヲシテ緩ムモノ  
アリ絡脉ノ事ナルヲ知ルヘシ又動悸ヲヨク胸ヤケルハ  
猶更中腕以上急痛スルハ工录散奇驗アリ一種心下急痛  
スルニ手モ近ケカタク痛ム者面色ヲミルヘシ唇ノ色モ  
アシク顔色ヲシカメ六脉閉伏シタルニハ心痛アリ大病  
ナリサレ疋形ハ似テ心痛ニアラサルモノ多シ真心痛ハ  
脊椎五俞ノ邊ヘ徹シテ是ヘモ手ヲツケルモナラズ痛ム  
カ平臥スルヲナラヌモノ也手足逆冷スルヲアレ疋是  
ハ常ノ積ニモアル先ツハ撫サスリ按摩ヲ喜ブモノ皆心



痛ニアラス建中湯或ハ芍藥甘草湯是ハ脚へ引ツルノ主  
ナレ氏急迫へ運用スヘシ又桂枝加附子湯ヲ甘草ヲ本方  
ノ通ニシテ奇驗有痞痛ニハ參連湯熊參湯木香散モヨシ  
工彖散モヨシ只建中湯ノ之ク處腹氣懸隔ナリ腹ノ見分  
ニ意ヲ付テ急痛ト痞ト鞭ヤノ分ヲ見ルヘシ苦痛ハ同シ  
形ナリサテアマリハケシカウヌニ痞へテ痛ムニハ弄玉  
湯桂枝加苓朮ナトニテモヨシ

失精ノ人臍ノ左傍一動悸アリテ動スレハ上衝シ奔豚ノ  
状ヲナス是素問ニ所謂大衝ノ脉ナリ奇經ノ衝脉腎經ノ  
脉トヲ合スル故ニ其脉大ニシテ無病ノ人ニテハ大脉ト

ナリ津液竭乏失精乾血ノ人ニテハ動トナリ塊トナル強  
按スレハ痛上下ニ引テ堪カタシ癩ノ發スルナトモ爰ニ  
根サス調理カヲ盡ト雖其動塊穩ニナリ難シ是腹候ノ一  
ツニシテ其脉ノ昇流シテ左胸ニ出ルヲ虚里ノ脉ニナル  
ト見ユ虚里ノ動ハ腹候ノ條ニ云通り脾ノ大絡トアレ氏  
此脉ノ上流也龍骨牡蠣ヲ運用スヘシ桂枝ニモ柴胡へモ  
加フ奔豚氣ト同形ニテ至テ治シ惡シ久病後ニ多シ又久  
病ノ後ニ食ヲスルト痞へ或ハ腹脹シ噫氣ナトスルハ積  
ノ部へハ不屬胃氣ノ不和也又空腹ニナルト發スルハ腹  
勢惡クナリテ發スル也食ヲ可與フ是ニハ疝積多シ疝モ



腹痛スル多シ腹ニテ見分テ可知當歸湯又ハ烏苓通氣十  
ト也又夜中寢入ノ六ヶ敷ト云積ニハ食ヲ可與フ又朝々  
腹ノ六ヶ敷ニモ夜中臨臥ニ食セシムヘシ睡中ニ空腹ニ  
ナル故腹勢惡クナリタル也又尿床スル人ニ食ヲ厚ク與  
テ其夜ハ不泄ハ腹氣下ニ實スル故腹勢上ヘ引アケ拘急  
ヒ又故ニ小便モレス朝ノ積ノ發ルヲヤムルト同意也  
芟凶湯 下虵虫穢物方

鷓鴣菜 二錢 大黃 二分或三分 蒲黃 二分 苦楝皮 二分

右四味以水一合半煎取一合空心頓服日一夜一小兒用  
意減之大便滑者去大黃

蔓連湯 治諸氣疾衝心直視煩悶或吐血不止者方

人蔘 黃連 各五分或一錢

右二味以水二合煎取一合少加熊膽亦妙小兒驚風亦主之  
熊蔓湯 主治同前小兒慢驚急風亦主之

上好熊膽 人蔘 各等分

右二味照常煎服

赤丸 治血痼腹痛方

生漆 大黃 麵粉 各等分

右三味蜜和調為丸每服五分白湯送下日一夜一發赤疹  
為知



鼈甲湯 療男女塊癖方

鼈甲 桃仁各一錢 虎杖七分 大黃二分

右四味以水二合煮取一合二劑數日後從大便去黑物毒垢香膠散兼用甚良

乾姜黃連黃芩人參湯 小柴胡湯 建中湯

芍藥甘草湯 柴胡加龍骨牡蠣湯 桂枝加龍骨

牡蠣湯 苓桂朮甘湯以上傷寒論 三黃湯金匱 紫圓小兒

烏苓通氣湯方彙 甲字湯 令壽丸 當歸湯

弄玉湯 鍼砂湯 工錄散 木香散

灸 章門 不容 天樞 脊第二行 第三行

心痛

是ハ難治ニテ又急症ナリ其人常ニ脉弦急ナルモノ多シ是ニ緩急ノ二ツアリ急ナルハ人ヲ呼ノ間モナク死ス兎角救フハナラヌ病ナリ金匱ニ云トコロノ病狀今ノ見トコロニ符合ス是ヲ辨スルニ背痛徹心心痛徹背ト云ハ心背一時ニ痛也心下ハ手モ近クヘカラス少シサハリテモ忍フナラスイタム背モ五俞ノ邊痛強或ハムツクリト腫ルモ有平臥スルヲナラス起坐シテ苦ム胸膈ノ痛ヲハ常有ノ症ニテ痛ノハトテ皆心痛ナルニ非ヨク辨ヘシ場所アシキ故他病ニテイタム凡油斷ハナラス吐血スルヲア



リ心痛ハ鳩尾ノ真中少シモ脇へ不偏痛ム胸痺ト云ハビ  
リくと響カ如ク痺ル、様ニ痛ム捨心ハ胸膈ハ痺ル、様  
ニ痛ミ心下ハ捨カル、ヤウニ痛ム懸痛ハ腹ト胸トカ離  
レテ居ルカト云様ニ痛ム並々ノ痛ト異ナリ心中飢タル  
カ如ト云ハスキ腹ニナリタルヤウニ覺ユルナリ食ヲ與  
フルニ甘キ物ヲ食シテ苦痛ノヤムモアリ食シテ快キヲ  
覺フルハ佳兆トス如食蒜狀トアルハ聲ヲ立テ呻吟スル  
モナラス苦々シキ顔ヲスルナリ病ノ間アル時ニ見レハ  
瘡タルヲモ無ク見ユルモノナリ急ナルモノハ朝發夕死  
トアレ氏今發シテ今死スルモノ多シ又少シ吐血シタル

モ時々見受タリ是ハ胸痛シテ吐血スル人多故吐血ニ屬  
シテヨケレ氏吐血ト云ホトニハ不出一口マテモ出テス  
即死ス一種酒客ノ胸痛ハ吐血後其痛ヲ忘ル有其緩ナル  
ハ間々救フヘシ其形ハ皆胸痺シテ心中痞塞懸痛徹背モ  
ノ上ニ説タルト同形ナリ肥人ニ少ク瘠人ニ多シ愚魯偶  
然ノ人ニ少ク性急智巧ノ人ニ多シ痛甚シキニ至リテハ  
四肢厥逆ス一體如此大病ナレハ何ニモ見違フヘキニ非  
レ氏積痛ト甚似タリ俗人モ心痛ノ難症ナルハ知ル故心  
下痞痛スレハ苦勞スルヲ衆醫トモ心痛ナト、サ、ヤク  
ヲ聞テ益容子惡ク手足モ冷テ自汗モ出痞痛劇シキハ安



臥セズ轉倒ス脉ハ是モ沉伏ス心痛ト混シヤスシ只積ハ  
撫摩スルヲ好テ按者ノ手ヲ放シカマルモノナリ是心  
痛ニ非ル所ナリ兼テ心得テ居ルヘシ是ヲ目利ノ一ツト  
ス又積ノ痛ニ發ルト臥スルヲ不成乍ニ起坐スルモノア  
リ是ハ積ニテモ惡キ形ナリト知ルヘシ心痛ノ類ナリ九  
種ノ心痛ト有レト一々ニ分ケラル、モノニ非ス偶言ナ  
リ古方ニ括萋薤白白酒湯括萋薤白半夏湯ヲ用ヒタリ薤  
臭ヲ忌ム人アリ存分ニ用カマル胸中痞留氣結シテ胸ニ  
在リテ滿シテ下ヨリ逆ニ捨心スルニ枳實薤白白酒湯ヲ  
用又人參湯モ用ユトアル方意大ニ異ナリ緩急ノ所ニテ

二方ヲ分テ用ユヘシ白酒ノトハ叢桂偶記ニ書載タリ此  
病ハ兎角温藥ヨシ附子ヲ用テ驗アリ薏苡附子湯ノ類得  
ト考ヘ用ユヘシ嘔逆ヲ兼タルアリ真心痛ニハ非スマト  
思ハル、日々ニ痛テナヤムモノハ當歸湯至テヨシ烏頭  
赤石脂丸ヲ兼用スルヲモアリ急迫シテ痛ムモノ半ニ居  
ス建中湯ヨシ桂枝附子湯ノ甘草ヲ本目ニシテ多用ルモ  
ヨシ砂糖湯ナトヨシ又餅ノ類ヲアタ、カニ煮テ食スル  
ト暫痛ノ不發モアリ是積ノ空腹ナリテ發スルニ食ヲ與  
テ止ト同意ナリ又心痛ノ因ニ痔疾ヨリ發スルヲ時々  
見受タリ下血痔瘡ナト俄ニ止テ心痛スルモノ又下血或



ハ發瘡シテ愈ル也。是ニ劇症ハナケレ。凡藥驗ナク長ナヘ  
ニ病ムコトアリ

一士人痔疾ニテ下血ス。馬鞍瘡ヲ患ヘテ肛外ヘ發ス。枯藥  
ヲ以平快ス。一日強飲シテ醉臥ス。夜半ヨリ心痛徹背背痛  
徹心指モ不可近。手足厥冷。只坐シテ臥スルコト不能。胸塞氣  
喘達明。少シ痛ウス。ク心中飢タルヲ覺フ。少シク食シテ漸  
痛ウス。シ手足モ温マリ。益有生意。翌夜復發ス。其發セント  
スルト齊ク衣被ヲ去テ起坐シ驚テ起フモノ。如少シモ  
猶預スルコトナラス。是ヨリ發作アリ。毎夜臥スルコト不能ヨ  
レカ、リニ坐シタルカ後ニハ疲テ終ニ横ニコケルト乍

ニ發ス。此時ニハ心中如飢意地ナリト言。百藥効無ク別テ  
白酒ノ入藥ハ痛ミ強シ。脉常ニ弦大ナリ。及一年餘病勢漸  
退キタレ。凡半夜ハ平臥スルコト不能。元來酒客ナルカ餅葱  
白ナトツ者テ夜食スレハ痛ミモコソヘヨク腹勢ユフタ  
リト覺フ。又過半年時々微ニ下血ス。是ヨリ痛甚減シ。當歸  
湯ヲ服スルコト一年許終ニ全快。後四五年ヲ經テ落馬シタリ  
其夜又發シ如前症。薏苡附子湯ヲ與ルニ寸効ナシ。夜半ヨ  
リ發痛シテ少シモ横ニナルコト不能。烏苓通氣湯ヲ與テ三  
日ホト全快シケルカ。又發ス。予因テ痔疾下血ノコトヲ問フ  
ニ百日前ヨリ痔ノ氣ナシ落馬シタル時飲酒ニ其酒不美



一ツヲ覺フト云及半年餘骨立肉脫元氣衰テ人ニ對スル  
ヲ忌自云夜々痛ントスル時乾菓子ノ分テ甘キ物ヲ食テ  
快キヲ覺ト仍建中湯或甘艸乾姜湯ヲ與フ胸ノ痺スルハ  
常ニ止ス懸痛スルハ休作アリ種々ノ方藥無寸効日月ヲ  
經痛漸々ニ退テ既ニ一年許ニテ平復ス然レハ大便快利  
時々下血シテ肌肉モ生シタリ

一農人富饒素封ニ比ス心痛ヲ患フ隱々トシテ膈間塞リ  
時ニ喘咳平臥スルヲナラス飲食無味痛休作スレモ手モ  
近ク不能病ノ間ニモ按摩針灸スルヲナラス日々醫ヲ  
迎テ議論區々ニ千金ニテ治センヲ求レモ微驗ナシ一

日天氣清朗病間ナル時ニ樓ニ依テ眺望ス一聲咳スルト  
鮮血ノ唾沫ヲ一口吐ヤアツト倒テ終ニ不蘇

一娼家夫胸痺ニ常ニ心痛シ飲食不美病間ナルトキハ氣  
力如常一二友人來訪圍碁ス大發ス手モ近クナラス轉  
倒乾嘔妻孥皆曰是酒傷ナリ常ニ醒日ナシ仍醫ノ治スル  
モノ酒トナシ治之無効或ハ疝トナシ或ハ痰トナシ三和  
散輩連投益危余曰是ヲ胸痺トナス即其脊第五椎邊ヲ按  
セントスルニ指ヲカサスコトモナラス當歸湯加附子ニ  
貼ヲ與テ痛半ヲ去三十日許ニシテ全愈シタリ  
一士人心痛ス痛ム時ハ人語ヲ聞コラ忌ミ自手ヲ懷ニシ



テ撫胸膈平坐シ臥スルヲ不好自云痔瘡肛ノ邊ニ發シ  
テ痒カリシニ自然ト治シテ不發終ニ崇ヲナスト余思フ  
ニ病輕シト則當歸湯ヲ與微功アレト痛ヤマス轉テ桂枝  
加苓朮附湯ヲ與フ胸膈ヲ按スルヲ間遠ニナリ便後時々  
微ニ下血スルトヤカテ愈此症ニ腰部ニ灸ヲシタルニ其  
驗アリシナレト是亦經歷スルヲ少シ後日シ俟

括蕒薤白白酒湯

括蕒薤白半夏湯

枳實薤白

白酒湯

人參湯

薏苡附子湯

烏頭赤石脂

丸

建中湯

以上傷寒論

藏方當歸湯

一、二、三寸白

疝ハ積聚ト同因ニテ瘀血ニ属スルナレト見分ケニ少カ  
ワル所アリ其證候多端ニテ人々見付サルヲ有北風或雨  
雪ノ前日ヨリ腹痛シ盛夏ト雖雷氣ヲ催シ北風雹霰ニテ  
モ降ラントスル時ハ腹痛ス雷ハカリニテハ病ニサワラ  
ヌ也婦人ナト朝ヨリ雷ノ催ヲ知テ頭痛スルハ虫積ニテ  
芟凶湯ノ主スル所ト又血分ニヨルトナリ疝ニ非スサテ  
疝痛ハ左右ニ定ナク腹中隱々ト痛之ヲ按セハ肋骨ノ下  
ノアタリ或臍傍ニ絡脉太ク塊ヲナサントスルモノ有夫  
ヲ強ク按セハ陰股邊ヘ引ツリテ痛モノ疝也寒冷ニ發ス



ルハ誰人モ知レ氏此病トハ縁ヲ引又様ニ見ユル有積年ノ腹痛ハ皆痼ニ属則之ヲ寒トナス桂枝加苓朮附桂枝加附子或烏苓通氣或甲字加附子モ用ユヘシ烏頭ニセ子ハ附子ニテハ一切ニキカヌモ有又甘草ニテ痛ノヤムモ有是ハ急痛ニテ大小建中モ又芍藥甘草附子湯モ奇効ヲ得ル有腹ノ引張ヲ見ルヘシ桂枝加附子ニ甘草本目方ニシテ用ルモ妙也又心痛ニ似タル有背マテモ痛ハ猶更當歸湯ヲ用ヘシ又嘈雜シテ痛ムモノハ工彘散也嘈雜ナキモ用ヘシ心痛ト痼痛トハ腹ヲ按スル中ニ知ル也指モ支ヘカ子ルト云ト按シテホシヒト云所ニテ別ヘシ痼ニコ

トノ外氣ヲ塞キ萬事ヲ苦勞ニシテ取越氣癖ニナリ又亂心モセント云形ヲナス有世ニ潔癖ヲ氣痼ト云是ハ已ヨリ直サ子ハ藥力ニテハ不治終身ノ癖ナル多シ人ノ事ハキタナク已ノ事ハヤリハナシナル有又已ノ事マテ湯水數度洗イ淨ノル有此潔癖モ痼也左傳定公三年邾子在門臺臨廷閣以餅水沃廷邾子望見之怒閣曰夷射姑旋焉旋小命執之弗得滋怒自投于牀廢于爐炭爛遂卒廢墮也先葬以車五乘殉五人莊公卞急而好潔故及是卞疾也ト見ユ予常ニ云フ古昔ノ醫法別ニアリテ今ノ素難ニテ學フモノニアラスト云是等ニテモ考ミルヘシ是ハ氣痼ヤミノ肝積モナ



ナリ今ハ十ト云病モ亦旋ト云トモ通用セス氣病ト云モ  
ノモ疝ニ屬スルヲ多怔忡驚悸ト云病門ヲ立タルモノ皆  
氣病ニテ貴賤貧福トモニ存入タルヲ不遂心ヲ傷テ病  
ムモノハ前ニモ云素問ノ心氣痿ト云モノナリ婦人ニハ  
血ノ道ト稱シテ其中へ入テ細ニ辨セス別テ婦人ニ多ク  
物音ヲ忌ミ或ハ人ヲ忌明ヲ忌暗室ニ入テ靜黙ヲ欲スナ  
ト皆心氣ノ痿タル也又晝日煩躁夜ニシテ安靜ナルハ血  
症ナリ件ノ氣病ニ此症ヲアラワスヲ有レハ能考合セテ  
治スヘシ男女共ニアル病也猶婦人門ニテカタラシク勞瘵  
ト見合セヘシ兎角ニ氣ヲ結ト云所ヲ問テ疝ナルヲ合

セ考ヘシ疝ノ候ニハ腹ノ鳴ヲ有又瀉下スルヲ疝瀉ト云  
舊痢ノ止リカ子腹痛甚シキモノニ疝ヲ治シ手扱スルヲ  
多シ疝瀉ハトメルハ惡シ裏急後重ノ氣アラハ合璧飲ニ  
テ跡ハ烏苓通氣ナトヨシ氣疝ニ何ノワケモナクコリカ  
タマリ亂心セント云モ動悸ツヨク見ヘハ柴胡加龍骨牡  
蠣湯ニテ効アリ寒疝ニ腹痛吐食スルモノハ胃反ト同事  
也蔓情湯奇驗アリ嘈雜スルハ猶更也工彖散ヲ兼用ス疝  
ハ心外ニ見ヘヌ所ニ病狀變化アル事虫積ト同シ爰ニ語  
盡ヘキニアラサレハ工夫シテ治スヘシ數度ニ手扱スル  
モノハ心痛ノ間違ト舊痢ト陳久腹痛持病ト唱ル積持ナ



トナリ又水腫ノ腰部ニ多キハ疝ナリ脚氣ニ疝ヲ兼ル有  
必心中ニ疝ト云モノヲ置テ活動スヘシ又積聚ノ論ト考  
ヘ合セヘシ

濕疝ハ囊常ニシメリテ痒シ不可敷枯藥上逆耳痛眩暈ス  
ルヲ有癩疝ハ素問ニ出ス俗トシヒント云是ハ母多足モ  
同症ナルヲハ偶記ニ論セリ橙奇藥也又橘核モ用ニ又鋒  
針ニテ囊ノ皮ヲ切レハ水ヲ出シテ治スレ氏又不日ニ溜  
ルモノナリ十分ニ水ヲモチタル所ヲ淺クサスヘシ  
婦人ニ疝氣ハ無ト覺ユル醫アリ是ハ素問ノ任脉ノ爲病  
男子ハ内結七疝女子ハ帶下瘕聚ト云ハカリヲ覺ヘテ誤

タルナリ五藏生成篇ニ黃脉之至也大而虛有積氣在腹中  
有厥氣名曰厥疝女子同法得之疾使四肢汗出當風此ノ外  
ニ色々ノ方書ニ婦人ノ疝ヲ論スルヲ多シ

古書ニ三蟲ト云ハ虻虫寸白虫蟻虫也世ニ疝氣寸白ト並  
言此地俚言ニサ、ヘリ虫ト云モノ寸白虫也本事方曰寸  
白虫先食豬肉一片乃以砂糖水調黑鉛灰四錢五更服之虫  
盡下食白粥一日許學士病嘈雜服此下二虫一寸斷一長二  
尺五寸節々有斑文也ト見ユ其狀平タクテ長ヲハホトノ  
知レヌモノ也丈餘ニモ及色白テ紫點紋アリテ節ヲナス  
之ヲ下トキ隨分大事ニ物ニカラムニテ引出セ氏切レ易ク



切レハ乍ニ肛内へ縮入腰中冷痛ヲ患ヘテ痴ト云人之ヲ  
下シテ治タリト聞ケモ予ハ未目撃彼虫ヲ下スヲハ時々  
見聞モシタリ余モ壯時之ヲ下スニ半ニテ引切二日ヲ經  
テ又下ル靜ニ引出スニ其末ト覺ヘタルハ殊外細ク尖タ  
リ下ルノ前後何ノ異ナルヲモ不覺之ヲ下ノ藥ハ未學莖  
凶湯ニテハ不下或傳フ竹ノ皮釋也嚴酢ニ浸テ一日夜黑  
燒ニシテ服スレハ下寸白虫如教スルニ無驗然此證候有  
寸白虫ト云看法モ不知レハ其虫ノ無キ人ニ用タルヤ誠  
癡人ノ夢ヲ説ニ齊又俗間脚皮中ニ屈曲シテ虫ノ狀ヲ作  
シ寸白ト云フアルハ間違ニテ得ト見レハ絡脉ノ切レテ

下ヘタニマリタル也額上ナトニモ見ルヲ有必ス下ノ方  
ヘノミタマルニテ虫ナラサルハ知ルヘシ田間ノ人濁  
酒ヲ飲故此虫多ト云フ有果シテ然ルヤ未知又件ノ脚皮  
中ノ絡ノ切ルモ田間ノ人ニ多キト覺ユ

調中湯 頓醫抄ニ産後一切ノ痢病ヲ治トアルヲ寒疝腹  
痛ニ用ユヘシ其方

高良姜 當歸 桂枝 芍藥 附子 川

芍各一兩 甘草半兩

右判合每服三錢水三盞入一盞ニ煎シ滓ヲコシアツフ  
テ服セヨ此藥ホトコスコトニ効アラスト云フナシ



立効湯 張璐玉醫通方

山查子 苦棟子 枳實 木 香附子

青皮錢五 吳茱萸錢三 延胡索錢五

右水煎服之

芍藥甘州附子湯 大小建中湯 桂枝加附子湯

以上傷寒論 烏苓通氣湯方 桂枝加苓朮附湯 藏 蔓倩湯方

當歸湯 甲字湯 工錄散

叢桂亭醫事小言卷之三 畢



