

門七武  
籍 77  
卷 4

叢桂亭醫事小言卷之四目錄

勞瘵

痰

腸癰

痛風

下疳

鼻口咽喉

噎膈

肺癰

鼓脹

黃疸

眼耳

喘息

咳嗽

哮喘

肺癰

肺痿

脹滿

黃胖

平石藏書

醫事小言卷之四目錄

叢桂亭藏

叢桂亭醫事小言卷之四目錄畢

叢桂亭醫事小言卷之四

原南陽先生口授

門人

伊豫

向居克

筆記

讚岐

渡邊德

校正

勞瘵

勞瘵ハ難治ニ極マリテ醫藥ノ治スル所ニ非ス幾千百ノ  
方ヲ用ユルトモ必死トス勞トハ心勞房勞シテ成ル病ノ  
義ナレトモ夫トハ異ナリ瘵ハ詩ノ小雅ニ上帝甚蹈無自  
瘵烏トアリ傳ニ病也又戰國策ノ註ニモ病ナリトアリテ  
今ノ勞證ノフニアラス説文ニ勞病也トアルハ後來ノ醫

家説ニヨリテ註解ヲ作りタルナラン肘后方ニ出タルモ  
ノ醫書ニテハ始トスヘシ醫説ニ瘵ハ必死シテ祭ラル、ノ  
義ナリト見ユ又醫宗金鑑ニ瘵ハ敗トモアリ是等ノ註ニ  
アタルベシ如此大病ナレハ素難ヨリ論シテアルヘキナ  
レトモ一言是ニ不及蓋古ノ無キ病歟又ハ此論紛失シタ  
ルヤ今不可知金匱ニ始テ虚勞ヲ論シタレトモ得ト今ノ  
勞病ニ不<sub>レ</sub>的當腎虚ヲ論シタリ故脈浮大弦遲ヲ説ク五勞  
ノ名モ金匱ニ出タレトモ闕文アリテ其一々ハ病源候論  
以下千金外臺ニ論シ下宋元ニ至リテクハシク記スル所  
ニ虚損諸不足ヲ勞瘵ニ組入ルハ甚不吟味ナリ肘后方ニ

骨蒸熱トアリ其熱ノ形ハ骨蒸ト云ニ盡シタリ此病  
ハ始發スルハ咳嗽ナリ風ヲ引タル咳嗽ト少モ不違又風  
ヲ引タルニ相違モナシ脇ヨリ見テハ何レニモ輕證ニ見  
ユル其大病ニ至ルハ其咳嗽イツマテモ不止小青龍湯十  
ト寸効ナシ起步ニ短氣シ微寒熱毎日午前午後ヨリ催シテ  
床ニ卧ニモ不及ソロ々ト氣重ニナリ總身瘦テ飲食無味  
此ニ種々ノ證アリ一同ナラス客ヲ見ルコトヲ惡ミ暗室ニ  
入モアリ元氣快爽ニテ言談快暢スルモアリ食物不變味  
モアリ此證半途ニ至レハ痰ノ殊外ニ粘スルモアリ臭キ  
モアリ白キモ黄ヲ帶タルモ其内ニ血線トテ血ヲ絹絲ノ

如クニ交ユルモアリ桃色ニ一面ニ交ルモアリ鮮血ハカ  
リモ又ハ血點交ルモアリ黒血或薄黒ノ如ク交ルモアリ  
紫血ノ交ルモアリ此諸證ハ一旦ニメ止ムモアリ始終止  
マザルモアリ何レニモ凶惡候ナリ始寒熱モ無ク咳嗽シ  
テ痰血ノ出ルモアリ勞瘵ニアラストモ凶兆ナリ況ヤ其  
催ト見ユル病者ナラハ大事ナリ何故如此ナリト云ニ積  
聚門ニ論シタル通ノ胎毒ニ根サシテ新血ヲ不榮シテ乾  
血瘀滯ノ人風寒ニ傷レテ咳嗽ヲ發シ欲愈ノ時ニ調節不  
宜或勞動スルコトアリテ輕邪ニテモ散シソコ子テ數々再復  
シ勞ニナル或ハ瘧ノ寒熱不退シテ遂ニ勞ニナルモアリ

是ヲ勞瘵ト云又ハ疫後ナトヨリ勞ニナル又婦人産後ニ  
發スルヲ蓐勞ト云小兒ヲ疳勞ト云皆同因ニテ其小兒ノ  
疳勞ハ十二七八ヲ可治瘵ヲ煩ハズハ勞瘵ニハナルマジ  
キモノヲ産ヲセズンハ勞瘵ハ煩ラハスト云ヘカラス元  
来ニ發スル毒ヲバタクワヘタルモノ瘵ヤ産ニサソハレ  
テ發シタルナリ今ヤミツカストモ何ノ時ニカ是非ニ發  
スルナリ世醫風勞瘵勞ナト、名目スルハ外ニ深意別因  
アルニ非ス風引ヨリ勞ヲサソヒ出タルヲ風勞ト云痰咳  
ノ強キヲ痰勞ト云俗人ニ見立上手也ナト、云評判サス  
ルマテノコト也サテカクノ如ク胎毒ヲ畜ヘテ血分不爽行

ハ勞ラモ病ト云人ナル故ニ常ニ沈黙ニテ不元氣ナル  
モノナリ快暢活氣ノ様ニテモ少ノヲニ意掛ナトスル性  
質ナルモノナリ又肥タル人ニ少シ是亦瘀毒アル故ニ瘦  
テ肥ルヲ不能ナリ其發スルニ遲速ノアルハ外ヨリ動サ  
レテ發スル故ナリサレトモ大概十七八歳ヨリ二三十歳  
ノ際ニ發スルナリ是ハ血氣既ニ盈ントスレハ毒アル故  
ニ閨澤セス情慾動キ世務或其身ノ稽古修行ナトニ心勞  
スル折カラ外感ニサワヒ引テ發スルカ故ナリ老成ニ至  
レハ情慾モ心勞モ一通手合スミテ勞スルヲ薄ク俗ノ所  
謂身ヲキタヘルト云氣味ニテ胎毒ヲ畜ヘタル人モ勞ヲ

免ル也サレハ其後ニ至リテ噎隔ヲ病ムモ中風スルモ鼓  
脹ニナルモ其因ハ一毒ニテ古ヨリ名醫哲匠トモノ手ヲ  
束タルトコロナリサテ其病ノ吉凶ハ脉ニアリ數ニナラ  
ヌハ諸證勞ニ似タルモ非難治只其必死トスルモノ脉細  
數ノ一條ニアリ其病未發飲食元氣平日ニテ無事ナレト  
モ脉細數ニテ熱アルヤト見ユル人アリ經年ニ勞ヲ發ス  
ルヲ時々見タリ卧床セスニ病モノ多シ夫ユヘニ俗醫ト  
セ勞ノ床ニ着タルハ如何トモスヘカラスト云ハ死期ノ  
近クナリタルノミ一體勞ノ難治ナルヲ知レトモ其脉候  
ヲ自得セサルユヘニモシモくと思タル人ノ語ナリ卧床

スルヲ以テ難治トセス細數ヲ以テ難治トス勞ニ似タル  
病甚多シソレヲ治シテ勞ヲ治シタリト覺ヘタルハ古ヨ  
リ多シト見ユ先第一ニ似タルハ氣癖ノ人ナリ繁華ナリ  
ヲ忌ミ暗室ニ引コミ人ト談論容接ヲ惡シ或ハ他出ヲ嫌  
指タルノ無ヲ取越苦勞ヲシ或ハ人ノ己カ短ヲ議スル  
カト疑ヒ飲食美ナル時アリ食ノナラヌ日モアリ夢多ク  
安眠ナラス自ラモ勞瘵ナリト覺悟シテ千万教誨スレモ  
飲込ス或ハ人ニ對シテ不義理ヲシタリ己ノ心底ノトハ  
カサルト先非ヲ悔ヒ心中ニ是ヲクリカヘスニ暇ナク或  
常ニ病證ヲ考ヘ人ニ對セハ痛苦ヲ告ケ訴ヘ同事ヲ幾度

モ云其人眩悸上衝心煩微寒熱乍來乍去其病状ハ醫モ知  
サル所アリ己一人ノ病ニテ天下ニ如斯病ハナキト思フ  
仲景ノ所謂百合病ト云モノハ此ヲ指カ百合知母ヲ用ニ未  
得其驗此上猶可試甚ハ睡中ニ死センコトヲ恐レ不能獨處  
看病人ヲ少ノ間モ離サス怔忡驚悸ス又起居如常ナレト  
モ門外へ出ルコト不能傍人コレヲ勸メテ移情變氣ノ法ヲ  
行ハント見物遊山ナトヲ催セトモ不趣強テサリハレテ  
モ芝居ノ一幕モ見ルト逃歸又信心念佛ナトヲ勸ムレモ  
遂テ誦スルコト不能何故ト穿鑿スレハ芝居ノ面白カラサ  
ルニ非ス信心ノイヤナルニ非如此ニマキレル時ハ己ノ

病氣ヲ考ル<sub>レ</sub>不能<sub>ク</sub>以間居スル<sub>レ</sub>ヲ好<sub>ミ</sub>甚キハ繁華ノ  
處ニ臨マントスレハ手足ノ心ヨリ冷汗ヲ出シ面赤ク眼  
ノ様子マテ變ス千萬教誨異見スレ<sub>レ</sub>凡一向ニ用ヒズ是ハ  
素問ニ出タル心氣痿ト云モノ也日月ヲ經テ自然ト治ス  
貴賤貧富ノ論ナク志願不遂心中ヲ傷ル人ニ多シ先ハ決  
断ノナキ人ナルモノ也大驚ノ後ニモ發ス自ラモ勞瘵ナ  
リト覺悟シテ死ヲ待<sub>ト</sub>ノミニナル此内ニ心氣不定乱心ス  
ルモアリ又疝氣ト云モノモ以上ノ状ヲナス氣塞<sub>リ</sub>アリ  
疝ヲ治シテ効ヲ取<sub>リ</sub>モアリ俗人皆是<sub>レ</sub>ヲ勞下地トイ<sub>ハ</sub>凡  
不細數<sub>テ</sub>酸棗仁湯柴胡加龍骨牡蠣湯温膽湯ノ類ヲ用ユ<sub>ハ</sub>

シ是ニ巫神湯奇効ヲ得ル<sub>レ</sub>アリ咳嗽痰沫ノ粘<sub>リ</sub>吐クニ  
皮弁散何<sub>レ</sub>ノ方ヘモ兼用ス<sub>ハ</sub>シ眩悸常ニ舟ニ乗カ如ク  
手足煩熱セハ參連白虎湯心煩スルニハ半夏瀉心湯モヨ  
ロシ是ヲ治シテ勞瘵ヲ治シタリト思フハ可笑ナリ然ト  
モ此病モ不<sub>レ</sub>手入ニテ筋ノ違タル治療ニテハ死ニ至ル<sub>レ</sub>  
シ病者ノ虛實ニモヨル<sub>レ</sub>シ夜中眠ル<sub>レ</sub>不能<sub>ク</sub>ニハ狂スル  
<sub>レ</sub>多シ無病ノ人風ト眠ル<sub>レ</sub>ナラヌハ狂ノ兆也狂ノ催ト  
見タラハ瓜蒂散ノ場アレ<sub>レ</sub>凡是ハ別ニ教ユ<sub>ハ</sub>シ柴胡加龍  
骨牡蠣湯ヲ用ユ<sub>ハ</sub>シ朱砂安神丸ヲ兼用スル<sub>レ</sub>モアリ氣  
癖ノ人ニモ用テ驗アリ又微疫數度再復シタルモノ眞勞



ニ似タリ證候ヲ不詳ハ大病ニ至ル其至ルトキニハ勞ニ  
非ト雖尸死スルニ至ル可慎是ハ勞ナリト心得テ誤テ四  
花ノ灸ナトシテ外邪ナレハ火逆スル故大病ニスルナリ  
其舌白胎黃胎ハモトヨリ也胎ナク只地アレシテサラツ  
クモ横豎ニ裂テ有モ又皮ノムケタル欵ト見ユルモ舌  
ノ薄ツマリテ見ユルモ疫ニ屬ス是ハ勞ノ形ナクフラ  
フラト食乏シテ煩ハ微疫ヲ不知他病トナシテ誤治スル  
フ有此症ニ逢ハ最初ニ惡寒シタルフ有ヤト問ニ有ト  
云ハ猶更昔過ル故忘テ居モアリ右舌候ヲ以テ疫ナルフヲ  
知テ可治衄血スルモ有少シモ熱ノ往來有ハ輕疫カト心得

ヨ又發勞トスル人疫ヲ受テ合病スルハ甚劇症ニテ無救法  
死症也痰唾ノ臭ハ肺癰ヲ催アリ肺癰ハ可治本病ハ必  
死ナレハ無救法又瘰癧モ勞形ヲ為蓋合病スルモノ同  
ク死證ナリ是亦瘀血ノ困ニ係テ勞ト併病ニアラス尸死  
スルモノアリ馬刀瘡トモ又馬刀狹癭ナトモアリ根ト  
リタル所馬刀ニ似タル故其形象ヲ以テ名ツクル瘰癧ト  
云モ耳下頸ノ所ニ累々歷々ト幾ツモグリクノ結スルヲ  
以テ名ツク此グリクハ俗ニ痰核ト云モノモ同シニ見ユ  
レ氏底ハナレテ根アサシサテ痰ハ如此カタマルモノニ  
非ス皆絡中ニ瘀血ノ結シタルナリ小柴胡加石膏湯神驗

アリ葛根湯モ背脊ノハルヲ目當トシ五物解毒湯ハ膿汁  
ニナランヤト云フ味ノトコロヨリ用ユ又尺中ヲ刺血ヲ  
去モ良シトス先ハ小柴胡加石膏也法ハ翹玄湯是モ化毒  
丸ヲ兼用スルヲ有リ灸法アレ尺未見其驗是モ勞ト併病  
ナラサルモノ、治法ナリ灸法ハ瘡瘍全書等ニ出タリ又  
香川カ肺膿ヲ勞ノ一證トスルハ一概ナリ勞ノ中コロヨ  
リ後ニ此症ヲ併病スルモノ多ケレハ是ヲ見テ論シタル  
ナラン肺痿ハ肺癰ニ似テ膿ナキモノヲ云是モ時々見受  
タリ肺癰カト思ヘハ膿ナク痰唾ハ臭シ是コリ瘵疾ノ一  
種ナリ○勞ノ候ハ腹皮離レテ薄ク下ニ板ヲ按スル如ク

ニ引張テ潤ナク脊ニ着テ或ハ乳下ヨリ左右へ伏梁アリ  
任脉凹ニナル或ハ皮上ニ細絡青ク見ヘテ一面ニ拘急ス  
ルモアリ金匱ニ裏急ト云モノニ建中湯ヲ用ユル所ヲ味  
ヘミルヘシ細動悸處ニアリ呼吸ノ應不穩即チ少氣ナ  
リ夫故ニ座敷ノ内ノ歩行ニモ息切レテ脉ヲ見セントテ  
居直リテモ短氣ニナリ小鼻<sup>コハナ</sup>扇ク甚シキハ胸肋モ扇ク又  
肩息ス肩背ノ諸骨呼吸ニツレテ動クハ凶候言ヘカラス  
唇赤キニ過ルモノアリ或面ニハ瘦ナク燕脂ヲ粧フカ如  
ハ桃花炷ト云又惣体ハ瘦テ色青白ニテ兩顴ハカリ紅ヲ  
點スルカ如キハ帶桃花ト云察色ニ詳ニス盜汗自汗出少

シク睡ルニモ髮際ニ汗ス婦人ハ此病ヲ發セントスレハ  
先經閉スル者ナリ破血ノ藥ヲ用テ大便下利スルアリ又  
大便始終滑ナルモアリ○勞ニ傳尸ト云丁アリ或傳尸注  
ト云注ハ外人ニ流注スルノ義也肘後ニ鬼症一門相染ト  
モアリ是ヲ傳尸勞ト云一人病メハ血脉ノアル人へ傳テ  
死ス又他人ニ傳ル丁モアリ老大ノ人へ傳ル丁モアリ如  
何ナルワケヲ不知甚シキハ門ヲ滅スルニ至ル藥灸シテ  
偶治シタル様ニ思フハ勞ニテ死シタル人ノ兄弟ナト其  
病ノ傳フルヲ苦勞ニシテ自ラ迎ヘテ氣ヲ結ヒ不元氣ニ  
ナリタルヲ外人モ勞ヲ傳タリト取サワケ氏實ハ眞ニ非

ルモノニテ前ニ云所ノ氣癰ノ類ナリ灸藥ニテ治シタリ  
ト醫俗共ニ思フ是ハ時々見ル所ナリ勞ハ何レニモ必死  
ナリト知ヘシ外臺ニ引所ノ文仲ノ伏連病ト云モノ傳尸  
ノ名ナリ臨哭シテ傳ユルノ説アレ氏必然ルヘカラス外  
臺ニ蘓遊論ヲ引テ曰傳尸之疾本起於無端胎毒ノ因ニ屬  
ス故ニ無  
端ト云莫問老少男女皆有斯疾大都此疾相刻而生先内傳  
毒氣周遍五臟漸就羸瘦以至於死死訖復易家親一人故曰  
傳屍亦名傳注以其初得半卧半起號為殮殞氣急咳者名曰  
肺痿骨髓中熱稱為骨蒸内傳五臟名之伏連不解療乃至滅  
門肺痿ハ勞ノ一證ナル丁可徵予兼テ思フニ伏連ハ伏流

ナトノ伏ニテ何レヨリ来ルモ知レスニ連リテ病ム故ニ  
傳尸ノコヲ云ナリト解セシカ爰ニテ見レハ五藏へ伏連  
シタルノ名也證治要訣曰五臟中ニ皆有勞蟲名曰勞瘵難  
以醫之ト云フハ其難治ナル故蟲アリト云説オコリタル  
ヤ東門隨筆中ニ勞咳異形ノ蟲ヲ吐シタルコトヲ記シタリ  
一醫治勞蟲ノコトヲ説テ人聽ラ惑スモノアリ其言曰勞蟲  
ハ胃中ニ生シテ漸ク肋間ノ肉ヲ蝕ス此蟲甚靈ナリ仍テ  
竊ニ午黃丸ヲ製シテ急ニ與レハ蟲コレヲ避ルコト不能故  
藥驗アリ若シ此事ヲ病人ニ喻シテ用ユル時ハ驗ナシ其  
用ユルニ手延ニテハ肋間ノ肉ヲ蝕シタル痕不愈ニ蟲ハ

殺テモ共ニ難治ナリト云又西京ノ荻台州祝法ニテ勞蟲  
ヲ取ル果テ何如ナルヤ凡治勞ノ奇方ト稱スルモノ多シ  
ト雖氏終ニ其驗ヲ不見皆是似タルモノヲ治シタルナラ  
ン四花ノ灸ハ古今一面ニ奇効ヲ説ク予モ亦常ニ是ヲ用  
ユレ氏必真ノ勞ハ不治久痰或ハ氣癰ナトニハ効アリ白  
虎湯竹葉石膏湯柴胡桂枝柴胡姜桂ノ類ハ皆似タルモノ  
ヲ治スルニテ真ノ勞ハ必死ナリ後世ノ歸脾養榮ノ類地  
骨皮黃柏知母ナトモ何ソ効ヲ望マン元來其發スルハ外  
感ニ屬シテ病付モノナニ七八ナレハ補法ヲ投スルハ了  
簡ノ有ヘキコトナリ獺肝冷勞ヲ治スト云コト金匱ニ肘后方

ヲ引タリ冷勞ト云モノハ其證候知ヘカラス直解ナトニ  
先ツ冷ニ傷レテ後ニ勞ニナリタルナトノ註アレヒ今見  
ル所ハ熱ニ屬シテ骨蒸スルモノナリ獺ノ勞ヲ治スルコ  
トハ水狗丸ヲ小兒ノ疳瘦朝熱ニ用テ辨フヘシ骨蒸ニ効  
アランハ深思シテ知ヘシ又義順丸モ異驗アリ人膽人油  
ノ類才覺ノシニクキモノユヘ俗人大ニコレヲ貴トヘヒ  
真勞ヲ治スルコトハ不可望也脉細數ナラヌヲ治スルマテ  
ノコニテ細數ニ至リテハ必死ナリ其内ニ老人ノ勞ハ俄  
ニ數ニナラス壯年ノ人ハ急ニ數ニナルモノ初ヨリ數ニ  
ナルモノ多シ世ノ中ニ才氣アリテ敏捷ノ人多ク病ム簡

雅ノ人ニハ反テ少ナキハ其人トナランズル時スコシ屈  
撓アルニヨリテ志意不遂ナトヨリ中氣抑鬱スルト見ユ  
又太宰春臺ノ真珠丸効アルコトヲ説ハ似タルモノヲ治シ  
タルナルヘシ今之ヲ用ユルニ下利下重スルコト甚シク大  
ニ用ヒ惡シ頃東都何某ノ方トテ一方ヲ傳フ 人參  
熊膽 蕎麥 三味等分丸服スト云寒熱咳嗽發散ノ藥  
ヲ數日用テ治シ兼タルニ柴胡桂枝湯ヲ用テ咳ハヤシ熱  
ノ往來治セサルニハ加鼈甲ヲ鼈甲ハ瘡門ニ云塊ヲ破ル故  
ニ熱ノ解スル意ナリサテ此咳ニ潤アツテ痰モヨク切レ  
テ吐シ出スモノ盜汗アラハ猶更是ハ無トモ柴胡姜桂湯

ヲ用テ効アリ金匱要畧ニ大黃蟄虫丸ヲ載テ五勞虛極羸  
瘦腹滿不能飲食スルヲ治スルヲ説テ内有乾血肌膚甲  
錯兩目黯黒ヲ治スルヲ記セリ是ヲ醫燈續焰ニモ引テ  
アリ古人補藥ト云モノ如斯品味ニテ瘀血ヲ去テ然ニ新  
血ヲ生シ榮スルヲ以テ補藥トスル味面白キヲナラスヤ  
勞瘵ハ從來瘵毒ニ属スルモノナレハ此蟄虫丸ノ意ヲ含  
テ治スヘシ仍化毒丸モ此味ナレハ諸湯ニ兼用スルナリ  
此病萬一ニモ治スル醫ノ有ント早ク辭退シテ賢路ヲ開  
キ良工ノ治理ヲ盡サシムルヲ善トセンヤ元來死病ナレ  
ハ己カ所識ノ方術器量ヲ盡シ庶幾クハ其効ヲ試ヲ善ト

センヤ

翹玄湯 療瘵瘵俠瘦

連翹

玄參

升麻

羌活

梔子

木通

薰陸

甘草

右八味以水二合煮取一合

水狗丸

療勞瘵初發諸證未具者

水狗

去皮腸胃  
燒存性

右一味細末糊丸每服三分日二夜一空心黃耆湯送下

義順丸

療瘵勞初發咳嗽發熱盜汗黃瘦者

茶毘處煤

甘草

麝香

右三味糊丸空心黃耆湯送下十五歲以上每服七分二夜一以下用意減之

柴胡加龍骨牡蠣湯

參連白虎湯

於白虎湯方中入參黃連ヲ加フル

ヲ參連白虎湯ト稱ス

酸棗仁湯

半夏瀉心湯

竹葉

石膏湯

柴胡桂枝湯

柴胡姜桂湯

以上傷寒論

大黃蟄虫丸

金匱

五物解毒湯

化毒丸

見下疳門

肺癰湯

巫神湯

皮弁散

見卷中

灸

四花

患門

脊際ヲ俠テ連リ灸ス七推際

ヨリ十三四推ニ至ルヘシ俗ハシコ灸ト云日ニ灸スル三四十壯

噎膈

反胃

噎膈ハ食ヲ下スヲナラス病ニテ噎トハカリモ膈ト計モ云噎ハムセルヲニテ戰國策ニ噎而後穿并何及於急トアリ水ニテモ不飲ハ不通也抑老人ハ食物噎スルカ故ニ杖端ニ鳩ノ飾ヲ作鳩ハ不噎ノ鳥也是ヲ鳩杖ト云漢書禮儀志膈ハ胃膈ノ膈ナレバ膈ト云意ナレバ又素問ニ膈中否膈靈樞ニ上膈ニ洞下膈脾膈ナト見噎ハ素靈ニハ不見五噎五膈ト云ハ病源候論ニ出氣噎憂一食一勞一思一憂一寒一熱一又羅天益衛生寶鑑ニ十膈ヲ出セリ此外食噎酒膈ノ類其名繁シ膈膈高噎ニ作異義ナシ又閑格ト云アリ格ハ吐逆ニ関ハ小便不利ノ一也ト雖氏

膈噎反胃閉格ト并稱スサテ噎膈ハ古昔ヨリ難治トスユヘニ  
幾ノ奇方良法ト雖治スル一無病因ノ論多端ナレ氏胎毒瘀  
血ニ屬ス瘦テ氣ノ勝タル性急如烈火ノ人多一體智巧人ニ勝  
レ機會ヲ以テ世ニ居ル人ノ病也愚癡ト温厚ノ人ハ病ス又猪  
首ノ人ニ少鶴首ノ人ニ多其病状食物咽喉ニツカヘ飲氏不  
下其皆ハ白沫ジハくと聚出冷水ヲ飲テ通時モアレ氏是ハ  
初起ノ一也後ニハ強テ湯水ヲ飲ハ鼻孔ヨリ出テ終ニハ支夕  
ル食物ヲ吐出スサテ粥モ通カタキハ糯米ノ粥又麵類ニト  
口クヲカケ又餅團子喉ニテ散セサル物ヲ食スヘシ夫モ  
通スハキナコヲカケテ飯ヲ食スレハ奇妙ニ通ル此症下ハ必

吐スル一無心神不變外ニ苦腦ナシ壯年ニテ病ハ大半治スル也  
丹水子ノ利膈湯或半夏瀉心湯及急湯ナト又菴羅果一味煎  
服スルモヨシ何故ニ喉ニツカヘタルカ偶ニ下レハ又吐スル  
一無ト云ヲ尋ルニ喉ノ食道ノ左右ニ大絡有其絡中ニ瘀血凝結  
シテ癰瘤ノ如クニナル故ニ食道ヲセハメテ通用ヲ塞其所ヲ  
通過レハ胃中ニ納ル故吐スル一ハ無也通ル一ナラヌ故ニ上  
ヘカヘルヨリ外無是ハ吐ニ非不下也往時西京ニ橋本鍼源  
トカ云人刺絡ヲ以行ル膈ヲ治スルニ人迎ノ邊ニテ絡ノ怒脹シ食  
道ヲ狭モノヲ索得テ鋒鍼ヲ上ヘムケテ刺ス黒血ヲ流ス絶粒  
ノ人立地ニ食スル一ヲ得タリ經日又前症ヲ發ス時ニ偏ノ絡



ヲ刺ト又得食<sup>コラ</sup>其癰瘤ノ所至テ知カタシ一二度刺セハ鍼  
痕邪魔ニナリテ刺<sup>レ</sup>不能終ニハ又不通ニナリ死スレ  
氏其通タル時生ヲ万一ニモ望ヘシ門人モ多見タレハ其  
術ヲ傳タル人今尚有シカ或曰腸ヲ病人一日面部ヲ撫ルニ  
覺<sup>快</sup>日<sup>ク</sup>ニ按摩シテ全快シタリト是ハ喉咽ヲ俠孫絡ノ  
面部ニ浮タルヲ按摩シテ結滯通暢シタルナラン病因考ニ思  
慮ヲハブキテ治タルヲ記是モ絡脉順流シタルナラン  
サテ其機アラハ早ク思慮ヲ省キ日<sup>ク</sup>灌水スヘシ庶幾ク  
可治<sup>ス</sup>也

反胃又翻胃トモ云同義也金匱ニ胃反ト出猶轉胞<sup>ク</sup>轉是ハ腸

ト違テ食ノ不下ニハ非食物得ト胃中ニ納リテヨリ出朝ニ食  
シテ暮ニ吐ス癖囊ト云モノ反胃ト同病ニテ近頃此邊ノ醫  
多癖囊ト呼何故ニカ近来此病多シ全胃ノ力乏飲食不能  
消化<sup>ス</sup>故ニ噯氣酸辛鼻ヲ衝キ嘈雜ズルヲ頻ニテ腹痛甚ク  
吐セハ痛乍止故ニ指ヲ以テ探吐ス食物ヲ吐盡ノ後ニハ水ヲ吐ス何水  
ノ出ルヤト思程多ク其水モ吐盡セハ煤色ノ物又海苔<sup>ク</sup>如ヲ吐<sup>レ</sup>モ  
有滑便ノ人モアレ氏先秘閉ス便ノ通スルハ痛薄シ大槩朝飯前  
快ク午食後ニ至テ腹痛シ以上ノ語ル症ヲ作シ晚間晡後ニ吐<sup>レ</sup>丁字  
湯曼倩湯主之其人飲食ノ味不變却テ貪食<sup>ス</sup>平日ニ異ナリ  
此病寒疝ニ屬ス臍傍<sup>ニ</sup>堅塊アリ是ヲ按セハ五體ニヒビキコ

タユ數十日ヲ経タルハ腹ノ津液ナク筋バリテ常ニ鳴或足跗  
ニ微腫有又腹面ニ一物浮出テムツクリト頭足有力如ク按セハ  
手コタヘ無ヂククト鳴テ没ス不鳴ニ無ナルモ有出没無定所  
非塊非絡脉凝結此物ノ見ルハ大病ニテ一快ヲ得モ又再發ス  
甚不審ニ思フ時ニ一狂人切腹スルヲ押留テケルニ臍傍三寸許  
切タリ是ヲ縫テ治タル後ニ胃反ヲ患彼腹面ニ件ノ物浮出テ如  
小鼠又蛇ナントノ動ニ似タリ按スレハタワイモ無没スルニ  
其疵口ノ痕ノアタリニテ消ス仍テ思ニ是必大腸ノ脂膜ノ切  
テ腸ノホグレテ收ラサルナラント是ヨリ意ヲ用テ胃反ノ人  
ヲ見ニ果シテ大腸ノ脂膜切ユルニ定位ニ不收也疵氣ニ蟠腸

氣ト云フ有萬病回春ニ盤腸氣ニ作是適當ノ文字ナレ凡杜撰  
ノ恐アリ金匱寒疝篇ノ大建中湯ニ有頭足上下スト見ユ即  
是ヲ云最建中湯主之所也此病法則ヲ守レハ什ニ七八ハ治  
外臺ニ華佗ヲ引テ胃反ノ病ヒタル朝食夜吐心下堅如杯往来寒  
熱吐逆不下食此為寒癖所作トアリ千金翼ニ癖ヲ癖ニ作治痰  
飲法曰諸結積留飲癖囊胸滿飲食不消灸通谷五十壯ト見ユ  
寒疝トモ寒癖トモ云ヘキ也其原ハ瘀血凝結シテ形ヲ作タルナリ  
此病人何ニテモ見マタル物ヲ貪食シ食スレハ必腹痛ス魚肉餅  
麵生冷菓實ノ類ヲ食セハ別テ大痛シテ晚ニ至テ吐ス故ニ嚴  
禁スヘシ仍日用ノ食物常法ヲ定ム一日陳倉米一合ヨリニ

合半粥又ヤワラカノ湯取ノ飯是ヲ四度ニ分テ食セシム  
飲物ノ多ヲ嫌カ故ニ藥モ一貼ニ限リ湯水モ一合ヲ一日ノ  
分量トス茶ハ別テ惡シ、燒塩ヒシホ梅干燒味噌位ノ  
ニテ食セシム厚梁ノ物胃中ニ入レハ不能消化力故ニ痛  
ムナレハ淡薄ニテ消化シ易ヲ食シメ自然ニ胃ノ力復スレ  
ハ經日月而愈ミテ後モ禁食專一也然トモ此食忌ノ一容  
易ノ教戒ニテハ守カヌル腹痛ニ吐モ合点ニテ貪食スル  
モノ也此法ヲ守ル人ハ皆可治不能守人ハ辞テ不<sub>レ</sub>与藥病  
状ハ旋覆花代赭石湯附子粳米湯ニ似タレ凡曼倩丁字背  
ニ徹痛セハ當歸湯吐甚ニハ安中散疝ト積トヲ参考シテ

桂枝加附子烏頭湯ニ香脂丸ヲ兼用スルモ大小建中工象  
散モ用ユヘシ秘閉甚ニハ大黃甘草湯ニ加吳茱萸牡蠣ヲ  
用ユ積聚門ニ語ル赤丸モ生漆ヲ酒ニテ用ユルモ此筋ニ  
工夫シテ用ユヘシ人ノ手ヲ束タルヲ治ヘシ

治膈症方官邸便方

大糞燒灰存性入辰砂少許蜜水調服

烏神散 治膈噎食不下

河豚一尾去腸胃以紅花填满燒存性白湯送下天石為

末湯ニテ用ユル亦良

利膈湯 治膈噎百發百中之神方

半夏二錢 山梔子 附子 各一錢 甘草小 生薑三片  
右五味溫服

安中散 治癰囊病神驗

延胡 茴香 桂枝各五分 螞粉一分 良姜 乾姜各三分  
甘草六分

右七果水二合煮取一合服忌酒肉麵餅一切厚味塩茶

香脂丸 治血積結痛

阿魏二錢 乳香 沒藥 丁香各三錢

右四果為末糊丸每服一錢日三空心白湯送下

曼倩湯 丁字湯 工彖散 及急湯藏方

痰 喘息 咳嗽 哮喘證

痰字素難及傷寒論不見金匱要畧出夕リ此病ハ人之  
無キナシ朱丹溪是ヲ主張シテ萬病痰ニ屬スト云見識  
ヲ立テ醫家コレヲ尊信シテ如聖如神思フ痰ノワケモ吟  
味セス古醫經ノ有無モ不構公然トシテ痰トイハハ醫  
俗トモニ合點スタトハハ背脊頸項手臂痛スルニ痰ナリ  
ト云中風ヲ指テ痰ト云眩暈頭痛モ痰ト云神氣不定モ痰ナ  
リト云勞瘵モ痰勞ト云脇胸痛ハ痰積ト云是三十丹溪ニ  
始マル張必賓カ痰不生病々生痰ト云者確論ナリ痰ハ淡  
ト云意ナリト釋ス金匱ニ留飲篇ノ目ヲ出ス其方ハ證候

ニ從ヒ殊驗ヲ奏スナリ亦水腫ニ合考シテ効ヲトル今是  
ヲ考フルニ痰ハ人身中ノ水道ニ溜ル所ノ穢物ナリ上ニ  
出ルヲ痰ト云下ニ出ルヲ腸垢ト云即チメト呼モノナリ  
赤子ノ未乳<sup>モ</sup>ニモ喘スルト痰ヲ吐スアリサスレハ内ニハ  
初ヨリカニバト云モノト一同ニ生スルニテ必飲食口  
ニ入テ濕ノ化計カ痰ニナルニハ非スサテ食物口ニ入ルト  
胃ニ納ルノ上口ヲ喉嚨ト云其喉ハ食道ナリ夫ヨリ胃中  
マテ一面ニメツタリト厚クノ口ノ如クアリ咳嗽ノ氣ニ  
切レテ口ニ出タルヲ痰ト云胃中ヨリ下口大便ヲ送ル道  
ヲ大腸ト云其道ニモ食道ノ如クメツタリト痰ノ堅キモ

ノカ着テアリ下利數ミナレハ動カサレテ肛門ヨリ出タ  
ルヲ痢ト云此外ニ痰ト云モノ、在所<sup>イ</sup>シ肺ノ持前ニス  
ルハ畢竟肺ハ上ニ居ル藏ニテ肺管テト云故ナリ其肺管  
ハ氣道ノ下ナリ此氣道中ニハ一點ノ物モナシ萬一ニ此  
氣道へ水飲一滴モ入レハ立トコロニ咽テ咳スルナリ其  
咳フル勢ニテ隣ノ食道ノ、口ヲ上エサソヒ出ス故ニ肺  
管ヨリ出タリト思フテ肺ニ屬シタリト見ユ痰ヲ肺ニ屬  
シタルハ素難ノ經ニハ見ヘス痰ノ字無レハナリサテ咳  
嗽スルハ引風ニテモ直ニ見<sup>ミ</sup>ス證ナリ邪ヲ散シ本病ヲ治  
スレハ痰ニカ、ワラスシテ治スルナリ可恐モノハ其咳

嗽ノ不止ニ數日ヲ経テ微寒熱往来スルモノ勞咳ニナル  
ナリ喘ハ呼吸ニ聲アリテゼレゼレト云咳嗽喘ト皆麻黄  
ノ主治トス其原ハ外邪ニヨリテ表症ニ屬スレハナリ小  
青龍湯ヲ用ユモシクハ熱強ク渴セハ大青龍ニスルナリ  
往来寒熱スルモノハ咳ニ貪著セスニ柴胡桂枝湯ヲ與フ  
若白沫粘痰ヲ吐スルモノニハ皮弁散ヲ兼用ス此散ハ何  
レニモ強ク咳シ粘痰白沫ヲ吐スル的ニシテ何湯ニモ兼  
用スヘシ勞咳ニ至リテハ麻黄ニテハ治セスサテ又喘息  
ハ呼吸ニ滯ノアルナレハ何病ニテモ兼テ病ハ凶兆トス  
別テ瘵病ニ咽中微喘スルハ死ニ近トス大病人ニ此證ヲ

見シタラハ危シ且又喘ハ痰喘咳喘アリテ痰咳退ケハ治  
スアリ是ハ本證ノ輕重ニヨルヘシ動悸アリテ呼吸ヘサ  
ワリ咳スルハ柴胡姜桂湯ニスヘシ盜汗小便不利ナトス  
ルハ猶更ヨシト雖凡必本論ノ主治ニ不拘ウルオコノア  
ル向ノ咳ヲ的ニ用ユ哮喘ト云ハ古ハ喘ト一同ニ論シタ  
レ凡今ハ別證ニス哮喘トモ云不可不辨仲景ノ桂枝加厚  
朴杏子湯ヲ用タル喘ハ即是ナリト云説アリ試ルニ未得  
其驗此證ニ竹瀝ナト總テ痰藥ヲ用テ却テ劇シクナルモ  
ノアリ其病多ハ持病ト稱シテ歳ニ三四度發スルアリ月  
ニ發スルアリ一二日或ハ四五日又深夜ニ發シテ晝ニ

至テ穩ナルアリ大概ハ秋冬春夏ノ交時候不正ノ節或ハ  
陰雨非時ノ冷氣ニ發ス其因疝ニ係ルモノアリ疝ニ論ス  
ル通り腹候ヲ察シテ疝ヲ治シテ喘ノヤム有既ニ愈ユレ  
ハ如<sup>ル</sup>忘<sup>ル</sup>發シタルトキハ平卧スルヲナラス高枕或ハ起坐  
ス物少シモ身ニ著<sup>ツ</sup>ハ益ク甚シキモアリ是亦大概ハ衣被  
ヲ覆フテ鬱スルヲ嫌フ寒天ト雖疝障子ヲ開キ清風ニ  
アタルヲ好ム喘聲大鋸ヲ拽カ如シ甚シキハ合壁ニ聞ユ  
口ヲスボメテ呻吟ス今ヤ死スラント見ユ父母ノ病ヲ相  
傳フルアリ益如何トモスヘカラス病ト共ニ老ユルモア  
リサテ此喘息シテ胸痛スルヲ的ニ栝<sup>ツ</sup>萎<sup>ツ</sup>枳<sup>ツ</sup>實<sup>ツ</sup>湯ヲ用ユ上

氣ノツヨキニハ蘇子降氣湯ヲ用ユ頸背強急スルハ葛根  
湯心下急迫スルハ甘草乾姜湯ニ底野迦ヲ兼用ス或ハ砂  
糖湯ニテモ穩ニナル茶實丸哮喘ノ奇方ナリ食ハ存ノ外  
ナルモノナリ背上ヲ微クニ韭菜鍼ニテ亂刺シテ少シ宛  
出血スレハ急迫立<sup>ツ</sup>トコロニ退アリ喘ト哮喘ト短氣ト少  
氣ト至テ似タリ兼テ辨置ヘシ何レ呼吸ヘ障ル故輕クシ  
ク見ナスベカラス黃胖ノ喘悸スルハ死生ニ不<sup>レ</sup>關一士人  
常ニ哮喘ヲ患フ後ニ下疝ヲ得輕粉ヲ多服シ二三年ニテ治  
タリ此後哮喘證不再發ハ九年ヲ過テ復哮喘ヲ發スルヲ前日  
ノ如シ此時ニ又粉劑ヲ用タラハ可治ヤト思ヘ疝病者モ

聞入兼へク用様トモ云出シ惡シ小兒ノ馬脾風ニ輕粉ノ  
入タル方入門ニ見タリ馬脾風ハ哮喘ト似タ形チノモノ  
ナリ今考合テ見レハ其味ヒ思フヘシ咳嗽ノ治シソコ子  
タルハ勞咳ニナラストモ至テ治シニクシ其元氣ヲタノ  
ンテ風冷ヲ不慎湯擲ヲ侵シテ癖ツケタルハ益治シニク  
シ咳嗽甚シキニ合谷ニ鍼シテ止ムアリ只恐ルヘキハ勞  
ニナルナリ微寒熱ヲ帶タルハ老壯ニ不拘大事ニ治スヘ  
シ療疾ニナレハ必死ナリ

金匱ニ心下有痰飲胸脇支滿目眩スルハ苓桂朮甘湯主之  
短氣有微飲當從小便去之苓桂朮甘湯主之腎氣丸亦主之  
皆痰藥ニアラス膈間支飲其人喘滿心下痞堅面黧黑其脉  
沈緊得之數十日醫吐下之不愈木防己湯主之ノ類ハ今ノ  
痰ニハ非ス考ヘテ知ルヘキ也膈間停痰アリ常ニ痛ヲ覺  
ルノ類ハ滾痰丸ヨロシ胸膈ノ間ニ云分アルモノ又夫ヨ  
リオコリテ眩暈ナトスルモノ此藥運用アリテ廣ク通用  
ヘシ諸咳嗽都ラ痰ト稱スルモノハ外感ニ發スルモノ多  
シ因テ外邪ヲ疎スレハ痰ハ治スルモノ也必其表證アル  
所ヲ求テ處方スルヲ專務ナリ咳ヲ後世醫書專ラ肺ニ屬  
スト云モノ非ナリ猶痰ヲ肺ニ屬スト云ト同意素問ニ無  
キ所ナリ素問云肺之令人欬何也對曰五藏六府皆令人欬



非獨肺也トアリ今之ヲ案スルニ咳嗽ハ呼吸常氣之外ニ  
内氣逆發シ氣息ニ併セ氣息常度ヲナス不能シテ咳ス  
其氣ニ動サレテ痰ヲ吐スナリ又痰外因ニ動サレテ氣息  
ノサハリニナリテ咳ス又膈間動悸迫シテ咳スル短氣不  
足ニテ咳スルハ勞ノ咳ナリソコデ頸元ヨリ出テ根ノ十  
キ様ナリ凡咳ノ因不過之咳字說文ニ小兒笑ナリトアレ  
氏莊子漢書三國志等欬作咳古通用ナリ猶歐作嘔歎作嘆  
成無己曰欬則有聲無痰嗽則有聲有痰ト云モ嘔吐ヨリ考  
ヘ附テ新說ヲナス素問以下古書ノ無キ所ナリ此說奇ナ  
ルヲ好テ咳ヲ為陽嗽ヲ為陰ノ類多ク成氏ノ弊ヲ受テ後

世皆從之者多シ欬ニ種々ノ名アリ姪者ノ咳嗽ヲ子嗽ト云五  
六ケ月ヨリヤミツキテ藥驗ナク分娩スルト立口ニヤム  
子ノ字ヲ孕婦ノ病名ニスルハ是ノミニアラズ子嗽ハ瘵疾ノ  
候ナクハ苦勞ニスルモノニ非ス只蓐勞ニナラヌヤト云所ヲ考ヘ  
テ防護スヘシ又久咳ト云ハ數年無餘證咳嗽老年マテ病  
ムモノアリ酒嗽又酒客咳トモ云酒客ノ久咳スルナリ是  
過飲ニテ留飲トナルナラシ證治要訣ニ冷酒ヲ飲ミ冷水  
ヲ飲テ此證ヲナス瘵肺ト名クトアリ古ハ多咳逆ノ字ヲ  
用ユ猶嘔逆之逆也此他諸名多シ典籍ヲ讀テ知ヘシ其因  
ハ一ナリ又小兒ニ百日咳アリクツメキ又連聲咳ト云ハ

小兒門ニ語ル通り也

一商婦秋間ニ至レハ大ニ喘息シ苦ム常ニモ動作不自由  
廢人ナリ予ニ治ヲ求ムルニ任セテ診スルニ巨燧槽ニ臂  
ヲ支ヘテ坐ス數十日動ク不能睡ルニモ此形ニテ少ク倚  
側スレハ立トコロニ喘悸甚ク食ハ一椀位ト云仍其發ス  
ルノ時ヲ問ニ脊ヨリ頸マテ如板ニナリテ顧ニモ痛ム醫  
勸ニテ八味丸數百目用テ喘ハ少クユルムト云葛根湯ヲ  
與テ五貼許ニテ起歩スルヲ得タリ數ヲ重テ全愈ユ  
一老人久ク吼喘ヲ患聲四隣ニ響音ク甘草乾姜湯ニテ底野  
迦ヲ投シテ愈タリ再發スル毎ニ前劑ニテ愈此證砂糖湯

ヲ與ヘテ喘ヤムアリ急迫ヲユルムル故ナリ

一士人嘗テ癩ヲ患フ後數年ヲ經テ哮喘ヲ病諸藥無効自  
心ヲ待<sup>ツ</sup>厠ナトヘユクトテ起歩スルニ傍人背後ヨリ手ヲ  
添ルト益喘ス一微物モ身ニ著<sup>ツ</sup>テ嫌フ坐スルニ已カ手  
ヲ膝上ヘ着<sup>ツ</sup>モ惡シト此人難去急用アル時ニ酒三大鍾ヲ  
傾クレハ所患如失<sup>ル</sup>起步遠行如常サリナカラ後日大發ス  
ルヲハ實ニ死ニ隣ルト云ヘシ又一士人同因同病ナリ一  
醫黃胖丸ヲ用テ愈タリ何ワケナレヤ

茶實丸 喘息急救方

茶實<sup>生熟</sup> 百合根 礬石<sup>各等</sup>

右三味研勻為丸每服一錢空心白湯送下

滾痰丸 留飲咳喘胸膈結滯

大黃八錢 黃芩四錢 甘遂二錢 青礞石五錢

右四味為末糊丸萬病回春云一方加朱砂二兩極末為衣而甘遂代沈查 ○燒青礞石

法硝石等分入土器以見黃金星為度

灸 肺俞 禹俞 四花 患門

二母寧嗽湯方彙 此湯ハ咳逆甚ク平臥スルコトナラス

起坐スルニ用テ効アリ竹葉石膏湯ノ意ヲ帶テ諸咳

ニ用ユベシ

肺癰 肺痿

肺癰ハ素問ニ出靈樞ニハ隱々而痛者肺疽上肉微起者肺  
癰也トアリサテ此病ノ始發スルトキハ風邪ノ咳嗽ニ異  
ナラス膈ニ引キテ咳ノ度ニ痛ム其痛處隱々トシテ左右  
ノ肋骨間ニ在リ張戴人ノ右脇ニカキルト云タルハ予カ  
所見ニハ不合常ノ咳嗽ニモ引釣リ痛ムコトアル故ニ意ヲ  
用テ辨セサレハ誤ルモノナリ此證音聲サビタル聲ニ十  
リ又咳モヒシケタルト云様ナル聲ニテ麻疹ノ咳ニ似タ  
ルモノ也濁唾臭キモノ也其中ニ米粥ノ如キカタマリタ  
ルモノアリ痰ハ一體カ膿ニ似タレハ見テハ分リカ子ル

故ニ水ニ投シテミレハ膿ハ沈ニ形散シテ底ニ凝リ米粥  
ノ如キモノアリ間ニ血ヲ帶ルモノアリ尤臭腥アリ醫燈  
續燭曰試肺癰法凡人覺隱<sup>ト</sup>痛咳嗽有臭痰吐在水内沈者  
是癰膿浮者是痰トアリ其人言語ニモ氣息臭クシテ自ラ  
モ臭氣ヲ覺ル其人膈間ノ痛ハツヨキト弱キアリ或背脊  
ニモ隱<sup>ト</sup>微腫ヲ作スアリ張戴人微寒熱自汗盜汗アリ  
テ勞瘵ニ似タリト云ハ尤ヨロシ其脉浮弦或ハ大數或ハ  
滑數ナト皆可治勞瘵ノ半コロヨリ此證ニナルハ併病ス  
ルナリ本病力難治ナル故ニ必死トス一本堂肺癰ヲ勞瘵  
中ノ別證ト云ハ不可也サテ又上ニ膿ヲ作シタルヲ肺癰

ト云下ニ毒ヲ畜タルヲ腸癰ト云ニテ必肺ノ藏へ膿ヲナ  
シタルニモ非<sup>サル</sup>へシ膈内肋骨間へ引釣リ痛ム處カ毒ノ  
結ヒ膿タル所ト見ユ胃管癰ト云モ素問ニ出レトモ膿ヲ  
吐<sup>フ</sup>ハ不論靈樞ニ隱<sup>ク</sup>トメ痛ムモノ胃腕癰也トアリ入  
門瘡瘍全書等ニ唾<sup>スル</sup>膿血<sup>ヲ</sup>ヲ記スレハ同シ物ト見ユレ氏  
真中ニ非ルモノ胃管ト云カタシ醫宗金鑑ニ無咳嗽トア  
リ是ハ怪キ説ナリ且又膿ヲ吐クハ何レニモ胃管へ出テ  
後吐出スレハ吐膿ヲ肺癰トシ下膿ヲ腸癰トスルマテニ  
テ深ク拘泥スヘカラス只此證度<sup>ク</sup>アレハ見付ケスニ誤  
治スル<sup>ヲ</sup>無キ様ニ講究スルヲ吾門ノ第一トス肺癰ノミ

ニテ飲食モナリ氣カ脉候ト、ノヒタルハ必死トセス古  
方桔梗白散ヲ用ユ仲景亦難治トセス金匱ニ已成膿ハ難  
救トアレトモ必不可然肺癰湯ニテ治スヘシ白散ヲ用ユ  
ルトモ有又一種咳嗽シテ臭氣アレトモ膿ナキモノニ肺  
癰湯ヲ用或ハ甘草ヲ減シ用テ効ヲ取ルモノ是欲作未作  
ノ時ナルヤ何ニモ此證ニハ桔梗ヲ主藥トス禁忌ヲ嚴ク  
スヘシ少ク厚梁ヲ食スレハ再復ス愈後モ暫ク禁スヘシ  
食ニヨリ再復シ或ハ至死タルモ多シ肺痿ハ膿ナク痰モ  
少シ是ハ却テ勞瘵ノ一種ニシテ難治トス其證候ハ余モ  
不知トコロナリ古書ニ其證候未詳不効者不渴甘草乾姜

湯温之又吐涎沫效者宜生姜甘草湯トアリ余別ニ考ルニ  
病源ニ姜ニ作ル是ハシホムト訓ス姜ニテ加タルニテ  
痿ハナヘタルノ義ナレハ肺痿ト云ハ聲音枯委シテ無潤  
ノ意ナラン夫ニテ痿ト云名ヲ命シタルヤト思ハル然ト  
モ古書ニ此事ヲ不論今コレヲ考ルニ聲痿ニ終身失音ス  
ルモノ有リ是ハ寒熱ナシ肺痿トハ異ナルヤ死ニ不至又  
瘡毒ニテ會厭陷落シテ聲ノ痿タルモノヨク似タリ混ス  
ヘカラス金匱ニ肺痿肺癰篇アリ其方藥可用モノ多シ見  
テ知ルヘシ炙甘草湯ナトモ用ユヘキナリ  
一男子四十所聲委シ咳嗽時々膈間隱々ト痛ヲ覺フ飲食

無味其人瘦テ元氣ハ如常只疾歩スルヲナラス脉浮數十  
リ即肺痿ト云醫藥一年無驗仍テ楚州ノ温泉ニ遊ント欲  
ス行装己ニ整テ一夕俄ニ吐血數升シテ死ス  
一士人久咳午後微寒熱人<sub>ス</sub>以テ為勞<sub>ト</sub>飲食不美半日床ニ卧  
ス數醫ヲ經テ余ヲ迎フ其家ニ至リテ未診<sub>ヤ</sub>咳聲ヲ聞クニ  
肺癰ナリ診之<sub>ラ</sub>脉細數ナラス浮大數ナリ左膈間咳嗽スル  
度引キ痛ム背モ其邊隱々ト痛ム晝夜吐痰甚多シ間ニ血  
ヲ帶ル四花ヲ灸シ獺肝ヲ服スレ<sub>ト</sub>无効ト云仍其痰ヲ驗  
ルニ米粥ノ如キモノ有テ膿ナリ乃肺膿ナリト告レ<sub>ト</sub>不  
信<sub>マ</sub>水中ニ痰ヲ投テ膿ト痰トノ異ナルヲ論ス始テ余カ  
愈ユ

言ヲサトル肺癰湯ヲ与ヘ白散ヲ兼用ル<sub>ト</sub>二度経數十日<sub>ヲ</sub>

桔梗湯 白散<sub>傷寒</sub>炙甘草湯<sub>千金</sub> 藏肺癰湯<sub>方</sub>

腸癰

内癰トモ云其發スル食傷ノ後ニ發ス又婦人産後ニモア  
レ氏半産後ニ發スルモノ多此病ハ俄ニ發スルモノニテ  
緩ニ起ルハ稀ナリ其痛初起ニハ腹中一面ニ痛テ何ノ  
分ケモナク手ヲ近クナラス能ク按スレハ臍傍以下ニ塊  
ヲ結ヒ多ハ脇エヨリ横骨際ヨリ塊ヲ結フ指尖モ近クナ  
ラス刺痛ス或腹面如鼓側卧スルヲナラス嘔スルアリ寒  
熱甚シ渴シテ絶食スルモアリ積痛ト混シヤスシ積痛ハ  
何ホト痛ムトテモ按摩スルヲ好ム腸癰ハ按スルヲナ  
ラス此形心痛ト同シナレトモ痛處ヲ異ニス其上ニ積ニ

モ心痛ニモ無キ病状アリ皮膚甲錯ト云アリ是ハ肌へ手當  
リサラミトシテ潤澤ナシタトへハ米粉ヲ掌へ付テ肌ヲ  
撫ルカト思フ味ヒアリ膿ヲ作スト腹中鳴<sup>ガ</sup>他病ニ無キ  
聲アリ醫書水雞聲ニ似タリト有先其聲杓ニテ水汲カへ  
ス音ニ似タリカワクト云時アリ壺ノ内ヨリ水ヲ傾ケ出  
ス聲ニ似タリゴホクト鳴又サツト水傾タル音ヲ作轉側  
スルニモ甚鳴ル一聞テ隔テ聞ユルホト高クナル腹痛ツ  
ヨキ人ハ第一ニ是ヲ問ヘシサテ二便共ニ不利スルモノ  
也小便ニ臭氣アリ既ニ膿ヲナスノ際ニ至レハ小便白濁  
スルモノ有膿ヲ小便ヨリ下スヲ小腸癰ト云へ凡小便ヨ

リハカリ出ルハ無ク大小便トモニ下膿ス膿ヲ下シテ後  
痛頓ニ退クヲ佳兆トス痛不正膿ノ下リ少ク絶食ニテ痛  
甚シキハ難治トス此病十ニ八九ヲ治ス難治ニナルハ少  
シ飲食ヲ節ニスヘシ少ク厚味ヲ食へハ再復ス大人小兒  
男女ヲ不問皆病ム薏苡仁大黄ヲ主藥トス只初起ノ看  
ニ熟スヘシ積痛ト混シヤスシ膿ヲ下スマテ不知ニ療治  
スルハ可<sup>キ</sup>愧<sup>ト</sup>ナリサテ又積痛ニテモ破血ノ劑ハ用ユル  
故ニ腸癰ヲ不知ニモ偶中スル<sup>ト</sup>有其表ニ見レタルバカ  
リヲ以テ規矩トスレハ此等ノ病因ヲ索メズ何ソ疎末ノ  
甚シキヤ又下膿ノ遲キ人有又臍中ヨリ膿ヲ潰スアリ又表



へ浮テ結ヒタルハ外科ニ刺セテロラ付テ治シタルモ見  
タリ是ハ腸癰へハ入レカタシト思ハル、也吾門常ニ攻  
究スル所ナリ

一本町六町目商家ノ女兒九歳俄ニ腹痛晝夜啼泣ス其腹  
手ヲ近ヘカラス數醫ヲ經テ不治一啞科來テ日々大炷艾  
ヲ以テ腹部ニ灸スルヲ連日益困苦ス食ヲ不欲ニ便不利  
腹鳴水聲ノ如シ後數日ヲ經テ臍中ヨリ膿ヲ出ス予ヲ迎  
フ腸癰ナリ疲極羸瘦腹大ニシテ蜘蛛病ノ如ク瘦テ疳候  
ヲナス只其遲キヲ如何トモスヘカラス父母曰臍口閉テ  
膿不出トキハ腹痛ス其苦腦見ルニ不忍死ハ其分也愚以

為下スニ遲シト雖モ腹滿ト腸癰ト皆下法ニアリ仍テ甲  
字湯加大黃薏苡ニ貼ヲ與フ翼日大便膿ヲ下ス更前劑ヲ  
投ス二三日膿ヲ下シテ腹滿漸減シ臍中ノ膿收リ口ヲ歛ム  
又日ヲ經テ膿盡キ起步スルニ至リ飲食ヲ節ニシ半愈ヲ  
得タリ盜汗羸瘦依然タリ仍テ轉弄玉湯八月ヨリ正月ニ  
至リテ全疴ス

千葉氏者ハ酒客ナリ夏月鰯魚ヲ食テ酒ヲ飲ム不美ト覺  
此夜欲吐不吐腹肚平痛手足厥冷ニ便閉結腹面如板手不  
可近側卧動揺スル時ハ痛劇欲死柱ニモタレテ坐ス冷汗  
如流煩渴ス或霍亂トナシ或ハ食傷ト為ス脉細數ニテ只

胃氣有ヲ吉トス腹候痛テ不能詳ト雖モ小腹邊へ手ヲ近  
ケントスルト味近ニ痛ム形アリ腸癰ナリト思へ氏未ダ口  
外スルホトニ決セス腹鳴スルヤト問ニ家人曰常ニ雷鳴  
スル人ナリ別テ高ク鳴ルト云仍テ暫ク傍ニ坐シテ其様  
ヲ診スルニ水聲ヲ作ス仍テ甲字加大黃ヲ投ス三日膿ヲ  
不下<sup>ヤ</sup>腹鳴益腸癰ニ決ス四日ニ至リテ痛劇ク小便點滴セ  
ス余モ亦計極ル大黃牡丹湯ヲ與フ夜ニ至リテ大便下膿  
如瀉<sup>カ</sup>腹滿痛頓ニ止ム又甲字湯ヲ與フ數日ニテ愈ユ一夕  
デニカクテ食シテ痛再復ス始ヨリハ薄シト雖病後未調  
故ニ大ニ疲極スサレトモ不下<sup>ヤ</sup>ハ治ハ望へカラス仍テ大

黃ヲ倍加シ再ヒ膿ヲ下ス數十日ヲ經テ平復ス

鉄炮町商家ノ妻腸癰ヲ患フ一日吐シ藥汁不入仍小半夏  
加茯苓ヲ与フ漸吐止ム腹痛甚キニ驚他醫ヲ引キテ治ス  
翌年又腸癰ヲ患フニ便閉結ス吐逆甚シ後ニハ糞ヲ吐ス  
或蛔虫ナト雜吐ス一室廁臭ヲナス他醫へ讓レ氏不聽死  
スルハカリニ見タルニ俄ニ便心ヲ生スルト廁ニ登ル間  
モナク乍膿數外ヲ下メ前證悉退キ次日ヨリ飲食進テ平  
愈ス翌年又腹中結痛シテ為腸癰百藥無効死ス  
寛政庚戌東上ス時ニ一士人ノ室患疫寒熱煩渴脉浮數嘔  
逆無食腹痛不大便一醫治之不収効更引一醫病益甚仍テ

予ニ乞<sup>フ</sup>診スルニ全<sup>ク</sup>瘦ニ似タレ<sup>ド</sup>凡<sup>ソ</sup>腹痛雷鳴スルモノ<sup>ノ</sup>疫ニ  
非ス仍<sup>テ</sup>小<sup>ク</sup>解スルニ臭<sup>ク</sup>氣如何ト問ヘ<sup>ハ</sup>熱毒ノ強キ故力  
鼻ヲ塞ク程臭シト云是腸癰ナリトス其遲キニ嫌アリ仍  
固<sup>ク</sup>辭ス強<sup>ク</sup>テ親類ヲ以テ療<sup>フ</sup>乞先ツ巫神湯ニ加<sup>シ</sup>薏苡大黃桃  
仁<sup>ヲ</sup>一貼ヲ与<sup>フ</sup>其夜膿ヲ下ス一行腹痛ヤ、穩ニ總<sup>テ</sup>快キ  
ヲ覺<sup>フ</sup>トテ家人喜<sup>ブ</sup>仍<sup>テ</sup>再診スルニ病勢少<sup>ク</sup>退<sup>ク</sup>前劑ニ  
貼<sup>テ</sup>投シテ又膿ヲ下ス<sup>ト</sup>二行嘔逆如<sup>ク</sup>失<sup>カ</sup>飲食稍進<sup>シ</sup>三四日  
ヲ經<sup>テ</sup>諸證退<sup>キ</sup>二十日ハカリニ全快<sup>シ</sup>タリ

大黃牡丹湯

金匱

藏方

甲字湯

鼓脹 脹滿

鼓脹ヲ難治トシ脹滿ヲハ可治ト云テ其病二因アル如ク  
ニ古來論スル所也今是ヲ考ルニ一旦ノ病ニテ腹滿シタ  
ルハ可治漸<sup>ク</sup>以テ脹滿スルハ鼓脹ノ初起ニテ共ニ難治  
ナリ其因枯血ニ屬ス婦人多ク此病ヲ患<sup>フ</sup>經閉スルモノ  
其先兆也又經水不斷ニ病ヲ覃<sup>ム</sup>脹ト云水脹篇曰脹覃如何  
曰寒氣客<sup>ニ</sup>于腸外<sup>ニ</sup>与衛氣不得營因有所繫<sup>ル</sup>癖而内著惡氣乃  
起<sup>ル</sup>瘕肉乃生其始生也大<sup>ク</sup>如雞卵稍以益大至<sup>リ</sup>其成<sup>ル</sup>如懷子之  
狀久者離<sup>レ</sup>臧<sup>ヲ</sup>按<sup>之</sup>則堅推<sup>之</sup>則移<sup>ル</sup>月事以時<sup>ニ</sup>下<sup>ル</sup>此其候也トア  
リ是亦多アリ婦人ハ腹滿ニ堪ヘヤスク男子ハ腹滿ニハ

ヤク困ル其初起ル時ハ疾苦スル所ナク漸クニ大脹スル  
ニ至テ側卧スルコトナラヌモアリ其腹ヲ按シテ大鼓ノ皮  
ノ如ク引キ脹故ニ鼓脹ト云脹ノ強キニ随テ青筋絡脉乳  
間ヨリ上腕ノアタリニ多見ハル甚シキハ皮ニ光リヲ生  
シテ醫者ノ手ノ映スルモ又障子ナトマテ映スルモ有是  
ヲ鼓脹トス如此モノ腹ヲ鼓スレハ如大鼓鳴ルト云コトヲ  
聞タレ氏未試最甚キハ頷下ノ皮膚腹ヘヒカレテ結喉ノ  
邊マテ引張ル口鼻モ斜ニナル産論翼ニ鎮神丸ニテ治シ  
タル米屋ノ女房ハ眼目マテカ堅ニナリタリケリ如此ニ  
脹ラヌニ手ニ押セハ腹ヲ按スルノ手サワリノ有ラ脹満

ト云可治ト云ハ別因ニ非ス輕重ノ分也數日ヲ経レハ小  
便不利シテ目窠或ハ腰脚ニ腫ヲ見シ夫ヨリ臍傍マテ腫  
スルモ有臍ノ凸出スルモ有是甚ノ惡證トス益ク不可救  
寒熱アレハ別テ凶兆也脹満ニハ厚朴ヲ主藥トス厚朴セ  
物湯三承氣之類選用スヘシ後世ニテ蘿蔔子大腹皮ヲ主  
藥トス中氣ヲ順スルヲ主トス附子ノ効多シ枯血ニ因ル  
故ニ甲字湯鼈甲湯運用スヘシ鼓脹ハ藥セスニ置ケバ數  
年ヲ保ツヘシ藥用スルホト苦惱シテ却テ死期ヲ促スノ  
之故ニ藥ナシニ捨置テ一策トス内經ニ雞屎醴ヲ用ユ一  
艸醫是ヲ造リテ用タルニ其効如神治シタルヲ見タリ予

モ夫ニ微テ用タルニ無寸効又癩蝦蟆ヲ黒焼ニシ用ユレ  
ハ大放屁シテ治ト云フヲ見タル故ニ試タルニ是モ無驗  
ナリキ小兒ノ脹滿ハ疳癖ニテ大人ニ比スレハ治ヤスシ  
黒瞳散ナト有効又心下ニ大結塊アリ如盤邊如覆杯水飲  
所作ナリト仲景ノ論シタルハ酒客ニ多シ大抵嗜シ酒ヲ  
嫌ヒ甚ハ臭モ忌モノ後ニ心下如斯ニナル是ハ元來酒ニ  
アタリテ病ナレハ中正湯ナトニテ初メナラハ可<sub>キ</sub>治モノ  
也仕舞ニハ水腫ニナリテ死ス枳朮湯ヲ用ユレ氏甘遂丸  
ヲ与テ一下シテ大柴胡或ハ柴胡加芒硝ノ腹多シ什ニ三  
四ヲ治ス又蠱脹ト云ハヤハリ鼓脹ニ用ヒタルコ偶記ニ

詳ニス俗ニ龜腹ト云ハ腹大滿如箕腹面筋絡浮出テ龜背  
ノ如シ此病治スヘカラス藥灸トモニ不行ハ數十年ヲ保  
ツヘシ不乳ノ婦人ニ多シ一本堂是ヲ腸覃ニ充ツ水氣ノ  
因アルモノ鎮神丸ヲ佳トス鍼砂湯ヲ与フルコアリ腹滿  
シテ四支瘦タルヲ蜘蛛蟲又蜘蛛病ト云形狀ニ象リテ名  
付タルナリ尤死病也素問五藏六府脹滿ヲ論テ一ノニ藏  
名ヲ以テス心脹胃脹ノ類又膚脹臍脹ノ名アリ以下諸書  
ニ種々ノ名アルハ讀テ知ルヘシ又舊事紀ニ脹滿ヲホテ  
ト訓ス今モホテ腹トハ唱ル言葉ナリ  
一農家ノ子廿歳ハカリ石尊詣テヨリ帰テ寒熱如勞顔色

衰瘦腹滿少氣衣ノ前不<sub>レ</sub>合<sub>レ</sub>青絡脉乳下ヨリ扶容ノ邊系<sub>レ</sub>瓜  
ノ如<sub>レ</sub>常ニ暗室ニ坐シ客ヲ見ル<sub>レ</sub>ヲ不<sub>レ</sub>欲<sub>レ</sub>脉微數ナリ難  
治ナリヒソカニ其父ニ之ヲ告<sub>レ</sub>ハ其父頗才氣アルモノ  
ニテ曰<sub>レ</sub>其小病ニアラサルヲ知ル<sub>レ</sub>故ニ遙ニ枉駕ヲ乞フ假  
令<sub>レ</sub>死ストモ於<sub>レ</sub>當國ハ誰氏ニ託センヤ只藥ヲ賜ヘハ望足  
レリト云急ニモ死スマシト厚朴七物湯ヲ与ヘテ去ル後ニ  
藥ヲ乞曰餘程快シト予思フニ前日断<sub>レ</sub>タル故ニ藥ヲ乞ノ  
言葉ナリト又前劑ヲ与フ又數日ヲ経テ再診ヲ乞余先ニ  
難治ト思ヒ定<sub>レ</sub>ハ再診スルニモ不及ト答フ其使頻ニ快キ  
所ヲ見セテ加減ヲ乞ト云故ニ辞<sub>レ</sub>ヲ飾<sub>レ</sub>ルトハ思ヘ<sub>レ</sub>氏強テ

命駕シテ行テ見<sub>レ</sub>ハ病者輕ト堂上ニ出迎フ予驚テ診  
ス<sub>レ</sub>ハ腹滿消シテ常ノ腹ナリ寒熱ヤミテ元氣清爽近隣  
へ出テ談笑スト云餘リ無面目覺ヘ<sub>レ</sub>氏宜キ方へ違ヒタル  
故家人ノ歡喜言フハカリナシ馳走ニ遇テ歸タリ何故ニ  
如斯早ク治シタルヤ於<sub>レ</sub>今<sub>レ</sub>不<sub>レ</sub>解

厚朴七物湯

桂枝加苓朮附湯

三承氣湯

傷寒論

鎮神丸

見黃

鼈甲湯

見續

藏方甲字湯

鍼砂湯

甘遂丸

脹滿ヲ他醫ノ治ニテ攻下シテ劇劑ヲ用ユレハ益  
脹滿ス追々論スル如クニ藥ヲ不<sub>レ</sub>飲置ケハ病穩ナ

ルノミナラス鹿島邊ヨリ一女鼓脹ニテ痛苦ニ不堪トテ来ル仍テ藥ヲ断シテ飲ムナト諭シテカヘスニ全快ス又鉋子ニテ去夏一鼓脹ヲ見タリ是モ藥ヲ禁シテ不用此春全快シタリ此病ニ逢コトニ藥ヲ不用ノ論ヲス、ムレ氏多ハ是非ニ藥ヲ乞ニヨリワケモナク湯ノ様ナル藥ヲ与ヘタク方ヲ組シヨリハ古人ノ方ニシタク索ムレ氏未得故ニ一方ヲ製ス名テ不及飲ト云後世方書ニタワイモナキ藥ニテ効能アルハ鼓脹ハカリニハナク萬病ニモ此意味アルコトナルヤト思フ也

痛風 鶴膝風

痛ムモノハ風濕ニ屬ス古来ノ説也故ニ痛風ハ治療ニ發散ノ意ヲ帶テ方組アル也金匱ニ歷節トアリ此病濕ニハ屬スレ氏瘀血ノアル人ノ疾也手足共ニ痛アリ又片手片足或ハ手ハカリ或足ハカリ痛モアリ是ハ輕キ證ナリ甚キハ寒熱モアリ腫ヲナシ赤ク色トル先ツハ骨節ニテ痛ム假令ハ腕節ニテ痛モノハ後ニ肘節肩ニ移リテ痛ム又不移ラニ痛モアリ其移ルヲ歷節風ト云甚痛テ不可忍モノヲ白虎歷節ト云甚キハ轉側スルコト不能手モ近クヘカラストカク節々ノ動揺スル所ニテ痛ム故他證ト混スル

一ナシ少シ動作シテモ骨節ノ揺キタル所へ痛ヲ移シ苦  
楚ス桂枝芍藥知母湯用ユヘシ又膝頭へ痛ヲ移シ腫モノ  
有大ニ可畏證ナリ前後ノ肉瘦テ痛苦スルハ鶴膝風ニナ  
ルヲアリ是ハ難治ニテ廢人ニナル也サレ氏痛風ヨリ發  
スルハ少シ脚氣ト云テ膝計リ痛モノヨリ發スルモノ多  
シ六物附子ヲ烏頭ニ代テ用ユヘシ又膝ツグラト云モノ  
膝頭ヲ強痛テ膝蓋ノ左右ニ膿ヲ催ス此病早ク鍼シテ血  
汁ヲ出スヲアリ膝邊ヲ按シテ心ニ深ク是ヲ求ムレハ自  
然ニ水勢應手スルモノ也是ヲ刺テ如膏水ヲ出セハ立所ニ  
治ス三日程ノ間ニアリ此度ヲ失セハ終身禹歩ス方書膝

蓋風ト云モノ膝シクラナラン痛風ニ似タリ痛風ノ因ハ  
枯血ユヘニ其人皆瘦テ手足トモニ冷ヘ或ハ瘡疥ヲ不發  
灸痕ナト立所ニ治シテ膿ヲナサズ又其人色黒キ方ノ人  
ニ多シ以上皆乾血ニヨル故ナリ大防風湯又ハ桂枝加苓  
朮附湯婦人ハ經閉スルモノ多シ甲字加附子湯ナリ温泉  
ノ効アリ常ニ脚攣急ナトノ證アルハ腹部ニ其因アリテ  
積聚ノ有方ヨリ引張モノナリ委中ノ刺絡ノ効アリ世ニ  
痛風ノ妙藥ト云モノ多シ醫者ノ藥ニテハ治セ又ト俗人ノ  
唱ルハ其中的ヲ得サル故ナリ此病破血ヲ以温散ヲ主トセ  
ハ無不治トシテ又一種項背強痛シテ顧盼スルヲナラヌ人ア



リ葛根加附子ナリ此中ニ吐血シタル人ヲ時々見タリサ  
レトモナニ故ト云證候ヲ未詳醫書ニ手ハカリ痛ヲ臂痛  
門ヲ立脚ハカリ痛ヲ脚氣門ヲ立ツレ氏先ハ痛風ニ屬ス  
ルト癰毒ニ屬スルモノ多シ誤リ認ル<sub>レ</sub>勿レ寒氣ノ時節  
ヨリハ暑ニ發スルモノ多シ諸痛ハ濕ニ屬スル<sub>レ</sub>古來ノ  
說也強ユヘカラス其重キ證ハ烏頭ニアラサレハ治セス  
俗年肘ニシテ又長命痛ト云ハ疝ニ屬ス捨置テ愈止<sub>レ</sub>テ附子ハ疝ヲ治ス藥  
ニテ附子ヲ加テ用ユヘシ  
下疳ヲ病テ後骨節疼スルモノ痛風ニ似タリ是ハ輕粉丸  
生<sub>レ</sub>乳ノ類ニ非レハ不治混スル<sub>レ</sub>勿レ  
一農人十八九歲嘗陰頭發瘡膿汁ヲ出シテ治ス後半年許

過テ左膝腫痛ス杖ニテ大小便ニ行クニ痛忍ヘカラス外  
踝ニ腫ヲナシ痛ヲ移ス更ニ起卧スル<sub>レ</sub>ナラス傍人皆以  
為癰毒ナリト仍テ治癰<sub>ヲ</sub>賣藥ヲ服ス二週口中不破毒益  
々甚シ更服セントスルニ其父疑ヲ生シテ是癰カ如何ト  
云ヲ不知ニ服スルハ危シトテ余ニ診ヲ乞仍テ其人ヲ見ル  
ニ黑瘦シテ乾血ノ人ナリ加ルニ實ノ楚人ニテ花柳ニ耽ル  
ヘキ様ニアラス竊ニ詰ルニ伊勢參ニ出タル時娼家ニ至  
リキ夫ハ二年前ニテ瘡ヲ發セシハ四五ヶ月以前ノ<sub>レ</sub>  
也且傳藥モセスニ治シタリケルト晡前ヨリ寒熱シテ飲  
食ヲ不欲終日粥三四口ヲ食ス脚ヲ見ルニ左膝頭踝ノ前

後腫テ赤ヲ帶フ是痛風ナリトス桂枝加苓朮附ヲ与テ十日ハカリ飲食益減ス脉細數煩渴仍与桂枝芍藥知母湯中去附子加烏頭ヲ小驗ヲ得タリ連服數十日ニテ治ス  
金街ノ價人常ニ遠キニ出テ高ス夏月洪水ニ逢テ日々水中ヲ渡ル家ニ帰テ脚心痛ム後踝骨ヲ痛微腫ヲ帶フ醫者脚氣トナシ治之無効予ニ乞フ脉弦洪ニテ數ナリ其人肥テ色白シ乾血ノ人ニ非スサレ氏是痛風ナリト云氏家人不信兩脚痛テ手ニテハカリ其身ヲ進退スル故痛ヲ兩臂トシヤ始テ予カ言ニ服ス大防風湯加烏頭ニテ二十日許ニ

治ス

鶴膝風ハ至テ治シ惡シ廢人ニナルモノ多シ早ク鍼シテ惡汁ヲ去ルヘシ又燒酒ニテ蒸ス針ハ外科ノ上手ニ任スヘシ膝頭ヲ按スレハ惡汁ノ有ハ指下ニヒ、キテ自然ニ水勢アリ鍼ハ膝内邊ヨリ入ル、ナリ惡汁ヲ取りテモ歩行ナリカヌルモノ有レ氏惡汁ヲ取ラスニ廢人ニナル故惡汁ヲ取テ正法トス万一ニ全快ヲ望ムヘシ燒酒ニテ日々蒸ス又濁酒味漉モロニヘ生午膝根ヲ加ヘ煮テ布ニ包ミテ日々蒸且服スヘシ

桂枝加附子湯

桂枝加苓朮附湯

葛根湯加附子

桂枝芍藥知母湯甚レハキハ鳥頭傷

寒論 六物附子湯是ハ脚氣ヲ

鼈甲湯見積

方藏 甲字湯

或得治痛風疝氣奇方於三河新城人傳予未試トモ折柄故

ニ記ス

柴胡 桂枝 防風 羌活 香附子 芍藥 生地黃

右七味以水一合酒五勺煮取一合分服

蚯蚓油 蚯蚓十條 漬燒酎一日夜去泥麻油一合煎七分去

滓塗痛處

蝸牛油 蝸牛去殼十箇 麻油一合煎七分塗痛處二油合塗益良

黃疽

古ヨリ五疸ト稱テ五ツニ分ツト雖其方藥ハ必五法ニ非  
ス五疸トモニ兼テ治ス方多シ尤スレハ五疸ニ分ルモノ  
ハ紙上ノ談ナリ八疸或ハ三十六疸其外種々ノ名稱アリ  
今是ヲ治スルニ緩急ニツアリ急發ノモノハ皆治シヤス  
ク緩發ハ多ク治シニクシ猶更年高ノ人ハ半ハ鬼簿ヲ免  
レス緩發トハ常ニ惡寒シテ卧床スルニ及ハヌ位ニ催ス  
テ累日小便微黃日ヲ經テ漸濃クナルサテ小便黃ニナル  
ハ熱アルヤ又ハ大黃ニテモ用ユレハ黃ニナレ氏沫ハ白ク  
立モノ也此證ノ小便ハ桶ノ内ノ泡沫トモニ黃ニ見ユルモ



ノ也甚シキハ白紙ヲ染ムヘシ此病察色ニテ知ヘシ障子  
ヲ立テ日向ニテスカシテ見レハ肌表ニ黄ヲ見ス是ハ日  
日ニ濃クナル早ク見ユル所ハ眼中ナリ病者ニ對セシ時  
心ヲ付ヘシ白眼ニ黄ヲ帶是ハ内ニ盛ル所ノ精液黄ニ十  
リテ早ク見ユルナリ又爪ハ豎ニ條理アリテ精液ノ通所  
ナリ故ニ黄ヲ早ク見スフアリ又冬日手ノ掌黄ニナルハ  
春ニ至テ大病ヲヤムト相書ニアリ是ハ黄疽トハ異ナリ  
一身ノ血液共ニ黄ニナルニ付テ語ルヘキフアリ京師左  
原木町ノ賣魚人誤テ指ヲ傷ルニ流血悉ク黄ナリ彼大ニ  
驚指ヲ抱テ養壽院ニ走り來リテシカミノフヲ語ル故同

社一同ニ見ルニ紙ニ染タル血藥汁ノ如シ因テ東門先生  
ニ報ス先生曰是必發黄セント是ヨリ後六日ハカリ過テ  
眼中黄漸クニ黄疽ニナリテケリ此病脾胃ニ濕熱蒸シテ  
發ス脾ハ土ニ屬シ其色黄ナリト云モノ能符合スル故五  
藏配合ノ論ノ鼻ヲ高クスル所ナリ一身血液黄ニナルハ  
全ク翹ヲ蒸タル意味ナリ酒色ニ過タル人ニ發ス甚シキ  
ハ金色ニナリ鼻煤ケ舌上黒胎ヲカケテ午後潮熱十分ニ  
胃實ノ證ヲ為シ又薰シス、ケタル色ニナリ又黒色ニナ  
ル其證ニ至ルト肌ニ光リヲナシテ諸形共ニ映スル老體ノ  
人ハ必死也又白キ衣或犢鼻褌ナト黄ヲ移シ染ルコトア

リ白キ物ヲ見テ皆黄色ニ見ル別テ白雲日ニ映スルト障  
子ナトノ紙黄色ニ見ル也經久ニ至レハ津液盡テ瓜ニテ  
搔ケハ黄粉飛落スレアリ是ヲ下セハ大便黒漆ノ如ク炭  
塊ヲ為ス承氣湯ニテ一下シテ黄減スレハ吉兆トスサレ  
凡腹滿下候ノ備リタルハ稀ニテ臍下臍傍大動築ミトシ  
テ腹勢ナク全虚候備ルモノ多シ是ヲ女勞疸トハ云ナリ  
難治多シ仲景黄汗ト云モノハ黄疸ト異ナラス衣ヲ染ル  
コトヲ黄汗トハ言ニクキニ似タリ予黄汗ト云ヘキモノヲ  
見タルコトナシ黄汗ハ黄疸ノ一身味黄シテ黄汗ノ出ルヲ  
言ニ似タレ凡是ハ黄疸ノ初起ナリ先ツハ黄疸ハ周身黄

ニナリソノ後ニ黄汗出ルニテ肌表ニ黄ヲ不發見ハ輕證  
トス按スルニ黄疸ハ病名ニテ黄汗ハ病證ニシタシ又食  
傷ノ後ニ急發スルアリ又疫熱劇煩燥狂乱シテ一夜ノ内  
ニ發黄スルアリ是ハ佳兆也應手治スルモノ也多ク小便  
不利スルヲ此證ノ持前ニテ小便清利スレハ黄去ル茵陳  
五苓散ヲ用ユル所ナリ大便秘澁スルモノ又常也茵陳蒿  
湯也其病ハ茵陳ヲ主トス山梔子又効アリ傷寒論ニテ熱  
得スヘシ急發ノ者皆以上ノ方藥ニテ可治緩發ノ者ハ仙  
露飲ナトニテ効ヲ取又黄ニ不拘泥他證ノ甚キモノヲ主  
トメ治スルコトモ有工夫ノ入ルヘキ所也大柴胡三承氣杯

皆可用此證ニハ蜺ヲ食セシメテ効アリ無事ノ人惡寒不  
久去者油断スヘカラス黄疽ニナルモノ也

黄胖ト云モノ方書ニ黄疽ニ屬シテアリ食勞疽ノ一トモ  
イヘリ黄胖ハ俗語ナリトク今民間ニ多ク中人以上ニ稀  
ナル病ニテ間ニハ貴人ニモ必無ト云ヘカラス此黄胖ハ  
糞土ノ氣ニ感シテ病ムト云浮苦病或阿遠ノ病ト呼又セ  
イフク氏呼方言甚多シ是ヲ脚氣ニ屬シタル書モ有偶記  
ニ詳ニ論セリ讀ヘシ瓜甲反テ薄ク或摧ケテ不長或ハ片  
片ニヘゲテ枯衰スルモノ其先萌也虛里ノ動強ク人迎ニ  
響キ喘悸シテ起步執作スレハ益甚シク眩暈ス此證先ツ

起步セント欲スレハ未起步ニ喘息ス故ニ坂ヲ上ラント  
スルニ坂ヲ望ムト立所ニ喘ス坂下ト呼フハ此ニテ名ツ  
クルナランカ又坂ヲ登ルヲナラヌト云ノ名欵ナリ久ヲ  
経レハ面色青黄微腫ス婦人ハ月経甚薄ク水ヲ加ヘタル  
位ノ色也皆綠礬鍼砂ノ主トル所ニテ悉ク難治トセス四  
五年モ廢人ト稱スルモノ皆治スヘシ鍼砂湯ヲ主トス也  
又虫積ヲ帶ルモノアリ芟函湯ノ證ヲ以テ考ヘ用ユレハ  
黄胖速ニ治ス兼用ハ皇盤丸鎮神丸ナリ大便黒ク通シテ  
治スサテ此ニ説ク所ハ相違モナキ黄胖ニテ誤ルヲ無所  
也此證ヲ得ト心得テ變證ヲ治スヘシ諸醫モ知サル黄胖

アリ先ツ微腫周身呼吸逼シテ起歩スルコト不能多クハ脚  
氣腫滿ト見ユルアリ瓜ニテ見ワケルモノハ意モ付トモ  
左ナキハ誤ルコト多シ又痰咳喘息シテ留飲家ニ此證アリ  
是亦混シ易シ此味ヲ知レハ大ニ奇驗ヲ得テ鬼神ヲ感セ  
シムル程ノコトアルモノ也細ニ辨スレハ七分ノ黄胖ニ三  
分ノ留飲浮腫ヲ併病スル也忽ニスヘカラス胖ハ大學ニ  
體<sup>ニタカ</sup>胖ナリトアリ不動ニ居レハ呼吸モユルマカナリト云  
意ニテ胖トハ名付シナラン偶記ニクワシク書オケリ黄  
疸トハ別證ナレ凡先輩ノ説ニ從ヒ此ニ論スルナリ黄胖  
ニ瓜蒂ヲ用テ吐スレハ立所ニ愈ユサレ凡又立カヘルモ

ノ多シ猶水腫ヲ下シテ再復スルモノ多カ如シ只其効ノ  
速ナルコトハ他治ト異ナリ要スルニ鍼砂綠礬ノ効ニ劣レ  
リト云ヘシ但鍼砂綠礬ニテ不治モノニ用テ効アルコト有  
ヘシ脱血ノ後ニ黄胖ニナルアリ其人唇舌マテモ虛白ニ  
ナリ喘悸ス血虛ノ故ニ如此黄胖ニ心モツカスウカクト  
シテ人ノ手柄ニスルコトアリ偶記中ニ論置タリ見ルヘシ  
一士人夏月黄疽ヲ患フ數醫ヲ經テ不解寒熱煩躁予ヲ乞  
其惡寒者厚覆衣被戰慄ス後ニ發熱流汗身面金色ニシテ  
小便不利如皂角汁大便秘閉食少ク五十餘ノ人故ニ自モ  
必死トナス診スルニ脉弦數大腹微滿甚不惡予其惡寒ヲ

見ニ瘡ナリ仍小柴胡ヲ與フ次日寒熱甚微ナリ仍テ加鼈  
甲寒熱如失小便黃色少シ減ス仍去鼈甲或加大黃或ハ去  
追日飲食漸進ニ黃去テ全愈ス

一士人積年留飲ニテ咳嗽面色萎黃微腫步行スレハ喘悸  
シテ木履ヲ着ルヲ不能足脛又微ニ腫ル、時アリ飲食不  
減氣カモ甚不惡數醫區々治之無効久日引込テ何レノ時  
ヲ出勤トモ不期先癆人ノ姿ナリ腹ヲ診スルニ卧セシム  
レハ胸間動悸如鼓起アカリテ喘悸甚シ額ヲ推シ背ヲ撫  
暫有テ穩ナリ脉弦虚ナリ爪甲厚ク枯衰シテ不長是黃胖  
ナリ鍼砂湯兼用皇盤丸三十日許諸證退又三十日許ニテ

収効今健歩面色滑澤無病ノ人トナル

鎮神丸 治黃胖病氣上動胸短息不得行歩小便不利者

鐵砂 七錢 蕎麥 三錢

右二味糊丸每服八分日三空心白湯送下兼療下血家腹  
裏生塊動氣不得行歩手足爪反裂者

仙露飲 治黃疸

鼠菴 陰乾 昌陽 各七

右二味以水二合煎取一合去滓日二劑

茵陳蒿湯 茵陳五苓散 大小柴胡湯

三承氣湯 瓜蒂散傷寒論 五疸神丹見叢桂



藏方 鐵砂湯

皇盤丸

治黃胖方 蜆殼ヲ鉄醬ニ漬ス<sub>一</sub>三日夜ニシテ燒テ又鐵醬ニ漬シテ又燒又漬テ燒<sub>一</sub>三度ニシテ細末シ糊丸梧子大每服二三十九白湯送下

下疳 便毒 楊梅瘡

下疳ハ古ノ無キ病ニテ總名ヲ癩毒ト唱フ至真要大論ニ陰中廼瘍隱曲不利互引陰股ト云モノ并ニ金匱ニ少陰脉滑而數者陰中生瘡陰中蝕瘡爛者狼芽湯洗之ト有モノ癩瘡ニ似タレ<sub>一</sub>凡必アタルヤ否ノ<sub>一</sub>ハ先輩ノ未決トコロ又陰瘡ト云モノ癩毒ニ適當ノ文字ナレ<sub>一</sub>凡是モ明辨ナシ自發スル人モアレ<sub>一</sub>凡先花柳ニ耽リテ此病ニ傳染スル故ニ都會ノ人又ハ行商旅客ニ多ク是ヲ病ム既ニ病テハ妻妾ニ傳テ平愈ノ後ニ子ヲ育スルニ血液終ニ癩氣ヲ傳テ其生子成長數年ノ後ニ發スルヲ遺毒ト云其病候千態万狀ニ

至テ殆ト名状スヘカラサルモノ有サテ俗人之ヲ濕瘡又  
ハ瘡濕ナト、呼フ下疳ト云フヲ忌ノ名ニテ唐ニテモ濕  
陰瘡ト云フアレ氏敢テ其名ニモトツキタルニモ非其初  
發スルハ尿口ノ左右上下ニ粟米ノ如又ハ豆粒ノ如ク物  
ニ觸テ赤肌ニナリテ陷蝕スルヲ灸ノ痂ヲ搔ハカシタル  
アトノ如痛ノ無モ又痛モ痒モ有リ陷凹ニナラヌハ下疳  
ニテ無シ一通リノ瘡ナリサテハケシキハ寒熱シ陰頭ヲ  
蝕シ何レマテモカケ込テ潰爛シテ陰毛ハカリ殘テ男女  
不辨至テ死スルモノモ見タリ又陰頭ヲ蝕スルト忽ニ死  
タルヲモ見タリ又半分虧テ愈ルモアリ陰莖餘皮アリテ陰

頭不露者ヲ俗ニ皮カブリト云ハ無事ナル時ニ宜キ程ニ  
餘皮ヲツマミ睫毛倒生ヲ治スル様ニ挾テ腐藥ヲ以テ切  
レハ有體ニナルモノ也下疳ヲ患時ハ此皮カブリハ外皮  
腫ヲ増テ陰頭ハ皮中ニ引込イカホトノ疵ニナリタルヤ  
ヲ見ルヲナラス膿汁ノ流出ヲ見ルハカリニナル是ハ皮  
中ニ膿ヲ包ミ蒸熱スル故ニ別テ治シ悪ク又陷蝕モ多ク  
ナル又皮中ニ堅クフクレ瘤ノ様ニナルヲ袋下疳ト云口  
ヲ生セス日數ヲ経テモ依然トスル有婦人ハ陰内ニ發ス  
ルヲ不異レ氏男子ニ比スレハ治シヤスシ男女共ニ陰毛  
ノ左右横骨ノトマリノ付根ニ結核スルヲ便毒ト云俗ニ

コレヲ横根ト云下疳ヲ病ナカラ便毒ヲ併セ病ニ有又便毒ハカリ病モ有又下疳ノ療治ヲ誤テ枯藥ヲ敷テ早ク治シタル故ニ便毒ニナルモアリ魚口便毒ト云ハ形象ニテ名付タルナリ便毒ノ破レ口小サク與ハ深ク膿汁ノ発シ思フ様ニナキ故ニ是ヲ割テ口ヲ廣クシテ治スル外科ノ手段トス楊梅瘡ト云ハ下疳ヲ病ム人周身へ吹出シテ紅鮮ニテ楊梅ニ似タリ是モ形狀ニテ名付シナリ膿ヲナサス痛モ痒モ無モ有下疳便毒楊梅瘡ト三病ノ形狀ハ異ナレ氏其源ハ一物也之ヲ癩毒ト云ト一言ニテ通用ス一寺住僧所謂五種不男ノ人ニテ割外腎ラ俗ニラセツト云其疵口不愈

日ヲ經テ治シタレ氏周身楊梅瘡ヲ發シ後ニハ班ノ如ク群リ聚リ外皮錫色ニナリ雲華頭ヲ作ス百方無驗テ死セリ此僧イヨク疵口ノ不治カ因ニナリテ楊梅瘡ヲ發シタルヤ疑ラクハ下疳ヲ得テ言ワケナク切タレ氏其毒ハ既一身ニ流注シテ如斯ナルヤ問ヤウモ無テ打捨タリキ又一士人囊大ニ腫テ堅シ蓋癩疔也諸醫醫囊癰トナシテ膏藥ヲ貼スルニ口モ不發百日ニ及ト楊梅瘡ヲ發ス仍テ癩毒トナスニ本人嘗テ是ヲ患タルヲ無ト云予五物解毒湯島藤丸ヲ少ク宛与フ楊梅瘡ハ治シタレ氏囊ハ依然タリ仍テ思フニ陰邊ニ病アリテ毒アルハ毒液周身ニ滿テ楊梅

瘡ヲ發スルモノ欵左スレハ彼僧モ疵口ノ愈ヘサル故楊  
梅瘡ヲ發セルナラン欵其後モ下疳ニテ無キ下部ノ病ニ  
テ楊梅瘡ヲ發タルヲ見受タルヲ有三病ノ内ニテ楊梅瘡  
ハ甚輕キモノ也下疳初起ヲ押隱シテ治ヲ不盡或ハ輕粉  
等ノ藥ヲ敷ニヨリ毒内ニ伏シテ數日ノ後發出スルモノ  
眼ニ出ルアリ耳ニ出ルアリ口鼻ニ出ルアリ面上ニ發ス  
ルアリ肛門ニ發スルアリ咽喉ニ發スルアリ背上ニ結シ  
テ肩骨ノ痛アリ項頸引ツリ轉顧スルヲ不能アリ肘臂痛  
テ不伸アリ腰脊痛テ屈スルヲ不能アリ腋下ニ發スルヲ  
腋漏ト云臭水ヲ流ス頭上癩塊ヲナシ或ハ口ヲ作ス有或

ハ内ニ伏結シテ頭額隱クトシテ痛鼻ヨリ黄臭水ヲ流ス  
アリ其似タルニ及テハ如痛風如癩風如附骨疽如舌疽如  
牙疳如喉疽如腦漏如懸癰如風眼如内障如聾耳一々カリ  
ヘカタシ夫癩毒ノ如斯ニ變態萬狀ナルヲ不知者皆生  
靈ヲ誤ル輕粉ヲ服シタル人毒ニアタリテ種々ノ證ヲ病  
ト先輩ノ説ナレト外ヨリ敷タルハ皆毒氣ヲ伏シテ以上  
ノ證候ヲナス内ニ飲服シタルハ毒氣為ニ化シテ害アル  
ヲナシ以上ノ諸證ノ如キハ輕粉生々乳ニ非レハ治スル  
ヲ不能以上ノ痼疾ヲ療スルノ仙品也所論ハ多端ナレト  
癩ノ一毒ナル故ニ皆一手段ニテ治スル也只輕粉ヲ用ユ

ルニ瞑眩無又ハ化毒丸ニシテモ猶自若ナラハ丹霞條ヲ  
以ス五宝散ハ平穩ニテ奇驗ノ良方ナリシカシ毒ノ盛ナ  
ル時ニハ其効是ハ經日毒定モノニ用ユヘキ也粉劑ノ効  
トハ大ニ味ノ違ナリ咽ニ發スルハ懸厭ノ左右又ハ懸厭  
ヘモ發ス懸厭ノ役目ハ喉ニ食道ト氣道トニツアリ食道  
ハ後ニ在氣道ハ前ニ在是ヲ氣管ト云其氣管ヘ一滴ノ物  
入レハ忽ケムセテ咳出ル飲食ヲ食道ヘ送ル時ニ懸厭ニ  
テ氣管ヲ塞テ之ニ入ラサラシム之ヲ懸厭ノ役トス又會  
厭トモ云也懸厭ハヒラクシタルモノ故ニ膺ニナルモ早  
ク立地ニ虧<sup>カ</sup>込<sup>コ</sup>故短クナレハ氣管ヲ塞クナラヌ食道ヘ

モ飲水ノ送り様アシキ故ニ溢レテ鼻孔ヘ出ルナリ言  
語モ鼻ヘカ、ルハ此懸厭ノ左右ニ兩鼻ヘ通スル竅アリ  
爰ニテ音聲ヲ受ルモノ無故鼻ヘヌケル也又聲音啞シテ  
不出モ氣管ニ毒ヲ移シ管口陷入シテ懸厭無キ故ニ聲シ  
イリ常ニモ呼吸ニ鳴<sup>ナ</sup>トスル也伏毒ハ咽喉ニ發スルモ  
ノ尤多トスサテ又懸厭陷落シテ餘勢上腭ヘ逮<sup>ツ</sup>ハ内邊空  
虛ニナル故ニ鼻梁窪<sup>ツ</sup>ニテ鼻孔ハ向ニ及リ獅子鼻ニナル  
小鼻モヒシケル也又一種鼻柱ニ瘡ヲ發鼻尖ヲ蝕シテ猶  
其勢ヤマスシテ深ク入上腭ニ逮<sup>ツ</sup>却テ懸厭ヲ蝕スルア  
リ是ハ鼻象モ無ナリ鼻孔真向ニ成一穴ヲ止ムルアリ猶

モ上唇ヲ蝕シテ前板齒ノ見ユルモアリ又頭上ニ肉瘤ヲ  
發シ癰塊ト幾ツモ發スルモ有一且口ヲ生スレハ臭水ヲ  
漏シテ骨マテ陷没シテ指頭ニテ穴ヲ明ケタル如クニ一  
寸ハカリモ陷ル是ヲ俗人吹抜タリト云如斯ナリテ前日  
患ル所ノ腦痛或項頸骨節諸痛或眼目為翳ノ類豁然ト愈  
テ是ヨリ無病壯健ノ人トナルモ有之ヲ治スル法ハ化毒  
丸島藤丸感享丸輕粉丸丹霞條五寶散ノ類ニテ外ニ奇方  
異術アルニ非ス迺是一毒ナルカ故也丹霞條ハ上部ニ有  
モノニ用ユルト云ヘトモ必上部ヲ以テ定式トスヘカラ  
ス何方ノ毒ヘモ可用藥汁ハ五物解毒或加葶藶或加土茯苓

苓鼻ニ結スルハ加辛夷丸此湯ヲ先鋒トス前ニ云所ノ骨  
節疼痛眼目頭疼楊梅瘡便毒一切癰毒悉主之兼用ノ丸藥  
分量ノ多少ハ巧拙其人ニ在予嘗テ解毒奇効方ト云書ヲ  
集タリキ然レ凡他ニ求ルニ不及ヲ以テ再不披一通リ全  
快シテ其後年々少々吹出シ又ハ消タリスルヲ有強キハ  
最初ノ手當ニスレ凡輕ハ龍膽浮肝湯ナトヲ用テ見合置  
ナリ此藥ハ如淋ニモ又真ノ淋ニモ用ユヘシ  
陰囊ニ下疳ヲ發シ皮爛レ脱シテ罽丸バカリブラリト下  
リテモ又皮ノ殘タルニツキテ下リテアルモ有リ脱囊ト  
名付ク陰莖ヨリハ治療シヤスキ方也是モ治方他技ナシ

下疳通りニテヨシ

世人下疳ヲ淋病ト云ナシテ隠シ居テアリ又實ニ淋病ヨ  
リ下疳ニナルト有是ハ下疳瘡ヲ尿道中ニ發スレ氏目ニ見  
ヘ又所故小便ノ通利ニ疼通シ或ハ膿ヲ出ス淋病ナリト  
覺テ居内ニ尿口ノ膿ノ出タルカツキニ粘ツキツキ乾キタルヲ  
不計ニ引ハカシタル跡ナトカラ忽ニ疵ニナリ始テ下疳  
ノ形ヲ露スアラハト有是ハ病根淋ニ非又按スルニ尿孔中ニ瘡ヲ  
生スルハ潰爛スルト少キヤ表へ發タル毒ノ見合ニテハ  
大破ニナルヘキ日數ニ及トモ知レスニ淋藥ヲ用テ居ル  
トアリ又舊淋ニ下疳ノ藥ヲ用テ驗アルモノハ此筋ノ淋

ニ係ルヤ

耳ニ結シテ終身ノ聾トナル有難治ナリ是モ初起ノ治ヲ  
誤リ外ヨリ膏藥ナトヲ付テ治シタルモノニアリ又面上  
ニ發シ癩風ノ形ニ似ル有誤リトムルト勿レ死肌ナキモ  
ノ也予カ知俗家ニテ下疳ノ奇藥ヲ賣人アリ其骨節疼ス  
ルモノ或面上瘡癩ナト其毒下疳ナルヤ又他因ナルヤノ  
看法ヲ不知故ニ生豆ヲ嚼セシムルニ腥氣ヲ不知モノニ藥  
ヲ賣ルサテ生豆ヲ嚼テ腥ヲ不知ハ方言ニ豆カミノ病モ  
アレ氏是ハ痧病ノ一種ニテ渡海ノ船子ノ病ニテ常ニ有  
病ニ非ス癩毒ノ試トスルハ一奇談也

液漏ハ平肉ニテ薄墨ヲ染タル如ニナリ臭水アタルヘカ  
ラサルヲ流ス又肘臂脛胫ニ發スルハ肉陷テ骨ノ見ント  
スルハトニ深虧入り縁通りハ是モ薄墨ニテ隈ヲ取りタ  
ル如クニナル或ハ胸肋乳房ニモ赤核ヲ結ヒ後ニ爛ル、  
モアリ又頸項ニ發スルハ瘡痂ヲ結フ本人ノ癩毒ヲ受テ  
久キヲ經テ此諸證ヲナスモ有又ハ父母ノ遺毒ニテモ此  
證ヲ病故ニ本人瘡氣ノ覺ナシト云トモ癩毒ナル有必油  
斷スヘカラス以上所論ハ皆結毒伏匿ヨリ發スルモノ皆  
可治ノ證ナリ前法ニテ治スヘシ他ニ求ルニ及ハズ  
伏毒骨節ニ滲染シテ微痛シ寒熱往来シテ瘵疾ノ状ヲ為

モノハ難治也葦薤湯ニテ龍膽真珠丸ヲ兼用スヘシ雞肉  
鯁鱺等ヲ餌シ幸ニ發出シ為膿潰モノハ可救然レ凡是ハ  
天賜ニテ甚稀也又癩毒入眼モノ明ヲ失スルニモ不至ノ  
年月不治モノ有骨節疼用粉劑一旦快キモ又發スルモノ  
件ノ天賜ナケレハ終身ノ痼トナルアリ是ニ雞肉ヲ餌セ  
スレテ逐毒散ヲ用ユルモヨシ輕粉ヲ服セシ故ニ藥毒内  
ニ殘骨疼スト諸書ニ記スル所ナレ凡骨疼ハ宿毒也粉毒  
ニ非予カ言ノ虛實ハ骨疼スルニ粉ヲ与ヘテ知ルヘシ骨  
疼ハ粉劑ニ非レハ不治俗醫粉ヲ製シテ毒ヲ殺シ瞑眩セ  
サルヲ以テ奇方トスルモノ有レ凡其効甚劣ル也凡用粉



ノ瞑眩ハ口内腐爛シテ臭氣ツヨク粘涎ヲ唾シ甚キハ齒  
根黒血ヲ流スモアリ其時ニ瘡所ノ乾クヤ痂ノ脱スルカ  
ノオトヲ見テ丸ヲ止ル欤猶愈ノコリテ有ニカト思フハ  
今一日用ユヘキカノ所ハ看法第一ニアリ口舌腐爛スル  
ニ驚キテ瘡所ノ善惡ヲハ不問藥ヲ止ルモノアリ此等ノ  
醫ハ瘡口ノ愈サルニ困リテ外ヨリ傳藥ナトシテ速ニ瘡  
ハ愈レ氏後ニ骨疼シテ癩毒ノ不盡ハ不論シテ粉毒ニア  
タルト覺タルナラン口舌腐爛スル氏瘡所未愈モノハ強  
テ用ユサレ氏丸藥ヲ止タレハトテ口中速ニ愈モノニハ  
非三四日ハ同様ニテ居モノ也瘡所ヲ見ルニ一二日ヲ過

テ乾仕舞ヘシト見タラハ丸藥ヲ止テ瞑眩ノ止マテノ日  
數ニテハ全快スル也又二三日ニテハ愈マシキ姿ナラハ  
何ホト苦ムトモ別ニ再療治センヨリハ手序ニ推テ今一  
日モ二日モ用ユヘシ今度ニ懲リテ勇者ニテモ再遍ハ仕  
兼ルモノ也又人情苦惱ヲ見ルニ不忍家人ノ苦勞カル顔  
色モ見カ子ル故ニ少シ早ト思ナカラ丸藥ヲ止テ瘡所愈  
殘ノアルハ初心ノ至也是ハ全ク分量多少ニ係ル所也其  
愈ノコリニコマリテ傳藥ヲシテ人ヲ害スルニ至リ罪ヲ  
輕粉ニ歸スモノ常事ナリ然レハトテ過劑セハ絶食數日  
氣血衰或妄語牙縫流血四肢逆冷シテ死ス如斯ハ瘡所ハ

トクト愈テアルモノ也全過劑ノ咎ニテ可慎也前件ノ様  
子ニナルモ脉ヲ見テ胃氣タシカナルハ銀花煎ニテ救ヘ  
シ良師ニ就テ分量ト瘡所ノ看法ヲ不學ノ罪ナリ夫故ニ  
買藥ナト大都ヲ計テ一劑ヲ一回トシテ用法ノ分量ヲ定  
メ不愈ハ二回三回トスル也サテ粉劑ヲ用テ後ニ備急圓  
紫圓ノ類ニテ下スヲモアリ是モ粉毒ヲ恐ルニオユル必  
用ユルニモ不及見合次第也口中爛シ飲食ナラヌ時ハ醴  
ヲ冷飲ス又冷豆腐ナトニテ凌也銀花煎ヲ含ムヘシ生  
乳ノ煅煉ノ方ハ癰瘡秘録ノ文難解故ニ先年ハ秘傳ニシ  
タル也今ハ人之ヲ知ヲ得タリ近時ソツピルマアト

ト云藥ハ水銀ヲ燒タルモノニテ生々乳ヨリハ其効速也  
ト云長崎ノ人ニ其燒様ヲ問ニ兎角蠻船載來ルモノニ劣  
ルト云故ニ不製生々乳ハ下疳ノ之ニアラス噎膈中風水  
腫脚氣勞瘵血積寒疝痰喘小兒馬脾風其外難病ニ配用シ  
テ奇驗アリ一ニ説盡カタシ只癰毒ト違テ瞑眩スルヲ速  
ニテ先發熱眩暈ナトスルヲアリ早ク冷水ヲ用テ其毒ヲ  
解スヘシ分量モ二三厘位用又日ヲ間スルヲモアリ塩梅  
ノ入モノ也  
三歳ノ兒ヲ携テ夫妻來テ診ヲ乞フ其兒上腭腐テ懸厭半  
ヲ蝕ス予曰是遺毒也ト夫妻決テ無此事ト云盖夫嘗患癰

毒ノ後ニ妻ヲ娶ニ仍テ其妻ニモ隱シテカクハ云也ト知  
レ氏先口科ノ醫ニ指圖シテ藥ヲ服セシムニ依然タリ却  
テ虧入ルヲ甚シ再ヒ予ニ乞ニ依テ化毒丸三厘ヲ与フ四五  
日腐肉モ少シ取レ目故五厘ツ、与ヘテ十日餘ニシテ治  
スヲ得タリ語音ハ鼻ニカ、ルノミ凡小兒ノ病ヲ診察  
スルニハ先陰囊ヲ見ルヘシ紅筋チラクトアルモノハ其  
父母ノ遺毒ナリ是ヲ看法トス

森戸村一農人二十三歳下疳愈後骨疼一手拘一足攣ス  
両眼赤痛頗明ヲ失ハントス貧ニシテ之ヲ療スルヲ不能  
醫ニ托センニハ一錢ノ貯無トテ来テ乞憐先五物解毒湯

ニ島藤丸一日四分ヲ兼用ス數十日ニテ眼少シ見ル手足  
モヤ、屈伸ス島藤丸六分ニスルニ依然タリ仍五宝散ニ  
劑ヲ盡シテ眼ハ全快ニ齊シ然レ氏五宝散ヲ又与ル費ヲ  
如何トモスヘカラス又五物ト島藤ニスレハ眼又赤ヲ發  
ス更ニ五宝散一劑ヲ与フ病人其費ヲカケ愛憐過ナリト  
テ固辞スレ氏外ニシテハ可治ノ藥ナシトテ強テ与ヘ服  
サシムレハ眼赤ヲ去フ如失骨疼未治其人頻ニ丸藥ヲ服  
センヲ乞ニマカセ又島藤丸ヲ与フ年餘ニ至テ少シノ  
荷物ヲ負テ數里ヲ行フヲ得タリ常ニ丸藥ヲ不服ハ心中  
憤々ヲ覺フ剛悍ノ丸藥連服ノ品ニ非スト教ユレ氏丸藥

ラ服スレハ心身輕爽眼力明カナルヲ覺トテ頻ニ乞今  
十年餘ニ至ニ仍九藥ヲ服シ五物ヲ飲初ヨリ輕粉ノ瞑眩  
ナシ九藥ヲ休ムレハ頭痛眼盲スト仍三十日ノ劑ヲ乞テ  
隔月ニ來今ハ其農作常人ノ如シ在塾ノ書生歸郷シテ再  
遊スレハ猶藥ヲ乞テ見テ綿連長病ト思其人ヲ見テ皆大  
ニ笑曰普代ノ病人粉丸ヲ持藥シテ何ソ一害ナキト  
感享丸 療癰毒方

薰陸

胡桃肉

炒令焦  
黑細研

槐花

炒令  
微黑

大棗

各二十錢  
炒令焦黑

未細

輕粉錢五

右五果別炒胡桃槐花大棗等次炒薰陸候其鎔沸變黑內

槐花拌取出与大棗同搗篩胡桃細研与輕粉并諸藥合調  
糊丸服後方送下土茯苓七錢萎蕤二錢以水五合煎取三  
合午前空腹以湯一合送下九藥五分餘湯二次服盡病重  
者服八分或一錢數日後口中欲腐爛者減服從前法東門  
曰此藥必不拘常法用解毒劑送下亦惟宜量其輕重表裏  
強弱以左右収効也

五物解毒湯

治諸結毒

假蘇

五分

金銀花

七分

芎藭

三分

葳菜

五分

大黃

二分

右五果以水二合煎取一合淹毒者加葶藶一錢甚良  
輕粉丸 治諸結毒下疳骨疼淹不愈者方

牽牛子二 大黃 輕粉各一 鹽梅肉一

右四味為末糊丸茶末為衣每服三分日三空心白湯送下  
不須嚼以六日為一劑七日平且空心服備急圓三分穢物  
當大下凡施劑不必盡劑隨病者強弱輕重斟酌之後方亦  
從之此藥尤剛烈慎勿過用服後口中爛者銀花煎方噙之

丹霞條 理上部結毒頭痛癭瘻及咽喉腐爛方


鉛一分 水銀一分 朱砂一分 沈香一分  
人參五分

右五味盛鉛土盞上火鎔化內水銀柳箸拌令相得傾注于  
紙上研候如泥入朱砂沈香入沒等之末三味和調二冬四

分紙ノ幅一寸長八寸ニ切一方へ糊ヲツケ



コヨ

リヲシテ火入ノ上ニ立テ外ニ紙ヲ五寸四方ニ切如筍  
ニシテ  是ヲ覆テ細キ方ヲ鼻孔ニ入テ烟ヲ吸其

昔病人水ヲ含ムヘシ左右各一管ツカケ晝夜二度十  
日ヲ以テ一劑ヲ盡ス此方ハ粉劑ヲ用テ瞑眩スルト異也

銀花煎 口中ノ腐爛スルニ合セルナリ

金銀花 黃栢 粉草各一分 青黛 柘榴皮各一分

右五味以水八合煎取五合去渣數々冷噙之日盡一劑

草解湯 治瘡毒上攻頭痛甚或結毒經久或項背強急往來  
寒熱咳嗽虛羸狀似勞瘵者兼用龍腦真珠丸最妙

葶藶<sup>十八</sup> 銀花<sup>三</sup> 辛夷 防風 玄參

川芎 天麻 烏頭 蔓荊子<sup>各五</sup>

燈心草 雨前茶<sup>各三</sup>

右十一味水煎服此法極妙不啻用<sub>二</sub>於瘡毒頭痛<sub>一</sub>諸藥不効者皆可用若頭痛甚者倍加<sub>二</sub>辛夷<sub>一</sub>

龍腦真珠丸 治下疳便毒楊梅瘡骨節疼痛日久腐爛臭敗不堪聞者或咽喉唇鼻破爛諸藥不効者

大黃<sup>二</sup> 黃芩 雨前茶 阿仙藥<sup>各一</sup>

蠶<sup>六分</sup> 去腸胃填輕粉<sup>容</sup> 桂枝<sup>七分</sup> 輕粉<sup>二分</sup>

甘松<sup>一分</sup> 珍珠 龍腦<sup>各三分</sup>

右十味極細末丸如梧桐子大白湯送下○眼疾卜小兒二用<sub>レ</sub>時ハ葛根二錢黃連一錢川芎一錢半丁香六分右四味ヲ加フ

逐毒散 治上部結毒耳目或咽喉作核痛

香附子<sup>一兩</sup> 廣東人蔘<sup>一兩</sup> 雞<sup>去翼足</sup> 以水洗淨以

二味<sub>二</sub>內腹中繩<sub>一</sub>ニテカラケ蒸也大抵雞肉ノ汁香附子ニシ<sub>レ</sub>ミコミタル時ヲ伺ヒ取上テ日ニ乾シ細末シテ用ユ

龍膽瀉肝湯<sup>方彙</sup> 五寶散<sup>萬病</sup> 烏藤丸<sup>藏方</sup>

化毒丸 療癰毒沈深兼理中風偏枯及一切痼毒腹痛水腫 噎噎久瘡等

薑陸一

大黃

雞冠雄黃

亂髮霜各三

生之乳一

右五味糊丸辰砂為衣每服一分。日二夜一。食遠稍冷湯服。病重者日用至五六分。服法依前法。後寒熱如感風寒。一身發赤疹者大良。蓋此藥酷毒最甚。得熱猛得冷緩。若服覺四體發熱懈惰無力者。煮綠豆冷飲立定。或服冷水亦佳。宜審察其虛實深淺。慎勿漫用。切忌房勞怒悲酒酢及熱飲生冷等。若犯此者不止不得効。其害亦不淺鮮矣。

眼耳

眼科ハ今専門アリ是ハ讓リテ佳也サレ凡不内治ハ不治者アリ天行赤眼ハ今世ニ風眼ト云寒熱頭痛甚眼中赤翳肉起リ眼胞腫レテ披キ窺フ不能強テ披ケハ熱淚流レ詳ニ診スルモナラス或陽ヲ惡之暗室ニ徇偶シテ疼痛甚キハ昏倒スルニ至ルモノアリ五三日ヲ過レハ翳ヲ作膿水潰爛終身失明ス其初メ疼痛スル時速ニ治スレハ毒散シテ膿潰セス手ヌルキ藥ヲ服シテ廢人トナル者幾人モ見タリ必緩クニスヘカラス疼ノ甚キハ翳ヲナサントスルノ兆也大便秘閉脈弦數ニテ萬事上衝ス三黃湯ヲ主

トスレ氏夫ヨリハ排雲湯ヲ晝夜ニ六七貼ヲ頻服スル三  
四日ニテ効アリニ貼位フ、用テハ適方ニテモ力不足紫  
圓ノ類ヲ兼用スルコトモ有ヘシ又石膏ヲ加ルコトアリ是ハ  
頭痛煩渴スルモノニヨシ石膏ハ総テ分量多用ユル者也  
古方ノ分量ヲ見テ知ヘシ尚足飲ヲモ用ユヘシ若薬用ヲ  
怠リ數貼ヲ用カ子ル人ハ難治ナリ此證ニ四物ハ物湯ニ  
菊花木賊蟬退ナトヲ加テ肝經ノ藥ナレハ柴胡ヲ加ルナ  
ト云流ノ醫ニ任セ無効故ニ不得止シテ轉療スルハ其度  
ヲ失スル故ニ多救カ子ルモノナリ故ニ能ク可攻ノ病ト可  
守ノ病トヲ知テ而後ニ匙ヲトルヘシ誤ヘカラス同方ニ

テモ多寡ニテ其力相違アリ此證ハ筋ニヨリテ葛根湯或  
合三黃湯又五物解毒モ用ユル所アリ又尺澤ヲ刺絡スヘ  
シ其効如神其法ハ瘈狗傷考ニ詳ニスレハ見ルヘシ又手  
中指第二節赤白肉ノ際ニ灸スルコト五七壯痛ヲ去ルヤテ  
又膿潰シ眼ニ破タル所陷凹シテ甚可恐形ニ見ユルモ瞳  
子少シモ殘タルハ日ヲ経テ愈テ明ヲ不失痛ノ止タル時  
か膿潰シタル時ナリ目ヤニ流ルト云モノハ膿ヲ流スナ  
リ意ヲ付テ見ルヘシ星クツレト呼モノハ難治ナリ是ハ  
眼中ニ出来モノ、スルナレハ其物瞳子ノ真中へ發シタ  
ルハ不及是非失明スルナリ外障ヲウワヒト云内障ヲソ



コヒト云外障ハ可治内障ハ難治也又青盲ト云モノハ瞳  
子碧色ニナリ痛痒ナク何時ヨリ明ヲ失セシモ不知モノ  
也其ハ其人ヲ望テハ盲者ト見ヘス内障ハ眼科ノ鍼ヲ刺  
テ膿ヲ去ル法ニテ治ス手際モノナリ翳トハカ、リモノ  
ナリ醫ハ星也星ハ眼中ニ腫物ノ出来タルナリ故ニ膿也  
眼中トテ別意味ニ非ス夫故ニ葛根湯ノ主スル所多シ上  
逆スル故三黄湯桂枝湯其宜ヲ斟酌スヘシ大人小兒ヲ不  
論鶏肝丸ニテ効ヲ取ルコトアリ小兒疳眼ハ多クハ治シヤ  
スシ疳ヲ治スレハ眼モ治ス故ナリ只連月治ヲ失シ病ツ  
ノルモノハ此例ニアラス赤子胎毒眼ニ入或目溢ナトハ

云モノ輕忽ニスヘカラス失明スルモノ多シ早ク紫圓ヲ  
用ヒテ跡ハ雞肝ナリ胎毒ノ頭瘡ヲ誤テ傳藥シテ眼ニ入  
タルハ鉉丹膏ノ主ナリ黑瞳散ナトニテ疳眼ノ治スルコ  
多シ又灸モ異効アリ  
眼胞爛レ終身ノ患ヲ作スアリ芟凶湯ノ證多シ又洗塵散  
ニテ治ス尺中出血シテ治スルコトアリ只久經不治モノハ  
難治痘毒ハ眼類ハ痘瘡ノ時ニ語ラン  
旅途日々風ヲ冒シテ赤眼痛スルモノアリ尺中出血ニテ  
應手スレモノナリ  
雀目小兒ニ多シ久ク治セサレハ疳眼ニナル白眼ノ所ハ

雲母粉ヲカケタル如ク又日久シキ病ハ皺ノ出ルモノ也  
黒瞳散雞肝丸主之ナリケ合谷ニ灸シテ治シ又七八九十  
一推不容天樞ニ灸スヘシ鰓腸ノ塩辛ヲ食セシムルニ奇  
驗有大人ハ肺俞三里ニ灸スヘシ一日治スルモ日向ヲ遊  
歴スレハ再復ス尤暑月ニ多シ清涼ノ日ニハ快キアリ  
ツキ目ハ鼯鼠霜反鼻ノ散ニテヨシ此他ハ専門アレハ是  
へ讓ルヘシ予モ未詳トコロアリ誤スクナカラニテ欲ス  
睫毛倒衝ハサカマツケト云眼胞ノ餘皮アリテ睫毛眼中  
ニ入テツ、キテ痛ムナリ鑷ニテ抜トモ又生スル故ニ不日ニ  
又發ス故ニ其餘皮ヲツマミテ竹枝ニテヨキホト挾ミシカ

トク、リテ巴豆或ハ膽礬ヲ挾ミアケタル所ニヌル五七  
日ニテ皮切レテ胞肉眼中ニ入ラス故ニ毛ニテ眼ヲツク  
ト無シ挾トコロノ見計大事也眼ノトチヌヤウニナル也  
排雲湯 治風眼方一切眼目カスミ痛等ニ用ユヘシ

車前子ニ 黄芩 黄連 細辛 大黄

甘草各二分

右六味以水二合煎取一合

鉉丹膏見痘瘡 三黄湯 葛根湯 桂枝湯傷寒論

紫圓千金 雞肝丸藏方 尚足飲同上 黒瞳散同上

雀目方青箱子黒燒細末雞卵中ニ入燒キ用

馬明湯 治眼疾屬先天遺毒者及結毒入眼或疳眼等諸證

海人艸 ニ錢 忍冬 一錢 紅花 四分 甘草 五厘 石菖根 二分

馬明退 一分

右六味照常煎服未試

灸手大指甲後一寸內廉橫紋頭白肉際灸一壯治雀目

疳眼ハ灸合谷一壯又治雀目一壯トアレヒアマリ少シ

青盲ハ系竹空每朝灸一壯年久二三壯必用小炷

耳ノ聽ユル味ヲ質ニ耳ノ奥ニ如竹膜モノアリテ是ハ響

テ聞ユルトソ其膜ハ物ヲ聽ントスレハ引張ル偶然ノ時

ハユルミテ在故ニ聞落アリ又老人ハ膜モ皺ヲ生シテ聞

カ子ル又腫物ヲ生シ膿ヲ催シ此膜ニ皺ノ出来タルモ壯

者ニテモ終身聾スルニ至ル耳鳴シテ大鼓力鐘ノ様ニ響

テ不聞ハ耳中ノ絡脉フトリテ動脈ノタカブリタル響音ナ

リ動脈ナシニ但腫テフトリタルハ風聲ヲ聞カ如ニナル

試ニ耳孔へ指ヲ繞ニカザシテ見ルへシ耳鳴シテ松風聲

ヲナス一點ノ障アレハ耳ハ鳴モノ也是耳ニ腫ヲ催シ絡脉

努張ノ有レハ鳴テ不聞モノ考へ知へシ人雙耳忽ニ腫痛

シテ清水ヲ流ス久ケレハ臭ク又久ケレハ變シテ膿血ト

ナルモノハ寒熱シテ耳ノ中沸湯ノ響ノ如ク又蟬ノ鳴カ

如シ聾耳ニテ終身聾スルモノハ件ノ膜切レタルナリ頭

項ヨリ強急シテ耳ノ聞ヲ妨ケタルモノ有葛根湯ナリ耳  
中痛之鳴ルハ五物解毒ナリ聾耳モ五物解毒或ハ加辛夷  
傷寒耳聾ハ別ニ治スルニ不及熱退ケハ治ス耳鳴ハ尺中  
出血ヲ宜トス肩部三里ノ灸ヨシ肩井へ灸シテ治スへシ  
方書ニ耳ハ腎ノ候ナリトテ補藥ヲ用ユルハ定式トシカ  
タシ耳ノ鳴テキコへサルハ耳前ニモ項頸ニモ絡脉ノ努  
張シタルヲ見テ灸スへシ多々益佳ナリカ時々聾者ヲ  
治スルハ此手段也總テ耳中ニ通タラント思絡ノ張タル  
ヲ按シテ灸スへシ一老人失勢神心ヲ苦テヨリ耳聾ス時  
ニヨリ俄ニキコユルト云嚴寒ニハ別テ聾ス或予ニ治ラ

計ル予曰若クハ灸歟老人兼テ灸ヲ嫌或頻ニス、ム仍テ  
肩井大推ノ左右并ニ風門ニ灸スルヲ三十壯少ク有驗又  
灸凡十五日ニ至テ常ニ復ス是ヲ聞テ聾者多ク来テ乞點  
予頸項ノ絡ノ張タルヲ探求テ俞穴ニ不拘肩以下ニ點ス  
ル大抵セハケ所灸スルヲ三四十壯毎日或ハ五三日十日  
ヲ隔テ灸ス又脊際自ニ七推至十四五推灸ス是モ數々灸ス  
ルニ十人ニ三四人ハ治ス  
耳中痛ニ大薊白花ナルモノ根ヲ取汁ヲ絞リ耳中ニ滴ル  
妙也多クハ耳病ハ大便秘閉シ上逆スルモノナリ項背ヨ  
リスルト結毒トノニツニ屬スレハ是ヲ分ツへシ百蟲入

耳モノハ胡麻油ニ紫金丹ヲ化シ少許ヲ滴ル  
下疳治ラアヤマリ聾スルモノハ難治ナリ是ヲ輕粉毒也  
ト云不吟味ナリ聾ノモノニ粉劑ヲ存分ニ用テ見タケレ  
氏本人恐ル、故遂ニ不試

芎黄散 治諸結毒方

川芎 大黃各等分

右二味為散每服一錢日二或三空心温酒或白湯飲下丸  
亦佳

五物解毒湯見下 葛根湯 三黃湯傷寒論

防風通聖散 加味道遙散方彙

灸 肩井 三里 肺俞 膏肓

鼻口喉

衄者ハ十血經脉篇ニ口乾衄衄ス又淚出衄衄スナト見ヘ  
テ衄ノ字ハ字書ニ無シ衄ノ字ニ似タリ衄ハ説文ニ病寒  
鼻窒也音裘ト見ユ猶委クハ經穴彙解ニ考アリ衄血ハ上  
逆ニ屬シ多ハ升餘ニ至リ血暈スルモアリ三黃湯桃花散  
ヲ兼用ス止カタキハ三里ニ灸スヘシ又犀角ヲ加ヘ用ル  
モ効アリ生地黃藕汁ノ屬皆可用也翠鳳散奇驗アリ大蒜  
ヲ子ジニシテ見ルヘシ酒查鼻ハ俗ニ云柘榴鼻ナリ甚シ  
キモノハ兩腫マテ赤紫ニナルアリ寒風ニ吹レテ紫黒ニ

ナルアリ一体鼻脹腫スルモノ有リ多ク酒客ニアリ鋒鍼  
ニテ輕ミニ刺シテ準頭ヨリ一面血ヲ取ハ治ス經日又前  
状ニナルトキハ復刺テ血ヲ取ヘシ治之ノ方多ト雖氏予  
未試蕃椒ヲ多ク喫スレハ查鼻ニナルト云説ハ虚ナラス  
金町ノ一高查鼻ヲ患フ鼻頭及口上粟ノ如ク細疹ヲ発シ  
或ハ膿ヲ白頂ニナル而腫紫黒鼻モ長大ナリ人ノ曰痔疾  
ノ上逆也椒ヲ食シテ大ニ下血スレハ可治ト此人元來蕃  
椒ヲ嗜ム人ト異ナリ冬初秋末ヨリ之ヲ大桶ニ塩漬ニ  
シテ一年ノ食ニ充ツ飯一膳ニ九枚ヲ盡シテ辛味ヲ不知  
予曰汝ノ病因ハ果シテ是ナリト即絶テ不食防風通聖散

數十劑ヲ投シ色モ薄ク鼻モ小サクナリタリ鼻中息肉ト  
云ハ俗ニ鼻荀ト云赤ク鼻中ニ生ス實ニ竹筍ノ形也何ニ  
テモ輕キ藥ヲ點シテ流レ治ス鉛丹ニテモ治スヘシ瓜蒂  
ヲツケルモ佳也鼻淵ト云ハ無端鼻ヨリ清水ヲ流スモノ  
久シキトキハ黄濁ノ物ヲ流シ如膿如髓腥臭聞ニタヘス  
即素問氣厥論云鼻淵者濁涕下而不止也ト是也臭氣アル  
ハ膿ヲ帶タル也鼻癰ト云ハ瘡ヲ生シタルナリ腦漏ト云  
ハ鼻病ニ非ス頭腦中ニ膿ヲ作り鼻ヨリ漏下スルナリ此  
人頭痛隱々涙ニ交リテ膿ヲ出スアリ自臭氣ヲ覺テ微寒  
熱項背強急スルアリ鼻淵ト云モ是ト一因也鼻淵ノ人他

病ヲ患ル時ハ愈テ居ルモノナリ鼻淵腦漏ハ輕重ト見ユ  
元來冒風寒ニシテ病モノ多ク酒客ニ多シ輕證ハ惡臭許リ  
ニテ膿氣ナシ風ヲ引タル時ニハ發シ風邪去レハ其證モ  
退ク也執筆筭勘ナト心神ヲ勞スル人ハ大ニ障ルモノナ  
リ方ハ葛根湯五物解毒湯ナト辛夷ヲ加テ効アリ背肩ノ  
灸モヨシサテ世ニ偏頭痛ト云ハ皆鼻淵ノ人ナル者也有毒方ニテ痛也  
鼻淵清涕ヲ流ス治方ハ在鼻淵夫ト不知ニ持病ノ偏痛何病ニ  
モ合病ト云者鼻紙ニ際トリシテ甚粘黄色カ青色カ又ハ  
血片ノマジワルモ有総テ治ハ偏頭痛ニアラス常クニ心  
得置テ可也扱腦漏ノ重キハ頭中膿ヲ作ス鼻ハ勿論口ヨ

リモ出テ面部ニ腫ヲナシ堅ク如石目眦ヨリ膿ノ出タル  
モ見タリキ寒熱往來如瘧盜汗肉脫面色青黃終ニ勞瘵ノ  
如ニナリテ死是瘰癧ナト一様ナリ翹玄湯ナト用ユヘケ  
レ氏如此至テ八十死一生ナシ膿ニ非ス後ハ血ヲ出スモ  
ノナリ頭癰ナト云モ一様ナラン然レ氏鼻ヨリ出サレハ  
鼻ニ屬セス耳へ吹切タルモ見タリ鼻不聞香臭モノ他ノ  
故ナク又生涯外ニ障ルヲナキ人アリ方ハ本艸ナトニ出  
タレ氏効驗如何ト云フヲ不知此人鼻ハキカ子トモ蔥白  
或橘ナトヲ喰シテ口内へ入レハ芳香ヲ知ルモノアリ外  
通セス内通スルノ形ナリ又偶ニ三日位鼻ノ通シヨクナ

ルモアリ風ヲ引テ却テ鼻ノ聞ユルモノアリ時師多ク痰  
飲肺藏ノ故トス一驗方ナキヲ以考ル<sub>レ</sub>不能後日ヲ俟ツ  
ヘシ下疳ニテ鼻陷ルハ下疳ニカタルナリ下疳瘡ノ治方  
ニテヨシサテ又本人癩毒アルハ知り易ク親ノ遺毒アル  
ハ本人モ不知極テ腭中へ物ヲ生シ會厭流落ル<sub>レ</sub>アリ懸  
癰ト名ク巳ニ物ヲ發ストモ痛ナキモアリ本人モ不覺只  
鼻孔へ飲水流ルト云ハカリノ病ニ云ナスモノナリ鼻ヨ  
リ飲水出ルト云ハ會厭ノサハリト改メ見ルヘシ其實ハ  
鼻病ニ非ス咽喉病ナリ病者ノ顔ヲ仰ケサセテ口ヲナル  
<sup>タ</sup>大開テ息ヲ内へ引スヘシヨク見ユルナリ若夫ニテ見ヘ

ヌハ箸ニテ舌ヲ押ヘテ息ヲ引スヘシ右ヲ見ルニハ右ヲ  
押ユヘシ左ハ左ヲ押ユ舌ノ真中ヲ押ユレハ嘔スルモノ  
ナリ嘔噎ノ鼻ヨリ流レ喉痺ノ鼻ヨリ流ルハ下ルヘキ  
道塞リ溢レテ出也懸癰ト云モノニ急證アリ會厭落ルト  
即死スルアリ癩毒ニテハ急死セス一人三子ヲ育ス長女  
嫁シテ子ヲ産ス携テ家ニ来ル途中ヨリ咽喉痛ス次日會厭  
ニ瘡ヲ發テ飲食ヲ妨ク醫藥ニツク寒熱甚シ痛不可忍又  
他醫ヲ引無驗氣力困篤スルヲ以テ予ヲ延ク脉沈微欲絶  
呼吸短氣又藥ヲ飲ム<sub>レ</sub>不能ヲ以テ幸ニ辞速ニ死ス其乳  
子又同病不乳<sub>セ</sub>シテ死ス其弟妹三人同病凡五七日中ニ四



人死ス百方不能救又一女人此證ヲ病次日行テ診セント  
スレハ忌中ノ札ヲカケタルヲアリ何ノ故ニ如此トラ不  
知泉街ノ一商人ノ娘駕ヲ娠リテ後暫クシテ心神不快ナ  
リ食味ナク卧床スルニモ非ス時アリテ嘔ス月經常ニ乏  
ク或隔月テ来ル今不来モノ二月ナリ咳シテ聲音シヒタ  
リ數醫ミナ以テ為勞後ニハ水飲鼻ヨリ出ス仰テ飲ハ能  
入ト云煎藥ヲ飲テ吐スルヲ數日ニ至テ予ニ乞脉微細緩  
腹候頗胎ヲ辨ス五三日前ヨリ飯ヲ食セズ餅子或ハ魚肉  
ヲ食スト云愈孕ナリ飲水鼻ヨリ出ルハ喉塞ルニ非ス即  
明所ニテ視レハ會厭甚長ク寸餘ニ及ヒタリ治スルヲ三

四日ニシテ兩脚隱痛節々皆痛余以為ク痛風ヲ發スト是  
惡阻中ニ兼子病也ト云ハ氏不信一醫ヲ延ニ非孕トテ益  
安ノ薰臍灸ヲ勸ム此夜陣疼頻ニ至テ隨胎シ終ニ斃ル是  
ハ至テ見惡キ證ニテ有ケリ鼻ヨリ出ルハ鼻病ニ非ト雖  
モ兼テ心得治セサレハ誤ルヲアラン數嘔シテ會厭ノ伸  
タルハ度々アリ又痘瘡ニ水滄ト云フアリ是ハ痘會厭へ  
發シテ水飲無形ノ物ノ通スルヲ不知故ニ氣道ヲフサカ  
ズウツカリトシテ居故ニムセルナリ津アルモノハ會厭  
エアタリ強キ故ニ痘ヲ隔テモ知ル故ニ氣道ヲフサク  
食道へ送り下ス故ニ滄スルヲナシ痘愈レハ肌サワリヨ

ク知ル、故ニ瘡スルヲナキナリ口中ハ別ニ單門アレハ  
其人ヲメ治セシムルヲ妙トスヘシサレ凡一通リハ知ラ  
子ハナラス總テ心火胃火ニ屬スト方書ニ論シタリ何ヤ  
マ口病ハ大便秘閉シテ内鬱ノ形ヲナス氣厥論云膀胱移  
熱於小腸馬腸不便為口糜トアリテ熱ニ屬ス病ナリ予嘗  
得口病奇書卷尾ニ享祿四年左大史小槻宿禰伊治ノ題跋  
此一巻丹波宗康朝臣令相傳畢云々口中第一ノ大病ト云  
ハ舌病ナリ世舌疽ト呼モノ醫書ニナキ名目ナリ然凡今  
海内ニ通用ス若出所アルヤ此病ハ死生ヲ以テ論ス輕キ  
トニ非ス舌疽ハ舌ノ縁通り一瘡ヲ生シ肉陷没シテ爪ニ

テ批取形ナリ段々ニ廣クナリ若ノ缺タル如ニ陷スルモ  
アリ其陷所アカクナリテ四邊紫赤ヲ帶タルハ何處マテ  
モ潰ユヘキ兆ナリ又其缺タル所ヨリ赤肉瘰肉ノ如ニ幾  
ツモ出ルヲ蓮花舌ト云難治ナリ又一所堅ク坐トリテ夫  
ヨリ潰ヘ初マルモアリ甚キハ血流レ出ルモアリ如此ハ  
ミナ食事ノシミテ痛ムヲナシ凡大小ノ瘡ニ不拘塩味噌  
ナトノシミサルハ大ニ可畏催ナリ病ノ深キハ頰下ノ絡  
中ニグリくと枝ヲ結フヲ大ク累ムトシテ幾ツモアリ何  
ノ絡ト定ハナシ是へ灸ヲ三五壯スレハ其所移テ又上下  
左右ノ間ニ結フ又灸シテ數日ヲ経テ解散スレハ本病治

スルコトアリ是ヲ名灸ト云テ業トスルモノアリ凡牙齒口  
舌ヲ不問ニ耳下ヨリ頰車ノ下人迎ノ邊ニ結核スルモノ  
ニ灸シテ奇驗アリ予ハ牙痛スル時ニ此核ヲ尋子按スレ  
ハ牙根ノ痛所ニ通スルヲ以テ夫ニ灸スルコト三五壯異驗  
アリ舌病ニモ用ユ一日ニテハ不治二日モ三日モ灸スヘ  
シ但シ結核他絡ニ移或上下ニ移ルコト有故ニ昨日ノ灸痕  
ヲ目當ニハナラス又舌ノ中面ニ發シテ崩レタモアレ凡  
先ハ舌根ヨリ發スルモノ多シ下疳瘡ノ陰頭ヨリ腐脱スル  
ト同形ナリ崑崙散可也尚足飲或ハ四物加升麻玄參石膏  
ナト見合ニ用ユヘシ舌端ニ發瘡シテ白ク坐トリテ灸痕

ノ形ニナリテ夫ヨリ疽ニナルモアリ先ハ塩氣ト熱湯ナ  
トノ染ルハ輕證ナリ唇内ニ灸痕形ヲ發スルハ至テ治シ  
易シ密佗僧乳香散驗アリ舌上細疱子ヲ發スルハ却テ日  
數ヲ經テモ治シカタキコトアリ亦前方ヨシ赤キコト如含朱  
ハ痛甚シ亦難治トセス黃栢効アリ口吻へ瘡ヲ發シテ開  
口大笑スルコトナラス或ハ白ク爛レタル如キハ治シ兼ル  
アリ終身不治モアリ芟函湯ナリ小兒ハ疳ニ屬ス俗ニ烏  
ノ灸シタルナリト云モノハ大人ハ腰部龜尾ノ灸ニテ治  
スルモアリ小兒ニハ猶脊腹共ニ灸スヘシ一種痔疾ナリ  
トテ肛門へ瘡ヲ生スルモノ俄ニ治シテ口中ニ發スルア

リ益以上ノ冬ニテヨシ又牙齒ノ尖リ舌ニ障リテ舌爛レ  
痛ムアリ其障ルハ牙ノ堅キモノニ破ラレ缺テカケタ  
ル所銳ニ尖リテ舌ニ當リテ痛ムナリ口瘡ト同シニ見ユ  
ルモノナリ是ハ火打石ヲ槌ニテクタク指ノ平ニ當テ牙  
ノ尖リタル所ヲ磨スヘシ又婦人妊者ニ口中爛ル、モノ  
ハ班龍散主之産後ニ發スルモノ癩ニナリテ每産ニ發ス  
熱物ヲ食スレハシミテ艱ムモノナリ甚シキハ絶食ニナ  
ル大便秘スルハ治シ易シ下利ヲ帶タルハ四十日或ハ百  
日ニ及テ治ス必難治トセス前ニ云會厭ニ發シタルハ粉  
劑ヲ用ヒ輕ニ治スアリ見合次第ナリ父母ノ遺毒ニ

テ發スル癩氣ニ係ルモノハ丹霞條主之又粉丸モ可也癩  
氣ナキモ運用スヘシ口内ハ多ハ癩ヨリ發スルモノ多シ  
油断スヘカラス齧齒ハ灸方諸奇方祝符多キモノナリ胡  
麻ノ油ヲ小陶器或ハ蜆殼ニ入テ火ニ上セ沸スル所へ崑  
崙散ヲ一點油中ニ下ス浮フ時ヲ不失楊枝ノ尖へ綿ヲク  
ルニ絹ヲ以テマトヒ梅ノツホミ位ニ製シ右ノ油ノ中ニ  
浮タル散ヲ付テ熱ニ乗シテ牙臼ニ掩ス立トコロニ治ス  
神驗此方元來昆布ノ塩ヲ用ユ夏日梅雨中ナトニハ塩消  
シテナシ故ニ崑崙散ヲ試ルニ同驗ナリ又手ノ合谷へ蒜  
ヲ摺テ點ス一時ハカリニテ洗去立所ニ治ス此蒜早夕可

洗去長夕置ハ肉爛テ灸痕ノ如シ人參ヲ嚙之又熊膽ヲ虫  
ノ蝕スル牙臼中ニ容レテ治ス又枚木脂モ可ナリ此他多  
クナレ氏崑崙散アレハ他ニ索ルニ不及又頸ノ結スルモ  
ノニ灸ス予近來筆硯ニ耽ルト必牙痛寒熱ス直ニ結核ヲ  
按シテ其上ニ灸ス立所ニ効アリ口問篇曰齒齲刺陽明不  
已刺其脉入齒中者立已此灸ト同意味暗合ス又灸巨骨三  
四壯治齲齒奇驗アリ牙縫出血ハ酒客ニアリ晝夜翻飛シ  
シテ一二升ニ及フモノアリ桃花散可ナリ足ノ三里ノ灸  
ナトヨシ齒衄トモ又齒縫湧血トモ云四物湯ニ加細辛服  
スヘシ牙根宣露或ハ血ヲ出シ膿氣アリテ指ニテ斷ヲ押

ハ牙根ヨリ膿出ツ齒痒ク口臭スルハ牙疳ナリ甚治難シ  
牙動テ寒中冷物ヲ食セバ寒氣骨ニ徹ス如此モノハ松木  
節燒テ炭トナシ塩ヲ少許加ヘ為散卧ニ臨テ牙根ニ塗ル  
安眠スレハ明旦漱シテ膿氣ヲ去ヘシ如此ト一年スレハ  
牙根シマリテ膿氣去走馬下疳ト云ハ乍ニト云意ニテ命  
ス牙根膿ヲ作腫張シテ痛之腐爛シ牙モヌケ落ケ一夜ヲ  
争フ甚キハ口吻トモニ脹テ絶飲ス其毒ナヲ進ンテ頰ヘ  
穴ノ明クアアリ穿腮ト呼フ可恐病ナリ小兒ナトハ乳ヲ  
吞時ニ乳頭ニ牙粘着シテイツノ間ニカ抜テ知ラサルモ  
見タリ大病ナリ痘麻ノ餘毒ヨリ發ス紫圓ヲ主藥トス尚

足飲三黃湯崑崙散ノ類ナリ口吻マテ脹タルハ牙齒如何ノ形ナルヤ不可見モノアリ小兒齒黒垢付缺テ不長後ニ牙根ハカリ斷中ニ有モノ治スルニ不及牙ノ替時ニ至リヨキ齒ヲ出ス

舌病ノ類連日不治シテ尚足三黃等ノ服藥無効時ハ四物加升麻玄參ヲ加テ用ヘシ

重舌ハ俗ニ小舌ト云テ舌下脹起シテ舌ヲ重子タル如シ出血ノ法アレ凡尚足飲ヲ用テ治ス木舌ト云ハ舌堅クナリテ言語澁リ中風ノ人ニ似タリ舌ノ兩邊ヲ刺シ出血セハ治スサテ咽痛諸藥無効ハ咽痛ニ非ス鼻ヨリ如髮血筋

無<sup>レ</sup>下<sup>テ</sup>黒泡ヲ生シ纓絡ノ如ク咽門ニカ、ツテ飲食入

カ子ル也杜仲午膝ヲ酢ニスリ鼻ニ吹ト予未見此證

喉痺ト云ハ咽喉腫痛シ水飲ヲ絶ス刺<sup>レ</sup>之<sup>テ</sup>去<sup>レ</sup>黒血<sup>ヲ</sup>則通ス

俄ニ腫ル、ヲ急喉風ト云偏<sup>カク</sup>ニヨリテ腫ル、ヲ單喉痺又

乳蛾ト云兩方腫ヲ雙乳蛾ト云其治方ハ血ヲ去レハ皆治

ス故ニ吹藥モ皆膽礬巴膏ノ類ニテ破リテ妙ナリタトヘ

ハ薄ク皮ヲカムリタルハ手足ニ出ル豆ノ如シ皮ヲ破レ

ハヒシケテ仕舞ナリ刀豆ヲ生食ルハ嘔スル張合吹切ノ

術ナリ又酢ハ咽腫ヲ消スルモノ故ニ杏ノ塩ニ漬タルヲ

含<sup>ム</sup>モ良半夏苦酒湯ノ意味ナリ又午房ヲ熱灰中へ入テ先

ヲソキテ切爰ニ真綿ヲカケテ喉中へ入テ嘔ヲ發スル時  
喉痺件ノ午房ノ夫へ突キカケテ皮破レ血出是ハ喉痺鎌  
トテ口中醫ノ行フ法ノ味ナリ纏喉風ハ似喉痺異ナリ纏  
喉風ハ四面共ニ腫ノ名ナリ尚足飲ヲ冷服スヘシ加桔梗  
トモアリ又驅風解毒湯ニ石膏桔梗ヲ加ヘ冷服ス鎖喉風  
ハ通用ヲ塞キタルノ名ナリ又喉風ト云モ同病ナリ咽喉  
ノ名多クニテ懸癰ト混シ易シ能見ワケヘシ皆少高ノ出  
血妙ナリ凡咽喉痛ニ少高ヲ刺シ出血シ有驗毒甚者不出  
深刺スヘシ合谷ニ針スヘシ如何シテ咽喉ニ通スルヤ經  
絡流注ノト必發スヘカラサルト可思

和田東郭曰風火ニ犯サレ咽痛ス咽腫テ藥湯不通モノア  
リ諸醫苦酒湯ヲ與ルニ無効飲食共ニ絶シ諸醫束手予驅  
風解毒湯石膏主劑ニシテ大ニ加ヘ煎ス冷服セシム咽痛  
止ニ飲食ス予カ秘事ナリ此方ニテ度々効ヲ取ルナリ又  
曰石膏ノ證アラハ不猶豫大劑トナシテ用ユヘシ不然則  
無効古方白虎湯竹葉石膏湯其外ノ方ニモ石膏ヲ倍スル  
トヲ見ルヘシ分量餘藥ニ倍ス甚尤ノ論ナリ  
一士人ノ婦一日急ニ積ヲ患飲食口ニ入ラス夜中予カ門  
人ヲ引脉平穩ナリ只一滴水咽喉ニ下レハ煩躁欲死腹滿  
ス仍藥食トモニ進ムヘカラス門人歸來テ予ニ方ヲ問フ

予モ其所言ヲ以テ考ルニ喉痺ニ非スヤト云ヘハ否也咽  
痛ハナシ是ヲ看守ノ人ニ問ニ昨日クサノ餅ヲ食シテ後  
發ス初メ一醫官治之却テハケシト云門人曰思フニ滯食  
ニ得タルナラントテ中正湯ヲ與ント云ニ任セテ藥ヲ与  
ヘシム次日ニ至リテ願クハ予ヲシテ診セシメントテ乞  
ト即其家ニ至リ問ヘハ前夜一醫官ノ藥ヲ飲ハ咽喉ニ下  
リカ子吐スルモ不出大ニ發汗シテ煩悶ス門人ノ藥ヲ飲  
ハ如斯ハ不甚カラ稍苦痛薄キニ似タリ夫モ只一滴ヲ以テ喉  
ヲ潤スノミ也ト湯水氏ニ与レハ心下逆滿ス故ニ苦痛ナ  
カラシメント只守テ居ト云診スルニ異状ナシ仍テ水ヲ

与エテ試ルニ下レ喉ト噎ハレルカ如ク噓スルカ如シ鼻孔へ出  
ルヤト問ハ嘗テ其事ナシ暫ク苦シテ漸ニクタルト見エ  
タリ當人ニ問ヘハ痛ハ無シ何カ咽中ニ在ル心地ヲ覺フ  
看病人ハ三四人集テ心下ヲ撫テ背ヲ按シテ共ニ汗ヲ流  
ス皆云フ心下へ逆上スル物アリト其噓スル勢ニテ腹氣  
引張ルナリ兎角喉中ノ病ナリト喉膈ヲミルニ又異ナシ  
殆ト處方ニ窮ス先半夏厚朴湯ヲ与ヘ小快ヲ得タリ更投  
三四日ヲ經テ本復ス一婦人四十餘歳同證ナリ是ハヤハ  
痛ヲ覺フ咽喉ヲ見レハ會厭ノビテ長其根ニ蝕シタル處  
アリ仍癰氣ナリト見テ問ヘハ下疳ハヤミタルトナシ妻



ニナル時ハ髮脱落シテ禿ノ如ク周身ニ何瘡カアリト云  
蓋シ夫ヘ之ヲ隱セシナリト五物解毒湯ヲ与ルニ咽セル  
ナラハ仰テ鼻ヘマワラヌヤウニ飲シムコトヲ教テ飲食凡  
ニ滞ナク飲コトヲ得テ數十日ヲ経テ治ス又中風ノ如斯ナ  
リタルハ舌根麻木シテ送下ノナラヌ也仰卧シテ食ヲ送  
ラシムヘシ

一婦人喉閉腫痛飲食ヲ絶ス一醫膽礬ヲ吹不應一醫清胃  
ノ属ヲ投ス凡七日ニ及テ不治予刺少高出血代鍼散ヲ吹  
桔梗湯ヲ与フ不治三黄ノ属無効人或ハ纏喉トナス予其  
策ニ窮シテ半夏苦酒湯ヲ与フ不應寒熱往来氣力頗衰夕

リ四隣集テ刀豆ヲ與フ杏子肉塩藏スルヲ投スルノ類日  
ニ多シ十二日ニシテ破レ紫血ニ口ヲ吐ス此ヨリ常ニ  
復ス

代針散

巴豆 三箇 枯礬 四錢 朱砂 少許

右二味内鍋燒之為末加朱砂少許其色令縞如包紅乃佳

桔梗湯 三黄湯 半夏苦酒湯傷寒論

東郭曰傷寒論ニアル煎法ハ所詮出来ヌナリ今此略法  
ヲ製ス半夏ノ末ヲ拵置毎ニ臨時酢茶碗ニ一ツ雞卵ヘ  
入テカキマセテ煎スルト硬クナル也然レ凡又醋ヲ入

テヨキ加減ニドロクトナルマテ酢ヲ幾度モ入テ飲シ  
ムルニ醋ノ香氣高メ口ハタヘヨセルトグツト鼻ニ酢  
氣カイル故鼻ヲツマミテ吞ヘシ

驅風解毒湯

涼膈散

四物加升麻玄蔘又加細

辛

木咸湯 方彙

方藏尚足飲

乳香散

翠鳳散

灸

巨骨三五壯治齩齒

頸項部絡張結核スル所咽喉齒舌一切主之

一切喉病刺少高血出則良毒深者血不出<sub>留</sub>再刺<sub>谷</sub>

喉風初起足ノ大指ヲカ、メ第一節ノ横紋ノ盡處内  
外ニ灸ス二十壯痛ナクハ覺ノ出ル程數ヲカキラス  
灸スヘシ

醫事小言卷之四畢

醫事小言卷之四

八十

叢桂亭藏

卷之八  
秋三月二十七日...  
舟楫...  
大...  
...

