



叢桂亭醫事小言卷之五目錄

婦人

兒孕
枕胎痛

辨胎

子惡
阻

瘵胎
水

瘵轉
胞

產血
暈後諸病

赤白帶下

小兒

驚口
疔病

無臍
風暴熱口

尿夜
啼床

痢臍
中出血

疳

驚風

馬脾風

丹毒



叢桂亭醫事小言卷之五

南陽原先生口授

門人

備中 多賀 苗 筆記

常西 大島 員 校正

婦人

孕胎 兒枕痛

辨胎

惡阻 子痛

胎水 癢癢

轉胞 瘕

血暈 產後

諸病

婦人ノ病男子ト異ナル所ハナケレモ月經ノ多寡ト順閉
ニテ病ヲナスヲ男子ノ無所ナレハ是ヲ問法第一ニスル
又孌胎ノヲハ病ニ非スト雖種口ノ變ヲ生スルニ至テハ
病也知スンハアルヘカラス病源候論ニ婦人三十六疾ノ
名ヲ出セリ又十二疾トモ有ナントスルニ臆シテ男子ト

ハ大ニ異ナリトスヘカラス婦人ノ病ハ經行ノ不足ナル
ニヨリテ瘀血トナリテ病モノ十ノ八九ニテ實ニ屬スル
モノ多ニ居ス手足攣急腰脊疼腹中癥瘕ノ類是ハ積聚ノ
理ヲ飲込メハ格別ノ不審ナシ男子ニ比スレハ治シヤス
キヲ有破血ノ藥ヲ用テ宿疾平愈スルヲ多三十六疾ナト
云ハ例ノ唐人ノ文華ナレハ男子ノ無處三十六疾ト思フ
ヘカラス何故ニ如斯言ナレハ千金方ノ白聖圓ニ曰治三
十六疾又白石脂圓モ同主治也三十六疾ニハ三十六方ヲ
配劑シテ治スルナラハ一一ニ證候ヲ詳ニシテ其看法ヲ
誤ラサルヲ第一トスヘキニ三十六疾ヲ一方ニテ治スル

ヲナレハ何ソ名目ヲ多端ニスルニ及ニ龍骨圓ニ治帶下
十二疾牡蒙圓治產後十二癥ナトニ至リテモ皆一方ニテ
十二ノ病ヲ治ト云ヲ見テ目錄ハカリナルヲハ知ルヘシ
然トモ古ヨリ三十六疾ノ名稱ヲ說出シ又婦人ニハ癥ト
云モ有ウヘハ之ヲ知ラサルハ文盲ト云モノナレハ今ハ
不知ニハスマヌ也病源論ノ五傷三癩ハ千金ニ出タルト
ハ違タル也見合スヘシ夫血虛ニテ煩フモノハ十中ノ二
三ナルモノニテ婦人ニカキラス萬病共ニ實ニ屬スルモ
ノ多シト知ルヘシ男子ニ異ナル怪症ハ皆瘀血ニ係テ瘵
スヘシ只胎孕ト經閉トノ見分第一也脊骨左右ヲ按テ大

絡アリテ十四推ノ邊ニテ左右ヨリ打違ニナリテ其末ハ
子宮ノ左右ノ耳ニ達ス經行ハ其大絡ノ中ヨリ漸ニメ
クリ来テ子宮ニ入ト見ユサテ子宮ニ左右ノ耳アルモノ
ハ陰囊ノ類ナルヘシ其耳ヲ割テ見ルニ内ニ通ル孔竅モ
無シ猶膀胱ニ小便ノタマルト同意味ニテ有ラン經行不
足或ハ閉スル婦人ノ腰脊ヲ痛ムハ此大絡ニ瘀血結滯ス
ル故ニテ委中ヨリ出血シテ此絡ユルミ痛ノ除フ有ノ味
考知ルヘシ婦人經行月ニ期ヲ不失日ヲ定テ歛マルモノ
壯健ノ人也經ノ来ラントスル前日ヨリ腹痛シ或寒熱ヲ
發スルモ有是ヲ俗ニ次虫ト云即九痛ノ一二テ經来即腹

中痛ト云モノ也多ハ胎孕ナリカヌル治方ハ破血ノ劑ナ
レ凡驗ナキモノニハ地黄丸ヲ用テ宜ク有其人ノ虚实ニ
ヨル月水ノ来ラントシテ痛時ニ甲字湯ヲ用ヒ經終レハ
止テ又来月ノ經行ニ用ユ數月如此ニノ連服シテ止ム
有又捨テ置テモ年ヲ經止モ有折衝飲甲字湯温經湯ヲ運
用スヘシ又壯年ノ人ハ偶ニ胎ヲ受ルク有夫ヨリ次虫ノ
ヤムモ有胎孕ハ天理自然ノ道ニテ病ニ非總テ天性ノ道
ヲ以スルヲ上策トシ人事ヲ以スルモノハ却テ害ニナル
ク有ヘシ胎ヲ受ルト經水ノ行カントスルモノ出ルクナ
ラヌヲ以テ心中憤ニトシテ飲食ヲウトニ或嘈雜吞酸シ

或ハ吐唾シテ身體解怠シ或ハ每食皆吐シ香臭トモニ忌
今マテ嫌ノ物ヲ嗜又ハ今マテ好物ヲ忌ミ多酸醎菓實ヲ
好ミ元氣不爽是ヲ惡阻ト云病源論ニ惡食又曰惡字ト見
ユレトモ後世此名ヲ不唱受胎ト二月ハカリニテ之ヲ病
ム三月目ノ經水ノメクラントシテメクルト能サレハ此
時マスマス甚シ四月目ニハソロソロ止ムモノ通例也先
人清連君ノ仕覺ニテ是ニハ増損白朮散加烏梅ヨシ之ニ
マキレル病ハ蟲積也ヨクヨク看法ヲコラスヘシ又蟲ノ
多キ人ハ惡阻ヲ強ク病モノ也藥水共ニ受ルトヲ得ス甚
ハ絶粒ニテ骨立スルニ至レ凡胃脉タシカニテ食付ト有

モノ也サテ藥ヲ受カヌルハ小半夏加茯苓湯ヲ用ユヘシ
夫モウケヌハ伏龍肝一錢ヲ器ニ入テ水ニ盃ヲ以カキ立
甘爛水ヲ作ル法ノ如シテ十分ニ水ノ濁リタル時ニ静處
ニ暫置ケハ澄テモトノ清水ニナルヲ静ニ傾ケテ一盃半
ヲ取殘ノ半盃ト沈タル伏龍肝ハ捨テ不用土漿水ニ似タ
リ故ニ山脇家ニテハ是ヲ漿水ト呼テ用ユルナリ此水ヲ
以テ小半夏加茯苓湯ヲ煎服スレハ受ヌトナレサテ是ハ
惡阻ノ嘔吐ノミニ非諸病ノ嘔逆藥水口ニ入レハ即吐ス
五苓散ノ水逆ト云処ニテ五苓散ヲ用ユルニ飲得スコマ
ルニ前法ヲ用ユレハ毎ニ諸醫ノモテ餘シタル處ニテ奇

驗ヲウル也傷寒ノ嘔逆ニモ用ユ諸熱嘔逆シテ水藥ヲウ
ケサルニハ諸藥ヲ止テ天靈蓋二錢牡蠣一錢半葛粉一錢
右為散方寸匕水服ス奇効アリ惡阻ヲヤムノ趣ヲ替ルニ
後月ノ經水行ラントスル時ニ胎ヲ受タルト一身中エ觸
流ノ迴文行ト、カヌ故ニ來月分ノ經水ハ段ニメクラ
ントスルニメクルトナラヌ故ニ惡阻ノ騷キハ始マル也
ツコテ其次ノ月ニハ觸ノト、ク故ニメクラヌ筈ニ定リ
タル時ニ惡阻ノ證ハ止也是ヲ定法トスレ凡人ニヨリテ
四五月ニテモ止ヌモ有是ハ其人ノ不塩梅ノ所アリテ觸流
ノ迴文ト、キカヌル氣味也醫書ニ脾胃虛弱ト論シ又胃

中停痰アルナト、論スルハ面白カラヌ又一向ニ惡阻ノ
患無時モ有是ハ早ク妊者ノ觸ノト、キタルニテ必脾胃
停痰ノ事ニアツカラス惡阻ノ強クヤミカヌルニ子玄子
ハ房事ヲ行セテ止ト有ト教ラレタリキ又八九ヶ月ニ至
テ此証ヲ發スルハ凶候ナリ是ハ妊者ニハナリタレ凡持
前血氣不順ノ人ニテ八九ヶ月ニ至リテ經行メクラント
スルナリト見ユ故ニ胎ヲ育スルノカモ乏クテ腹勢ナク
皮肉薄クテ胎モ皮ノ下ニテ堅クゴリゴリト手ニ應スル
モノナリ津液ノナキニテ甚危キ症ナルモノ多シ油斷ス
ヘカラス惡阻輕重ハ敢テ婦人ノ虛實ニモ限ラヌ也常ニ

好ナル煙草ヲ嫌又常ニ嫌ナル酒ヲ好ムハ其子成長ノ後
ニ上戸ニナリ煙草ノ嫌ニナル大抵違ナシ一奇事也是ヲ
以テミレハ胎教ト云フハ有ヘキ事ナレ其婦人ノ性ニ
ヨリテ讀書ナトヲ惡ムヲ是非ニ習ハセテハ氣血順行ノ
害ニモナルヘキカ絃歌俳優日夜ヲ不辨ナトハ何ホト氣
血順流スルトモ大ニ胎教ノ道ヲ失ス况ヤ夫妻互目憤怒
スルノ類ハ思慮セスレハ有ヘカラス

胎ヲ受タラハ房事ヲ禁スヘシ極テ安産也横産血熱發暈
ハ多ハ多房ニ根サス人ノ鳥獸ニ劣ルハ此慾情ナリ一度
暈スレハ乳汁乏又重テノ産ニモ癖ニナルモノ也又八九

月ニ至ル時二日に朱明丸ヲ服シテ大便ヲ通シ置ケハ血
暈血熱ヲ防クヘシ時ニ腰湯行水ヲ禁スヘシ賤婦ハ是等
ノ事無キ故ニ易産多キヤ
辨胎ノ法ハ婦人ヲ仰卧セシメ輕ク手ヲ以テ腹ヲ候フニ
上中脘平ニテ臍邊ヨリ下自然ニ高メニテ妊者ノ經月形
ノ兆ヲナスモノナリ胎ハ手ニ應セストモ孕候爰ニ現ス
三月目ニハ臍下ニ大栗ホトノ物有指ノ下ニ凝ルカト思
フ様ニ見ユ總テ手指ヲ輕ク靜ニ候フヘシ強ク按スレハ
沈ミ散テ隱ルモノナリ又今日夕シカニ見ヘテモ明日
ハ見ヘ又事有手サハリト又婦人ノ意致動作ニモヨルヘ

シ又腹ノ全體ヲ候テ腹勢ニ滯ルヲ無又經水モ月ニ閉ル
ヲナク順行スル女ノ一月經ノ来ラヌハ件ノ粟ホトノ物
見ヘス氏妊娠ナルモノ也然トイヘ氏胎ノ手ニ應セヌハ
明言シカタシ經閉スルハ病ナレハ腹ニ言分ノ無キヲハ
ナキ理ナリ爰ヲ以テ候ヘハ見ハツス事ナシ若疑シキ
有ラハ十日ヲ隔テ候ヘハ十日ハ大フリニナル又モ疑シ
キハ又十日ヲ隔テ候テ決スヘシサテ病ニテモ臍下ニ如
此モノ有コト有四五ノ胎ハ瓜位ニナル是モ病ナルヤ
胎ナルヤヲ見カヌルナラハ其胎ト思フモノヲ少シ強
ク按スレハ癥塊ナレハ痛ヲ覺フ胎ナレハ指下ニカヲ用

ユル氏少シモ痛ムヲ無シ是ニテ辨胎スヘシ乳房ニテ見
分眼中ニテ知ル法ハ産論及翼ニ詳ナリ猶委クハ賀川家
ニ隨身シテ學フヘシ雙胎ハ六七月ニ至レハ任脉通りニ
一道ヤハラカニテ左右ノ胎ノ堺有常ノ姓者ヨリ腹モ大
ク横ニ廣シ八月九月ニ至レハ著坐シカ子ルアリ胎ノ長
スルニ随テ真中一條ノヤハラカナ所引張テ知カタク常
ノ腹ヨリヒラタク見ユルモノ也後ヨリ見レハ左右ニ腹
フクレ見ユルナリ
婦人癥塊ノアルハ胎ヲ壓ス故ニ兒胎ノ長スルニ及テ之
カ為ニ推シ出サレ故ニ六七月ニ至レハ孕ム毎ニ流産ス

ルアリ之ヲ腹帶ノユルキ故也トシ又ハ足ヲ伸シ放ニ卧
スル故也トシテ帶ヲ強クシメ足ニ壁ヲ踏セ體ヲ縮メテ
卧シムル故ニ益腹内狭クテイヨイヨ癥塊ニ壓サル故ニ
是非墮胎スル也醫藥ニ就ケハ虛性故ニ胎ヲ護スルヲ不
能也トテ補血ノ藥ヲ服スルハ癥塊ヲ培養スルニ齊ク俗
人保藥ト云ヘハ結構ナル物ト思ヒ醫ノ佞言ヲ信シテ不
晤悲哉月經不來ヲ二三三月ニテハ時ニヨリ孕ナルヤ否ヲ
不知ハ一七ノ藥ヲ投スルヲ不能補瀉懸隔ノ相違ナリ古
人脈ニテ知事ヲ説ケトモ予不敏ニシテ脈ニテ知ルヲ不
能故ニ辨胎ノ法ヲ以テス夫胎ヲ受ルヲハ經行畢リテ子

宮一點ノ穢瘀無時ニ孕ム產論ニ經畢テ十日ノ内ニ胎ヲ
受ルト云ヘリ十日ヲ過テハ後ノ月ノ經水ワロツ口子宮
溜ル故也婦人崩血シタル後ニ胎ヲ受ルヲ必有事ニテ是
モ宮中ノ掃除シタル處ニテ清淨ナレハ也故ニ婦人經行
ニ定期ナク或ハ日數ノ外ニモ下リ或ハ來レテ不多或ハ
一二月不來ナトスルハ不順ニテ其身中ニ乾血有テ不榮
シテ上衝下冷背腹痛ニ快日ナク又壯盛ニ見ヘテモ經行
乏少又ハ少腹ニ塊ノ有婦人ハ生涯孕スルヲナラヌ者也
孕ハ經行ノ順流ニ在是ハ常法ナレテ經水滯ナク其人壯
實ニテ不孕ハ子宮ノ口ノ弘キト狭キニヨル又傾テ後ニ

向フモアリ男精口内一射フ不能ハ皆不孕其人虚弱嬌軟
ニテモ多産ナルハ其口ノ廣キナリ是ハ新奇ノ一話ナリ
一種俗ニ木女ト云有又石女トモウマズ女云即暗經ナリ
經水常ニ不行受胎ノ時ニ下ル下レハイツモ娠ス是ヲ壞
血ト呼多病ナルヤト思ヘハ至テ壯健ナルモノ也本草綱
目曰女人之經一月一行其常也或先或後或通或塞其病也
復有變常而古人並未言及者不可不知有行期只吐血衄血
或眼耳出血者是謂逆行有三月一行者是謂居經俗名按季
有一年一行是謂避年有一生不行而受胎者是謂暗經有受
胎之後月ニ行經而產子者是謂盛胎俗名垢胎有受胎數月

血忽大下テ而胎不墮者是謂漏胎此雖以氣血有餘不足言而
亦異于常矣女子二七天癸至七七天癸絕其常也有女年十
二十三而產子如褚記室所載平江蘓達卿女十二受孕者有
婦年五十六而產子如遼史所載巫普妻六十余生二男一
女者此又異常之尤者也學醫者之于此類恐亦宜留心焉頃
府中商人ノ妻患下血多日ニシテ治ヲモトム服藥數十日
ヲ經テ無驗理中湯ヲ用テ愈是ハ痔疾下血諸藥無効モノ
ニ用テ奇驗アリ是ヨリ月信不來月ニ下血スルヲ四五日
ニテ収ルト云處女寡婦ニモ姦淫シテ孕スルモノ有レハ
病人ヲ見テ病根ヲ見ルヲ忽ニスヘカラス凡病人ニ對

スルニハ無心ニテ影ノ鏡ニ映スルカ如クスヘシ心中一
物ノ客氣アレハ必誤ル一富農ノ女十二歳ナリ疝ヲ患フ
灸藥手ヲ盡スニ毎食必惡心或吐逆吞酸シ羸瘦骨立ス日
日灸スル故ニ腹ニ手ノツケルヲモナラヌホト也數十里
ヲ隔テ予ニ乞其病状ヲ説ウチニ勝手ニテ煮ル味噌汁ノ
臭モ惡ムヲ有ト云風ト耳ニ留タレ凡未見病人故ニ只聞
ナラヘタルノミ病者ハ房ニ平卧ス起坐スルヲ不能ト云
脉平穩ニテ胃ノ氣タシカ也腹候スルニ臍下四月ノ胎ト
思フ其女ハ十二歳ニモ少シ小フリ也又疑フカ、ル大家
素封ニ比ス漫ニ姦人ノアルヘキニ非然凡病ニアラ子ハ

告ズンハアルヘカラス如何セント心配シタレ凡外ニ致
カタナク折柄半白老人番頭ラシキ人燭ノ心ヲ切ルヲ招
キ人ヲ避テ竊ニ孕ナルヲ告此人モ大ニ驚キ其主人ニ
報スレハ主人大ニ喜テ曰老来ニテ只此一女ヲ育ス仍幼
甥ヲ贅トシ家ヲ嗣セント欲シテ二年前ニ引取畢ニ又日
夜手習遊戯真ノ兄弟ノ如ク卧起ヲ共ニセリ果テ是孕ナ
ルハ天賜也幸ニ恩惠ヲ以テ孕愈セハ即日婚禮シテ親屬ヲ
觴セント其妻ヲ呼番頭ヲ召テ其歡フヲ既ニ孫ノ生シタ
ル如シ予カ前刻ノ心配イタツラニナリケリ増損白朮散
ヲ與テ嘔吐止ミ二十日許ニテ床上ニ坐起ス惜ラクハハ

九月ニテ死胎ヲ下ス産論ニハ歳ノ女孕スルヲ記ス予
カ知所ノ女九歳ニテ孕ス皆是悪少年ノ所為ニテ近コ口
七歳ニテ産スルヲ聞從來怪キニアラス
妊者七八月ニ至テ脚ノ攣痛スルヲ有ハ兒胎右ニ偏シテ
脚へ引ツル故必右脚ニ限ル整胎ノ術ヲ以テ治スへシ其
儘ニ置ケハ横産ニナル也此意味ヲ以テ横産ハ兒ノ左ノ
手ヲ出スヲ定式トスル也横産ノ治療ハ至テ六ヶ敷シ逆
産ト云モノハ名称ハ大病ニ聞ユレ凡是ハ天然ニ胎ヲウ
ケタル処ニテ人カヲ以テ順産ニスヘキヲ不能サレ凡是
ハ母子無事ナルモノニテ坐婆ノ下手ナルハ胎死スルヲ

有陰肉ニテ口鼻ヲ塞ク故也至テ手廻ノ入ヲ也順産ハ頭
ヨリ出ル故口鼻ヲ塞クヲ無シ逆産ハ手廻遅ケレハ手ニ
テツカヘ夫ヲハツセハ領ニテツカヘスル内ニ呼吸ヲ閉
テ死スル也可悲事也是ヲ以賀川家ニ隨身シテ學フヘシ
トハ云ナリ逆産ハ陣痛ツヨク其聲ヲ聞テ戶外ニテ察シ
知ルヲ子玄子ノ治驗ニ記スル通也辨胎ニテ兼テ之ヲ知
ルへシ其候法ハ横骨ノ上ニ兒頭ナキ故ニ知ル胎ハ倒ニ
居モノハ産論ノ主意第一ニテ又紅毛ノ圖ニモ合ス子カ
へリト云ハ妄談也始ヨリ順産ハ倒ニヤトリ逆産ハ兒頭
上ニムキテ居ル也夫故ニ臨産ニ至リテモ小便通スル也

臨産ニテ手間取ルヤ出産ニ近キヤヲ知ニハ潮汐ヲ以テ
スレモアテニナラス臨産ノ期ヲ明知スルハ探宮ノ術ニ
過タルモノハ有ラスト雖産醫ニアラサレハ之ヲ行フヘ
カラス仍坐婆ニ問ニ元來産科ノ道ニ暗キ人ハ問ヘキス
ヘヲ知ラス故ニ遠キヤ近キヤ計ルヲ能ハス知レタ顔レ
テ押付ノ今夜中ナト、イヘトモ實ハアテナレニ出来合
ヲ云モノ也爰ヲ以テ賀川家ニ親多セサレハナラヌトハ
云也看法ヲ知ラヌ醫ハ脉ニス、之有故推付ナラヌト
ト云ノ外ナレ脉ニ離經ト云フ難經ニ出テ産論ニ論セル
フ詳也子玄子ノ語ラル、ニ真ノ離經ト思フハ甚稀ニテ

半離經ト思フハ常ニ多シ一婦臨産スルニ頻ニ子玄子ヲ
カニシテ手ヲ握ル故ニ脉ヲ診スルニモアラ子トモ寸口
ヲ握リ居ルニ陣痛俄ニ絶脉ス怪ト思フニ指頭ニテ脉ウ
チタリ是ハト驚ク間ニ出産スルト脉ハ出テ初二復セリ
誠ニ分娩ワツカノ間ニ絶ス是ヲ離經トハ云ナラヌ又絶
スルホトニナクテ指ヘ走ルハ常也ト教ラル故ニ予ハ出
産スルヤ否ノ脉ハ寸口ヲ診スル時ニ大拇指頭ヲ候ニ極
テ脉甚シク動ス是ヲ出産ノ催ト極ム左無ハ假痛トスサ
テ陣痛ニテモ其遲速ハ知レルモノナレハ常ニ心ヲ用ユ
ヘシ指頭ニテ脉ノウツハ上衝スル人ニハ男女トモニア

ルモノ也サレ凡臨産ニセマリタル時ノ脉ハ常ヨリモ強ク動スル也出産ニ近キハ小便通セス是ハ兒頭セマル故也死胎ヲ候スルハ豆ノ煮汁ノ如キヲ下ス胎内冷ルカ不動ヤ又陣痛俄ニ止テ忘タル如クニナルノ類ニテ悉ク産論ニ詳也サレ凡睡腰ト云ハ死胎トハ異也是ハ度ニ有事也一醫來問テ云妊婦無事常ノ如シ少モ煩シキ処ナシハ月ニ至テ自云鼻ニ臭氣有飲食皆臭シニ便モ同臭有ト竟フ時ニ盛夏故ニ日ニ浴スルニ體モ亦其臭ヲナスト云故ニ鼻癰腦漏ノ漸カト診スルニ其候ナシト予其對ヲ知ラス九月ニ至テ呼吸煙艸モ臭氣甚ク食ヲ減シタリトテ復

來問フ其婦貴室ナルヲ以テ予ヲ引テ診セシムルヲ能ハス因テ問フ胎冷ルヤ如何又不動ヤヲ診シタルヤ醫曰衣ヲ隔テ候スル故ニ詳ニスヘカラスト予曰何ツ是ヲ有司ニ報シテ診セサルト教ユ後ニキケハ滿月ニテ死胎腐爛シタルヲ下スニ常ニ患タルト同臭也ト云

妊娠中ノ水腫ハ三因方ニ婦人宿有風寒冷濕。妊娠喜脚腫。俗呼為皺脚。亦有通身腫滿。心腹急脹。名曰胎水。又証治準繩曰。妊娠兩脚浮腫。名曰脆脚。又引產乳集論。妊娠自三月成胎之後。兩足自脚面漸腫。腿膝以來行步艱辛。以至喘悶。飲食不美。似水氣狀。至於脚指間有黃水出者。謂之子氣直至分娩方

消ト常ノ水腫ノ治法ニテ宜シ只兒頭橫骨ニセマリテ尿道ヲ壓ス故ニ快利セステ腫ルモノ十ノ七八也夏月ハ八月目位ヨリ腫ル多シ胎成長スル故也又四五月ニモ腫ル者有是ハ皆整胎術ヲ以テスレハ臍下ニスキ出来スル故ニ小便通シテ腫消スル也此術ヲ知ラサルモノ又ハ他醫ノ治療ニテ鎮帶ヲ強クシテ頻ニ胎ヲ下腹ヘ推下シ其上ニ足ヲ縮メテ夜卧セシメ或ハ腰湯ヲ時ニシタル乃子婦ナラハ悉ク之ヲ禁シ腹ヲ寬暢セシムレハ通スルモノ也輕ク利水ノ藥四苓散葦ヲ用ユヘシ又朱明丸ヲ用テ出產ヲ俟ヘシ産後ニ至リテ水氣アラハ巫神湯主之又左ヲ

下ニスレハ左ヘ右ヲ下ニスレハ右ヘ腫ノ移ルハ禹功湯ニテヨシ又脚氣ヲ帶ルモ有治療ハ常ノ通ナレト産後ノ腫ニハ琥珀湯第一ニ主之ハ反鼻ノ力彼ノ瘀血一カ、ル味ヲ考テ知ルヘシ又水氣腹部ニ滿タルハ桃花散ノ類ニテ下スフモ有常ノ水腫ト同前ナリ然レト一旦ハ下サレテ腫消スレト又不日ニ滿スルモノ多キ故ニ先ハ通利ヲ以テ消スルノ治ヲ求ムヘシ氣急衝心ノ勢ヲナス故ニヨリトコロナク下スフナリ又下利數日ノ後ニテ腫ルハ方彙ニ出タル實脾飲ナリ凡水腫ハ藥水トモニ多キヲ忌故ニ粉藥ニテ治スルモノ大ニ徳ナリ産後水腫諸藥無効氣

息迫スルニ仙受散ヲ用ユヘシ又一身洪腫スルニハ治水散モ用ユヘシ又瘀血ニ係ルモノハ甲字湯加附子奇驗アリ時ニ効ヲトルナリサテ此氣息ノ迫スルニハ脚氣腫滿ヲ産後或ハ産前ヨリ患ルヲ有是ハ常人ノ脚氣ノ治ニテヨシ赤癩ヲ發スルヲ有リ氣血凝滯シテ腫ル、筋ノ脚氣多ケレハ九味擯榔湯ノ効アルモノナリ脚氣門ニテ治ヲ盡スヘシ水腫モ常ノ治法ニテ只瘀血ニカ、ルヲ舍テ治スルヲアレトモ常ノ水腫ニテ考合セヘシ産後小便閉ハ轉胞也ハ洩閉術ニテ立處ニ通ス是賀川家ニ學サレハナラヌ處也又子宮ノ口産ニ困シテ腫ルヤ

又ハ子宮下垂シテ便道ニ塞リ不利スルモ治法ハ轉胞ニ同シ又塞ルトナク終ニ水腫ヲナス有是ハ小便ノ通心如何ト云フ問極テ通スル半ニテ止ムノ氣アルヤ又ハ通シハタテハ快利スレトウカシテ通セ又時有力内ヨリ推出スヤウナ心持アルヤ又居スニ并ニテ能通スル時モ有力或ハ不斷小便心有ヤ或ハ痛ムノ類ハ子宮ノ延タルニテ便道ニサハル也夫ヲ産椅ニ着坐シテ脚ヲ伸タル故ニ腫タリトテ頻ニ正坐セシメ或ハ帶ヲ強クシメナトスルヲ愚醫俗人ノ定或ナリ平人モ長坐スレハ足腫ル、ヲ有ニテモ考ヘミルヘシ夫ヲイヤカ上ニ正坐セシムレハ子

宮ハ益サカリ帶ヲ強クシムレハ腹勢下ニ脹ル故是モ子
宮ハ下リ勝手也偏ニ水滴ノ口ヲ閉テ水ヲ出サシテ欲
スルニ似タリ其効ナキハツノ理也又兼テ痔疾ノアル婦
人ハ其勢人門ニ及ヒ子宮ノ口シマリワコ子タル処ニ附
込テ痔氣ヲ帶テ餘計ニ腫ルコトアリ是ニテ不利スルハ乙
字湯ヲ用ユヘシ

産後ノ血暈ハ虚實ノ二種有テ實ナルハ死症ニ非ス必生
ク其看法ハ顔ヲシカメ齒ヲ嚙頭ヲカツカツト云ナカラ
仰ケニツリ反リ手モ握リナントシテ萬事ニ陽證ヲ見ス
也必騒キ驚クヘカラス世上酸ヲ焼テ嗅セ或ハ其名ヲ呼

髪ヲ握リテ弦急ナラシメ血ノ藥血ノ蒸トフリ出シナト
ヲ進メ暫静ニナリテ後又ハ再發ス房中ニ爪モ立ヌホト
人込ニナリ神符ヲ移シテ飲セルヤラ散藥ヲ用ルヤラス
レハ胃中ニ停飲スル故惡心ヲ發シ吐ス吐セハ却テ是快
ニ至ルヲ知ラス是ヲ止ルトテ加減ノ藥ヲ頓服シテ益吐
スルコトハ時ニ見ル処也是決シテ死證ニアラス禁暈術ヲ
行ヒ右側卧セシムレハ再發セス此術ヲ知ラスニハ心下
へ小腹ヨリズキズキト升ル動氣ヲ能押テ中位ノ枕ニシ
テ横ニ右ヲ下ニシテ卧シムヘシ脚ハ伸テ上ナル左足ヲ
下ノ足ノ前へ打越セテ陰戸ノシマルヤウニスルノミ是

瘀血ノ血暈ト云者法ヲ知ラ又故ニ騷ク也但胞衣未下シ
テ發暈スルハ惡証ニテ肥立ニナルマテニハ死ス偶ニハ
救フコト有レ凡凶候トス其病人ヲ遠ク望テモ虛實ノ二
証ハ知レルモノ也脉ハ沈伏セサルモノ也方ハ三黃湯抽
刀散ヲ服スヘシ水服シテモヨシ其跡ハ巫神湯ニモ折衝
飲ニモスルナリ惡露ノ多少ニヨルナリ産後ニ水ヲ禁ス
ルコト古ノ習也必ス左ニ非ス賀川家ニテハ胞衣ヲ下サヌ
間ニ水ニテ抽刀散ヲ飲セ或ハ煙草ナトモ吸セテ而後ニ
胞衣ヲ下ス也サテ又一種胞衣下ラサルモノ有是ハ至テ
取惡シ鉤胞衣ニテ取ヘシイヨイヨ不下トモ婦人エヨク

飲込セテ安心サスレハ夏ハ五七日寒氣ノ時ハ廿日許ニ
ハ腐爛シ切ロニナリテ下ルモノナレ凡産婦是ヲ苦勞シ
氣ニカケテ血暈ヲ發スル故教諭安心セシムルコト第一也
折衝飲ノ所主平常ノ産婦ハ小便通利スレハ血熱ハ醒ル
ナレハ惡露ノ下リヤマントスル寸ハ巫神湯ニスヘシ胞
衣ノ下ラヌワケハ出産スルヤ手廻シ早ク腹帯ヲ強クシ
メル故ニ胞衣帶ノ上ニナリ下ヘ引トモ下ラス又手ニテ
強ク按シテモ下リカヌルモノナリ彼是ト手間取ウチニ
子宮口ヲ閉レハマスマス下リカヌル也産シタル當座ニ
腹ヲ輕ク撫テ見レハ胞衣中腕ノ邊ニムツクリト手ニア

タルモノナリ夫ヲ輕ニ指頭ニテ少腹へ撫ナカラ胞帯
ヲ引ケハ臍下マテサガル時ニ少ノ間乳婦ニ氣ヲヤスニ
セテ血ノ藥ナトヲ飲セイツニテモ取度時ニトレル様ニ
シテ置故一引ニテ下ル也子宮ノ口ヲシメル後ハイカニ
引トモ下ラヌモノニテ強ク引トキハ胞帯ヲ引切故ニマ
スマス手段ヲ失フ第一ニ是ヲ心得テ引ヘカラス鉤胞ノ
術ナケレハ取カタシ賀川家ニ學フベシトハ此所ノ事也
産後直ニ發暈スルハ乳汁ニサワラヌモノ多シ二三發ス
ルハ乳汁必通セス又二三四日ヲ經テ血暈スルハ甚仕惡
シ必乳汁不通血熱モ日數ヲ經サレハ肥立ヌモノ也

脱血ノ血暈ハ齒ヲ嚙スシテ口ヲ明キ頭ヲ俯シスル
ト引込レル如ク手ノ痿タルカ如シ脉沈伏シテ或ハ手足
厥冷是ハ陰証ニテ必死也コノ看法ヲ知ラヌ故ニ瘀血ノ
血暈ニモ醫俗共ニ騒ク也妄言自汗ナトヲ加フルハ實ニ
マキレヤスシ醫ヲ迎ル間モ無キ急証アリ
産後ノアト腹トテ痛ムヲ兒枕痛ト云皆瘀血ニ属ス甲字
湯折衝飲也然シ此類ヲ用ユレハ用ユルホト却テ痛甚シ
キハ巫神湯奇効アリ
産後ニ風ヲ引寒熱咳嗽スルモノ必輕ニシクスヘカラス
常病ノ發散ニテヨシ葛根湯桂枝麻黄各半湯ナト用ユル

処多シ大小青龍ナト勿論ナレ凡少シ麻黄ヲ遠慮スル氣
味アルヘシ邪氣ノ薄キハ桂枝湯或ハ桂枝加葛根ニテ取
アツカウ然レ凡疫ニナラント云邪氣ニハ如此柔カニ療
治シテハ大病ニ仕立ル必ス本病ヲ見テ産後ヲ見ルヘカ
ラス是ヲ以巧拙ワカレ死生爰ニ係レリサテ外邪ニ血熱
ヲ合セ自汗盗汗食味ヲ失シ脉細數ニ至レハ蓐勞ト云ニ
ナリテ難治也再三風ヲ引返シテ爰ニ至ルヲアリ又血熱
ニ蓐勞ノ形ヲナス事アリ脉ニテ決スヘシ似タルモノ治
シソコ子ヌヤウニ候法ヲヨクスヘシ柴胡桂枝湯ヲ用ユ
内虚煩熱短氣セハ甘竹茹湯ナト也常ノ勞瘵ト同法ナリ

難治トス

産後痿痺ヲ病ムハ椅ニ在内ヨリ両脚シヒレテ後ニハ覺
ナク痿シテ起テ能ハス委中ニ針ヲ刺シ出血シテ治スル
一有刺絡ノ法ハ嘗テ著ス瘦狗傷考ニ詳ニ載タリ是ニテ
行フヘシ此外諸病ニ用テ効ヲ取テアリ腹ノ左右ニ通ル
大絡ノ凝滯シテ伏梁ト云ヘキモノ委中ヲ刺テ意外ノ効
ヲ得ルヲアリ皆瘀血ニ屬スルモノニ行フ也當歸建中湯
ヲ用ユヘシサテ其痿タルハ療法ハ常ノ痿痺ニ異ナル
無ク破血ノ劑ヲ專要トス又ユルムル事ヲ心得ヘシ芍藥
甘草附子湯ナリ既ニ委厥ハ其治法ヲ中風ニ語ル産後ノ

痿痺ハ數年治セズ再ヒ産スルニ及テ割然トシテ治シタ
ルハ度ニ見タリ

産後血熱ノ甚シキハ外感ヲ挾ムヤト心ヲ付テ見ルヘシ
又兼テヨリ癰或ハ痢ナトヲ患タルハ出産スレハ二三日
ハ愈居ルヲ有テ又發スルモノ也妊娠産後共ニ痘瘡麻疹
ハ甚仕ニクシ必ス本症ヲ治スルヲ先務トシ妊娠産後ニ
カ、ハルヘカラス諸病共ニ本病ヲ治スヘシ妊者ニ忌ム
藥モ多ケレ凡是ニ拘泥スヘカラス本病イエスニハ大病
ニ仕立ルヲアリト知ヘシ血熱退カサルニハ贊夫籃ヲ一
味五分七分或ハ一錢モ煎服スヘシ又巫神湯ニ加ヘ用テ

モヨシ妊娠ハ九月ニ至リテ惡阻ノ証止マズ或ハ嘈雜シ
テ煤色ノ物ヲ吐ス吐血スルモ有是ハ大半産後ニ死ス又
虛里ノ動甚シキハ産後ニ急症ヲ發ス兼テヨリ辭退スヘ
シ又腹皮薄ク兒胎コリコリト堅キ骨ヲ按スル如ク或ハ
マトハリテ西瓜ヲ風呂敷ニ包タル如キ手當リハ産ニ死
スルカ娩後ニ死ス津液極虚ノ凶兆ナリ

子癇ト云モノハ妊娠俄ニ發癇シテ卒倒スルヲ云病源論
ニハ出又病ニテ妊娠僵仆胎上搶心下血候ト云トハ異ナ
リ子癇ニハ非ス母癇ナリト雖凡其因ハ胎動ニ屬ス手足
搐搦直視反張ス甚キニ至テ舌ヲ吐フ數寸或ハ宿食ヲ吐

ス又甚シキハ糞汁ヲ吐ス是ハ必死也能ク治シタルハ滿
月ニ至テ母子共ニ安穩ナルモノ多シ今娩ノ後モ癖ニ十
リ幾タヒモ發シ卒倒スル故ニ母癩トハ云ナレ凡子癩發
スルノ兩三度ニ及ヘハ子宮必ユルム故ニ回生ノ術ヲ行
フテ出セハ母ハ必救フモノ也又胎氣自然ニ墮テ臨月ナ
レハ母子全キモノナリ賀川家ニ從テ回生術ヲ學ハサレ
ハ如斯ハ救フナラス起死回生ノ事此一術ニ在宜ク習ヒ
得ヘシ藥ハ瀉心湯ノ屬ナレ凡先又清漣君ノ時ヨリ羚羊
角湯ヲ用ヒ來ル奇驗アリ一婦人孕八月隣里失火ス挾箱
ヲ持テ土藏ノ階子ニノボルトテ手離レテ心下ヲ搏テ發

癩ス一時ハカリニテ甦ル滿月ニ至ルマテニ四五發スレ
凡終ニ安産シテ母子全シ産後復發スルノ一月ニ三度次
第二輕ク發シテ止其後孕ス四五子ヲ産スルニ復發スル
ノナシ一女臨月子癩ヲ發ス舌ヲ吐フ數寸ニ日不甦回生
術ニテ子ヲ去ニ猶不甦如尸ナルノ三日四日メニ始テ人
ヲ見ル呼ハ應ル時モアリ藥食共ニス、ム數十日ニテ全
快ス始ハ羚羊角湯中ハ三黃湯終ハ巫神湯ナリ
婦人産後血熱退カ子或ハ漏血ノ後ヨリシ或ハ蓐ニ在時
ノ心勞驚動ナトヨリシ上衝頭痛大ニ欠シ耳鳴眩暈心氣
乏少寒熱發作五心煩熱心中驚悸明ヲ惡ミテ暗室ニ入或

ハ人ト對スルヲ忌ム等ノ症ヲ一面ニ血ノ道ト稱ス翠
鳳散主之此藥ハ諸失血ノチトメニ用ヒ又諸毒虫刺ニ用
テ妙ナリ詳ニ瘕狗傷考ニ出セリ持病ト云モノニナリ雨
ヲ催シ或ハ南風ナトニ付テ發シ頻ニ睡ルモ有巫神湯主
之又安眠ナラヌモアリ夢ニ驚多ク或ハ魘シナントスル
モノハ心下ニ必動悸アリ總テ睡ルヲノナラヌハ此動悸ハ
アルモノナリ狂ノ催ニテ睡ルヲナラヌモ同シ此動悸ハ
心中不安ヲアレハ何症ニモアラハル酸棗仁湯主之心煩
スルニモ用ユ其甚キハ半夏瀉心湯ニスルヲモアリ兼テ
虛弱ニテアラハ歸脾湯モ用ユヘシ巫神湯三黃湯安神散

抽刀散又ハ振出ノ血ノ藥ナトニテ靜養スル寸ハ皆治ス
ヘシ此内ニ心勞數ヲカサ子或ハ驚悸ニヨリ夫ヨリ怯虛
ニナリテ今ヤ死スラント取越苦勞ヲシ萬事ヲ氣ニヤミ
細慮纖思少シノ物音ニモ畏レ冷汗ヲ流シ眼中クモリ或
ハ悲泣淚ヲ流シ常ニ黙ヒトシテ所思アルカ如ク絃歌ヲ
催シテ之ヲ慰セントスレハ益忌避テ只其病ヲ考ヘ如何
ニ教誨千百スレ凡用ユルヲ能ハサルハ氣癖ニテ是モ素
問ニ出タル心氣痿ト云モノ也痿ハ陰痿ナトノ痿ニテ異
見教誨ヲ聞ワクルヲノナキニハアラス心氣怯弱ニテ少
シモ推張ルヲナラヌニテ人ノ語聲モ耳ニ響音テイヤカル

安氣ノ心少モナク苦勞ニナル是ハ歸脾湯加味温膽ノ屬
安神丸ナト選ミ用ユヘシ日月ヲ經テ自然ニ治スルモノ
ナリ甚シキハ年ヲ經ルモアリ乍寒乍熱胸心煩悶者ハ知
母湯仲景ノ百合病ヲ考合セ見ルヘシ
産後下利スルハ芍藥湯ヲ用ユヘシ産后ノミナラス經閉
滯下或ハ上氣足冷或ハ發熱乾噫食臭腹脹雷鳴切痛下利
不止ニ運用スヘシサヲ下利浮腫スルナラハ實脾飲也
瘕ハ又破傷風ト呼角弓反張ト云ハ象形ヲ云也傷寒金匱
ニ作瘕誤ナレ凡素問氣厥論ニモ肺移熱於腎傳為柔瘕ト
瘕ニ作テアルハ不審ナリ剛柔緩急アリ其始ハ牙關噤シ

テ開フ能ハス項頸強急惡寒熱或ハ渴ス脊骨痛テ一時ニ
反張スオコリサメアリ其發作急ナレハ當人舌尖ヲ啣切
血ヲ流ス甚シキハ反張シテ椎骨コキリコキリト鳴モ有
仰卧スルヲナラス俯シテ居ルモノ也金匱ニ脉上下スル
トアルハズイスイトスルヲニテ即反張スルノ象也此病
ハ脉弦急ニテ引張ノ勢爰ニ見ユルナリ産後ニ稀ニ半産
後ニ多シ又小瘕ヲ得テ發ス大低手足指ノ瘕ニ多シ雨水
田遊ノ氣ニテ瘕口ヲ浸シテ必發ス傷口腐レテ臭氣ヲナ
スヲ常ノ腐臭トハ異ナリ十二五六ヲ治スヘシ是ハ婦人
産後ニ限ラヌ病ナレ凡序故ニ爰ニ語ル一人路上雨ニ遇

草履ヲ脱シテ走ルニ茶碗カケニテ大指ノ尖ヲ傷ル痛ヲ
忍テ歸ル其夜寒熱牙關噤シテ開カス次日反張シテ死ス
一人水游ヲ學フ篠ノ切口ヲ踏抜タルニ替古塲故其怯弱
ト云ヲ愧テ終日游キテ歸後反張ス葛根加烏頭ヲ用ル
一日五六帖連進十日ヤ、緩ナル故仍用ルヲ数十日ニテ
愈タリ出遊スルホトニ成テモ時ニアツト云ホトニ引
メルヲアリキ一婦人産後項背重キヲ覺テ寒熱ヲ作ス脉
浮弦ナリ口ヲ開フナルヤト問エハ成ト云欠ハ大キクナ
ルヤト問ハ前刻欠シタルニ何故カ思フホトニナラスト
云是瘧ナルヲ知甚輕症ナリ栝蓏桂枝湯ヲ與ヘテ治シ

タリケリ一童女痘瘡酒湯ノ時隣人猿ヲ引来ルニ紅巾ニ
テ面上瘡痂アルヲ見テヤ件ノ猿飛付ニ驚キ倒レテ膝ヲ
傷ル猿ノ咬タルヤ又仆タル時ニ傷ルヤハ知レス其夜瘧
ヲ發ス小兒故ニ猶舌尖ヲ嚙フ數ニナリ其父豪勇ナル者
ニテ女ヲ懷ニ抱テ晝夜不寐反張スル時ニ肩ヲ押付テ救
瘧術ノ如クス葛根加附子ヲ與テ数十日ニテ治シタリ一
捕匠二十歳許手ノ大指ニ瘧ヲ得タリ一日出行ス夜間發
熱直視牙關禁急人事ヲ省セス脉沈弦二三醫診スレ何
病ナルヲ知ラス予ニ乞亦何ノ因ナルヲシラス手ニ
瘧アルヲ見テ瘧ナラシヲ知ル其瘧ニ灸セシムルニ不

知大艾ヲ上セルヲ數十壯ニテ目偶是ヲ見ルニ似タリ傍
 人等此ホドノ艾火汝ハ熱セサルヤト大呼スレ凡不應百
 壯ニ近キ故止シム葛根加烏頭ヲ與フ次日マテニ三貼ヲ
 盡ス隣人相議シテ又艾火ヲ上スニ知ルト見エテ手ヲ振
 切其タ少ク正氣アリ猶前法ヲ守ル牙關漸緩ミ人事ヲ知
 ル三日ニシテ快ヲ得七八日ニ全愈ス是ハ反張スル事ハ
 無リキ後ニ灸痕水ヲ包ミタル如ニナリ掌中一盃ニ盈タ
 リ刺シテ水ヲ去リ皮剥タリケリ年ニヨリ此病ハ四五人
 ツ、一時ニ有フアリ葛根湯ヲ主劑トシ附子烏頭ヲ用ユ
 ルナリ大承氣モ用ヘキ症アリ多服ニアラサレハ効ナシ

羚羊角湯 治子癇

羚羊角 木通 橘皮 二錢 厚朴 吳茱萸

乾薑 三錢 烏頭 五枚

右水三合。煮取一合。分服。水率略スヘカラス鳥毒恐ルヘシ若クハ分量ヲ心得テ調合ス

別ハ格ナリ

芍藥湯 治產後下利。及經閉帶下。上氣足冷。時發熱。乾噫食
 臭。心腹妨脹。雷鳴切痛。下利不止者。

芍藥 二錢 香附子 二錢 乾薑 縮砂 各五分 丁香 四分

甘草 三分

右六味以水一合半。煮取一合。不過五日。下利漸減。

琥珀湯見三卷目
翠鳳散瘦狗傷考

赤白帶下

帶下ハ素問ニ出テ古名也婦人赤白帶下ハ俗ニ長血白血
ト云其人元ヨリ臍下ニ血塊アリテ月信常ヲ失シ月信不
來或ハ來ルモ日期過テ猶歛セス日ヲ引テ却テ多下ニ至
リ或ハ終ニ崩漏シ藥餌ヲ以稍ヒヤムト雖終ニ白キ穢物
ヲ下シ或ハ赤白雜下シ臍下疼痛ス壯婦ハ治スヘク老媪
ハ治シ難シ又年ヲ經テ止又休作四五年ニ及モ有其終ニ
止又ハ臥床シテ勞瘵ノ形ヲ為ス顔色青白ニテ兩顴ニ紅
ヲ粧フ如ニ見ユルアリ是ハ勞瘵ニ云桃花蛀ト云モノ也
骨立シテ死ス又其下物臭ヲ發スル有日月ヲ經テ其臭益

甚ク廁ニ滿ル者有又蓐内モ臭ク一室ニ入レハ臭氣鼻ヲ
衝アリ臭氣ノ出ルハ何レ必死ノ候トス又産後惡露ノ下
リヤマス引續テ帶下ニナルアリ是ハ娠スルノナルホ
トノ婦人ニテ跡ノ帶下ニナル理ハナカラズニ帶下ハ元
来血分不足瘀濁ニナリテ發スルカ又順流宜シカラス
テ發スルノ病ナレハ胎ヲ受ルノハナラヌハツ也後ニ考
ル一條ニテ産後ノ帶下ヲ患ル意味ハ知ヘシ先治法ハ穢
物ヲ内ニ留レハ其處エ流レ來ル鮮血モ其穢瘀ノ血ニ交
リテ惡クナルノ譬ハ新シキ飯モ少シ餒タル飯鉢ニ入置
ハ直ニ餒ルト同理ナリ仍テ先瘀穢ヲ逐ヒ下スヲ第一ニ

スヘシ最初ナレハ逐レテ止ムモノ度ニ見タリ甲字湯折
衝飲ノ類ヲ用テ下スヘシ筋ニヨリ大黃牡丹皮湯モ抵當
湯モ用ユヘシ下シテ赤白ノ多ク下ルハ却テ効ヲ得ヤス
シト覺ユ猶痢病ニ大黃劑ヲ用ルノ意ナリ五七日モ十餘
日モ下リタル後ニ丁香飲ニスヘシ奇驗アリ内股ノ邊ニ
冷ヲ覺ヘ攣引スルハ香薑湯也此冷ルヲ目當トスヘシサ
テ帶下ナレハトテ破血補血ノ藥ニカキラス其證候ニテ
大小柴胡湯桂枝ノ輩モ用ヘシ腹ヲ治シテ止ムノ度ニ
アリ理中湯ノ如キハ猶用ユヘシ世ニ廣東人參ト云モノ
血症ノ主藥ニテ諸症ニ用ユルノ偶記ニ詳ニセリ用ユヘ

シ又軍中ノ用意ニ欠ヘカラサルノ奇品也嘗テ一婦人数
年ノ帯下赤白兼下ル其毒眼系ニ衝テ瞳子散大殆ト内障
ノ候ヲ催サントス坐藥ヲ以テ其瘵毒ヲ去内ニハ大紫胡
ヲ用ユ凡半年餘大黃ハ去時モ又加ル時モアリ坐藥モ亦
止タリ始タリ半年ハカリニテ帯下モ眼モ治シタリ坐藥
ハ絹ニ包ムト大拇指ノ大サニシテ子宮ノ口ニ指入置小
便スル時ニ出シテ坐藥頭ニ穢ノ付タルヲ拭テ又入ル三
日ニ一包ニテヨシ絹ノク、リヘ絛ヲツケテ視ヘナリ凡
結ツケ置ヘシ是ハ宮口ノ澁リヲ開キテ穢物ヲ早ク下サ
ンカ為也服藥ハ腎氣丸モ用ユヘシ煎服スルモヨシ芎歸

膠艾湯犀角地黄湯ノ類撰用ユルト有ヘシ灸効モアルモ
ノナリ崩漏ヲ治スルモ別ニ手段アルニ非ス只血熱アル
故ニ三黃湯或ハ贊夫藍ナトヲ用ユルナリ生地黃汁藕汁
ナトハ長血ニハ効ナシ崩漏ニハ驗アル者也又經閉シタ
ルヲ色ロニシ抵當丸ナトヲ用テ漸メクルト夫ヨリ引ツ
ツキテ帯下ニナルトモアリ近頃常北ノ門人志賀東庵一
農婦ノ帯下數年ナルヲ治ス臭氣強ク丁香飲輩ヲ用ユル
ニ効ナシ其婦一日山ニ入テ薪ヲ采ルコレヲ負テ起ント
スルニ重シ努力シテ踏張ニ陰中一物ヲ突出ス驚キ来リ
テコレヲ東庵ニ告コレヲ見レハ子宮ノ脱スル也其頭邊

ハ腐爛ス猶赤白膿汁ヲ流ス其臭ハ前日ノ帶下ト同臭ナ
リ東庵モ是ヲ治スルノ法ヲ解セス新作意ニテ其腐爛シ
タル所ヲ藥線ヲ以テ緊扎ス不日ニ退落ス殘ル処ハ後ニ
自ヲサマシ爾後多年ノ帶下割然トシテ治シタリ仍思フ
ニ臭ヲ為モノ則皆是陰中傷ヲナシ腐爛スルモノニテ補
血ノ藥ニテ効ナク死ニ至ルハ理リ也寒熱ノ往來スルモ
ノハ即瘰癧ナトノ如ニテ勞熱ノ状ヲ為ス産後帶下ヲ患
フルヲ不審ニ覺タルニ果シテ是子藏ニ腫物ヲ生シテ腐
爛スルナリ左スレハ是ヲ癰毒ノ手當ニシテ効アラント
思ハル藥ハ龍膽瀉肝湯或加土茯苓化毒丸ヲ兼用スル処

ナラシ又粉丸モ瞑眩セサル位ノ境ニテ試ント欲スルニ
偶一寡婦六十餘歳多年帶下ヲ患フ數醫ノ手ヲ經テ治セ
ス最後ニ予ニ乞フ是ヲ診スルニ疲勞シテ蓐ニ卧ス飲食
乏シク肉脫ス其室ニ入レハ臭鼻ヲ撲ツ六脉虛細ナリ術
ノ出ヘキナシ其婦自ラ言フ陰内如何ニナリタルヤ子宮
ナトハ流レタルヤ少シモ手指ニサハルモノ無ク空虚也
ト果シテ是前ニ言モノト同シト知レ凡其虛脫ヲ奈レシ
カタシ故ニ固辭シテ去其後コレヲ試ント欲スレ凡未タ
病婦ノホトヨキモノ無シ又有賀村ノ醫佐藤貞淳ナルモ
ノ曰頃口帶下ヲ治スルニ下疳ノ手當ヨロシカラシムヲ

嘗テ先生ノ語ニテ承ル故是ヲ試ルニ効ナシ陰中一物ヲ
 出ス其婦快活ノモノ故ニ出シテ示ス且云フ痛痒ナシト
 其出ルモノへ火炭ヲアツルニ覺ナシ帶下ノ穢物ハ其出
 タルモノ、左右ヨリ下ル先藥線ヲ以テ其覺有ト無トノ
 堺ノ処ニテシメ切ルニ退落シテ内へ收マルル後帶下ハ
 全愈シタリトツ

丁香飲 治婦人血積或滯下吐沫上氣腰冷時寒熱效嗽方

香附子一 乾芋 石菖根 當歸各八分

丁香 川芎 紅花各三

右七味以水一合半煮取一合日二劑或三劑服後發熱倍

前者為知或加阿膠

理中湯 抵當丸傷寒論 八味丸 大黃牡丹湯

坐藥金匱 膠艾四物湯方彙 朱明丸 折衝飲產論

灸 八膠 或ハ下膠中竅ヲヌキヌキニモスル

小兒

驚口 驚病

無

驚風

暴

熱

口

尿

夜啼

痢

中

出血

瘡

瘡

甘

甘

甘

甘

小兒醫ハ昔ヨリ啞科ト唱フルハ病状ヲ告ルナキ故也

今ハ専門アレハ其經驗多キニテ予カ覺タルヲ以テ人

ニ示サンコト思ヒモヨラ子氏一ニテ語ラシ夫小兒ニハ疳

ト云病ヲ常病トス是ハ甘ヲ食テ發スル故ニテニ从テ疳

ト云ハ正字通ノ説也本邦ニテハ古ヨリ疳ヲ忌テ兒ノ初

生ニハ必カニ小紋ト云テ積雪艸葉ヲ染テ産衣ニスルハ

疳ヲ除クノ縁ニヨルコト東門随筆ニ見エタリカニト云フ

ハ疳ト云フ也ニトニトハ同字ニテハ子テヨメト云タメ

ニニラント書キタリ乃謠本浄瑠璃本ノ節ヲ付タルト同

意也ント云字ハ無キ故ニ或ハ武ノ字年ノ字ヲ以テ訓ス
平假名ノんノ字ハ人ノ字片假名ノニ字ハ仁ノ字也んモ
ハ子テ讀メト云為ニ人ノ字ヲハ子テんトハ書ナリ夫故
ニニトントハ轉シテ通用ス小兒ノカニバ、ハ初生ノ時
胎毒下ラ子ハ疳ニナルト云テ疳バ、ヲカニバ、ト云カ
ニ小紋ハ疳小紋也猶錢ヲセニ紫菀ヲシヲニト云ノ類也
サテ初生ニハ此カニバ、ト云ヲ下スヲ第一トス是ハ胎
毒ノ殘ラサルノ為也古昔ハ鸕鶿菜ヲ用タルトミヘテ訓
蒙圖彙ニマクリト訓ス今ハ甘連湯ヲ以テマクリト呼テ
乳ヲツケヌ前ニ用テ胎毒ヲ下スト口ニハ云ヘ凡彼甘連

ハ何ノ用ニヤ立ン世人胎毒ハ終身ノ大害ヲ為リヲ知ラ
ス故ニマクリト云名ヲ以テ儀式一篇ニスルト何ソヤ是
ハ例ノ病家ノ姑息ニ阿順スル而已マクリ予ハ未タ其解
ヲ聞ス軍談ノ記録ニ敵兵ヲマクリ返ス又城兵ヲマクリ
出スナト有ヲ見レハ一時ニ殘ラス出スノ言葉ニテ胎毒
ヲマクリ出スノ意ナルラント思ハル吾門ニハ甘連大黃
湯ヲ與フ若其胎毒ノ多キハ紫圓ヲ用ユ紫圓ハ從來小兒
ノ藥ニテ小兒ハ急卒ノ藥驗ヲ貴フ連久ニ藥ヲ服シカヌ
ルヲ以テナリ又孩子ハ病ニ堪カヌルヲ以テ速ニ治スル
ヲ貴フ大人ニ用ユルトチカヒ小兒ハ瞑眩ナキモノナリ

古人ノ方ヲ創タル妙感スルモ餘リアリ千金ニ内ノ病ニ
ハ紫圓外ヨリノ病ニハ黑散ヲ用ユルヲ論セリ熟讀ス
ヘシサテ山脇家ニテ芟山湯ト云ハ鷓鴣大黃蒲黃苦揀皮
ノ四味也何故ニ蒲黃ヲ組タルヤトタツヌルニ鷓鴣菜ノ
胎毒虺虫ヲ下シ去ルヲハ唐人ハ知ラサルトコロニテ閩
書ニ其名ヲ出セトモ其主治ハ記サス本邦ニテ此奇効ヲ
知モノハ蓋神代大己貴命少名彥名命ノ遺方ニテ有ヤラ
ズト思フ也其蒲黃ヲ組タル意ハ人間ノ解スヘキヲニ
アラス解スヘカラサルヲ以テ真ニ古方ノ儘ナルヲ知ニ
貴フ也後人漫ニ取捨スヘキニ非況ヤ試用シテ其神驗

諸方ニ勝レリ實ニ是上世ノ遺方ニシテ今ニ至テ其賜ヲ
拜ス世醫ノ用ユル甘艸大黃等ヲ配用スル物ハ至今眼ヲ
以テ製スル處也トソ東門先生物語ラレタリキ
初生乳ヲ飲サルハ鷲口ニ多シサレ凡鷲口ニアラスシテ
吞ヌハ生葱ノ白根ヲ舌上ニ塗ルヘシ能吞モノ也撮口ト
云モノ晝夜啼テ唇色靛黑臍ノアタリ青黑色口ヲアキカ
子ルハ内搐ト名ツク又爪甲黒キモノ死ス手ヲ開テ握ラ
スニ居モノ也凡赤子ハ握テ掌中ニ垢ノアルホトニ開カ
サルヲ壯實トス手ヲ開クハ成長シカ子ルモノナリ老子
ニ含德之厚比於赤子云云骨弱筋柔而握固ト見エタリ腹

脹テ腋へ青筋出ルハ紫圓ノ主ナリ不治ニ至ルモノ多シ
二便不利ナトヲ問ヘシ白沫ヲ吐手足冷テ死ス又鷺口瘡
ハシ口舌ト云モノ也乳ヲ吞マスニ啼泣スルモノ心ヲ用
テ見ヘシ初ハ舌上或腭ニ細ニ粟粒ノ如キ白疱ヲ生シ段
ニ多クナリテ上腭唇マテ白クナル鷺口ノ如キ故ニ名
ツク乳ヲ吞フ能ハス醫書ニ紗ノ切ニテ洗オトスノ法又
銀ノ窠耳ニテカ、ケ取ノ法ヲ載是ニテ取レル時モ有レ
凡紫圓ヲ用テ下スヘシ元來胎毒ナレハ也又一極散奇効
アリ他ニ求ルニ及ハス輕キニハ天花粉ニ臘脂ヲ和シ又
ル一切ノ口中ヲ主ル又紺屋ノ甕ノ内ニ夕子タル藍ノ沫

ニテ堅紅ヲトキテ塗モヨシ又五倍子黃丹ヲ等分ニシテ
塗モスルナリホ、ツキ虫ト云ハ江戸ニ多シ水戸ニテハ
見聞セス續醫說曰小兒初生不啼不乳蓋因前臍帶之時為
風所入自臍已上循咽喉攻至下胛牙齒當中有小水泡如黃
粟一粒疼不可忍故不啼不乳但以指甲破之出黃膿一點而
愈後以此法教人活數兒矣ト云モノ似タレ凡是ハ鷺口瘡
ノフナランカ千金翼曰小兒生輒死治之法當候視兒口中
懸癰前上腭有赤胞者以指摘取頭決令潰以少綿拭去勿令
血入咽入咽殺兒急ニ慎之是ホ、ツキ虫ナラシ燈籠艸實
ノ如キモノ腭邊ヨリ出テ乳ヲ吞マスニ死スル也

臍風一云ハ臍帶ノ退落ノ後ニ保護宜シカラス或ハ臍口
未タ斂ラサルニ兒ヲ浴シ臍口ヨリ水氣入テ死スル也退
落シタル當日ニ浴シテ即死スルヲ度ニ見タリ附蒂ノ跡
ヨクハ乾キテ愈サル間ハ慎テ浴スヘカラス二三日シ
經タルハ即死セストモ病身ニナル毎ニ見受タリ先臍
蒂落タラハ小艾ノ灸ヲスル臍帶ノ落タル口ノ形ニ隨テ
豎ナラハ豎横ナラハ横ニナラヘテ一炷ツ、ヲ灸ス是ハ
火氣ノ温ヒヲ望ニアラス臍口ヨク斂シテ再ニ開カサル
ノ為ナリ此處ヨリ水氣ノ入ヲ忌フヲ知ス或ハ茶碗ノイ
トシリニテ熊胆ヲ水ニテトキ傳ルト小兒腹滿シテ死ス

恐ルヘシ五倍子ノ末ヲ傳ルハ早ク乾ス為也熊胆ハ乾ス
ノ意ニハナク腹内へ通シテ驚風疳ヲ治セニフヲ願フノ
為ナラニ津唾ニ和シテ傳レハ害ナシ千金曰小兒始生即
當舉之舉之遲晚則令中寒腹内雷鳴乃先浴之然後斷臍
臍帶ヲ斷ト後浴者則臍中水臍中水則發腹痛又云若臍中
ハ異ナリ水及中冷則令兒腹絞痛夫糾啼呼面目青黑此是中水之過
當炙粉絮以慰之不時治護臍至腫者當隨輕重二者便灸之
乃可至八九十壯輕者臍不大腫但出汗時二啼呼者擣當歸
末和胡粉傳之炙絮日慰之至百日愈以啼呼止為候若兒糞
青者冷也與臍中水同トアリ口鼻ノ氣冷ルヤト掌ヲアテ

テ候フヘシ若冷ルハ冷ナリ弄玉加附子ノ主タルヘシ此
候法ハ大人ニモ心得有ヘキナリサテ後世ニテ益黄散ヲ
用ル所ナリ屎ノ青ハ青菜ヲ絞リタル方如キモノヲ下ス
一初生ニカキラス冷也簡易方ナトニ驚風ヲ催ストスレ
凡天樞ニ灸スレハ神驗アリクレクレモ臍帶ノ落ントス
ル氣味ヲ見タラハ浴スヘカラス臍帶ノ落タル故ニ水氣
ノ入ニアラス落ント欲ニテ落サルトキハ帶ノ四方ハ既
ニクツロキテ有ナリ故ニ浴スヘカラス落タル後ハ五六
日モ過テ能ニ斂リタルヲ見テ浴スヘシ
初生夜啼スルニ紫圓ナトヲ用テ驗ナキモノハ不容天樞

ニ灸スヘシ極テ驗アリ一日ニテ効ナキハ二三日モツ、
ケテ灸スヘシ小炷ニテ効ナキモノ多シ中ノ艾ニモ大ニ
モスヘシ二十壯ヨリ五十壯ハカリニモスヘシ小兒ニ灸
効アル一ハ人意ノ表ニ出初生ノ小兒ノ啼ハ腹痛ニ係ル
姑息ニテ艾灸ハ行カ子熊胆燒塩温石ナトニテ治カ子ル
ハ能ニ説キテ灸スヘシ灸ハ驚カス故惡シキナト云説ア
レ凡是ハ灸効ヲ知ラサル人ノ言葉ナリ
初生ノ小兒臍中出血ハ凶惡也醫説ニ小兒初生未滿月多
啼叫致臍中出血以白石脂末貼之即愈未愈微ニ炒過放冷
再貼仍不得剥揭ト有レ凡初生ノ兒出血ハ即死多シ又二

三日ヲ生テモ聲出スシテ死ス數月成長スル兒ハ弱クモ活スルヲ有ヘシ又臍ヲ痒カリテ黃臭水ヲ出スハ三妙散ナリ

魘病ハ本艸伯勞ノ主治ニ小兒繼病取毛帶之繼病者母有娠乳兒ニ病如瘡疥他日相繼腹大或瘥或發他人有娠相近亦能相繼也北人未識此病時珍曰案淮南子云男子種蘭美而不芳繼子得食肥而不澤情不相往來也蓋情在腹中之子故也繼病亦作魘病魘乃小鬼之名謂兒羸瘦如魘鬼也大抵亦丁奚疳病按字昏魘早鬼小兒鬼醫燈續焰云魘小鬼也乳兒未行而母復有娠其兒忽微下利寒熱往來毛髮鬚鬣為有惡鬼神

導腹中之胎妬嫉而為此故名魘病也。以他兒食其乳亦能相繼而病。故俗又名繼病。雖然妊乳兒不必悉致魘亦偶有此耳。女子氣血上為乳汁下為經水小兒飲交乳且病況氣血既榮於胎而乳汁必自漓薄兒飲之能無病乎。鬼神之咎似無替也。小兒ノチハナレト疳ノ形ヲナス夏月ハ別テ扱惡シ寒氣ニハ一體小兒ノ病ハ輕キ者ナリ又乳ノ不足ニテ諸病ヲウクレハ極テ六ヶ敷理也。乳ノ少キ故ニ飯ヲ與ユレハ過飽シテ腹滿シ四支ハ瘦テ丁奚病ナト云名ヲ付ル魘病モ是モ同意味ナリ五雜俎曰昔人謂亢旱之時上帝有命封禁五瀆此誠似之每遇旱即千方祈禱精誠億竭杳無其應

也。燕齊之地。四五月間。嘗苦不雨。土人謂有魃鬼在地中。必掘出。鞭而焚之。方雨。魃既不可得。而人家有小兒新死者。輒指為魃。率衆發掘。其家人極力拒敵。常有叢毆至死者。時有刑之訟牘。間真可笑也。

夏月何事。モナキニ俄ニ大熱シテ煩渴シ乳ヲ吐ス微ク下利眠ルニ似テ眠ルニモ無ク半眼ニシテ夢中ニ驚キ痢ニモ非ス驚風ニモアラス食傷ニモアラス是ハ名状ニココルヲ有リ即無暈暴熱ト云モノ也。是ハ脉ヲ以テ吉凶ヲ決ス脉數急ナルハ難治トス又沈伏シ或ハ絶脉四支微冷スルモ有或ハ妄語スルモアリ凶候也暫時ノ内ニ顔色憔悴

スルモノ也脉ノ數ニ怪ムヘキホトニセハシキハ必死ナリニ三日ヲ過スシテ死ス當日ニ死スルハ世ニ驚風トスレ氏驚風ニハ仕ニクキモノ有初ハ葛根湯也三黃湯大小柴胡四逆又ハ熊胆紫圓モ其時ニ臨テ運用次第ナリ難治多シ

尿床ハ灸効第一ニ居ル十三推骨ノ左右ヲセマリテ五十五壯ハカリス神驗アリ又關元モ良シ夫ニテモママ又ハ香龍散ナリ其兒虛弱ナルニハ平日弄玉湯加附子或ハ八味丸煎服スヘシ
痢ハ大人ノ論通りナレ氏初起ハ寒熱表症ヲアラハスニ

ヨリテ葛根湯ヲ專要トスルナリ疫痢ナトニ驚ヲ兼ルハ
十二六七ハ救フヲ得サルナレトモ驚風ノ形ニナルト
モ又驚風ハカリニテモ葛根湯ヲ用テヨシ三黄湯ハ此所
へ諸人ハ用ユレ氏葛根湯ヨリハ損ナルヲモアリ久痢ハ
終ニハ疝候ヲナス爰ニ至レハ疝ノ治方ニテ却テ救フ
多シ烏梅丸ヲ煎服シテ効アリ又建理湯ト名ツケテ建中
湯ニ理中湯ヲ合方ニシテ用ユルヲモアリ久痢ニナリタ
ルハ却テ暴卒ノ變ナク療治仕ヨキモノナリ弄玉湯或ハ
如附子ナトノ症多シ是モ腹部ノ各効多シ瘦多キナトテ
過慮シテ手拔ヲスヘカラスサテ疝痢ニナレハ度数モ餘

多カラス元氣モヨクテ日數ヲ經テモ同シ事ニ煩フ若腹
痛強ク時ニ手ヲ握リテ口ニ入ルハ死ス聲細少ニナリテ
必イヤト泣モノ凶兆ナリ臭氣モナク清水ヲ下スハ虚候
ノ凶兆ナリサレ氏此候ヲナスハ疝痢ニナラヌ前ニアラ
ハシテ死スル也前ニモ云青菜ノ汁ホリ汁ノ如キヲ下ス
ハ冷ナレハ弄玉湯加附子ニスル処ナレ氏誤テ大黄ヲ用
ユレハ益青屎多ク下リテ甚危ニ至ル疝痢ニテ日月ヲ重
テ愈エサルハ補タラハヨロシカラント思フハ誤ニテ是
ニハ新榮丸カ又ハ左ニ羅丸ヲ用ユヘシ飲汁ハ弄玉湯ニ
史君子ヲ多加テ煎服スヘシ此左ニ羅丸ハ疝痢ノ藥ノミ

二非ス驚風小兒ノ諸病ニ用ユ左ニ羅ハ昔ノ小兒科ノ名家ナリトフ疫痢ハ大人ト違ヒ速ニ死ニ至ル葛根湯ヲ多服スルヲ第一ノ良法トス然トモ急變ヲ知ラヌハ恥辱ナレハ能ヒ候法ヲ精クスヘシ前ニモ云通り十二六七ハ亡スルナリ

瘡ハ是モ大人ノ通ナレ凡是ハ却テ治シヤスシ思ノ外コマラヌモノナリ

小兒肛門ニ細虫ヲ生シテ痒カルト有陰蝕蟲ト云ニハ非瘡ノ候アリテゲレルモノ也鬲俞肝俞不容天樞ニ灸シテ其蟲ハ去ルモノナリナレ凡度ヒハナキ病ナリ小兒ニハ

何病ニテモ日数ヲ経レハ必瘡ニナルナレハ本病ヲ止テ瘡ハカリニナルモノ也回春久ノ字ヲ冠シテ説タルハ甚面白キナリ

香龍散 治遺溺方

反鼻十錢 丁香二分

右二味細末臨卧白湯送下後温酒任性凡自七歲至十歲每服五分自十歲至十五歲隨年壯每增一分至一錢十五歲以上每服一錢温酒送下惡酒者白湯亦可不過二十日而痊

疳

小兒ノ疳ハ其形状盡シカタシ後漢ノ王符カ潜夫論曰嬰
兒有常病貴臣有常禍父母有常失人君有常過嬰兒常病傷
於飽也貴臣常禍傷於寵也哺乳多則生癩病富貴盛而致驕
疾愛子而賊之驕臣而滅之者非一也ト古ヨリ小兒ニハ飽
シムルヲ以テ病ヲ致ス癩ハ驚風ノ事ヲ云也疳ハ甘ヲ食
シテ病ムト云トモ疳ノ字ハ古書ニ出タルハ皆疳虫蝕瘡
ノ事ニテ今ノ五疳ノ一ニアラス外臺方ニ疳痢ノ方ヲノ
セタル氏今ノ疳痢ノ事ニハアラテ肛門ニ虫ヲ生スルノ
一ヲ論セリ又金匱ニ疳虫蝕齒ノ方アリ註家多ク仲景ノ

文ニ非スト評ス猶又今ノ疳ニハ非ス病源候論ニ始テ疳
蠱ト称ス曰。人有嗜甘味多而動腸胃間諸虫致令侵食腑藏
此猶是蠱也。凡食五味之物皆入於胃其氣隨其腑藏之味而
歸之脾與胃為表裏俱象土其味甘而甘味柔潤於脾胃脾胃
潤則氣緩氣緩則虫動虫動則侵食成疳蠱也。但虫因甘而動
故名之為疳也。ト云モノ今ノ疳ノ病因ヲ論タルニ似テ古
ノ疳蠱ヲ生スル病ヲ辨ス正字通ニ小兒食甘物多生疳病
五疳ノ説且其病状ヲ具論シ以葱椒煮蝦蟇食之大効ト記
スモノハ今ノ疳也サテ五疳ト云モ病源候論ニ出タリ曰
五疳一是白疳。二是赤疳。三是蛟疳。四是疳蠱。五是黑疳。トア

リ村上氏ノ慈幼密旨ト云書ニチリケニ數種ヲ出セリ其
名チリケ。チリチリケ。紅チリケ。黃チリケ。波美チリケ。其論
疳ヲサスニ非胎毒ヲ指ス又梶原性全ノ頸醫抄ニ塵氣ニ
作ル經穴彙解身柱ノ條ニ諸ヲ引テ具論セリ見ルヘシ今
ノ疳ト云モノ適當ノ一ハ宋錢仲陽ノ小兒直訣ニ五藏ノ
疳ヲ載テ論タルモノ詳也古ハ疳トハ唱ヘサルト見ユ
ルナリ素靈ニ疳ノ字ナク千金方ニモ疳ノ字ナシ小兒直
訣曰。凡小兒疳在內。目腫腹脹。泻痢青白。體漸瘦弱。疳在外。鼻
下赤爛。頻揉鼻耳。或肢體生瘡。鼻瘡用蘭香散。諸瘡用白粉散。
肝疳一名筋疳。白膜遮睛。或瀉血而瘦。用地黃丸。心疳。面黃頰

赤。身體壯熱。用安神丸。脾疳一名肥疳。體黃瘦削。皮膚乾澁。而有瘡疥。腹大嗜土。用益黃散。腎疳一名骨疳。肢體瘦削。遍生瘡疥。喜卧濕地。用地黄丸。肺疳一名氣疳。喘嗽氣促。口鼻生瘡。用益黃散。又傷寒。誤下。皆能成疳。其初病者。為熱疳。久病。名為冷疳。萬病回春曰。夫小兒疳病。由乳母寒熱失理。動止乖違。飲食無節。甘肥過度。喜怒氣乳。醉飽勞傷。便乳兒者。故成病。又因久吐之後。久瀉之後。久痢之後。以致久渴。久汗。久熱。久瘧。久嗽。久下血。久瘡。之後。皆能亡津液。並成疳病。此久ノ字。至テ味アリ。皆久病ノ後ニ發ス。小兒直訣ニ曰。凡此因大病脾胃虧損。內亡津液。所致。當固脾胃。為主。而早為施治。則不變敗症也。トア

リテ早ク手抜ノ無ヤウニ疳ニテハナキカ又疳ニナランカト思慮シテ取アツカウヘシ一友人子多シ嘗テ曰小兒ニ飯ヲアテカフハ却テ悪シ飽スレハ食ハヌシ以テ度トスヘシ鳥ノ巢ニ餌ヲ運フニ口ヲ開クウチハイツマテモ運フナリ此理ナリ飯ヲロカヘルハ悪シ菓餅ノ類ヲハ食セシムヘカラスト大ニ面白キ話ナリ論語ニ曰肉多ト雖食ノ氣ニ勝シメスト是ハ大人ニテサヘ此ノ如クナレハ小兒ニハ猶更ニ慎シムヘシ疳ノ證候ハ面色青黃ニテ事ニ物ニ氣ニ入ラス右ト云ヘハ左左ト云ヘハ右ト云ヘハ或ハ人ヲ忌坐セハ立ト云立テハ坐セヨト云暫時モ遊

戯セス乳母ノ脊ニ負ル、ヲ好ム是ハ腹部ニ滯アル故ニ
脊ニテ腹ヲ壓シテ快ク覺ル故也常ニ鼻孔ヲ堀テ鼻下紅
赤或ハ血ヲ出スホト堀モ有或ハ爪ヲ齒兩眉ノ間ニ青筋
アラハレ四支瘦テ頭頸細ク日晡寒熱ヲ作ス疳癆ト云ニ
至レハ壁土ヲ食シ或ハ炭ヲ喰シ又線香又生米ヲ喰スル
モアリ夜卧安カラス睡中ニ驚動シ眠ルニ半眼ニテ合ス
此外小兒ノ好ムヘキヲ惡ミ惡ムヘキヲ好ミ甘ヲ忌テ塩
ヲ欲シ辛ヲ欲スルアリ其狀一ニ數ヘ盡シカタシ食ヲ進
ニテ腹ハ大クテ外ノ處ハ瘦ル丁奚病ト云氣厥論ニ大腸
移熱於胃喜食而瘦按衍字甲謂之食亦胃移熱於胆亦曰

食亦トアリ小兒ノコニハアラ子トモ食亦ト云ヘシヤ小
兒ニハ脾疳ト名ツクル此症熱氣ノ無ハ皆治ヘシ灸ヲ第
一トス背腹章門共ニ灸スヘシ其灸スルノ法ハ小兒ハ灸
ノハナシヲ聞テモ啼泣スル故ニ啼泣スルヲ以テ憚ルコ
ナカレ始メハ先ヒ子リノ小艾ヲ以テスルニ啼泣スル時
ニ灸ヲ燒盡シ肉上火無テモ啼テ居ルハ真ノ泣ニハ非玩
具或ハ菓子ヲ以テマキラカセハ啼止ムカヲ試ムヘシ又
火ノ炷上ニアリテモ泣モ偽也炷ヲヤキ盡シテ肉際ニ至
テ泣モノ真ノ泣也疳ノ日數ヲ経タルハ艾火ノ痛熱ヲ知
ラサルモノ也中ノ切艾ニシテモ泣ス啼泣スルモ睡ヲ催

シ熟睡スルハ大艾ニス初二三壯ハ泣トモ又睡リ或ハハ
ナシナトシスルハ大艾ヲニツモ三ツモ合セテ其痛熱ス
ルマテハ灸スヘシ灸數ハ二百モ三百モ灸スレ氏猶熱痛
ヲ覺ヘサルハ次日又灸スヘシ今度ハ初ヨリ大艾ニスヘ
シ病勢甚シキハ六七日モ日ニ灸スル一有サテ灸ノ真ニ
應スルハ灸炷二三壯スレハ灸根紅暈ヲ作ス是ヲ色ノヨ
クツキタルトス是ハ痛熱始終アリテ大灸ニ及ハス壯數
モ四五十壯ヲ度トス必姑息シテ壯數ヲ減スヘカラスニ
十壯ソコラテハ効ナシ艾炷ヲ燒盡シテ根礎ノ処ニ至テ
一際泣聲ニカアリテ啼ヲ真ノ啼トス是則灸ヲスルノ看

法ナリ上ニ云通り二三壯ニテ紅暈ヲ生スレハ灸功速ナ
リ但啼泣ノ真偽ヲ慮テ其度ヲ為スヘシ灸穴ニツキテ預
メ壯數ヲ定メ置カタシ病ノ輕重ニアリ朝ニ灸スレハ夕
ニハ元氣輕爽ニナルモノ也或ハ睡中ニ驚キ夢ニ魘スル
ハ章門ヲ灸スヘシ其効神ノ如シ以上小兒ニ灸スルノ法
トス小兒ノ持藥ノ五疳丸肥兒丸ナトヲ用ユルニ及ハス
月ニ灸スレハ肥壯スルモノ也疳癖ハ猶更ヒ子リ艾ニテ
ハ効ナシ切艾ニスヘシ一體ヒ子リ艾ハ高貴ノ人ノ用ユル
モノナルカ其効極メテ劣レリ前ニ言通りノ灸スヘキ症
ニ灸ヲ忌テ行ヒカヌルハ難治也又紫圓ヲ用ユル一有是

モ小兒ニ異驗アリ口邊ニ瘡ヲ生シテヂレルニ二三厘ヲ
用ユレハ奇驗アリ一醫家ノ兒遊戯ニ兔角氣六ヶ敷ニ紫
圓五厘ヲ用ユ次日輕爽ナリ乳母之ヲ覺エテ氣六ヶ敷
ヲ二三日ハ紫圓カ萌シタリト云テ是ヲ度トシテ用ユ面
色萎黄ニテ鼻根兩眼ノマハリ別テ目元ノ邊ニ黄ヲ帶ヒ
或ハ眼爛レ常ニ白沫ヲ唾スル者腹ヲ按スレハ心下ムツ
クリト高ク物ノ有ニモナク手ノ掌ニ凝ト云ヤウナ氣味
アリテヤハラカナルハ蟲積也芟凶湯ヲ用ユヘシ細虫ハ
絹系五六分ニ切タル如ク又大虵ハ蚯蚓ノ如シ數條ヲ下
スヘシ壁土ヲ食ヒ生米ヲ食フノ類ハ猶更眼胞ノ爛ル、

ハ十ノ八九ハ蟲積ニ屬ス又大人ニナリテモ眼ノ爛ル、
ハ治シカヌルモノナリ
壁土生米炭ナトヲ食スルハ黑瞳散ヨシ瓜ヲ嚙鼻孔ヲ搔
ノ類悉クコレヲ主ル且灸スヘシ
疳勞ト云ハ寒熱大人ノ勞瘵ノ如ク咳シ盜汗瘦テ氣重シ
ナル大人ハ必死ナレ氏小兒ハ十二四五六ヲ救フヘシ是
ニモ蟲積ヲ帶ル有夫ナラハ先芟凶湯ヲ用テ蟲ヲ下スヘ
シ後ニ柴胡桂枝ニモ柴胡薑桂ニモ又ハ柴胡四逆ノ屬ニ
モスヘシ大人ノ通ニテヨシ水狗丸ヲ兼用シテ大人ト違
ヒ其驗アルヲ格別也兔角兼用ニハ疳ノ藥ヲ用ユヘシ新

榮丸黑瞳散雞肝丸食餌ニハ蛙ナトヨシ魃病ヨリ瘡勞ニ
ナルモノアリ治方同前也弄玉湯加附子ニスルヲモアリ
脉虚数ニトリテモ大人ヨリハ治スルヲアリ是モ灸功ヲ
第一トス灸処ハ別ニカハルヲナシ

瘡ヲ患ヒテ漸ニ浮腫スルヲアリ本艸綱目ノ甘遂ノ條
下ニ總微論ヲ引テ曰小兒瘡水ト乃此ヲ云ナリ治法大人
ノ水腫ト異ナラ子氏免角瘡藥ヲ兼用スヘシ灸灸ノ効ア
リ瘡痢ノ中コロヨリ水腫ニナルモ灸スヘシ主方ハ大人
ノ方ヲ用ユ六味丸ヲ煎服スルヲモアリ又ハ味丸モヨシ
小兒ノ病ニ附子ノ効アルモノナリ水腫ハ猶更瘡ニモ其

外一切ノ病ニ藥驗ナキモノニ加テ効ヲトルヲアリ
瘡眼トテ眼中ニ翳膜ヲ生シ或ハ赤痛シテ日向ニムクヘ
カラス又火光ヲ惡ミテ眼ヲ瞑シ或ハ眼胞腫テ塞リ濁淚
ヲ流シ暗室ヲ好ミ終日寂然トシテ聲ナク卧スル有是ニ
モ緩急有急ナルハ一二日ニテ盲ス瞳子ニ近ク星ヲ生ス
ルハ皆明ヲ忌ナリ油斷スヘカラス紫圓ヲ用テ毒ヲ瀉ス
ヘシ若シ虚シテ下スヲナラヌハ雞肝丸ヲ多ク用ユヘシ
是ニハ虫積ヲ帶ルアリ芟凶湯也又排雲湯ニモスル又葛
根湯ニ三黃湯ヲ合ン用ユル事モ有雞肝丸ハ十二八九ヲ
治スヘシ神驗アリ又雀目ヨリ瘡眼ニナルヲアレハ早ク

雀目ヲ治スヘシ雞肝丸主之黑瞳散モ亦ヨロシ鰻鱺魚ヲ
用ユ

小兒咳嗽ニ百日咳トモ又連聲咳トモ云ケイケイシヤフ
キ又クツメキトモ云百日ハカリノ内煩フ流行スル寸
ハ一面ニ病ム咳ノ甚キトキハ乳モ食物ヲモ吐スル風寒
ニ胃スレハ夜ノ間ニ別テ強ク咳スル連綿ト治セサル内
ニ黄瘦シテ大病ニナルモノアリ疳ノ候ヲアラハスニ至
ルモアリ麻黄杏仁甘州石膏湯効ヲ得ルトモ有モノナリ
小青龍湯ナト一向ニ驗ナキモノナリニ陳湯ニ鵝鴝ヲ倍
加シテ用ユル人アレ氏是モ思フヤウニ驗ナシ日ヲ經タ

ルハ各効アリ本草貝母ノ條ニアル方ヲ用テ見ルニ貝母
ハ少シ驗アルニ似タリ奇方呪法種ヒアリ河ニナ介トモ
ニ霜ニ用ユヘシ又胡頹葉陰乾シ末シ白湯ニテ服ス或
ハ人參ヲ加フ此方蘓沈良方中藏經ニモ出タリ日久シキ
モノニ阿片一味薄糊ニ丸シ五六粒ツ、用ユルモ効アリ
又陳海蝶蛸ヲ細末シテ米飲ニテ用ユ久咳ニテ瘦勞シタ
ルハ鼈ヲ餌シテ驗アリスヘテ百日咳ハ其兒ヲ治シテ餘
症ヲ防クヘシ又丹水子ノ乾薑煎治産前後小兒咳嗽乾姜
一錢蘇子半夏杏仁桂枝各四分山椒二分右六味水一盃半
煎取八分去滓入白砂糖如滓大冷服コレヲ用テ効アルト

キモアリサレ凡皮弁散ノ効ヲ第一トス宜ク主藥ニ用ユ

ヘシ

左左羅丸

熊膽

麝香

龍腦

莢木

檳榔子各等

右朱砂為衣

新榮丸 理小兒癩證黃瘦者方

蟾頭

一枚灸

鱗頭

各二錢

蘆薈

胡黃連

五倍子

苦棟皮

夜明砂

雀甕

一名天漿子各五分

熊膽 一錢

雄黃

二錢

麝香

五分

青黛

三錢

右十二味細末以糯米飯丸麻子大一歲兒每服七丸日三

米飲送下隨年壯用意增之

白瞳散

治小兒五疳四君子湯一兩加木鼈子半兩右雞卵

ヲホト蒸ニシテ合セ食ス

弄玉湯

雞肝丸

黑瞳散

皮弁散

藏方

灸

梁門

天樞

章門

膈俞

肝俞

身柱

餌食

蛙

鰻鱺

臭梧桐虫

雞卵 多食ス

黑瞳散ヲ用ユルニ鰻鱺ヲ忌カ若シクハ無トキハカ

ナカシヲ鮓ニテ用ユルモヨシ

驚風 馬脾風

驚風幾度モ引ツ、イテ發スルヲ慢驚風ト云テ難治トス
其因ハ胎毒ノ塊ト成テ不時ニ奔騰スルモノニテコノ驚
風ノ成長スルマテ治セサルニ癩癩トナルアリ癖ニナル
氣味ニテ少シ熱有テモ引付ルアリ暴熱脈數心下悸真中
ニテ甚シキハ驚風ヲ發ス故ニ油断スヘカラス睡中物音
ニ驚キ或ハ犬狗ノクルウニ驚キ或ハ雞ノ猫ナトニ逐レ
テ叫フニ驚キ或ハ高キヨリ落ナントシテ夫ヨリ驚悸ス
ルヲ客忤ト云熱氣ノ有時ハ猶更物音ヲ静ニスルヲ病家
ニ喻スヘシ又痘瘡初熱ニ發驚スルハ伏毒ノ發スルニテ

熱氣早ク醒テ出痘スル故吉事ニスレモ慢驚ニナリテ死
スルモアリ一様ニハナラス其發スル形ハ直視シテ齒ヲ
クイシメ手足搐搦ス脈伏セサルハ吉兆也又少ノ間ハ絶
シテモ忽ニ出ル有始終沈伏シテ絶シタルナリニテアラ
ハレサルモアリ下利ヲ兼子或ハ吐逆スルモアリ葛根湯
ノ正面ニテ嘔スルニハ半夏ヲ加フ又食傷ヲ兼ルアリ是
ハ元來發スヘキノ驚風ノ食傷ニサソハレテ發スル也紫
圓ノ正面ナリサテ胎毒ノ發動シテ奔騰スルナレハ食ヲ
兼スレ紫圓ヲ用ユレハ醒ル三黃湯大小柴胡參連白虎湯
熊參湯何レモ見合テ用ユヘシ又熊膽一味モ至テ効アリ

藥ヲ與テ泣出ストキハ甦リタル也藥水口ニ入テモ手足
ヲ引シメ直視シテ一向泣モセヌハ灸スベシ勞宮湧泉或
ハ人中ナレモ人中ハ灸痕愈テ後ニ見ニクケレハ了簡シ
テヨクヨクナラハスヘシ是ハカルキ時ニスル灸ナリ又
百會ニモ灸ス重キトキハ中ニ甦ラス夫ハ神闕天樞不容
章門ニ大灸ヲスヘシ尤壯數ハ正氣ノウクヲ度トス灸ハ
大人ノ大拇指位ニスヘシ甦レハ一聲高ク泣出スヲ見テ
灸ヲ止ヘシ泣モ亦止思フヤウニ本氣ノ出ヌハヤハリ灸
スヘシ何レニモ灸ノ効ヲ第一トス此症ニハ龍麝ノ入タ
ル藥姜蠶南星ノ類拘龍丸破棺丹ナト、世ニ名高キ丸丹

モ多ケレ氏終ニ是一灸ニ着ス灸ニテ甦ラサルハ十二ハ
九ハ不治也サテ甦リタル後ハ安眠サスヘシ自汗流ル、
カ如ク熱モ醒ルモノナリ治シタル後ニ件ノ灸痕憤爛ス
ルハ膏藥ヲ傳ル此症ヲ病ム小兒ハ毎月件ノ穴処ヲ灸ス
ヘシ此灸サヘ急ラサレハ再發セス灸法ハ前ニ言通りナ
リ必姑息スヘカラス

馬脾風ト云アリ是ハ大人ノ哮喘ニ似タリ痰喉間ニカタ
マリテ死ス偶吹切タルヲ見ルニ甚堅キ疼ニテ餅ノ如シ
泣聲モ出ス呼吸短シ魑病ノ時ニ發スルモアリ是モ甘味
ヲ食シテ發スル病ナレ氏胎毒ノ因ニ屬ス驚風ヨリハ少

キ病ナリ馬脾風ハ俗語ナリト云ヘトモ千金ニ脾風占候
聲不出或上下手ト又喉風ト名クトモ見ユ註ニ脾風ハ總
テ呼テハ風ト為ト馬ノ字ヲ加ヘルモノハ俗語ニ多シ大
ノ義ニ用ユ醫學入門ニ輕粉ノ入タル藥出タリ未タ試ミ
ス又馬糞ヲシホリテ汁ヲ飲ト良ト云フヲ俗傳ニ聞タレ
氏此モ未タ試ミス馬ト云字ヨリ出タルヤサテ此病ハ十
ニ一二ヲ治スヘシ驚風ヨリハ凶惡ノ病ナリ藥水口ニ入
ラスシテ死ス先麻黃杏仁甘草石膏湯ナリ一門生ノ兒馬
脾風ヲ患フ百方効ナシ艾灸數処ニ及ヒ予ニ託スレ氏亦
奈ントモシ難シ仍テ化毒丸ヲ二分許リ與フ奇驗ヲ得ニ

三日用ヒテ終ニ全快セリ

三黃湯

紫圓

葛根湯

黃連解毒湯

灸

章門

不容

天樞

上中腕

湧泉

勞宮

人中

一兒眼吊シ聲出ス乳哺ナク日ニ幾度モ引付三黃ヨリ大
小柴胡ノ屬白朮散ハ猶更十日餘ヲ経レ凡一効ヲ得ス衆
醫手ヲ束ヌ予風ト斯ノ如キハ癖積ナリト思ヒテ淨府湯
ヲ用ユ一帖ニテ再發セス又一女兒十二三歳瘡疥内攻腫
状ヲ為ス一門人之ヲ治ス赤小豆湯ヲ與フ夜間癩ヲ發ス
針灸スレ凡甦ヲス水毒衝心ストナシテ甘遂丸又ハ擯榔

子末ヲ黑豆煎汁ニテ送下ス灸カ藥カキ、テ甦タリ呼吸
穩ニテ衝心ノ勢ニハアラス少頃アリテ又發ス前方ヲ用
ユルニ甦セス更ニ三黃湯或ハ紫圓ヲ投シテ甦ル間モナ
ク又發ス藥驗ナキ故ニ藜香圓赤竜丹ノ屬齒ヲ開テ灌ケ
凡少シク甦ルニ似テ正氣薄シ其度ニ灸ハ手足心天樞神
闕章門カハルカハルニ大灸ヲスレ凡通セス其正氣ノナ
キ中ニモ更ニ癩ヲ發シテ搐搦スル時アリ深更ニ予ヲ迎
フ前來ノ病状如何トモスルヲ能ハサルニ彼淨府湯ノ
ヲ思ヒ出セリ則一貼ヲ與フ未タ盡サルニ甦リテ再發セ
ス夜明テ少正氣アリ灸痕水包痛苦スルヲ云猶前方ヲ

守ルニ小便快利腫消シテ全愈ス

丹毒

丹毒ハ寒熱ニ甚煩渴シテ周身定ル処ナク丹クナル或ハムラムラトナルヲ赤遊風ト云其丹キ処源氏雲ノ様ニナルヲ雲花頭ト云又寒ナク偏ニ大熱スルモアリ三黄湯白虎湯又ハ犀角ヲ用ユルヲモアリ又近頃江州ノ大島某ノ丹毒ヲハヤクサト名ツケテ奇術ヲ施印ス曰ハヤクサノ病症ハ其相顔ニアラハル最初ニ左右ノ耳及頬ノ色赤又赤黒クモナルアリ夫ヨリ咽喉エムケテ其相顔ル也或ハ腹痛スルモアリ或ハ正氣ヲ失ヘルヤウナルモアリ腹痛スルハ腹カタクタトヘハ石ノ如ク又腹マハラカニシテ

腹ニ熱アルモアリ是ハ病ノ輕重ニヨルナリ此病ハ俄ニ
發シ甚急ナリ尤餘病ニ異ニシテ耳及頰ノ色ヲ見ルヲ丹
毒第一ノ見立トスル也能ヒ心ヲ付テ見ヘシ右ノ相顯レ
丹毒ニテ是アラハ左右ノ肘ノウチ臂ノ折カ、ミト肩ト
ノ真中子トモナトノカコブト云フ処工得トロヲ付テ強
ク吸也是療法也輕キハ血出重キハ黒血出ルニ口三口ホ
トツ、血出ル也血ノ出ヤムヲ期トス若療治格別手オク
レナレハ吸トモ血出カ子ルヲアルヘシ其時ハカコブノ
處ヲ平針カ剃刀ニテ少シハ子切テツヨク吸ヘシ若夫ニ
テモ驗ナキハ左右ノ足ノ大拇指ノ本ヲ元結ニテ四五篇

ホト強ク括リ置テハへ際トセツ毛ノ間ヲハ子切血ヲ出
シ其一、直ニ元結ヲホドクベシ尤外ノ病ハ知ラズハヤ
クサニ右ノ療治ヲナセバ何ホド重キ丹毒ニテモ治スル
事神妙也手ノ大陰肺經ノ圖ニテ云時ハ雲門尺澤ノ間俠
白ト云圖ノ少内ニ當ル也嗚呼此術ノ妙ナル事ハ用テ知
ヘシト有リ按スルニ此術丹毒ニノミ用ユルニアラス諸
病ニ運用スヘシ小兒ニハ刺絡ノ法行ヒカタシ今試ニ吸
ニ血ハ無病ノ人ヲ吸テモ出ル也醫說ニ是ニ似タルヲ
載タリ小兒丹者風熱積毒所成冬間烘衣藉不候冷以衣兒
或夜間蓋覆太暖日間親火或妳兒喜食燒炙物飲酒之類皆

致兒病丹也。或發於手足。或發於頭面。曾背其熱如火。輕口著手。則痛不可忍。急為砭出血。為上策。千金有服食并搗湯皆可。用又鍼灸聚英二奪命。ト云穴處ヲ載ス。此穴入門ニ惺トト名ツケ醫學綱目ニ蝦蟆ト名ツク手膊ノ上筋骨ノ間ニテ曲澤ノ上一尺ト見ユコレニ針シ暈倒シ療ス丹毒ノ血ヲ吸フ處ニアタル然レトモ小兒ノ熱ヲ治スルノ說ハナシ。詳ニ經穴彙解ニ載タレハ考合スヘシ。

復中川修亭

僕嘗聞南紀華青洲先生者。癰疽治方有奇術。遣門人楊生者。學歸時携足下書并所惠管城二柄。謹領文房清翫。感荷感荷。

且楊生言與足下相見於京師。慙慙之事。前楊生之在南紀。寫寄險證百問一本。僕謂是青洲自問自答。而附吉益南涯之答者。率爾評其二三。以示楊生。何料足下之所問。而經足下之清覽。不堪愧赧。僕生東海濱。老東海濱。獨學孤陋。無過人知識。何齒乎都人士。僕所以評二三。者。以所自試驗。示楊生等而已。而足下重被之。其全答。設使答之。恐不足補足下所好也。敢辭。且賦一律。聊寄其意。僕役ニ于刀圭。動奔走東西數百里外。橘子黃而尚未休。昨楊生來曰。西京中川君之書。達求其報。僕遲緩之罪。不知所謝。諭云。僕所著醫事小言。嘗見寫本四冊。於浪華。後於京師見刻本二卷。被怪未全備。此書僕平日家居之雜話。

以口授門人子弟等筆記備遺忘故其言極卑俚終得六卷其尾附弊家藏方共為七卷自以家傳禁方不許示外人何知誤落人間傳寫四方殊多謬誤大致齟齬門人等患之亦不可如之何也乃相議曰自以誤二人不如公之計上本甚急仍先刻二卷次年刻第三卷今年又刻第四卷書肆行當致京師願賜覽觀如其五六七卷追年當附刻惟是賤陋取笑識者於今無所逃僕嘗著經穴彙解八卷叢桂偶記二卷瘦狗傷考一卷既行于世而又有若艸一卷如醫事小言若草二書非公行于世之書共出意外并以告時惟凜烈自愛十一月五日副洛下最里公濟者昨寄書乞序其著述不知此人在知交中

否

醫事小言逐季上本今茲已到第五卷人或憾望其全帙刊行之遲緩疑惑不少矣先生有曩答平安中川修亭一書今乞之附卷尾聊以解其疑云

文化十三年癸亥

大島員謹識

叢桂亭醫事小言卷之五畢

南陽原玄瑛先生著述目錄

經穴彙解

俞穴の誤を訂悉古書に徴し頭面腹背手足各分寸法以圖に流注の一卷一經切に別圖に記し奇穴二卷ハ諸書出

八卷

瘈狗傷考

病大喰療治りて記し附録にハ鼠喰蛇食其外諸毒虫刺經驗の秘方を載

一卷

叢桂偶記

仲景の事跡を考諸書に考つるを以て集め廣東人參伊吹艾の考瘡癩の考しやハ丈島流竹の考瘡癩神の考病名儒の考

二卷

叢桂亭醫事小言

假名を以て医学論の秘を察色狐つきの病因病名以古書に考し經驗の良方を以療治を教未だ家の秘方を以

七卷


砦草

戰場に急卒の病金瘡赤身水死に至るまで救へき心付入旅り此の病癩を貯りき方素人として製するなり成やとせし秘を以

一卷

書肆

- 京都 二條通富小路 須原屋平左衛門
- 江都 下谷池之端仲町 須原屋伊八
- 水戸 下町本町三町目 須原屋安次郎



世取桂真醫事小言終